



بالقزمية والبطيخية والقرمية والندانية
والبريطانية والاندلسية والبريانية
المواد والمعادن

إدوار غَالِب المَوْسُوعَة

٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ مللّة
٦٩٦٢ رسمًا • ٢٤ لوسّة ملوّنة

في عُلُوم الطَّبِيعَة

تبحث في الزراعة والنبات والحَيوان والجيولوجيا



دارالمشرق بيروت



مخطوطات ،
دارالمشهورت ش.م.م
ص.ب. ٩٤٦ - بيروت ، لبنان

الطبعة :
المكتبة الشرقية - ساحة البوابة
ص.ب. ٦٩٨٦ - بيروت ، لبنان

الموسوعة في علوم الطبيعة

الرسوم :

جورج ديب

جورج غلطوس

جان قرطباوي

جهاد جبر

سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الثاني : ISBN 2-7214-2550-6

يحتوي هذا المجلد من

القصص والروايات والسير الذاتية

١٠٢٠٨ مؤاد

٢٢٧٧ رسا

٨ لوحات ملونة

الأستاذ غالي

مهندس زراعي

الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور
والبحر والشجر والأرض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجيولوجية والطب والحقائق
وتتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على مسارد للمصطلحات باللغات :
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الثاني

من الرء إلى الفء



السرعويات . مستطيلة الجثة ، قصيرة القوائم ، غيراء الصفحة العليا من قفن الرأس الى الذنب ، سوداء الصفحة السفلى من الرأس الى الذنب . اذنانها صغيرة مستديرة . حلبيها كثيف وليليط . اطرافها طويلة حادة || مسرهما من القروب الى الفجر . قوتها البسل والفسار والجرذان والحيات والمصافير والديويات والثآير وجبور بعض الانجار . له نوعان ، يليان .

١١١٥٣ - واهك
قال ابو حنيفة : « شجرة ترتفع على ساق ثم تنفرع لها ورق ممدود احمرش » . وقال غيره : « شجرة جبلية كانتها عظلة ولها زهرة بيضاء لينة كانتها تفل » . ج راء .
١١١٥٤ - وايض
الرايض نجم لير من كوكبة التنين مركزة على اللسان .

١١١٦١ - وائل ابو كعب *
Mellivora leuconota, Ratelius capensis (S). Ratel du Cap (F). Ratel of Cap (E).
نوع من الراتل موطنه افريقية الشرقية والجنوبية . طوله نحو ٨٥ سم . ذنبه ٢٨ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم . يألف الجبال والارحاج والبراري على السواء ويتسلق الانجار بختسة .

١١١٥٥ - وابل حركاة
Thermostat (F). Thermostat (E).
جهاز آلي يستخدم في تكييف الحرارة المطلوبة وتثبيت استمرارها على درجة معينة .
١١١٥٦ - وابلعة
Lieux (F). Binder (E).
اداء آلي يجمع قيرط الزرع ويربطها .



راتل ابو كعب

١١١٦٢ - وائل ابو كيم * ششور، لصلوص
Mellivora indica, Ratelius indicus (S). Ratel de l'Inde (F). Indian ratel (E).
نوع من الراتل موطنه الهند وبلاد فارس وبنارها . طوله نحو ٨٥ سم . ذنبه ١٢ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٤ سم . يألف الجبال والارحاج ، يرغب في المناطق الكثيرة الغصاب والوبصاد .

١١١٥٧ - وابلعة ، خاصلة
Phytophage (F).
Plant-eating (E).
هي كل حشرة قوتها النبات .
١١١٥٨ - وابلعة
Colline (F). Hill (E).
ما ارتفع من الارض وكان دون الجبل .
١١١٥٩ - وابلع زراعي
Rente convenancière (F).
Fifty rent (E).
هو الذي ينشأ على ارض زراعية ولا يجوز لمستعته ان يسترده ولكنه يجوز للمدين بعد التحرر منه بالتخلي عن الارض .



راتل ابو كيم

١١١٦٣ - وائل *
Pléiotrope (F). Pléiotropic (E).
صفة الجين الوراثي الذي يحقق جمع السمات المتباينة .

١١١٦٤ - وائلنج
Résine (F). Resin (E).
وبهم من قال راتنج . مواد ثلاثية معينة لزجة تنفصها بعض النباتات لاسيما الصنوبريات واللبطيات .

١١١٦٥ - وائل ، اكل العسل
Mellivora, Ratel (S). Ratel (F).
جنس حيوانات راسية بليطة الحركة ، كسولة من فصيلة

١١١٧٦ - رائج الصنوبر - كاشيف

Réactif (F).

Reactif, Reagent (E).

كل مادة كيميائية يساعد انفعالها حل الكشوف عن حقيقة الجسم لللوب مفرقة.



راتون غاسل

١١١٧٧ - رادان

Safran (F). Saffron (E).

هو الزعفران ، مله.

١١١٧٨ - رادوم

Radium

عنصر معدني نادر الرصيد اكتشف عام ١٨٩٩ بمقرور عام ١٩٠٤ على يد العلماء يار وباري كوري وبيون. لونه ابيض فضي يضيء في الظلام. اشتد شفقوية برفها فسقي. يتفكك بسرعة اذا تعرض للهواء || يوزن (يو-٢٣٨) وزنه الذري ٢٢٦,٠٥ وله ٨٨ يصهر في ٩٦٠° س. يتميز بشفائه الاشعاعي العظيم وخاصيته في اباداة الانسجة الحية التي يستخدمها الطب في معالجة الاجزاء المبطورة من الجسم || يوجد في بعض انواع الفحم المستخرجة من مناجم بوهيمية وفي الكونوق والولايات المتحدة وكندا.

١١١٧٩ - زكو الجبلع *، صمغية زبانه

Xanthochrous hispidus, Polyporus hispidus (S). Polypore hispidus (F). Hardwood (E).

ظفر من السيات يركب بعض الاشجار الحرجية والزراعية اعصها الدلب والصرة والشت وتوت والجزر والخلع. اروسه مستطيرة قطرها نحو ١٠ سم. وهي مقنطة الجلبع القائم حل الجبلع. لونها اصفر يتقارب ثم يحل ويضيء بالسمرة. ليلها مفتحي التركيب ، فزير الصارة ، اصفر اللون في اول حمله ثم يحل منه ادراكه وخليه من الصارة || يوفاته صفر ، يضيء الشكل ، قياسها ٥x٧ ميكرون || مشيجه يدخل من الاجزاء اليابسة فيضمرزك بين القشرة والشب اليابس ثم ينش في الشكير والشب ويمنه سى القلب || يكافئ بتفتيل وتطهير الجروح اليابسة ويطلي بجروح الجلود والاضغاص باحد المالبين الخاصة او السليخ.



زار الجبلع

١١١٨٠ - زكو الصنوبر *، صمغية الصنوبر

Xanthochrous pini, Polyporus pini (S). Pourriture rouge du pin, Polypore des pins (F).

ظفر من السيات يركب الصنوبر للسر الذي صار حزن لاحتلاط الراتج || مشيجه يدخل وألأ الى قلب الجلع حيث يتضمرزك ثم ينتشر من الداخل الى الخارج وين مركز انطلاقه الى اعل ولعل بذات المساحة التي تراوح من المتر الى المترين فيطبل الخشب كما يبدو في الرص بعد ان يفضن حفره || اما القطر فاروسه قنفسية الشكل ، جانية الانكاز حديدية الاغصان المستمرة. قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفرة الشبه. ليلها ظلي ناشف التسج حلي اللون الزاقي || يوفاته شفاة تبنيه اللج يضيء الشكل قياسها ٥x٦ ميكرون || يكافئ بتطهير جروح الخز منه نهاية لاحتلاط وباتزان غطور قبل ادراكها.



زار الصنوبر

١١١٨١ - زكو الكشمش *، صمغية الكشمش

Xanthochrous ribis (S). Polypore du grosellier (F).

ظفر من السيات يركب سوق الكشمش عند سطح القربة فيطبل اللسة والشكير دين ان يتدها الى الخشب. اروسه قيمة الشكل فائرة الحافة المنخفضة لصلية ، لونها اصعب حلي ثم يميل الى الحزوة. ليله اصفر غامي



زار الكشمش

١١١٧٥ - رائج الصنوبر

Barras

صارة صمغية راتجبة تزيل من حز سوق الصنوبر البشري.

١١١٧٦ - رائج الصنوبر

Réineux (F). Resinous (E).

اسم شامل يطلق على كل شجرة راتجبة الصارة اعصها الاجار الفصيلة الصنوبرية.

١١١٧٧ - راتون ، راتون

Procyon (S).

Raton (F). Racocon (E).

جنس حيوانات لبنة من فصيلة الراتونيات. موطنها ايلاد الاريكية. تشبه الدب والفرير. اصوالها لبدة صغيرة. انائها تقسم نحو اربعة جزاء تر بها نحو الحول || له نصان الراتون الفاسل والراتون المنى.

١١١٧٨ - راتون فاسل *

Procyon lotor (S). Raton laveur (F). Maspach (E).

نوع من الراتون. حفره اربعة متشرة من المكسيك الى السكا. طوله من ٨٠ الى ٩٠ سم. ارتفاعه من ٣٢ الى ٣٦ سم. ثوبه المتكبل الى القطعة القنراء يعلوها موج اصفر || يالفت خطوط البسمات والانهار يعيش في البر ولله وحل الاشجار. لا ياكل شئاً الا بعد غله بللاء. قوته التار والحبوب والجلور والبير والاسماك.

١١١٧٩ - راتون صمغي *

Procyon cancrivorus (S). Raton crabier (F). Agouara, Crab-eater (E).

نوع من الراتون. موطنه امريكا الجنوبية. طوله نحو ٧٥ سم. ارتفاعه ٣٢. ثوبه الى السمرة يعلو جسمه خطوط ييض حازنة. لا يسل اكله. قوته التار والجلور لكنه يرغب في بعض انواع السرطان اعصها المنع.

١١١٨٠ - راتونيات

Procyonidae (S). Procyonidae, Rats (F). Procyoni, Racoons (E).

فصيلة حيوانات من الثدييات القوارض. تأتي بين السنوريات والدييات. اجناسها خمسة : البشري واليندا والراتون والكواكي ولكنكاجو ، جميعها امريكية المولن.

١١١٨١ - راجع

Probabisme (F).

Probabilism (E).

الراجعية ملهب ظلي اجتاهي يقبل باهمية اللول وفقاً لراي الرابع.

١١١٨٢ - راجع ، راجع ، راجع

في الخمر ، شراب كحولي يحصل من اختيار صير المنب.

١١١٨٣ - راجع الاكسد

هو صالغ الاد ، مله.

١١١٨٤ - راجع

Melliphage (F).

Melliphagus (E).

نعت تصريفي يطلق على الطيور والاشجار التي تزحف رديم الاذكار. ج رواجح.

١١١٨٥ - راجع

Couvouse (femelle) (F).

Brooding-han (E).

اثنى الطير في زين حصفها البيض. ويقال ارض الماثر وارغمت اللجاجة على ييضها فهي مرغ.

١١١٩١ - **رأس الثعبان** Rastaban (F).
Dragon's Head (E).
رأس الثعبان ويسمى أيضاً رأس الثعبان نجم ثير من الموائد وهي اربعة انجم مركزها على رأس الثعبان .

١١١٩٢ - **رأس الجاني** Ras Algehi
رأس الجاني ويسمى أيضاً كلب الرامي ، نجم ثير من كوكبة الجاني مركزه على الرأس .

١١١٩٣ - **رأس الحشيش** رأس الحشيش هو الكروثن ، اطليه .

١١١٩٤ - **رأس الله فوري** رأس الله فوري هو القطريين الاسمر ، اطليه .

١١١٩٥ - **رأس الشبح** رأس الشبح هو الاقسن ، اطليه .

١١١٩٦ - **رأس العصفور** *
Clinopodium vulgare, Melissa clinopodium (S).
Clinopode, Grand basilic sauvage (F). Wild basil,
Horse-thyme (E). Gemeiner wirsbaldost (D).
Basilico salvatico, Clinopodio (I).
نبات حشوي يري طبي معمر من فصيلة الشفويات ينبت في ضباب ورماد مناطق حوض البحر المتوسط . ساقه فروع مشرعة كثيفة الزغب . اوراقه لائحة متعاقبة صغيرة . ثقلها كثير المروق والشرابين ، مزبب الصلصة ، عشن اللبس . ازهاره ابطية الاركاناز ، ضمية التجميع ، مهدبة الكأس والقلص وهي بيضاء اللون ليلكية المواج . يقاى ان اوراقه وازهاره طيبة تفيد المعدة .

١١١٩٧ - **رأس الفول** Algol
رأس الفول نجم ثير من كوكبة سيابس .

١١١٩٨ - **رأس النخل** Chaintre, Fourrière,
Tournière (F). Balk, Headland (E).
المكان في ابل الحقل وأغره حيث تثقل سكة الحراث وتعود اللواب .

١١١٩٩ - **رأس الفخر** رأس الفخر هو الجبلج ، اطليه .

١١٢٠٠ - **رأس مال ، ورسمال** Capital
هو مجموع الثروة المخصصة .

١١٢٠١ - **رأس مال الشركة ، ورسمال الشركة** Capital social (F). Registered capital (E).
هو مجموع المبالغ المدفوعة أو الاموال المقدمة الى الشركة .

١١٢٠٢ - **رأسيب** Précipité (F). Precipitace (E).
عكر او دودي يحصل في بعض السوائل ويذهب سلسا من جراء استعمال بعض المواد الكيماوية .

١١٢٠٣ - **رأسية** Diluvium
غرين جيولوجي قديم تجمع في الحقبة الرابعة او قبلها بتأثير مياه الانهر والبيحار والثلج .

١١٢٠٤ - **رأسمالية** Capitalist, Capitalisme (F). Capitalism (E).
هي سيادة الراسيل والرأسمالين وهي من النظم الاقتصادية السائرة الى الاستغلال وذلك لان معظم العالم يدين بالتروسيه ويستسلم الى سلطان الدولة .

مكون من طبقتين متصلتا انفياً خشابة ليفية صلبة سوداء اللون . اللبقة العليا استنجية التركيب حشة وكسل فلينة جامدة || يوفداته حشلية مستديرة قطرها من ٢ الى ٥ ميكرون || يكلف بانثاز الفطور قبل ادراكها ويظهر السماء والشكر بعد تنظيفه . بين الضروري اجتناب زراعة الكشمش في الاثرية القوية الانسجام .

١١١٨٢ - **وكزيانج** هو الشبار ، اطليه .

١١١٨٣ - **وكزيانج كبير ، برهيكية** Hippomarstrum (S). Hippomaratre (F). Rosemary frankincense (E). Languedockische nussdoldie (D). Ipomaratro (I).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الليميات . انواعه عديدة منبتها الاراضي الملاحية . اوراقها خرقية غمرية . ازهارها صفراء . روفها مستحب الرائحة تفوح من اللبس .

١١١٨٤ - **وكزيانج * ، مشغيل ، إينانكة** Enanche (S). Enanche (F). Water drapwort (E). Pferdesaat (D). Enanto (I).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الليميات . انواعه نحو ٣٠ جميعها متعقة او مالكة . اوراقها مشرعة المتصل . ازهارها مزراجية بيضاء اللون || يستخرج من جذور بعض انواعها صمارة صفراء اللون سامة يمتة . اشهر انواعه الازرايانة المالكة .

١١١٨٥ - **وكزيانج مالكة * ، مشغيل ، ماليك ، إينانكة متعقبة** Enanche phellandrium (S). Phellandre, Fenouil d'eau, Cigué aquatique (F). Water hemlock, Horsebane (E). Echpe pferdesaat (D). Phellandrio, Filipendula, Cicuta aquatica (I).
نوع من الازرايانة يعيش في المناطق وعلى ضفاف الانهار . يملو نحو المتر . سمه نافع ميت . يستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

١١١٨٦ - **رأس** Tête (F). Head (E).
عصر من اعضاء الجسم الحيواني يتكون من حلية عظمية لا قياسية الشكل تدعى الاجسمة تحوى المخ والشيخ والانتخا للمستطيل . فلافها اشجية عظمية يسلطها الجلد الذي يحمي الشعر . ويسمى الرأس على فتحتين القمم والالاف وما طريقا التنبس والاكل وعلى اعضاء الحس وهي العينان والاذنان والالاف واللسان .

١١١٨٧ - **رأس الأسد** Ramas
رأس الاسد نجم ثير من كوكبة الاسد الاصفر .

١١١٨٨ - **رأس الأفقي** رأس الأفقي هو الاحيون ، اطليه .

١١١٨٩ - **رأس التثن** رأس التثن هو البقران ، اطليه .

١١١٩٠ - **رأس الفول المومصر** Pollux
نجم ثير من برج الثوابين ، يبعد عن الارض نحو ٣٢ سنة ضوئية .



زايانج كبير



زايانج



زايانج مالكة



رأس العصفور

جميعها صغيرة القند المولدا ترواح من ١٧ الى ٢٠ سم. أجسامها أحليجية الشكل. رؤوسها خفيفة ، قصيرة المظهر . زعانفها الظهرية مستطيلة ، تسامية المناس . اثوابها تراوح بين الطحلة والحرة . سهلها أزرق الخمار ٥ غوبها مستطيلة الصف مأكولة .



رأسن حامي

١١٢١٤ - رأسني * Capitula (F). Capitata (E). شكل من الزباني قوله فواصل اسطوانية متتامة تملظ تدريجيا عند الفواصل الثلاث الأخيرة .



رأسن طيني

١١٢١٥ - رأسيات Céphalés (F). Cephalata (E). قسم من الرؤيات يشمل رأسيات الارجيل ومعديات الارجيل ومجتمعات الارجيل .

١١٢١٦ - رأسيات الأرجل Céphalopodes (F). صف حيوانات من الرؤيات .

١١٢١٧ - رأسية ، فيفالكثف Cephalanthus (S). Céphalantho (F).

جنس نباتات برية وريشية من فصيلة الفويات . دعت رأسية لان تنورها اثباتي ويستدير كالرأس . انماها عديدة جميعها شجيرات تمل من مترين الى ثلاثة امتار . تكثر في المواقع الرطبة وعلى ضفاف الجبترات والمنائق . فنيدها طريقة متقابلة . اوراقها مستطيلة معتقة . ازهارها لورية التجميع ، كبيرة الحجم ، بيضاء اللون ٥ اشهر انولها رأسية الحدائق .



رأسن من السج

١١٢١٨ - رأسية الحدائق ، فيفالكثف غربي Cephalanthus occidentalis (S). Céphalantho occidentalis, Bois à boutons (F). Button-bush, Globe flower bush (E). Amerikische kopfbäume (D). Cefalanto, Legno da bottono (I).

هو النوع الزراعي الوشفي ، يمل نحو ٣ امتار . اوراقه بيضية ، مستطيلة ، ذلقة الزام الاخير . ازهاره حطرة نوبيا الى الابيض يملو موج اصفر ٥ ازهاره يستمر من تموز الى آب .



رأسن كبير الزهر

١١٢١٩ - ركشة Rachis القراشة هي محور البنية والحرة والمفرد والاوراق المركبة وغيرها . وين اسمها الزند والقت .

١١٢٢٠ - ركش Filter (F). Fiter (E). اداة تصفى بها السوائل من ماء وغيره .

١١٢٢١ - ركشة الندي في لغة التجميل ، اطباها .

١١٢٢٢ - ركش Commensal تمت ترميى يطلق على كل حشرة تلازم غيرها وتعيش على حسابها .

١١٢٢٣ - ركصيدة ، صجلا ، مقرب Telescope (F). Telescope (E). جهاز خاص برصد الاجرام السماوية .

١١٢٢٤ - راج Berger (F). Shephard (E). هو من ولي امر التجميل .

١١٢٢٥ - راجي Erral الغراي نجم من كوكبة قيفاوس مركزة على الرجل اليسرى .



رأسية الحدائق

١١٢٠٥ - رأسن Inula (S). Aunbe, Inule (F). Inula (E). Alant (D). Enula (I). جنس نباتات حشوية معمرة من فصيلة المركبات الابتوية الزهر . انولها عديدة مظهرها بري ويصفها ركسي . اوراقها متناحية لا قياسية الانتساب . انماها خفيفة رؤوسية صفراء القرس ٥ احرف انولها يشهرها قيق .

١١٢٠٦ - رأسن البركاشيت هو البرنوبه ، اطباها .

١١٢٠٧ - رأسن حشامي * Inula ensifolia (S). Aunée ensiforme (F).

حشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . ساقها غليظة زباه اللحاء ، متناحية الوراق السنانية الضيقة ، تفصلها خلي البشرة خامي المرواح المتزاوية . رؤوسها الزهرية متجمعة القند ، قطرها يراوح من ٦ الى ٦ سم . قناباتها المخاربية مستطيلة حسامية الشكل ٥ ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١١٢٠٨ - رأسن قيق هو الحليون ، اطباها .

١١٢٠٩ - رأسن طيني ، جناح رؤسي ، ركشجيل شامي ، قسقت شامي

Inula helenium, I. campana, Corytaria helenium (S). Aunée grande, Elecampane, Oeil de cheval (F). Common inula, Elcampane, Horse-selder (E). Echter alant, Alantaster (D). Enula elenio, Enula campana, Ochio di cavallo (I).

حشبة طيبة برية معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها حافسة كبيرة القند ، السفلية منها تطلو نحو ٨٠ سم . والمطلوية طول من ١٥ الى ٢٥ . نصلها ازهر الصفحة السفلى الطحلاء اللون . حطها صلب القروح ، رؤوسها الزهرية كبيرة القند ، قطرها نحو ٧ سم . ازهاره يستمر من ايار الى ايلول .

١١٢١٠ - رأسن عتق المسح * Inula oculus-christi (S). Aunée oeil du Christ (F). حشبة سرورية معمرة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها معتقة ، متناحية . نصلها خلي البشرة باهت الخضار الاظحل . حلق ازهارها كبير القند ، رؤوسها معتقة قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم . ٥ ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١١٢١١ - رأسن هدي Inula glandulosa (S). Aunée glandulosa (F).

حشبة معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها زغبية اللحاء تنتمي بزهر رؤوسية واحدة ، قناباتها غزيرة الشكل . اوراقها صغرية القند ، لينة ، خيفة . نصلها خلي البشرة حل صفحتي . حناره مبرر الحد الدنية الطاهرة . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١١٢١٢ - رأسن كبير الزهر * Inula grandiflora (S). Aunée à grande fleur (F). حشبة سرورية معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها لاطقة تطلو نحو ١٠ سم . رؤوسها الزهرية كبيرة القند ، قطرها يراوح من ٦ الى ١٠ سم . لسنتها بترقالية اللون . ازهاره يستمر طول شهر حزيران .

١١٢١٣ - رأسون ، قارة البحر Novacula (S). Rason, Rasoir, Rat de mer (F). Razor-fish (E). جنس اسماك بحرية من شلكات الزانف وفصيلة الكوسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اسماها بجار البلاد الحارة .

١١٢٣٩ - راقود *
Platycephalus (S).
Platycephale (F). Flathead (E).
جنس اسماك بحرية من شراكات الزعانف وعضلة الطرفيات
انواعه المعروفة ٣٠ اسماها بحار البلاد الحارة . جميعها
منزلة الشكل ، مفلطحة الرأس ، مستطيلة الزعانف الظهرية
وبطنية ، صغيرة الفصوص الخشنة . منشفة الانثوب .
تسرح في السمق ، تألف المناطق الرملية حيث يطيب لها
الاستقرار والاعتدال بانتظار الافتراس .

١١٢٤٠ - راقوش ، راقولويه *
Ramularia
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرامليات يركب النصل
على صفحته فيوشه يقع مختلفة الالوان يذبل فيها الابيض
والاصفر والاسمر || منشفة شديدة الرقة والمليونة ، داخل
وتخلوي الانتشاب . جريه الكنيدي قصيرة ، شفاقة ،
غنية التجميع ، كنانته مستطيلة ، قليلة التشعب ،
اسطوانية ، مؤنثة . يرفاته مختلفة الالوان والشكل تنبل
فيها الاسطالة || انواعه كثيرة البد اعرفها ما يتبع .

١١٢٤١ - راقوش الإجماسي *
Ramularia magnusana (S).
فطر مجهرى يركب ثمار الاجناس والتفاح المغوطة .
مظهره الخارجي يقع قطرهاراوح من ١ الى ٦ م . تملأ
بشرة الشرة فتسقطها ببناء مشبي التركيب ، خلي الشكل
يبدو ابيض اللون ثم يتحول الى الوردي وينتهي بالاسمر .
اضراره لا تقتدى البشرة . يذرك بالتوبة وباجتناب الحرارة
والرطوبة .

١١٢٤٢ - راقوش البنفسج *
Ramularia lactea (S).
فطر مجهرى يركب اوراق البنفسج . مظهره الخارجي
يقع شبه مستوية قطرها نحو ٥ م . تملأ نصل الازواك
وقد تصيب الحاليق والازهار . تبدو صفراء اللون ثم تتحول
الى الابيض تحرقها حالات تلية || يجب قياس التسج
وتسج الازواك يذبل الازهار || يكافح منه ظهوره
بالتصاع الازواك المؤنثة وينضج الثبات بامتد الفوطير
المركزة على التماس .

١١٢٤٣ - راقوش الدويكييات *
Ramularia primulae (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الدويكييات واعصها زهرة الربيع .
مظهره الخارجي يقع مستوية او مقرنة الزوايا تبدو النصل
على صفحته تبدو على العليا صفراء اللون ثم تتحول الى
الجلوة وتكون على السطح خلية بيضاء || يكافح منه
ظهوره باستهلاك مركبات التماس .

١١٢٤٤ - راقوش الشوندر *
Ramularia beticola (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الشوندر في اواخر الصيف .
مظهره الخارجي يقع صغيرة مقرنة الزوايا قطرها من ٢ الى
٣ م . توشم النصل على صفحته . تبدو مستطيلة اللون
حراء الاغلاز ثم خلية بيضاء || اضراره زديدة لا تستجيب
للمكافحة .

١١٢٤٥ - راقوش الحشيش *
Ramularia cynarae (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الحشيش والاراضي شوكي والقرطم
والكرزنت || مظهره الخارجي يقع قسيحة مقرنة الزوايا
تملأ النصل على صفحته فتبدو على العليا سواد اللون وعلى
السطح ريدانية خلية كثيفة الزغب || اضراره زديدة
لا تستجيب للمكافحة .

١١٢٤٦ - راكمي ، ليرويس ، عسور
Eros, Amor (F). *Eros* (E).
الراعي كوكب سيار يتبع النظام الشمسي . مركزه بين
الارض والرميح . دورته حول الشمس تستمر نحو ٩٤٢
يوماً .

١١٢٤٧ - راكمي الجوزاء
راعي الجوزاء كوكب .

١١٢٤٨ - راكمي الحنور
راعي الحنور نجم ثير من كوكبة حور وسية مركزه على
رأس الحور .

١١٢٤٩ - راكمي الشفاه
la Bourvier (F).
راعي الشفاه كوكبة نجم شالية المقيع تسمى هواء ، اطلها .

١١٢٥٠ - راكمي النعام
راعي النعام كوكب .

١١٢٥١ - راكميكة
Phagocyte (F). *Phagocyte* (E).
في اللقطة ، اطلها . والراعية ج . دواع من وضع البازي .

١١٢٥٢ - راكمين *
Prémonitoire (F).
Premonitory (E).
نعت تعريفي يطلق على الامراض او الاعراض التي تسبق
نغوب المرض . او على الملاحظات التي تشر بقرب وقوع
الحوادث .

١١٢٥٣ - راكميد هو الجمد ، ج روافه .

١١٢٥٤ - راكمية ، عكلية ، ميخل
Lavie (F).
Lever (E).
ضبيب صلب يتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز
يستعمل لرغ الالتقال والمحنور وما شبه || والرافعة
انواع منها التي تقع نقطة ارتكازها بين القوة والمقاومة .
وبها التي تقع فيها المقاربة بين القوة ومحور الارتكاز .
وبها التي تقع فيها القوة بين المقاربة ومحور الارتكاز .

١١٢٥٥ - راكميا
Raphia (F). *Raffia* (E).
جنس نخيل غليظ الجذع ، مستطيل المسطح ، كبير الشبة
الشدلية ، حشني الثآبر . انواعه صلبة ، موطنها افريقية
وامريكا الجنوبية ويندغسر || اعرف انواعه واشهرها يتبع .

١١٢٥٦ - راكميا المختصر *
Raphia vinifera (S).
نوع من الرافيا الصنعية . ثمارها سكرية المادة سريعة
الاختصار يصطنع منها شراب كحولي يسمى نبيد التخل .

١١٢٥٧ - راكميا الرباط
Raphia ruffia (S).
نوع من الرافيا الزراعية الصناعية . سفنها يطول نحو
٢٠ م . الياف سفها خفيفة متينة ناعمة عيكة تستعمل
في عدة صناعات . وهي أيضاً شائعة الاستعمال كرباط
زراعي تشبه به اللطام وغيرها .

١١٢٥٨ - راكمي
Hercule (F). *Mercurius* (E).
هو الجاني ، كوكبة نجم شالية المقيع .



رافيا الحمر



راقود



راقوش الاجاس



راقوش البنفسج



راقوش الدويكييات



راقوش الشوندر



راقوش الحشيش

٨ الى ١٥ سم. ازهارها قليلة العدد ، كبيرة الحجم ،
بنفسجية اللون ، صفر المآثر لا تتورمها صيفي .



رام

Podostem aster (S). * **واشوس أسود** *
Podostem noir (F). Podostem aster (E).

نوع من الراموس . حشرة من مفصليات الاجنحة عثفلات
الاجزاء وفضيلة الحسولييات . موطنها بين من الشرق الاذن
الى اوروبا . الحشرة الجبلية تعيش على الازهار . البرقة
دائمة قوتها المواد الخشبية المنحلة ، يكثر وسوجها في جلود
واضغان الانجار النخرة || جسمه الطليجي الشكل ،
محبب الصفعة العليا ، يطول من ١١ الى ١٢ سم. عيانه
بارزتان . زبانه غيظيان . غذاء لافحات . ثوبه الى
السواد الاسفع المالح .



راستي

١١٢٥٨ - **واكسي** * ، **فنب سيام**

Besleria nivea, Urtica nivea, U. utilis, U. tensa-
cissima (S). Ramele argentata, Ortia argentata, O. de
China, Chanvre de Saigon (F). Ramee grass, China
grass (E). Rame, Chinanessal (D). Ortica de lino,
Canapa di Siam (I).

نبات حشبي لني صناعي ممر من فصيلة القراسيات .
يطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوريته ضخمة ، كثيرة
الفرع الكثيفة الانتشاج . اوراته مسقة فضيصة
اطليجية ، تصلها نفي الصفعة السفلى ، يطول نحو
١٥ سم . عتقه احر اللون خلي البشرة || ازهاره عتقوي
اسطواني . الياله عتية شائعة الاستعمال في صناعة الادواق
التندية .



رايسر اسود

Myoporaceae (S). * **واكسيات** *
Myoporaceae (F). Myoporaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها نحو
٥٠ اسماؤها تمتد من الشرق الاوسط الى اليابان || جمع
نباتاتها هيرات وجينات . اوراتها متعلقة في معظم الانواع
ومتعاقبة في بعضها . تصلها شقيقة ، مستطيلة ، لزجة .
ازهارها ابطة الانتشاج وطرية ، غمية التجميع او فردية .
ثمارها عتية رباعية البزور || نصال اوراتها وطلاء سوطها
وافنداعها ملينة بالجايوب الراتنجية الفتنة بالادعانة الطرية
المصنية المعروف || اشهر اجناسها القرام .



رامي

١١٢٦٠ - **واكيج** هو التارجيل المعروف ، اطليه .

Ranina (S). * **واكين** *
Ranina (F). Ranina (E).

جنس دويبات بحرية من القشرييات وفضيلة الرانانيات .
انواعها المرفوعة قليلة العدد اسماؤها البحر الاخر والحيث
العتني || اجناسها مبطلة معتدة الحجم ، تطول من ٥
الى ٧ سم . وتفرس من ٤ الى ٥ سم . دويوها قليلة
الاجساد . قوتها صيرة ، غليظة ، محترمة الاطراف .
ملاطها عتية ، كلابية الشكل || اشهر انواعه الرانين
المسن .

Ranina dentata (S). * **واكين مسن** *
Ranina dentata (F).

نوع من الرانين يكثر وجوده في المحيط المتدي . يعيش
قرب الشط . دويته جويي اللون ، اسفع المالح ، مسن
الحافة الامامية .



راين

١١٢٦١ - **واكُون** هو الرانين ، اطليه .

١١٢٦٧ - **واكل** **Autruchon** (F). Young ostrich (E).
هو المحل اي ذلك النعام المحل يحيي رائة ، ج واكل
ورثالة .

١١٢٦٨ - **وام** * **Mydopore** (S). **Myopora** (F).
جنس نباتات عتية مصرة من فصيلة الراميات انواعه
نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها ترابي . اوراته متعلقة
مستطيلة التصل الضيق . ازهاره نوري التجميع ابلي
الارتكاز . ازهاره بيض او حر . ثماره عتية رباعية
البزور .

١١٢٦٩ - **وامكة** القارة : مستقيم يجمع فيه الماء .

١١٢٧٠ - **واميج** **Laurer** (F). **Trap** (E).
القرايع : ملوحي تصاد به الجوارح كالسقاقر ونحوها .

١١٢٧١ - **واميس** ، **دجوي** **Nocturne** (F).
Nocturnal (E).

كل دابة مسرحها الليل هي راس . وقد كثر استناد
الرواس الى طير الليل .

١١٢٧٢ - **وامي** **Appelant** (F). **Decoy-bird** (E).
الرائق : الطائر الذي ينصبه الصياد ليش عليه البازي
فصيده .

١١٢٧٣ - **واميل** **Sillicole** (F). **Silicle** (E).
لعت تعمرلي يملئ على النباتات التي تعيش ويجود في القروء .

١١٢٧٤ - **وامندي** * **Ramondia** (S).
Ramondia (F). **Ramondia** (E).

جنس نباتات عطية برية وتربيتية مصرة من فصيلة
الجسبريات . مرفوعة التمرير على اسم العلامة راستي
(١٨٢٧-١٧٥٣) || انواعه المرفوعة اربعة ، اسماؤها
الشرق الاوسط وبعض مناطق اوروبا الجنوبية والغربية .
جميعها سريرية ، فريقة ، عادمة الساق قروصة الادواق
الخشنة المزينة النصال . ازهارها قليلة العدد ترتكز على
شراخ دقيق يطول من ٥ الى ١٥ سم .

١١٢٧٥ - **وامندي اسفع** ، **وامندي صوفي** *
Ramondia serbica, Jankaea ferruginea (S).
Ramondie de Serbie, Jankaea ferruginea (F).

نوع من الرانندي ، عتية سريرية ، فريقة ، مصرة .
منبتها الطويي بعض مناطق البلاد المعتلة الحرارة اخصها
سربيا || اوراتها مشيرة تطول نحو ٣ سم . نصالها خلية
الصفحة العليا البحرية اللون ، صفاء الصفعة السفلى .
شراخها الزهري يطول من ٧ الى ٢٢ سم . ازهارها قليلة
العدد متوسطة الحجم ، صفراء اللون ، زرق المآثر ||
تنويرها صيفي .

١١٢٧٦ - **وامندي ميكوني** * **Ramondia Myconi** (S). **Ramondie de Myconi** (F).

نوع من الرانندي . عتية فريقة مصرة . منبتها المناطق
المعتلة الحرارة من ارتفاع ٦٠٠ الى ١٦٠٠ م . من سطح
البحر || اوراتها تطول نحو ٧ سم . تصلها عثن للمسح
مسن الحافة ، زرق اخير اللون على الصفعة العليا ،
اصعبه على الصفعة السفلى . شراخها الزهري يطول من

١١٢٦٢ - **رَالِيَّيْنِيَّة** *
 Raninidae (S).
 Raninidae (F).
 فصيلة دوبيات بحرية من التثريات عشاريات الاربل المتلوات. اجناسها وانواعها المروعة قليلة العدد اعطانا بحد البلاد الحارة والاسوائية || احرف اجناسها واسمها افرانين الذي يعتبر قيس الفصيلة .

١١٢٦٤ - **رَاهِيَّة** هي البنية ، اطليا .

١١٢٧٢ - **رَاهُوب الدَّيَّع** *
 Ustilago scorzonerae (S). Charbon du scorzonère (F).
 فطر مجهري طويل العمر يعيش في الابعية واخليا ، يصيب الديع في المواقع الرطبة حيث يطب روشتات الازهار || ظهوره الخارجي يتور بوبية لونها الى السمره تطلو الروشتات ثم تطلق من غيرات هبابية شديدة السواد. يكافح باجتناب زرع الديع في الامكان الرطبة .

١١٢٧٧ - **رَاهُوب الدَّخَن** *
 Ustilago crameri (S).
 Charbon du millet (F).
 فطر مجهري يصيب البسن على اختلاف انوعه . مركب مريض الزهرة فيسبب انتفاخه واحول مادته ثم تحوّلها الى كتلة بوبية قهرا نحو ٤ م. لونها الى السمره || احصراره تختلط باختلاف العوامل الجوية لذلك تراوح من ١٠ الى ٧٥ ٪ || يكافح اما بتطليس البذار مدة خمس دقائق في ملوب الفرمول المحلول ٠.٢ ٪ حيث يمكن منع الحبوب المطوية لانها لا تنقص في الماء او باستعمال املاح اللثيق او املاح النحاس واخصها كربونيد النحاس .

١١٢٧٤ - **رَاهُوب الذَّرَّة الصَّغْرَاء** *
 Ustilago maydis, U. mayz-seae, U. zeae (S). Charbon du maïs (F). Common smut of corn (E). Maisbrand (D).
 فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الذرة الصفراء في جميع اقطار العالم وفي جميع اصنافها التريية والحوالية من الجذور الى الازهار فيؤذيها ويضرها او يملها ويقتع عموما . ظهوره الخارجي كتل سود مختلفة الاشكال والاحجام ، تركب الاضواء بعد ان تحل لونها الى غيرات بوبية مشربة السواد يراوح قطرها من ٧ الى ١٥ ميكرون . يكافح باستعمال اللدرة الزراعية الثلاثية وذلك لان استعمال الفولتير يظهر البذار ولكنه لا يظهر التربة التي ياربى اليها والتي تحضنه من عام الى عامين .

١١٢٧٥ - **رَاهُوب الزَّرِّيَّق** *
 Ustilago vaillantii (S).
 Charbon des lis (F).
 فطر مجهري يصيب بعض الزريقات اصحابها الاشجار والحامل . يعيش داخل نسيج الاسطاط ويتكاثر في اواخر الازهار متخفلا على جذرات البوع ثم يحول التكاثر الى حفاق بوبية تطلق من غيرات هبابية لونها الى السمره المحطية . يكافح بتقلع وتلف الجصل المصاب .

١١٢٧٦ - **رَاهُوب الشَّعِير** *
 Ustilago nuda, U. segetum (S). Charbon nu de l'orge (F). Loose smut of barley (E). Gerstenflugbrand (D).
 فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الشعير على اختلاف انوعه وضروبه . مركب السبال عند ازهارها فيملب الزهر وكه بقضي على كامل السلبة تنسل بمجموعة متتابعة منتصبة من الكتل البنية . واذا تركب نسل الزهرات سبب احصراره وذووله بعد تحطيطه وترقيعه || يكافح بجمعه

١١٢٦٥ - **رَاهِيَّة** Veine de l'intérieur du fémur (F).
 Vein of the inner femur (E).
 الراش والراشة : حرق باطن ذراع الدابة . وبما راهاش . ج رواش .

١١٢٦٦ - **رَاهِمَة**
 الصفرة الثابتة . واقر واصل هي الصغور المتراصة الثابتة .

١١٢٦٧ - **رَاهِم**
 Durable
 نمت وصفي للاعتاب التي لا تبلى .

١١٢٦٨ - **رَاهُوب** *
 Ustilago (S).
 Charbon (F). Smut (E).
 جنس فطور مجهرية طفيلية من الراهووبات . تتميز بطيلساها الفردية وبزكاتها السريعة الانطلاق التي تنشا وتكاثر على الاضواء الثانية في النبات النضار || انوعه عديدة . اسمرها ما يلي .

١١٢٦٩ - **رَاهُوب اَسْوَد** *
 Ustilago nigra (S).
 Charbon nu noir de l'orge (F).
 فطر مجهري يصيب سبائل الشعير ليطيب . ظهوره الخارجي كتل سود ميمونة تركب جميع اقسية الزهر حتى الراشات التي لا تقريبا . يوبعا طيلساها شفوية التكاثر الرباعي العرقي || احصراره زفيدة ، يكافح بظهور البذار وباجتناب الزرع في المواقع الرطبة .


١١٢٧٠ - **رَاهُوب الثَّرْفُول** *
 Ustilago bromivora (S). Charbon des bromes (F).
 فطر مجهري يصيب مختلف انواع الثرفول في انوعها ليطيب . مركب الزهرة يقضي على المبيض والاشعية بعد ان يحولها الى بؤرة من التبار والبروغ كلوية الشكل سمراء اللون تهب جامدة لزجة ثم تنسل تدريجيا وتطالير تفسح لها كالمذاب || يكافح مكافئة رَاهُوب البسن اذا كانت زراعتة تدخل في نطاق النباتات المليفية .

١١٢٧١ - **رَاهُوب الحَفْطَة** *
 Ustilago tritici (S).
 Charbon du blé (F). Loose smut of wheat (E). Welzenflugbrand (D).
 فطر مجهري طفيل واسع الانتشار يصيب الحفطة وقد شجود عليها في جميع اقطار العالم ما عدا امريكا الجنوبية التي لا تزال حقلها سليمة || مركب سبائل الحفطة فيملب بقى سبها او شوبها ريمها . وقد تركب عقد السلاميات وانماذ المصنف || ظهوره الخارجي يتور بوبية كيفية التجميع خلافة البؤرة الناعمة السريعة المطب . ان تطلق من غيرات كروية سود قهرا نحو ٥ ميكرون . يكافح باستعمال الفلواقي المختلفة التالية :

١ - في الاساليب الزراعية القائمة على اجتناب للمواقع الميورة او على تغيير البذار او على جمع وسرق جميع البسائل المصابة .



راهوب الثرفول راهوب اسود



راهوب الحفطة (٢)



راهوب الديع



راهوب الدخن



راهوب الذرة الصفراء (١)



راهوب الذرة الصفراء (٣)



راهوب الشعير

رُاهُوبُ الشَّعِيرِ المُتَخَلِّف - رَاوَنْد

ريسيبي



رُاهُوبُ الشَّعِيرِ المُتَخَلِّف (١)

المشج الشفاف. فيها عيوب الازمية والقصب وقد يصيب الحلايا || تتميز بصفتها البعاطي. دملها جولية غير انقباضية. يوقتها لا تياض وكثرة البند || ظورها تسبب عدة وسموم، أشهرها البوم القصبية والرومية. أشهر اجناسها التكتفوره والراوب والسجاد والشيزونه والعلطل والقصبية والفرزيرة .

Abelle (F). Bee (E).

١١٢٧٨ - رَاهُوبِيَّة

في النحلة سميت بالرأبية لسكنها في طرابها .

١١٢٧٨ - رَاهُوبُ الشُّوْقَان * وَكُونْد

Rheum (S). Rhubarbe (F). Rhubarb (E).

جنس نباتات طبية عشبية جلجورية ممرمة من فصيلة البطيانيات. أنواعه عديدة جميعها غنية الارواء الكبيرة القند، نصلها شارب الصفحة المشعبة. ازهارها متشكلة يرتكز على شارب قصبية الانقباض. ازهارها متشوية. ثمارها عنية || افرق انواعها وافرها ما يج .

١١٢٧٩ - رَاوَلْدُ الْجَنْتُوب

Rheum australe (S). Rhubarbe australe (F).

نوع من الراوند الشرقي يملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه صتيرة القند قليلة الشكل تطلو من ١٠ الى ١٤ سم. ازهاره حر || جذوره طيبة شاملة الاستعمال .

١١٢٧٧ - رَاوَلْدُ حَمَلَايَا

Rheum emodi (S). Rhubarbe de l'Himalaya (F).

نوع من الراوند موطنه سفوح جبال حلايا . يملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه كبيرة القند تطلو نحو ٦٠ سم. نصلها اشعر اللون ناعم البشرة . ازهاره ونمارة حر .

١١٢٨٨ - رَاوَلْدُ ذَكَرٍ ، اُطْرُوَكْدِي

Rheum raphaniticum (S). Rhubarbe raphanitic, R. anglic, R. des moines (F). Raphanitic, Garden rhubarb, Pie rhubarb (E). Pontischer rhubarber, Garten rhubarber (D). Barbaro raphanitic, Rapontico (I).

نوع من الراوند التريبي يملو من ١٢٠ الى ١٨٠ سم. اوراقه قليلة الشكل تطلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. وصفتها كذلك . نصلها رغو النسيج متنازع التصنيع حايل المغار. ضلعها مأكولة || ازهاره كثيرة البند لبنا الى اللياس الاصفر .

١١٢٨٩ - رَاوَلْدُ رَيْسِيَّيْ ، رَيْسِيَّاس ، رَيْسِيَّاس

Rheum ribes (S).

Rhubarbe-groseille (F). Currant fruited rhubarb, Gooseberry currant (E). Persischer rhubarber (D). Rabarbaro acido, R. polposo (I).

نوع من الراوند ومونيات زراعي ممر موطن الشرق الاوسط يملو نحو ١٠٠ سم. اوراقه قليلة الشكل تطلو من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٢٠ الى ٤٠ نصلها جلدي النسيج، لبنة الى المنفرة الزرقاء، نصلها مأكولة وترب . ثماره مأكولة لكنها حارة الحامض ويستعمل منها وين نمل الارواق حامض الليون . كما يصنع من عصير ثماره بعض المربيات الصحية المشهورة ويستخرج من ايضا بدلتشير نبيذ كحولي يعرف بخر الريساس || ضرره عديدة تختلف باختلاف لون الثمار بين الاسود والاحمر والابيض

راوند

ورقه فور ظهوره كما يحسن اجتناب الزرع في المواتع الربية .

١١٢٧٧ - رَاهُوبُ الشَّعِيرِ المُتَخَلِّف *

Ustilago hordei, U. jenseni (S). Charbon couvert de l'orge (F). Covered smut of barley (E). Genstanharbrand (D).

فطر مجهري مركب سنابل الشعير فيسبب مواد الحب الى كل من الراوب الاسود الفضي وذلك بعد ان يعلب الراشة ويحب الاشعة || يكاثف كثيرا من الراوب.

١١٢٧٨ - رَاهُوبُ الشُّوْقَان *

Ustilago avenae, Uredo segetum avenae, U. avenae foliolosa (S). Charbon nu de l'avoine (F). Loose smut of oats (E). Haferflugbrand (D).

فطر مجهري مركب الشوكان فيسبب الحب وقد يقضي على كامل التشكيل || يهدو بطور كروية تتكون داخل الزهرة على الحب ثم تنم الزهرة مع اشدتها وتظهر شويوب سود موهوبة بدلا من شويوب الشوكان || يكاثف بتطویر البذار اما متفيرا بكتريوات النمل او نمتا محبوس القربى او باستحار غيرها من الفواظير الفعالة الحديثة .

١١٢٧٩ - رَاهُوبُ الشُّوْقَان المُتَخَلِّف *

Ustilago levis, U. avenae levis, U. kolleri (S). Charbon couvert de l'avoine (F).

فطر مجهري يصيب الشوكان بعد تأثير زهره ليركب المبيض وينشأ عليه ثم يم كامل اخيشة الزهرة || مظهره الخارجي ككل من البثور البولية الزاوية المكثفة القليلة التصنيع والاختلال || يكاثف باجتناب زراعه في المواتع الربية ويتطویر البذار .

١١٢٨٠ - رَاهُوبُ الرِّفْرِفِيَّاتِ * ، رَاهُوبُ بَنَفْسِيَّيْ

Ustilago violacea (S). Charbon violacé (F).

فطر مجهري يصيب نحو ١٠٠ نوع من الرفرفيات. مركب مآبر ازهر فيمنع تكوين جذوات الولع بعد ان يحول المآبر الى بطور بولية لبنا الى البتشيقي الباقي . اضراره زهيدة لا تنوب المكثفة اما يحسن قطع وسرق الازهار المصابة اجتنابا لتفشي الوسم .

١١٢٨١ - رَاهُوبُ المَصَان *

Ustilago sacchari, U. scitamina (S). Charbon des cannes à sucre (F).

فطر مجهري مركب نولاي المصان على اختلاف انواعه من التريبي الى قصب السكر || مظهره الخارجي تأثير في التريبي يقتصر عموما على قصب السكر الثاني مع اوراقه الحامية ثم ظهور فتائل سود تملو الازهار وتصل على وسمه || يكاثف باختلاص ورقق القصبان المصابة .

١١٢٨٢ - رَاهُوبُ التَّجِيرِ * ، رَاهُوبُ حَبِيطِيَّيْ

Ustilago striformis, U. linearis, Tilletia striformis (S). Charbon linéaire (F).

فطر مجهري طويل الحامة يمشي نحو خمس سنوات في التربة وعلى النبات المتناحر . مركب التجير على اختلاف انواعه . مظهره الخارجي خطوط غيبطة فضية اللون تركب نصل الورداء بمزائة البروق تخفي على اللسع دون الكثرة وتركب سيقان المشاكل الزهرية فتصلها .

١١٢٨٣ - رَاهُوبِيَّات *

Ustilaginaceae (S). Ustilaginacées (F). Ustilaginacées (E).

فصيلة فطور مجهرية طفيلية من رتبة البعاطيات غزيرة

Genetta (S). Genetta (F).
Genet, Genett (E).

جنس حيوانات لاحمة من فصيلة الزباديات . انولاه ستة موطنها افريقية واروية والشرق الاوسط . اجسامها مستطيلة وذانها ايضا . قوائمها قصيرة خامية الاصابع ، طويلة الاظافر المنقطة . اذنانها متوسطة القد . اذنيها مشرعة ، تخرج ظهورها عابق اللون وسيد الخط || تألف الجبال والبراري . تسرح في الليل . ترتاد اجرف الاشجر وشفاها . تفتي القوافض والحماضير والحيويات والحشرات . الاثني تنصع جروا واحدا في الحول ترصده نحو ثلاثة اشهر || اما انولها الستة فهي ما يتبع .

Genetta pradina (S). رُبّاح اُرُقَط
Genetta pradina (F).

نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى السنغال ، طولها نحو ٨٥ سم . صفة قصير الحلب . ثوبه عابق اللون ككتيف التنصير ، خطوط ذنبه غامقة مستمرة .

Genetta rubiginosa (S). رُبّاح اُمْدَا
Genetta rubiginosa (F).

نوع من الرباح ، موطنه افريقية الجنوبية . طولها نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصبغة الشهباء ، تنمير امر . خطوط ذنبه متفرقة .

Genetta senegalensis (S). رُبّاح السنغال ، جَرَنْطِط
Genetta du Sénégal (F).
Pale genet (E).

نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى القطب . طولها نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصبغة الباهتة ، تنمير لا تقاسي الشكل ، ريشته ريشة القد لا غلظية .

Genetta felina (S). رُبّاح الفايون ، زُوَيْكَا
Genetta felina (F).

نوع من الرباح ، موطنه الفايون والكنغو وشفاها النيل الازرق . وهو قريب اليه من الزباد ، طولها نحو ٨٧ سم . ثوبه الى الصبغة الرملية . تنمير يبعي الشكل .

Genetta tigrina (S). رُبّاح دَنْكَلَة * ، كَدَيْس الزباد
Genetta tigrina, Genetta de Dongola (F).

نوع من الرباح ، موطنه افريقية الشرقية اعصها دَنْكَلَة والذوية . طولها نحو ٩٥ سم . ثوبه الى الصبغة الخفيفة . تنميره جروي اللون . خطوط ذنبه مستمرة .

Genetta vulgaris (S). رُبّاح شاك *
Genetta commune (F). Common genet (E).

نوع من الرباح ، موطنه الشرق الاوسط واروية . طولها نحو ٩٥ سم . جسمه ٥٥ وذنبه ٤٥ اما ارتفاعه فهو ١٥ سم . ثوبه الى الصبغة الغبراء ، تنمير الى الجذوة السوداء . خطوط ذنبه متوسطة العرض || يعيش في الجبال في الجرة وقرب الماء . يسرح في الليل يتسلق الاشجار ويمر في الماء ويسبح . يسكن ويقيم العلم ، يصطاد الجرازين والفئار .

١١٣٠٧ - رُبّاح هو القردوح السي ، اطله .

١١٣٠٨ - رُبّاح اَبُو الهول هو القردوح الشحوت ، اطله .

١١٣٠٩ - رُبّاح زَيْتُونِي هو قردوح الحيفة ، اطله .

والاصغر والمشح . || والرياس يطلى الحماضات ويقوي الاضاء والحظم ويزيل شعث الرقبة الجفنة والفتقان والبياسير .

Rheum compactum (S). رَاوَلْد كَتِيْف
Rhubarbe compacte (F).

نوع من الراوند . مدهه الصين . يطول نحو ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد مفرصة . فصلها متجع الصفحة ، جامد النسيج السيك ، مسن الحافة ، جميل الخضار القرامي . اثماره يبيض || جلوده طيبة لكنها اقل جودة ونحوها من جلود الراوند الجنوبي .

Rheum palmatum (S). رَاوَلْد كَتِي
Rhubarbe palmée (F).

نوع من الراوند الشرقي . يطول من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد مسطيلة المتق ، كثية التنصل للمصص المباق الخضار . خضارته الزهري وضلوع اوراقه ومروها الى الجذوة || اثماره الى البياض الاخضر .

Rheum officinale (S). رَاوَلْد مَحْزُونِي ، رَاوَلْد صَبِي
Rhubarb (E). Echter rhubarb (D). Rabarbar, Rubarbar (I).

نوع من الراوند وهو نبات طبي وزراعي زَيْتُونِي . يطول من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد خمسية التضاميص فصلها جميل الخضار الباهت مسن الحافة . اثماره كثيفة التجميع خضراء اللون || جلوده طيبة مديدة المنافع . تدخل في عدة مستحضرات وتساعد الحظم وتدر الصفراء . وهو مقو للمعدة ، منه الهضم ، يقضي على البوليسر والاسك . ويستعمل في حوضة المعدة واضطرابات الحظم لا سيما عند الاطفال .

Débouraou (F). رَاوَوِي
آلة تستعمل في ترويق الحمور البيضاء وفي تنظيف المساقل من الزبل والمادان من القواب .

١١٢٩٤ - رَاوِي ، حَكَاوِي ، مَحْزُونِي ، حَكَاوِي
Caillé, Coagulé (F).

لبن راب لمشر ولا يزال ذلك اسمه حتى يتخمر منه زبد .

Eteandard (F). رَاوِيَة
بنة في الازمة شلت من ريفاتها لعلت واصبحت كالراية .

Compote, Jus (F). رَاوِيَة
صارة الجار المغلية المكثفة .

Patron رَاوِيَة المَسَل
١١٢٩٧

Usure (F). رَاوِيَة
الربا الاقراض بفائدة يتجاوز فيها مرق الفائدة القانونية او حيق الفائدة الحاصل به عادة بين المتقارفين .

١١٢٩٩ - رَاوِيَة *
Stratocumulus, Cumulostratus (S).

ضرب من النجوم وهو محاب متواصل الطبقات والارصفة ايضى اللون او اريد .



رباح دَنْكَلَة



رباح شائع



رُبْعَة

11324 - رُبْعِيّ الأَوَّاهِرَ Quadriflore (F).

11325 - رُبْعِيّ الأَسَدِيَّة Quadriflor (E).

11326 - رُبْعِيّ الأَسَدِيَّة Tétracore (F).

11327 - رُبْعِيّ الأَسَدِيَّة Tétrandrous (F).

11328 - رُبْعِيّ الأَصْلَاح Quadrilobé (F).

11329 - رُبْعِيّ الأَصْلَاح Quadrilateral (E).

11330 - رُبْعِيّ الأَوَّاهِرَ Quadrifolié (F).

11331 - رُبْعِيّ الأَوَّاهِرَ Quadrifoliata (E).

11332 - رُبْعِيّ الأَيْدِيّ Quadrumanus (F).

11333 - رُبْعِيّ الأَيْدِيّ Quadrumanous (E).

11334 - رُبْعِيّ الأَوَّاهِرَ Tétrasperme (F).

11335 - رُبْعِيّ الأَوَّاهِرَ Tetrasperme (E).

11336 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Tétraploid (F).

11337 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Tetraploid (E).

11338 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Quadrilobé (F).

11339 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Quadrilobata (E).

11340 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Quadripédale (F).

11341 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Quadripetalous (E).

11342 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Quadrupède (F).

11343 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Quadruped (E).

11344 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Tétrastome (F).

11345 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Tetrastome (E).

11346 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Tétravalent (F).

11347 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Tetravalency (E).

11348 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Quadrifolié (F).

11349 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Quadrifoliata (E).

11350 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Tétrapède (F).

11351 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Tetrapede (E).

11352 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Tétrapode (F).

11353 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Tetrapod (E).

11354 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (S).

11355 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Réapote (F).

11356 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11357 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11358 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11359 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11360 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11361 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11362 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11363 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11364 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11365 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11366 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11367 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11368 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11369 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11370 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11371 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11372 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11373 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11374 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11375 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11376 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11377 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11378 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11379 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11380 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11381 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11382 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11383 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).

11384 - رُبْعِيّ المِعْرَكَة Retaporus (F).



رَبَاعِيَّةٌ

الظهر، جالس البطن. يطول من ٣٥ إلى ٥٠ سم. ثوبها جميل الألوان. ظهورها الى الزرقاء السمجنونية. جانبهاها ويطبقها الى الصفرة الغنية. رأسها وأعناقها مرقوشة باللحمي. فيها يتجق بالاسود. رأسها مستدل الجرم. قصير الخطم يملو حول ذنبي اللون فوق كل عين. شقلها مستدل الانفرج. فكاهما متعادلان. اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الاعلى، ورباعيتها في الفك الاسفل. صيهاا كيرتان مستديرتان، جاسطتان. زعنفتها الظهرية واحدة، مستطيلة الشكل. زعنفتها الذيلية حلالية التقدير || لحما فاخر الصف، مغروب فيه.

Naucratis (S).

١١٣٤٦ - رُبَانٌ ٥

Pilot (F). Pilot-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شالكانات الزعانف وفصيلته الاستمرديات. انواعها المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة. اجسامها اعليجية الشكل. سفها صغير لثد. زعانفها الظهرية مستطيلة تتقدمها اربعة مناسخ مستقلة لحمية. زعانفها الشرجية فارقة || أشهر انواعها الربان للبلد.

١١٣٤٧ - رُبَانٌ مَبْدُولٌ ٥

Naucratis ductor (S). Pilota commun, Fanfre (F). Common Pilot-fish (E).

سمكة من الربان. اصلهاا بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة. تتميز بمواكبها البياض والسفن في رحلاتها عبر البحر ذهابا وايابا من بلاد الى بلاد || جسمها اعليجي الشكل يطول نحو ٣٠ سم. رأسها مستدل الجسم، شبه مخروطي الشكل. قصير الخطم. مستدير الظهر || ثوبها الى السمرة الفضية والذهبية الممزج يبق عند الظهر وبغير عند البطن ويمتلكه ثلاثة احزمة متفارقة العرض شديدة السمرة || لحماا كامن الصف، مأكول قل من مريض فيه.

Archives (F).

١١٣٤٨ - رُبَالِدٌ ٥

Archives, Record office (E).

هي المخطوطات الكتابية من وثائق وغيرها، وأحدثها ريدية.

Caroubier (F). Carob-tree (E).

١١٣٤٩ - رُبَيْجٌ ٥

هي شجرة الخروب الجوي او شجرة الخروب المأكولة الثمار.

١١٣٥٠ - رُبَيْجٌ ٥ هو قردوح بياض، اعليه.

Profit

١١٣٥١ - رُبَيْجٌ ٥

هو ما تحقق من مكسب. والربح يقسم الى قسمين : ربع اجالي او قائم وربع صاف.

Lucrum cessans

١١٣٥٢ - رُبَيْجٌ فَالْتٌ ٥

هو الربح المتوقف حصوله فيا او نفذ المتعاقد التزامه لان القناعة في تقرير التوقف من القصر في حساب الحسنة القليلة التي وقفت والربح العمل الذي فلت من عدم تنفيذ الالتزام.

Buphthalmum (S). رَيْدٌ ٥

١١٣٥٣ - رَيْدٌ ٥

Buphthalmum, Œil de bœuf (F).

الاسم العلمي من اليونانية بمعنى عين الثور || جنس نباتات عشبية مسمرة من فصيلة المركبات. انواعها عديدة بعضها زراعي تربسي، اورقاته متعاقبة. اثمارها وريسية ملقحة البليات، حشوية الغلاف القرصي. يزود متوتبة باكليل مذهب || أشهر انواعها ما يقع.

وربايات المياشيم والكل والاذنيات، كثيرة الوبس الفكية التي تحيط بالثم || اصداهاا شبه قرصية الشكل مجرولة عديدة الجيوب او الحبر || أشهر مرتباتها او فصائلها المستويات والوثقيات والمقرنات.

Mitoyenne (F). Midway (E).

من الانسان القاطنة الاسلمية وهي السن التي بين الثانية والثلب.

Tétramères (F).

١١٣٣٩ - رُبَاعِيَّةٌ الْأَجْزَاءُ ٥

Tetramera (E).

رُبْعِيَّةٌ حشرات من نمديات الاجنحة.

Tétractinellidés (F).

١١٣٤٠ - رُبَاعِيَّةٌ الْقُرُوعُ ٥

Tetractinellidés (E).

رُبْعِيَّةٌ من الاسفنج السواني.

١١٣٤١ - رُبَاعِيَّةٌ ٥، كُرُوبٌ عُلْكِيٌّ ٥

Brassica oleracea napus (S). Rutabaga, Navet de Suède, Turnep (F). Swedish turnip (E).

نبات عشبي زراعي علفي محول من فصيلة الصليبيات. جته يضي الشكل كبير الحجم اسمر القشور اصفر القلب الجلد || يزرع كالقث يحول في جميع الاودية لكنه يرضب في الملقح التي تكثر فيها الرطوبة الجرية ويقل فيها الاشعاع الشمسي || يستعمل كمكاف للبر والحليب والخبازير والتمس.

Plotax

١١٣٤٢ - رِبَالِيٌّ ٥

هو الربي من الاسماك البحرية الصغيرة القند.

Chrysophrys (S).

١١٣٤٣ - رِبَالَكٌ ٥

Daurado, Daurat (F). Gilt-head (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات. انواعها عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة. اجسامها اعليجية الشكل، تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. لونها صغيرة، زعانفها الظهرية مستطيلة شالكة. اثارهاا ملحية اللون تشبه القريدي. لحماا لذينة اللحم.

١١٣٤٤ - رِبَالَكٌ بَرْدَكٌ ٥، بَرْدَكٌ ٥، أَبُو بَصَلٌ ٥

Chrysophrys berda (S).

Daurado rose (F). Pink dorado (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات ورُبْعِيَّةٌ شالكانات الزعانف. اصلهاا بعض اقالي البحر الابيض المتوسط والحيث الاطلسي. تتميز من اسماك الهامح والثغاف، مسرحها الانفراط القرية الثور || جسمها اعليجي الشكل، طولا يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. ثوبها الى الوردي اللحي المالح يملو شمسة زرقاء في الظهر وقبة فضية المالح في البطن. زعانفها حشلية اللون باستثناء الصدريه لانها شفافة. رأسها مستدل الجرم، قصير الخطم. شقلها مستدل الانفرج. اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الاعلى، ورباعيتها في الفك الاسفل. صيهاا كيرتان، مستديرتان، جاسطتان. زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة. زعنفتها الذيلية فارقة || لحماا ابيض اللون، فاخر الصف.

١١٣٤٥ - رِبَالَكٌ مَبْدُولٌ ٥

Chrysophrys surata (S). Daurado vulgaire, D. blunée (F). Common Dorado, Gilt-poll, Gilt-head, Chad (E).

نوع من الربالا. اصلهاا منظم اقالي البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تتميز من اسماك الهامح والثغاف || جسمها شبه اعليجي الشكل، مقوس



رِبَالَكٌ



رِبَالَكٌ بَرْدَكٌ



رِبَالَكٌ مَبْدُولٌ



رِبَالَكٌ مَبْدُولٌ

الْفُتَّاح



رَبْدٌ صَفْصَالِي الْوَرْق

الصفة المفضة. ازهارها بنفسجية. ثمارها صلبة كروية سوداء، تليق لا تزكّل || رغب في الازفة المنبقة الانسلاج والطرود. مطوم اليانحين على الربرق ينشر طولاً لينة. ثماره لليلة المطم.

١١٣٦١ - رُبْدِيَّاتٌ ٥
Hypodermatodes
عارة فطور مجهرية من فصيلة الحشريات ورتبة الزبقات. تتميز ببنيتها وبسنتها الفائرة في النسيج النباتي المنساعة. نكتاتها شفعية، رباعية أو خماسية. نكتاتها عديدة، عجيبة أو صقية، فراء الرووس || استنساخ عديدة منها واحد يوم الاقتصاد الزراعي ينهي الحارب.

١١٣٦٢ - رُبْدِيَّ

رُبْدِيَّ الكيش عن القتم : ترك غرابها عن حياء.

١١٣٦٣ - رُبْدِيَّ

Incestus (F). Bowels (E).

الرُبْدِيَّ هي الاسماء.

١١٣٦٤ - رُبْدِيَّ

Fondation (F).
Foundation, Ground-work (E).

الرُبْدِيَّ : أساس البناء وما على الأرض من التهي.

١١٣٦٥ - رُبْدِيَّ

Attelage (F). Harnessing (E).
قرون أو شد الحواب بالجرور.

١١٣٦٦ - رُبْدِيَّ

Ligature (F).
هو تكتيت أعضاء النبات أو بعضها برباط.

١١٣٦٧ - رُبْدِيَّ الْكُرْمَةِ

Accolage ou accollement de la vigne (F). Nailing up or joining of vine (E).
هو رفع وربط مروع الكرمة بالمساويك.

١١٣٦٨ - رُبْدِيَّ الشَّرَاحِ

Liaison de contentieux

١١٣٦٩ - رُبْدِيَّ

الرُبْدِيَّ نيم غير صغير من كوكبة الثنتين مركزة في وسط الموالدة.

١١٣٧٠ - رُبْدِيَّ

Eumétrique (F). Eumetrical (E).
نمت تعريض يطلق في تمشيت القواطع على كل حيوان مربوع الجذعة متوسط اللق والوزن.

١١٣٧١ - رُبْدِيَّ

Irrigation (F).
الرُبْدِيَّ والرّي والاسقاء واحد.

١١٣٧٢ - رُبْدِيَّ ٥ ، قَسْمِيْلِيْلَا ٥

Phacidiella
جنس فطور مجهرية من الرغيات. يتميز ببنيتها المنبقة المستندرة، ببنيه البيضي الشكل الوحيد الخلية وبنكاته البنفسجية الزرق الامل || اشهر انواعه ربيع الفتح.

١١٣٧٣ - رُبْدِيَّ الْفُتَّاح ٥ ، قَسْمِيْلِيْلَا دِيْسِكُولُون

Phacidiella discolor, Phacidium discolor, Phacidopycnis furfuracea, P. malorum, Discula pyri, Fackelia conspicua (S).

فطر مجهرى يركب الفتح والايام والسفرييل في انصاتها وثمارها نيجيها || يصيب احصان واثان الاجبار الضعيفة فيقرح ثقلوها ويصلها. مظهره الخارجى يقع فضية، منخفضة الوصل الاصل، مرتفعة الحافة الحطية المنددة. وهو على الكار عند تمام ادراكها وفي انهاء خزنها يتسحق

١١٣٥٤ - رُبْدِيَّ صَفْصَالِي الْوَرْق *

Bupththalmum salicifolium (S). Bupththalmum à feuilles de saule, Cèl de boeuf à feuilles de saule (F).

نوع من الربد يملو من ٣٠ الى ١٥٠ سم. ساقه نحلة اوراقه سنانية طولها نحو ١٠ سم. عرضها ٢، نصلها جلد النسيج الرقيق، ازغب البشرة على صفحيه. ازهاره كبيرة القد فردية الارتكاز.

١١٣٥٥ - رُبْدِيَّ ظَرْفِيَّ *

Bupththalmum speciosum, Tékia speciosa (S). Bupththalmum élégant, Cèl de boeuf élégant, Tékia élégant (F).

نوع من الربد يملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه غليظة، اوراقه قلبية الشكل منبقة، نصلها مائل بشرة الصفة العليا، ازغب السفلى. ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ٨ سم.

١١٣٥٦ - رُبْدِيَّ قَلْبِيَّ

Bupththalmum speciosissimum, Tékia speciosissima (S). Bupththalmum superbe, Cèl de boeuf superbe, Tékia superbe (F).

نوع من الربد، يملو نحو ٥٠ سم. ساقه غليظة قوية. اوراقه حاشية كبيرة القد مميكة النصل الجلدي الازغب. ازهاره كبيرة، قطرها نحو ٦ سم.

١١٣٥٧ - رُبْدِيَّ ثَنِيَّ وَرْدُ الْحِمَارِ

Bupththalmum graveolens (S). Bupththalmum fétide, Cèl de boeuf fétide (F). Oxyeye (E). Rindsuge (D). Bufalmo, Occhio di bus (I).

نوع من الربد، يملو نحو ٨٠ سم. اوراقه مستطيلة المنح مميكة النصل الباهت الخضار. ازهاره شارفة البتلات، لونها الى الصفرة الباقية. يكثر في الاراضي البور للتصحة الانساج.

١١٣٥٨ - رُبْدِيَّ دُرَّ ٥

Rhipidura (S).

Rhipidura (F).

طائر من الجواثم سليات المتأخر وضعية المهابيات. موطنه ماليزيه والجزر الهابرة. يالغ النابات وصفات مجاري الماء. قوته الاذباب والحوم || جسمه صغير القد، مستطيل اللذب المردسي الشكل. ثوبه الى الصفحة الطلاء. عجماره وزوره واثنيكه الى القنيرة، ويملو في بحيرة من قاعدته الشفق الى النطق، جذة حابطة السرة كما في الرأس الى يدين عنه في الاشجار الزرقية. عنه كاللحوب جيد الحيك بالخشيش الناعم. الاثنى تحضن بتناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحمل. القرغيم يستمر نحو ١٢ يوماً.

١١٣٥٩ - رُبْدِيَّ رُبْدِيَّ

Troupeau de ruminants sauvages (F). Drove of savage ruminants (E).

سجامة البقر الوحشي وسائر الحيوانات المجترة.

١١٣٦٠ - رُبْدِيَّ رُبْدِيَّ ، قَلْبِيَّ ، مَعْدِيَّ أَسْوَد ، عَسْبِيَّ

Solanum nigrum (S).

Melongèna noire, Morella noire, Amourette, Tue-chien (F). Black nightshade, Hound's-berry (E). Schwarzer nachtschatten (D). Morella, Solano nero, Solatro ortense (I).

جنية رية مدمرة من الفصيلة الباذنجانية. يالها غليظة، فراءه، شاككة. اوراقها كبيرة القد منبقة، نصلها مكيح



رَبْدٌ ظَرْفِيَّ



رَبْدِيَّ



رَبْدِيَّ الْفُتَّاح



رل



رية النخيل



رية شية



رية منقطة



رييدان مرعوي

مستديرة حنية خلية حنطية اللون تركب البشرة المخدوشة والمطوية تتجمل في اغلال أخلايا والساد || يكلف بطعم ورق الاضمان والانتاد المصابة ثم تطهر الجروح بمطول سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١١٣٧٤ - **زيتونات** *Phacidiaea*
عزاة طلور مجهرية من فصيلة الحشريات زيتونية الزيتيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بقصصها اللاتقياس الذي يتفصل من النخينة او يلتصم بها . مدينتها مستديرة منبسطة . يوفها يضي الشكل خفاف وسيد الخلية . نكتاتها بنفسجية الزام الاصل || لشجر اجناسها التي تمرى الثبات ثلاثة : الربيع والخريف والشتاء .

١١٣٧٥ - **زيتكة** *Empria (F). Expropration (E).*

١١٣٧٦ - **زيتكي ، زيتاني** *Plotax*
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات صغيرة القد مفلطحة مستديرة زاهية الالوان البديدة ، تكثر في البحار الحساسة .

١١٣٧٧ - **زيسل *** *Randia (S). قرعسي العنكب*
Randia (F). Ink plant, Ink-berry (E). Randie (D). Randia (I).

جلس بنبات وهجرات برية وزيتنية من فصيلة الغويات . انواعها عديدة جميعها فراء السوك ، بعضها شاك . اورقاتها متقابلة او رمية لثلاثية ، احليجية الشكل ، مياوية للتصل ، مستقلة . انزعاجها فردية التجميع ابطية الاوتكار . ثمارها متينة متينة ثنائية البلقلة . ترطب في الاراضي الرطبة . تكثر في المناطق وعلى ضفاف الانهر . يستخرج من ثمارها صباغ ازرق قاصر الصنف .

١١٣٧٨ - **زيتوش** *الشجرة العظيمة الواسعة .*

١١٣٧٩ - **زبي**
الشاة التي وضعت سحيتا . وتيل الرب من المخر والرفوش من الفسفن وجسمها رباب .

١١٣٨٠ - **زيتكة النخيل *** *Phyllonatus stenus (S).*
غضاض من فصيلة الجليبات ، طولها نحو ٢٠ م . ومرضها ١٢ ، رأسها مريض ضلع بقرن مدب . لونها كستنائي موله لل سمرة . تحمها مستدير الطرف . تعيش بين النخيل وترطب في المناطق الرطبة . ريقها تركب جلجور لككية ويطويها حتى سطح التربة .

١١٣٨١ - **زيتكة شبيهة *** *Pentodon idiota (S).*
Pentodon nigaud (F). Pentodon idiota (E).

حشرة غاشلة واحدة من فصيلة الجليبات ورقية ممدعات الاجنحة . موطنها الشرق الاوسط . تألف المزارع والبساتين والكروم والقرواتين . خنافسها تعيش على اوراق النبات . يرقاتها تركب الجلجور التاكيب والشعرية || جسمها يضي الشكل ، متوسط القد ، يطول من ١٨ الى ٢٠ م . ويعرض من ١٢ الى ١٣ م . ثوبا الى السواد اللامع يعطو ظل دقيق . رأسها مستدك الجسم ، قصير الخط ، ضلع الكنكين اللزبين . زبابها صغيران ، صمغيا اطرافا . عينها صغيرتان بارزتان ، ظهرها مستدك الاحديداب مشطوم الطرف لا يلمس كامل البطن . غذاءها متباينة الحشيز الخفيف . اصنافها خاسية المنقل || جلجها ثلاثي اطول . تخرج الحشرة الجملانة من مكنتها في نيسان وتبقى

حتى اواخر ايلول . تسرح من الشروق الى نحو الساعة الثامنة ومن العصر الى الدخشة . تساد بعد ظهورها بثلاثة اشهر . تنجع المكن في التربة على عمق ٥ او ٦ سم . || البرقة عند بلوغها الادراك الجسموري الذي يحصل بعد التقف ينمو ٢٦ شهرا تقو نحو ٣٠ م . ثوبا الى البياض الابهر . جسمها مستطيل الجسم ، مقوس الشكل ، مستضخم الرأس الاسود ، ضلع الكنكين ، سداسي الرواجب المسر || طود الاكمال الذي يستمر نحو حشرة اسابيع يقضي في التربة على عمق نحو ٢٠ سم . داخل جراب غشن من القراب والخاب .

١١٣٨٢ - **زيتكة منقطة ***

Pentodon punctatus (S). Pentodon ponctus (F).
غضاض من فصيلة الجليبات . جسمها يطول نحو ٢٢ م . ويعرض نحو ١٤ م . رأسها مستعرض الشكل . ظهرها مخدوب . ثوبا الى السمرة اسود المواجه . غذاءها مجذعان جينوط دقيقة تليو كالنقط المتتابعة || ريقها كبيرة القد ، مقوسة الشكل ، غبراء اللون ، تعيش نحو ثلاث سنوات ، تركب جلجور النباتات من اي جنس ونوع .

١١٣٨٣ - **زيتسكة** *Dividende (F). Dividend (E).*
هي الحصة من الربيع الصحيح وله تكون حقيقية او صورية .

١١٣٨٤ - **زيسيد** *الريد ، تمر لصد ثم نضج بالماء .*

١١٣٨٥ - **زويدان ، رجل الطير ، رجل العصفور** *Ornithopus (S). Ornithope, Pied d'oiseau (F). Bird's-foot (E). Vogelfuss (D). Ornitopa (I).*
جنس نباتات عشبية برية وطلنية من فصيلة القنطاريات القراشية . انواعها ستة ترطب في الازربة الرطبة والخليلة الانساج . اورقاتها متعاقبة مركبة وقرية ، وريقها احليجية صغيرة . انزعاجها محورية ، ثمارها صمغية التجميع و يضاها اللون او وردية . زنادا قرون دقيقة اسطوانية الشكل متفاوتة الطول حوية المقعدة تشبه رجل الطير . يزودها صغيرة شبه كروية . اشهر انواعها ما يلي .

١١٣٨٦ - **زويدان قنوم** *Ornithopus perpusillus (S).*
Ornithopus nain (F).
نوع من الرييدان البري النجسي الصينى القد . انزعاجه يبيض . يقال انه من النباتات الطبية يدر البول .

١١٣٨٧ - **زويدان مرعوي ***
Ornithopus sativus (S). Ornithope cultivé, Serradelle, Serradelle (F). Sersadilla, Common bird's-foot (E). Serradella, Kleimer vogelfuss (D). Ornithopa sativa, Serradilla (I).

نوع من الرييدان الكلائي ، زهر ودي اللون ، يزرع في الحقول والمراعي . حلقه جيد الصنف رغب فيه الماشية .

١١٣٨٨ - **زيتسك** *Printemps (F). Spring (E).*
فصل من فصل السنة بين الشتاء والصيف . مدته ثلاثة اشهر من ٢١ آذار الى ٢٠ حزيران . يمتدنى عند زوال الشمس من برج الحمل . وفيه يتسوي الليل والنهار ويتبدل الزمان ويطيب الهواء ويب القمم وتزود الشجر وتسيل الاودية وتنبع العين ويورق الشجر ويتلاذ الزهر في الربيع والحقل || يخدم ان ان تبلغ الشمس آخر الاجزاء حيث يقلل الصيف .

١١٣٨٩ - رَيْكِي (E). Vernal, Spring-like (F). Vernal (F).
نمت ترميز يطلق حل ما يخص بالربيع .

١١٣٩٠ - رَيْمِيَّات (S). Primulaceae (S).
Primulacées (F). Primulacées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة القمالة ، تشل
عدة أجناس وأنواع ، أشهرها زهرة الربيع وبخود مريم
وسحيفة الخلة .

١١٣٩١ - رَيْكِي (E). Autosome (F). Autosome (E).
اسم يطلق حل مجموعة الشب المجسدة في كل حيوية
حيوانية .

١١٣٩٢ - رَيْت (E). Sanglier (F). Wild boar (E).
الرت هو الخنزير الوحشي . الذكور ينحى الشعر والاني
الورث . أنواعه عديدة موطنها العالم القديم ، أمورها وأشهرها
الاربعة التالية :

١١٣٩٣ - رَيْت أَصْفَر (S).
Sus cristatus (S).
Sanglier à crinière (F).
نوع من الخنزير الوحشي يتميز بطوله الطويلة الحلب
الاسود الممتدة من اللذن الى الكفل . ذنبه قليل الحلب .
أذنه مرطاب الصفعة الخاضعة ، عليه الناعالية . جثته
متوسطة القد طولا نحو ١٥٠ سم . طولها ٩٠ || موطنه
الهند حتى ارتفاع ٤٥٠٠ م . ويرتبط وبشر الجوز
الاجري || اناته تقص من ٤ الى ٦ خناثيس مرتين
في العام .

١١٣٩٤ - رَيْت قِزَمِي (S).
Sus salvanius (S).
Sanglier nain (F).
نوع من الخنزير الوحشي ، موطنه مغرب جبالا . جثته
صغيرة القد طولا نحو ٦٠ سم . طولها ٣٠ بذيله ٣ سم .
يشي طعاما صغيرة براوح حلدها من ٥ الى ٢٠ . يأنف
الاجراج والادغال والرمال الطبيعية الرطبة الاضباب .
اناته تقص مرة واحدة في العام من ٦ الى ٨ خناثيس .

١١٣٩٥ - رَيْت مُجَدُّول (S).
Sus scrofa (S).
Sanglier commun (F). Common wild boar (E).
نوع من الخنزير الوحشي ، شروبه عديدة موطنها آسيا
والشرق الاوسط واروبة وجزر المتوسط وافريقية الشمالية
حتى مصر واليونان || جسمه غليظ الجف ، طوله نحو
٢٠٠ سم . طول ١٠٠ ذنبه ٢٥ . اما وزنه فيراوح بين
١٥٠ و ٢٠٠ كيلو . قوامه قصيرة قوية ، رأسه شامخ
فنتليته مسطوية . اذنه منتصبة ، عليه كثيف التجميع
يفلظ ويطلق عند شبح الظهور || يشي جهامات غطفة
المدد . يأنف النباتات والحقول المزروعة . يسرح في الليل .
اناته تقص من ٦ الى ١٠ خناثيس مرتين في السنة .

١١٣٩٦ - رَيْت مُسْتَج (S).
Sus vittatus (S).
Sanglier rayé (F).
نوع من الخنزير الوحشي ، شروبه عديدة ، موطنها جبال
وسوترا وبورنيو والهند الصينية . يتميز بخبره المنح
وبذفرته السوداء التي تمتد من الفلقتن الى اوائل الظهر .
جثته متوسطة القد طولها نحو ١٢٠ سم . وطولها ٦٠ || يأنف
الاجراج والناثق والاضباب الكثيفة للفضة . اناته تقص
من ٦ الى ٨ خناثيس .

١١٣٩٧ - رَيْكِي (F). Phytoclasie (F).
الرتاية مبحث من مجموعة مباحث علم النبات ينحصر
بالتصنيف والتسمية .

١١٣٩٨ - رَيْكِي (F). Lithologie (F).
العالم يتركب الحجارة .

١١٣٩٩ - رَيْكِي (E). Lithologie (F). Lithologie (E).
علم الحجارة وتركيبها .

١١٤٠٠ - رَيْكِي (E). Ratanhia (F).
Ratanhia, Krameria (S). Ratanhia, Krameria (F).
جلس نباتات جنسية طيبة معمرة من المستنقعات وخصبة
النباتات . انواعها المعروفة ٢٠ أصلها البلاد الامريكية
تكثر في بوليفيا والبيرو . سيقانها فروع . اوراقها سنائية
متعاقبة ، تصالفا صغيرة اللد جلابة . ازهارها فردية التجميع
محورية الاركانز . يتكرر فيها اللون الاحمر . ثمارها كروية
ناشقة تلتف بعض البسات المستدرة || جلجورها لينة
التركيب لينة الانتشابه والامتداد ، تنجها جلجوري اللون
في بعض المواد المقوية انشابة الجزلة التبع || الشهر
أنواعها ما يتبع .

١١٤٠١ - رَيْكِي (F). Ratanhia indica (S).
Kramérie rouge, K. de Savatille (F).

١١٤٠٢ - رَيْكِي (F). Ratanhia secundiflora (S).
Kramérie grise, K. du Mexique (F).

١١٤٠٣ - رَيْكِي (F). Ratanhia officinal (S).
Kramérie officinale, K. triandra (F).

١١٤٠٤ - رَيْكِي (F). Ordre (F).
هي في تصنيف الاحياء جبال الفصائل لمتشابهة .

١١٤٠٥ - رَيْكِي (F). Marche de l'escalier (F).
الرتبة : الواحدة من درجات الدراج .

١١٤٠٦ - رَيْكِي (F). Rotama (S). Rétama (F).
جلس نباتات معمرة برية وريضية من فصيلة القزليات .
انواعه قليلة منها الشرق الاوسط . جميعها نباتات تملو
من المترين الى الثلاثة امتار . سيقانها فروع اسلية الشكل .
فروعها الزهرية عريانة اما الفلقة فلذات اوراق صغيرة بسيطة
مسطوية التصل المحوري او غشية . ازهارها متعدي
التجميع ، محوري الاركانز . ازهارها صغيرة القد ، كثيرة
العدد ، يضاء اللون || تنورها يستمر من شباط الى
اواخر نيسان .

١١٤٠٧ - رَيْكِي (E). Gommage (F). Tapping (E).
استئصال او امتصاص راتنج الحشويات وذلك بحر
سوق حله الاجبار والقطاط ما يحل منها من الراتنج .

١١٤٠٨ - رَيْكِي (F). Cul-de-sac (F).
Blind alley (E).
كل منجم لا يخرج فيه وكل طريق غير ناظ .

١١٤٠٩ - رَيْكِي (E). Sous-ordre (F).
Sub-ordre (E).
الرتبة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الرتبة وقبل الفصيلة .



رت اصفر



رت مبلول



رت

الصردية الى التي الاسمر . وراجها البغية لمول دقيقة ||
طور الكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوما يتقيض ضمن
صلبة متينة الحيك تنسجه البرقة التي ملع النمل بعد
ان تطويه وتبكيه بخيط حريرية متصالية .

١١٤١٧ - رتيلاء Ranger (F). To range (E).

رثت اللباجة فيها : حته . ورت البيض في الحانسة :
رتبه .

١١٤١٨ - رتيلاء الرجمة : يراض في طرف انف الفرس.

Rhytisma

١١٤١٩ - رتيلاء

جنس فطور مجهرية من الرينيات وفصيلة الفشاريات
يتميز برتيلاء نقشة وتتنو في نصل الورقة المنحار تحت
الباسة الادمية . تحضن في داخلها الاصاب التي تضم البرغ.
فيها كيت لينة ، بسيط التركيب ، غيبلي الشكل ،
شثاف || انواعه قليلة اشهرها رتة القيقب ورتة
المنصفان .

١١٤٢٠ - رتيلاء المنصفان

Rhytisma salicinum, Melasma salicina (S). Maladie
des croutes noires du saule (F).

فطر مجهرى يصيب اوراق المنصفان فيشوهها || مظهره
الخارجي يقع بجبهة ناعقة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها
ال اسمر ، تركب نصل الازراق على صفاته العليا
تستند النصل وتحميه وتشوهه || اغزاره طفيفة لا
تستويب المكافئة .

١١٤٢١ - رتيلاء القيقب

Rhytisma acerinum, Melasma acerina (S). Maladie
des croutes noires de l'arabe (F). lar spot of maple
(E). Pechfleckkrankheit des ahorns (D).

فطر مجهرى يصيب القيقب في اوراقه فيضها . مظهره
الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم تكثر فيها الاستدارة .
قطرها يراوح من ٧ الى ١٨ سم . تركب نصل الازراق
على صفاتها العليا تتوزع فيشوه صفراء اللون ثم سمراء
يعطيها اطار مذهب || اغزاره محدودة الاثني لا تستلزم
المكافئة . حل ان استمال سائل بورود مرة واحدة عند
الانواع يفيد . ومنهم من استعمل الاسمدة الازوتية لانها
تقوي مناعة الازراق وتضع الرتة .

Archrite (F). Arthritis (E).

١١٤٢٢ - رتيلاء

في التهاب المفصل . اطبه .

Trechidas (S).

١١٤٢٣ - رتيليات

Tréhidés (F). Trechidas (E).

فصيلة حشرات قانصة ناعمة من رتبة غدييات الاجنسة .
اجناسها وانواعها كثيرة البعد معظمها من حشرات الانعام
الغارة والمتدلة الحرارة || جميعها صغيرة القدر قلي يتجاوز
طول الواحدة منها ١٠ سم . رؤوسها كروية الشكل ،
صغيرة العين الناشرة ، مستطيلة الزباني الفشارية النصل .
كرواسها قليلة الشكل . امامها لاسقة ثمانية الاعاديد
القاطبة المتوازية . اطوارها يخطفه الالوان || تسرح في
النبات رتييت في الليل . تسمى بسرعة ورشاة وتطير غفلة ||
قوتها ما تهرس لما من الحشرات الدنيا واليدان || اشهر
اجناسها الرتيلاء والسيرة والبنوس .

١١٤٢٤ - رتيلاء ، صغو سيلندريوم

Septocylindrium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرططيات . مشجبه داخلي

Tarentula (S).

١١٤١٠ - رتيلاء

Tarentule (F). Tarantula (E).

جنس حشرات من المناكب ينتمي الى فصيلة الحنكيات .
انواعه قليلة جميعها متوسطة القد ، قانصة ، مقفرة وبامة .

١١٤١١ - رتيلاء الالبية

Araignée des caves (F).

دورية من المناكب تدعى شبيعة ، اطبا .

١١٤١٢ - رتيليات Araneida (S). Aranéides (F).

Aranéids, Spiders (E). Spinnen (D).

في المناكب رتبة من الحنكيات مدينة الفسائل والاجناس
والانواع .

Lygodium (S).

١١٤١٣ - رتيلاء

Lygodier, Lygodion (F). Climbing fern, Snake's
tongue fern (E). Schlingfarn, Kletterfarn (D).
Ligodia (I).

جنس نباتات مرسخة من فصيلة الرتييات . انواعه
المعروفة ١٥ جميعها نباتات حارشة ملتفة ممرمة . يقال
لها لا تغل في القنائل الخلية وقد تنقع الصدر والامعاء .

Schizaeaca (S).

١١٤١٤ - رتيليات

Schizaeacés (F). Schizaeaceae (E).

فصيلة من البرسيم اجناسها نحو ١٦ . انواعها كثيرة
العدد جميعها برية ، منبتها المناطق الحارة الرطبة . اشهر
اجناسها الرتيلاء .

Lais (F). Wild sow (E).

١١٤١٥ - رتيلاء

انثى الرت اي الخنزير البري .

١١٤١٦ - رتيلاء ملوثة ، لايعة اوزك

الاشجار الثميرة

Lyonetia clerckella (S).

Minuse des feuilles des arbres fruitiers (F).

Apple leaf miner (E). Obstbaum-Miniermotte,
Schlangenniniermotte (D).

حشرة من فصيلة القويديات ورتية سرشقيات الاجنسة .
اصطلاحا تمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا واثريقية الشالية .
تألف الممرات التي يكثر فيها التفاح والكرز والخوخ .
فراشتها جارية قوتها حريق الانظار . سرشقتها لايعة قوتها
غللا نصل الازراق || جسمها نحيل خفيف ، يطول
نحو ٤ سم . سبطها من ٨ الى ١٠ سم . راسها معتدل الحجم ،
شبه مكور الشكل . عينها صغيرتان ، بارزتان . زباناها
عيطان . ملابها قصيرة ، مرشها معتدل الطول . جوشها
الذهب اللون كالطين . رواشتها صغيرة ، الاسمانيا الى
الانفصان الى الذهبية الخططة . اما الاحداث فالل الشبهة
الزاهرة || لها ثلاثة اصيل في الحول . تسرح في النهار
وتسكن في الليل . تبارش الاثني متع المكن بعد الكوم
يبروين وتقسر عليه نحو خمسة ايام وقرن مباحدا في
الصفحات السفلى من نصل الازراق . يتغف المكن بعد
صحة بنحو ٨ ايام من اسارع دقيقة تلم النصل في تسجيده
المادي تحت البشرة وتغدد فيه انفاقا مستطيلة ، متعربة
تضم فيها حتى نهاية الطور الاسروي اي نحو ٢٥ يوما ||
البرقة عند بلوغها الاذراك تمام تطول نحو ١٠ سم . جسمها
وشهي الشكل ، تنبي اللون ، اسمر الرأس . منها ورواجها



رتيلاء



رتيلاء



رت



رتيلاء ملوثة



رتة المنصفان



رتة القيقب



رَبِيعَةُ الْجُدُور



رَبِيعَةُ الْقَطْنِ



رَبِيعَةُ



رَبِيعَةُ

١١٤٣٥ - رُبُجُوجُ *
Gnetum (S). Gnèta (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الغليديات. ومنها
البلاد الحارة. أنوعها نحو ١٥ منها الجنبات للمادة المارشة
ومنها الشجيرات القزواء البقاء. أوراقها مسننة، متعاقبة،
بيضية للتصلب المسح. أزهارها مثلية التجميع أبلي الارتكاز
اشهر أنوعه ثلاثة التالية.

١١٤٣٦ - رُبُجُوجُ جَمَاوُ
Gnetum gnemon (S).
Gnèta de java (F).
نوع من الربرج الزراعي. أوراقه النامية مأكولة وبلورة
كلية.

١١٤٣٧ - رُبُجُوجُ طَبِي
Gnetum urens (S).
Gnèta rufarachisante (F).
نوع من الربرج الزراعي. بلورة مأكولة. يستخرج
من ساقه عصارة لزجة مرطبة عديدة المنافع الطبية.

١١٤٣٨ - رُبُجُوجُ لَسِيْمِي
Gnetum fusciculare (S).
Gnèta textile (F).
نوع من الربرج الزراعي الصناعي. يستخلص من ثمره
اللياف صناعية نسيجية.

١١٤٣٩ - رُبُجُوكَة
Réclapés, Reçu (F).
Receipt, Received (E).
عمر أو وصل تدون فيه بالتفصيل وأيسر البضائع التي
صار استلامها.

١١٤٤٠ - رُبُجُوبِي
Rétroactif (F). Retroactive (E).
جار معلوله على الماضي.

١١٤٤١ - رُبُجُوبِيَة
Rétroactivité (F).
Retroactivity (E).
هي ربيعة الار اي نقل أثر القانون أو الحكم أو أي
عمل قانوني الى الماضي.

١١٤٤٢ - رُبُجُوبِيَة الْقَرْط
Rétroactivité de la condition (F). Retroactivity of
condition (E).
هي نقل أثر الشرط الى يوم العقد القانوني فلذا حل الشرط
المؤقت حدث أثره منذ يوم تحرير العقد وإذا كان الشرط
فائضا اعتبر العقد كأن لم يكن قط.

١١٤٤٣ - رِبْجَلُ
Pied (F). Foot (E).
هي لقائمة وتسمى الحافر في الخيل والخف في الايل والظلف
في البقر والفسان.

١١٤٤٤ - رِبْجَلُ وَ رِبْجَلَة
Multitude, Troupe (F).
Multitude, Troop (E).
سرب أو جماعة الجراد وما اشبه ج أربال.

١١٤٤٥ - رِبْجَلُ الْأَرْقَبِ
هو نقل البر، اطلبه.

١١٤٤٦ - رِبْجَلُ الْأَسَدِ
هو اللذان الجلي، اطلبه.

١١٤٤٧ - رِبْجَلُ الْإَوْدِ
راج أئنة.

١١٤٤٨ - رِبْجَلُ الْجَبَارِ الْبَيْسَرِي
Rigel Elgebar (F). Rigel (E).
نجم نير من كوكبة الجبار أي الجزء. مركزة على القدم
البيسري. ويدعى أيضاً رِبْجَلُ الْجُزَاءِ البيسري. يدعى من
الأرض نحو ٦١٠ سنة ضوئية.

الانتشاب، جربه الكندية مهمة الفوض، شديدة
الانصر. كنانته قلاعية، مؤثرة، ضمية التجميع. أنوعه
نحو ٢٥ جميعها ملاذية أعرضها ربيعة الجذور وربة
القطن.

١١٤٤٥ - رُبَيْكَة الْجُدُور *
Septocylindrium radicolium (S).

نار مجهرى يركب جلود الاثجار المظلمة القلوية منها
الفتح والكلز والبيون نيفها ويسرع في ينسها.

١١٤٤٦ - رُبَيْكَة الْقَطْن *
Septocylindrium areols (S).

نار مجهرى يركب أوراق القطن دون أن يؤذيها || مظهره
الخارجي بلطح مسطوية طويلا نحو ١٠ م. لعنر التصل
على صفحت العليا. تبهر غشاء اللين ثم تتحول الى السمرة
ويبقى حل حالها ولونها حتى آخر جهدها.

١١٤٤٧ - رُبَيْكَة وَ سَيْسَمُولُوجِيَة
Séismologie, Sismologie (F). Seismology (E).

الرباجاة أو السيسمولوجية علم يبحث في الزلازل والاضرابات
الارضية.

١١٤٤٨ - رِبْجَاع
Retour (F). Return (E).
وقت الرجوع أو زين الرجاء هو زين رجوع العبد بعد
نظامها.

١١٤٤٩ - رِبْجَاكَة
Stabulation (F). Sealing (E).
الربانة والربن هي تربة الدواجن في المرائب والاصطبلات
والمرح لا في المراعي.

١١٤٥٠ - رُبَيْكَا
Madrépore (F). Madrepore (E).
نوع من الربانة، مهد عمار البلاد الحارة والاسوائية
ركبته مسنة نسيجية التركيب كثيرة الفروع والشعاب
والانفاق.

١١٤٥١ - رِبْجَاكَة *
Madréporaires (F).
فئة من المرجانيات البحرية وهي حيوانات بحرية من صف
المحيطات تتميز بأفرانها النحسية المتراكمة وبعناقها
الكبيرة المشبعة التي تصنع كالشعاف.

١١٤٥٢ - رِبْجَاكِي *
Madréporique (F).
Madreporic (E).

لعت تمريلي يطلق على الشعاف والصفور البحرية
الشرة والمشبعة كدائع الرجان.

١١٤٥٣ - رُبَيْكَانِيَة *
Rajania (F).

جنس نباتات جنبية عارفة من فصيلة البوتسودويات.
أنوعها المعروفة ستة اصلاطها امريكية الوسطى والانتليل.
جلودها عسقلية. سوقها لينة ملتفة. أوراقها مسننة
متعاقبة قليلة التصل. أزهارها ثنائية المسكن. أزهارها
مثلية التجميع، أبلي الارتكاز. ثمارها تعلق بعض
الزور اللينة اللزوية الجناح. عسقلها ديماسية لايبة
مأكولة تستعمل استعمال الانيام أي البطاطا الصينية.

١١٤٥٤ - رُبَيْكَة
ربوب النخلة: ينبت عنها دكاأا تنمد عليه لصفها. ووضع
الشوك حوطا لئلا يعمل اليها اسد.

١١٤٦٠ - رجل القط المزمري

Antennaria plantaginifolia (S). Pied-de-chat à feuilles de plantain (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو نحو ٤٠ سم. وراكها قليلة، مستطيلة، كسبة التواقي. أوراقها غنية، نصلها لساني الشكل خلي البشرة ثلاث الفلوع. رؤسها الزهرية بيض وغضر || أزهارها يستمر من نيسان إلى تموز.

١١٤٦١ - رجل البقرة اطبل كالية المروج.

١١٤٦٢ - رجل المعزى، حشيشة المعزى

Aegopodium podagraria (S). *Aegopode podagraria*, *Egopode aux gouteux*, *Herbe aux gouteux*, *H. de St Gérard*, *Pied de chèvre* (F). *Gosswed*, *Bishop's weed* (E). *Gemeiner giersch*, *Podagrakaut* (D). *Egopodo podagraria* (I).

نبات عشبي يري طبي معمر من فصيلة الخيميات ينبت في الأماكن الظليلة، منافعه الطبية عديدة وبهية || ساقه غليظة جوفاء تنمو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. أوراقها كبيرة، مركبة، سداسية، وسيقانها ثلاثية التجميع، يهسية الشكل، مسنة النصل الباهت الخضار.

١١٤٦٣ - رجل قنطوروس

نجم نير من كوكبة قنطوروس.

١١٤٦٤ - رجلته هي البقلة الحساة، اطبلها.

١١٤٦٥ - رجلكتات

Portulacaceae (S). *Portulacacées* (F). *Portulacaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القنات، اجناسها وانواعها عديدة. اشهر نباتاتها الرجلية.

١١٤٦٦ - رجلتين

Stabular (F). *To stall* (E).

رجل ورجل اكدية : حبسها في رابضها على اللطف.

١١٤٦٧ - رجلتين هي الرجلية، راجسها.

١١٤٦٨ - رجوع هو الايلولة، اطبلها.

١١٤٦٩ - رجلولة

Coralliphila (S). *Coralliphila* (F).

جنس حيوانات بحرية من الرجويات معديات الارجل وفصيلة الرجويات. انواعها المعروفة قليلة البدن نحو سم. اعطتها بحار البلاد الحارة اغصها البحر الاخر. تميش لاصقة بدائع المرجان والبرجان || اصداها صغيرة حوشة شبه يهسية الشكل مقطوعة القاعدة تبدو كالجلب الومعة. اعقابها عازنة ومثللة.

١١٤٧٠ - رجولات

Coralliphilidae (S). *Coralliphilidae* (F).

فصيلة من الرجويات معديات الارجل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها يعيش على بدائع البرجان والمرجان في بحار المناطق الحارة || اصداها خشن، حوشة، متباينة الاشكال للاخفاسية، قليلة القليلة، قصيرة الحارزة الصغيرة || اعرف اجناسها واشهرها الرجولة والسحيفة.

١١٤٦٩ - رجل الجبار البني

نجم نير من كوكبة الجبار مركزه على القدم البني. ويصير ايضاً رجل الجوزاء البني.

١١٤٥٠ - رجل الحشام هو لكجان الصلبي، اطبله.

١١٤٥١ - رجل النبة

Arctopus (S). *Oursin*, *Pied d'ours* (F). *Bears paw* (E). *Bärenfuss* (D). *Plè d'orso* (I).

نبات عشبي يري من الخيميات. ساقه متضبة تنتهي بهمة من الاوراق الكبيرة اللد يطواها الزهار الصيواني التجميع. أوراقه متفكة كبيرة، نصلها طبي المسام، غاوش الصفة الماربة المندة. ازهاره بيض.

١١٤٥٢ - رجل الذئب هي الخفرة، اطبلها.

١١٤٥٣ - رجل الصنقاء راجع غريق نجس.

١١٤٥٤ - رجل القرب المداد

هو الحضان المداد، اطبله.

١١٤٥٥ - رجل القبرة اطبل مائق الحدائق.

١١٤٥٦ - رجل القط، رجل المرأة أشتيكورية

Antennaria (S). *Antennaire*, *Pied-de-chat*, *Haplidule* (F). *Cat's-foot*, *Cat's-ear* (E). *Echterkatzentpötchen*, *Chatza-dépli* (D). *Piede di gatto*, *Zamba di gatto* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الابنوبية الزهر. انواعها عديدة معظمها يري ويهسية زراعي زريفي. سيقانها زبداء، أوراقها متعاقبة، نصلها خلي الصلصة السفلى. ازهارها ابنوبية لا لسين لها. قوحياتها صفراء. رؤسها بلون القناب || اعرف انواعها واشهرها الاربية النائية.

١١٤٥٧ - رجل القط الأمريكي

Antennaria microphylla (S). *Pied-de-chat microphylla* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو نحو ٢٠ سم. وراكها قصيرة كاسية التواقي، ساقها كثيفة الزغب اللبد، أوراقها السفلى غنية التجميع خلية النصل. رؤسها الزهرية كثيرة العدد، نوربة التجميع، يهساء اللون || ازهارها يستمر من حزيران إلى آب.

١١٤٥٨ - رجل القط الجبتي

Antennaria alpina (S). *Pied-de-chat alpestre* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو نحو ١٠ سم. وراكها دقيقة كاسية. أوراقها السفلى اعليجية سلمية تنطو نحو ٣ سم. نصلها خلي البشرة. رؤسها الزهرية إلى الخضار الاصح. قناباتها مديدة الحافة المسنة || ازهارها يستمر من نيسان إلى آب.

١١٤٥٩ - رجل القط الشائع

Antennaria dioica (S). *Pied-de-chat commun* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو من ١٠ إلى ٤٠ سم. صفروها مديدة. ساقها متضبة كثيفة الزغب اللثني. وراكها مستطيلة كاسية. أوراقها صغيرة تنطو نحو ٢ سم. نصلها خلي البشرة. رؤسها الزهرية يهساء اللون. او دية او قلبية || ازهارها يستمر من نيسان إلى حزيران.



رجل القط الشائع



رجل المعزى

١١٤٧٦ - رُحْبِيَّاتٌ - مَعْتَرِيَّ

Mellifera, Nectarifera (F). Melliferous (E).
هو كل نبات من أي فصيلة كان سوت أزهاره رحيقاً
تجبره النحل || ونباتات الرحاقة عديدة الخلقيا في
(نبات رحيق).

١١٤٧٧ - مَعْتَرِيَّ

Mérite (F). Meritis (E).

١١٤٧٨ - مَعْتَرِيَّ

Séchoir à fruits (F).
Drying-room (E).

هو الموضع الذي تجفف فيه الثمار ، راجع جبرين .

١١٤٧٩ - رُحْبِيَّاتٌ

الأرض الواسعة السريعة النبات . ج رحاب .



رجوم ثنائي الشريط

١١٤٨٠ - رُحْبِيَّاتٌ

Elope (S). Elope (F).
جنس حيات خفية سامة من فصيلة الرحيات . أنواعها
المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الاستوائية
والحارة من أفريقيا إلى الهند وأمريكا وأستراليا || أجسامها
شبه اسطوانية الشكل ، مسطوية ، قليلة الفصانة ، لطيفة
من ١٠٠ إلى ١٤٠ سم . رؤوسها صغيرة ، بيضبة الشوكة .
الأوليا ملوكة ، مظلمة مطوق . أطولها سوداء اللون تحويها
خطوط بيضاء || اهرق أنواعها الرسة المرجانية Elope
corallinus (S). ثوبها إلى الحرة المرجانية السهام
المواج يعطوها أطواق سود .

١١٤٨١ - رُحْبِيَّاتٌ

Schnelles (F).
لعت تعريفي يطلق على الجهات غير المستقرة في مكان
مين واحد .

١١٤٨٢ - رُحْبِيَّاتٌ

هو الانقراض ، اطله .

١١٤٨٣ - رُحْبِيَّاتٌ

Bât (F). Pack-saddle (E).
مركب الدواب يختص عادة بالابل والبغال والحير .

١١٤٨٤ - رُحْبِيَّاتٌ

Matrice, Uterus (F).
Womb, Uterus (E).
جزء من أعضاء التناسل في الحيوانات العليا يدعى عضو
الحمل يحصل بالهبل والفرج بواسطة قناة الرحم . وهو
مضلي التركيب مبطن بشفا . غاملي وقليلة الاحتياط
بالرياضة المنصبة التي تتحول إلى جنين .

١١٤٨٥ - رُحْبِيَّاتٌ

Hystericaceae (S).
Hystericacées (F). Hystericacées (E).
فصيلة البطور الرحية . أجسامها وأوتانها كثيرة العدد
مظلمة من البطور البحرية .

١١٤٨٦ - رُحْبِيَّاتٌ

Protopterus (S).
Protoptera (F). Protopterus (E).
سكة نهوية وحيدة الجنس والنوع من رنودجات التنفس
وفصيلة الرحاشيات . موطنها مستنقعات أفريقية الاستوائية ||
جسمها مستطيل الخيطيط يطول نحو ٧٥ سم . رأسها شبه
خروطي الشكل . حيناها صيرتتان ماصتان . زعنفتها
الظفرية مستطيلة ، قاطبة ، تتصل بالشرعية عند طرف
الذيل . زعانفها الصدرية والحشوية عريضة ، مسطوية ،
عذبة الشكل . ثوبها إلى الشبهة السراء يطولها توشم

١١٤٧١ - رُحْبِيَّاتٌ

Argiopides (S). Argiopides (F). Argiopides (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . أجسامها وأوتانها
كبيرة البدن الذي يجاوز الألف || أطولها البلاد الحارة
والمعتدة الحرارة من المالن القديم والجديد || أجسامها
متباينة القده منها الصغيرة والوسلى والكبيرة جميعها ثنائية
الروايا سداسية الشان مجزأة الشيايف بغطات حادة
محبة نحو الداخل || أولياها مختلفة الألوان والزراركن .
جميعها ناصبة كبيرة الشح . مكادها كروية كثار الرمان ،
علوية القوة ، تحبها بين الحجارة وعلى النباتات العذلة
اغصانها الشائكة .

١١٤٧٢ - رُحْبِيَّاتٌ

Regin (F).
Second crop, New lease (E).

هو الكلاء الناتج من الحقة الثانية . وهو الأوراق الناتجة
عن القروع كما في التبغ .

١١٤٧٣ - رُحْبِيَّاتٌ

Pédicelle (F).
Pedical (E).

هو الزناد الصغير حامل الثمرة . وهو أيضاً الملاقق القرمي
المركب كما في التبغ .

١١٤٧٤ - رُحْبِيَّاتٌ

Rhagium (S).
Rhagie (F). Rhagium (E).

جنس حشرات من عذبات الاجنحة وفصيلة القرنيات .
أنواعها المعروفة حة || أجسامها مسطوية القده ، أطولها
توازي من ١٦ إلى ٢٦ سم . أولياها مختلفة الألوان يسلطها
خل دقيق نصير تكثر فيه الشبهة || تسرح في الثمار .
تظهر في أوائل الربيع وتبقى حتى أواسط الصيف . مرتها
الانحلال الخرجية || يرقاتها صغيرة ، غليظة ، سمراء اللون ،
تدبش على الجلود اليابسة إن قامت أو مغطوة واغصانها
جلود التنوب والشرين والسرور والسنديان والكنستان .

١١٤٧٥ - رُحْبِيَّاتٌ

Rhagium bifasciatum (S). Rhagie bifasciá (F).

Rhagium bifasciatum (E).

حشرة خاضعة من فصيلة القرنيات ورتبة مفدمات الاجنحة .
تأكل الأجرار والنباتات . غناصها تقتل من جميع أجزاء
النبات . يرقاتها غاشية تركب جلود الأجرار اليابسة
ويجودها وأغصانها || جسمها مستطيل القده يطول من ١٧
إلى ٢١ سم . ثوبها إلى السمرة الخطية تشبه سمرة في الرأس
والكوكيل وأعلى الظهران . غناصها مجلجتان مبطن من البتج
الحبر . رأسها شبه مربع الجرم . حيناها كبيرتان .
زبانها كبريان ، مسطوقان إلى الرواء . ظهرها مستطير
المؤخر الثلاث . غناصها كفيقتا الحمل القصير . أصانها
المجلاة البعل الظاهرة || جبلها ثلاثي الحمل . تظهر الحشرة
في أواسط الربيع وتبقى حتى أواخر الصيف .
تسرح في الثمار . تشابه بعد ظهورها بثلاثة أسابيع . تمتع
المكن في صدور الجلود وشقوقها || البقرة عند بلوغها
الأدراك تمام تطول نحو ٣٢ سم . جسمها حدي التركيب ،
مستطيل الجرم ، عديم الرواييب ، حنطي اللون ، اشقر
المواج ، اسمر الرأس ، يمتد الحبل الدقيق || طور
الأكامل الذي يستمر من ٤٥ إلى ٥٥ يوما يتغذى في طور
الترية ضمن صلبة من المواد النباتية والعنصرية المعجنة
بالرأل .



رحة



رحاشة

Rhinanthus major (S). - رَحْمَاءٌ كَبِيرٌ *
Rhinanth à grandes fleurs (F). Rattle (E). Grasse klapper (D). Corona di re (I).

نوع من الرخاخ السريع النمو يكثر بين الزروع ليضربها ويقتسمها اللدء. أزهاره كبيرة القد صفراء اللون || أبادته واجبة ثم يستأهل أحد العواشب الحشرية .

Hippoglossus (S). - رَحْمَاشٌ *
Flétan (F). Halibut (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من المسافات وقصيلة المفلطحات. أنواعه المعروفة عديدة أصنافها بحار البلاد الباردة والمتتلة الحرارة || جميعها كبيرة القد ، أحليجية الشكل ، دقيقة الصف الصغير . زعانفها الظهرية والبطنية قاسية تمتد من المتي إلى الذنب . زعانفها الشرجية مقطوعة الأطراف || أحرر أنواعه وأشهرها الرخاشة الميولولة .

١١٤٩٩ - رَحْمَاشَةٌ مَبْدُولَةٌ *
Hippoglossus vulgaris (S). Flétan commun, Flétan halibut (F). Common Halibut (E).

سمكة من الرخاش . طولها نحو ٢٠٠ سم. نوبها إلى السمرة الحنفية يميلها موج أصفر تشوبه بعض الخضرة || أصنافها بحار البلاد الباردة والمتسربة نحو المعتدلة . وجودها في البحر المتوسط محصور ببعض المناطق أخصها الممتدة من جبل طارق إلى بحار اليونان والبحر الأسود || حمها للبد العلم مرغوب فيه .

١١٥٠٠ - رَحْمَاءٌ ، رَحْمَرٌ (E). Marble (F). Marbre (F).
جسم حجري صلب تعريفه الكيماوي مركب كربونات الكالسيوم المتبلور. ألوانه عديدة يكثر فيها الأبيض الحليبي. وهو من الأحجار التي استخدمها الإنسان في البناء والتمتعت منذ أقدم العصور .

١١٥٠١ - رَحْمَاشِيٌّ *
الرخاشي والرخاشة ضرب من الخلفة غبراء الخضرة لما زهرة بيضاء نقيه ولها عرق أبيض تحفره الحشر بمخارها والريش كله يأكل ذلك العرق خلاوته وطيبه (أبو حنيفة) || وقيل لبث تجمده السامة ، وهي بقلة غبراء تصرب إلى البيضاء وهي حلو لما أصل أبيض كأنه المنقر ، إذا انتزع حلب لبناً (اللسان) .

١١٥٠٢ - رَحْمَاشَةٌ ، رَحْمَاشَةٌ ، رَحْمَاشَةٌ *
الرخاشي والرخاشة ضرب من الخلفة غبراء الخضرة لما زهرة بيضاء نقيه ولها عرق أبيض تحفره الحشر بمخارها والريش كله يأكل ذلك العرق خلاوته وطيبه (أبو حنيفة) || وقيل لبث تجمده السامة ، وهي بقلة غبراء تصرب إلى البيضاء وهي حلو لما أصل أبيض كأنه المنقر ، إذا انتزع حلب لبناً (اللسان) .

١١٥٠٣ - رَحْمَاشَةٌ نَقْلٌ *
Passavant (F). Permet (E).
جواز ينقل الكحول أو بعض المستحضرات والفلات .

١١٥٠٤ - رَحْمَاشِيٌّ *
Mou (F). Soft (E).
نمت وصفي . الفلين خشب ريش لين .

١١٥٠٥ - رَحْمَاشَةٌ ، رَحْمَاشَةٌ ، رَحْمَاشَةٌ *
الرخاشي والرخاشة : الرشد والرفعة : الرشد الرقيق .

١١٥٠٦ - رَحْمَاشَةٌ ، رَحْمَاشَةٌ ، رَحْمَاشَةٌ *
Agnelle (F). Ewe lamb (E).
الأنثى من ولد الضأن . ج. رنائل .

١١٥٠٧ - رَحْمَاشَةٌ ، رَحْمَاشَةٌ ، رَحْمَاشَةٌ *
Halizet leucocephalus (S). Pygargus leucocephalus (E). Alge à tête blanche (F). White headed eagle (E).
طائر من النشأط ينتمي إلى عمارة العنكبان وقصيلة الصقريات .

اسد || تعيش في الاممال حتى الضحل ثم تنقش في السلي وتشتكن إلى أن تمتد المياه فتنزح المستنق || لحمها متوسط الصف ، مأكول .

١١٤٨٧ - رَحْمَاشِيَّاتٌ *
Protocarididae, Lapidocarinidae (S). Lapidocarinidae (F). Protocarididae, Lapidocarinidae (E).
نصيلة اسماك نهرية من مزدوجيات التنفس . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها من اسماك منقح المناطق الاستوائية والحارة || أحرر اجناسها وأشهرها الرخاشة والرخاشة .

١١٤٨٨ - رَحْمَاشِيٌّ *
Cebestan (F). Capetan (E).
آلة لرفع الاثقال العظيمة .

١١٤٨٩ - رَحْمَاشِيٌّ *
Meule (F). Millstone (E).
حجر الطحن . ج. أرطأ ورشي وأرطأة . وهي من الوسائل البدائية المستخدمة لطحن الحبوب أو جرشها . تتركب الحجر الاسفل منها وقد يكون حوله الحجر المألوي .

١١٤٩٠ - رَحْمَاشِيٌّ *
الرخاشي والرخاشة : الرشد والرفعة : الرشد الرقيق .

١١٤٩١ - رَحْمَاشِيٌّ *
Elapidae (S). Elapidae (E).
نصيلة حيات عديمة من اماليات الاغناد . أنواعها المعروفة نحو ٧٠ تنتمي إلى بضعة اجناس . أصنافها البلاد الاستوائية والحارة . اجناسها سامة قلبية قريبة الشبه بالانثاش . رؤوسها صغيرة شبه بيضة الثورون . ألوانها ملونة يكثر فيها التطويق وبعضها يحمل من خطين إلى خمسة خطوط قاسية || جميع أنواعها سامة وبعضها شديد الاذى || أشهر اجناسها واسمها الرسة والبناندا .

١١٤٩٢ - رَحْمَاشِيٌّ ، رَحْمَاشِيٌّ ، رَحْمَاشِيٌّ *
Nectar
غصارة سكرية لزجة مختلفة التركيب تفرزها غدد خاصة في الزهر ليحبسها النحل .

١١٤٩٣ - رَحْمَاشِيٌّ *
Aepyornis (S). Rock (F).
طائر صيبي عظم القد كان في جزائر الهند وانقرض وقد مر على بعض رؤته في منفسكر . يقال ان طول الرنة يراوح من ٣٠ إلى ٤٢ سم .

١١٤٩٤ - رَحْمَاشِيٌّ *
Vent faible (F). Weak wind (E).
الريح اللينة التي تتخلخخ الصاليج .

١١٤٩٥ - رَحْمَاشِيٌّ *
Rhinanthus (S). Rhinanth (F).
جنس نباتات شبيهة برية هشة من فصيلة الخنازيريات . أنواعه قليلة . سوقها منتصبية لينة . أوراقها كليلية حاشية متعاقبة . نصلها سناني الصفصمة ، سنن الحافة . أزهارها فردية ، أبيلية الاكروكاز ، صفراء اللون غالباً .

١١٤٩٦ - رَحْمَاشِيٌّ ، رَحْمَاشِيٌّ ، رَحْمَاشِيٌّ *
Rhinanthus crista-galli (S). Rhinante crête-de-coq, Cocrête, Croquette (F). Cock's-comb, Rattle grass, Yellow rattle (E). Klapper, Gelberkriechkraut (D). Cauterelle, Pidocchio dei prati (I).
نوع من الرخاخ الوردي يكثر بين الزروع فيسبح من النباتات الضارة لانه يسبق الزروع في ازدهار النامسر اللذائبة . يقضى عليه باستأهل اسد العواشب .



رشي



رخاخ عرف الديك



رخاخ كبير



رخاشة مبدولة



رخاء

موطنه العالم بحرب جميع القارات، يكثر في أمريكا. طوله نحو ٨٠ سم. والآنق ٩٠ سم. ثوبه إلى البصرة للسفاد. بطنه مشط بالابيض. رأسه وعينه وذنبه بيض. منقاره وخطابه صفر. قوته الاسماك والطيور والقواضم والافانام كالفم والماعز وما اشبه.

١١٥٠٨ - رَحْمَة * شَوْحَة
Pernopterus (S). Alimoche, Vautour d'Egypte, Poule des Pharaons (F). Egyptian vulture, Pharaoh's hen (E). طائر من الكوراس ووحيد الجنبس والنوع ينتمي إلى فصيلة السرايات وهو اسفر النور جنة واربعها انتشاراً. طوله نحو ٦٠ سم. وبسطه ١٦٠. ثوبه غير البلى. رأسه ازغب الريش الاصفر يبدو كالاسلم. عنقه اخضر اصفر. مشرقه اسمر. ريشه وردي اللون تلوها ماجة وبدا. قوائم سفله سود، مناكبه وصامية، اناجره طمل. عينه قزوينية. موطنه بلاد حوض البحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج الفارسي. نظامه الحياتي جماعي. اسرابه كثيرة العدد تعيش قرب المدن والساكن وتراقب القنوقل قوته الجيف والقيامة. يصيد القواضم والصنابير عندما يسهه الجرح. ينش منه في صعدور الصغور الثالثة. اناده ينفث ٣ نغبات تحضنها نحو ٣٠ بيضاً. اما كنية الفرخة فأم جمران رداءة وام عصبية وام قيس وام كير.

١١٥٠٩ - رَحْوَنَات، لَيْسَات

Malacostracae, Mollusques (F). Malacoza (E). شعبة حيوانات تشمل ذوات الصلغتين والملميات والراسيات.

١١٥١٠ - رَحْمِيلَان * Phaleris cristata (S). Parakeet auklet (E).

طائر ووحيد الجنبس والنوع من جماعة البهائم فضيلة الطيريات. اصطناعه المناطق القطبية الاسيوية والامريكية. ينزح في الشتاء نحو الصين وكوريا وكندا. ملحمه الحياتي جماعي. جماعته اسراب لا يوصى لها عدد. قوته الحشرات والحمام والفاصيص والاسماك الصغيرة والقشريات. جسمه صغير القد يطول نحو ٢٥ سم. منقاره صغير الحجم، احمر اللون، شبه غرغولي الشكل. حلقه عينه عسلية اللون. جناحه قصيران، ذلقتان، لاسفان. ذنبه غرغولي الشكل، شديد القصير. ريشه دقيقتان. ثوبه العلوي إلى البصرة المرحقة بالارادون تلوها زركسة يضاء. ثوبه السفلي إلى الريدة الزرقاء المالح. ذوده ابيض. رأسه متعرج بقترعة صغيرة من الريش اللينق الناعم. كسلة عينه يضاء اللون تمتد حتى العين. ريشه إلى البصرة الزرقاء. الآنق ابيض قدماً من الذكر وتحتل بنفس القلوب. موطنه كل نقرة على حضور المهادج او فيها. الآنق تحضن بتناوبة الذكر بيضة واحدة اصغر من بيضة الذليج. الفرخم يمتن نحو اربعة اسابيع. الصنير يمدوم على سطح الميم به التفت باسبور.

١١٥١١ - رَحْمِيمَة *

Ptilonorynchus violaceus (S). Ptilonorynchus satiné (F). Ptilonorynchus violaceus (E).

طائر من فصيلة الرخميمات. موطنه استراليا. يألف الادغال والارواح الكثيفة الانجبار. جسمه متوسط القد، يطول نحو ٣٠ سم. ثوب الذكر إلى الزرقاء السوداء المسطاه المالح. جناحه وذنبه إلى السواد القمعي. حلقه عينه زرقاء اما اطرافها فاحمر. منقاره ازرق اللون، اصفر الملقط. رجلاه إلى الحمرة. ظهر الانثى اخضر اللون.

جناحاه وذنبه إلى البصرة العافية. يعلو إلى الخضار الاصفر يعلو توشم حلالي الشكل عند اطراف الريش. قوته الكبار لا يتركها أبداً كانت. واعصها العين والدرق والمشمش والوز والبرقال ثم البزور وبيض الحشرات. يلدن منه في الانجبار الداسية ويقت بالقرب منه، على بعد بضعة امتار، مسراً يزينة بمختلف الاشياء اللينة تنسج مدته من القصبان المحبوكة تمتلها الانثى كلما دعت الحاجة الطبيعية إلى الكرم. اما الاشياء اللينة التي يزغرف بها المسرح فهي الريش الجميلة والاصناف اللينة وبيض الحصى وكسر الزجاج... الآنق تحضن من مرن إلى ثلاث مرات في الحبل وتضع في كل مرة من بيضتين إلى ثلاث بيضات ترعها بتناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً.

١١٥١٢ - رَحْمِيمَة * Ptilonorynchus (S). Ptilonorynchus (E).

فصيلة طير من الجلوب. اجتماعها والاعمال المعروفة قليلة العدد. اصطناعها بعض مناطق استراليا وفيهذه الجبهه اجسامها متوسطه القد، حيلة الاوان المتطاحلة. تتميز بالمسارح المزينة والمزخرفة التي تقيها بالقرب من عشائها. اعرف انواعها واشهرها الرخم.

١١٥١٤ - رَد * Remedant (F). Produce (E).

الرذ هو الانتاج أو الرعي. يقال شعبة كثيرة الرذ.

١١٥١٥ - رَد * Récusation (F). Challenge (E).

حق ينص عنه القانون وبين اسبابه يمنع احد المتخاصمين اللجوء إلى طلب رد القاضي ورد الحكم ورد الخير ورد الشهود.

١١٥١٦ - رَد * Resttution

احادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب البصرة.

١١٥١٧ - رَد * Rédhibition (F). Annulement of sale (E).

هو نسخ البيع الذي يميزه القانون في حالات خاصة عددة قولها حين غني يجعل البيع غير قابل للاستعمال أو يحد من استعماله.

١١٥١٨ - رَدَك

الكيش الرذاع: القسم الالاية. ر ج ع.

١١٥١٩ - رَدَامَة * Cynonycteris (S).

جنس حيوانات من فصيلة البطاطيات. انواعها ٩ ثلاثة منها اسبورية وستة افريقية. جميعها ثائرة، متوسطه القد قصرة للذنب، سوية اللون، تعيش جماعات صغيرة متفرقة وراوح عددها من ١٠ إلى ٦٠. مسرحها بيده المرن قابله يخلو نحو ٥٠ كم. اقليلها فحج الارباد ينشد من اسية إلى افريقية. اشهر انواعها ما يتبع.

١١٥٢٠ - رَدَامَة حَنْطَلَة * Cynonycteris straminea (S). Cynonycteris pallid (F).

ردامة صغيرة القد، طوله نحو ١٥ سم. وبسطه ٤٥. ثوبها حنكي اللون، يعلو زاهر الليلج، رأسها وعنقها وظهورها إلى البصرة. مؤنثها يمتد من صغار إلى الحيلة والفايون. تألف الانجبار الحربية. قوتها الكبار.



رَحْمَة



رَحْمِيلَان



رَحْمِيمَة

الثانة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة البلد اعطائها بحار البلاد المظلة الحرارة . جميع انواعها تسره في المياه العذبة حيث تنمك نحو ١٥ اسبوعاً ثم تموت الى البحر الى البحر انوعها الرذانة .

١١٥٢٧ - رَدَج (F). To grind (E).
الردج الصخري بالاحتكاك المتبادل بين قطعتين .

١١٥٢٨ - رَدَج
الردج : ما يخرج من بطن المهر او السحلة قبل الأكل .
مثل التي من الصبي .

١١٥٢٩ - رَدَجِي Marchand ambulant de légumes
هو البقال المتجول .

١١٥٣٠ - رَدْع Bourbe (F). Mud (E).
وسل المائع والاهوار .

١١٥٣١ - رَدَف Tréou (F). Tribe (E).
الردف في تصنيف الحيوان يأتي تحت الفصيلة وفوق الهامة والجلس .

١١٥٣٢ - رَدَف، كَمَل، قَطَن Croupe (F).
حيز القاذية وغيرها .

١١٥٣٣ - رَدَف، ذَكَب Daneb
الردف او القنب نجم نير من كوكبة الدجاجة . مركزه حل القنب . يبعد عن الارض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية .

١١٥٣٤ - رَدْفِيل أَزْرَق النَفس Rhodophyllus lividus (S).
Rhodophyllus livide (F).
نظر جحلي شديد الازرق وقد يمتد من فصيلة الدفاريديات . يوجد في المراعي الجبلية . يعيش على التلال . ساقه ضخمة مستعدة الارتفاع . فراء اللون . لكته كبيرة القد . للنبوة الشكل . حليقة ، لونها الى الزرق الفاتحة الى السواد . قطرها نحو ١٢ سم . اطرافها ليكنية اللون .

١١٥٣٥ - رَدَم Terressement (F).
Earth work, Embankement (E).
ما يوضع في المنخفض من تراب وصخور لرفع مستواه .

١١٥٣٦ - رَدَسِي Rudéral (F). Rudéral (E).
نمت تمريفي يطلق على كل نبات يعيش بين الاتعاش والردم .

١١٥٣٧ - رَدَن، رَدَن Rayonne (F).
Rayon, Artificial silk (E).
سد نسيجي يشق من البوليوز ، يستعمل استعمال الحرير ويصنع الحرير التباقي .

١١٥٣٨ - رَدَن، حَك Dévidage (F).
Winding, Reeling off (E).
هو استخلاص خيوط الشرائق أو المرادن وما اشبه .

١١٥٣٩ - رَدَن Ridé (F). Wrinkled (E).
نمت وصفي يطلق على كل ما هو مضفر وتعدد من الجلود والشعر والجلد وما شاكلها .

١١٥٢١ - رَدَّاسَة صَحْرَاء

Cynonycteris amplexicauda (S). Cynonycteris fauve (F).
رداسة متوسطة القد ، طولها نحو ٢٠ سم . قوتها الى الصحراء . موطنها يمتد من الخليج الفارسي الى الهند والهند الصينية والفلبين || تألف الكهوف القريبة من الشواطئ . يسرعها من الفسق الى القنجر . قوتها البار والرعويات البحرية .

١١٥٢٢ - رَدَّاسَة مَصْرِيَّة

Cynonycteris aegyptiacus (S). Cynonycteris d'Egypte (F).
رداسة صغيرة القد ، مسطيلة البنية . طولها نحو ١٦ سم وبسطها ١٠٠ سم . قوتها الى الريدة التبرء ، ظهرها اغم من بطنها . جوانبها صفراء للونج || موطنها مصر وجولوها من الحبشة الى سورية . تألف الاشجار والكهوف والبيوت الخربة || قوتها البار .

١١٥٢٣ - رَدَاغ Terrain bourbeux (F).
Muddy ground (E).
تربة كثرت فيها نسبة الروغ .

١١٥٢٤ - رَدَّالَة السِّنْدِيَّان

Mythimna acetosellae (S).
Mythimna acetosellae (F). Mythimna acetosellae (E).
حشرة من فصيلة الفشقات ورؤية حشرهايات الاجنحة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارية قوتها رقيق الاذيوار . مرتبها غاشلة قوتها اوراق السنديان || جسمها معتدل القد بطول نحو ١٨ م . بطنها نحو ٤٢ م . رأسها صغير الحجم . صينها كيرقان . زباناها خيطيان . مرتبها مسطيل . جوشها احمر اللون صتاي الموج . يطلى الى الحشرة الخنطية الموج || روثناها الامنيان الى الحشرة الخنطية يطولها ثلاث بقع متعابية لامتداوية الحجم . روثناها الخنطيان الى الخنطية الاكعب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بستة اسابيع وتمتد المكان على الصفحات السفلى من اتصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٤٥ م . جسمها اسطواني الشكل . مشعور انتشار . ثوبا الى الطحلة الرداء يطولها رقعة يضاء وسط ثوبي اسود وغطان جانبيان اسفراوان . ملاتي سكرها الى السواد النحسي . رأسها ورواجها سود . منها الى الطحلة الفراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتعقي في التربة ضمن جلاب من العين .



رَدَّالَة السِّنْدِيَّان



رَدَّالَة



رَدْفِيل أَزْرَق النَفس

١١٥٢٥ - رَدَّالَة Osmers perianus (S).
Eperian (F). Smelt, Sparling (E).

سمكة بحرية نهريّة من فصيلة الرديانيات . اعطائها معظم بحار المناطق المعتدلة الحرارة . تقترب من الشطوط في فصل الربيع وتقتل الاذيوار والابهار حيث تسره ثم تموت الى البحر || جسمها شبه اعطليبي الشكل بطول من ٢٥ الى ٣٠ م . رأسها مخروطي الشكل . لها ولس تشق الذي يتنحى خلف مؤخرة العين . زعنفتها الذيلية ثاقبة . ظهرها الى الخلفار الالاس البحري الموج ايظاحا وبطنها الى الريدة الفضية || لحمها مأكول ، متوسط الصفت .

١١٥٢٦ - رَدَّالِيَّات Osméridae (S).
Osméridae (F). Osméridae (E).

فصيلة اسماك بحرية نهريّة من كائلات النظام مفتوحات

١١٥٤٠ - رَدُفَةُ ٥

Rhodanthe (S).
Rhodanthe (F).

فروعها منتصبية فناء ، أوراقها سنانية ، طولها نحو ٧ سم .
وتعريض ٤ ، نصلها جلدي الصلصة ، ثلاثي البروق ،
ذاتي الزوايا الأخير . أزهارها غبراء اللون . ثمارها إلى
السواد اللامع ٥ أزهارها يستمر من نيسان إلى تموز .



رَدُفَةُ

١١٥٤٥ - رَدُفُ الْفَيْصِ ٥
Cortaria terminalis (S).
Redoul à fleurs terminales (F).

جنية سمرة ، رفة ، صغيرة القدة ، طولها نحو ٧ سم . ساقها
فروها وأزهارها زبداء اللون . أزهارها بيضية
الشكل ، نصلها خاسي البروق ، جامد السليج ، ذرب
أزوايا الأخير ، مدبب المقصبة ، خلي الصلصة السفلي .
أزهارها ناجية صفراء اللون . ثمارها إلى الصفرة الزاهية .
أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١١٥٤٦ - رَدُفُ الْهَيْشَةِ ٥
Cortaria nepalensis (S).
Redoul du Népal (F).

جنية سبروتية سمرة ، طولها نحو ثلاثة أمتار . ساقها فروها
فناء . أوراقها بيضية الشكل . نصلها جامد الصلصة .
خاسي البروق ، مدبب المقصبة ٥ أزهارها وثمارها حنطية
اللون . أزهارها يستمر طوال شهر أيار .



رَدُفُ آيِ الْوَرْدِ

١١٥٤٧ - رَدُفُ الْيَابَانِ ٥
Cortaria japonica (S).
Redoul du Japon (F).

جنية سبروتية سمرة طولها نحو ١٠٠ سم . ساقها فروها
أوراقها أحليجية مستطيلة ذرية . أزهارها وردية اللون .
ثمارها تمر بمختلف مشي الإحراق إلى أن تنتهي ، منه الأدراك ،
بالخسرة السوداء اللامعة ٥ أزهارها يستمر من نيسان إلى
أيار .

١١٥٤٨ - رَدُفُ الْوَيْدِ ٥
Cortariaceae (S).
Cortariaceae (F). *Cortariaceae* (E).

فصلية نباتية من ذوات القلقطين تقمل جساً واحداً جميع
بعض الأنواع البرية والبريتية .

١١٥٤٩ - رَدُفُ ٥
Repris

حالة كل نبات بعد غرسه أي رده إلى التربة لحاجة
دوره الحياتية .

١١٥٥٠ - رَدُفَةُ ٥ ، اَلْثَرْتَرَكِيَّةُ ٥
Alternaria

جس تطور مجهرية من هامة زراعاتها بفضلة الخبثات .
كتائله جلمودية الشكل ، حلية أو حبيبية الطرف ،
مكوفة من حدة بويقات مستديرة أو مرقطة الجوانب ،
حليطة الوسط ، مستطلة القطب ٥ أوتامها المثلثية عديدة
أمرها ما يتبع .

١١٥٥١ - رَدُفَةُ الْبَاذِجَانِيَّاتِ ٥ ، رَدُفَةُ
الْبَطَاخَةِ ٥

Alternaria solani, *Al. deud*, *Macrosporium solani* (S).
Alternaria des solanées, *Taches noires des*
feuilles de pomme de terre (F). *Early blight of potato* (E). *Dörrfleckenkrankheit der Karoffeln* (D).

فطر مجهرى يظلل حل أوراق بعض النباتات الباذجانية
أخصها البطاطا والبندورة ٥ ظهوره الحادى ، حل البطاطا ،
يتبع كثيرة سمراء اللون ، تركب نصل الأوراق . تبو
ستيرة الحجم ثم تتسع فيبلغ قطرها نحو ١٠ سم . نسب
ذليل التصل ثم يسهل ٥ وهو حل البندورة ويتبع لا تسمية
الشكل والحجم ، سمراء اللون ، ربادية اللون ، عديدة
المحالات المتتالية الفقراء الخشار . قطرها براوح من ١٠
إلى ١٠ سم . تركب التصل فتقويه وقد تصيب الثمار عند



رَدُفَةُ الْبَاذِجَانِيَّاتِ

حشة حولية برية وزراعية تربيينة من فصيلة المركبات .
ساقها فروها طولها نحو ٣٠ سم . فروعها دقيقة . أوراقها
ساحنة ، سنانية التصل ، مستديرة الأذيات . أزهارها
رؤسية قطرها نحو ٤ سم . فروعها أصفر اللون ، ثنائياتها
وردية أو حمراء ٥ تنموها يستمر من أواسط الصيف إلى
أواسط الخريف .

١١٥٤١ - رَدُفَةُ مَكْتَمَةِ ٥

Reduvius personatus (S). *Réduve masqué* (F).
حشرة قانصة من فصيلة الردفيات . جسمها متوسط القدة ،
ميشر الحلب ، يطول نحو ١٧ م . رأسها شبه بلوطي الشكل ،
متكاثف الحلب . عظمها شديد النشط . حينها صغرتان .
زبالها مستطيلتان ، مهدبان . حنقها أنبوي . كيطها
مهدب القسم الأمامي ، مقعر الخلفي . حنطتها مزوايلة
صغيرة . علوانها لاسف . قوائمها مجنبة الاعتقاد ، كثيفة
الحلب ٥ ثوبها إلى البني يطو ملوج براوح من الحنطى إلى
الاصفر ٥ ممرها دجوي . تمحص دم الحشرات والذباب
والحمام . رفايتها قانصة ، قوتها قوت الحشرة الجملانة .

١١٥٤٢ - رَدُفُ الْوَيْدِ ٥
Reduviidae (S). *Reduviidae*, *Assassin bugs* (E).
Rauwanzen (D).

فصلية حشرات نالمة من رتبة غمظلات الأجنحة وطبقة
نصلهايات الجناح . أسباطها وأجناسها وألوانها كثيرة العدد ،
تتجاوز الألف ، منتشرة في معظم أقطار العالم أخصها
الاقليم المنصورة نحو الحارة ٥ أجسامها صغيرة أو مخططة .
رؤوسها صغيرة . أعينها واسعة . انطباعها نقطة مجوزة
بجاة ذرية تهرق منها بعض السموم المفردة . حينها جالية ،
صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشارية مستطيلة ، ثلاثية
الفصل . قوائمها نطيفة ، وأزواج الأمامي حدة بعض
الاجناس مجهر ، كما في البرصية ، للاعتصاف ٥ جميعها
قانصة تقضي على الكثير من الحشرات الفسادة وينها البعوض
والسكيت والذباب والبق ٥ ممرها دجوي ينته من
غروب الشمس إلى الفجر .

١١٥٤٣ - رَدُفُ ٥ ، عَيْشَةُ الْبَاذِجَيْنِ ٥
Cortaria (S). *Redoul* (F).

جس نباتات حمرة من فصيلة الردفريات . أنفوله ٥
سوطها فروها فناء . أوراقها منقطة ، متعاقبة ، سنانية الشكل
نصلها جلدي الصلصة ، ثلاثي أو خاسي البروق ٥ أزهارها
عتقوية التجميع . أزهارها صغيرة القدة عادمة التبرج ،
غشائية الفصل والاسدية ، غشائية البات والأكرايل المنبسط
التجميع الشكل ٥ جميع أعضائه النباتية من فروع دقيقة
وأفان وغلاف واوراق وأزهار تحوى مادة قلووية جسمية
تسمى كوريارين (*Cortarins*) . تستعمل في دغ الحلود
القاعرة الثنية ٥ أعرف أنوعها وأشهرها ما يلي .

١١٥٤٤ - رَدُفُ آيِ الْوَرْدِ ٥ ، عَيْشَةُ الْبَاذِجَيْنِ
الْأَسِيَّةِ الْوَرْدِ ٥
Cortaria myrtifolia (S).

Redoul à feuilles de myrte Corroyère, *Herbe aux*
caneurs (F). *Myrtle leaved cancer's tree*, *Myrtle*
leaved sumach (E). *Myrtenblättriger gerberstrauch* (D). *Cortaria a foglie di mirto* (I).
جنية سبروتية مبنولة معمرة غزيرة الحلود الباذجانية طولها
من ٣٠٠ إلى ٣٠٠ سم . ساقها فروها رباعية التصلع ،

في برادات يراوح معدل حرارتها من درجة إلى درجتين فوق الصفر.

Cladode

١١٥٥٧ - رَدْدَقَة

ورقة كاذبة أو شبه ورقة تكون في سوق بعض النباتات كما في السنتورج رداق.

Radiola (S).

١١٥٥٨ - رَدْدَقَة

Radiole (F). Radiola (E).

جنس نباتات عشبية حولية بريمة من فصيلة الكتانيات . انزلها المبرقة قليلة السدد منبتها جبال حوض البحر الابيض المتوسط || سورها قراء متشعبة . اوراقها متعاقبة ، شبه بيضية النصال . ازهارها عذق التجميع . ازهارها صفيرة يضاء اللون || اشهر انواعها الرديولة الكتانية (R. linoides) منبتها الطوسي بين جبلي صين وكينكية . تنوعها صيني .

Pluie fine (F). Thin rain (E).

١١٥٥٩ - رَدْدَقَة

هو المطر الضئيل . قال الاصمعي اعنف المطر واضفه البطل ثم الرذاذ .

Hygrométrie (F). Hygrometry (E). رَدْدَقَة

علم يبحث في قياس الرطوبة الجوية .

Balançier (F).

١١٥٦١ - رَدْدَقَة

Balancer, Poisers (E).

الوزان ويعدى رقاص التوازن ، عضو دقيق صغير ، شبه دبوس الشكل ، ينشأ في البرسادة أي في الحلقة الصدرية الثالثة ، عند الحشرات من ذوات الجناحين . رها وزانان أمين وأيسر تصممها الحشرة في توصيه طيراتها وتسدده .

Hyposmétric (F). Hypsometry (E). رَدْدَقَة

علم تحديد الارتفاعات .

Atelopodidae (S).

١١٥٦٣ - رَدْدَقَات

Atelopodidae (F). Atelopodidae (E).

فصيلة حيوانات دواء قاذبة من لة الخديعيات وبرتية السونيات وبرتية البتراوات أي دمجات اللب || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية . جسمها صغيرة القفد تشبه بمساواة سطح ضلعي قوسها ابيضا في مركز ثلاثها || اشهر اجناسها الرزان والرندودة والهندوديات والكلوكا ...

١١٥٦٤ - رَدْدَقَة ، رَدْدَقَة ، رَدْدَقَة ، رَدْدَقَة

Echassage, Pissalage (F). Fropping (E).

غرز المرازح والسمايك بجانب النباتات لدم سورها أو نوحها .

Rangée d'arbres (F).

١١٥٦٥ - رَدْدَقَة

Tidy of trees (E). الصف أو السطر من الاشجار المشجرة .

Plantation en lignes (F).

١١٥٦٦ - رَدْدَقَة

Planting in ranges (F).

هي الزراعة بالسطر ترتكز على الامداد المتسارية والخطوط المتوازية .

ادراكها فخرح البشرة وتغور في اللب الذي ينسل ويغن . يكلفه حته ظهوره اما يتغص ثباتا بورود الحليل ١٪ او يتغيره باكسيد النحاس المركز ٤٪ .

١١٥٥٢ - رَدْيَّةُ الْبُرْتَقَالِ *

Alternaria citri (S). Black rot des oranges (F).

فطر مجهري يصيب البرتقال في مجامع المدركة فيغن المروق والفرابين الداخلية التي تسبب احرار الكثرة ثم اضرارها وتصلبها الى ان يقضي عليها الففن من الداخل فتتشقق او تحنط وتيس || اضرارها زهيدة لا تستوجب العناية لانها لا تتجاوز ٣ او ٥ ٪ .

١١٥٥٣ - رَدْيَّةُ الْبُرْتَقَالِ *

Alternaria tenuis, Al. longipes (S). Maladie du plant de tabac (F).

فطر مجهري يتطفل على عدة نباتات اغصانها التبغ عندما يكون في المثلث || مظهره الخارجي ذليل يحل بالاوراق واسوق ينغص ظهور اوغص خلية سمره اللون تركب السوق والاوراق قطعها وتعطفها بمادة حنطية لزجة تغشي عليها وتبني || يكلفه اولاً يظهر البذار قبل استماله في مراعق كانت موبوءة . وتطويع يكون اما يتغص الجلود مدة ١٥ دقيقة في نباتات النحاس الحليل ١٪ او يتغيرها بالاسح الزبق . منهم من استعمل بيكرينات النحاس بمعدل غرام واحد لكل كيلو زر || ثانياً بالفتح وحرق الشقق الموصية وتغير او تنفع للشقق الباقية بأحد المطويع المركزة من النحاس او على بعض المواد الكيماوية الناعمة الاتصال حالياً .

١١٥٥٤ - رَدْيَّةُ الْبُرْتَقَالِ *

Alternaria nigrescens (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الشمام يقضي عليها . مظهره الخارجي يقع فسيحة لا يقابله الشكل تركب الاوراق فتدومها وتغشي على نحو اللب . وقد يصيب النار فيرشها يقع خلية ردياة اللون يطغى سواح زرق تفرح القشور وتصلبها || ينشط كثيراً في المواقع الرطبة الحارة || يكلف حته ظهوره باستعمال المركب التالي :

سلفات النحاس ١٠٠٠ غرام
كلس ١٥٠٠ غرام
كلورور الامونيوم ٣٥٠ غرام
ماء ١٠٠٠ لتر

١١٥٥٥ - رَدْيَّةُ الْبُرْتَقَالِ *

Alternaria dianthi (S).

فطر مجهري يتطفل على الترنفل قرب زين ازهاره فيؤذي . مظهره الخارجي يقع زهيدة مستديرة او بيضية الشكل تركب الاوراق والسوق ثم تنتشر فيبلغ قطرها نحو ١٠ م وطولها نحو ١٥ م . تسبب بياس واصدام البشرة وانفلاق الطبقة الاضية التي ينشأها القطر || يكلف حته ظهور الموسم بسائل أكسيكلورير النحاس الحليل ١٪ .

١١٥٥٦ - رَدْيَّةُ الْبُرْتَقَالِ *

Alternaria oleracea, Al. brassicae (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الملفوف وغيره من النباتات الزراعية والبرية كالفصل والشتور والخرقة والقريل ... مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سواء اللون ، حنطية الحالة ، صفراء اشكال تركب الاوراق الباقية الخارجية قطعها ويستمر اذاها على الملفوف المحفوظ || يكلف باستعمال سائل بورود الحليل ١٪ كما يحسن حفظ الملفوف



رَدْيَّةُ الْبُرْتَقَالِ



رَدْيَّةُ الْبُرْتَقَالِ



رَدْيَّةُ الْبُرْتَقَالِ



رَدْيَّةُ الْبُرْتَقَالِ (١)



رَدْيَّةُ الْبُرْتَقَالِ (٢)



رَدْيَّةُ الْبُرْتَقَالِ

١١٥٦٧ - زُرْع

Hygrometricité, Hygroscopicité (F). Hygrometry, Hygroscopicity (E).

قابلية الجسم الطبيعية لامتصاص الرطوبة وهي أيضاً نسبة الرطوبة للغرور استيعابها.

١١٥٦٨ - وَزْم، حَزْم

Botzage, Emballage (F). Tying up in bundles, Packing (E).

هو شد الشيء بعد جمعه وضمه. وهو تغليف الشيء بعد صفه بترتيب.

١١٥٦٩ - وَزْمَة، حُمْمَة، وَزِم

Botte (F). Bunch, Bundle (E).

ما حزم من البقل.

١١٥٧٠ - وَزْنَامَة زُرَاعِيَّة

هي التقويم الزراعي، اطله.

١١٥٧١ - وَزْنَة

Mare (F). Pool (E).

هي المستنقع الصغير مفيض الماء رقيقه. ج. زئان.

١١٥٧٢ - زُرْوَان

Chloridium (S).

جنس طحور مجهرية من الفطريات وفصيلة اللبنيات. مشبهه غزير المادة. جبره الكهنية مشبهه. كئالده مستطيلة أو كروية || أنوعه عديدة معظمها بيضاء تعيش على الاخشاب اليابسة ومنها طفيلية تركيب الأوراق. أمورها زروان الخرز.

١١٥٧٣ - زُرْوَان المَوْر

Chloridium musae (S).

طحور مجهرية يركب أوراق اللوز فيؤثم التسلل في يلائق الأمر يهش البقع الصغيرة المستديرة السوداء التي ثم يتكاثر وتنتشر الفطر كامل التسلل الذي يابل ويبيض. يتكاثر عند ظهوره بامتثال سائل يورجو المحيط من ٨٠ الى ١٥٠ ٪.

١١٥٧٤ - زُرْوَد

Rhysodes (S).

Rhysode (F). Rhysodes (E).

جنس حشرات من مفدمات الاجنحة وفصيلة الرزوديات. أنوعه المعروفة نحو ٣٠ مشتقة من مظهر اصباح اليلاد الحارة من المائلين القديم والجديد. تعيش في الغابات وفي البراري المظلمة. جميعها مفترسة || أجسامها مستطيلة اشكل وعبية الفصحات العليا، طول من ٨ الى ١٢ سم. رؤوسها صغيرة. منيها ثائرة، وقرنوا الاستشعارية ثلاثية مركبة من ١١ فصلة. قوائمها قصيرة. الحادها لاسفة، ضخمة، مقطوعة الاطراف. ألوانها خيائية الالوان تكثر فيها السمرة الكستنية والسمرة والجوية والسمرة الزرقونية.

١١٥٧٥ - زُرْوَدِيَّات

Rhysodidae (S).

Rhysodidae (F). Rhysodidae (E).

فصيلة حشرات من مفدمات الاجنحة. أجسامها وأنوعها المعروفة قليلة العدد اصنافها معظم مناطق اليلاد الحارة من المائلين القديم والجديد || جميع أجناسها مفترسة، صغيرة القد، ضلعية التأثير، قائمة الاطواب || أشهر أجناسها الرزود.

١١٥٧٦ - زُرْبَر

Rhexia (S).

Rhexe, Quadratea (F). Rhexia, Meadow beauty (E).

Rhede, Ankerblume (D). Ressa (I).

جنس نباتات عشبية ريشية من فصيلة الميكانيات. أنوعه

عديدة بعضها ترابي والآخر بري وسيلاني. سوقها متعصبة مريكة الفلوع. أوراقها متعاقبة قصيرة النعق، نصلها اطليسي الشكل، بارز الحروق، خلى البشرة. أنزاعها متكوني أو نووي التجميع، هامى الارتكاز. أنزاعها خالية البتلات، ألوانها من الاحمر الى الاخضر.

١١٥٧٧ - زُرْبَع

Hydrophile (S). Hydrophil (E).

الزريع والنف لله واحد. تمت تعريفه يطلق على النباتات الثمرة الى الماء وحل الاشياء التي تنصص للماء.

١١٥٧٨ - زُرْبِكَل

Rafial

عشرب، يرتكز على كلورات الصيدا، ينقص على جميع النباتات الضارة بما فيها النجيليات || يستعمل محلولاً ٢ ٪ بمعدل لتر ونصف اللتر المتر المربع الواحد.

١١٥٧٩ - زُرْن

Digitaria sanguinalis (S).

Digitaire sanguine (F).

نبات عشبي جلجوري بري معمر من الفطريات النجيليات. يكثر في الأتربة الرطبة والخروية. وهو مبلق في جميع البلاد الحارة والمعتدلة. يعتبر من النباتات الضارة الكثيرة الأذى.

١١٥٨٠ - زُرْس

Besa

ج. رفس.

١١٥٨١ - زُرْس

Mineral (F). Ore (E).

الزرس هو المعدن. ج. رفس.

١١٥٨٢ - زُرْسَة نَسَكِيَّة البَقْع

Rhizopagus bipustulatus (S).

Rhizopage bipunctatus, R. bipustulatus (F).

Rhizopagus bipustulatus (E).

حشرة وائمة وقائصة من فصيلة الرسائيات رؤية مفدمات الاجنحة. تألف الإحراج. غشائتها تموش على رصق الأتعار وظلمها. يرقاتها تموش في سراديب الحشرات الخاشية ساعية وادها لانتزاسها || جسمها صغير القد بطول من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى السوداء الفضي يعلو في مؤخر كل حمة بقية صغيرة حمراء. وأنها مستطلة الجسم. هيئتها صغريتان. زوانها غشيان، صفيا الاطراف. ظهرها مقطوع الطرف الاثلاث. اوساغها خماسية الغفل متد الاثلاث دهايتها في الزوج الخلفي عند الذكور || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الحشرة الجذابة في اوبال الربيع وتموش حتى اوبال الصيف. تسرح في الغبار. تساقط بعد ظهورها بأسبوعين. تمتع المكان تحت الفشور وبنيها || البقرة عند بلوغها الإدراك أقام طول نحو ٦ م. جسمها شبه مدرفي الشكل، سداسي الرواجب، الخبز، جسم الفواصل والرأس وطرف الشعر || طول الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينتهي في آخر نفق ويته الفرقة ضمن صليبة خائفة الفشور المركب النفايا الخشبية والقضوية المسجورة بالريال.

١١٥٨٣ - زُرْسَائِيَّات

Rhizophagidae (S).

Rhizophagidae (F). Rhizophagidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقائصة من غشيات الاجنحة. أجناسها وأنوعها المعروفة قليلة العدد مشتقة من معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تعيش على الأتعار وتحت ماء الانجار. يرقاتها قاتصة تسمى وراه البطرشيئات ||



زور



زورب



زورس



زرسَة نَسَكِيَّة البَقْع

القوم. أنواعها المعروفة عديدة معظمها من اسماك بحار البلاد المعتدلة الحرارة. مسرحها اساطيل الاقواط والمجاذع و اجسامها شبه اهلبيجية الشكل ، مبططة الجرم ، تطول من ٤٠ الى ٧٠ سم. زعانفها الظهرية والبطنية منفصلة لا تتصل بالذيلية. اثنائها تخطف مع الانواع لكنها لا تخطف من الرقعة. لحومها جيدة الصنف ، مستحبة الطعم. اشهر انواعها وأعزها الثلاثة التالية :

١١٥٨٩ - رُسَامَة مَسْكَايَة *

Platessa cynoglossus (S). *Pile cynoglossae* (F).
Cynoglossum plaice (E).

سمكة من الرغاف. اساطنها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. مسرحها اساطيل الاقواط و اجسامها مثالي الشكل ، قريب الشبه بلسان الكلب ، يطول نحو ٥٠ سم. ثوبها الى الزبد الحطية تعلوها رقعة مفسوخة التوزيع تتخللها بقع قاتمة. لحومها فاخر الصنف.

١١٥٩٠ - رُسَامَة شَالِيَة *

Platessa vulgaris, *Pleuronectes platessa* (S).
Pile franche, *Carrelet* (F). *Common plaice* (E).

سمكة من الرغاف. اساطنها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال. مسرحها اساطيل الاقواط والكتاف و اجسامها شبه اهلبيجي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٧٠ سم. صيانتها على الصلصة البني. ثوبها في الصلصة البني الى الخضار الخشن المواج يعطو تجميع اسمر وتبيح يرتقالي. صفحاتها اليسرى الى السفل تراوح من الزبدية الغبراء الى الخشن الاخر المواج. وتتميز بصف من الثوب الصغيرة يمتد من العينين الى الزعنفة الصدرية. لحومها جيد الصنف ، مغروبو فيه.

١١٥٩١ - رُسَامَة صَغِيرَة الرَأْس *

Platessa microcephala (S). *Pile microcephale* (F).
Microcephalus plaice (E).

سمكة من الرغاف. اساطنها المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. مسرحها اساطيل الاقواط والمجاذع و اجسامها شبه اهلبيجي الشوزن ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٤٠ سم. تتميز بصغر الرأس. ثوبها الى الخضار الخشن الاسمر المواج تعلوه رقعة يبراه لاسفوخة التوزيع. لحومها جيدة الصنف ، مغروبو فيه.

١١٥٩٢ - رُسَامَات *

Attacidae, *Saturnidae* (S). *Attacidae*, *Saturnidae* (E).
نفسية حشرات من سرشيات الاجنحة. اجناسها المعروفة نحو ١٠٠ وانواعها نحو ١٢٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم. اجسامها كبيرة القند او موشوخة. اثنائها متباينة الالوان الجسدية. قرونها الاستعمارية مغطاة مزجوجة عند الذكور ، صفة عند الاناث. ملامسها الفكية قصيرة وبراشفها كذلك. عينها بسيطة. قوائمها الامية عادمة الغالب. ارباع ذكروها وسيدة الملقلة. يرقاقها خاضعة، جرداء القشار ، زياء الحسام المستطيلة الملب. دباط خادراتها شرجي السلك تتدل به.

١١٥٩٣ - رُسَامَة الإِجْصَاح *

Grand paon de nuit (F). رابع ابر الوشي الليلي.

١١٥٩٤ - رُسَامَة *

Croquis (F). First sketch (E).

هي الرسم الاعدادي.

اجسامها صغيرة القند ، مستطيلة الشكل ، مستعرضة القروين. قرونها الاستعمارية صغيرة مركبة من ١١ فصلة. كليلها واغدادها مستطيلة. جرانها نشطة. ارباعها خضية المقل عند الاناث ، رديعتها في الزوج الخلفي عند الذكور. اشهر اجناسها الرسامة.

١١٥٨٨ - رُسَامَس *

Rhizostoma (S).
Rhizostoma (F). *Rhizostoma* (E).
جنس حيوانات بحرية من قراصات البحر الموصيات في علم الرساسيات. انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم. جميعها كبيرة القند ، فكية التركيب ، قلنسوة الملقلة الشفوية ، عادة الالاف الحيارية. ملاحظها الفكية رباعية الازواج ، وقنية الشكل ، محمية الاطراف. تتوهم على سطح الماء. اثنائها تترالج بين الابيض والاسمر والاروق. اعداب شففتها شاذكة تلهم الجله ان لاسه. بينها انواع تغلف برشاش ناضط يلدح كثرار النار.

اشهر انواعها :

Rhizostoma cuvieri (S) رُسَامَة الاطلس
Rhizostoma pulmo (S) رُسَامَة المتوسط

١١٥٨٥ - رُسَامَسِيَّات *

Rhizostomidae (S). *Rhizostomidae* (F). *Rhizostomidae* (E).
فصيلة مدوس من قراصات البحر. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم. اشهر اجناسها الراس.

١١٥٨٦ - رُسَام *

Heptanchus (S). *Heptanchus* (F). *Heptanchus* (E).
جنس اسماك بحرية سرلوة مفترسة من فصيلة الجلوليات وثية الاثلاق. انواعها المعروفة ثلاثة اساطنها بحار البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها كبيرة القند. قريية الفكية بقرقوش. اجسامها وشية. رؤوسها شبه مغروطة الشكل. افواهها سفلية الارتكاز ، متاخرة من المقاطع. اصكامها الخيشوية فلوج سباحة الازواج. اشهر انواعها الرسامة السراء.

١١٥٨٧ - رُسَامَة سَمَرَة *

Heptanchus cinereus (S).
Heptanche cendré, *H. gris*, *Cendré*, *Mouge gris*, *Parion* (F). *Gray Heptanchus* (E).

سمكة بحرية سرلوة مفترسة من الرساج. اساطنها معظم اقطاع البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من الاسماك البنية. مسرحها الاقواط والمجاذع. اغذلتها شرسة لكنها تبته عن الانسان. جميعها رشي الشكل يطول من ٣٠٠ الى ٣٥٠ سم. سمكها متوسط الخشونة ، قليل الثوب المبيضة. ثوبها الى الزبدية تعلوه مابة زرقاء مع اقترابه من ثوب الظهور ويغير ويغير عند الجبل. رأسها مغروطة الشكل. لها سفلى الارتكاز. شففتها معدلة الانفراج. اسناتها كبيرة ، ذرية. عيناها مستديرتان. نافثرتان. فوطها الجفني يحتل مركز الزعنفة الخشوية. تصاد من ابل سمكها وزيتها واسناتها. لحومها كامن الصنف.

١١٥٨٨ - رُسَام *

Platessa (S). *Pile* (F). *Plaice* (E).
جنس اسماك بحرية يبرضة من الملساوات وفصيلة جانبيات



رُسَام



رُسَامَة مَرَاه



رُسَامَة ثَامَة

وفصلة الرسات. انواعها المعروفة قليلة البعد اصطلحا معظم بحار العالم. معظم انواعها يعيش على القيع ويقسم الآخر على الحث الاخر || اصطلحا صغيرة لاجل شكله الذي يختلف مع النوع. معطها بين القواعد ، خاصي الدورة الحلقوية اوسباحتها .

١١٦٠١ - رستومة الغلب

Proctemma guttula (F). *Proctemma des bois* (F).
حشرة خاضعة من فصيلة البتيديات ودية مخلفات الاجنحة. جسمها شبه المثلثي الشكل بطول نحو ١٢ مم. || رأسها صغير ، أزرق اللون. غطها معتل القه ، طليق ، ميتا صغيرتان ، تلتزتان ، زباناها دقيقان ، مستطيلان . كوسلها أزرق اللون ، غلي الحلب الدقيق . حجبها صغيرة ، سوداء . حجبها صغيرةتان . ظهورها لينة ، أحر اللون تملو رقعة بيضاء ومبراة . يلبها الى اسف السراء المراج . قوامها حر ، كثيفة الحلب || تألف الثابات . مرتتها الاشباب البيرة .



رسان لريق

١١٦٠٢ - رستيل

Aristella (S). *Aristella* (F).
بسات حشبي يري رموي حولي من التجليات يكثر بين الزروع وفي الارض المصاة .

١١٦٠٣ - رستم

Paturon (F). *Pastorn* (E).
جزء قائمة الفرس بين الحطب والأفرة .

١١٦٠٤ - رستم

Taras (F). *Tarus* (E).
جزء من رطل الحمار والحشرة يقع بين اساق والغالب .

١١٦٠٥ - رستكس

Rascasse blanche (F).
سمكة بحرية كدس كروب احسن ، اطبا .

١١٦٠٦ - رستكس احمر

Rascasse rouge (F).
سمكة بحرية تدعى جلاع ربي ، اطبا .

١١٦٠٧ - رستكس اسمر

Rascasse brune (F).
سمكة بحرية تدعى جلاع ميري ، اطبا .

١١٦٠٨ - رشم ورموش

Hormones
مواد عضوية قشرها يفس اعضاء الجسم الحيواني فتقشر في سائر الاضداد التي تنتقل اليها بواسطة الدم || وهي في النباتات مواد عضوية تقشر في قشور البقول والشمري . والرسول هو الحلب ، اطبا .

١١٦٠٩ - رشم

Lever d'un plan (F).
To make a plan (E).
وضع غطط الشيء .

١١٦١٠ - رشم

Droit (F). *Right* (E).
نقطة تحديدية تطلق بالمسئ المال في المرافق غير المباشرة أو غير للفرقة . وهي تستعمل في صيغ عديدة لأخصها :

Droit de licence رسم الاجازة
Droit de coponacation رسم الاستاذ
Droit de posta رسم البريد
Droit de transmission رسم التوصيل
Droit de transcription رسم التسجيل
Droit d'enregistrement رسم التقييد
Droit de douane رسم الجمر



رشم

١١٥٩٥ - رسان ، افشور

Ophurus (S). *Ophurus* (F). *Ophurus* (E).

جنس اسماك بحرية يوزع من مفتحات المئات وفصلة الرساتيات. انواعها المعروفة خمسة ، اصطلحا بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة منها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والمحيط الهادي || جميعها انقلبية الشكل ، مستطيلة الجسم المحيط . جلودها عادية السه . رؤوسها اسطوانية . اعظامها ذقة . اخدائها كبيرة . اسنانها كثيرة البعد ، صغيرة الحجم ، ذرية || احرف انولها واشهرها رسان البرق .

١١٥٩٦ - رسان البرق ، بيركيل البحر

Ophurus serpens (S). *Ophurus serpens* (F). *Ophurus serpens* (E).

سمكة بحرية يوزع من الرسان . اصطلحا البحر الابيض المتوسط . تكثر من اسماك المهادس والثقات الجيدة القور || جسمها ضيق مستطيل يبدو كأنه انبوي الشكل . طولها من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . جلدها ملس البشرة ، حاد السه . فوها ثنائي اللون ، ظهرها وبناتها الى الصفرة المظلمة يعلوها موج حشلي ، يلبها الى البياض الفضي التني الموج . رأسها اميق غضاباً من ظهرها وتتقل بالاسود وهو اسفني الشكل ، ذلق اسفل المقرن الحاد . زعنفتها الصدرية صغيرة ، شائعة ، مقدافية الشكل ، وها زعنفتان بني ورمي . الزعنفة الظهرية خط شديد السرة ، قليل المرض الذي لا يتجاوز ٥ م . يمتد من اوائل الظهر الى طرف الذنب . يقابله خط مائل طوي وعرضاً وضباباً . يدهي الزعنفة الشرجية ، يمتد من قاعدة المق الى طرف الذنب . اما الزعنفتان الحوضية والذيلية فلا وجود لها || جلدها كامن الصفت قل من يرغب فيه .

١١٥٩٧ - رسانيات

Ophuridae (S). *Ophuridae* (F). *Ophuridae* (E).

فصيلة اسماك بحرية يوزع من القطبوات مفتحات المئات . انواعها المعروفة عشرة تجتمع الى جنسين الرسان والشليل || اصطلحا بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . معطها من اسماك الحجاج . سرسها الثقات الجيدة القور || اجسامها مستطيلة مسقوفة . جلودها مائلة ، عادية السه . رؤوسها اسطوانية . ذلقها ذقة مستطيلة . زعنفتها الظهرية والشرجية قليلة العرض تمتد حتى اطراف الذنب . زعنفتها الحوضية والذيلية متصلة || لحومها غسولة الصفت أو كاضعة قل من يرغب فيها .

١١٥٩٨ - راسب

Sédiment (F). *Sediment, Deposit* (E).

الرسب هكر السوائل واغلاما عندما تستقر في القاع .

١١٥٩٩ - رسة

Arum arizarum, *Arizarum vulgare* (S). *Gouté à capuchon* (F). *Friar's cow* (E). *Kappenzahrwurz*, *Kohlschwarz* (D). *Arizzaro*, *Gilico* (I).

نبات عشبي ثديي مفر من سبط الرسيات وفصلة القلقاسيات . يسلته صفولية بيضة الشكل . اوراقه سنالية وشرناه اوسوي الحول يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم .

١١٦٠٠ - رسة

Rissois (S). *Rissois* (F). *Rissois* (E).

جلس سوزانات بحرية من الرضويات مغليات الاربل

Rissolidae (S). ١١٦١٩ - رُسَيْتَات

Rissolidés (F). Rissolidae (E).
 فصيلة ديديات بحرية من الرنغويات مديات الرجل
 أماميات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد
 مبرزة في منظر بحار المال || أصدافها صغيرة اللد ، بطيئة ،
 تمش على النيتوت البحرية أحصاهم الخليات || اعرف
 اجناسها وأشهرها الرسة .

Epigone (F). Epigone (E). ١١٦٢٠ - رُسَيْسَكَة

الرسيعة مذادة الاجنية عند الطالب والكدييات .

Sipunculus (S). Siponice (F). ١١٦٢١ - رُسَيْع

جنس ديدان بحرية من فصيلة الرسييات . انواعها المعروفة
 عديدة منتشرة في منظر بحار العالم . اجسامها شبه اسطوانية
 الشكل تطول من ٨ الى ٢٥ سم . وهي سرعة عادمة السمك
 والمناخس . افواهها مستطيلة ، مخروطية ، جمحة ||
 اعرف انواعها وأشهرها الرسيح الامشط .

١١٦٢٢ - رُسَيْعُ امْطَط

Sipunculus nudus (S). Siponice nu (F).
 نوع من الرسيح . يعيش في جميع بحار البلاد المتحدة الحرارة .
 يتكرر وجوده في البسر الابيض المنحط . طوله نحو ١٦ سم .
 ثوبه الى الشقشة السمراء الموج .

Sipunculidae (S). ١١٦٢٣ - رُسَيْعِيَّات

Sipunculidés (F). Sipunculidae (E).
 فصيلة ديدان بحرية من الجفريات . اجناسها وأنواعها
 عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اشهر اجناسها الرسيح .

Métacarse (F). Metatarsus (E). ١١٦٢٤ - رُسَيْع

هو في الحشرات فصلة الرسع الاول .

Esquisse (F). ١١٦٢٥ - رُسَيْمَة

Sketch, Rough (E).
 الرسمة الرسم الاعدادي او التخطيط الاعدادي او المسودة .

١١٦٢٦ - رُسَيْعُ

Bassinage (F). Sprinkling (E).
 هو الاسقاء بالرشاد كما بالرشة .

Faon (F). Fawn (E). ١١٦٢٧ - رَشَاء ، رَشَاء

ولد الطيئة الذي قد تحرك ويش . ج ارشاء .

١١٦٢٨ - رَشَاء

Tige rampante des cucurbitacées (F). Creeping
 stem of cucurbitaceous (E).
 حبل اي ساق نباتات الفصيلة القرعية . ج أرشية . يقال
 أرشية البطيخ والتملين والحنتل .

١١٦٢٩ - رَشَاء

الرشاء مجموعة كواكب كثيرة صغار من برج الحوت .
 وهي على صورة السمكة يقال لها بطن الحوت . وفي سرها
 كوكب نير يدعى عقد الحليتين ينزل القمر آخر ليلة
 من الشهر .

Droit de tonnage
 رسم الخرج
 Droit de sortie
 رسم الخروج
 Droit d'entrée
 رسم الدخول
 Droit d'octroi
 رسم الدخولة
 Droit de timbre
 رسم النسخة
 Droit de quai
 رسم الرصيف
 Droit de garantie
 رسم الضمان
 Droit de navigation
 رسم الملاحة
 Droit ad valorem
 رسم بحسب السعر
 Droit gradué
 رسم تدريجي
 Droit progressif
 رسم تصاعدي
 Droit fixe
 رسم ثابت
 Droit de passeport
 رسم جواز السفر
 Droit au comptant
 رسم فوري
 Droit constaté
 رسم محقق
 Droit proportionnel
 رسم نسبي
 Droit de croisement
 رسم نقل البضائع
 Droit de mutation
 رسم نقل الملكية



رسمور تدريجي

١١٦١١ - رَسْمُور

Eristura (S).
 Eristura (F). Eristura (E).
 جنس طير من كليات القدم وفصيلة البليات . انواعه
 المعروفة ستة . جميعها مستطيلة الجسم ، مخروطية الذنب
 المتحد الحنج ، قصبة السبق والمقتاد المستدير الطرف .
 شكلها بين الناق والفاص . اثوابها متباينة الالوان المزينة
 والبيجة || اعرف انواعه وأشهرها الرسمور التدريجي .

١١٦١٢ - رَسْمُورُ كُدُرْجِي

Eristura leucocephala (S).
 Eristura leucocephala, Canard faisan,
 C. culvris (F). Pintail duck (E).

نوع من الرسمور . اطنايه تمتد من اواسط القارة الاسيوية
 الى اطراف اوروبية اجنوبية والشرقية يحوي بجزائرها وانهارها
 كل سنة في شعابه وايابه المصيف والمشتي || جسمه كبير
 اللد . ثوبه الى الصبغة الصفراء المجلعة بالاسود والاشفق
 والافير . رأسه مستدل الجرم ، ابيض اللون تطوي بقجة
 سوداء . متفاده حنطي اللون ، اسود القاطعة . ورجلاه الى
 الصفار الزيتي || الانثى تبيض من ٨ الى ١٥ بيضات
 تحضنها نحو اربعة اسابيع بينا الذكر يؤمن لها الغذاء .



رسيح امشط

١١٦١٣ - رَسْمَكَة

هي التائيل ، راجحه .

١١٦١٤ - رَسُو

هو الأوطى ، راجحه .

١١٦١٥ - رُسُوْبِي

Sédimentaire (F). Sedimentary (E).

نمت تعريف يطلق على ما هو مركب من رسوب .

١١٦١٦ - رُسُوْبِيَّة

Stoicism (F). Stoicism (E).
 الرسوبية او فلسفة زينون ، مذهب فلسفي يقول بنبات
 الجنان وبشدّة الخلق والعزم .

١١٦١٧ - رَسُوْلُ الْفَيْث

هو الزفران ، اطليه .

١١٦١٨ - رُسَيْتَات

Arées (F).
 سبط من فصيلة القلقاسيات ، اشهر اجناسه الرسة .

١١٦٣٠ - رَشَاءٌ

قيل فيها : هجرة لسمو فوق القامة ورفها كورق المروح ولا ثمرة لها ولا يأكلها شيء . وقيل أيضاً : حشبة تشبه الزنبرة وهي مثل الجبهة ولها قضبان كثيرة البقد وهي مرة جداً شديدة الخضرة لزجة تبت بالقيام منسطة على الأرض ورفها لطيفة معدة والناس يطبخونها وهي غير بقلة تبت بنبج . ج رشأ ورشأ .

١١٦٣١ - رَشَاحٌ

مادة فعالة توجد في بعض النباتات الطبية ، استعملها بسبب بعض الافراتازات المائلة من مرقعة او مدرة البول او مسهلة .

١١٦٣٢ - رَشَادٌ * ، حَرْفٌ

Lepidium sativum, Nasturtium (S). Cresson alénois, Passerage cultivé, Nasitor, Cressonnette (F). Gartenkresse, Tongue-grass (E). Gartenkresse, Kresse (D). Carconallo, Crescione, Agresto (I). بقلة حولية من فصيلة الصليبيات . اورائها حريفة مأكولة لا تخلو من الفوائد الصحية ، ترطب في الأتربة القليلة والمتوسطة الاندماج الممكن سقايتها كلما دعت الحاجة .

١١٦٣٣ - رَشَادُ الْبَحْرِ

هو الفصيلة ، اطليا .

١١٦٣٤ - رَشَادُ بَرْيٍ ، رَشَاءٌ

هو حرف الماء ، اطليه .

١١٦٣٥ - رَشَاشٌ ، مَطْفَرَةٌ

Jet d'eau (F). Waterspout (E). ثقب أو جهاز يطر من الماء .

١١٦٣٦ - رَشَاشَةٌ *

Aspergillum (S). Aspergille, Arrosoir (F). Aspergillum (E). جلس حوليات بحرية من الرضويات فضيحية التلماشيم وفصيلة المتشويات || أنواعها القادرة المتحصرة قويس في بيضان الطبقة التالية . اما الانواع الماصرة فأصلها بحار البلاد الحارة . تعيش في رمال الشواطئ المتصورة بالماء وتنفور فيها محوياً ضمن البروب كلسي المادة ينتهي بفشاء مستدير الشكل حديد الثوب الفتيقة كضروب المرثة .

١١٦٣٧ - رَشَائِكَةٌ *

Hydrocyon (S). سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من ملتصقات الثلاثة فضيلة المرقنات . موطنها الأبحار الاثريفة انحصا النيل والقيصر . طولها يراوح من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ظهورها اخضر اللون . بطنها وجزواها فضية . لحمها لذيق الطعم . لكنها كثيرة السمك .

١١٦٣٨ - رَشَيشَةٌ

Coque de la noix de coco (F). Shell of cocco-nut (E). قشرة الترابيل افرغت من لبها ويذوق بها .

١١٦٣٩ - رَشِشٌ ، مَصْلُوبٌ ، تَشْرُفٌ ، لَشْفٌ ، لَشْجٌ ، رَشَلٌ

Suintement (F). Oozing, Sweating (E). هو الماء ينضخ بقله من الجوامع الجامع .

١١٦٤٠ - رَشْدِيَّةٌ

هي القلقبان ، اطليه .

١١٦٤١ - رَشَكٌ

Bélier (F). الرشك دويبة من العقارب تدعى عقرب اكه . اطليه .

١١٦٤٢ - رَشَمٌ

اطل ما يظهر من اللبت .

١١٦٤٣ - رَشُونَةٌ *

Commensalisme (F). Commensalism (E). حالة العلاقات الحية التي تعيش وتتغذى مع غيرها .

١١٦٤٤ - رَشِيجٌ *

Actinolema (S). Actinoleme (F). جنس اشباح حولية برية من فصيلة الهيميات . انواعه المعروفة قليلة العدد منها بعض اصقاع الشرق الاذل || سطها فرام تملو من ٤٥ الى ٧٥ سم . اورائها متعاقبة . السفلى شاذية التصال عادة للستين . العليا ريشية الشكل ، ثلاثية الانثاب . ازهارها سبواني التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها صغيرة اللد لها الى الصغار الباحت .

١١٦٤٥ - رَشِيكَةٌ

هي الابرية ، اطليا .

١١٦٤٦ - رَشِمٌ

هو الجرشية ، اطليا .

١١٦٤٧ - رَشَمٌ ، رَشَمٌ ، رَشَمٌ

Damage (F). Ramming (E). رشم هو رص القرب او طيه وقد يتم بواسطة اللعالة او للساعة او المطبة .

١١٦٤٨ - رَشَمُ الْبِضَالِجِ

Arrimage (F). Stowage (E). ايداع البضائع وستلها في حبر السفينة .

١١٦٤٩ - رَشَادٌ *

Tityra (S). Tityra Bécarde (F). Tityra (E). جنس طير من الجوارم مليات التأثير وفصيلة القطنيات .

انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في مختلف مناطق امريكا الجنوبية . تألف الثبات ويقيم على قفز الاشجار تترصد الحشرات لاقتناصها || اجسامها ريشة تطلو من ٢٠ الى ٢٥ سم . اذواها مختلفة الالوان تكثر فيها النقطة والشمشة والسواد والياض . تتميز بمناظيرها الفضلية وبأذنانها المقعرة || قوتها الحشرات على اختلاف انواعها وبعض الثمار النعينة البرية .

١١٦٥٠ - رَصَاصٌ

Piomb (F). Lead (E). معدن متجانس اللون ، ثقيل الوزن ، شديد اللزوجة ، سريع التآكل في الهواء الرطب . رمزه (Pb) . قتله السوي ١١٦٣٥ ، وزنه الاتني ٢٠٦,٩١ ، ينصهر في ٣٢٤ °س . ويغل بعد الاحرار بين ١٦٠٠ و ١٨٠٠ °س . وهو لا يذوب سراً تقياً في الطبقة الانداز . عاماته الطبيعية عديدة الاشكال والقرا كبر تعرف بالمجالبة . اهم البلاد المنتجة لغامات الرلايات الفضة والمكسيك واستراليا وكندا || هو كثير الاستعمال الصناعي اما بجنس من اسلحه على الصمعة الملاء لانها سامة .

١١٦٥١ - رَصَاصِيَات

Plombaginaceae (S). Plombaginaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القتالة . انواعها المعروفة زهاء ٢٠٠ منها تلم وطولها بحار المناطق الحارة والمعتدلة . سطها عشبي وبعضها لني . اورائها متعاقبة . ازهارها سبلي التجميع ، علمي الارتكاز .



رشد



رشد



رشد



رشد

١١٦٦٢ - رُصَامَة، وَحَاف Banc (F).

ج ارضقة ووصف . Bench, Layer bed (E).

١١٦٦٣ - رُصَامَة

هو الحبار من القرد المقدسة ، اطلبه .

١١٦٦٤ - رُصَامَات Semnophthecidae (S).

Semnophthecidae (F). Semnophthecidae (E).

هي الحباريات فصيلة قرد من سفليات التخرن تشمل اربعة اجناس: الحبار والحور والزيك والقطررب .

١١٦٦٥ - رُصَامَة، كَدَه Talure (F). Graze (E).

حوراض آلية تحل بالاجبار في هياكلها الخشبية تقسب حسب اللحاء وتصينه .

١١٦٦٦ - رُصَامَة Consentement (F). Consent (E).

هو احزاب المرء من قبوله الارتباط مع غيره بقصد قانوني طوعاً واختياراً || وهو ايضاً احزاب المرء من الموافقة على حل الغير سواء كانت هذه الموافقة منطقياً بما ام مسكوتاً عنها .

١١٦٦٧ - رُصَامَة قطع الثلج والبرد .

١١٦٦٨ - رُصَامَة، اِرْصَاع Allaitement (F).

Nursing, Suckling (E).
التغذية بالحليب من الولادة الى النظام .

١١٦٦٩ - رُصَامَة Biberon (F). Bottle (E).

قنينة أو جهاز غاص صديد الثلمات وضع لارضاع ارباد الحيوانات عند تلمد الرضاع الطبيعي .

١١٦٧٠ - رُصَامَة البُكَر هي أم الحيات ، اطلبها .

١١٦٧١ - رُصَامَة، مَنَارَة، عَمَارَة، فُتَاح، زُرْبَعَة Emblavement, Emblavure (F). Wheat-sowing (E).

هو الحقل الذي كُرب وسمد وبلر وأثير أي دفن بذر .

١١٦٧٢ - رُصَامَة Acronychia (S).

Acronychie (F).

جنس شجيرات ونباتات برية وصربية من فصيلة السذابيات. انواعها المعروفة قليلة العدد ، منظرها لطيف . مهدها يتد من الهند الى ماليزية وأستراليا || سورها فراه . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، شبه بيضبة الشكل ، جلدية النصال . ازهارها خضراء ، قصيرة التويجات ، رباعية التركيب . مبيضها رباعي الفصوص . ثمارها صغيرة ، جلدية السقذ ، لا تكفل .

أعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

١١٦٧٣ - رُصَامَة رَائِصِيَّة Acronychia resinosa (S).

Acronychie résineuse (F). مهدها الهند حيث يستعملون جنورها دلماً في معالجة داء المفاصل .

١١٦٧٤ - رُصَامَة عَطْرَة Acronychia odorata (S).

Acronychie odorante (F). مهدها الكوششن حيث يستعملون براعمها كإدام .

١١٦٧٥ - رُصَامِيَّة، حَنَظِيَّة الأَسْطَن Plumbago (S).

Plombagine, Dentaire (F). Leadwort (E).

جنس نباتات عشبية ليلية برية طيبة من فصيلة الرصاصيات. انواعها عديدة تألفت البسوط البحرية . سورها فراه . اوراقها متعاقبة لمطوية صغيرة القد . ازهارها رصاصية اللون . تربتها وسيد التلال وأقل الخليلي . بتلها خماسية الفلق . اشدتها ومثلها وبساورع كمارها خماسية للتركيب . اشهر انواعها واعرفها ما يلي .

١١٦٧٥ - رُصَامِيَّة أُرُوبِيَّة Plumbago europaea (S).

Dentaire d'Europe, Malherbe (F). Toothwort, European leadwort (E). Europäische bleiwort (D). Dentalaria, Lappoline (I). بجلة معمرة ، تلم من ٣ الى ١٢٠ سم . فروصها مضلعة ، اوراقها معتقة ، اذنية . نصلها جامد للصبح ، مسن الحلة ، عايق الخضار . ازهارها مستقيمة لونها الى اليتلجي . ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

١١٦٧٤ - رُصَامِيَّة الرُوس Plumbago capensis (S).

Dentaire du Cap (F). بجلة معمرة تلم من المتر الى المترين . سورها ليلية سرعية سرعية اللحاء . فروصها متعقبة . اوراقها لمطوية ، نصلها سوري الصفعة السفل . ازهارها صغيرة لند لونها الى الزرق الباهت || ازهارها يستمر في الصيف والخريف .

١١٦٧٥ - رُصَامِيَّة زُرْهَة Plumbago corulea (S).

Dentaire bleue (F). Blue leadwort (E). بجلة معمرة ، تلم نحو المتر . فروصها معتقة . اوراقها ضيقة ، ذلقة . ازهارها خضراء ، لنية ، كلفة التجميع ، زرقاء اللون || ازهارها صبي .

١١٦٧٦ - رُصَامِيَّة صَغِيرَة الزُّهْر Plumbago micrantha (S).

Dentaire à petites fleurs (F). عشبة سولية تلم نحو ٦٠ سم . مهدها سيري . زردق لزين . ازهارها اربمانية صغيرة القد || ازهارها صبي .

١١٦٧٧ - رُصَامَة جَوِّي Observations météorologiques (F).

Meteorological observations (E). الرصد الجوي هو ضبط العوامل الجوية المختلفة أهمها الحرارة ، والضغط ، ولبس الرطوبة وكتبتا ، وقياس المطر ، واتجاه الرياح وصرتها ، ولبس الاضام والسدم الخ .

١١٦٧٨ - رُصَامَة Larves des abeilles (F).

Larva of bees (E). هو التحل في طوره البرقي الذي يتد من لقف المي الى نهاية الترق .

١١٦٧٩ - رُصَامَة

الرصع هو سداد الطائر (عن كراع) ويقال راصع الطائر لئله . سادها (التاج) || والرصع هو البلق ، اطلبه .

١١٦٨٠ - رُصَامَة نبات طبي يلى الحفرة ، راجمه .

١١٦٨١ - رُصَامَة Solde (F).

Balance (between debit and credit) (E). هو ما بقي من دين بعد حسم المبالغ المفضية .



رصاصية أوروبية



رصاصية

مسئلة الاطراف. انزهارها حشوي التجميع هجين القروع.
انزهارها حدية ، بيضاء اللون ، قرمزية الاطراف ||
تنويرها خريفي .

١١٦٨٢ - رُطَبٌ

رُطَبُ القنوة : كمرها . والرُطَبُ هو القنوة المروض .

١١٦٨٣ - رُطَبٌ

الرُطَبُ شجر قزمه الايل . الواحدة رُطَبَة (السان) .

١١٦٨٤ - رُطَبَةٌ ، دَاشِصَةٌ
Rothia (F).
Pazilla (E).
النظم للمدور المتشرك في رأس الرُطَبَة . ج. رُطَبُ و رُطَبَات .

١١٦٨٥ - رُطَبٌ ، كَرَبٌ ، زَرْعٌ
Emblaver (F).
To sow with wheat etc. (E).
حرث الرُطَبَة وبعدها وبعدها .

١١٦٨٦ - رُطَبَةٌ
Pierre non taillée (F).
Unperced stone (E).
هي الحجر المستخرج من القلغ قبل تقميمه . وهي الدبشة
المسالمة لبناء . ج. رُطَبُ و رُطَبُ .

١١٦٨٧ - رُطَبُوسٌ
Aramus (S).
Courlan, Courliri (F). Courlan (E).
جنس طير من طول الساق وعضلة انفعلقات . انواعه
المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها
متوسطة القدر ريشة القوائم ضاربة لمخالفات الجالسة المستطيلة .
الوانها متراكبة الالوان التي تتراوح من الاصهب الصباني
الى الخفي الاصفر يلمع زيتوني واورق . ومنها
حور الاحداق . متاقبها الى الصدر الاخضر المواجه
اراسها جذوية || قبتها الحشرات والمصانير الصغيرة
ويضيها ويزور النباتات النجيلية .

١١٦٨٨ - رُطَبٌ
Constipation
هو الاسساك عارض سببه اختلال في الجهاز الهضمي .

١١٦٨٩ - رُطَبَةٌ ، لُكَّةٌ سَوْدَاةٌ
Centrolophus niger (S). Centrolophus niger (F).
Centrolophus niger (E).
سكة بحرية يروض من الاسقمريات شائكات الزمانف .
اصطادها معظم العالم البحر الايطالي المحيط وبعض مناطق
البحر الاطلسي || جسمها وشي الشكل يطل من ٣٠ الى ٦٠ سم.
حراشها صغيرة مبيضة . ثوبها الى الخضار
الالامس الزيتي المواجه ، يمتد فتحت سمرة في الظهر وتقل
في البطن . راسها مستد الجرم ، مستفص الارتكاز ،
قصير الخطم المستعير . عينها كبرتان جاسفتان زعنفتان
الظهورية مستطيلة قاطبة عمدة . زعنفتان اثريشة مستطيلة
قليلة العرض . زعنفتان الذيلية ذائقة || لحمها مأكول يراوح
بين الجيد والوسط .

١١٦٩٠ - رُطَبٌ
Dattes mûres (F).
Mature dates (E).
نضج البسر قبل ان يضر . الواحدة رُطَبَة . ج. اُطْلَاب
ورطاب .

١١٦٩١ - رُطَبَةٌ
هي القصة وهي نقل الروج . اطلها .

١١٦٩٥ - رُضَامَةٌ غَارِيَّةُ الْوَرَقِ

Acronychia laurifolia (S).
Acronychia à feuilles de laurier (F).
مهدا جايا . لحاء جلوعها مرة المذاق ، حارة ، تستعمل
في معالجة الاسهال والجذام .

١١٦٩٦ - رُضَامَةٌ
Echeveria (S).
Echéverie (F). Echeveria (E).
جنس نبات عشبية معمرة من فصيلة الخلدات .
اوراقها ضيقة التجميع تنوعها الشاربغ الزهرية . انزهارها
خاسية البيلات النافذة الاكثار || قزوع القرن ضمن
البوت وفي الحدائق .

١١٦٩٧ - رُضَامَةٌ بَهِيَّةٌ
Echeveria fulgens (S).
Echavéria écastante (F).
نوع من الرُضَامَة . مهدا بعض اقاليم امريكا الوسطى
والمكسيك . شراخها يرتفع من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها
ضيقة التجميع تطل نحو ١٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ سم .
نصالحا بحرية الخضار ، متواجبة الحمار . انزهارها حشوي
التجميع . انزهارها صفر القواعد وازام الاول ، مرجانية
لامعة في البقي || تنويرها يستمر من تشرين الثاني الى
نيسان .

١١٦٩٨ - رُضَامَةٌ جَبَّارَةٌ
Echeveria gigantea (S). Echéverie géante (F).
نوع من الرُضَامَة . مهدا المكسيك . شراخها يرتفع نحو
٢٠٠ سم . اوراقها سانية الشكل تطل نحو ٢٠ الى ٢٥ سم .
وتعرض من ١٢ الى ١٥ سم . نصالحا بحرية الخضار ،
خلية البشر . انزهارها عقودي التجميع . انزهارها عاجية
اللون مرققة بالاصفر || تنويرها خريفي .

١١٦٩٩ - رُضَامَةٌ حَالِدَةٌ
Echeveria secunda (S). Echéverie unilatérale (F).
نوع من الرُضَامَة . مهدا امريكا الجنوبية . شراخها يرتفع
نحو ٣٠ سم . اوراقها اسطوانية الشكل تطل نحو ٤ سم .
وتعرض نحو ٢ سم . انزهارها عقودي التجميع ، حادة
الارتكاز ، مقوس الشكل . انزهارها متحدة الحجم ، لونها
الصفرة الحمر المواجه || تنويرها يستمر من نيسان
الى ايار .

١١٦٩٠ - رُضَامَةٌ قَرْمِزِيَّةٌ
Echeveria coccinea (S). Echéverie écarlate (F).
نوع من الرُضَامَة . مهدا المكسيك . شراخها يرتفع من
٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها مسطوية الشكل ، خلية التصل ،
ضيقة التجميع ، تطل نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٣ سم .
انزهارها عقودي . بيلات انزهارها قرمزية اللون من الخارج ،
صفراء اللون من الداخل ، قطرها نحو ٢ سم . || تنويرها
سيفي .

١١٦٩١ - رُضَامَةٌ مُعْدَبَةٌ الْأَزْهَارِ
Echeveria gibbiflora (S).
Echéverie à fleurs gibbeuses (F).
نوع من الرُضَامَة . مهدا بعض مناطق المكسيك . شراخها
يرتفع من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها تطل نحو ١٥ الى
٢٥ سم . وتعرض من ٧ الى ١٥ سم . نصالحا بحرية الخضار ،



رُطَبَة



رُطَبَة



رُطَبُوسٌ



رُطَبَةٌ

الزواحي. ازهرارها عقودي التجميع يرتكز عل زناد يرتفع نحو ٢٠ سم. ازهارها قرمزية اللون. قطر الزهرة يراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم. || تنويرها شعوي.

١١٧٠٢ - رَطْبِيَّةٌ مُبْجَعَةٌ ٥

Gasteria maculata (S). *Gastérie tachetée* (F).
نوع من الرطبة. ساقها قصيرة ترتفع من ١٢ الى ١٧ سم. اوراقها لحمية، مشققة، متصببة، تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ سم. نصلها غويوب الصفرة العليا، بتفصيلي اللون يملو تبيج ابيض. ازهرارها عقودي التجميع يرتكز عل زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها مرجانية اللون. قطر الزهرة يراوح من ٢ الى ٣ سم. || تنويرها شعوي.

١١٧٠٣ - رَطْبِيَّةٌ مُثَلَّثَةٌ ٥

Gasteria verrucosa (S). *Gastérie verruqueuse* (F).
نوع من الرطبة. ساقها مقرة. اوراقها لحمية ثنائية الصف. تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١ سم. نصلها مثالي البشرة على الصفيحتين العليا والسفلى. لون الاوراق الى الخضار اللقائم والتأليل الى البياض الاخضر. ازهرارها عقودي التجميع يرتكز عل زناد يرتفع نحو ٢٥ سم. ازهارها بياض الانتشاب والزام الاذن والثاني، وريدة الزام الثالث، خضر الزام الرابع. قطر الزهرة يراوح من ٢ الى ٣ سم. || تنويرها شعوي.

١١٧٠٤ - رَعَادَة هـ الحبارى الاروية، اطلها.

١١٧٠٥ - رَعَادَات
Tropedidae (S). *Torpédidés, Torpédinidés* (F). *Torpédidae* (E).
فصيلة اسماك من رتبة الاشلاق، اجناسها واوراقها عديدة اشهرها الرعادة.

١١٧٠٦ - رَعَادَة ٥
Torpedo (S). *Torpille* (F). *Torpedo* (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الرعادات، اوارها عديدة تكثر في بحار البلاد الحارة جميعها مكهنة. اذا مسها الانسان خدرت يده وعنده حتى يرتد ما دام السمك حيا.

١١٧٠٧ - رَعَادَة الثيل هي فترة الليل، اطلها.

١١٧٠٨ - رَعَادَة مَبْدُولَة ٥

Torpedo marmorata (S). *Torpille commune, T. marbrée* (F). *Cramp-fish, Numb-fish* (E).
سمكة بحرية سرلو مفرسة من فصيلة الرعادات وريدة الاشلاق. اصلاها البحر الابيض المتوسط وبعض اقلام المحيط الاطلسي وبحر الشمال. تعتبر من اسماك البجاج. مسرعاها اسماك الثنائ. تتميز بجهاز حشلي خاص يتألف من الرأس من الجانبين واوراء مركب من مئات الموارير المسددة الزوايا والاضلاع تمثل كتل كهربائية يحيط تقريباها بطن للمقر وفوقها نحو المئة في الثانية. اذا مسها الانسان تخدر ويرتد || جسمها قريب الشبه بالشفتين، يطول نحو ١٠٠ سم. مسكها مائل القشار. ثوبها الملوي الى الخشبي الاصفر يملو موج وردي عند الذكر وخشعة بتج مستديرة زرقاء اللون، يبيضه الطوق. بتج الاذن بحرية اللون، غراء الطوق، فها سفلى الاركان. شقها متدل الانفراج. اسنانها متتابعة الصفوف البدة. نياما تفران جانبيا. عينها صغيرتان، سطحيان. زمامتها الظهريه اثنتان

١١٦٩٢ - رَطْل ٥
Soupeur (F).
رفع الشيء يده تقديرا لوزنه. *To weigh in one's hand* (E).

١١٦٩٣ - رَطْل ٥
سدة من الموازين القديمة قدرها اثنتا عشرة اوقية. وهو بالنسبة الى الموازين المترية، المتصلة حاليا في معظم البلاد العربية، يساوي ٢٥٠٠ غ.

١١٦٩٤ - رُطْبِيَّة (F). Humidité (E).
حالة كل جسم او شيء رطب يحوي بعض الماء.

١١٦٩٥ - رُطْبِيَّة لَيْسِيَّة (F). Relative humidity (E).

١١٦٩٦ - رُطْبِيَّة نَوْعِيَّة (F). Humidité spécifique (F). Specific humidity (E).

١١٦٩٧ - رَطْبِيَّة ٥
Gasteria (S). *Gastérie* (F). *Gasteria* (E).

جنس نباتات لحمية مسرة صغيرة القد من فصيلة الزنبقيات. منتجا بعض مناطق افريقية الجنوبية. ساقها صلبة او جعدة او متصلة. اوراقها لحمية، قرصية مشققة. ازهارها متباينة الالوان || تزود لقرنين ضمن البيوت وفي الحدائق التي لا تحصى البرد. تزده في الارربة المتوسطة الانساج الوافرة النضارة من عضوية ومعدنية. ازهارها كثيرة البند اشهرها التالية :

١١٦٩٨ - رَطْبِيَّة اُثْيَلَة ٥
Gasteria pulchra (S). *Gastérie gracieuse* (F).

نوع من الرطبة. ساقها موزلة تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها لحمية، ماسية، مطلة الزوايا، تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. لونها الى الخضار اللانس يملو تبيج ابيض واجر. ازهرارها عقودي التجميع يرتكز عل زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها قرمزية اللون || تنويرها شعوي.

١١٦٩٩ - رَطْبِيَّة سَوْدَاة ٥
Gasteria nigricans (S). *Gastérie noiretre* (F).

نوع من الرطبة. ساقها جعدة. اوراقها لحمية مشققة، شكلها شكل السان تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الخضار اللانس السابق تلوو رقة بياض. ازهرارها عقودي التجميع. نژادها يطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهارها الى الحمرة الزنجفورية السياه الموج || تنويرها شعوي.

١١٧٠٠ - رَطْبِيَّة كَطْرَة ٥

Gasteria carinata (S). *Gastérie carinée* (F).
نوع من الرطبة. ساقها مقرة. اوراقها مشققة لبدة. نصلها لحمية، محرمة الشكل، مطلة الاصلع الكثرة، تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعلوها بعض التمثل الدقيقة. لونها الى الخضار اللانس المنقط بالابيض. ازهرارها عقودي معتل الانتشاب، نژاده يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها حراء اللون خرية الموج || تنويرها شعوي.

١١٧٠١ - رَطْبِيَّة لَامِيَّة ٥
Gasteria luisante (F).

نوع من الرطبة. ساقها مقرة. ساقها مشققة تطول من ٢٠ الى ٢٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. صفحاتها العليا مقعرة ماسية. صفحاتها السفلى مخددة. لونها الى الخضار



١١٧١٣ - زحافات
Odonata (S), Odonates (F), Zygoptera (D).
Odonata (E), Wasserjungfern (D).

زفة حشرات من الرميسات . اجسامها مستطيلة . رؤوسها كبيرة . عينها مركبة بارزة . قرونها الاستفارية قصيرة وذقنة . اجنحتها غشائية شبكية ، جرابها دقيقة . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة تقسم الى مرتبتين : الرماشات الكبيرة والرماشات الصغيرة .

١١٧١٤ - زحافات صغيرة
Zygoptera (S), Zygoptères, Damselflies (E), Gleichflügelige Libellen (D).

مرتبة من الرماشات اجسامها نحيلة مستطيلة . حورياتها تكتسب بنحائم دقيقة مركزها في مؤخر البطن . اشهر فصائلها الكتيما .

١١٧١٥ - زحافات كبيرة
Anisoptera (S), Anisoptères, Libellules (F), Anisoptera, Dragonflies (E), Ungleichflügelige Libellen (D).

مرتبة من الرماشات تتميز باجسامها المستطيلة ورؤوسها الكبيرة المستعرة . تكتسب بنحائم دقيقة مركزها جدار المستقيم الداخل . اشهر فصائلها البسويات والرمادات .

١١٧١٦ - زحافات الليل
في فترة الليل ، اطبا .

١١٧١٧ - زحافات
Epistaxis, Saignement du nez (F), Epistaxis, Bleeding at the nose (E).

هو النزف الانفي أي خروج الدم من الأنف . اسبابه عديدة اخصها التهاب للنفخ وضربة الفم .

١١٧١٨ - زحام ، سكرحة ، زحال
Morve (F), Snot, Glanders (E).

مرض معد يسبب ذوات الحمار وقد ينتقل الى الانسان فيكون قاتلا له .

١١٧١٩ - زحامة ، زحامي ، شجرة المسافر
Ravenala (S), Ravenala, Ravenala, Urnula, Arbre du voyageur (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة اللوزيات . ثغفه للوز ولانتل سما . مهكها مدسكرو وما حولها من جزر المحيط الهادي . جلدها متعصب . اوراقها حلالية ، مروحية الاذكار ، تطلو من ٣ الى ٤ امتار وتوفر نحو المتر . ازهارها عتقوية التجميع . ازهارها يفس . ثمرها كمار صميكة الثغور تفلح حدة بزور فسيمة الشكل فية بالواد للثغرة المأكولة بعد طمها ويطبخها . تقدرها صناعية يستخرج منها دهن نباتي لا يفس به . اما سبب تسميتها بشجرة المسافر فيعود الى اذنتها اوراقها الخاصة التي تغط للماء زلالا باردا يروي حثث الكسان .

١١٧٢٠ - زحابل
Anémomètre (F), Anémomètre (E).

جهاز قياس سرعة الريح وعظما .

١١٧٢١ - زحابل
هو الزعفران ، انبل .

١١٧٢٢ - زحبل
الرجلة : ويح لا تكدي منها لدم استقرارها .

١١٧٢٣ - زحبت
Balausta

زهر الزمان البري . واحدة زفة .

زعتلها الذيلية مجذافية الشكل . شوارها الجني يتدكر بين الزعتلتين الحوذيتين . مسكها جيد الصنف ، شائع الاستعمال الصناعي . لحمها بين المتوسط والكامن ، قل من يربط فيه .

١١٧٢٤ - زحاس
Stomias (S), Stomias (F), Stomias (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الرماسات . انواعها المعروفة من الآن خمسة ، اربعة منها مسرعا المحيط الاطلسي والمهادي ونوع واحد يقطن في البحر الابيض المتوسط . تتميز من اسماك التناف والباحج التي لا تقترب من سطح الماء ابدأ . اجسامها مستطيلة الشكل مضغوطة كالانقليس . رؤوسها عظيمة . عظامها طسة . اشداقها كبيرة قافرة . اسنانها متبادلة ، مستطيلة ، حجة ، حادة . تحمل في فكوكها السفل علبه او علبات متغايرة الاشكال . زعانفها الظهرية والشرجية طرية الاذكار متعاقبة . زعانفها الاخرى متبادلة الاذكار والاحجام . حورلفها سداسية او خماسية الاضلاع . الوباها قائم يكثر فيها الكسني الجلوي للمواج والرماسي الازرق المواج والاحضر الامس الاسود المواج . تتميز بما تحمله من عمول مضببة مبشرة على كامل سطح الجسم وفي اماكن معينة اغصها الصلصة السفل من الفك والظن والذنب . اعرف انواعها واشهرها الزمسة الاصلية .

١١٧٢٥ - زحامة اصليمة
Stomias boa (S).

Stomias boa (F), Stomias boa (E).

نوع من الرماس . مكة بحرية بيوض . اصلها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تتميز من الاسماك الجبية . مسرعا الغاف التي يراوح معها بين ٢٥ و ١٠٠ م . . اجسامها قريبة الشبه بالانقليس ، بطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . توجها الى الرماسي الازرق المواج تبق زفته عند تيج الظفر وتقتف وتتصل الى شوية في البطن . رأسها قلاب ، مستطيل الشكل . الفس الخلف . فيها واسع الشفك الكبير . اسنانها متبادلة ، حجة ، ذرية . فكها السفل يحمل علبه سوطية الشكل . عينها كيرتان ، حلوتان . زعتلها الظهرية واحدة ، بعيدة عن الرأس ، قريبة من الذنب . زعتلتها الذيلية مزوانية الشكل . اجهزها السفي يتألف من بفس العمول المبشرة على سطح الجسم ومن صف من الاثول الصغيرة المتسارية الامداد بطرفه السطح السفل من الجسم بحافة ذلك . لحمها متوسط الصنف ، كبير اللادة الزرقية .

١١٧٢٦ - زحاسيات
Stomistidae (S).

Stomistidae (F), Stomistidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من مقوصات الخانة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من اسماك الاغواط والباحج . اصلها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدة الحارة . اجسامها قريبة الشبه باجسام الانقليس . رؤوسها قلابية ، عظيمة ، متباعدة ، مقوسة ، حادة الاطراف . الوباها تراوح من الزبدية الرمامية المواج الى البدية الكسنية تتصلها اجزاء مضببة مبشرة على كامل سطح الجسم .

١١٧٢٧ - زحاش
Tremblade, Tremblante (F).

Quivering, Trembling (E).

مرض عصبي او ميكروبي يسبب التشنج .



زكاة اصليمة



زكاة

أرجوانية يقطها خط أبيض . كانوا وما زالوا يستعملون جذليهما في بعض المستحضرات الطبية .

١١٧٣٨ - زَعْفَرَانِيَّة * Nosodendron (S).

Nosodendron (F). Nosodendron (E).

جنس حشرات من فصيلة العنكبوتيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٤ الى ٧ م . رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشور ، مستطيلة الاضلاع . عيونها صغيرة . تأثيرها وعلامتها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف . كواسلها صغيرة وعريضة . اغمارها لاحقة تملؤها حزم من الحلب الفلق الاصفر نظامي الخطوط الناعمة . قوائمها نسيطة . اذيولها وسيدة اللون القاتم يكثر فيها الاسود والاكستني || تألفت الحراجل الكثيفة الاشجار . تعيش على العصارة الصمغية التي تروشح من جروح السوق والاغصان . يرقاتها دلمة .

١١٧٣٩ - زَعْفَرَانِيَّة * Nosodendridae (S).

Nosodendridae (F). Nosodendridae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٨ م . رؤوسها مستعرضة القعن ، قليلة البروز . عيونها صغيرة . تأثيرها وعلامتها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، دبوسية الاطراف ، خماسية الفصل . كواسلها قصيرة وعريضة . اغمارها لاحقة تملؤها حزم من الحلب ، نظامية الصفوف ، صفراء اللون . قوائمها نشيطة . ارسلها خماسية المقل || تألفت القبابات والحراجل الكثيفة الاشجار . تعيش على العصارة النباتية التي تروشح من جروح الاغصان والسوق وصل المواد المنسجة . يرقاتها دلمة || اشهر اجناسها العنكبوت .

١١٧٤٠ - زَعْفَرَانِيَّة * Plutes fines (F). Drizzle (E).

الاضطار الخفاف .

١١٧٤١ - زَعْفَرَانِيَّة * Paltre (F).

To graza, To feed, To tend (E).

البرجح الماشية وسرورها لتأكل .

١١٧٤٢ - وَحْيُ الْإِبِل * Echinops sphaerocephalus (S).

Echinops commune (S). Echinops commune (F). Boulette commune (F). Globe thistle (E). Riesen-kugeldistel, Kugeldistel (D). Echinopo commune, Cardo pallirola (I).

وين اسمها مرغوليا شائعة ، شبه الجبال الشام ، ستاني . نبات عشبي بري معمر من فصيلة المركبات الابيوية الزهر . يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ م . ساقه وقروعه وارواها خضراء لينة . اوراقه عريضة اللسان قليلة النشور . رؤوساته الزهرية مكورة ، قطرها من ٤ الى ٨ م . لونها الى الزرقاء الباهتة .

١١٧٤٣ - وَحْيُ الْحَمَام Varbens (S).

Vervaine (F). Vervain (E).

جنس نباتات برية وريسية من فصيلة الساجيات . انواعه كثيرة العدد . سيقانها مفلجة ، عشبية او خشبية . اوراقها متبادلة ، كاملة او مفروقة لالفة ، حاشية او معتقة واذينية . اغمارها سنبل او لوريه التجميع . اغمارها صغيرة القند ، عديدة الالوان ، عطرية العرف || احرف واشهر انواعه للزينة ما يتبع .

١١٧٤٤ - زَعْفَرَانِيَّة Caroncule (F). Caruncle (E).

زائدة لحمية تكون على رأس أو عتق أو مقار بعض الطيور كما في البليك الحلي . ج . عتاق .

١١٧٤٥ - زَعْفَرَانِيَّة Barbillon (F).

Little barbel, Wattle (E).

زائدة لحمية مسطحة تشبه الزنقة تكون تحت فلق البليك ، وما يشبهه .

١١٧٤٦ - زَعْفَرَانِيَّة Pulicaria (S). Pulicaire (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعه المروفة نحو ٢٠ جميعها نباتات عشبية حولية وعملية ، اوراقها لسنة ، حاشية ، متعاقبة . اغمارها رؤسية صفراء اللون . اشهرها زمرار ايوب .

١١٧٤٧ - زَعْفَرَانِيَّة * Pulicaria dysenterica (S).

Pulicaria dysenterica (S). Pulicaria dysenterica, Herbe de St Roch, Inule des prés (F). Common fleabane (E). Grosses flöhkraut (D). Policaris svedese, Inula pratense (I).

نوع من المرمز البري مشهور بمقاومة الحلي . يسلح نساد المدة ويقضي على الزحار .

١١٧٤٨ - زَعْفَرَانِيَّة * Secouer (F). To shake (E).

رض الريح الشجرة : سركها .

١١٧٤٩ - زَعْفَرَانِيَّة * Abeille mille (F).

Masculine bee, Drone (E).

هو ذكر النحل ، ويسمى اليمسور .

١١٧٥٠ - زَعْفَرَانِيَّة * Troupeau de solipèdes (F).

Soliped drove (E).

الرجل ج ارمال هو القطيع من الخيل والحمر الوحشية .

١١٧٥١ - زَعْفَرَانِيَّة * Bourgeonner, Débourner (F).

To bud (E).

رمل الشجر والكرم : خرجت رمله اي برامه وزماته .

١١٧٥٢ - زَعْفَرَانِيَّة * Broutille (F).

Sprigs, Small-wood (E).

الطرف الغض لتاني من الكبرية . ج . رطل . والزملة هي نخلة .

١١٧٥٣ - زَعْفَرَانِيَّة * Graisse (F). Grease (E).

الزوم هو الشمع .

١١٧٥٤ - زَعْفَرَانِيَّة * Insolation (F).

Insolation, Sun-stroke (E).

عارض يصيب الحيوان وهو ضرب من الاحتقان الشمسي سببه تأثير الشمس في جمجمة الحيوان .

١١٧٥٥ - زَعْفَرَانِيَّة * Danaë laevis (S).

Danaë laevis (S). Danaë, Fragon à grappes, Laurier d'Alexandrie (F). Alexandrian gree laurel (E). Echtes minsterbauchen (D). Pugnapico a grappolo (I).

جنية برية وريسية تمل من ١٠٠ الى ١٥٠ م . رؤوسها مستطيلة . اغمارها عقودية التجميع غضراء اللون . غمارها

١١٧٥٦ - زَعْفَرَانِيَّة * Danaë laevis (S).

Danaë laevis (S). Danaë, Fragon à grappes, Laurier d'Alexandrie (F). Alexandrian gree laurel (E). Echtes minsterbauchen (D). Pugnapico a grappolo (I).

جنية برية وريسية تمل من ١٠٠ الى ١٥٠ م . رؤوسها مستطيلة . اغمارها عقودية التجميع غضراء اللون . غمارها

لتنزيه ما يتبع .



زمرار ايوب



زمن



زمن



زمن الابل

١١٧٤٤ - دِي الحَمَام الأُرْسِي

Verbens arnoides (S). *Verveine-arnois* (F).

حشبة حولية ، تملو نحو ١٥ سم . ساقها فروما . فرومها انقية الانتشاب نحيلة . اوراقها ثلاثية التفريش ، نصلها خلي البشرة على مسطحه . ازهارها صغيرة اللد لا حار مهدب لها . لوها الى الزرة الزاهية || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١١٧٤٥ - دِي الحَمَام الأَمْرِي

Verbens bonariensis (S). *Verveine de Buenos-Aires* (F).

حشبة معمرة ، تملو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . ساقها منتصبه زاهية . اوراقها لائقة . نصلها حشن للملس على مسطحه . ازهارها مستطيلة زياه التبرج ، لوها الى الزرة الباحة . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١١٧٤٦ - دِي الحَمَام الطُوقِيُونِي

Verbens teuroides (S). *Verveine germandrée* (F).

حشبة معمرة ، تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فروما . فرومها مغربية الانتشاب ، انقية . اوراقها قصيرة المدق اذنبيه . نصلها مستطيل الشكل ، ذلق البقعة ، مشن الحلقه ، حشن اللروق ، خلي الصفحة السفل . ازهارها يفض ثم لتصرف الى البردي . عرفها ليلي || ازهارها سني .

١١٧٤٧ - دِي الحَمَام الكَبِيرِي

Verbens sulfurea (S). *Verveine jaune-soufre* (F).

حشبة حولية ، تملو نحو ٦٠ سم . ساقها فروما . فرومها ضيقة الانتشاب . اوراقها قديده التفريش خلية البصل ، ملطه الاطراف . ازهارها خلية التبرج ، كبريتية اللون . ازهارها سني .

١١٧٤٨ - دِي الحَمَام الكَنَدِي

Verbens canadensis (S). *Verveine du Canada* (F).

حشبة حولية ، تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فروما . اوراقها مستعرضة برفشة طول من ٣ الى ٥ سم . ازهارها قصيرة مستعرضة ، قليلة البرف الليل ، لوها يختلف مع فرومها فيها الازرق والبنسجي والاريجوني || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١١٧٤٩ - دِي الحَمَام المَحْزَنِي ، بِمَارِسْكَرُونْد ، حَشْبَةُ الأَنْجَام

Verbens officinalis (S). *Verveine officinale*, *Herbe sacrée* (F). *Vervain*, *Holy-herb*, *Pigeon's-grass* (E).

Echtes elsenkraut (D). *Verbens officinale*, *Colombaria* (I).

حشبة معمرة ، تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . ساقها فروما . فرومها منتصبه . اوراقها اهلجية مفرشة . نصلها أثقب الصفحة السفل . ازهارها صغيرة اللد ودية اللون يوشوا موليخ اخضر . وفي من الاشباب الكثرية للنانع الحمية . يستخرج منها بالتقطير ططور فاخرة الصفت طرزة الاستعمال || كانت ولا تزال تستعمل لد البرق ولزيادة القوة الجلية || ازهارها سني .

١١٧٥٠ - دِي الحَمَام الحُطَطِي

Verbens venosa (S). *Verveine veinée* (F).

حشبة معمرة ، تملو نحو ٥٠ سم . ساقها منتصبه زياه اللام . اوراقها لائقة نصف حاشية . نصلها حشن الصفحة العليا ، الملس السفل خلي الحاشية . ازهارها فولية العرف لوها الى الليلي الازرق || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١١٧٥١ - دِي الحَمَام الأُرْسِي

Endophyllum
جنس ططور مجهرية من فصيلة العريشيات . انواعه قليلة تنقل على بعض النباتات كتحذيا || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

١١٧٥٢ - دِي الحَمَام الهَرَبِيُونِي

Endophyllum euphorbiae-silvaticae (S).

نوع من الرعيث يركب التولي حيث تنقل مثاقه وتفتح النبات حسن الازهار . يتم من مبيدو رائحة سطرية ذكية وتقلص في غشار الورق . اما ذمافها فتركب الاوراق على مسطحها السفل || يكلف بمركبات النسل من ظهور عوارض اللوم .

١١٧٥٣ - دِي الحَمَام التُكُونِي

Endophyllum valerianae (S).

طر قليل الانتشار ينقل على السرق والاوراق ليؤذيها ويمنع الازهار || يكلف باستئصال احد مركبات النسل نفسا على الاوراق عند ظهور عوارض اللوم .

١١٧٥٤ - دِي الحَمَام حَتِي العَالَم

Endophyllum sempervivi (S).

نوع من الرعيث يركب لاه الجلمن فينقلها بتدوير الكروية الصغيرة البرتقالية اللون ثم يقرسها ويصلها وقد يسيب يلسها وينشا || يكلف بقتلح النباتات المصابة ويتطهر التربة .

١١٧٥٥ - دِي الحَمَام حَتِي العَالَم

Endophylacae (S). *Endophylacae* (E).

فصيلة ططور مجهرية من رتبة الحمايات تدوير مجاشها للضائرة المتتابة مشن فصات مجشها المسقلان . لاس بويافها دعالي الشكل اليدي الانفصال || اجسامها الاقتصادية قليلة . اعرفها الرعيث .

١١٧٥٦ - دِي الحَمَام حَتِي العَالَم

Odonoptera (S). *Odonoptera* (E).

طليقة سحرات قارضة مجشها مستطيلة الاجسام . رؤسها كبيرة اللد ، حوتها بارزة . فروها الاستشمارية شديدة القصر . رؤسها مستطيلة ، غشائية ، كثيرة العروق الشكية . اقليها عديدة الااليان || نصلها واجسامها وانواعها كثيرة اللد تضم الى رتيين : الطرايات والجليليات ومن نصلها المشورة : النتيات واليسويات .

١١٧٥٧ - دِي الحَمَام حَتِي العَالَم

Bélemet (F). *Bélemet* (E). *بَلَمَت*

صوت ذوات الخف .

١١٧٥٨ - دِي الحَمَام حَتِي العَالَم

Procellaria (S). *Pétrel* (F). *Pétrel* (E).

جنس طيور مائية من كليات القمم وفصيلة البراقليات . انواعه المروفة حمة جميعها متوسطة اللد فشطلة ترائق البراوير في سفرها عدة ايام لا تتقاط بقايا اللطخ || اجسامها تملو من ٥٠ الى ٥٠٠ سم . اجسامها مستطيلة ذلقة الاطراف . اذنها قصيرة . منقايها ضيقة ، متوسطة اللد ، لمطولية الصفحة العليا ، ضدة السفل ، مجشمة المناس القدية . غنايتها وحيطة القدية . ازهارها كامة . شترة اصابعها كاملة تمتد حتى الغالب || قتها القشريات ويشت الحيتان والاسماك . سرسها بجار البلاد الحارة ولباردة . توم على الماء وتجوم فوقه ولا تقرب البر الا في زمن العفاد



دِي الحَمَام الطُوقِيُونِي



دِي الحَمَام الكَنَدِي



دِي الحَمَام المَحْزَنِي



رِفَاة

١١٧٦٦ - زُفَّاءُ جُورْتِنَا * Epinephela

Jurtina, Maniola Jurtina (S). Epinéphèle Jurtina, Myrcil (F). Epinephela Jurtina (E).

حشرة من فصيلة المهابيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا. فراشها جارية قوتها مفر الاضرار. سرقتها غاشلة قوتها نصف التجميلات || جسمها متوسط لحد يطل نحو ١٧ م. بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٠ م. رأسها صغير الحجم. صيها كيرتان. زياتها صولفانيان. جوشها كسني اللون صناعي الموج عند الاثنى، اسمره عند الذكر. بطنها ليد الحبل القصير يتصل بشرب الجوشن عند الشقين. ورأسها كسنية، صمرا الموج عند الذكر، حطيت عند الاثنى، الزوج الامامي عند الذكر خصب بتقطة بيضاء المركز حطية الجولاب || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار. تسرح في التبار تماثل بعد ظهورها بشرة اسابع وتمتع المكن لطعام السفل من نصال الاوراق || السرة تطل نحو ٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل، ماس القشار. ثوبا الى الرعدة الصفراء الموج يملوها ثلاثة خطوط منها خط لبي وخطان جانبيان جميعها الى الخضار الماي. رأسها اسود. شربها مجهز بزايدة مفلقة. مدنها ورواجها الى الطحلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة بين الجلالة ونحتها.

Terre sablonneuse (F).

Sandy soil (E).

Trachée-artere (F).

Windpipe (E).

Prémontion (F).

Premontion (E).

لرقانة احساس يستقبل العمل ويشير به.

١١٧٧٠ - زُفَّاءُ Desiderata

١١٧٧١ - زُفَّاءُ Procellariidae (S).

Procellariidae (F). Procellariidae (E).

فصيلة طيور مائية من كليات القدم مستطيلات الاجنح. اجناسها وانواعها قليلة العدد. اسطها منظر بحار العالم الى اوروبا. فراشها جارية قوتها مفر الاضرار. سرقتها غاشلة قوتها نصف التجميلات || جسمها متوسط لحد يطل نحو ٤٠ م. رأسها صغير الحجم. صيها كيرتان. زياتها صولفانيان مستطيلان. مرشفها خفيف الجسم. جوشها كسني اللون عند الذكر، حطية عند الاثنى. بطنها ليد الحبل يتصل بشرب الجوشن عند الشقين. ورأسها، عند الشقين، الى الشقرة يملوها تبقي حطلي وتتقيد اسود وتبيض اسمر وتمتع الحبل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في التبار. تماثل بعد ظهورها بنحو حشرة اسابع وتمتع المكن لطعام السفل من نصال البصيف || السرة عند بلوغها الكمال الجسدي تطل نحو ٣٠ م. جسمها اسطواني، ماس القشار. ثوبا الى الكهبة الخضراء يملوها حمة خطوط عتائية منها خط لبي. رأسها جلوي اللون. شربها مجهز بزايدة مفلقة الى ثلثين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة تحت الجلالة ضمن غلاف ضوي المادة.

١١٧٧٢ - زُفَّاءُ Artère mammaire (F).

Mammary artery (E).

حرق غليظ ينشئ في الفرس يدر اللبن.

١١٧٧٣ - زُفُل هو ذن لحام السنايل في الزرع. او عندما يحاوذ سنيل

الزرع الاغلام.

١١٧٧٤ - زُفُل Anserine (F). Goose-foot (E).

الزحل هو الاكثية، نبات بري طبي. ج اذغال.

والخضن. انثاها تحضن بيضة واحدة نحو خمسة اسابيع. للذكور كوين الغذاء.

اعرف انواعه :

١١٧٥٩ - زُفَّاءُ الجليد، فُلْزَار Procellaria glacialis (S). Pétrol glaciel, Fulmar (F).

١١٧٦٠ - زُفَّاءُ القُطْب Procellaria capensis (S). Pétrel du Cap (F).

١١٧٦١ - زُفَّاءُ الهيد، حَالِيَة Procellaria hastata (S). Pétrel haste (F).

١١٧٦٢ - زُفَّاءُ، زُفَّاءُ Permeable (F).

Permeable (E).

اوس زفاب تأخذ الماء الكثير ولا تسيل الا من مطر كثير.

١١٧٦٣ - زُفَّاءُ، زُفَّاءُ Permeabilité (F).

Permeability (E).

صفه الارض الزفاب يبي قابلية نفوذ للسوائل والغازات في التربة وفي غيرها من الاجسام.

١١٧٦٤ - زُفَّاءُ Ereos (S).

Ereos (F). Ereos (E).

جنس حشرات مائية قاصصة من غديات الاجنح وفصيلة التكروليات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق العالم باستثناء الاصقاع الباردة. تعيش في الجيبرات والمناقع والاهوار ويباري الماء القليلة الانسياب. قوتها كل ما تيسر لها من مواد عضوية حية كانت او ميتة || اجسامها متوسطة القد، احليجية الشكل، مستدلة الانحداب، مجاذبة الجرايز الخلفية، محببة الامامية عند الذكور || زياتها مائية قاصصة مؤدية لا تنف من سره السمك.

١١٧٦٥ - زُفَّاءُ يَتُون * Epinephela

Epinephela tithonus, Maniola tithonus (S).

Epinéphèle tithon, Tithon (F). Epinephela tithonus (E).

حشرة من فصيلة المهابيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا. فراشها جارية قوتها مفر الاضرار. سرقتها غاشلة قوتها نصف التجميلات || جسمها متوسط لحد يطل نحو ٤٠ م. رأسها صغير الحجم. صيها كيرتان. زياتها صولفانيان مستطيلان. مرشفها خفيف الجسم. جوشها كسني اللون عند الذكر، حطية عند الاثنى. بطنها ليد الحبل يتصل بشرب الجوشن عند الشقين. ورأسها، عند الشقين، الى الشقرة يملوها تبقي حطلي وتتقيد اسود وتبيض اسمر وتمتع الحبل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في التبار. تماثل بعد ظهورها بنحو حشرة اسابع وتمتع المكن لطعام السفل من نصال البصيف || السرة عند بلوغها الكمال الجسدي تطل نحو ٣٠ م. جسمها اسطواني، ماس القشار. ثوبا الى الكهبة الخضراء يملوها حمة خطوط عتائية منها خط لبي. رأسها جلوي اللون. شربها مجهز بزايدة مفلقة الى ثلثين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة تحت الجلالة ضمن غلاف ضوي المادة.



زُفَّاءُ بِيرون



زُفَّاءُ جُورْتِنَا

١١٧٨١ - رُغِيَّة ٥

Rhyssa (S).

Rhyssa (F). Rhyssa (E).

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المحصورة الاشرافيات الحافرات وصليبة التنسيات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها دقيقة مستطيلة. اطولها الكاملة، من الرأس الى طرف المرنج، تراوح من ٨ الى ١٦ سم. انوثها مثابثة الاناثن لكثير فيها الشبهة الخفية بالاصغر || تتميز بصقلتها الاجسام والرقائق والقوقام والمرازات. مرازاتها جميعاً تحترق الفكر والمخشب تحترق من الحشرات الملقية لانها تنبت الككن في بطون يرقات الحشرات الملقية تفضي عليها.



رغل

١١٧٨٢ - رُغِيَّة ٤ ميردوم Masoderme (F).

Masoderm (E).

الرغيلة في علم النبات الغلات الغشائي الذي يلصق الجباب وتكثفه القشرة || وهي في علم الحيوان (لرولوجية) انشاء الاصوات بين البشرين الحارثية والداعية.

١١٧٨٣ - رُقَالِجَة سَمَرَة ٥

Apotomus latigens (S). Apotome brun (F).

Apotomus latigens (E).

حشرة قانصة من فصيلة الرقاليجات ورتبة غشائيات الاجنحة. موطنها بغض الاقاليم الممتدة الحارة من حوض البحر الابيض المتوسط. تألف الموطن الريانية التي لا تخلو من المشب. خنافسها تعيش على الحوام والحشرات الدنيا ولقديان اللقية. يرقاتها تعيش في اول مدها على المواد المضوية ثم على ما تستطيع اقتباسه من الحشرات والحوام || جسمها صغير القند يطول من ٤ الى ٦ سم. فويها الى السرة البطن والسفاه. رأسها صغير الجرم، مستطيل الخيط، زباناها دوقنان، مستطيلان. عيناه صغيرتان. ظهورها ثنائي التنديد القندي القاطب. ارسافها خاسية القل || الاثن اصغر قفًا من الذكر واجبت ثوبًا من وقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواخر الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها انتم تطول نحو ١٠ سم. جسمها اسطواني الشكل، تني اللون، اسمر الخيد، اغبر اللهب، اسود الرأس والشرح || طور الاكمال يستمر نحو ٣٥ يومًا وينتهي بظهور الحشرة الجملانة في اواسط سزيران.



رغيف لشق



رغية

١١٧٨٤ - رُقَالِجِيَّات ٥

Apotomidae (S).

Apotomidae (F). Apotomidae (E).

فصيلة حشرات قانصة نافعة من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة || جميعها صغيرة القند قلًا يتجاوز طول الواحدة منها ١٠ سم. رؤوسها اسطوانية الجرم، مستطيلة الزقاق المغارية الفصل. كواسها كاسية الشكل. اجسامها خلية القشعار. الحامدها ثمانية الاغابيد القاطبة الشاذية || تسرح في النهار وتبيت في الليل. تسي بسرعة وشرقة وطير بشفة. قوتها ما تيسر لها من الحوام والحشرات الدنيا ولقديان || اشهر اجناسها الرقالية.



رُقَالِجَة مَرَاد

١١٧٨٥ - رُقَادَة الرقادة هي غشب السقف.

١١٧٨٦ - رُقَادَة Compress (F). Compress (E).

هي الصبغة المظهرية البنية الطوق التي تقسم بها الجرج.

١١٧٧٧ - رُغُل ٥ قَرْنِيَّة ٥

Vernonia (S).

Vernonie (F). Vernonia (E).

جنس نباتات عشبية جلمورية طيبة معمرة من فصيلة المركبات معقودة التبريف على اسم اليوناني فرزين || انواعها المعروفة عديدة. اصطناعها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدة الحارة || منها غرام حليانية المصارة تركز على جذابير غليظة. اوراقها متعاقبة صلبة ضيقة متصل الجالده. ازهارها فردية، طريقة الازدكار، ويلبب نيسا اللون الازرقاوي. بزورها صغرية، مزوانية الشكل، خددة، معمره || جلمودها دافئة الحسى، قتيقة ومباردة لقمود. اوراقها وازهارها تتصلب استحال الناي.

١١٧٧٦ - رُغُلَة

Agneau, Chevreau (F).

Lamb, Small goat (E).

صغير النجمة او الغزل لا يزال يرغل امه.

١١٧٧٧ - رُغْنَة

Erg (F). Erg (E).

الرغنة اسم يطلق على كل منطقة صحراوية تشداه الكتيان المتحركة. اما المناطق الصحيرية المرتفعة التجاد تسمى حادة.

١١٧٧٨ - رُغْنِيَّ ٥ قَصْحَاة ٥

Rhagonycha (S). Rhagonyque (F).

جنس حشرات من فصيلة الدراحيات ورتبة غشائيات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اصطناعها الشرق الاوسط واروبة. جميعها مستطيلة الشكل، صغيرة القند. اطولها تراوح من ٧ الى ١٨ سم. انوثها غثلفة الاناثن يكثر فيها الاصغر والالتهيب الخراج بالاحمل او بالزقة او بالاسد || تسرح في النهار. التطير في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف. مرازها الازهار || يرقاتها تآرية مفترسة تقضي على معظم الاساريق وتعطيقها بنشاط.

١١٧٧٩ - رُغْنِيَّ شَفِخ ٥

Rhagonycha fulva (S). Rhagonyche roux,

Rhagonyche roux (F). Rhagonycha fulva (E).

حشرة واشعة خاسلة من فصيلة الدراحيات ورتبة غشائيات الاجنحة. تألف الموطن التي تكثر فيها الازهار واغصنها الازهار البرية. خنافسها تعيش على بتلات الازهار ورسيتها. يرقاتها تعيش على المواد المضوية وعلى ما تقتريه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير القند يطول من ٧ الى ١٠ سم. ثوبا الى الشبهة الصفراء يقيم عند اطراف الظهران. رأسها صغير الجرم. زباناها عيطيان. عيناه صغيرتان. ظهورها لا يلبس كامل البطن. بطنها اسفر اللون، معظمهم اللطوف. ارسافها خاسية القل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اواسط تموز. تسرح في النهار. تساقه بعد ظهورها بالزقة عند بلوغها الازدكار انتم تطول نحو ١٨ سم. جسمها مبطل الجرم، اسمر اللون، حنلي الخراج، سداسي الزواجب السمر، مستطيل الرأس الجلموي، ضليخ القاتير، مدبب اللطوف || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٥٥ يومًا ينتهي في القرية.

١١٧٨٠ - رُغْوَة السَّحَر Magnéite (F). Magnésit (E).

هي سيليكات المغنيزيم الطبيعي يتصلب في عدة صناعات دقيقة.

١١٧٩٨ - رَقْلَانِيَّات * Melanconiales

مرتبة تطور مجهرية من رتبة الزويعات تتميز بكتلتها الكثيفة في السرفولة. فيها عضون الجوانب يكتشفه جمل دقيق قصير. اجناسها عديدة تجمعها فصيلة واحدة تدعى الرقليات.

١١٧٩٩ - رَقْلَة * Melanconis

جنس تطور مجهرية من الرقليات يتميز ببوطه الشفاف لثنائي الخلية. له نوع واحد يحم الاقتصاد الزراعي ينسب رقة الكسنة.

١١٨٠٠ - رَقْلَة الكَسْنَة * Melanconis

Melanconis modonis, M. perniciosum, Fusicoccum perniciosum, Coryneum modonum, C. perniciosum, C. kunzei castaneae (S).

فطر مجهرى يصيب احضان الكسنة فيؤذيها ويسبب يباسها. مظهره الخارجي يقع منخفضه مسطيلة مدببة افراس والحطب بارزة التركيب لحاء الاضغان فضيت اخلايا وتقل الاوعية وتقرئ سير النسيج وتبادل. وقد تقضي عليه عندما تطرق النمن فتقبل الاوراق وتبقيها الاثان والاثناد والفضن. يكافح بقطع وسرق احضان المبروة ثم تطهير الجروح بحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس.

١١٨٠١ - رَقْلِيَّات * Melanconidaceae (S).

Melanconidaceae, Melanconidaceae (F). Melanconidaceae, Melanconidaceae (E).

فصيلة تطور مجهرية من الرقليات ورتبة الزويعات تتميز بوليصة جنية جلدية تقوم على جعلها احضان غليظة طليقة. يرضها غروطي او اسطواني او غيبي الشكل، ثنائي الخلية، شفعي الوتيرة المتفرعة. اجناسها الخلية ١٦ البستوريزه، البوليسوريه، الرقة، السيلفولوم، البستوريكسة، السجبة، السيليسوريه، السيلندروسوريوم، القنيسمة، الكريستوسوريوم، الكورينديوم (الرقة)، الصوف، الليريثلا، المرصونية، الميكسوديوم والنيوسوريه.

١١٨٠٢ - رَقْل * Mammite (F).

Mammitis, Mastitis (E). نوع من الالتهاب وهو مرض يصيب الفرج فيؤذي.

١١٨٠٣ - رَقْلَة Consorts

الشركاء في المصير، اصحاب المصلحة الواحدة.

١١٨٠٤ - رَقْلَة Penna (F).

Feather of the tail or wing (E). كل ريشة غليظة طويلة من ريش ذنب الطائر ورجانه. ج. رقال.

١١٨٠٥ - رَقْلِيَّات Rafflesiaceae (S).

Rafflesiaceae (F). Rafflesiaceae (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة، عديمات الضامات، مستفضات المبيض. اجناسها وانواعها قليلة جميعها اصحاب استوائية اللينث طليقية ترتكز وتقوم على مشرة ليفية تلشب في لحاء حوائلها.

١١٨٠٦ - رَقْلِيَّة Rafflesia (F).

Rafflesia (E). جنس نباتات مشبية طفيلية من فصيلة الرقليات. انواعها ثلاثة، سويقها قصيرة مدادة. اوراقها حرشفية. ازهارها لحمية كبيرة اللند. قطرها نحو المتر. وزنها ٧ كيلو. بتلاتها رباعية يضاء اللون، قرمها احمر قرميدي تفوح منها رائحة كريهة لا يقربها شيء.

١١٧٩٧ - رَقَال * Emasculation des fleurs (F).

Emasculation of flowers (E). اقتلاع تلك الزهر منأ ثابريه منها.

١١٧٩٨ - رَقْرَال، صَيَّاد السمك Ceryle (F).

Ceryle, Kingfisher (E).

جنس طير من القرقليات، انواعه ١٤، موطنها الماء. يتكر ويصيدها في المناطق الخالية والممتلئة. يتميز بمناظريها القوية المسطيلة، وابجنتها المتوصلة اللند، باذانها المرصبة المستدرة وباصفاها القصيرة. الواجهات متعددة الاالوان لكنها بين القردل ورقفا وزمار. انها تدر في صلعو المستور. تبيض ٧ بويضات تحضنها وحدها من ال ١٤ الى ١٦ يوما. احرف واشهر انواعها ما يلي.

١١٧٩٩ - رَقْرَال السَّال Ceryle alcyon (S).

Céryle-alcyon (F).

طائر من القرقليات، طوله يراوح من ٢٩ الى ٣٠ سم. لونه رمادي اللون ازرق المواج. صدره مشع بالازرق. يلمه ابيض حلي. جنتاه مرتفذان بالابيض. ذنبه غيق الرقعة الماجية. قوته الاسماك والقشريات والصفادح والوزغ والجنادب والجراد.

١١٧٩٠ - رَقْرَال شامع Ceryle rudis (S).

Céryle-rudis (F). Pied Kingfisher (E).

طائر من القرقليات، طوله نحو ٢٧ سم. رأسه قنري الريش المسطح. لونه ابيض الظاهر، ابيض الباطن والصدور واليطن. صدره مطقان بقلادتين نصفيين لونه الى السرة الفصحية. موطنه آسيا الغربية وافريقية الشرقية والبالية. يالاف القشوط البحرية ويرب الانهر ويجاري الماء. قوته الاسماك الصغيرة والقشريات والصفادح والحشرات اعصها الجنادب والجراد.

١١٧٩١ - رَقَش Pelle (F).

Shovel (E). اداة يستعمل لجرف التراب ونحو.

١١٧٩٢ - رَقْع، لَزَاكَة Malolevée (F).

Replevin, With drawal (E).

هو يقع سحب او ابطال فمليه رهن مقاري او مقايمة شسم في قضية.

١١٧٩٣ - رَقْع، تَحْل Dérangement (F).

Dialtering (E).

اخراج الشيء من التربة كاهراث في آخر التلم واربوية الشجرة والجذور المقطوعة الخ.

١١٧٩٤ - رَقْع الاعتِاق Levée de scellés (F).

Take of seals (E).

عمل يقوم به القاضي المختص ينتزع الاعتام التي اصفاها بعد ان يتحقق من صلاحيتها.

١١٧٩٥ - رَقْع الفِركَيب Dégrièvement (F).

Reduction, Allowance (E).

هو ان ترعب الضريبة او تخفف من المكلف.

١١٧٩٦ - رَقْع اليَد، كَتَف اليَد Démiselement (F).

Parting with (E).

هو الانتاع او المنع من ادارة مال او عين.

١١٧٩٧ - رَقْع هو تبين القرة.



رقال شامع



رقة الكسنة

Non rustique (F). No rustic (E). **١١٨١٥ - رَفْثَة**
تمت ترجمتي يطلع على النباتات المطلوبة التي تستعمل
التخصص في التربة والغنية بالملح.

١١٨١٦ - **رَفْثُوج** هو اصل كبري للتل.

١١٨١٧ - **رَفْثِيل** * Parodia, Stilet (F).

طار من الجوانب نباتات المناظر ونباتات الفروسيات. موطنه
جنوب الهندية. يألف النباتات قوت الحشرات والاساريع
والقديدان والآفات العنيدة واليزور البرية || جسم صغير
القد يطلع من ١٨ إلى ٢٠ سم. ثوب الذكر إلى السواد
الحلي الاحمر اللامع. زوره وصدور وقدم الاسفل من
عسريه الى الصغار النحاسي الاسفم. رأسه متوج بست
رفال دقيقة مستطيلة تتجهي بست سطحات صغيرة نحاسية
اللون. الاثني حادة الزرقاء وثوبها البولي الى الشحنة
السراة. زودها وصدورها وبقايا الى الشحنة الصهباء.



رفثاء الخدائق

١١٨١٨ - **رَفْثِيح** Turgide (F).
Turgid, Swollen (E).

تمت ترجمتي يطلع على اعضاء الحيوان ونباتات التي تتورم
تلقائياً أو عرضاً تشبه وركباتها رافعة.

١١٨١٩ - **رَفْثِيلِد** هو لفظية القرصيات، المطالب.

١١٨٢٠ - **رَفْثِيْدَكَة** Fleure (F). Fleure (E).

الرقيقة وتسمى الرباط الجنبي، غشاء يصنع بين التربة
والقوة اي الزودين عند الحشرات.



رفثل

١١٨٢١ - **رَفْثِيْدِيْدَات** * Raphidididae (S).
Raphidididae (F). Raphidididae (E).

نصيلة حشرات مفترسة من رتبة شبكات الجناح. اجسامها
المعروفة قليلة المد، اما انواعها فتنوع ٨٥ منتشرة في
معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة
القد، شبه اطيالية الشكل، تطلع من ١٠ الى ٢٠ سم.
بسطة اجسامها تتراوح من ١٢ الى ٣٠ سم. رؤوسها ناعمة.
جهازها الفمي نظامي. اذناها مستعرض. جفاتها مستطيلة.
تاكثيرها قليلة للثني، بمجزة بلسان قوي. ملابها مربعة،
الفكية رباعية الاجزاء، المشفوية لثامتها. قرونها
الاستثمارية قصيرة ونحيلة. عيونها جانبية. زانها صغيرة،
ثلاثية. كواسلها مستطيلة. اجسامها شبه مثاقلة. يطلعها
مخارية السكم. مرازات اثنائها مستطيلة، مبطنة || تألف
الحراج والنباتات. جميعها رافعة، لامة في دورها البري
والحشري || اشهر اجسامها الرقيقة والبنقة والاكثولة والاسنة.



رفثة

١١٨٢٢ - **رَفْثِيْلَة** * Brenthos (S).

Brenthos, Brenthe (F).
جنس حشرات سوسية غاشية من عفايات الاجنحة ونباتية
البرقيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق
الحارة من المابين القديم والحديث || اجسامها مغزوية
الشكل، مستطيلة. رؤوسها دقيقة، عظمها غائرة
اللون، متنفقة القدم. قرونها الاستثمارية غليظة،
محسنة، تنقب عنه طرف الخيط، قبل انقائه || قوتها
المواد الخشبية. تألف النباتات وتعيش تحت لحاء الانجار
القابلة والميتة.

Ceufs des rapaces (F). **١١٨٠٧ - رَفْثَن**

Eggs of rapacious birds (E).
الرفن : بيض كواسر الطير اعصها المتعبان. الواحدة رفنة.

١١٨٠٨ - **رَفْثَنَاء** **اِرِيْثَنُوس** Erianthus (S).
Erianthe (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة النجيليات.
انواعها المعروفة نحو ٢٠ منها واحد زراعي رئيسي.

١١٨٠٩ - **رَفْثَنَاء** **الْحَدَاكِي** * Erianthus ravennae (S). Erianthe de Ravenna, Canne

de Ravenna (F). Plum-grass, Ravenna-grass (E). Woll-
zucker, Ravenna seidengrass (D). Erba ravenna (I).
نوع من الرفثاء وهي عشبة ثريبتية معمرة، تطلع من المتر
الى المترين. ساقها ليفية. اوراقها جامدة، صلبة،
ذائقة، بتفسيحها اللين. ازهارها حذكولي التجميع هري
الشكل يطلع نحو ٦٠ سم. ازهارها ثوبها بنفسجية ثم
تتحرف الى الالباض || ترغب في التربة الكلسية القليلة
الرطوبة.

١١٨١٠ - **رَفْثِي** * Ové (F). Oves (E).

تمت رمي يطلع على كل شيء شكله شكل الرنة اي
البيضة.

١١٨١١ - **رَفْثِيْكَ** Rafnia (S). Rafnia (F).

جنس نباتات معقوفة التعريف على اسم العلامة اليوناني
الدائري « رَفْن » . انواعها ٢٢ جميعها معمرة، معظمها
بري وبعضها رئيسي. موطنها افريقيه الجنوبية، منها
الجبنة والجبلة. وهي تنتمي الى فصيلة القرنيات الغراسية.
اوراقها بسطة كاملة. نصلها وسيد العرق. ازهارها
لا قياسية التجميع والارتكاز. كواسيها خاسية للتخصص
للانحساري، قوتيجتها فراشية الشكل، وايانها مستديرة،
يطلع فيها اللون الاصفر. ثمارها سفلية جالسة. زودها
مستطيلة مغلطمة || تتكاثر بالبرق والمقل. ترغب في
التربة الدنيابة القليلة الانساج، الوارفة النعس الضروي
المتمثل || اشهر انواعها الازينية الثلاثة التالية.

١١٨١٢ - **رَفْثِيْكَ** **اِهْلِيْجِيْكَ** Rafnia elliptica (S).

نوع من الرفنية وهي جبنة صغيرة تطلع من ٤٥ الى ١٠٠
سم. قرونها مزاكية شفعية. اوراقها اطيالية الشكل
تطلع من ٥ الى ٨ سم. نصلها بحري اللون ذي الزام
الاخضر. ازهارها محورية الارتكاز، فردية او ثنائية التجميع
صفرها اللين || ازهارها يستمر من اواخر ايار الى
اوائل تموز.

١١٨١٣ - **رَفْثِيْكَ** **لُثَالِيْكَ** **الْأَوْهَكَر** Rafnia triflora (S).

نوع من الرفنية وهي جبنة ثنائية الشكل تطلع من ٦٠
الى ١٢٠ سم. قرونها منشية فارفة. اوراقها بيضية
الشكل مستديرة القاعدية، مدبية الطرف. نصلها بحري
اللون، عاكب المراج غليظ من ٥ الى ٨ سم. ازهارها صفراء
اللون محورية الارتكاز، فردية او ثنائية التجميع || ازهارها
يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز.

١١٨١٤ - **رَفْثِيْكَ** **مُغْرَكَة** Rafnia angulata (S).

نوع من الرفنية وهي بجلة معمرة تطلع من ٣٠ الى ٦٠ سم.
قرونها مقربة الزوايا، غائرة، منشية. اوراقها مغزوية
الشكل تطلع من ٢ الى ٤ سم. نصلها بحري اللون مدبب
المقمية. ازهارها الى الصفراء الكبريتي || ازهارها يستمر
طوال شهر ايار.

١١٨٣١ - رقائق متفعل Haut-fond (F).
Shoal, Shallow (E).
سهل قليل النور.

١١٨٣٢ - رقائق Funaria (S).
Funaire (F). Funaria (E).

جنس طحالب من فصيلة المصريات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منها البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم. جميعها من الطحالب الشطئية الحولية التي تعيش في التربة. بعضها دقيقة صيغة تنتهي بإكياس البروغ الحولية الشكل. سراسفها متراكبة تملأ أسافل السوق. يكثر وجودها قرب مشاعر القمم.

١١٨٣٣ - رقائق Cartographie (F).
Chartography, Mapping (E).

الرقطة فن رسم الخرائط الجغرافية.

١١٨٣٤ - رقائق حاصلية Cartographie pédologique (F).
Soll Mapping (E).

فرع من الرقطة يختص بوضع الخرائط الحاصلية.

١١٨٣٥ - رقائق Cartographique (F).
Chartographical (E).

نمت تعريفية يطلق كل ما له علاقة بالرقطة.

١١٨٣٦ - رقائق Trichilla (S).
Trichillia (E). Mafurabum (D). Trichilla (I).

جنس الحجار ومجبرات برية وزراعية من فصيلة الازديشيات. أنواعه المعروفة زهاء ١١٢، أصنافها البلاد الحارة والاستوائية بعضها جالسة. أصنافها متفرقة الانتشار. أوراتها مركبة وتزيه يكثر فيها التثليث. أزهارها عكسولي التجميع محوري وطرفي الارتكاز. أزهارها كبيرة القدد عطفلة الأوان لا تقاسم الانتظام البلي || أشهر أنواعها ما يتبع.

١١٨٣٧ - رقائق Trichilla hirsuta (S).
Trichillie bois de fer (F). Bestard Iron wood (E).

نوع من الرقاق، شجيرة تملو نحو ٤ أمتار، أوراتها مركبة خاسية، وريقتها لا قياسية الشكل، تصلها أزغب الصفحة السفلى. أزهاره عكسولي التجميع، خلية البشرة، هاجية اللون. غشيه شديد الصلابة، أسمر اللون، قلعر الصفص | أزهاره يستمر طول شهر حزيران.

١١٨٣٨ - رقائق Trichilla glabra (S).
Trichillie glabra (E).

نوع من الرقاق، شجيرة تملو نحو ٦ أمتار. أوراتها مركبة ثلاثية. وريقتها لائفة يضيئة الشكل مغشوة القاعدة مدببة الطرف. تصلها جامد الصفحة بجمل أخصار التلاصق. أزهاره عكسولي التجميع مغلفة الشكل، لونها ألب البياض الجامبي. أزهاره يستمر طول شهر حزيران.

١١٨٣٩ - رقائق Trichilla spondiodes (S).
Trichillie tendre (F). White butter wood (E).

نوع من الرقاق، شجيرة تملو نحو ٦ أمتار، غشها أخضر اللون، قليل الصلابة، سهل الانطاف. أوراتها مركبة لا قياسية التجميع، وريقتها تعد ٧ أو ٩ أو ١١ وهي اعطليدية الشكل مدببة الطرف. تصلها جامد الصفحة الملساء، جمل الأخصار الزمعي || أزهاره صفراء اللون، تبتية اللولج، كثيفة التجميع، محورية وطرفية الارتكاز. أزهاره يستمر طول شهر حزيران.

١١٨٣٣ - رقائق Branchidae (S).
Branchidae (F). Branchidae (E).

فصيلة حشرات سوسية الشكل من غديات الاجنحة. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد معظمها غشيب وبعضها يعيش برقة النمل في جلوج الاشجار القديمة النشرة || أصنافها البلاد الحارة والاستوائية || أشهر اجناسها الرقطة.

١١٨٣٤ - رقائق Raffinose, Maltose (F).
Raffinose, Maltose (E).

ضرب من السكر، يوجد خاصة في ثفل الشندر وفي الجزر وقد يستخلص من بعض أنواع الاروكاليبتوس. بلوراته ابرية الشكل لا قياسية الرسم.

١١٨٣٥ - رقائق Chelys (S).
Chélyde (F). Chelys (E).

جنس سلاح من فصيلة الرقيات. أنواعها عديدة، جميعها مقترنة، كبيرة القدد، طولها يراوح من المتر إلى المترين. رؤوسها مفلطحة، أصنافها مستطيلة سفينة الجمل. ذنبها قليل الاحدياب، قرة عربي الشكل بين التنديد || قوتها الامساك والقتليات والقضاد والقرير والوزغ والحيات وهي من السلاحف البدوية التي تسرح في الليل. تعيش في المياه العذبة وحل غشاف الأبر.

١١٨٣٦ - رقائق Contrôle (F).
Control (E).

١١٨٣٧ - رقائق Crithagra (S).
Crithagre (F).

جنس طير من الجوامع غرغيات التأثير وفصيلة الشرشوريات. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ أصنافها معظم المناطق الحارة من البلاد الافريقية. ملجئها الحياتي جامي. اسرارها مغشوة الجلد. تألف الثنايات والبراري والمغشول المزدببة. قوتها الحبوب والبروز والحشرات الصغيرة حل اغشائها || اجسامها صغيرة القدد قلبية الشبه بالعمودي، تعلو من ١٣ إلى ١٦ سم. ألوانها مزودة وبنيفة يكثر فيها الاصفر والابيض والاشهب. مناقبها غرغوية، قوية. اجنحتها كبيرة. أذناها مقعرة الاطراف || اعرف أنواعه وأشهرها رقاق الحبيشة.

١١٨٣٨ - رقائق Crithagra abyssinica (S).
Crithagre d'Abyssinie (F).

طائر من الرقاق. موطنه بعض مناطق الحبيشة. يألف الثنايات والبراري. ملجئها الحياتي جامي. سره يبد أكثر من ١٠٠ زوج. قوته الحشرات والحبوب والبروز || جسمه صغير القدد تعلو نحو ١٥ سم. رأسه ألب الخضار الاس. دفاؤه وذنبه ألب الشفة السوداء. صفراء وزودو الى الصفرة. جناحه الى الشفة يملو تدبج اخضر. بطنه الى الرقبة المصانة اللولج. ذنبه مقعر الطرف || الانثى اصفر قداً من الذكر وأقل تزويجاً منه || يذئن في الاشجار وبرك كره منه عند تصالب الاناث. الاثى تحضن بتناوبة الذكر من ٣ الى ٥ بيضات حل ثلاث او اربع مرات في الحبل.

١١٨٣٩ - رقائق Commerce des cortéales (F).
Corn-trade (E).

هي التجارة بالمحاصل الزراعية.

١١٨٤٠ - رقائق Hibernation

فقد الحية وانكادتها بعض الوقت في الثنايات وفي بعض الحيوانات والبرويات || وهناك أيضاً الرقاد الصبي المعروف بالعمود الصبي، اطلبه.



رق



رقاق الحبيشة



رقاصة

صغيرة غرطية. اضطهادها ذلقة، مستقلة انفراج الشفق. زعانفها الظهرية والشرجية قاطبة تمتد حتى الذيل. الصدرة مستعرضة. الحوضية مخزومة. الذيلية ثاقبة، حلالية الشكل. لحوبها مأكولة متوسطة الصف.



رقاع قائل

١١٨٤٦ - رَقْشَاتُ ٥
Malacanthidae (S). *Malacanthidae* (F). *Malacanthidae* (E).

صلة اسماك بحرية بيضه من شاكيات الزعانف. اجسامها وانواعها الممرقة قليلة المد اعطائها بجار البلاد الحارة || اجسامها مبطلة، مستطيلة، شفافة، تطول من ١٨ الى ٢٦ سم. تتميز بهيكلها الشبيه بالصخر المهدب، وبرؤوسها الصغيرة الغرطية الشكل. الذيلية الى القسلة السمره الفضية الملوحة || اشهر اجناسها الرقاعة.



رقاعة

١١٨٤٧ - رَقْشَاتُ ٥ الرقاع: الحناء والقران.

١١٨٤٨ - رَقْشَةُ ٥
Fascia (F). *Faggot* (E).
الرقية والصناعة والكيش: اغشاب وافصان واشباب ترشع في مجاري الماء لاضراس السيل الطبيعي والتحليل بعض الماء الى مجرى آخر.

١١٨٤٩ - رَقْشَةُ ٥
Malilura (F). *Speckles* (E).
رقشة مستديرة تتألف اللؤلؤ السادة تكون على اجنحة البعير.



رقشة الاجاص

١١٨٥٠ - رَقْشَةُ ٥، كورينوم، خردكة ٥

Coryneum
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرقشيات. البوالة حادبة منها مؤذية وبضها شديد الالان || ويسته كتيبة محصورة للثآليل، حمية او عسبة الشكل، ككثافة كروية او شفوية مستطيلة، شفوية الانقسام، مفقورة. لونها الى الصبغة الخضيلة || احرف ولشهر انولاه ما يلي.

١١٨٥١ - رَقْشَةُ الْإِجَاصِ ٥، كورينوم الْإِجَاصِ ٥
Coryneum folitolum (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الاجاص والفلح وقد يصيب الجار والاناناد || مظهره الخارجى يقع لا قياسية الشكل تبدو سمراء اللون ثم لفضية تنفوخ بالنسج المتناحرة التي تبس وتتيزق || وهو على الجار يثور مبهمة ترسية السطح تركب البشرة وتقر في لب قنصله || يكثف كثير من الفطور المؤذية.



رقشة الوزيات (١)

١١٨٥٢ - رَقْشَةُ الْوَزِيَّاتِ ٥، كورينوم الْوَزِيَّاتِ ٥
Coryneum beijerinckii (S). *Cribra de amygdalis* (F). *Blight of stone fruits* (E). *Dörrfleckenkrankheit des steinobstes* (D).

فطر مجهرى يصيب اكثر الوزيات منها اللوز والكرز والقدراق والمشمش والغوخ || مظهره الخارجى يقع صغيرة لونها الى الحمر، اطرافها اسمر التهدب، فطرها يراوح من ٢ الى ٥ سم. تركب فصل الادران خضيل السج المتناحرة وتسبب يأسها واختناها ونحما || وهو على الاناناد والاناناد يثور لثولية ترسية، تركب السواد فطليا وتصلب سير السج في الاربعة || وهو على الجار يثور صغيرة مستديرة مفقورة السطح، كتيبة التجميع، لونها الى الملوحة ثم يتحول الى الاسمر. تركب البشرة فتدثرها وتصلب سطح اللب || افزاره لا قياسية القبع والتناحج لانها مخرقة ببولام شى تبدو الى البرية والمخج والمناح والاقليم || يكثف باستمال مائل يورده او غيره من الفطريات الحديثة.



رقشة الوزيات (٢)

١١٨٤٥ - رَقْشَةُ عَطَر ٥
Trichilia odorata (S).
نوع من الرقاع، شجرته تملو من ٥ الى ٨ امتار. اوراقه مركبة خماسية. ورقياتها اوليجية الشكل، تصليا جيل الخشار يطول من ٦ الى ١٥ سم. ازهاره طرفية الارتكاز، مستطيلة الذليبات، صفراء اللون، حطرية العرف المنسحب. ازهاره يستمر من اوتائل حزيران الى اواسط تموز.

١١٨٤٦ - رَقْشَةُ مُهَرَّج، خَشَبُ الْمَسْك ٥
Trichilia ametica (S). *Trichilia musquée* (F). *Rosa tree of Arabia* (E).
نوع من الرقاع، منته الجزيرة العربية، شجرته تملو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقه مركبة ثلاثية. ازهاره ليلكية اللون بكيفة التجميع، طرفية ومجورية الارتكاز. غشبه شديد الصلابة فانحر الصف حطر الزائفة يلى غشبه المسك || ازهاره وثماره طيبة مقبنة.

١١٨٤٧ - رَقْشَةُ آخَرُ الرِّاسِ ٥
Melanerpes erythrocephalus (S). *Melanerpe à tête rouge* (F).

طائر من فصيلة النقراريات. موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية. جسمه يطول نحو ٢٥ سم. يسلط نحو ٣٨ سم. لونه ريق الالوان. رأسه معتقه الى الحمره الشفافة. ظهره وجناحه وذنبه الى السواد العايق. اياهه وبلطه وركبها الى البياض الاخير. حقله عينه كسنتية اللون. منقاده وساقاه الى الزرقاة اسمره || اخلاطه رضية لكث كثير الحذر. قوته الحشرات واسارها ولا ينف من الجار البرية والزارمية كالنمائل والمصر والكرز والفلح والين ... يثخن شدة في تجاريف الاشجار المنفرة. الاثنى تبيض من ٧ الى ١٢ بيضات تحضنها وسجها دون الذكر الذي يئن لما اللداء.

١١٨٤٨ - رَقْشَةُ نَمَلِ ٥
Melanerpes formicivorus (S). *Melanerpe fourmilier* (F).

نوع آخر من الرقاع. موطنه بعض المناطق الامريكية اغصنها المكسوك وكرونية || جسمه يطول نحو ٢٤ سم. يسلط نحو ٢٧ سم. لونه الى السواد اللامع يطو تقيز ابيض في الجناحين والصدر والاطلين. رأسه الى الحمره الشفافة. منته سطوفة بقلادة كبريتية الصفار. حقله عينه صفراء. منقاده وساقاه الى السواد الاسمر || اخلاطه رضية، قليل الحذر، لا ينفى الاقتراب من الانسان. قوته الحشرات على اخلاطها واغصنها النمل. يتيزق يتخزن البلوط في تجاويف الاشجار فيؤن بذلك خذيرة فصل الشتاء والثلج || يثخن شدة في نيسان في تجاريف الاشجار و بين اوراق البوكا. الاثنى تبيض من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها وسجها دون الذكر الذي يئن لما اللداء.

١١٨٤٩ - رَقْشَةُ ٥
Uranometria (F). *Uranometry* (E).
الرقاعة تبيان نجم الرقيق كليا او جزئيا مع تحديد محورها الصادية.

١١٨٥٠ - رَقْشَةُ ٥
Malacanthus (S). *Malacanthie* (F).
جنس اسماك بحرية من شاكيات الزعانف وفصيلة الرققيات. انولاهها للممرقة ثلاثة موطنها بجار البلاد الحارة || اجسامها شبه شفوية الشكل تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم. رؤوسها

بيضة الشوزن ، قاعدتها اي رباعها المعتي أضيق من سنيتها اي طرفها .

١١٨٦٧- رقيب هو البطيخ ، اطليه .

١١٨٦٨- رقبيات Chelydae (S).
Chelydae (E). Chelydae (E).

فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاسل ، اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها قازية مقترمة دجاجة المسرح . تألفت اليها الطية الرأكة . دقائقها ملحوية القذبل والزغب . ذيلها بيضي الشكل نائي القتر الارسوي القالب || اشهر اجناسها الفرق .

١١٨٦٩- رقيب

هو الناظر من الحيات الخفية . ج رقب و رقبيات .

١١٨٧٠- رقيب الشمس راجع هليوتوب .

١١٨٧١- رقيب خداع

Tarbophis trompeur (F).
سنة من البوقاقيات تدعى ناظر مأكو ، اطليه .

١١٨٧٢- رقيب ذكة Marcotte (F). Laver (E).
النسن الذي يمسك ويرقد .

١١٨٧٣- رقيب ذكة Diagramas (S).
Diagramme (F).

جنس اسماء بحرية من كاملات العظام شالكات الزمانف وفصيلة القرضيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من اسماء حمار البلاء الحارة || اجناسها اعاليجية الشكل ، معتدلة التعليل ، تطلي من ١٨ من ٢٨ سم . اولها تراوح من البيرة الى الربة والطحلة جميعها فضية الموانج مرقوشة بالاسمر من الرأس الى الذيل . كثافة رقبها تفيض مع الانواع . تتميز ببيوتها الكبيرة الجاسطة ، بظهورها المخسورة المزهر وزمانفها الظهرية المستطيلة الشاككة القسم الاسامي || لحومها متوسطة الصنت ، مأكولة .

١١٨٧٤- رقبيات الصدك

Leptostracae, Phyllocarides (F).
رتبة من القشريات العليا ، فصائلها و اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها صلبة القدر قريبة الشبه بالاربيان الصغير . حوضها مزينة . ارجلها الصدرية متساوية ثنائية المخادف || اشهر اجناسها التبلانة .

١١٨٧٥- رقبيات المتأثير Tenuirostra (S).

Ténuirostres (F). Tenuirostra (E).
مرتبة من الطيور الجوارح عديدة الفصائل والاجناس والانواع . اشهر فصائلها المدهديات والنتقولات .

١١٨٧٦- ركباً هي الجربجر ، اطليه .

١١٨٧٧- ركاسة مُحَرَّزَة

Colydium crenatum (S). Colydia crénelée (F).
Colydium crenatum (E).
حشرة دامة قرصاية من فصيلة الركباجيات ورتبة مفصيات الاجنسة . تألفت الارواح والحدائق والجائان . شتاتها وبريقاتها تميز تحت لاه الانهار في سرايب الحشرات

١١٨٥٣- ركاسة الورديات * كورينيوم الورديات
Coryneum microstictum (S).

نظر مجهرى واسع الانتشار ركب بعض نباتات الفصيلة الوردية اعصها لورد والعليق والزعور والقتب || مظهره الخارجي للبحر مستطيلة بنفسجية او سمراء اللون ركب السوق القني والقصبان النامية تسحب جفاف وتنضج الطرية والصلابة التي لا تلبث ان تلوى || يكافح باقتطاع وحرق الاعضاء الموصولة وينضج النبات ، يمد تطهير جرحه ، يسهل الفطريات الفسالة القريبة المتناثر .

١١٨٥٤- رقبعة Panachure (F). Sreak (E).

يقع يبيض في خضرة النبات .

١١٨٥٥- رقب سمكة بحرية ونبوية من اللانس .

١١٨٥٦- رقبعة Fougerale (F).

Fern-patch, Fernary (E).
مكان يكثر فيه الخنشار والبرنس والخنشار وما اشبه .

١١٨٥٧- رقبعة حمراء Pie-rouge (F).

نمت وصني يبر من شكل غاص من الثوب البشر .
فاخرة الرقواء الحمراء هي ذات الثوب الاحمر عليه يقع يبيض .

١١٨٥٨- رقبعة سدقاء Pie-noire

البقرة الرقواء السدقاء هي ذات الثوب الاسود عليه يقع يبيض .

١١٨٥٩- رقبعة Grain, Texture

رقبة الشهي اصله الحكمي اللصوص . وتتمثل غاصة في التصير من صفت الخشب . فتقيل من غصب الجوز صلب القربة الناعمة وعن الازديت اصله الرقبة .

١١٨٦٠- رقبعة

الرقبة : شجرة عظيمة ، ساقها كالدبل ورقها كورق القرق ونمرا كالتين . ج رقب (السان) .

١١٨٦١- رقبعة Palmer elevé (F).

Raised palm-tree (E).
الرقبة : شجيرة طويلة التي تقوى اليه . ج رقب و رقاب .

١١٨٦٢- رقبعة

قال ابو حنيفة : الرقبة من اسرار البقول . وقيل : انها من العشب العظام تنبت مستطلة غضة كباراً وهي من اول العشب عربياً ، تنبت في السهل (السان) وما كان الجبازي .

١١٨٦٣- رقبعة Parterre (F). Flower-bed (E).

جزء من حديقة غصص لزراعة الزهور .

١١٨٦٤- رقب Hachurer


خط الرسم وتعبو بخطوط متوازية اليماء فارقة .

١١٨٦٥- رقب Ceu des vautours (F).

Eggs of vultures (E).
هو يبيض النصور حل اختلاف اجناسها وانواعها .

١١٨٦٦- رقب Obovale, Obov, (F). Ob-ovoid (E).

نمت تعريفى يطلق ، في علم النبات ، على كل ورقة



رقبة الورديات .



رقب



ركاسة مُحَرَّزَة

١١٨٨٤ - رِكَاةة (F). Fixisme (F).
الركانة نظرية بيولوجية تقول باستقرار الانواع الحيوانية ونباتية الحياة على حالتها .

١١٨٨٥ - رِكَب الْجَمَلُ هي الاثنية البيضاء، اطلها .
١١٨٨٦ - رِكَبَان
ركبان النمل: سوابقه التي تخرج من البطن في اوله .

١١٨٨٧ - رِكْبَة (F). Genou (F).
ضو الركبل الامامية بين الساق والركبتين .

١١٨٨٨ - رِكْبَة ذات الكَرْسِيَّ Rochbah
ركبة ذات الكرسي نيم نير من كوكبة ذات الكرسي .

١١٨٨٩ - رِكْع Flanc du montagne (F).
Flank of mountain (E).
ناسية الجبل . ج. ركوع وركع .

١١٨٩٠ - رِكْحَة Cour de ferme (F).
Farm-yard (E)
مساحة دار المزرعة . ج. ركح .

١١٨٩١ - رِكْوَر Doser (F).
To put the right quantity (E).
حدد نسبة المادة المضافة الى سائر اجزاء المركب . او
حدد كمية المادة المضافة الجائر لتقويها واستعمالها في متة
او ألف جزء من المادة .

١١٨٩٢ - رِكْوَرَة Rejet, Rejeton (F).
Shoot, Sprout (E).
الفصيلة النابتة على ابروة الشجرة او على جذعها .

١١٨٩٣ - رِكْسِيَة * (F). Rhexin (S). Rhexide (F).
جنس نباتات حولية وسمرة ، بيرة وازينية من فصيلة
المستويات . انما هو المعرفة حديثة متشرة في معظم اقطار
العالم . تعيش تحت هذه الاجمار في سراديب الحشرات
الخفية . قوتها طراسم الحشرات وبرازها والمواد النباتية
المتحللة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ،
ستمررة الرؤوس ، متباينة اذبان المشاوية الفصل .
كواسها واخمادها تلتك الانظار لما تتصل به من نقوش .
جرامها مستطلة . ارسافها رباعية المقل || اشهر اجناسها
الركاسة والديتية .

١١٨٩٤ - رِكْس، رِكْش، رِكْش Binage (F). Ploughing (E).
كري التربة لتفكيك تماسكها حول النبات . ولان تغيير
وطونها وتلطيف انفصالات الخمار وعمل الميكروبات
الحوائية .

١١٨٩٥ - رِكْل هو الكرات المروى ، اطله .

١١٨٩٦ - رِكْلَة Botte de légumes (F).
Bundla of greens (E).
الحزمة من البقل .

١١٨٩٧ - رِكْلَة Artefact (F).
Artifect, Artifact (E).
الركلة البقل الصناعي الذي يذو في الحبيرة الحيوانية او
الغلية النباتية بعد ساجتها بالثابت التي تقف على الحياة
وقد تشو بعض الشيء الماعالم الاسيانية .

الخافشة قوتها طراسم الحشرات والمواد النباتية المتحللة ||
جسمها صغير اقله يطول من ٤ الى ٥ م. قوتها الى السواد
الشمسي باستثناء الغديين فانها الى الجوزة تتركها عند
متصفها جلد سواد . رأسها كبير الجرم . حناتها بارزتان .
زبانها غطبان ، صفيا الاطراف . فكها ضليخان .
ظهورها قليل الاخدباب مستدير الخواصر اللاصت . غمدان
متسايتا التحزير القاطب . ارسافها رباعية المقل || لها
جبل واحد في الجول . تظهر الحشرة الجملدة في اوائل
الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتستكن
في النهار || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٦
الى ٧ م. جسمها سميكي التركيب ، محدوب الظهر ،
مبطط اللب ، سداسي الرواج ، حطلي اللون ، اسمر
الفاصل والرأس ، مهذب السكم من الجانبين في طور
الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في آخر
نلق ويته البرقة ضمن سلسلة خاوية الفشاء .

١١٨٩٨ - رِكَايَات * (S). Colydiidae (F).
Colydiidae (F).
فصيلة حشرات دامتة قرضاية من وثية لمديات الاجنسة .

اجناسها وانواعها المعرفة حديثة متشرة في معظم اقطار
العالم . تعيش تحت هذه الاجمار في سراديب الحشرات
الخفية . قوتها طراسم الحشرات وبرازها والمواد النباتية
المتحللة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ،
ستمررة الرؤوس ، متباينة اذبان المشاوية الفصل .
كواسها واخمادها تلتك الانظار لما تتصل به من نقوش .
جرامها مستطلة . ارسافها رباعية المقل || اشهر اجناسها
الركاسة والديتية .

١١٨٩٩ - رِكَال ، وَعْثَة Lazérite (F).
Lazarite (E).
نوع من التراب الصلصالي الاحمر اللون يكثر بربوده في
المناطق الاستوائية الرطبة . يتميز بوفرة ما يحويه من
الاولوين وكاسيد الحديد . وهو عند جفافه ، او في المراتع
المادة الرطوبة ، شديدة الاندماج قليل الخير والانتارة .

١١٨٨٠ - رِكْلِي * ، وَعْثِي * Lazérisque (F).
Lazaritic (E).
صفة الركال اي التراب الصلصالي الاحمر اللون الشديد
الاندماج .

١١٨٨١ - رِكَام * ، عَمْشِي ، مَكْشَر Cumulo-nimbus
Cumulo-nimbus
ضيمر تندر بالماءة او بالمر القريب مظهرها ككل
ملبدة متراكبة سماء اللون منخفضة الارتفاع تصل الى
امطار غزيرة .

١١٨٨٢ - رِكَام، رَمَل مَكْشَر Falun, Trex (F).
Shell-marl (E).
رواسب بحرية للملأ صدفية المنصر الرئيسي تحوى نحو
٦٠ ٪ من كربونات الكلس و ٢٠ ٪ من الرمل تتصل
كصدمات كلسية تقيه التربة والزرادة .

١١٨٨٣ - رِكَامَة Agglomérat (F).
Agglomerate (E).
الركامة الاعتلاط الطبيعي للغزات شق .



ركام



ركسية

Sympodita (F). ١١٩١٠ - رَمَّانَة

الرَمَّانَة القسم القاعدي من زوائد القشريات يتكون من فصليتين تتهيأ بمقدولين بمقدولين منفصلين .

Sympodique (F). ١١٩١١ - رَمَّانَة

Sympodial (E).
نمت تعريفي يطلق على كل عضو شكله الخارجي يماثل الرَمَّان .

Nesocia (S). ١١٩١٢ - رَمَّانَة

Nésocia, Nesokia (F), Nesokia (E).
جنس جرذان كبيرة القد أنثيا وحادية عايقة . أخطامها قصيرة مقطوعة . أذنانها مستديرة . أذنانها مستطيلة حراشفها الجلد . أرجلها مستعرضة . أطرافها قوية . مخففتها تشبه قبايع الخيزير . أركارها انفاق مستطيلة يتخللها دهاليز وصحير جانبية || أنثاه سبعة موطنها الشرق . أعرفها ركين سرنڤيد وركين البنغال .

Nesocia bangalensis (S). ١١٩١٣ - رَمَّانَة

Nésocie du Bengale, Nesokia, Rat du Bengale, Kok (F), Indian nesokia, Kok (E).
نوع من الركين موطنه البنغال وبورما ، طوله نحو ٥٠ سم . يعيش قرب الماء يحزن نحو ٢٠ كيلو من غلظت الجيوب يدغوا إلى الشتاء || أنثاه تضع من ٨ إلى ١٤ دوسة .

Nesocia bandicota (S). ١١٩١٤ - رَمَّانَة

Nésocie bandicot, Rat bandicot, Rat perchal (F). Nesocia bandicoot (E).
نوع من الركين موطنه سرنڤيد وبنغال وجنوب الهند . طوله يراوح من ٧٠ إلى ٧٥ سم . ظهوره أبيض اللون . يمشي الأشول ، قوائمه سيد ، أطرافه طويلة || أنثاه تضع من ٨ إلى ١٢ دوسة .

Fibriste (F). ١١٩١٥ - رَمَّانَة

نمت تعريفي يطلق على من يقر نظرية الركانة .

Rollulus (S). Rouloul (F). ١١٩١٦ - رَمَّانَة

جنس طير من عارة الحجلويات وفصيلة الطيوريات قريب الشبه من الجبل لكنه أشفق جسمًا وأطول ساقًا . قويه إلى الصبهة الكراديد يملو تأذير وذوئيم || أنثاه أربعة موطنها الهند وبورما حتى ملقه .

Brouter (F). To browse (E). ١١٩١٧ - رَمَّانَة

رم الحيوان الثبات : تناوله بفمه فأكله . وفي الحديث : « للبقير رَم من كل شجر » .

Brachynidae (S). ١١٩١٨ - رَمَّانَة

Brachynidae (F), Brachynidae (E).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة عديدات الأرجحة . اجنتها وأنواعها كثيرة العدد تعيش تحت الحجارة وفي انفاق تحفرها في التربة الحسنة لأنها تفضلها على غيرها . تحمل في مؤخر بطنها جرابين كبيرين ينفتحان على الترحيق تقذف منها سائل ينغمر في الهواء لونه إلى الطلعة البفراء يضيء في الظلام لأنه لا يتخلل من التدفقور .

Brachynus (S). ١١٩١٩ - رَمَّانَة

Brachyne, Bombardier (F), Brachynous, Bomber (E).
جنس عنافس وأجنحة ناهمة من فصيلة الرنانات . أنثاه

Reclusia (S). ١١٨٩٨ - مَكْلُوزَة

Reclusie (F), Reclusia (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات سديجات الارڤيل وبصلة الجنسنيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها عينة مقترنة . ملجئها الحياتي جاعي . أسرابها وافرقة العدد || أصدافها رقيقة و صغيرة القد ، بليطة ، حلزونة الإصقاب ، بحرية اللون أو زرقاء .

١١٨٩٩ - مَكْلُوس ، و مَكْلُوس

هو السوس ، نبات حسي طيب ، الحلبة .

Agréat (F), Aggregata (E). ١١٩٠٠ - رَمَّانَة

مجموعة مواد مختلفة سبائك

Empoter (F). To pot (E). ١١٩٠١ - رَمَّانَة

فرس في مركب أو في أصيص .

Stolon ١١٩٠٢ - رَمَّانَة

رشد حوائط ينبت من الأرض ويتبرز له جذور عند المفصل تنقيه من أمه فإذا فصل أصبح نباتًا مستقل .

Stolonifère (F), Stoloniferous (E). ١١٩٠٣ - رَمَّانَة

نمت تعريفي يطلق على كل نبات له ركب أو يتكاثر بركبه .

Rhacoditum ١١٩٠٤ - رَمَّانَة

جنس طيور مجهرية من الشحيات . أنواعها قليلة جميعها ربة فائقة تلتصق الحفصيص والاشخاب في المواقف الظلمية الرطبة || مظهرها الخارجي نواوس خلي ، متكويش الشكل ، كثيف التجميع ، أسمر اللون ينشج جوانب قمر الدندان وبالإبراميل والمواقع الرطبة من الألفية .

Racumin 57 ١١٩٠٥ - رَمَّانَة

مسروق سام يرتكز على مادة الكوبرين يستعمل القضاء على الجرذان والفئران . واستعماله قد يكون أضرًا في المواقف المظروقة من هذه البورويات أو طمسًا يشاق على يعض المواد التي ترضي لها هذه البورويات اغصها الخيزر المنقوع والبطاطا المسلوقة وبنايا السمك واللحم .

١١٩٠٦ - رَمَّانَة

Andropogon annulatus (S), Andropogon annulatre (F), Blue grass (E), Bartsgrass, Blutgrass (O), Barbone (I).

نبات عشبي بري حولي معروف ويطي من فصيلة النجيليات . أروته قرصية ممراسة الاشطاء . أوارته عصفية التصلب منتصبة . سنايله كثيفة الزغب والخمدل . يحسن اقتطاعه للعلف قبل الإصبال .

Puits (F), Well (E). ١١٩٠٧ - رَمَّانَة

في البئر ذات الماء .

Pileis (F), Piles (E). ١١٩٠٨ - رَمَّانَة

مجموعة أوتاد تنترج في قمر الماء لتدعيم أسس بناء .

Symode (F). ١١٩٠٩ - رَمَّانَة

Symode, Sympodium (E).

نمت تعريفي يطلق على كل جلع أو جهور متراكب السكم المتلاصقة المتزايدة ستة بعد ستة .



رَمَّان



رَمَّان



رَمَّانَة



رَمَّان البنغال



رَمَّان



رَمَّاتَة حَمْرَاءُ الرُّاسِ

والزرق والبيضاء || أما نسب هذه العناصر فلا قياسية لأنها تختلف من نبات إلى آخر وبين سائر أعضاء النبات الوسط || أما من الناحية الزراعية الاقتصادية ويوجه عام فتصوفا ما يحويه الرماد من مختلف العناصر الغذائية الرئيسية يمكن تلخيصه كما يلي :

نوع الرماد	قشوري	بوتاس	كلس
أخشاب المحالوات	٣٥ %	١٠ %	٣٠ %
أخشاب الصنوبريات	٣٥ %	٦ %	٤٥ %
سوق التبنوخ	٣ %	١٥-٢٠ %	٥٠-٢٠ %

١١٩٢٦ - رَمَّادَة في فريون القنجر ، اطباء .



رَمَّال

Rhinocryptus (S).
Rhinocrypta (F).

طائر وسيد الجنس والنوع من الجواثم فضيلة الطيوريات . موطنه جزر الزانج . تألف النباتات ونباتات مجاري الماء . ملجئه الخافي جامي . جماعته قليلة العدد . قوته الخمول والحشرات والبهائم والثمار الننية والبروز || جسمه صغير القند يعلو نحو ١٨ سم . رأسه متوج بفتحة لينة مرتدة إلى الوراء . جناحه مثلاً الطويل ، ذنبه مقعوم الطرف . رأسه إلى الشبهة القروية الخولج مثقبة بالايض . رداؤه وجناحه رذاؤه إلى الخصار الاسف . زوره وسعد إلى الشبهة . يطنه إلى الفتحة || يطن حبه في الانجرار الرقبة . الاثني تحسن بمناوبة الذكر من ٤ إلى ٥ بيضات .

١١٩٢٧ - رَمَّال

نحو ١٦٠ مثقفة في جميع المالم . تعيش تحت الانقاض والحجارة تقترس الحشرات الصارة وتقاتل عن نفسها بقصد فسقوري تغلق من غثي شرجها فينجبر عن رائحة كريمة منتنة .

١١٩٢٠ - رَمَّاتَة حَمْرَاءُ الرُّاسِ * ، لَدَدَالِ اَحْمَر

الرأس *
Brachyne creptans (S).
Brachyne creptans (F). Cracking brachynous (E).
حشرة نافعة من الرماتات . تألف الاراضي الجصية الجبلية . طولها نحو ٩ م . رأسها يوقم جوشها إلى الحرة . محمداً ويطنها زرق . مولج ثوبها إلى الحشرة المابقة . قوتها الاروق وبعض حشريات الاجنحة .

١١٩٢١ - رَمَّاح *
Pteridophora (S).
Pteridophora (F).

جنس طير من الجواثم نباتات التأثير فضيلة القرويات . انواعها المعروفة قليلة العدد اظهرها وامرغها رباح ابرتي (P. Alberti) . قدره قدر السمعة ثوبه إلى الصبهة يسر ويرق في الرأس والظهر والجناح والذنب ويترى ويصفر والصدر والبطن والالانك . يمتد برشتين لونها إلى الزرققة الجملية السقاء الخولج تنشيان عند مدني الرأس طول الواحد منها نصف طول الجسم .

١١٩٢٢ - رَمَّاح الحير *
Poisson-pique (F).

سمكة بحرية تسمى عداة ، اطباء .

١١٩٢٣ - رَمَّاحَة *
Polyodon (S).
Spatulaira (F). Polyodon (E).

جنس اسماك نهرية من الاسماك فضيلة الراسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها انهر وبجيرات المناطق النائية || اجسامها كبيرة ، مستطيلة ، شبه وشية الشكل ، طولها من ٣ إلى ٦ امار . مسوكة مرفوعة بشمل خطية التركيب ، نجمة الشكل . رؤوسها حلقة مجهزة بزوائد فخرولية تمتد كالربح فوق القف . افواهها كبيرة ، مستعرضة الاشكال || تصاد من اجل صيدها ابله الصنف اما لحوبا فيقتله قتل من يرغب فيها .

١١٩٢٤ - رَمَّاحِيَّات *
Polyodontidae.
Spatulairidae (S). Polyodontidae, Spatulairidae (F).
Polyodontidae (E).

فضيلة اسماك نهرية من اللاسات الجنايات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها انهر وبجيرات المناطق النائية || اجسامها مستطيلة شبه وشية الشكل . مسوكة مشعلة . رؤوسها مجهزة بزوائد فخرولية تمتد كالربح فوق القف . اشهر اجناسها الرماحة .

١١٩٢٥ - رَمَّاد لَبَّائِي *
Cendre végétale (F).
Vegetable ashes (E).

هو ما يبقى بعد حرق المواد النباتية . تركيبة المتصري يسم إلى فئتين : فئة العناصر الرئيسية التي تشمل البوتاسيوم والصوديوم والكلسيوم والمغنيزيوم والحديد والفسفور والكلريت والسليسيوم والكلور . فئة العناصر الثانوية التي تشمل البروم والمغنيزيوم والنياسم والزنك والكلوكيت والنيكل والباريوم والسترونيوم والزرنيخ والليثيوم واليتان والبراسم والسليسيوم والزرنيخ والكلور والفلاناديوم والباريليوم والفلاناديوم والفضة والليسيوم واليود والبروم

١١٩٢٨ - رَمَّاس *
Emballonura (S).
Emballonure (F).

جنس خفاش من حمارة الرماتات . انواعه اربعة جميعها صغيرة القند مستطيلة الرأس فخرولية ، مجمة الفتحة . موطنها الملايو . تسرح من القس إلى القنجر . قوتها الحشرات . تعيش جماعات قليلة العدد . تألف الانجرار الحرجية والناور .

١١٩٢٩ - رَمَّاسَة *
Emballonuridae (F).

حمارة من فضيلة الراسيات . اجناسها سبعة تتميز باذنانها المنفصلة عن الفتحة الجدي || اما اذنانها فهي : النمس والنمس والرماس والفتقان والنيوم والتضوف والتكليل .

١١٩٣٠ - رَمَّاسِيَّات *
Emballonuridae (S).
Emballonuridae (F). Emballonuridae (E).

فضيلة من الخفاش . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، تبسها عازرا الرماتات والمجيرات .

١١٩٣١ - رَمَّاحَة *
Arène (F). Arène (E).

الرمافة ميدان في وسط ملعب او نحو كان يصطلح . عند الاقربين من ميزان ورويان وفيرم . كمترك المبارزة والمجاجة والمصارعة .

١١٩٣٢ - رَمَّال *
Arenicole (F).
Arenicolous (E).

نعت ترمي في يطلق على كل حشرة تعيش في الرمال كالديدان وغيرها .



رَمَّاحَة



رَمَّال

١١٩٢٢ - رَمَالَةُ الْمُتَوَسِّط *

Ammodytes cicarellus (S).

Ammodyte cicarellae, Cicarella, Equille de la Méditerranée (F). Sand-cal, Sand-lance (E).

سمكة بحرية من فصيلة الرماليات . اصطناعها منظم شطوط البحر الأبيض المتوسط . تعيش متنمة في الرمال والأوساخ || جسمها شبه بيضي الشكل ، مستدق المقدم والمؤخر . طولها يراوح من ١٥ إلى ١٨ سم . رأسها صغير الحجم . خطمها غزيرولي الشوذن . فكها السفلي يتقدم العلوي . زعنفتها الظهرية مستطيلة الشكل ، لامناوية العرض ، تقطب الظهر واقسم . الأكبر من الذنب || توربا الى الزقوة الخفراء بعلها في جانبها جفة مستطيلة ثلاثية اللون ويملو الشرج بقعجة نحاسية || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

Ammodytidae (S).

Ammodytidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السمكيات شاككات الزعانف . اجناسها وانواعها المحروقة قليلة العدد . اصطناعها منظم شطوط بحر العالم || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم . اعطلمها ذقنة تتميز باستطالة الفك السفلي وزعانف الظهرية والشرجية وعلوية من الزعانف الخوضية . حراشفها شديدة الصغر تكن في المسك || تعيش منظم حياتها متنمة في الرمال والأوساخ ولا تقترب من الشطوط الا في ضلي الصيف وأغريف اي في زين التسرقة حيث تلتقي ببرمها في الرمال فيلتصق ببعضها || أشهر اجناسها البرانة والشمون .

١١٩٢٣ - رَمَامُ الرمام : البقل حين يثقل .

١١٩٢٤ - رَمَامُ *

Punica granatum (S).

Grenadier cultivé (F). Pomegranate-tree Carthaginian apple (E). Echter granatbaum (D). Granato, Melagrano, Pomo punico (I)

شجرة مثمرة من الرمانيات . غروبها عديدة معظمها مأكول الثمار وبعضها سائل اللحم شديد الحموضة يستعمل استعمال الحامض . يقال ان مهدها كان بلاد فارس وقد عمت زراعتها حوض البحر المتوسط وهي منتشرة في أمريكا من البريتن الى التشلي والمكسيك وأريزوله وكليفورنيا . وقد عرفها قدماء المصريين في عهد الفرعون رمسيس وارهاني ومن اشق الاسم القبطي « بن » والاسم العربي « رومن » ثم الاسم العربي « رمان » . تطو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها مساه . اوراقها بيضيلة الفسائل . فروجها منتصبة . خنثيا اسفر اللون لب الرقة صلب المود . اوراقها متقابلة عابدة ، فصلها رعيي الشكل مالى البشرة . ازهارها غشوية ، كلها صلب القلفة خامي التخصيص . تومجها خلصي التلات الاثريونية . اسديها عديدة . بعضها متعدد البريقات . ثمارها كروية خضرة مكللة باسنان الكاس ، تقودها صلبة متينة تبدو خضراء اللون ثم تتحول الى الحمرة مع اقترابها من الادراك ، تلتف بزود صغيرة تسمى الفرند يحيط بها لب مائل شفاف تلحمه غشوة رقيقة ملونة . ينمو الرمان في منظم اقاليم حوض البحر المتوسط . يرغب في الاراضي المتوسطة الانتاج السميكة الثنود المسكن رجا عند الانتقاء لانه يفضل الرطوبة على الجفاف || يتكاثر بالبذر والتغصن والقرية والتطعيم || ازهار جميلة الشكل ولون ترفق باسم جلتار ، وهي خضرة ، قايضة ، طاردة للعدان انحصا الثنود الوحيدة || ثماره للأكولة لليلة

رمالة المتوسط



رمان



رمان بري



رمالة



رموسه

العلم ويستخلص من ثماره الحامضة عصر بعض شراب الرمان || تومجات ازهار صياغية خضها احر . تقود ثماره ولها مائه وقوف جلوده قايضة وتستعمل في البذابة .

Androsæma (F).

Androsænum (E).

نبات زهره مراكب الصفرة والحرة . حبه يشبه حبه الباق يتدلى به يتنع داه المفصل ، اطلب هيفواريقون .

١١٩٢٨ - رَمَامُ السعال

هو الخشخاش الابيض ، اطلبه .

Balaustion (S).

Balaustier, Granadrier sauvage (F). Wild pomegranate tree (E). Balausto, Melagrano salvatico (I).

شجرة بريية مثمرة من فصيلة الرمانيات ، ساقها شاككة . اوراقها كثيرة الفسائل ، فروجها منتصبة ، لدنة ، شاككة . اوراقها كاملة ، متقابلة ، سنانية الفصل ، عابدة . ازهارها مزدوجة التركيب مفردة تسمى الرث . ثمارها كروية صغيرة طعرا نحو ٤ سم . فروجها حازرة مرة لا تكلل || ازهارها وثمارها صناعية تستعمل في الصباغة واللبانة .

Grenada (F). Pomegranate (E).

ثمرة الرمان تختلط باختلاف الظروف . منها فزرة الصارة ، طرية الفرك ومنها صلبة الفرك ، متوصلة او قليلة الصارة . وبعضها لللب الطعم والكتكة او ساحن او حازر او مز || عصارة الرمان تروي غليل النمل وتقيد الناقين ، تحليلها الكباري

% ١٦,١٤	مؤاد سكرية
% ١٧,٥٢	مؤاد استخلاصية
% ٠,٠٣	مؤاد دهنية
% ٠,٥٢	بروتايين
% ٠,١٧	حواض
% ٠,٧٣	ويساد

وقد جاء عن الامام علي قوله : « اذا اكثرت الرماله ذكركم يشبعها فانه دباغ للحملة وما من حبة منها تقوم في جوف رجل الا انارت قلبه واخرست شيطان الروسية » .

Punicaceae (S).

Punicaceae (E).

فصيلة نباتية قليلة الاجناس والانواع كانوا يعتبرونها في الماضي سبطا من الاسباط || أشهر اجناسها الرمان .

Rhombus maximus, *

Scophthalmus maximus (S). Turbot (F). Breet (E).

نوع من سمك الترس . سمكة يبيض من فصيلة الحروسيات وربية المسامات . اصطناعها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال . تعيش من اسماك اساطير التناف || جسمها شبه مستدير الشكل ، مبط الجرم ، يطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ويعرض من ٦٠ الى ٩٠ سم . تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن بما يحيل منها في الصفحة اليسرى من الرأس اي عكس ما تستل منه اسماك فصيلة المغلطح . جلدها غشن القشار مبهر النطق . صفحتها اليمنى بيضاء اللون تعلوها رقيقة سمراء . صفحتها اليسرى الى الصهبة يطوها توشح اسود ورقيقة سمراء . وصفها : زعانفها الى الصفرة تعلوها رقيقة سمراء . رأسها مبسط الجرم ، واسع الشفق ، فكها الاسفل يتقدم الاعل .

11954 - **رَمَكَة** (E). Ophthalmia (F). Ophthalmie (F). التهاب في عين الإنسان تسببه عوارض مختلفة بعد تشخيصها وتقرر معالجتها إلى الطبيب البيطري .

11953 - **رَمَد الكَرَم** هو ابتداء الكرمه ، اطلبه .

11952 - **رَمَد مُعْكَوَد**

Fluxion périodique, Ophthalmie périodique (F). Periodic fluxion, Periodical ophthalmia (E).

عارض مزمن يصيب الخيل في حينها فيؤذيها . يبالغ بالاستراحة ويستخدم بعض الأدوية الخاصة التي يقررها الطبيب البيطري .



رعيه

11950 - **رَمَرَام * ، وَهَرَم**

Chenopodium murale (S). Asardine des murs, Petta d'ole vraie (F). Wall goose-foot, Nettle leaved goose-foot (E). Gänsefüßel, Mauergänsefuß (D). Chenopodio dei muri, Zampa d'oca (I).

نوع من الأئينة وهو نبات عشبي بري طهي مسمر من فصيلة السمريقات. اللهه واجوده غراساً ما تبت في الأرض الكسبية . وهو مضاد للتشنج . يدر الحليب وينفع التشنج ويلهب باليدان المروية .

11956 - **رَمَر** (E). Symbol (F). Symbol (F).

رَنْز ج. رموز. الرموز هي العلامات المختصرة المألوفة على أسماء العناصر والمركبات الكيميائية || والرمز يدل على اسم العنصر وعلى وزن القلعة الواحدة منه أي الأتوم || وقد ذكرنا في الجداول التالية رموز أشهر العناصر مع أوزانها الأتومية . اسم العنصر رمزه وزنه الأتومي

Élément (F). Element (E).

Azote (F). 14,01 N ن

Nitrogène (E).

16,00 O ا

Oxygène (F). Oxygen (E).

Aluminium 26,97 Al لو

Antimoine (F). Antimony (E).

121,76 Sb كت

Hydrogène (F). Hydrogen (E).

1,008 H هـ

Baryum 137,3 Ba يا

Brome (F). 79,92 Br بر

Bromine (E).

Bismuth 208,98 Bl بت

Platine (F). 195,24 Pt بلا

Platinum (E).

Potassium 39,10 K يو

Bore (F). 10,82 B ب

Boron (E).

Fer (F). 55,84 Fe ح

Iron (E).

Zinc 65,38 Zn خ

Or (F). 196,24 Au ذ

Gold (E).

Radium 226,05 Ra يو

Plomb (F). 207,21 Pb و

Lead (E).

Arsenic 74,91 As ز

200,61 Hg هـ

Mercur (F). Mercury (E).

اسنانها صغيرة ، ذرية ، وراعية الصفوف . صناعها صخريتان ، نازحتان . زعنفتها الظهرية تمتد من قاعدة الذيل . زعنفتها البالية مستديرة الشكل || لها فاجر الصنف ، مرفوف فيه .

11943 - **رَمْبُوطَان**

نبات يعرف باسم ليتشي اصفر ، اطلبه .

11944 - **رَمْه** (F). Winged ant (E). Fourmi ailée (F).

الرمه : الحشرة ذات الجناحين .

11945 - **رَمْت**

Flottage du bois (F).

Floating of wood (E).

الرمث : خشب يغمس بطيه إلى بعض ويركب في البحر وهو الطوف . وفي إحدى الطرق المتصلة لنقل الإخشاب في الأنهار .

11946 - **رَمْت**

Caroxylon articulatum (S). Caroxyle, Caroxylon (F). Saltwort (E). Salzkrant (D). Carosion, Call (I).

نبات عشبي بري من السمريقات . ساقه وفرويه عقدية مدادة . أوراقه زاهة المتصل كانوا يستخرجون منه الصيدا .

11947 - **رَمْت نَتْن**

Caroxylon fastidum, Salsola fastida (S). Caroxyle fétide, Salsola fétide (F). Stinking saltwort (E). Stinkende saltkrant (D). Erba kali pudente (I).

نبات عشبي بري من السمريقات ، ساقه وفرويه مدادة ، أوراقه ملهامة المتصل الامرط النتن الرائحة . كانوا يستخرجون منه الصيدا .

11948 - **رَمْصِيّ** (E). Hasté (F). Hastate (E).

نمت رمسي يطلق على اتصال الاوراق الشبيهة بالرمح .

11949 - **رَمْصِيَّة ***

Doryanthes (S). Doryanthe (F). Queensland spear lily (E). Spearblume (D). Dorianto (I).

جس نبات "رَمِيّ" من فصيلة السوسنيات . أوراقه قرصية التجميع يوكية الشكل تمد نحو القمة . شراخه الزهري غليظ القاعدة متعصب يعلو من متر إلى ستة أمتار . ازهاره كبيرة القلعة تشبه الزنبق وتمادل جرمه || له نومان الزمعية السامية ورعيه بلرس .

11950 - **رَمْصِيَّة بَلْمِيَر** (S). Doryanthes palmeri (S).

Doryanthe de Palmer (F).

نوع من الرعيه . أوراقها تطويل من 175 إلى 250 سم . وتعرض نحو 15 سم . تصلها جيل الخضر الملقح يتغير بتقصه ذلقة حادة أسطوانية القمة السوداء . طليها نحو 15 سم . || شراخه الزهري يعلو من 200 إلى 240 سم . ازهارها متفردي هرمي ناجي . ازهارها قمية الشكل مستطيلة لونها إلى الحمرة .

11951 - **رَمْصِيَّة سَكَمِيَّة** (S). Doryanthes exotica (S).

Doryanthe élevée (F).

نوع من الرعيه اوراقها تطويل من 150 إلى 200 سم . وتعرض نحو 10 سم . تصلها جيل الخضر يفتي بمعة سوداء طليها من 5 إلى 8 سم . || شراخه الزهري يعلو من 6 إلى 7 أمتار يتغير بقصة كثيفة من الازهار الزنبقية الشكل الاسطوانية اللون .



درام

11962 - رَمَكَة Jument poulinière (F).
Brood-mare (E).
هي الفرس تتخذ للسل وليست من عتاق الحمل كالخمار.

11963 - رَمَلٌ الرمل: التليل من المطر. والرمل: خطوط في قوائم البقرة الرشيطة مخالطة لسائر ألوانها.

11964 - رَمَلٌ Sable (F). Sand (E).
مادة صخرية دقيقة الجرم تتجعد من تفتت الصخور الكلسية والصوانية ويصوت بنفس المرو || والرمل أنواع، أشهرها رمل البحر والرمل والرمل ثم العقيق والخشن والصواني والآخر ثم الرمل الفلسفي.

11965 - رَمَلُ الْمَقَالَةِ، حَصَى الْمَقَالَةِ Gravelle, Cystite calculosa (F). Gravel, Calculous cystitis (E).
شائبة صدرها تكون بلورات من بلورة الصودي في المثانة. تصيب خاصة الفجائين للمريضة السنية.

11966 - رَمَلُ الْمَتَاعِ هو العذاب، اطلبه.

11967 - رَمَلٌ مَحْلُوقِي هو الركام، اطلبه.

11968 - رَمَلَاءُ الرمال من التناج السوداء القوام رشاها أبيض. وأما التناج البيضاء فهي الرمال.

11969 - رَمْلِيَّ Sablonneux (F). Sandy (E).
كثير الرمل.

11970 - رَمْلِيَّةٌ هي الانزياح، اطلبها.

11971 - رَمْلِيَّاتٌ ° Ramalina (S).
Ramalina (F). Ramalina (E).

جنس حزاز ينتمي إلى فصيلة الرماليات. أنواعه المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم اصقاع العالم. مشاهير غمرية، متشعبة، مشرشرة. كونها إلى الحفاز البحري الباهت. أما الأنواع الثلاثة فهي:

11972 - رَمْلِيَّاتُ الْأَشْجَةِ °

Ramalina orsellina (F).
ينمو ويتكاثر على الصنوبر في المواقع الظليلة. ويستخدم كاد صباغية حمراء.

11973 - رَمْلِيَّاتُ الصُّغُر °

Ramalina des rochers (F).
ينمو ويتكاثر على صخور التيم والحضاب البحرية المرص.

11974 - رَمْلِيَّاتُ الْفَرْس ° Rameline du frêne (F).
ينمو ويتكاثر على لحاء المرائن وسطم الاشجار الحرجية والتزيينية والزراعية.

11975 - رَمْلِيَّاتٌ ° Ramalinaceae (S).
Ramalinaceae (F). Ramalinaceae (E).

فصيلة من الحزاز الذي ينمو ويتكاثر على لحاء الاشجار أو على الصنوبر وليس في التربة. مشاهير غمرية، شبه جلدية، لينة، متدلة النباة || اجناسها المعروفة قليلة العدد أشهرها الرملين الذي يعتبر قيس الفصيلة.

Silicium	٢٨,٠٦	Si	س	سيليسيوم
Sodium	٢٣,٠٠	Na	ص	صوديوم
	٣١,٠٢	P	فر	فسفور
Phosphore (F). Phosphorus (E).				
Argent (F)	١٠٧,٨٨	Ag	ف	فضة
Silver (E).				
Fluor	١٩,٠٠	F	فل	فلور
Quartz (F).	١١٨,٧٠	Si	ق	قصدير
Tin (E).				
Soufre (F).	٣٢,٠٦	S	ك	كبريت
Sulphur (E).				
Cadmium	١١٢,٤١	Cd	ك	كاديوم
	١٢,٠١	Ci	ك	كروميوم
Carbone (F). Carbon (E).				
Chrome (F).	٥٢,٠١	Cr	ك	كروم
Chromium (E).				
Calcium	٤٠,٠٨	Ca	كا	كلسيوم
Chlore (F).	٣٥,٤٦	Cl	كل	كلور
Chlorine (E).				
Cobalt	٥٨,٩٤	Co	كو	كوبلت
Magnesium	٢٤,٣٢	Mg	م	مغنيزيوم
	٥٤,٩٣	Mn	م	منغنيز
Manganèse (F). Manganese (E).				
Cuivre (F).	٦٣,٥٧	Cu	نح	نحاس
Copper (E).				
Nickel	٥٨,٩٩	Ni	ني	نيكل
Iode (F).	١٢٦,٩٢	I	ي	يود
Iodine (E).				

11957 - رَشَشٌ Bouquet de fleurs (F).
Bunch of flowers (E).
للانثاء، أي الباقة من الزهر.

11958 - رَمَصٌ Mine des carniassiers (F).
Cub (E).
وضع السباح.

11959 - رَمَصِيَّةٌ الرصية: آخر المير وذلك حين تحترق الأرض لأن أول المير الرصية ثم السفيقة ثم الدثية ثم الرصية (السان).

11960 - رَمَصِيَّاتٌ °، رَمَصِيَّةٌ °

Rhamphocle, Tife (F).
جنس طير من فصيلة التترييات. أنواعه المعروفة ستة. موطنها المناطق الحارة من البرازيل والبلاد المجاورة. تألفت الإدخال والحراج المبشرة الاشجار. نظامها العالي جماعي. اسرارها متطابقة المبدأ تكثر فيها القلة || اجناسها صغيرة القد. مثالبها غمرية الشكل صغيرة. اجنسها متدلة الحجم. أذنانها متوسطة القد، مغطاة الاطراف. اصباغها دقيقة. ألوانها جميلة الألوان يكثر فيها الأحمر القرمزي || جميع أنواعها تعيش على البنود وبغض اللآر السنية || تدان اشغالها في الإدخال على ارتفاع ٤ أو ٥ أقدام من سطح التربة. اناثها تضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها بمنوبة للذكور نحو ١٤ يوما.

11961 - رَمَكَة

الرَمَكَة، هي لون الرماد في الجبال. يقال في لونه رَمَكَة. والارمك من الجبال ما كان لونه الرَمَكَة، قال أبو حنيفة هو الذي اشتهت كتبه حتى دخلها سواد والاني رَمَكَة. ج رَمَك.



رمفول



رملين

خلى القشار يطول من ٤ الى ٨ سم. قريبا متضارب الاذن، اسن الرأس والكوسل، اصفر الطوران، اسمر السكة الشريية والجرايز. رأسها مستدل الجرم، غروطي الخلف. فكها قويان. حينها مشتركان. زباناها عجيلان مقوسان. ظهراتها سنان الشكل لا يلبس كامل البطن || لها جبل واحد في الحلق. تظهر الحشرة الجملة في ايار وتمشش حتى آب. تسرح في التبار. تسلف في تموز. تمتع الككن لطناً مربية الشكل تحت حله الاشجار اليابسة وبعت الجلالة || البرقة عت بلوطها لكالك الجسودي طولها نحو ٨ سم. جسمها شبه مربي الشكل، مبطط الجرم سداسي الراجب، حطلي اللون، اسمر الحاج، يمتد في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقضي طليقا من كل فلاف تحت السماء او تحت الجلالة.



زنوس ثاني اللون

١١٩٨٢ - زئوس
جنس نباتات حشوية برية حولية من فصيلة الحشويات
مشهورة باسم سلبج، اطليا.

١١٩٨٣ - زئوس
جنس طير من فصيلة القرقنيات. انواعه المروفة ستة
اطلها المناطق الممتدة الحارة من العالم القديم || اجسامها
صغيرة القد. منقدها غززية الشكل. اجنتها قصيرة،
مستطلة الانفرج. اذنانها متضاربة طوية. ارفها
قوية حشوية || قريبا الحشرات ويرقاتها ومكثها وما
اصطاعت اليه ميلا من البزور البرية خاصة في فصل
الشتاء || اعرف انواعها وظهرها الريز الكمل.



زئوس مصفدة

١١٩٨٤ - زئوس
Agathis pendulini (F). Réniz pendulini (F).
طائر من الريز. صغير القد، طولها نحو ١٣ سم. رأسه
وصفه وصوله الى الصبهة الرادية. بطة ابطاله الى انباض
الاخير. ظهره الى الصبهة الزبداء. قولده وياهره سيد
الصفة، يمش الحاشية الصبائية الحاج. كسلة حيه
سوداء تمتد من قاعدة المتقاد الى الاذن || اطناها تمتد من
الشرق الانوس الى اربية. يأنف المتاع وضفاف مجاري
الماء || قوته الحشرات والديدان ويزور النباتات البرية ||
يشن عشه في الانفاق والمائل والمغاص. الاثن تقع
نحو ٦ بيضات متحفها بمناوة القد نحو ١٣ يوما.



زئوس مكمل

١١٩٨٦ - زئوس
Prionurus (S). Prionurus (F).
جنس اسماك بحرية حاشية من شاكات الزعانف. انواعها
المروفة قليلة العدد. اطلها تمتد من بحار اليابان الى
امريكا الجنوبية || اجسامها الطليجية الشكل، مبططة،
طولها من ١٥ الى ٢٥ سم. رؤوسها مستطلة القد، محصورة
الانضمام الصغيرة للتأثرة. حينها صغيرة رقيقة الانكاز.
زماثها الظهريه مستطيلة، قليلة العرض. زماثها الخروية
تألف من منحس حصاد رضة شمع. الشريية تقابل
الظهريه والذيلية مقعرة. القليها تزوج من السمرة
الحطية الى السمرة السوداء يطويها في جواربها لطع قابلية
صفراء اللون او شقراء او سمراء || قوتها الاغصان البحرية.
لجوها متوسطة الصف، مأكولة.



زئوس

١١٩٨٧ - زئوس
Macroscopic (F).
Macroscopic (E).
هو ما يرى بالعين المجردة.

Rhamnusium (S).
Rhamnusium (F). Rhamnusium (E).
جنس حشرات من حشيات الاجنحة وصيلة القرقنيات.
انواعه المروفة قليلة العدد. اطلها تمتد من اليابان الى
اروبه || اجسامها متوسطة القد، طولها من ١٥ الى
٢٢ سم. اقلها ثنائية اللون. تسرح في التبار. تظهر في
اربعين ايار ويثبي حتى اواسط ايلول || عرضها الانتار
الحربية. يرقاتها غاشية تركب الحور والودار والزيرون
والقنصل. تنشر السماء وتسردب الشكر.

١١٩٨٧ - زئوس
Rhamnusium bicolor (S). Rhamnusium bicolor (F). Rhamnusium bicolor (E).
حشرة خاضعة حاشية من فصيلة القرقنيات وربة صفات
الاجنحة. تألف الحقائق والياطين والسياسات الحية
وضفاف مجاري الماء. غناصها غاشية تغطي من جمع
اجزاء النبات. يرقاتها غاشية تركب الجلود والافصان
تغطدها حتى الشكر. وقد تغفل الحور والصفصاف والذب
على غيرها || جسمها متوسط القد اعيف الشكل يطول من
١٦ الى ٢٢ سم. ثوبا ثنائي اللون، رأسها وكوسلها وبطنها
وسرازمها الى الاحمر القرميدي، ظهرها الى الزرة يعلوها
مواج بنفسجي عند الذكر. رأسها مستدل الجرم. حينها
كبرتات جاسطنان. زباناها كيربان مقوسان. فكها
ضليمان. ظهرها مشير الحور للانش، متتابع
التنيز القمدي القاطب. ارسافها رباعية القمل القاطرة ||
الاثن اكبر قدما من الذكر واقصر زبانا منه وابتد ثوبا ||
جملها ثلاثي الحلق. تظهر الحشرة الجملة في ايار وتمشش
حتى آب. تسرح في التبار. تسلف بعد ظهورها باسبينين.
توز الككن تحت قشور الجلود والافصان || البرقة عت
الادراك تمام طولها نحو ٢٢ سم. جسمها اسطواني الشكل،
عادم الراجب، اسمر اللون، اسن الرأس، ممش
الحلب الدقيق || طور الاكمال الذي يستمر من ٥٥ الى
٥٥ يوما ينقضي في آخر نفق استخرته البرقة ضمن صلجة
خاوية من المواد النباتية المحبوبة بالريال.

١١٩٨٨ - زئوس
Bonduc (Frute).
هو شجيرة القيقق حشية جسمه حشم البتق المروف اما
يقطع عن استدارة. يتغلق في ليلاب جامد حاجي اللون
يموي بسن الاذن الثالثة. وهو يتغير من المقويات
ويستعمل في المنة كدليل الحشيات وقد تيش الانامي.

١١٩٨٩ - زئوس
Saprophyte.
جهاز نباتي اولي نظري او جزئي يعيش على الفضويات
البالية.

١١٩٨٩ - زئوس
Saprophyzism (F).
Saprophyzism (E).
حالة الاجسام الضاحية التي تعيش على المواد الضوية
المتحللة.

١١٩٨١ - زئوس
Stenalia costacea (S). Stenalia costacea (F).
Stenalia costacea (E).
حشرة وائمة غاشية دامت من فصيلة الرديليات وربة
معدنات الاجنحة. تألف البراري والاحراج الخلقة.
غناصها تعيش على ازهار واوراق الصيوليات. يرقاتها
تتغير على المواد النباتية المتحللة || جسمها صغير القد،

١١٩٨٨ - وركلو * Oryzovore (F).

Oryzovorovous (E).

نمت ترميفي يطلق على كل حيوان أو طير قوته الأرز .

١١٩٨٩ - وركان * Araponga à trois cornes oues (F).

طائر يدعى أربنتا ثلاثي القرناس ، اطلب .

١١٩٩٠ - وركه * Rangifer (S).

Renne (F), Reindeer (E).

جلس حيوانات لينة بجرة من فصيلة الأيليات . أسطافها البلاد الباردة . قتها الأعشاب والأوراق وزينات الأشجار ذواها والقطاب والفقوس || تعيش جماعات ، اجلها يمد من ٢٠ الى ٥٠٠ نمر . تجوب معظم الاسقاع الثلالية في طلب القوت || اناها تفصح من يفتور الى يفتورين . لها نهمان : القرنة الثامنة والرنة الاسريكية .

١١٩٩١ - وركه أمريكية * Rangifer tarandus caribou (S).

Renne américain, Caribou (F), American reindeer, Caribou (E).

نوع من الرنة ، موطنها امريكا الشمالية ، ضروها اربعة اجسامها كبيرة القة تملو من ١٢٥ الى ١٤٠ سم . وزنها يراوح بين ١٧٥ و ٢٠٠ كيلو . أثوابها الى السرة يملوا مزج اصعب || تسجن بصورية . لا يمكن استعمالها كالأرنة الثامنة .

١١٩٩٢ - وركه شائعة * Rangifer tarandus (S).

Renne commun (F), Common reindeer (E).

نوع من الرنة ، موطنها البلاد الباردة المنتشرة من الترويج الى اقاصي سيبيريا . جسمها كبير القة يملو نحو ١٢٠ سم . رأسها غليظ مستطيل . قربها كيرة متشعبة تطول نحو ١١٥ سم . عنقها قصير . اذناها مستديتان . حياتها كيرقان . ثوبها قوي . انظافها صلبة فائرة تحكها من السير على الثلج . ذلها قصير طوله نحو ١٤ سم . ثوبها الى السرة يمتد مع اقترابه من شبح الظهور ، يمتل ويبيض مع البياض ومنه داخل القوائم || تسجن بسهولة وتستعمل استعمال البقر والاعمل .

١١٩٩٣ - وركجة * Rangia (S).

Rangie (F), Rangia (E).

جلس حيوانات بحرية من الرضويات صفحيات الخياشيم وصليقة الرغيات . انواعها المروقة قليلة العدد أسطافها اعول وصيات اهر امريكية الوسطى والجنوبية || اصداها شبه يضيئة اللون ، متصلة القة والاحدياب متساوية الصاويص ، لامشوية الافضل . لوها من الخارج الى البياض المنسد والخطوط بالكتني والجلاوي ، لوها من الداخل الى البياض القلوي اللامع || لوها مأكولة جيدة الصفت .

١١٩٩٤ - وركجوسيات * Protorthoptères (F).

Protorthoptera (E).

رنة حشرات منقرضة من طبقة مستقيبات الجناح . اساقفها تعود الى الحقبتين . الكروية والبردية من الاباج الارل || الاسم العلمي يرمز الى انها من اسلاف مستقيبات الجناح . ترتيبها الرثوي البسيط يدل على ذلك .

١١٩٩٥ - وركجيات * Rangidae (S).

Rangidae (F), Rangidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات صفحيات الخياشيم .



رنة شائعة



رغية الكشمش



رغية الوردة

اجناسها وانواعها الممارسة المروقة قليلة العدد . جميعها من علم بحار امريكية الجنوبية والوسطى || اجسامها متدلة القد . اصداها لامة متدلة البياكة يكثر فيها الشكل الاحليلجي || تعيش لاصقة بالصخور المنصورة . لفيها قليل الغزالي || اعرف اجناسها واشهرها الرغية .

١١٩٩٦ - وركشوس * Rhynchosia (S).

Rhynchosie (F).

جلس نباتات عشبية معمرة بيرة من فصيلة القرنيات القرانية . انواعها المروقة نحو ٧٠ جميعها من ثوب المناطق الحارة والاسوائية || سيقها مدادة او عارضة كثيرة الحوالق . اوراقها ورقية متعاقبة . انزعارها عشوي التسجيع ، ابطي وطرقه الارتكاز . انزعارها صفراء اللون او حمراء .

١١٩٩٧ - وركشيغ * Botryosphaeria

جلس فطور مجهرية من الرغويات يتميز بوليمته الفائرة تحت البشرة في نسج اللحاء . اصنافها غليظة مختلفة الاكفال . يونه بسيط التركيب والتسجيع ، يضي او احليلجي الشكل . اشهر انواعها الخلية رغيية الكشمش ورغية الوردة .

١١٩٩٨ - وركشيغ الكشمش * Botryosphaeria ribis,

الكشمش Macrophoma, Dothiorella mali (S), Black-rot du groseillier (F).

فطر مجهرى يسبب الكشمش ويضف الثنابات الاخرى كالوز والطاح والاجاص والكمرة والجوز والبرتقال والحامض واليوسى || مظهره الغاريبي في الكشمش يقع في صفة مميزة تسبب جفاف القشرة وذبول يمل اللوامي ثم يمتد زولا الى القند فافلس فاجلسد || وهو في الحشيات وسم يسبب صرح الفروع والساق يمد ان يسلب الجار يبقعه القفنة التي تبدو مهية اللون ثم يمر . وهو على الفلاح يقع رغيته انها الى السرة تركب ارياسه والانان فتصلب اقسام اللحاء المصابة وتسبب ارياسه يكافس يقطع وسرق الاعضاء المصابة فور ظهور الرصم او القبول ثم تطهير الجروح بمذيب سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١١٩٩٩ - وركشيغ الوردة * Botryosphaeria dothidea (S).

فطر مجهرى يسبب الوردة في فروع فيلوجيا || مظهره الغاريبي قروح بجنية جامدة بارزة مبرقعة تملو سطح القشرة وتشوه وتغور في الداخل فتصلب الفكر والاياف الحشية || يكافس بالقطع والحرق ثم التطهير بمذيب سلفات الحديد .

١٢٠٠٠ - وركد هو الجار ، واسدته رندة .

١٢٠٠١ - وركديو * Renne (F), Reindeer (E).

حيوان لين يجتر من فصيلة الايليات يدعى رنة ، اطلب .

١٢٠٠٢ - وركوين * Rendzine

اربة تميزت ببيود بعض البقايا الجصية المحيرة في مقاطها المحيرة . لشكلها واللها عبيدة يكثر فيها الاخر والاسفر والاحمل والافير والاسود .

١٢٠٠٣ - وركس * Calla (S), Calla, Choucalie, Calle (F).

Calla, Trumpet lily (E), Schweinewurz (D), Calla (I).

نبات عشبي بري جلموري معمر من سبط الرنيات



رئس النملع



رئس لوزق



رئس الكركرة



رئس لوزق



رئس لوزق



رئس لوزق



رئس لوزق

صنعا كيرتان ناشرتان . زبانا دقيقان ، صقيان .
ظهورها مثل الاحديان مطروح الطرف المنقش نحو
الاسفل . خدامها متناهات تتحيز ، كهيئة الجمل ||
لها جبل واحد في الخلف . تظهر الحشرة الجملة في اوتائل
الربيع وتبقى حتى اواسط الصيف . تتاهد بعد ظهورها
باسيوس وتنسج للكن مباحدي في سوق الجار القليلة في
قرب تخليجها تنسجها || البقية عند الادراك تمام طول
نحو ١٢ سم . جسمها دقيق الجرم مقوس الشكل ، تني
اللون ، وردي المويج ، اسود الرأس والرجل ، حاد
الرواجب ، تلبو ثلاثة خطوط من القدام حتى طور
الاكامل الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتغني ضمن
جراب من التراب والمواد الغضرية المحيية بالرمال .

١٢٠١١ - رئس

Poinciana (S).
Poinciana, Poincilliana, Poinciana, Poinciana (F).
Poinciana (E). Poinciana (D). Poinciana (I).

جلس شجيرات يرة وريانية من فصيلة الرقيبات ، انواعه
قليلة بعضها شاكك . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها
متعددة التجميع جميلة للشكل كالأقلام في لونها بالاحمر .
اشهر انواعه الزينية الرئس الجليل ورئس الملك .

١٢٠١٢ - رئس الملك ، و زهرة الجفنة

Poinciana regia, Delonix regia (S). Poinciana superba, Flamboyant, Fleur de paon (F). Royal poinciana, Peacock flower (E). Poinciana (D). Poinciana regia (I).

شجرة زينية من الرئس تملو من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم .
ساقها رفيعة شاككة . اوراقها عايلة ، ازهارها هري
الشكل . ازهارها كبيرة القند ، صيرها فلاح مستحب ،
لونها احمر برتقالي . اسديتها نارية اللون تلبو نحو ٢ سم .

١٢٠١٣ - رئس جميل

Poinciana elaeis (S). Poinciana elaeis (E).

شجرة زينية من الرئس تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم .
ازهارها جميلة للشكل كبيرة القند نارية اللون موزجة بالاحمر .
رغب في الاربة المخلعة والخصبة الانساج . نخل الرطوبة
المستحكة .

١٢٠١٤ - رئس

Poule couvresse (F). Brooding-hen (E).

هي الدجاجة الحاضنة للمروقة عند العلة بالقرقة .

١٢٠١٥ - رئس

Rhynchos (S). Rhynchos, Timon (F).

طائر من فصيلة الرقيبات طوله نحو ٤٢ سم . رأسه
صغير القند . منقاره مستطيل . منقعه دقيق وطويل . ريش
ظهوره وجانبه الى الصبغة تلبو خطوط سود متعرجة .
انفكته متوسط القند تنسج الاش . يلبه اشهل الريش .
يلبو برصعة نائلة . يألف الاصراج والنايات والمروج .
قوته الجار والحبوب والخضراوات والامشاب || الاثنى تبيض
من ٧ الى ٩ بيضات تحضنها وسعها نحو ٤ اسابيع . يقال
انها تحفن ثلاث مرات في السنة .

١٢٠١٦ - رئس

Cryptoridés, Timonidés (S). Cryptoridés, Timonidés (F). Cryptoridés, Timonidés (E).

فصيلة طير من الرواقص ، اجناسه وانواعه عديدة .
مهدا امريكة الجنوبية ، جميعها صغيرة القند مستطيلة
قصيرة القوائم || قوتها الحبوب والباز والامشاب والخضراوات .

وفصيلة الفلقاسيات . انواعه قليلة . اوراقه قرصية الانتشار
زنايدة متعرجة . رجعته الزهري خضراوي الانتاج . جناح
عينية الشكل متراكبة لينة .

١٢٠١٧ - رئس النملع

Calla palustris (S).
Calle des marais, Choualtes des marais (F). Bog-
saur, Water dragons (E). Aronstab, Echte schwe-
weinewurz (D). Dragonet, Pleda di vitallo
palustre (I).

لوع من الرئس يعيش في المنابع وعلى ضفاف البحيرات .
جسمه مراد . اوراقه قليلة الشكل طويلة الزناد المنسج .
شراعه يلبو من ٢٠ الى ٣٠ سم . شراعه ابيض الزهر
يبلو نحو ٧ سم . ثماره عينية متراكبة متراصة مرجانية
اللون .

١٢٠١٨ - رئس

Callis (F). Calla (E).

سبط من فصيلة الفلقاسيات .

١٢٠١٩ - رئس

Rhynchos (S). Rhynchos (F).
Rhynchos (S). Rhynchos (F). Rhynchos (S). Rhynchos (F).

جلس حشرات من فصيلة السويات . انواعه عديدة تعيش
على الاشجار المثمرة والحرجية . انواها زاهية الالوان .
اجسامها صغيرة القند ، ريقها غارة تلبو الارواق وتتص
الصارة . اشهرها ما يلي .

١٢٠٢٠ - رئس لوزق

Rhynchos caruleus (S). Rhynchos bleu, R. coupe-
bourgeois (F). Apple twig beetle (E). Zweig-
tecker (D).

حشرة صغيرة القند من السويات ، طولها نحو ٣ سم . لونها
ازرق لامع . سطحها رقيقاها سود . تركب الاشجار المثمرة
اغصانها الاجاص والفتح . تقتصم مع ريقها الجرام
الزهرية تنفسي عليها .

١٢٠٢١ - رئس الكركرة

Byctiscus betulae (S). Rhynchos de la vigne, Cig-
rier, Urber (F). Pear leaf roller (E). Rabensteher,
Zigarrenmacher, Zigarrenwickler (D).

حشرة من السويات صغيرة القند طولها من ٦ الى ٨ سم .
لونها اسفج يلبو مويج زرجدي . تنسج الاثنى مكها على
ورق الكركرة فينفس من ريقات صغيرة دقيقة مستطيلة
تقلل الارواق وتعيش في داخلها .

١٢٠٢٢ - رئس زنجري

Rhynchos bacchus (S). Rhynchos bacchus (F).
Rhynchos bacchus (E). Purpurroter Apfelfrucht-
stecher (D).

حشرة من السويات طولها راوح من ٥ الى ٦ سم . قوتها
قزوي الاث يلبو مويج بنسجي . تركب جميع الاشجار
المثمرة . تلبو الجرام الزهرية لاصاص صارتها تمسح
مكها الذي يتغني من ريقات تلبو الجار وتصلها .

١٢٠٢٣ - رئس مذهب

Rhynchos suratus (S). Rhynchos doré (F).
Rhynchos suratus (E).

حشرة خاضلة ثائرة من فصيلة السويات وذوية مدلمات
الاجنحة . تألف الجبان . غناضها تلبو برام الخوخ
والفلفل ويتنازل الزمار والنايات القليلة . ريقها تعيش
في الثمار وداخل حباتها || جسمها صغير القند يلبو من
٧ الى ٩ سم . قوتها ال اغصان النامي يلبو مويج ابرواني
ورق اشقر . رأسها كهيئة الجمل ينهي بترك مستطيل .

1٢٠٧٥ - زهكاه *
Melanospora (S).
جنس فطور مجهرية من السناحيات وفصيلة السناحيات .
أصابتها زئيفة ، بديئة ، بسيطة ، منفردة ، مستديرة ،
عابقة اللون || تكاثرتا بديوية الشكل لا تكاذا لها ،
سرية الانصلاص || يربطها ويسجد الخلية اسمر اللون .
أنواعها الملوقة ثلاثة وهي ما يبع .

1٢٠٧٦ - زهكاه الرطاب *
Melanospora styranophora, **Styranus stomontis**,
Dematophora glomerata (S).
فطر مجهرى تركيب جلور الكثرة والباطما ويبرها من
النباتات الثانوية || يعيش ويتكاثر في بيئة مشبعة
الرطوبة || مظهره الحاربي يبع حطية خلية مهددة لزينة
المكسر تركب الجلولر فتصلها || يكافح بتحفير الزربة .

1٢٠٧٧ - زهكاه الزرع *
Melanospora damnosus, **Sphaeroderma damnosus** (S).
فطر مجهرى يصيب القمح والشعير والشتوان || تركيب
سلاسل القصب وأحمد الصف زئيفها يبع فصية
خلية حطية تيق التمو وكذا الاسبال || أضراره زئيدة
عمودة ألا اذا وأفتها العوامل الطبيعية وأصاحها بنجاف
الزربة والجر .

1٢٠٧٨ - زهكاه المليون *
Melanospora asparagi (S).
فطر مجهرى يصيب المليون فؤوده وقد يصيب يباسه .
تركيب السوي في أي وقت كان فيضل إصاحها الحورية
ويسبب انقراض رؤوسها وأضرارها نحو الارض ثم جفافها
قبل اكمال دورتها الحياتية || يكالسم منه بدء ظهوره
باصتصاح اسد الفواطير الفعالة غير المركزة على التماس .

1٢٠٧٩ - زهكاه * هو قودج شوت ، اطليه .
1٢٠٨٠ - زهكاه * ما لا يصيد من الطير .
Impondérable (F).
Imponderable (E).
الرجل ما كان غير قابل الوزن .

1٢٠٨١ - زهيكه *
Impondérabilité (F).
Imponderability (E).
الرجلة عدم قابلية الوزن .

1٢٠٨٢ - زهيفون *
Tilletia
هو الزئيفة جنس فطور مجهرية .

1٢٠٨٣ - زهيفونيات *
Tilletiaceae (F).
Tilletiaceae (E).
هي الفئريات فصيلة فطور مجهرية .

1٢٠٨٤ - زهيج *
Seratus
هو السديم نوع من الفيرم ، اطليه .

1٢٠٨٥ - زهكاه *
Rohdea (S).
Rohdea (F). **Rohdea** (E).
تبات حشبي ، جلمودي ، سروي ، عمر ، وحيد
الجنس والنوع من فصيلة الزئيفيات . مهدد بنقش مناطق
اليابان || اوراثها جلدية الانتشاب ، اعليجية الأشكال ،
تعطين من ٧ الى ٩ سم . تصالحا عادمة الزغب ، مستعلة
الفرق . أضرارها سنبل التجميع ، يبرقع نحو ٣ سم .

تدثر في أنفوس تحضره بين الإدغال الكثيفة الشائكة .
اشهر اجنسلها الزئفوت .

1٢٠٨٦ - زئيفيق *
Rhynchichthys (S).
Rhynchichthys (F).
سمكة بحرية يربض من شائكات الزعائف وفصيلة المتفديات .
أصابتها المحيط الهندي والبحر الاحمر || جسمها متوسط
القد ، بطول نحو ٢٤ سم . رأسها كبير الجرم . عظمها
مدب الطرف . فكها الاصل يتقدم الاسفل . شفتها رحب
الانفرج . ميناها كبيرتان ، جاسطتان . زعنفتها الاقلية
فارقة . اسفانها سفنة اخضر شائكة . ثوبها الى الرمكة
القضية للمواج يمين في الظهر ويژهو في الجانبين ويغير
في البطن || لحمها جيد المصنف ، مرغوب فيه .

1٢٠٨٧ - زئكة *
Clupea (S).
Hareng (F). **Herring** (E).
جنس اسمك بحرية من فصيلة السابوقيات و أنوعه نحو
٩٠ ، موطنها بحار المال أخصها بحار المناطق الحارة .
نظامها الحياتي جاسي . سرها يد نحو مليون سمكة . تجرب
البحار في المياه الاقلية حيث تكثر القشريات التي تركز
عليها قوتها . وقد تدخل مصبات الأنهر || اعرف أنواعه
الزئكة الشائعة وزئكة البحر الاسود .

1٢٠٨٨ - زئكة البحر الأسود
Clupea pontica (S). **Hareng de la mer Noire** (F).
Pontica herring (E).

نوع من الزئكة ، موطنها البحر الاسود ، ظهرها الى
الزئكة الرسامية . جانبها الى الزئكة البحرية القضية
المواج تصلها خطوط دقيقة مستطيلة عابقة . بطنا فهي
اللون والمواج . سرها نحو نصف مليون . تصاد وتؤكل .

1٢٠٨٩ - زئكة شائكة
Clupea harengus (S).
Hareng commun (F). **Common herring** (E).
نوع من الزئكة ، ظهرها الى الزئكة ، جانبها وسطها
فضية المواج . تكثر في المحيط الاطلسي . نادرة في المتوسط .
سر بها من المليون الى المليونين . تصاد وتؤكل .

1٢٠٩٠ - زئكة * نبات دقيق (اللسان) .

1٢٠٩١ - زئئفيرة *
Renanthra (S).
Renanthra (F).

جنس نباتات أسية من فصيلة السطليات . أنواعها
الحمرقة حنة . أصابتها تمتد من الهند الى ماليزية . يكثر
ويجها في الغابات والاراحل الظليلة الربلة وقد انتشرت
زراعتها الزئيفية المركبة منه معظم الشعوب التي تمتد
بالازنداد || اوراثها مزدوجة التصفيف ، جلدية التماس
المستطيلة الضيقة . اضرارها كبيرة ، خاصة البتلات
المستطيلة ، شفلية التجميد الذي يبرو كالنثر . ألوانها
الى الحمر منها القرمزي والاربعوني والاحمر الزاهي والاديس
والوردي .

1٢٠٩٢ - زؤوح *
Echoudage (F). **Limo-wash** (E).
فتح الحر يصيب الزرع من حنطة وشعير بدء أضراره
يقصر حيه .

1٢٠٩٣ - زؤكاه *
Altitude
رداء كل شيء : ارتفاعه عن سطح البحر وسيله . ومنها
خطوط الرداء (Courbes de niveau) .



زئيفيق



زئكة



زئئفيرة



رداء الزراب



رداء الزرع



رداء الهليون



رداء

Rhynchophila (S).

الرهوكيليا

Glossosoma (S).

الغلووسومة

Agapezus (S).

الاجيوسوس

1٧٠٤٥ - رهنل Brouillard épais (F). Dense fog (E).
سحاب رقيق جرار رذاذ كثاني يغطي المناطق الجبلية .

1٧٠٣٧ - رهندي Rhodens amarus (S).
Bouvière (F).

سمكة نهريّة من فصيلة الحماة وفصيلة الشبليات .
أصلها بعض أجناس الشرب الاذن وادوية || جسمها صغير
القد يطول من ١٢ الى ١٥ سم . رأسها صغير الحجم ،
قصير الخيط . لكنها الاذن يتقدم الاسفل . زعنفتها الظهرية
مربعة شبه هريمية الشكل . زعنفتها الذيلية هريمية ، مقعرة .
ثوبها الى الشبه السمراء القضيّة المولج ، تميل في الظهر
ويبيض في البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

1٧٠٤٦ - رهناليمه Rehmannia (S). Rehmannia (F).
جسّ نبات مغربي التبريد على اسم العلامة الرومي جوزيف
رمان (١٧٧٩-١٨٤١) . انواعه عديدة رديسيه شبيهة
معمرة من فصيلة الحناكر ريات . سوقها خضراء لينة زاهية .
اوراقها متعاقبة ، نصلها اطيالي الشكل ، مسن الحافة .
ازهارها كبيرة الالوان ، فردية التجميع ، ابطية الازهار .
اشهر انواعها الزينية ما يليج .



رهنس

1٧٠٤٧ - رهناليمه سكاهيه Rehmannia alata (S).
Rehmannia élevée (F).
شبه معمرة منها الثرق الاصغر تمل من ١٠٠ الى
١٥٠ سم . اوراقها اطيالية ذلقة الزم الاخضر . نصلها
شعبي التكوين ، اسنله مدينة حادة . ازهارها كبيرة الالوان
تطول نحو ٨ سم . وردية اللون يطولها مزاج ارجواني
يميل مع اقترابه من قاعدة الزهرة || ازهارها صفي .

1٧٠٣٨ - رهنل Macronyx (S).
Macronyx, Alouette éperonnée, Sentinelle (F).
جسّ طير من فصيلة القربيات . انواعه قليلة اصلاها
البلاد الافريقية . تتميز باستقامة ذوارها ، اجسامها
مخترقة الالوان الى الاربدة ، ظهورها مائلة ، ريشها
ابيض الاطراف . يطير الى الصبية . ازوارها مطوية بالاسود
حواجب بعضها برتقالية اللون || انها تنزل في الاذغال
تبيض من ٣ الى ٤ بيضات ، لونها الى الزرقه يطولها يتبعج
جلوي || قوتها الحشرات والبرور البرية .

1٧٠٤٨ - رهناليمه لزجكه Rehmannia glutinosa (S). Rehmannia visqueuse (F).
شبه معمرة منها الصين رايان تمل من ٣٠ الى ٦٠ سم .
ساقها غنية لزجة . اوراقها خلية النخل ، جزوية الصفة
السفل ، غضراء البياض . ازهارها سفراء اللون موشمة بالاخر ،
اطرافها وردية ، حادها ابيض || ازهارها يستمر من
نيسان الى حزيران .

1٧٠٣٩ - رهنل و رهنل Pyrrhuloxia (S).
Pyrrhuloxia (F).
جسّ طير يهدن في مشقة من فصيلة القربيات . انواعه
قليلة تعيش معظم حياتها على الارض . اصلاها البلاد
الافريقية جميعها صغيرة الالوان . اجسامها تطول من ١٤
الى ١٥ سم . مناقيرها مخروطية قصيرة . وريشها سود ،
عاسرها ابيض ، ظهورها الى السرة القرمزية ، بطونها سود ،
غواظها الى الثيرة ، اجسامها الى السرة الزبداء . اذنانها
مائلة || انها تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة .
تلد في الثيرة بين الاذغال . حطنتها ثلاث بيضات ، لونها
الى الخضراء ، ثملها رقيقة سمر . ج رمان .

1٧٠٤٩ - رهناليمه متعلكة البزور Rehmannia arguta (S). Rehmannia à grains angustius (F).
شبه معمرة منها الصين . تمل من ٦٠ الى ٩٠ سم .
اوراقها السفل متعاقبة . نصلها لا تقاسي التناقل ، حلي
للبشرة . ازهارها تطول من ٦ الى ٧ سم . لونها الى الخضراء ،
قاعها بتنجسية ، اطرافها ارجوانية موشمة بالابيض .
زورها حادة الزوايا متعقبة .

1٧٠٤٠ - رهنل و رهنل Aasia (F). Foundation, Basis (E).
المرق الاسفل من الحائط .

1٧٠٥٠ - رهن Hypothèque (F). Mortgage (E).
حق حبي على عقار تأسس الدين .

1٧٠٤١ - رهنس Pressurage (F). Pressing (E).
شدّة الصبر لاستخلاص اللصطاع من المادة المقصودة .

1٧٠٥١ - رهن إكفالي Hypothèque conventionnelle (F). Conventional mortgage (E).
هو الرهن العقاري الذي ينطق بتراضي الدائن والدائن .

1٧٠٤٢ - رهنطي طائر يقال له غير السرة .

1٧٠٥٢ - رهن الحيازة Nantissement (F).
Cover mortgage (E).
هو عقد ضمان حبي ينعى بمقتضاه المدين على غيره من الى
الدائن ضمانا لدية سواة مال ثابت او متحول ويحول حقا
معيلا على هذا المال .

1٧٠٤٤ - رهنكوفيليات Rhyscopillidae (S).
Rhyscopillidae (F). Rhyscopillidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنسة . اجسامها
وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد
المتحدة الحرارة || اجسامها متوسطة الالوان سمراء اللون .
اجنحتها الامامية مقبضة او موزعة . اما الخلفية لشافة ،
مهدبة المختار الخلفي . قوتها الامامية مجوذة بمنحس
ظنبري الازهار || اسرارها تعيش في المياه الزاكية اما
طليقة او ملصقة بجلايب شبه البوية الشكل .
اشهر اجناسها :

1٧٠٥٣ - رهن حيازة العقار Antichrès (F).
Mortgage de revenus (E).
عقد بيع وضع اليد على عقار المدين استيفاء لقوائد المال
المطلوب .



رهنل

١٢٠٦٦ - رُوكَايْن مي النواجر .

١٢٠٦٧ - رُودَاد * ، رَهْوُ الْجَنَّةِ

Tetracteryx paradisae (S).

Tétractéryx, Grue de paradis (F).

طائر من طوالب الساق ونسيلة الكركيات . اصطناعه تشمل البلاد الأفريقية وبعض المناطق الآسيوية بجوها في طلب المرتع والمصيف والمشتق . يذبح صفه ويضرب بشفه في افريقية الجنوبية || جسمه كبير القند اجف القوائم مستطيل الذنب غرزي المنقاد . ثوبه الى الزبد الصنانية المواج باستثناء خط ابيض يمتد من قاعدة الفك الاسفل عبر الزور والمنتق ، الى اعالي الجرشن || ويته مهذل مرغوب فيه .

Pis de la brabls (F).

Dug of swa (E).

١٢٠٦٨ - رُوكَايْن

في ثمل الشاة خاصة .

١٢٠٦٩ - رُوكَايْن اششاب السقت وسوامد البحر .

Coueurs, Ratites (F). هُوكَاد

Ratites (E).

احد قسم الطير يشمل اربع فصائل التنايمات والنبنيات والرتقيات والكوريات . اما القسم الثاني فيشمل الجوريات .

Beve des bestiaux (F).

Slaver of cattle (E).

١٢٠٧١ - رُوكَال

لذاب اللواب ، وقيل لذاب الخيل خاصة .

Blennius pholis (S).

Pholis lisse (F). Shanny (E).

سمكة بحرية من فصيلة الجيريات . اصطناعها بعض بحار البلاد الحارة والمتحدة الحرارة || جسمها متوسط القند يطول نحو ٢٧ سم . رأسها مستطيل المكشك ، قصير الخطم ، صغير الشفق . صيادها صيرتات صامحات . زعنفتها الظهرية مستطيلة تمتد من الرأس الى القليل . الشرجية ضيقة مستطيلة . الصديتان مرويتان . الحوضيتان صديتان دقيقتان . الذيلية مقنطرة || ثوبها العلوي الى الطحلة السراء يعلوها مواج يراوح من الاخضر الى الفضي . يعلها الى البياض الاخير || لحمها مأكلي ، جيد الصنف .

Oiseaux nocturnes (F).

Nightly birds (E).

١٢٠٧٣ - رُوكَايْن

في الطيور التي تسرح في الليل .

Argentine vulgaire (F).

١٢٠٧٤ - رُوكَايْن

سمكة بحرية تقص فيفس نضي ، اطبا .

Caillé (F). Curd (E).

١٢٠٧٥ - رُوكَايْن

خيرة تلقى في الحليب ليروب .

١٢٠٧٦ - رُوكَايْن في تلك ، اطبا .

١٢٠٧٧ - رُوكَايْن هو الاربيان ، اطبا .

Ruppie (S).

Ruppie, Rupelle (F).

١٢٠٧٨ - رُوكَايْن

جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . انزعاجها المعروفة قليلة العدد مهاد الماء الاجاج في مناطق البلاد الحارة والمتحدة الحرارة . اوراقها غنية الرباط كأوراق النجيليات .

Hypothèque judiciaire (F). رَهْنُ قَصَّافِي

Judiciary mortgage (E).

هو الرهن القائم على حكم المحكمة أو المحكمين عمليا بالصيغة القضائية .

١٢٠٥٥ - رَهْوُ هو الكركي ، اطبا .

Grue (F). the Crane, Grus (E). رَهْوُ

المرح كوكبة نجوم جنوبية الميخ . نجوما متصلة العدد ، كاشفة الحركة .

Grue de paradis (F). رَهْوُ الْجَنَّةِ

طائر من طوالب الساق يسمى روكاد ، اطبا .

Phacocaea (S).

Phacocaea (F). Phacocaea (E).

فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السبقيات .

Mouton maigre (F). Lean sheep (E). رَهْوَم

تعريف صني يطلق على اللحم الملهوالة .

Ambia

١٢٠٦٠ - رَهْوَكَة

في المصلحة ، ضرب من سير اللواب .

Ahtacé (F).

١٢٠٦١ - رَهْيَدَة

هو التصحيح لقليل الحيك في كليل الحشرة ومعدا .

Merendère (S).

Mérendère (F).

لغات طبي دويص من فصيلة السورينجانيات ، جميل المذاق قريب الشبه السورينجاني . فريضة فيه غروبية الشكل . اوراقها من ٥ الى ٥ ، ناصها ثنائية تطول من ١٠ الى ١٥ سم . تكون مستقيمة في اول مهادا ثم تلف القرية . زهرها كبيرة وحيدة بتقسيمه اللون مدامية اليتلات تقوم على شمرخ متصب يرتفع من ٧ الى ١٢ سم . تنويرها يمتد نحو ثلاثة اسابيع ابتداء من اواخر آب || خواصها الطبية ومنافعها لا تختلف من خواص السورينجاني ومنافعها .

١٢٠٧٣ - رَهْيَلَة * ، دَهْبَرَا ، رَهْوُ

Labao rohita (S). Rohita (F). Rohita (E).

ديبرا وروبو من اصنافها الحديثة . نوع من اللبيس سمكة نورية يمرض تنتمي الى فصيلة الشبويات . اصطناعها اكثر انهر المحدث اصحابها انهار السنه وبرمانيه || جسمها كبير القند يطول من ٦٥ الى ١٠٠ سم . رأسها مستطيل الجرم ، مقطوم الخطم . فكها الاعل يتقدم الاسفل . صيادها كوربان ، مستديتان ، نازارتان . زعنفتها الظهرية واحدة شراعية الشكل . الصدرية سفلية الارتفاع . الذيلية نازقة . ثوبها الى الخضار الاسمر تشته سمته مع الاقتراب من شبح الطهر وتشت عنه البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكلي .

١٢٠٦٤ - رَهْيَلِيَّات * Calicicées (F).

Calicicées (E).

عمارة ظفور بحيرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . اجتماعها وانزعاجها قليلة تنضلل على الطحالب والحزاز . ومنها جنس واحد ينضلل على النباتات العليا يدعى قضاة .

١٢٠٦٥ - رَهْيَق هو الفرح .



رَهْيَدَة



رَهْيَلَة



رُودَاد



رُوكَايْن

نماها حول مسطبة متتابعة تتركز على اصلاح دجمة .
تتمثل في المسالك والاحواض كزحف للاهلاك انماية .



روئية مسطبة

١٧٠٨٦ - روث الخريق °، كونيوليوم الخريق °

Coniothyrium hellebori

ظفر مجهري يصيب اوراق الخريق فيفيضا . يظهر الخارجي بقع مستديرة او بيضية تركب سافة الفصل . تبو حشيتة ثم تنحرف الى السرة تسحب يراس واتحات النجس المنارة || يكلف عند ظهوره ، باستمال اسد السوائل النسيجية الخففة .



روث ابيض

١٧٠٨٧ - روث الزنبق °، كونيوليوم الزنبق °

Coniothyrium cancrum

ظفر مجهري يصيب بعض الزنبق انصها الجريس فايوكا والياهرة || يظهر الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحمى تركب نصل الارواق الجالنة . تبو طبلار اللين جزوية الخمار ان تلقى على النجس المنارة تسحب يباسها وانفصلها || يكلف عند ظهوره باستمال السوائل النسيجية الخففة .



روث الخريق

١٧٠٨٨ - روث الوردة °، كونيوليوم الوردة °

Coniothyrium wernsdorffiae

ظفر مجهري يترى فروع وفتاد الوردة فيسجلها . يظهر الخارجي بقع قمرية مسطبة تبو حشيتة اللين ، مربعة الخمار الاجرام ثم ترغ وتصلب كاللاكة || يركب الانواع الحساسة التي لا تتحمل قير البرد || يكلف بتقاصح الاضفاء الموصية ويظهر الجروح .



روث الزنبق

١٧٠٨٩ - روثون °، روتون °

مادة فائلة تستخرج من بطور يمش النباتات البترية انصها اللويس والجرار والبرية || يبي مادة شديدة القسالية يذابتها يقضي على جميع الحشرات وكل معط الامساك الصغيرة . اما لا يؤثر في الانساق والحيوان الناجس . مما جعل استعمالها في مكافحة الحشرات ينتشر بسرعة ممتدة .

١٧٠٩٠ - روث °، روتون °

Crotzin (F).

Dung of horses, mules, etc. (E).
سرجين الخيل وكل ذي سافر . امامة تسبه وفكة . وهو من الاسامة المضوية الثالثة الاستعمال . يذبه بنوع خاص الاتربة المشبعة لانه يخفف من تماسك ذراتها ويمنحها بالحرارة الثابتة من تخميره وبالنسار انذائية التي يحولها || راجع حبوب ما يحول الفروث من عناصر في مادة ساد .



روث الوردة

١٧٠٩١ - روثة °، روثة °

Bac des rapaces (F).

Bill of rapacious birds (E).

الروثة : منقار كوايس الطير . روية الخقاب : منقارها .

١٧٠٩٢ - روثة °، روثة °

Casio (F).

Casio (F).

جلس اسماك بحرية من شائكات الزمانف وفضلة الفرغيات . انواعه المعروفة نحو عشرة . اصحابها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة لثة ، اطيانية الشكل ، متدلة التبط ، طولها من ١٥ الى ٢٠ سم . زانفتها الظهيرة مسطبة روية المقدم ، شائكة القسم الامامي . زانفتها الدالية فاكية . الزوايا تختلف مع الانواع ، تكثر فيها الزفة وشفتاها والركمة القفصية والقطعة الرصاصية || جميعها جيدة الصنف ، مأكولة .



روث

١٧٠٩٩ - روثية °، روثية °

Robinia (S). *Robnier (F).*
جنس اشجار وجفريات حربية وزربية من فصيلة القرنيات الفرائية . انواعه عديدة سفيها متضبة شائكة ، اوراقها مركبة ريشية وربة التجعج . انزهارها عقودية الشكل ، ابطي الاكناز || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

١٧٠٨٠ - روثية مسطبة °، شجرة الجبراد °

Robinia pseudoacacia (S).

Robiner faux-acacia, Faux-acacia (F). *False acacia, Locust tree, Locust acacia (E).* *Gemeine schenkezie, Gewöhnlichekaskie (D).* *Robinia, Falsa acacia, Falsa gaggie (I).*

اعرف وأشهر انواع الروئية غروبية حربية متضبة متضبة الحجم والشكل ورازان الاثمار . اثمارها طولها من ١٥ الى ٢٥ م . وريقات اوراقها لا تقل عن ٧ ولا تتفرق ١٩ . انزهارها عناقيد كبيرة طولها نحو ٢٠ سم . انزهارها عريفة الزائفة عديدة الازران يكثر فيها الياض .

١٧٠٨١ - روثية ليرة °، روثية ليرة °

Robinia vitacea (S).

Robiner vitaeux (F).

شجرة من الروئية طولها من ١٥ الى ١٥ م . ساقها وريقتها قليلة الشوك . نوايسها غنية اللحاء الزائفة اعدادها حر . اوراقها كبيرة لثة . وريقاتها من ١٣ الى ٢١ م . نوايسها ابيض الصلعة السفل . عقودها الزهري متضبة الشكل يعمل من ١٥ الى ١٥ زهرة ودية اللين يطولها موانع ينشسي .

١٧٠٨٢ - روثية مهدبة °، روثية مهدبة °

Robinia kotschy (S).

Robiner de Kotschy (F).

شجرة من الروئية طولها من اللتين الى الثلاثة امتار . ساقها وريقتها سلسة . نوايسها مهدبة اللحاء اللينة الزائفة . اوراقها مركبة من ٩ او ١١ ودية مسطبة النصل المائل البصرة . عقودها الزهري يعمل من ٥ الى ٨ انزهار ، لونها ال الوردى المشج بالاحمر . قرونها مبطلة مهدبة الشفور .

١٧٠٨٣ - روثية ودية °، روثية ودية °

Robinia hispida (S).

Robiner rose, Acacia rose (F).

شجرة طولها من اللتين الى الثلاثة امتار . ساقها قليلة الشوك . فروعها كثيفة الغلب المشوك الاحمر اللين . وريقات اوراقها نمد . من ٧ الى ١١ م . نوايسها مائل البصرة . انزهارها ودية اللين . عقودها الزهري يعمل من ٩ انزهار عريفة الزائفة .

١٧٠٨٤ - روث °، روث °

Coniothyrium

جلس فطور مجهريه من فصيلة الفصليات . بكتيدتها كروية او مغلفة ، محبوسة للفتا ، سطحية الانتشار . جولا لحمي او متصلب الانسجة . شفيراته متشاككة . بوفانته يفضية او اطيانية ، صغيرة ، وحيدة الخلية ، سماء اللين || انواعه عديدة منها حبيوة لا تكفي ومنها ضارة تركب الاضفاء والارواق || اعرف انواعه المؤذية ما يتبع .

١٧٠٨٥ - روث ابيض °، كونيوليوم الكرمة °

Coniothyrium dipodiale (S).

Coltre, Maledie de la grêle (F). *White rot, Livid rot (E).*

ظفر مجهري يركب حبوب العنب التي اصحابها البرد .

١٢٠٩٣ - رَوَّثِل

Russula (S). Russule (F).

جنس تطور كاملة التركيب من فصيلة الفانيريتيات .
أنواعه المعروفة كثيرة العدد اصطلحنا معظم اقاليم المناطق
المعتدلة الحرارة . يعيش حسل المواد النباتية النضجة
في الغابات والحراج . اطرافه قرحة ، مضاربة ، يضاء
اللون او صفراء . يريه ابيض اللون او اصفر . بعض
أنواعه لتليق العلم مأكول والبعض الآخر كامن الصف
غير مرهوب فيه .



رَوَّثِل أَخْضَرُ أَصْفَرُ

١٢٠٩٤ - رَوَّثِلُ أَخْضَرُ أَصْفَرُ

Russula cyanocantha (S).
Russule verta et jaune (F).

نوع من الرَوَّثِل المأكول ، يكثر وجوده في الحراج الكثيفة
الاجنار . اروسه شبه مقعرة الشكل ، رقيقة الاطراف ،
لونها الى الخضار الاصفر البهيجي المولج .



رَوَّثِل شَدِيدُ الصَّمْرَةِ

١٢٠٩٥ - رَوَّثِلُ أَحْمَرُ

Russula foetida (S).
Russule fétide (F).

نوع من الرَوَّثِل الكامن الصف . يوجد في الغابات . ساقه
خليفة ، معتدلة الارتفاع . اروسه شبه قلسوية الشكل ،
مضلعة الحافة ، لزجة للمس ، كريمة الرائحة ، لونها
الى السرة الصفراء المولج ، قطرها نحو ١٥ سم .



رَوَّثِل مَأْكُول

١٢٠٩٦ - رَوَّثِلُ أَصْفَرُ فَاتِحُ

Russula claroflava (S). Russule jaune clair (F).

نوع من الرَوَّثِل الكامن الصف . يكثر في المواتع الرطبة
قرب صفات بجاري الماء . اروسه لزجة للمس ، صفراء
اللون ، قطرها نحو ٨ سم . ساقه يضاء . طعمه مطلق
البيدق .



رَوَّثِل مُشَبَّ

١٢٠٩٧ - رَوَّثِلُ الْمُتَالِيعُ

Russula paludosa (S). Russule des marais (F).

نوع من الرَوَّثِل الكامن الصف . يكثر في المناطق . اروسه
لزجة ، فارشة ، قطرها نحو ١٣ سم . لونها الى القوية
البهيجية المولج .



رَوَّثِل مُشَبَّ

١٢٠٩٨ - رَوَّثِلُ زَاهِدُ

Russula consobrina (S). Russule sobre (F).

نوع من الرَوَّثِل الكامن الصف . يوجد في حراج الصنوبر .
اروسه لزجة ، فارشة ، قطرها نحو ٨ سم . لونها الى
الرمادي الاسمر . رائحتها كريمة . ملاتها حامز .



رَوَّحَا

١٢٠٩٩ - رَوَّثِلُ سَمَّجُونِي

Russula azurea (S). Russule azurée (F).

نوع من الرَوَّثِل الكامن الصف . يوجد في الغابات .
اروسه مقعرة الوسط ، قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الزرق
السمجوني . اطرافها يضاء اللون . ساقه الى الطلطة
البحرية .

١٢١٠٠ - رَوَّثِلُ شَدِيدُ الصَّمْرَةِ

Russula nigricans (S). Russule noirissante (F).

نوع من الرَوَّثِل المأكول . يكثر وجوده في المناطق الحرجية
الظليلة . اروسه كبيرة فارشة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها
الى السرة اللثامة . ساقه مقعرة .

١٢١٠١ - رَوَّثِلُ عَكِيْقِي

Russula eardonia (S). Russule ardoinne (F).

نوع من الرَوَّثِل الكامن الصف . يوجد في حراج الصنوبر .
ساقه معتدلة الارتفاع . اروسه كبيرة ، قطرها نحو ١٠ سم .
لونها يتغير مع العمر ، يبدو اصفر ثم ينحرف الى الرمادي
ويتهيئ بالبنفسجي المتينق المولج .

١٢١٠٢ - رَوَّثِلُ مَأْكُولُ

Russula vesca (S).
Russule comestible (F).

نوع من الرَوَّثِل المأكول . يكثر وجوده في الغابات الظليلة .
ساقه قصيرة . اروسه قلسوية الشكل ، قطرها نحو ٨ سم .
لونها الى الحمرة الغنية المولج .

١٢١٠٣ - رَوَّثِلُ صَدْمِي

Russula sanguinea (S). Russule sanguine (F).

نوع من الرَوَّثِل الكامن الصف . يوجد في حراج الصنوبر .
ساقه معتدلة الارتفاع ، وردية اللون . اروسه الى الحمرة
الشموية ، قطرها نحو ٧ سم .

١٢١٠٤ - رَوَّثِلُ مَذْهَبُ

Russula aurata (S). Russule dorée (F).

نوع من الرَوَّثِل المأكول . يكثر وجوده في حراج السديان
والملول . ساقه معتدلة الارتفاع . اروسه فارشة ، مقعرة
الوسط ، صفراء اللون ، خضية المولج .

١٢١٠٥ - رَوَّثِلُ مُقَيِّي

Russula emetica (S). Russule émétique (F).

نوع من الرَوَّثِل الكامن الصف . يوجد في الغابات .
ساقه يضاء اللون . اروسه فارشة ، برتقالية اللون ،
قطرها نحو ٨ سم . طعمه حريف المذاق مقهي .

١٢١٠٦ - رَوَّثِلُ مَكْلُوحُ

Russula adusta (S).
Russule brulée (F).

نوع من الرَوَّثِل المأكول . يكثر وجوده في حراج السديان .
ساقه قصيرة . اروسه فارشة مقعرة الوسط ، صفراء اللون
كلها مغفرة ، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم .

١٢١٠٧ - رَوَّثِلُ لَوْرِي

Russula integra (S).
Russule intégrè (F).

نوع من الرَوَّثِل الكامن الصف . يوجد في حراج
الصنوبريات . ساقه قصيرة ، يضاء اللون . اروسه
مقعرة الوسط قطرها من ٥ الى ٧ سم . لونها الى الكسفي
الاصفر المولج .

١٢١٠٨ - رَوَّثِلُ هَشُّ

Russula fragilis (S).
Russule fragile (F).

نوع من الرَوَّثِل الكامن الصف . يوجد في الغابات .
اروسه مقعرة ، هشة ، سريمة الطعم ، قطرها من ٣
الى ٤ سم . لونها الى الودي الاجبر المولج . طعمها حامز
المذاق .

١٢١٠٩ - رَوَّحَا ، رِيَّة ، تَنْدُو ، تَعَاكَة آمْرِيكِيَّة

Rhen (S). Nandou (F). Nanou (I).

جنس طير من فصيلة التماميات . أنواعه ثلاثة ، موطنها
أمريكة الجنوبية . تتميز بنمذ قهقريها حل الطيران . يبلغ
متوسط ارتفاعها نحو ١٦٥ سم . الذكر اصغر رافع من
الانثى || ريشها مودل نام . عنقها مستطيل القد شال

١٧١١٨ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ السُّفَّاحِ* ، سَخ السُّفَّاحِ*
Rosellinia radiparda (S). Pourridé du pommier (F).
 فطر مجهري يصيب جلود التفاح فيفينا. مظهره الخارجي
 عفن أبيض ثم اسفر ركب جلود التفاح فيصطب جرادتها
 ويسيب انحلالها || اما اوزك التفاح المصابة فيبدو
 متكتفة ، متصل ، قامة اللون ، قليلة الحوية || يكالغ
 باستعمال التنقيط والتطهير.



رود

١٧١١٩ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ الثُّوتِ* ، سَخ الثُّوتِ*
Rosellinia aquila, R. byssidea, *Sphaeria aquila*,
Trichosporium fuscum, *Spororchium fuscum* (S).
 Pourridé du mûrier (F).



رُوزَلِيَّةِيَّةُ البُن

فطر مجهري شديد الاذى يصيب جلود التوت فيصطب
 وقد ركب جلوح بعض الاجنار الحرجية اليابسة اعصابها
 السديان واليترو والصنصنات واليرور || مظهره الخارجي
 عفن ابيض يشاء وطلع اسمر ، ركب جلود التوت
 فيصطب حل جرادتها ويسيب انحلالها ويوت الشجرة . لكن
 في الآرية المنحنية الرطبة ويفط في زن الاوراق .
 يكالغ بتصفيف القرية واستعمال الاجنار الحية وتطهير
 مولاتها بالكلس الحراق وسلفات الحديد .



رُوزَلِيَّةِيَّةُ السُّفَّاحِ

١٧١٢٠ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ السُّدِيَّانِ* ، سَخ
 السُّدِيَّانِ*
Rosellinia quercus (S).
 Pourridé du chêne (F).



رُوزَلِيَّةِيَّةُ الثُّوتِ

فطر مجهري يخمد الانتشار يصيب جلود السديان
 ويقره من الاجنار الحرجية كالقايوب والاسعدان والزنان
 والصنوبر والتوت || مظهره الخارجي عفن شفاف ثم
 اسحل قاسر يقسم مشائل الاجنار الحرجية المذكورة اعلاه
 فيركب جلورها ويصطب ويصق باء الاذى . اما
 السديان فانه يذبه حتى حر عشر سنوات .



رُوزَلِيَّةِيَّةُ السُّدِيَّانِ

١٧١٢١ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ الكَاكُو* ، سَخ الكَاكُو*
Rosellinia pepo, *Dematophora* (S). Pourridé du
 cacaoyer (F).
 فطر مجهري يعيش ويتكاثر في البلاد الحارة يصيب
 الكاكو ويركب جلود الحشبات اصفرار
 الاوراق وسقوطها ويؤخر نمو الثمار ويصطب || مظهره
 الخارجي كتلة من العفن الاسود المذهب بالاصهب والاسفر
 ركب الجلود فيصطب || يكالغ بالاستعمال والتنقيط
 وتطهير.



رُوزَلِيَّةِيَّةُ الكَاكُو

١٧١٢٢ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ الكَرْمَةِ* ، سَخ الكَرْمَةِ*
 رُوزَلِيَّةِيَّةُ الشَّجَرِ المَصْرَةِ* ، سَخ
 الشَّجَرِ المَصْرَةِ*
Rosellinia necatrix, *Graphium necatrix*, *Dematophora*
necatrix (S). Pourridé de la vigne, P. des
 arbres fruitiers, *Blaque* (F).



رُوزَلِيَّةِيَّةُ الكَرْمَةِ

فطر مجهري ركب بعض التباينات الزراعية فيفينا ،
 منها الكرية والاسباس والموخ والبنان والقرز والحشبات
 واشندرو والبطاطا والبقول والورد والارض شوكي || مظهره
 الخارجي طفوة يشاء تسمى الجلود فيصطب جرادتها وتسبب
 انحلالها وموتها || يكثر في الآرية الطينية الرطبة || يكالغ
 بتصفيف القرية نصرف المياه الزائدة ويثر الكلس وطهر
 في المياقل والقرامات المرمية . ويصطب مفلور الكرم
 سحتا في القرية بمعدل ٢٥٠ غ لتر المربع الواحد .



رُوزِيَّةُ مُجَمَّع

١٧١٢٣ - رُوزِيَّةُ مُجَمَّع*
Rozites caperata (S). *Rozites ridé* (F).
 فطر مأكول من فصيلة الفارغيتيات . يوجد في غابات

من الریش . رأسها صغير مبسط ، متقاربا مغلطع . تألف
 البراري الشاسعة الاطراف والحشبات القليلة الاجنار .
 قوتا الاصاب والخرافات . تعيش جهافات قليلة العدد ،
 تتألف من ٦ او ٧ ذات بقودها ذكر واحد || الاثني
 تعيش نحو ٢٠ يضة . النسوما صاحي الشكل تنلفه
 بالحشيش الناعم . الاكثار وحده يحسن البيض من الترويب
 الى الترويق .

Spiritualismo (S).

Spiritualism (E).

الروسانية مذهب القائلين بان النفس غير حوية .

Melogrammatodes (F).

عارة فطور مجهرية من فصيلة الحشريات وربية اقيات
 تتميز بويضة مصادية تبدو غائرة في التمسج ثم بارزة .
 اصحابها سحابة . يعلها مختلف التمسج || لها جنسان
 مؤنثان هما الانثوسية والزغبة .

Rodge (F). *Grinding* (E).

الرودية القيام بميلة الردج .

Ontogénese, *Ontogénie* (F).

Ontogenesis, *Ontogeny* (E).

الرودية علم نشو الافراد وتطويعم .

Fusus (S).

Fusum, *Fusus* (F). *Fusus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات منليات الابليل
 وفصيلة البصليات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٦٠
 منتشرة في جميع بجان البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اما
 انواعها المنقرضة ومدها نحو ٥٠٠ فطها من مصبرات
 الحفة الجيرية || اصداها شبه يشية الشكل ، بحلة
 الاالوان والزينة ، حلزونة ، مسطلة القوية التي تبدو
 كالزباب . اطولها ذراع من ٥ الى ١٦ سم . || جميعها
 منقرضة وقد كتبت اصداها غيرها من الرخويات .

١٧١١٥ - رُوزُ هو السديان المزله ، اطلبه .

١٧١١٦ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ* ، سَخ

Rosellinia

جنس فطور مجهرية من البصليات وفصيلة البصليات
 تتميز باصاها القسمة السود التي تنشأ في وسط ليفة
 الفطر . يوغها سيد الخلية اسر اللون تحبث كاتمسطيلة
 تعصب النكات الدقيقة . معها يرتكز في اهل التعليل
 الحرفي الشكل || اشهر انواعه ستة تلي .

١٧١١٧ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ البُن* ، سَخ البُن*

Rosellinia bunodes (S). Pourridé du caistei (F).

فطر مجهري يعيش ويتكاثر في البلاد الحارة . يصيب
 البن والاشجار والكاكفور والحشبات || مظهره الخارجي
 كتلة من العفن الاسود المذهب بالاحمر . وهو ركب الجلود
 المنقرضة في الثآرب فيصطب اللحاء والفشكر وقد يدخل
 حتى التلب فيصطب بلون زيتي يحل الى السود . اما في
 الجلود فانه مبسط الجردة ويصطب عليها || يكالغ
 باستعمال الاجنار المروية وتطهير القرية بالكلس
 الحراق وسلفات الحديد .

الادراك التام طول من ١٨ الى ٢٢ سم. فوها الى البياض الاخير تملو ماجة طحلاء. رأسها الى الزبدية السوداء. فكاهذا ذربان غليمان، رواجها قصيرة سمراء اللون. شربها ثنائي السرك.

١٢١٣٠ - رَوْشَن *
Aile d'Insecta (F).

Wing of Insect (E).
هو جنح الحشرة وقد استند بالتصميم الى حشرات رتيبة حشرنيات الانجسة. اشكاله مدنية تختلط باختلاف الفصائل والانجاس والانواع.

١٢١٣١ - رَوْشَن غِيْمَدِي *
Elytre (F).

Elytron, Wing-shard (E).
هو الظهران الثلاث الغنمدي الذي يلحف الجناح في بعض الحشرات.

١٢١٣٢ - رَوْشَنَة ، هَمَكَن *
Parasitisme (F).

Parasitism (E).
حالة الكائن الحي الذي يعيش طفيلياً على غيره من الكائنات الحية.

١٢١٣٣ - رَوْشَنَة
Parc (F). Park (E).

حديقة واسعة فيها الشب والام. فاذا كانت في احوالي البراق والغفاف فهي سلق وان كانت في الرطالات فهي روضة وروية. ج. روض.

١٢١٣٤ - رَوْشَب *
Ancillaria (S).

Ancillaire (F).
الواحدة وروية. جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الاربل وفصيلة الطسربيات. انواعه المعروفة قليلة الممد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش على رمال الشطوط العميقة || اصداؤها ماسية ، تعيش على اعطيجية ، ذلقة الاعتقاب الملهمة ، فصحاتها قليلة التميز الطولي التميل الخطوط. الوانها زاهية. احطامها انبوية دقيقة مستطيلة.

١٢١٣٥ - رَوْق *
Corne (F). Horn (E).

الروق : القرن. « كالقور يسمي انفه برقه ». والاروق ذو الروق اي القرن.

١٢١٣٦ - رَوْقَش * ، عَصْفُور مَاسِي *
Pardalotes punctatus (S).

Pardalote punctué, Oiseau-diamant (F).
طائر من الجوليم سنيات المناقير ينتمي الى فصيلة الصردييات. موطنه بعض مناطق استرالية. يألف الغابات واحراج الاراكاليثوس. ملجته الحياتي جماعي. جماعته متوسطة العدد. قوته الحشرات والبيزور || جسمه صغير القد ، مكردم الشكل ، يطول نحو ٩ سم. قصير المقاد والجناح والقدنب. ثوبه الملوي الى الخضار الالامس تملو رقة ييشاه فضية الموالج تتلاو كانها قطع من القلس. ساجياه وزودو وصودو ويعل الى البياض الجمالي. متقادة شديد السمرة. وصفاه واصابه الى السمرة الحظية || يذن القوموه في الجانف الشديدة الاتحاد. اقوموه نفق يطول نحو ٦٠ سم. ينتهي بمجرة قطرها نحو ١٥ سم. يبعثها باليات الاراكاليثوس وبعض احشائش الناعمة الاناق تحفن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات. الترخيم يستمر نحو اسبوعين.

الصنوبر ، يعيش على المواد النباتية المنطحة. ساقه مستدلة كشخانة والارتفاع ، غيرا اللون يملوها موالج تبي ، طولها مجده التفرق. نكته صيرانية الشكل ، صفراء اللون ، ذعية الموالج ، حيدة الحافة ، قطرها نحو ١٥ سم. احراسها الى الصفار الباهت || لحية جيدة الصنف ، مأكولة.

١٢١٣٤ - رَوْسَم
Cachet (F). Seal (E).

١٢١٣٥ - رَوْشَة *
Rochas (S).

Roché (F). Rochas (E).
جنس نباتات بحلية مصمرة من فصيلة الخلدات. معقودة التعريف على اسم اليوناني « لاروش » || انواعها المعروفة خمسة مهدا افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها التريينية في معظم البلاد المعتدلة الحرارة || سقها منصبة تتعني بفسه من الازهار المستطيلة الخماسية البتلات. اوراقها متطابقة لحية النصال الخروطية الشكل. ثمارها جرابية ، خلية الفلق ، عديدة البزور || أشهر انواعها التريينية القروية والباسمية.

١٢١٣٦ - رَوْشَة قَرْمِزِيَّة *
Rochas coccinea (S). Rochas écarlate (F).

نوع من الروشة التريينية الشائعة الزراعة. يملها تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. فسيتها ازهرية كبيرة القد ، متكوية التجميع. انهارها قرمزية اللون ، فواصة العرف الطري المنصب || تنويرها يستمر من اواسط حزيران الى اواخر تموز.

١٢١٣٧ - رَوْشَة يَاسْمِينِيَّة *
Rochas

Jasmines (S). Roché à fleurs de jasmin (F).
نوع من الروشة التريينية المبهولة عند معظم الزواوين. يملها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. فسيتها ازهرية متكوية التجميع ، متصلة الجهم. انهارها الى الصفار الاخضر الموالج ، شكلها قروي شبه بالياسمين. عرفها طري مستحب || تنويرها يستمر من اواسط نيسان الى اواخر ايار.

١٢١٣٨ - رَوْشَم
Levee des semis (F).

Sprouted sowing (E).
اول ما يظهر من الزرع.

١٢١٣٩ - رَوْشَك أَزْهَب *
Cylindronotus lanipes (S). Cylindronota

lanéux (F). Cylindronotus lanipes (E).
حشرة خاضعة دامت من فصيلة النيشيات ورتبة منمذات الانجسة. تألف المواق المشجرة. خنافسها تمش على اوراق النبات وعلى المواد النباتية المنطحة. رقاتها غاشية تمش تحت لحاء الاشجار اليابسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ سم. فوها الى الخضار الالامس الاسف الموالج. رأسها معتدل الحجم. اسفها صغيرتان بارتتان. زباناها مستطيلان دقيقتان. ظهرها ذات الفلق ، بالغ التحزير الغندي. اسفها خاسية القفل في الترويين الانامي والوسطي ، ربايتها في الزوج الخلفي. وهي مهدبة ، مستطيلة الحدي في الزوج الانامي ما دما الى تسيتها بالروشك الازغب || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتمش حتى اواسط ايار. تسرح في التبار. تملك في حزيران وتفرق المسكن تحت لحاء الاشجار وقشورها || البرقة عند بلوغها



روشة قرمزية



روشك أزغب



روش



روشن غندي



روشب



روش

والزئان لا تشبهان تشابهاً كاملاً لأن الزئ البني صغيرة ورمية تتكون من ثلاثة فصوص بينما تتكون البني من فصوص أو أكثر. وهي ملونة بالبشم والشرابين والأوردة والأوعية السفاوية والأصابع.



زئة

١٧١٤٦ - زئة البحر* Charrybdaea (F.) Jelly fish (E).
نوع من اللبوس ينمو في البحر الأحمر والوسط، يألف جرف السفاوي. قال في وصفه المشي: «سكة مسورة القلنسوة شفاقة كشوف الزجاج شبة بالبيضة يمني الحذوة وما أربعة اجرام في وسطها ترى في الليل ضيئة كالقمر اذا سحبه السحاب الرقيق. وما ضوء يشرق على ما حوله في البحر ولونها أزرق سموي. وإذا احست بالانسان يوم سوطا او أراد مسكها خرج لها رشاش لاذع يهرق الجسد مثل شرار النار من سميت. وهو يلقبه البحر بساحله كثيراً».



زوية دنة

١٧١٤٧ - زئد هو الركوب والمكيس، اطلبها.

١٧١٤٨ - زئم* Guzalia marica (F.).
Guzalia blanche (F.). White guzalia (E).
ظبي ابيض الغرب اغبر للمواج عابق الظهر في حجم الظبي المرفوف. وهو جميل الشكل، ابيض اللد، ورقيق الاقدام، غليظ الحركة، ملهش السرعة في عديمه. اصابته فسيحة الاربعاء تشمل جزيرة العرب وسورية واغريقية الشمالية حتى ليبيا. الاثني زئمة.



زؤس

١٧١٤٩ - زؤيات* Pulmona (F.).
Pulmona, Pulmonobranchia (E).
طائفة من الزؤيات مدهيات الارجل بمقدور افرادها استنشاق الهواء الطلق ذلك لانها مجهزة بمجاز تنفس حوائي قوامه شبكة وتالية نافذة الى الخارج || فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة المد، جميعها غشيرة الفم تحمل الاضواء الكرية واللاتية في آن واحد، لذلك تارة ذكراً وتقل فله في كوم الاثني وتارة اثني وتقل فلهما فيفيس || تقسم هذه الطائفة الى زئتين، زئة الزؤيات البرية وزئة الزؤيات البحرية. القاري المميز بين الزئتين هو ان حيوانات الزئة البرية مجهزة بآرغ لويس خاصة في حين ان حيوانات الزئة البحرية مجهزة بلاستن فقط ولواسها جامدة لا تتنفس || جميع افراد هذه الطائفة تعيش على الافراد الثنائية ومنها الاصابع البرية والبحرية.



زئة البحر

١٧١٥٠ - زؤيات بحرية، وزؤيات مائية

Besommatophores, Pulmona aquatiques (F).
زئة من طائفة الزؤيات. افرادها ثنائية الواسس الجامدة اللاسنتية. حينما ترتكز على قواعد الواسس || اصنافها متباينة الحجم والاشكال وبعضها عرياء خال من القصد || جميع افرادها تقترب من سطح الماء وتعلمو التنفس || اشهر اجناسها القصة والدوب والزيج وكلام والانصبل.



زئ

١٧١٥١ - زؤيات برية* Stylomastophores (F).
زئة من طائفة الزؤيات. افرادها رباعية الواسس المتعفة الهامة || اصنافها متباينة الحجم والاشكال. بعضها كامل الهيكل السفندي كالخزلون والبعض الآخر يميل درع صغير يلف مقدم الظاهر كالزئق || اشهر اجناسها الخزلون والبزاق والصرب والسريع.

١٧١٣٧ - زؤك* Laltance, Laito (F).

Milt, Soft roe (E).

هي المادة الحيوية التي تفرزها الاضواء التناسلية الذكرية في السمك فتلي بها الذكور على سره الاناث لانصبا.

١٧١٣٨ - زؤوكه* Roelle (F).

جنس نباتات جنينة معمرة برية وتروثنية من فصيلة الجريسيات. انواعها المعروفة ١١ مدها افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعة بعض انواعها في البلاد الحارة وفي المازن والصحاري || سوطها فراء. اوراقها عطيفة للنصال، متعابلة، متناوبة. ازهارها كبيرة الجرم، خالصة البتلات. جملة الالوان الزاهية المختلفة مع الانواع.

١٧١٣٩ - زؤوم* Lobe de l'oreille (F). Lobe de ear (E).

هي شمسة الاذن.

١٧١٤٠ - زؤوم Rhum (F). Rum (E).

شراب كحولي يستخرج من عصارة قصب السكر بعد تقطيرها وتقطيرها وتقطيرها.

١٧١٤١ - زؤيهة دسكة* Rumia maculata, Opisthographis maculata (S).

Rumia maculé (F). Rumia maculata (E).

حشرة من فصيلة الاثنيات ورتبة حشرقيات الاجنسة. عوطها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. قراحتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرتها غاصلة قوتها اورال الزرور والبريق والذيراء والسنتان || جسمها صير اللد يميل نحو ١٢ م. بطنها نحو ٣٤ م. راسها مستقيم الجرم. ميتاها كيرتان. زباناتها مشطيان عند الذكر، غطيلان عند الاثني. جوشنها وبطنها كثيف الخمل اثناء || رواشها، عند الفلقين، الى الصفار الكبريتي يميل دسك اشعث وزرقة حثلية || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الفرافلة في حزيران وتبقى حتى آب. تفسح في اليل. تماثل بعد ظهورها بسنة اسابيع وتمتص الحنك على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تقبل من ٢٥ الى ٣٠ م. جسمها اسطواني الشكل، مالى القفار تعلو ثلاثة ارجوز من التيل الصينية. ثوبها الى الطيلة السراء تعلوا غطوط متقطعة كسنتية. راسها واسطوي سيد || طول الامكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقص ضمن صلجة تحيكها السرعة بين الاوراق التي تجسها وتجرها بخروط حمرية.

١٧١٤٢ - زؤؤد هو الزؤود، اطلبها.

١٧١٤٣ - زؤؤو Rehta (F).

هي الرهضة، سكة نهرية، اطلبها. والرهو من اسمائها المحتبة الثالثة.

١٧١٤٤ - زؤؤيس* Capitulo (F). Capitulum (E).

شكل من نظام التنوير الخليلي المستجيب يند فيه رأس الحور الاصلي سحلاً زيجرات لاسنة.

١٧١٤٥ - زؤة Poumon (F). Lung (E).

المعو الرئسي في جهاز التنفس. وما زئان موزونان في تجويف الصدر يفصل بينهما القلب. وارتة غروية الشكل قاضتها مقعرة ترتكز على عضلة الحجاب الحاجز.

١٧١٦١ - رِبَائِيَّات

هو الرافد الرياسي نبات طبي مشهور ، اطبه .

١٧١٦٢ - رِبَائِيَّة * ، شَجَر الصَّابُون (S). Sapindus

Savonnier, Arbre à savon, Riba (F). Soap-nut tree, Soap-berry tree (E). Seifenbaum, Seifenbeere (D). Saponaria, Sapotiglia, Noce saponaria (I).

جنس شجر من فصيلة الصابونيات . أزهاره المزهرة ١١ منها البلاد الحارة . أوراقها متعاقبة ، مركبة ، مائلة . أزهارها عتودي . أزهارها رباعية أو خماسية البتلات ، ثمانية الأضلاع ، ثمارها عتوية ثلاثية التخصيص مأكولة في بعض الأنواع || أوراقها وأليافها وثمارها غنية بمادة الصابونين (Saponine) التي ترغو في الماء وتظلف كالصابون .

Vent (F). Wind (E).

١٧١٦٣ - رِبَاح

الرياح نسيم الهواء . ج. رياح وأرياح . وقد أطلق عليها أسماء مختلفة تعود إلى مصدر مهبها . لذلك فالرياح أربع منها الجنوب وهي القبيلة . والشمال وهي الشمالية والحدواء . والسايب وهي الشرقية . والحدوير وهي الغربية . وبين الرياح الأربع أربع أخرى وهي الأريب بين السايب والجنوب والسايبية بين الجنوب والحدوير ، والجربية بين الحدوير والحداء والحيف بين الحداء والسايب . وأزادوا ثامنة يقال لها الحداء وهي التي تدمر بالكانن فلا يتبين لها مهب . احلب حصفق الرياح || وتقسّم الرياح بالنسبة إلى سرعتها وضغطها وتأثيرها إلى تسع كما هو موضح في الجدول المقابل .

١٧١٦٤ - رِبَاحَان هو الأس المسكي ، اطبه .

١٧١٦٥ - رِبَاحَان أَبْيَض هو ذقن الشيخ ، راجمه .

١٧١٦٦ - رِبَاحَان الْأَرْض

هو التقيصوم وهو بقلة الغزال أيضاً ، اطلبها .

١٧١٦٧ - رِبَاحَان الْكَافُور * Camphorosma (S).

Camphorosme, Camphrée (F). Stinking ground-pine (E). Kamferkraut (D). Canforata (I).

نبات عشبي بري طبي من فصيلة السرنقيات مهددة الشرق الاوسط وأروبة الجنوبية . خواصه وبنائه الطبية عديدة . رائحته تشبه الكافور . يستخرج منه مادة زيتية فعالة مقوية لتلطف الباه وقد تستعمل كمرة وسطية ومدررة البول .

١٧١٦٨ - رِبَاحَان بَرِّي * ، رِبَاحَان قَرْشَلِي ، قَرْشَلْمَشْك ، أصابع القنات

Calamintha acinos (S). Calament acinos, Achnos, Basilic sauvage (F). Acinos, Basil thyme, Wild basil (E). Feldwürze, Wilde basilic (D). Timo campestre, T. salvatico (I).

نبات عشبي بري طبي ممر من فصيلة الشفويات . يطو من ٢٠ إلى ٣٥ سم . ساقه قصيرة فراء . فروعه خشوشية مهدلة . أوراقها متعاقبة معقطة بيضية الشكل . نصلها أزرق البشرة في صفتين . أزهاره بيض يميلوا موالج ورددي . أوراقها وأزهارها عطرية العرف المسحب || يدخل في تركيب بعض العقاقير الصحية وهو مضاد للتشنج .

١٧١٦٩ - رِبَاحَان دَكُورَة هو المردقوش ، اطبه .

١٧١٧٠ - رِبَاحَان سَلْبِيَّان هو سيق الربان ، راجمه

١٧١٧١ - رِبَاحَان الْبَيَّات * Phragmosporas (F).

Phragmosporas (E).

عقار فطور مجهرية من فصيلة الطحنيات ، تتميز ببوغاتها

١٧١٥٢ - رِبَائِيَّات ، مَقْدَمَات Primates

رَبَّة من الثدييات تشمل ثلاث مراتب : البشرىات والقرديات والليموريات .

١٧١٥٣ - رِبَائِيَّة Irrigation

الري من الجربة العلمية هو السيلالة المائية التي تهدف إلى الانتفاع من المياه على أكل وبه يمكن . وهو من ناحية العملية وضع ودوس الاصول والوسائل اللازمة لتسقية الارض وأحياء بورها .

اسم الريح	يقابلها بالفرنسي	تأثيرها	سرعتها في	ضغطها بالكيلو
			المتري	المتري
نسيم ، ريدة	Vent très faible	تيز الريح	٢	٠,٠٠٠
رياح	Vent frais	تثني الصالح	٤	١,٩٦٠
زفافة	Vent vif	تثني القوي	٦	٤,٤٠٠
سامكة	Vent fort	تحرك الشجر	٨	٧,٨٤٠
موجم	Très fort	تسقط الريح	١٣	٢٠,٧٠٠
عاصفة	Tempête	تضيق الانصاف والرياح	٢١	٥٤,٠٠٠
زعر	Fort tempête	تكسر أو تنقل الشجر	٢٨	١٠٣,٠٠٠
زبعة	Ouagan	تهدم بعض الابنية	٣٤	١٤١,٠٠٠
إحصار	Cyclone	تخرّب كل شيء	٤٠	١٩٦,٠٠٠

١٧١٥٤ - رِبَائِيَّة Ecluse (F). Lock, Sluice (E).

جسور حكمة البناء يفترض بحري المياه للانسيابة السطح ، له قداسان مدققي ومسيحي . رفع القداس المدققي يسمح بدخول المركب إلى الحوض ورفع المسيحي يسمح بخروجه من الحوض .

١٧١٥٥ - رِبَائِيَّات Plantes aromatiques (F).

Aromatic plants (E).

النباتات العطرية الفواحة العرف . الرائحة ريحانة .

١٧١٥٦ - رِبَائِيَّات Mathématiques (F).

Mathematics (E).

اصلاح يطلق على مجموعة من العلوم الحسابية والهندسية تشمل فنة الرياضة البحتة التي تنس بالحساب والجبر والهندسة وحساب التكمال والتفاضل ... وفنة الرياضة التطبيقية التي تنس بالآليات وعلوم الفلك والبصريات الخ ...

١٧١٥٧ - رِبَائِيَّة Abondance de récoltes (F).

Abundance of harvest (E).

هو حسب الحاصل الزراعي .

١٧١٥٨ - رِبَائِيَّة Salive des insectes (F).

Saliva of insects (E).

الريال والريالة هو لعاب الحشرات .

١٧١٥٩ - رِبَائِيَّة Euchiiana mexicana (S).

Reana, Téointe (F). Teosinte (E). Teosinte (I).

نبات عشبي كلابي من فصيلة النجيليات مهدد المكسيك وقد تمت زراعته جميع مرابي البلاد المطلة المزاراة .

١٧١٦٠ - رِبَائِيَّة Protobe (F). Protobe (E).

الريب اسم يطلق على كل كائن حي متناهي الصغر والذقة لا يشاهد تحت حسة المجهر المادي .





رَيْرِيس

١٢١٧٧ - رَيْشَة
Vent très faible (F).
Very weak wind (E).
هو التسم يتبر هو اوراق لثبات بشفة .

١٢١٧٨ - رَيْشَة
Penné (F). Pinnace (E).
نعت تعريتي يطلق على الاضواء الحيوانية والنباتية الشبيهة بالريش .



رَيْشَة لَاحِظَة الْأَصَابِع

١٢١٨٢ - رَيْشَاتِ الْأَحْتَكَاكِ ، هَيْكِيَاتِ
Mystice (F).
مرقية حيوانات بحرية ولوده لينة من ربة الحقيقات ، تشمل الحيتان الباعثة الإنسان ، الربة الصفايح الحكية ، انواعها المعروفة لا تتجاوز العشرين جميعها ثلاث فصائل : الباليات والقاليات والمركليات .

١٢١٨٣ - رَيْشَة
Randement, Revenu (F).
Produce, Revenue (E).
الريع هو ما تملكه شيئاً او نقداً ماسة سليمة من الارض .



رَيْشَانْج

١٢١٨٤ - رَيْشَة
Rhyphus (S).
Rhyphé (F). Rhyphus (E).
جنس حشرات من ذوات الجناحين غيبليات القرون وقصيلة القصصيات ، انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار الشرق الاوسط واروپة . تألف البراري والحدائق والمنازل ، اجسامها صغيرة اسطوانية الشكل . رؤوسها مكورة .

١٢١٨٥ - رَيْشَة
Rhyphus (S).
Rhyphé (F). Rhyphus (E).
جنس حشرات من ذوات الجناحين غيبليات القرون وقصيلة القصصيات ، انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار الشرق الاوسط واروپة . تألف البراري والحدائق والمنازل ، اجسامها صغيرة اسطوانية الشكل . رؤوسها مكورة .

١٢١٨٦ - رَيْشَة
Rural, Agreste (F).
Rural, Rustic (E).
نعت وصفي يطلق على معظم الانشاء المختصة بالريف ، كقربك الاعمال والصناعات والمكان الريفي .



رَيْش

١٢١٨٧ - رَيْشَة
Rivina (S). Rivina, Rivinie (F).
Rought plant, Carpenter's herb, Blood-berry (E).
Rivinie (D). Rivina, Erba da legnaioli (I).
جنس حشرات وريشيات برية وريشيت من فصيلة الكليات . انواعها ثمانية ، اوراقها متعقبة متعاقبة ، تصلها مالى البشرة ، متواج الصلصة ، حايك الخضار . ازهارها متعقبة التجميع ، ابطي الاكثار . ازهارها صغيرة لثقة ، خمسة البتلات البيض . ثمارها نوية ، وصيدة السجة ، قمرية اللون .

١٢١٨٨ - رَيْكُونَا
Ricotta (S). Ricotta (F).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصحابها بعض المناطق اغارة متعاقبة ، ثنائية او ثلاثية التفصيل الريشي . ازهارها صغيرة ، مفرسة البتلات ، ودية اللون او بيضاء دنية . اشهر انواعها :

R. lunaria (S)
R. linata (S)

رَيْكُونَا قَرْمِيَّة
رَيْكُونَا عِجَاق

١٢١٧٩ - رَيْشَة
Rhizomys (S).
Rhizomys, Rat des bambous (F).
جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الخلدات . انواعها ستة اجسامها اسطوانية . طولها يراوح من ١٨ الى ٥٠ سم .

١٢١٨٠ - رَيْشَة
Rhizomys (S).
Rhizomys, Rat des bambous (F).
جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الخلدات . انواعها ستة اجسامها اسطوانية . طولها يراوح من ١٨ الى ٥٠ سم .

١٢١٨١ - رَيْشَة
Rhizomys (S).
Rhizomys, Rat des bambous (F).
جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الخلدات . انواعها ستة اجسامها اسطوانية . طولها يراوح من ١٨ الى ٥٠ سم .

١٢١٨٢ - رَيْشَة
Rissa tridactyla (S). Rissa tridactyla (F).
طائر من كتيبات القند وقصيلة القروسيات . يعتبر من القواطع لأنه يعضي فصل الشتاء والبرد على شطوط البحر الابيض المتوسط ويغضي فصل الصيف في المناطق القطبية . جسمه معتدل القند يطول نحو ٣٧ سم . جناحاه كبيران ، ذلفان ، لاصاف . ذنبه معتدل الحجم ، مغطى بالريش . قدمه ثلاثية الاصابع . منظره لا يكتشف كامل الاصابع . لونه متراكب البيض والشفة ازرقة اللون . جناحاه موشحان بالابيض والاسود .

١٢١٨٣ - رَيْشَة
Plumes (F). Feathers (E).
انابيب ظفورية للمادة يملؤها الزغب والغبب والشعاع تنبت في معظم مناطق جلد الطائر . فالتأثيراتها موصلة رديئة الحرارة توثي الطائر شر التقلبات الجوية وانها تخفف الثقل النحوي فتساعد على الانتقال في الجو . الواسعة دوشة والجمع ريش وريش واريش .

١٢١٨٤ - رَيْشَة
Sínécure (F). Sínécure (E).
مركز اجتماعي او لقب يدر على صاحبه لئال الخير ولا يوجب المبادلة بأي عمل او وظيفة .

١٢١٨٥ - رَيْشَة
Reichenbachia (S).
Reichenbachia (F).
جنس حشرات من فصيلة البليانيات ودية عمديات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم مرج البلاد المعتدلة الحرارة . اجسامها صغيرة طولها من ٢ الى

١٢١٩٢ - رِيَهْدَرْمَة

Rhinoderma (S).

Rhinoderma (F). Rhinoderma (E).

جنس ضفادع من فصيلة الرنانيات. أنواعها المعروفة قليلة العدد مهددة أمريكة الاستوائية والوسطى || أجسامها صغيرة القذ، طول من ٤ الى ٥ سم. عند الذكور، ومن ٥ الى ٧ سم. عند الاناث. رؤوسها محرمة تنتهي بقذ حسيمة في مقدم الحظم. فكوكها السفلى عادمة الاستئان. اصابع قوائمها الخلفية مقيدة بمخاطب ضعيف لا يتجاوز اقزام الاول. جلودها ماعة مبعثرة الكثول. انثواها الى الحفشار الاسمر يملو موج اصفر ورقشة جزوية لاقامية الشكل والقذ || ذكورها مجهزة بجيوب قية تحمل مركز البلفة الصوقية وتمتد حتى مستوى البطن، تؤدي مهمة التقيق وحسن الدليل الذي لا يتجاوز مدده ١٥ دةلة يأخذها الذكر بطرف لسانه عند التسررة ويدخلها في الجيب فتبقى الى ما بعد النطف حتى يتم التطوير البلطي، تخرج السفار من افواه ابائها كاملة المدة تسرح حيث تشاء || تعيش من ١٥ الى ١٢ سنة. تسرح في الليل وتبيت في النهار. قوتها الحشرات والديدان.

١٢١٩٣ - رِيَه

هي الروعاء، طائر من النعاميات، اطلقها.

١٢١٩٤ - رِيَهَان

هو الزعفران المزروع، اطلبه.

Gazelle blanche (F).

White gazelle (E).

رابع ريم. ج. آرام. قال الاسمي: الأرام الظباء الأبيض الخالصة الأبيض وهي تسكن الزبل. وهذا النوع من الظباء يقال انه ضالها لانه اكثر شمسا وحشا || اما البيري فيقول: الرم ولد الظبي والجميع آرام ويستشهد بقول الشاعر بها البير والأرام يحين خلفه

والريم ايضا هو الجبل الصغير.

١٢١٩٥ - رِيَنَكْسُورِيَوْم

جنس فطور مجهرية من فصيلة الريحليات. مشبه آدمي الانتشار. وليته سطحية قارضة، كنانته صغيرة مركبة، لا قياسية الشكل والحجم || انواعه قليلة، اعرسها رينكسوريوم الشيلم.

١٢١٩٦ - رِيَنَكْسُورِيَوْم الشيلم

Rhynchosporium secalis
فطر مجهري يصيب حصف بعض التجيليات اعصها الشيلم || مظهره الفاربي يقع مستطيلة ميمرة او كتيقة التجميع، ليد صغيرة ثم تنتشر فيبلغ طولها نحو ٢٥ م. تركب نصال واتحاد الحصف، لوها آل الزرة يملوها موج افير ثم ينحرف الى الاخير الرصاصي وينتهي بالنتي تحفه حالات واعبارات شاحبة وضعية || يصيب يباس الحصف وضعف الاسبال وتحمل الحب.



رينكسوريوم الشيلم (١)



رينكسوريوم الشيلم (٢)



١٢١٩٥ - زاج

Affermer (F). To farm (E).

زارع لؤلؤ : حامله على الارض يبيض انتاجها . اطلب مزارعة .

12205 - زكرك ، زراوع ، هزكرك .

Agriculturist (E).

هو الذي يستغل ارضه مستخدماً عمالا او تلاحين . تحديد الامير مصطلق الشهابي .

Sulfate, Vitriol (F).

Sulphate, Vitriol (E).

اسم شامل يستعمل للدلالة على بعض الاملاح اخصها سلفات الحديد والنحاس والرصاص الخ ...

Vitriol blanc (F).

White vitriol (E).

هو سلفات الزنك من الاملاح المزدوجة التابعة الى سلسلة الاملاح المنيزية .

Vitriol vert (F).

Green vitriol (E).

هو سلفات الحديد من الاملاح المزدوجة التابعة لسلسلة الاملاح المنيزية او سلسلة الاملاح الشبية .

Vitriol bleu (F).

Blue vitriol (E).

هو سلفات النحاس من الاملاح المزدوجة التابعة لسلسلة الاملاح المنيزية .

Austricherie (F).

Ostrich-farm (E).

الكان الخصاص لتربية الترج اي النعام .

Procombant (F). Procombent (E).

نمت تمرني يطلق على النبات الذي يزحف على الارض .

Gaster (F). Gizzard (E).

هي الحوصلة وقد صار تخصيصها بغير الماء والمانع .

Hippobosque (F). Hippobosca (E).

هي الشفراء ذباب يقع على الابل والدواب والكلاب .

Corvus corone (S).

Corneille, Corbeau-corneille (F). Carrion crow (E).

Rabenkrähe (D).

طائر من الغربان متوسط الجثة طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه الى السواد الاسفع البنفسجي المالح . موطنه الشرق الاوسط واروبه وافريقية الشمالية . يعتبر من الطيور الفسارة لانه كثير الاذى . قوته الديدان والحشرات والحرب واليدار الناقص والبار الخ . || ينش في الانجار الريفية . الانثى تحضن صغارها من ٤ الى ٦ بيضات لزنها الى الزقعة المفترسة يملؤها توشم اسمر .

12207 - زكاف

يقال زاف عليها فزافت له اي مكته من سفادها وهذا في الطيور الجوارح (الجلسط) || زواف الذئب : نشر جناحيه وذنبه وجها على الارض .

12208 - زليقي

هو ذكر الصبي ومنه من قال الذئب : ج زواقي . قال ثوبه بن الحبيب صاحب ليل الاغنية :

« ولو ان ليل الاغنية سلت

على ريدني صبتك وصفائح

لست تسلم البشارة او زفا

لها صدى من جانب القبر صائح



زاج

من ٣٠ الى ٤٠ م. اوراقها عابطة تطول من ٨ الى ٢٠ سم. مرورها غلظية او خاسية الا زوايا. اغلفة زائفتها مستطيلة لاحقة || ترطب في جبال البلاد المعتدلة الحرارة. تكثر في المناطق الواقعة بين ارتفاع ١٢٠٠ و ١٨٠٠ م.

١٢٢١٧ - زان ياباني *Fagus japonica* (S).
Hêtre japonais (F). Japanese beech (E).

نوع من الزان يملو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقها تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٨ م. نصلها عند القصعة، مسن الحافة، كثير المروق التي يراوح عدد ازواجها من ١١ الى ١٤ || اغلفة زائاته قصيرة القذ سنانية الشكل، حشوية التركيب || يرغب في المواقع الجبلية الرطبة.

١٢٢١٨ - زان * *Faine, Fêne (F).*
Beechnut, Beechmast (E).

ثمرة الزان ج زانات .
١٢٢١٩ - زانفيل ، زانفيل *Xanthophylla (F).*
Xanthophyll, Xanthophyll (E).

شجاع اصفر يرسد في اوراق التبان.

١٢٢٢٠ - زاوية *Angle*
هي الانفرج الحاصل من تلاقي خطين مستقيمين يبرزان بقلي الزاوية. اما نقطة التلاقي تدعى رأس الزاوية. وتنقسم الزاوية الى ثلاثة انواع. كل زاوية قائمة يبلغ مقدارها ٩٠ تدعى حادة وكل زاوية اصغر من الحادة تدعى حادة وكل زاوية اكبر من الحادة تدعى منفرجة.

١٢٢٢١ - زاوية الاحتكاك

Angle de frottement, A. de friction (F). Rubbing angle, Friction angle (E).

١٢٢٢٢ - زاوية الإشتاب *Angle d'insertion (F).*
Insertion angle (E).

١٢٢٢٣ - زاوية الإحتراف *Angle d'inclinaison (F).*
Inclination or slope or dip angle (E).

١٢٢٢٤ - زاوية الانخفاض *Angle de dépression (F).*
Depression angle (E).

١٢٢٢٥ - زاوية الإنكسار ، زاوية السقوط *Angle d'incidence (F).*
Incidence angle (E).

١٢٢٢٦ - زاوية القذف *Angle de projection (F).*
Projection angle (E).

١٢٢٢٧ - زاوية جالس ، زاوية قائمة *Angle droit (F).*
Right angle (E).

١٢٢٢٨ - زاوية حادة *Angle aigu (F).*
Acute angle (E).

١٢٢٢٩ - زاوية حرجة *Angle limite (F).*
Limit angle (E).

١٢٢٣٠ - زاوية زوجية *Angle dièdre (F).*
Dihedral angle (E).

١٢٢٣١ - زاوية قهرية *Angle apsisal (F).*
Apsidal angle (E).

١٢٢٠٩ - زالحكة *في الاطوم ، اطليه .*

١٢٢١٠ - زام *Quart (F). Quarter (E).*
الزام : الربيع من كل شيء.

١٢٢١١ - زاميس * *Schizophyllum commune*
فطر من الفاريفوريات يركب احصان ويطلع بعض النباتات الحرجية والمثيرة بها الكركز والشمش والخوخ وقد شوهد على سوق الثوت وعلى ثمار الفطخ الناضجة الساقطة . يركب القشور الخشبية او المسطوية من لينة الشمس فيتركز عليها ويرتد بمشبه حتى التشكير فيفسد التبادل النسفي بعد ان يفتي حل الاوعية || منظره الخاربي ، ما يميز في هذا الرسم ، وهو كثيف التجميع ، تحيل البكتة الدقيقة السرية القلب || يكالغ باستصاكه ويتغير المرح وظليه بالاستيكاك .

١٢٢١٢ - زامور *Naucrotus ductor (S).*
Naucrote (F). Pilot fish (E).
سمكة بحرية من السميات طويلا نحو ٦٥ سم. ثوبا الى الزرقاء انفساء يملو موج نقي ومث غطوط سود قاطبة مستعرة.

١٢٢١٣ - زامية * *Zamia (S).*
Zamia, Zamier (F). Jamaica sago tree (E). Zapfenpalmaria (D). Zamia (I).
جنس نباتات غلظية الجذع والاوراق من فصيلة السيكاسيات ينمو بالبلاد الامريكية الاستوائية || انواعها المعروفة ٣٠. جلودها غلظية وقصيرة . سطها كثيف التجميع ، مسطيل الجريد ، صحن الزمان الاخير || بعضها رشي وبها زراعي ينسخرج من ثماره مادة نشوية مأكولة تفر بالسافر (Sagou).

١٢٢١٤ - زان *Fagus (S). Hêtre (F). Beech tree (E).*
Buche, Buchbaum (D). Faggio (I).
جنس اشجار وجميعات برية حرجية من فصيلة القدييات انواعه نحو ١٥ صنفا متصبية جالسة . اوراقها معتقة متعاقبة . نصلها يضي الشكل ، مذهب القصعة ، بارز المروق ، عند القصعة ، مسن الحافة . ازهاره الذكورية درلية التجميع . ثماره زور هريبة الشكل حادة الزوايا تدعى زانة . اغشابه صلبة قوية مرنة صناعية شائعة الاستعمال . ثماره اشجار دالية || بزور غلظية . اغلفة بزور تحوي بعض المواد الجمالية الفسادة كقوى الحيل والحبر وتسن الثمن والمجاز والحناظر .

١٢٢١٥ - زان امريكي *Fagus ferruginea (S).*
Hêtre américain (F). American beech (E).
نوع من الزان يملو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها تطول من ٦ الى ١٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٩ م. نصلها عند القصعة ، مشاري الحافة ، كثير المروق التي يراوح عدد ازواجها من ١١ الى ١٧ || وهو من الاشجار السرية النمو النسفي . يرغب في المواقع المعتدلة الرطاب .

١٢٢١٦ - زان معزوف ، زان شامك *Fagus sylvatica (S). Hêtre commun, Fau, Fauco, Fayed, Foyard, Fouteau (F). European beech, Common beech (E). Echte buche, Buche boom, Roebuche (D). Faggio comune (I).*
اشهر انواع الزان واعمالها انتشارا . فروه عديدة منها الابنوي والكبير المروق والمناج والمسنبي والسنباني العربي ... جميعها من الاشجار الكبيرة الحجم تطو



زام



زامية



زان معروف



زانة



زَاوِيَةُ الْجُلُودِ



زَاوِيَةُ الدَّرَةِ



زَاوِيَةُ حَفْلَةٍ



زَاوِيَةُ حَدَامَةٍ



زَبُ الْبَحْرِ



زَابَاةٌ شَامَةٌ



زَابَاةٌ قَرْمَةٌ



زَابَاةٌ مُعَدَّسَةٌ

١٢٢٤٨ - زَاوِيَةُ هَدَامَةٍ *

Pseudomonas destructans (S).

طول البكتيرية نحو ٨ مي. تركب بعض النباتات انحصارها
الفتت قشيب اصفرار الاوراق ويذبلها . يعيقها ارتفاع
الجلود ثم اسمرها وكروية وانحما .

١٢٢٤٩ - زَاوِيَةُ هُو السَّوِي ، اطليه .

Penia

١٢٢٥٠ - زَبُ ، عَوَفٌ ، قَفِيبٌ

ذكر الحيوان .

١٢٢٥١ - زَبُ الْأَرْضِ هُو الطَّرِثُ ، اطليه .

Aktinos (S).

١٢٢٥٢ - زَبُ الْبَحْرِ * Actinia, Anémone de mer (F). Actinia, Sea-anemone (E).

جنس حيوانات حليا من البقيات السيات السرية .
انواعه عديدة غطلة الاشكال والاحجام يذبل فيها الساق
الانوية والفرق الكلف للذباب اثمار . جميعها
لحسية نابضة سريعة الانقباض والانتشار ، مشرقة
لللمس ، زاحية الاثوان اللامعة من الوردي الى القرمزي
والاصفر والازرق البشجي . يوجد منها في المياه
الآبانية . تعيش حل المسنور للفقرة بلالة . قوتها ما وصل
اليها من هيام وحشرات مائية . وهي مأكولة يقال انها
مستحبة الطعم .

١٢٢٥٣ - زَبُ الْكُرْمِ هُو الفلوس ، اطليه .

Sorex, Crocidura (S).

١٢٢٥٤ - زَابَاةٌ Musaraigne (F). Shrew (E). Woldepitzmaus (D).

جمع زباب . جنس حيوانات صغيرة القند من الزبابيات
الاحفارات . انواعها نحو ٤٠ صولها العالم . اجسامها
رقيقة مستطيلة خلية الور . وروثها واسطها لاذقة .
اذنانا مستدرة . قوائمها قصيرة . اطرافها حادة . اذنانها
حقيقية ، مستطيلة ، حلية الشعر || من ميزاتها انها تحصل
في عوصها بمسوى قوائمها الخلفية عند مسكة فواصة
القائمة || انثاتها تضع من ٤ الى ٦ ادواس ترسمها
من شهرين الى ٣ اشهر || اشهر انواعها ما يلي .

١٢٢٥٥ - زَابَاةٌ شَالِمَةٌ *

Sorex araneus, S. vulgaris (S). Musaraigne commune, Musette (F). Common shrew (E).

نوع من الزباب ثوبها الى الرمادي الاشقر يقيم مع
القراري من ثوب الظهور ويبيض عند البطن . طولها الكليل
من ١٢ الى ١٣ سم . علوها نحو ٢ سم . تألف الجبال
والسهول والادية والحقول . قوتها الحشرات والديدان
والبراك والحلزون وفار الخروع .

١٢٢٥٦ - زَابَاةٌ قَرْمَةٌ *

Sorex pygmaeus, S. minutus (S). Musaraigne pygmée, M. nana (F). Pygmy shrew (E).

نوع من الزباب ثوبها الى السرة الصهباء . بطنها اغمر
البن . طولها من ٨ الى ٩ سم . || تألف الاحراج
والنبات الكثيفة . قوتها الوزغ والحشرات على اختلافها .

١٢٢٥٧ - زَابَاةٌ مُعَدَّسَةٌ *

Sorex religiosus, Crocidura religiosa, Suncus sacer (S). Musaraigne sacrée (F). Sacred shrew (E).

نوع من الزباب ، ثوبها الى السرة الصبانية يقيم مع
الظهور ويشتر حد البطن . طولها يراوح من ١٥ الى

Equerre (F).

١٢٢٢٢ - زَاوِيَةُ مُثَلَّثَةٌ Square, Knee-piece (E).

الزاوية المثثة وشكل المساح واحد .

Angle plan (F).

١٢٢٢٣ - زَاوِيَةُ مُسْتَوِيَةٍ Plane angle (E).

١٢٢٢٤ - زَاوِيَةُ مُنْحَنِيَةٍ انْخَطِئِي

Angle curviline (F). Curvilinear angle (E).

Angle obtus (F).

١٢٢٢٥ - زَاوِيَةُ مُنْفَرِّجَةٍ Obtuse angle (E).

Radian

١٢٢٢٦ - زَاوِيَةُ نَصْفِ الْدَّرَةِ

١٢٢٢٧ - زَاوِيَتَانِ مُتَبَادِلَتَانِ Angles alternes (F). Correspondent angles (E).

Alternate angles (E).

١٢٢٢٨ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَامَتَانِ

١٢٢٢٩ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ Angles complémentaires (F). Complementary angles (E).

١٢٢٣٠ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ Angles opposés (F). Opposite angles (E).

١٢٢٣١ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ

١٢٢٣٢ - زَاوِيَتَانِ مُتَوَابِلَتَانِ Angles correspondants (F). Correspondent angles (E).

Adjacent angles (E).

Excédant (F).

١٢٢٣٣ - زَاوِيَةُ فَائِضٍ Exceeding (E).

Appendice (F). Appendix (E).

١٢٢٣٤ - زَاوِيَةُ كَلِّ عَصْرِ زَاوِيَةُ الْجِسْمِ الْحَيَوَانِيِّ وَالتَّابِي .

Pseudomonas (S).

١٢٢٤٤ - زَاوِيَةُ * زَاوِيَةُ زَوَائِفُ . جنس بكتيرية من فصيلة القضيبات .
انواعه عديدة تتميز بآركاتها الاسطوانية ، بقطبيها للمهدين
وباعداها المتحركة || انواعها اللزجة قليلة تخص منها .

١٢٢٤٥ - زَاوِيَةُ الْجَذَرِ *

Pseudomonas radialis (S).

طول البكتيرية نحو ٤ مي . اذنانها حلقية سوية .
تركب جلود النباتات قشيبا . مظهرها الخارجي
درينبات صغيرة سمره اللون مبشرة على الجلود والقرقرش .
تكاثرها يظهر البذار والرتة .

١٢٢٤٦ - زَاوِيَةُ الدَّرَةِ *

Pseudomonas stewarti (S).

طول البكتيرية ٢ مي . اذنانها خيطة . تصيب الدرة في
زين ازهرار تتركب الاوراق ويذبلها وتقضي على النبات .
تكاثرها يظهر البذار والرتة .

١٢٢٤٧ - زَاوِيَةُ حَقَلِيَّةٍ * ، عَصَبُ اسْتَرْدِ

Pseudomonas campestris (S).

طول البكتيرية نحو ٥ مي . تصيب اللؤلؤ واللفت
والخردل وفيها من السليبيات . تركب . احصاب
الاوراق تشيب اسمرها ثم اسودها وتضرب الجلود
تفقس مكاكها ثم تمثها || يحسن اجتناب تقويض
النبات لانه السبب الوحيد في انتفاخ وبيلته . يكافح
بظهور الرتبة .

١٢٢٦٤ - **زَيْبَادَة سَوْدَاة** *
Arctelis (S).
Arctélide, Binturong (F). Arctelis, Binturong (E).
جنس حيوانات لبونة من الزيباديات. موطنها الهند
اجسامها مستطيلة. قوائمها قصيرة. رؤوسها مسترسفة
أذنها سوية اللون الاسود. يراوح طول اجسامها من
٧٠ الى ٨٥ سم. وذيلها من ٩٥ الى ١٧٠ سم. || تألف
الاجراج الكثيفة. تتسلق الاشجار. تسرح في الليل.
قوتها الحيوان والطيور والسلم والحشرات والثمار.

١٢٢٦٥ - **زَيْبَادَة مَلَكَّة** * ، **وَس** *
Viverricula malaccensis (S). Civette de Malacca.
Petite civette de l'Inde, Rasse (F). Rasse civet cat (E).
نوع من الزيبادة تملو نحو ٤٠ سم. طولها ٩٠ سم. وذنها
٤٠. ثوبها الى الصبغة الورداء يملو تخطيط متعرض
اسود. ثيج ظهرها اسود يكتنفه غطاء عاجيان. رأسها
اسمر. صفوها مطوق بالابيض || موطنها يمتد من
ملقه الى الهند. || تألف الاجراج والادغال. تتسلق
الاشجار بسرعة || قوتها الحيوان والطيور والثمار وبعض
الجلود. تأكل الموز بشهية.

١٢٢٦٦ - **زَيْبَائِيَّات** *
Viverridae (S).
Viverridés (F). Viverridae (E).
فصيلة حيوانات لاجمة مفترسة اجنتها ١٦ اشهورا
الزيبادة والرياح والتيس. اما انواعها فكثيرة العدد.
موطنها المناطق الحارة من العالم القديم. اجسامها مستطيلة
دقيقة، قوائمها قصيرة، اذناها طويلة، جلده، رائحة.
امتاحتها غليظة، ورؤوسها زائفة، اعظامها ذققة، مثيرها
صغيرة، اذناها مخططة الحبيب || تتميز بفندھا ميتة
التي تفرز دهن الزباد المسكي اللزج في اجرة خاصة
مركزها بين السرم وملقن الفلنجن || مسرحها في
الليل. قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحيوان والطيور
والانعام والورع والاسماك.

١٢٢٦٧ - **زَيْبَاكَة ، فِلَكَة** *
Cotyldon (F).
Cotyledon (E).
هي الخوصة حين تخرج من النواة.

١٢٢٦٨ - **زَيْبَاكَة** *
Taille de la vigne (F).
Pruning of vine (E).
هي تسريع الكريمة اي تسهيلها. يقال زبر او يبرز
الكريمة.

١٢٢٦٩ - **زَيْبَاكَة** *
Cane (F). Female duck (E).
هي البطية وتسمى زيباكة لانها تكثر الزبط اي الصياح.

١٢٢٧٠ - **زَيْبَاك** *
ما تحمله البصلة فيها.

١٢٢٧١ - **زَيْبَانِي** * ، **زَيْبَانِي** *
Antenne (F).
Antenna (E).
ما تزين به الحشرة وما زيبانيان. اطلب قرن استعماري.
اشكاله كثيرة البند اعماها ما جاد به الرسم.

١٢٢٧٢ - **زَيْبَاكَة ، زَيْبَانِيَّات العُكُورِب** *
الزيبانا او زيبانيا المقرب منزل من منازل القمر البائنة.
وما كوكبان نيران مقترقان في قرني " برج المقرب " ،
معتزمان بين الشمال والجنوب بينهما قيد روح ينزلما القمر
في الجلة السابعة عشرة || يقب الزيبانا يدعى البهين.

١٦ سم. موطنها البلاد الحارة. تألف السهول والحقول
المزدرة قوتها النوبيات والحشرات.

١٢٢٥٨ - **زَيْبَائِيَّات** *
Soricidae (S). Soricidés (F).
Soricidae, Shrews (E).

فصيلة حيوانية من رتبة الحشرات. انواعها نحو ١٧٠
موطنها العالم القديم. اجسامها صغيرة القند تشبه القار
والجرذان. اذنها رمادية. اعظامها ذلقة. اذناها
مستديرة. قوائمها قصيرة. انظرها حادة. اذناها دقيقة.
تألف الجبال والمساب والسهول والقياني. قوتها الحشرات
على اعلاها والمصابير والاسماك.

١٢٢٥٩ - **زَيْبَاد ، زَيْبَادِي ، مَسْحَا** *
Pallenis spinosa (S). Pallénis, Petit mugue (F). Star-
wort (E). Dorniges goldauge (D). Pallenis (I).
لبات حوض بري طي شاك من فصيلة الكركيات.
منته حوضي البحر المتوسط. ازهارها حلوية اللون مثرية
يجريها التحل. فولاده الغليظة مهيئة يقال انه ينفع الصدر
ويقوى للعدة.

١٢٢٦٠ - **زَيْبَادَة ، صَيْبُورُ الزَيْبَاد** *
Viverra (S).
Civetta (F). Civet cat (E).
جنس حيوانات من فصيلة الزيباديات. انواعها خمسة
تتميز باجسامها المستطيلة. اذنها مخططة الالوان
يكثر لها التميز والتخطيط || اذناها تضم من ثلاثة الى
اربعة جراء ترسها نحو ٨ اسابيع.

١٢٢٦١ - **زَيْبَادَة افريقية** *
Viverra civetta (S).
Civetta d'Afrique (F). African civet cat (E).
نوع من الزيبادة تملو نحو ٣٠ سم. طولها ٧٥ سم.
وذنها ٤٠. رأسها مكور الشكل، ذلقوها مدب.
اذناها قصيرتان قوائمها متوسطة القند قوية. ثوبها الى
الصبغة الاسراء يملوها تخطيط وتيج اسود وشك نصبي
يقتب النيج من القطن الى طرف الذنب || موطنها افريقية
الشرقية والشيالية. تألف الجبال والادغال والقياني.
تسرح في الليل. قوتها ما تستطيع اقتناصه من الحيوان والطيور.

١٢٢٦٢ - **زَيْبَادَة التحل** *
Paradoxurus (S).
Paradoxure, Musang, Harle des palmiers (F).
Palm civet cat (E).

جنس حيوانات لبونة من الزيباديات. موطنها البنغال
وسريليب والهند الصينية. انواعها عديدة. اجسامها
مستطيلة. طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٥ سم. اذناها
من ٤٠ الى ٥٥ سم. وطولها من ٢٥ الى ٣٥ سم. اذوها
مرفقة || تألف الاجراج وتتسلق الاشجار. قوتها الحيوان
والطيور والثمار على اختلاف اجنتها وانواعها || اذناها
تضم اربعة جراء ترسها نحو ٨ اسابيع || زيبادها
مهيمن الرائحة الكريهة.

١٢٢٦٣ - **زَيْبَادَة الهند** *
Viverra zibetha (S).
Civette de l'Inde, Zibeth (F). Indian civet cat,
Zibeth (E).

نوع من الزيبادة تملو نحو ٤٠ سم. طولها ٨٠ وذنها
٤٥ سم. موطنها الهند والصين وبنورما. ثوبها الى
الصبغة الصفراء يملو تميز بقوي. ثيج ظهرها اسود
اللون. سواد يمتد من القطن الى طرف الذنب || تألف
الاجراج والادغال والسهول والحقول. تسرح في الليل.
قوتها الحيوان والطيور والانعام والقضاد والحشرات والبيض
والثمار.



زيبادة افريقية



زيبادة التحل



زيبادة الهند



زيبادة سوداء



زيبادة ملقة



زيبان

Colombophille (F).
Pigeon-faucyng (E).

١٣٣٠٩ - زَحَاة

الزحاة من تربية الحمام الزائيل وترويضه على العمل المنوط به .

١٣٣١٠ - زَجَر * ، زَجَر (F). Latilus (S). Latle (F).
جنس اسماك بحرية من شقائق النعمان وفضيلة البهاريات . انواعه المعروفة خمسة : اسطفاها بحار المناطق الحارة من العالم القديم جميعها كبيرة القند طويلا براوح من ٧٠ الى ١٢٠ سم . وروصها غليظة مضطربة الخشن . حيوانا كبيرة مستديرة جاسطة . زانفها الظهرية مسطيلة . حراشيفها صغيرة . اثوابها بخلفة الابلوان غضية المزاج .
ج زجور .

١٣٣١١ - زَجَل Retournement des œufs (F).
Returnement of eggs (E).

هو تقليب البيض . زاجلت الدجاجة : قلبت البيض في ايام الحضان لانها ان لم تجال مدر البيض . وهو ما يجب الالتباه له في الحاضنات الآلية ليسلم البيض من اللد .

١٣٣١٢ - زَجَم ، صَوْنُو الماء (S). Hydrochelidon (S).
Mirodelle d'eau, Guifette (F). Sea-swallow (E).

جنس طير من كليات القدم . انواعه قليلة ثقبه الخرشوف الا انها اطول جناحا ورصا . تألف بحيرات ومنابع المناطق المعتدلة . تكثر في شواطئ البحر المتوسط . قوتها الحشرات والحوام والاسماك الصغيرة . تدثر في الانجار والنباتات المائية . اناثها تبنيش ونحش ثلاث بيضات نحو اسبوعين || اشهر انواعه الزجم الاسود .

١٣٣١٣ - زَجَم اسود * (S). Hydrochelidon nigra (S).
Guifette noire (F). Black sea-swallow, Black tern (E).

نوع من الزجم . رأسه وصقعه وصدرة الى السواد الغامق . ظهره احمر الكين . جناحاه وذنبه الى الورداء الزرقاء المزاج . يطنه وباطن جناحيه واظفكه الى البياض الناصع . متقاربه وسقاؤه حر .

١٣٣١٤ - زَحَار Enterotoxemies
مرض معد خفيف يصيب الحيوان في امعائه فيفيذه .

١٣٣١٥ - زَحَاة Reptiles (F). Reptilia (E).
الزحافات توكلف السلف الثالث من قسم الغفاريات . مركزها المرتبي يأتي بين الطير والصفدييات . علمها يدعى زحفة . اجسامها مسطحة اما بهفت متباينة الاشكال والياكة والمادة ، واما صفاتها قريبة ، متفاوتة الشفاعة شديدة الصلابة . تنفسها رئوي . اجهزتها التنورية والمصبية والمغصية والتناسلية كاملة . فصفها يتصل بالعمود الفقري بواسطة لقمة قذالية ، اوسطة ، بسيطة . بعضها مجهز بأربع قوائم يستعين بها للالتفاف وبعضها مرقال مدع القوائم . كانت فصائلها واجناسها في الازمنة النافرة كثيرة العدد وقد بلغت اربعها في الاباج الثاني حيث وصل عدد رتبها الى ١٩ . اما الآن ، فالانواع الممارسة تقدر بنحو ٩٧٥ تنقسم في اربع رتب فقط . وهي مخلوقات الرؤوس والسلاحيات والسحاسيات والشفديات .

١٥ مخلوقات الرؤوس Rhynchocéphales (F).
رتبة من الزحافات يمد ظهرها الى الاباج الثاني . وقد

١٣٣١٦ - زَبِيلين * ، سَمُور سَمِيرِيَّة Mustela zibellina (S). Zibelline, Marte zibelline (F).
Sable (E).

حيوان مفترس من السموريات . موطنه الاساقع الباردة بكثري في سبيرة . طوله نحو ٤٥ سم . وذنبه ٢٢ ثوبه جل الور الثام الطويل . ظهره الى السرة السوداء منقعه وباطله الى الصببة الصناوية . غذاه الى الرتبة . غطه اسود . انذاه الى السرة ، حشاها اريد . زوره وصدرة وطلته الى الصببة الصفراء المزاج . فرتة فاعرة . يأنث الاخراج الكثيفة وجاري الماء . يسرح في الليل . قوته الحيلان والظير والسلك والبار .

١٣٣١٧ - زَبِيد * ، مَرِيُون Zapus, Meriones (S). Zapode, Mérones (F).

جنس حيوانات ليونة قاضمة من فصيلة البيربوسيات . انواعه عديدة جميعها شديدة اللقد طويل من ٧ الى ١٠ سم . واذاها من ١٢ الى ١٥ سم . جرازها الخلفية مسطيلة تمكها من التفر الطويل . اثوابها الى الصببة السوداء . اذاها اسود . اياظها اصفر . يملوها توشج اسود . بطونها ليس || تألف الاذفكال واظراف الغابات والنباتي والجبال والادوية والحقول والمراعي . تسرح في الليل . اجسامها انفاق ودعايز تنفخها على عن ٥٠ سم . فرتها المولد النباتية حل اختلافا من الفيلار الى الحب ومن الارواق والبرام الى القار ومن الشب والجحور الى حلاء الاجار .

١٣٣١٨ - زَبِيد ، حَمَجَم Raisin sec (F). Raisin (E).
هو السنب الزئب له طريقة تجفيف خاصة تمكنه من الاحتفاظ ببعض اللدانة .

١٣٣١٩ - زَبِيد بَرِي هو المائق الجيلي ، اظله .

١٣٣٢٠ - زَبِيد Fournillière (F).
Ant-hill, Ant's nest (E).

هي المنسة اى قرية التل || هي الزابية لا يملوها ماء .

١٣٣٢١ - زَبِيد ك هي الاذريين وهي القوشحان المزني ، اظله .

١٣٣٢٢ - زَبِيد ك هي السمر الارط ، اظله .

١٣٣٢٣ - زَبِيل Cuellotr (F). Fruit-baker (E).
قوة اى وءام ما توشع فيه الخار عند قصفها .

١٣٣٢٤ - زَج Ausruhe (F). Ostrich (E).
الزج هو النعام . الواحدة زجاء وأزج للذكر .

١٣٣٢٥ - زَجَاج Verre (F). Glass (E).
مادة صلبة شفافة سهلة الانكسار تصنع من الرمل والقل .

١٣٣٢٦ - زَجَاج هو حب القرزفل .

١٣٣٢٧ - زَجَاجِي ، شَقَاك Hystolde (F).
Hystold (E).
صفة ما هو شفاف كالزجاج .

١٣٣٢٨ - زَجَاج Colombophile.
Périscronique (F). Pigeon faucyng (E).

الزجبال من تعامل تربية الحمام الزائيل وترويضه .



زبيلين



زبید



زجر



زجم اسود

Solénoglyphes	أَبُوِيَّات الإِخَادِيد	انقرضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالخيطرية أو السفنكون الذي يعتبر أقدم الزحافات الماصرة لأنه مثال الخنثى الأول.	
Opisthoglyphes	خلفيات الإِخَادِيد		
Aglyphes	خديجات الإِخَادِيد		
Opotérodontes	سُرَاوِلَات الإِنْسَان	٢٥ السلاحف	
		Chéloniens	
	أما فصائلها فهي :	رتبة من الزحافات . أنواعها الماصرة المعروفة ٢٣٥ تجمع إلى ١٢ فصيلة . أجسامها مبطنة ملحمة . رؤوسها مكروحة صغيرة . أعناقها متوسطة الطول . فكوكها عديمة الإِسنان لكنها مجهزة بتصال قرنية حادة الأطراف . قوتها غليظة . ظهورها مدورة بذبال . بطونها قرنية الكتف المعروف بالزيف . وزنها هذا سداسي الثقل يخرج منها الرأس والذنب والقوائم الأربع أما فصائلها فهي : بالنسبة إلى التصنيف الحديث ، ما يلي :	
Typhlopidae	تفلسيات	Trionychidae	ترسيات
Leptotyphlopidae	دسليات	Kinosternidae	جنتيات
Boidae	بوآليات	Dermatemydidae	حسليات
Ilysiidae	حسليات	Palomédutidae	حفاسيات
Uroplattidae	خفريات	Emydidae	حسليات
Xenopeltidae	خدليات	Platysternidae	غشائيات
Colubridae	حنثيات	Chelydridae	دلهيات
Amblycephalidae	مسلحات	Carettochelyidae	دوريات
Viperidae	أفيجات	Chilidae	زقيات
		Tesudinidae	سلحيات
		Dermochelyidae	قشريات
		Chelonidae	جلديات
		Crocodylidae	٢٥ الجصاصيات
			رتبة من الزحافات تشمل فصيلة واحدة تضم ٢١ نوعاً تجمع إلى ٦ أجناس . أكثريتها الباسقة من المناطق الاستوائية والحرارة . معظمها يعيش في مياه الأبحر والبحيرات وبعضها يغترس مياه البحر كالتسلح البحري والتسلح الذي الخلف . تتميز التماسيح بأجسامها المستطيلة الخشنة ، مجلوها الخشنة الصلبة القاسية ، بقوة ذكورها الكبيرة المجهزة بإسنان ذرية ، يصغر حيوانها الجاشفة ، بارتفاع مناسرها الطرفية الانكسار ، وبأذنانها الضخمة المستطيلة . أما أجناسها الستة فهي :
Iguanidae	عيدونيات	Crocodylus du Nil	تمساح النيل
Agamidae	حرذونيات	Crocodylus marin	تمساح بحري
Chamaeleontidae	حراريات	Crocodylus à museau effilé	تمساح ذلق الخلف
Gekkonidae	زفريات	Gavial	تمساح الهند ، أذوم
Pygopodidae	سليليات	Alligator	تمساح امريكي ، ألباتور
Xantidae	تنطريات	Caiman	تمساح كيان ، كيان
Lacertidae	مقليات ، غشائيات	Squamates	٥٠ السهلقيات
Tetidae	تيديات		رتبة من الزحافات وقد قسموها إلى مرتبتين أو ثلاثين : مرتبة الحيات ومرتبة السطاليات .
Scincidae	مستقوريات		أ - مرتبة الحيات - الحيات حيوانات زسلفة مرقالة متوافقة الاخلاص والحيوم والأقارب . أنواعها المعروفة نحو ٢٧٠٠ تنتمي إلى ٢٥٠ جنساً تجمعها تسع فصائل تضم إلى خمس فئات .
Anguillidae	حنجريات		الفئات الخمس هي :
Annelidae	قشائيات		أمنيات الإخاديد
Heterodermatidae	فاخرات		
Varanidae	ورليات		
Amphibénidae	تهقرات		
Gerrhosauridae	جسوريات		
Lepidae	سدريات		
Zonuridae	غنثيات		
Xenosauridae	دولسات		
Andryropidae	عكليات		
Dibemidae	نقشيات		
Chilopodes	١٣٣١٦ - زَحَافِل		
	رتبة دويجات تعرف بلقوة الأرجل .		
Diczyoporidae (F).	١٣٣١٧ - زَحَاصِيَات		
Diczyoporidae (E).	٥		
	عارة تطور بجمهورية من فصيلة الطحريات . تتميز ببوياتها القراصدية الشكل . أجناسها خمسة : الباريغة ، الرديفة ، الزوبوره ، الكونيزيوم والمكروسيورديم .		
		Protoglyphes	

خليلة ، محبة الأطراف || لها كاعنة الصنف قل من يرغب فيها .

١٣٣٦ - زُحْمُوك *
Loranthhe sauvage (F).
Wild loranthus (E).

نوع من الحمال وصيلة الثنيات . وهو نبات طفيف يركب اغصان الاشجار الحرجية فينبغ فيها ويقنات من عصارتها . ج زحاميك .

١٣٣٧ - زُحْمِيَنَة *

Zoonomie (F). Zoonomy (E).
مجموعه من الشرائع الطبيعية التي ترمي حياة الحيوان .

١٣٣٨ - زُحْمِيَنِي *

Zoonomique (F). Zoonomic (E).
نعت ترميضي يطلق على كل شريعة طبيعية تتحكم بحياة الحيوان .

١٣٣٩ - زُحْمُغ *
Agneux (F). Lambs (E).
الزينة : اولاد الذئب لانها ترعى اي تلاق وتقع من رائها .

١٣٣٠ - زُحْمُوط *
Glaire (F). Glair (E).
الغاط السائل عند الدواجن من الايل والحيل والشاه والبقر .

١٣٣١ - زُحْمُوط * ، زُحْمِيَنَان *
Gagea (S).
Gagée (F). Gagea (E). Goldstern (D). Gagea (I).
جنس نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة ٢٠ منجها بري وبعضها زراعي تربي ، لورالها غنية مستطيلة . ازهارها صفراء اللون طوله المتق متعددة يجسمها شراخ اجوف مستطيل .

١٣٣٢ - زُحْمُورَف *
رجاء ابنة يوم .

١٣٣٣ - زُحْمُورَفِيَات *
Ephemeridae (S).
Ephéméridés (F). Ephemeridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة المرجسيات وطبقة البويات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها تحلج الاجسام المستطيلة ، دقيقة الاطراف والارباني .

١٣٣٤ - زُحْمُورُوب النَمَس *

Incurvaria muscaella (S). Mineuse des feuilles du chêne (F). Incurvaria muscaella (E).
حشرة من فصيلة الزغوليات حورشيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاذن الى بعض مناطق اوروبية واfrريقية الشمالية . فرائشها عجيبة تموش على غزونها الاسمانى . راسها لائحة ثم عاصلة ، تلم اوراق الفص والسديان ثم تنهيرا الى الاغصان البنية || جسمها صغير قصيف بطول من ٤ الى ٥ م . بطنها تراوح من ١٢ الى ١٤ م . راسها مستطيل الجرم حطلي اللون . حينها كيرتان . زيانها غيطيان . ملاسها صفيرة . مرشها جده . جريشها الى الحطلي وبطنها كلك || وراشها كبيرة . ورشها الامانيان الى التي السابق تملو بقجتها ثلثيا اللون . ورشها الحطليان الى الحطلي القاتم . ابدالها الى الحطلي الاصفر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفرافرة في القسم الثاني من الربيع . تسرح في النهار وتبيت في الليل || السرعة تثقب بشرة النصل وتلفه وتموش على خلايا الرن

١٣٣١ - زُحْمَف *
Reptation (F). Creeping (E).
الزحف الانتقال على الارض ديبيا كما تقبل الزحافات من ثابنين وعطاء وغيرها .

١٣٣٩ - زُحْمَقِن *
Erpétologiste (F).
Herpetologist (E).
الزحفن موليدي اختصاصه درس الزواحف .

١٣٣٠ - زُحْمَقِيَنَة *
Erpétologie.
Herpétologie (F). Herpetology (E).
الزحطة او علم الزواحف جزء من علم التاريخ الطبيعي .

١٣٣١ - زُحْمَقِيَنِي *
Erpétologique (F).
Herpetologic (E).
نعت ترميضي يطلق على كل ما له صلة بالزحطة .

١٣٣٢ - زُحْمَل *
Saturne (F). Saturn (E).
كوكب من مجموعة النظام الشمسي ، وهو من الخس . سرعه دورته الانتاقية في الفضاء نحو ٣٤٧٠ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق ٢٩ سنة و١٦٧ يوما || ولانجسن يدعونه شيخ النجوم ويسمونه النمس الاكبر لانه في النصوص فوق المريع واصافوا اليه الخراب والحلاك والم والم .

١٣٣٣ - زُحْمَلَة *
الزحطة : دابة تمش على جرحها من قبل اسبا (السان) .

١٣٣٤ - زُحْمَلِيَنَة مَبْكِيَنَة *
Tomoxia biguttata (S). Tomoxie à 2 taches (F).
Tomoxia biguttata (E).
حشرة وائمة غاصلة دامت من فصيلة المردليات ورتبة مفصلات الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة السبيلية . غناصها تموش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها تموش على المواد النباتية الصائرة نحو الاخلال || جسمها صغير القد بطول من ٥ الى ٧ م .

توينا الى الكسفي التاتم تملو في اواسط الظهور بقجة يفساه وزرارة . راسها مستعرض الجرم . زيانها غيطيان . حينها صغيرتان مساحتان . ظهرها غيب الخضر لا يلحف كامل البطن . بطنها مردي الشكل ينقي بسم ذلق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى آب . تسرح في النهار . تساه في تموز . تمنح للمكن تحت غاء الاشجار الباسية والاعشاب المقطوعة || البرقة منه يولوها الإدراك التام بطول نحو ١٢ م . جسمها شبه رشي الشكل ، سداسي القرواجب ، مستطير الرأس ، ضلع التكتير ، احمل اللون ، اسمر الموج يسود ويمر في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقي طليقا في التربة .

١٣٣٥ - زُحْمَلِيَنِي *

Rhypticus (S). Savonnier (F).
زحلوكة وزحلوكة جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفريشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اصلاها بحار البلاد الحارة والامراتية || اجسامها الحليجية الشكل . مسكها داعم السهف ، تمام للشمس . حينها كبيرة ، نائقة ، عاصلة ، ربيعة الاركان . زعانفها الظهرية مستطيلة ، شائكة المنحاس الامانية . زعانفها الذيلية



زحلوكة مبقية



زحلوكة



زحلوكة



زحلوكة



زحلوكة النمس

١٣٤٢ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ Metépimère (F).

Metepimerium (E). هو في الحشرات البضو التحيل البقيق الذي يصل البرجد بالبرجد.

١٣٤٣ - زُرْعَةُ الْبُحُوشِ Epimère (F), Epimerium (E).

هو في الحشرات عضو صغير يمدل كسلة وصل بين غشيش الموشوش وسائر أقسامه.

١٣٤٤ - زُرْعَةُ الْوَرْدِ هو الحقيق ، راجحه .

١٣٤٥ - زُرْعَةُ حَبِيصِي هو الحظطة ، اطبا .

١٣٤٦ - زُرْعَةُ دَهْيِي هو الحيزان الحريف ، راجحه .

١٣٤٧ - زُرْعَةُ الْبُرْقِ Elansons (F), Elans (E).

جنس طير من عمارة الحدأة فضيلة الصقريات ، أنواعه سبعة جميعها من كواسر المناطق الحارة . منسارها غليظة شديدة الانحناف . سرانها طرية . أفتانها قصيرة . غالبها قوية . أظفارها حادة . أريائها رقة متندبة الألفان ينط في ظهورها الأزرق الاسمر وفي بطنها الأبيض الاخير || جميعها يابسة المزاج ، شديدة الجناح ، سريعة الطيران لا تهاب شيئاً . انهزها الزرق والكنجي .

١٣٤٨ - زُرْعُ Planteur (F), Planter (E).

هو الذي يمارس زرع الأرض .

١٣٤٩ - زُرْعَةُ Agriculture

هي فن زراعة الأرض وبترفيها الشامل هي فن استئثار النباتات الزراعية والحيوانات الحاجة على أكل وبه الاقتصادي .

١٣٥٠ - زُرْعَةُ ، زُرْع Culture (F).

Culture, Cultivation, Husbandry, Tillage (E).

هي العمل الزراعي المخصص .

١٣٥١ - زُرْعَةُ الْفَيْضَانِ لِلْمُشْمَرَةِ Fruiculture (F), Orchardng, Fruit-growing (E).

هي التي تسمى بإنتاج ثمار الفواكه .

١٣٥٢ - زُرْعَةُ الْبُرْقِي زُرْعَةُ يَدَارِيَّة

Culture de porte-graines (F).

وسمى من قلة زراعة البقاري والهيئات والبزرات . وبهم من كل زراعة تهذب الى انتاج البذار راجح حمزة .

١٣٥٣ - زُرْعَةُ الْيَسَاكِينِ ، يَسَكَنَة Horticulture

تخصيص زراعي غاية استئثار النباتات البستانية دون سواها .

١٣٥٤ - زُرْعَةُ التَّرَاوِيْقِ ، سَرَقَسَة

Mosaiculture

تخصيص زراعي يركز على ترويب الحدائق وفقاً لاشكال هضمية يلمب فيها لين النبات الدور الفرنسي .

١٣٥٥ - زُرْعَةُ الْحَرَاكِ ، حَرَاكَة Sylviculture (F), Forestry (E).

هي علم التصريج يبحث في استنبات وقرس واستئثار الأشجار الحرجية .

١٣٥٦ - زُرْعَةُ الْخَضَارِ ، زُرْعَةُ الْبُقُولِ

Culture maraichère, C. potagère (F), Pot-herbe cultivation (E).

تخصيص زراعي غاية انتاج البقول .

نحو ثلاثة أسابيع ثم تخرج من التلق وتعدل بخيط حريري المائدة حتى سلط التربة حيث تنويحه نحو الاضباب البرية . والسرقة عند بلوغها الادراك تمام تعلق نحو ٨ م . جسمها مستطيل الشكل ، مبط الجرم ، اسمر اللون ، ميمش الحلب ، اسيد الرأس والفرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعاً ينتهي طلياً ضمن جراب السرعة في الجلالة او بين الارواق التي تلتاس التربة .

١٣٣٥ - زُرْعَةُ الْبُيَاتِ Incurvarilidae (S).

Incurvarilidae (F), Incurvarilidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشنيات الاجنحة . انواعها المرفقة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . تسرح في التباد وتبيت في الليل . طياتها متدل البرقصة والحرم || اجسامها صغيرة ، مغزلية الشكل . رؤوسها مسطعطة . عيونها كبيرة ، ناعرة . قرونها الاستشعارية غليظة . شديدة الطول . ملابسها صغيرة ، قصيرة ، جالسة . مرافقها جناح . طياتها كيفية التمدل القصير . حذاتها لا يوجد لها . رؤوسها ذلقة الاطراف الخارجية . فلتايب قوائمها الخلفية رباعية المتناسخ || اساريها مبططة ، زباء الفشار . لاهة في اول عهدتها ثم خاضعة تيش داخل جراب مبطط تأوى اليه ويغيره عند الاضلال || خادتها طليقة تصغر ، في طور الاكمال ، ضمن جراب السرعة || أشهر اجناسها الزعلوب والأديلة والنصفوده .

١٣٣٦ - زُرْعَةُ Turnera (S), Turnère (F).

جنس نباتات طليعية عشبية من فصيلة الزديقيات . انواعه نحو ٩٠ متبها المناطق الحارة والامتوائية . جميعها سرية التنو . اوراقها متعاقبة ، متعقة ، احليجية ، ذلقة . ازهارها ابيلة الارتكاز فروية التصبيح || اوراقها طليعية تنمد القلب وتنشط الباه || أشهر انواعه الزداع السابق .

١٣٣٧ - زُرْعَةُ شَابِقِ ، دَمِيَاَة Turnera aphrodisiaca (S), Turnère aphrodisiaque, Daminara (F).

جنية زراعية طليعية مهدا البلاد الحارة . ساقها فرفرا زغبية الاحام ميمدة المسام اللندية الشكل النعنية للمادة . اوراقها متعقة ، متعاقبة ، احليجية الشكل . نصلها جامد اللون ، كبير الثمرق ؟ صفحه العليا كيفية المسام اللندية || يستخرج من اوراقه زيرويه زيوت طليعية ويولد دمية وراثتية صاعرجا الفعالة شديدة البقع على الاضضاء التناسلية . تليها شابق منظر . كثيرها مؤذ .

١٣٣٨ - زُرْعَاتُ Turnera (S).

Turneraceae (F), Turneraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها مهددة جميعها عشبية او شبية . ازهارها شتوية خاسية التركيب . ثمارها حقبة ثلاثية المصارع . بذورها دقيقة سرء اللون || اعرف انواعها وثمرها الزداع .

١٣٣٩ - زُرْبُ Pars, Portion

هو التصيب والحصة . ج ازداب .

١٣٣١٠ - زُرْدُوكُ هو الجدار القيد . اطله .

١٣٣١١ - زُرْ Bouton floral (F), Floral bud (E).

هو الكم الزمرة قبل انبلاجه .



زداع شابق

وتوب القمح || موطنها فياني افريقية وإدغالها. قربها الشب وورق بعض أنواع الميموزا والسنت والاكوبية . تعيش جماعات صغيرة العدد أجملها يتألف من فصل وثلاث أو أربع أنثى وثلاثة أو أربعة مدبار .

١٣٣٠ - زَرَاقَة Camilopard, Girafe (F). Camelopardus (E).

الزراعة كوكبة نجوم شمالية المقيع مركزها بين كوكبة هسك الاعنة وكوكبة الدب الاصفر || عدد نجومها ١٩ جميعها من المرتبة الخامسة .

١٣٣١ - زَرَاقِيَّات Giraffidae, Camelopardalidae (S). Giraffidae, Camelopardalidae (F). Giraffae, Camelopardalidae (E).

فصيلة حيوانات مجترمة من ذوات الظلف تقبل في الزمن الحاضر جنس الزرافة الوحيد النوع .

١٣٣٢ - زَرَاقَة * Fistularia (S). Fistularia (F). Fistularia (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الزرقانيات. أنواعها المعروفة ثلاثة موطنها ببحار البلاد الحارة من البحر الاحمر الى بحر الصين || اجسامها غليظة ، مستطيلة ، لزجة ، صاعدة الحراشف . رؤوسها صغيرة ، انبوية الاعظام الطويلة . زعانفها الذيلية غارقة تلتصق في وسط كل منها عذبة مستطيلة دقيقة تشبه سوط الخويذ || لحومها كاعنة الصنف وبهشها جعالي المادة مؤخر .

١٣٣٣ - زَرَاقِيَّات * Fistulariidae (S). Fistulariidae, Fistulariidae (F). Fistulariidae (E).

فصيلة اسماك بحرية يربطها من شاكلات الزعانف ، اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها معظم ببحار البلاد الحارة || تتميز باجسامها الضيقة المستطيلة وباعظامها الانبوية . عينها صغيرة ناشزة . زعانفها الظهرية غليظة الاركانز قريبة من الذيل || اعرف اجناسها واشهرها الزرافة والصيصة .

١٣٣٤ - زَرَاقُود * , أوستولوزية , هسَمَتُون , Aristolochia (S).

Aristolochie (F). Worm-killer, Birthwort (E). Osterluzel, Hohlwurz (D). Aristolochia (I).

جنس نباتات عشبية ليلية عارضة معمرة من فصيلة الزراندنيات . انباضها عديدة منها البرية والبرية والعلوية . اوراقها متناقبة قليلة الشكل ومنها ثنائية أو ثلاثية التخصيص انفراديا كبيرة القد ، غريبة الشكل ، مختلفة الاوان . جذور الانواع الطيبة كافورية الرائحة تشتمل كمرة وفي مدرة القطن ، تسهل الولادة ، تزيد من الربو ، تنفي القروح وتجلو الاستان . ويستخرج منها جوهر جعالي فداي يدعى زرافتين قليلة مقو جزيل النفع ، كثيره سم زعاف .

١٣٣٥ - زَرَاقُود أرغَب , سَمَمَقَار , سَمَمَقَرَان Aristolochia tomentosa (S). Aristolochie cotonneuse (F).

نوع من الزراندن ساقه مادة عارضة زبدية تطول من ٥ الى ١٠ امتار اوراقه قليلة ذلقة الزمان الاخير . نعلها خلي البثرة . انذاره كبيرة القد ، قليلة التحسين . صفحتها الخارجية صفراء اللون اما الداخلية فبنفسجية .

١٣٣٦ - زَرَاقَة الزُهور Floriculture

تخصيص يتناول زراعة وتعد النباتات الزهرية والجزينية .

١٣٣٧ - زَرَاقَة الشجر Arboriculture

تخصيص في الزراعة يتناول استئثار الاشجار دون سواها .

١٣٣٨ - زَرَاقَة الكرْم Viticulture (F).

تخصيص في الزراعة يتناول الكرمة .

١٣٣٩ - زَرَاقَة الكرْم Trufficulture (F).

تخصيص في الزراعة يبحث في استنبات واستئثار الكرْم .

١٣٤٠ - زَرَاقَة المُستَدَات Culture en espalier (F). Espalier-culture (E).

تخصيص في الاساليب الزراعية التشكيلية المتبعة في قيادة وتعد الانجار للثمرة المرتكزة على المستدات .

١٣٤١ - زَرَاقَة بَا كُورِيَة Culture forcée (F).

كُل زراعة تستعمل اوانها المألوف ان بالوسيلة او بالقرينة .

١٣٤٢ - زَرَاقَة بَعْلِيَة Dry farming

كُل زراعة لا يتبعها راي بل تقوم على اسقاء المطر .

١٣٤٣ - زَرَاقَة حَدِيْقَة Néo-culture (F).

كُل زراعة ترتكز على الاساليب التقنية الحديثة .

١٣٤٤ - زَرَاقَة كَهْرَبِيَة Electroculture

هي الزراعة القائمة على الاستفادة من الكهرباء في سبل الانتاج الباكر وربما تحمين الانتاج .

١٣٤٥ - زَرَاقَة لَاحِيَة Culture intensive (F). Intensive cultivation (E).

زراعة تقدمية تهدف الى الحصول على اكبر انتاج ممكن في بقعة معينة من الارض .

١٣٤٦ - زَرَاقَة مِيكَانِيْكِيَة Culture mécanique (F). Mechanical cultivation (E).

هي الزراعة القائمة على استعمال الآليات .

١٣٤٧ - زَرَاقِيَة Agricole, Agronomie (F).

صفة كل ما يتنسب الى الزراعة او يتصل بها .

١٣٤٨ - زَرَاقَة * Girafa camelopardalis (S).

Girafe (F). Giraffe (E).

الزرافة حيوان لبون مجتر من ذوات الظلف وفصيلة الزرافيات الخالية من الجهاز القسوي || والزرافة سيدة الجنس والنوع جسمها سيم البير ، ارتفاعها الكامل من ظلفها حتى نقرة رأسها يقو ستة امتار وارتفاعها المألوف من الظلف الى الحمارك لا يقل عن ٢٢٥ سم . وهي قصيرة الرجلين طويلة الياض والعتق منحدرة الظهر ، لها قرنان عظميان منفلدان صغيران يتوسلها تنوء بارز . ثوبها الى الصفرة يطولها تقيع قروي متتابع التبيين لا تقياس الشكل والحجم . وقد قبل في وصفها لها رأس القرس وجسمه ، وعنق الجمل وراسلته ، آذان الثور ، ذنب الحمار ، قوائم الهامة



زرافة



زَرَاقَة



زَرَاقُود

leuse, Noctuelle colorée (F). *Brotilomia metaclosa* (E).

حشرة بجلة الألوان المتداخلة من فصيلة النسيات رتبة حشرغيات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الساحلية المتاخمة. فرشتها واضحة قوتها رقيق الاذياع. سرقها غافلة تركب الكثير من النباتات البرية والزراعية اغصانها الوردة والبنفسج || جسمها مستطيل الجرم بطول من ١٣ الى ١٥ سم. يسلطها قروح من ٢٨ الى ٤٢ سم. رأسها مستطيل الخصر، كبير الخطر، حطلي القرون، اسمر الموضع. عينها كبيرتان، نافذتان. زباناها غطيان، مستطيلان. ملامسها صغيرة. مرشها مستطيل. بيوتها حطلي القرون وعلتها ايضا || رواشها مزودة بويجعة وبغرضه الخنار الحارضي || الاثني اكبر قدام من الذكر واغلف بطناً منه || لها ثلاثة ابيال في الجيل. تظهر فراشة الجيل الاول في اذار وفراشة الجيل الثاني في حزيران وفراشة الجيل الثالث في ايلول. تسرح من القروح الى فحة القيل بين الفجر التامق الى الشروق || تباشر الاثني معن المكان بعد التكمير ويويون وتلقو لها سطيلة الشكل تعلقها مادة غروية لاصقة تنبتا على الصفحات السفلى من تصال الاراق || السرعة عند بلوغها الاذراك بطول نحو ٤٠ سم. ثوبها يتأرجح بين الاخضر والاسمر يملو خط ثوبي زاهر متوسطه ليل سود ويلموا ايضا حطان جانبيان قاطبان. ورأسها الى الحطلي يملو مويج اخضر. منبها ورواجها الى الحطلي الاسمر || طوط الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في القربة ضمن جراب من الطين .



زربة دبقه

١١٣٧٦ - زُرُونْد مُتَبَانِي ، اُوسْتُولُوحِيَّة مُتَبَانِيَّة ، لُوف عَطَرِي

Aristolochia serpentaria (S). *Aristolochie serpentinaire* (F). *Virginia snake-root* (E).

نوع من الزراند الطبي. ساقه متعصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقه قليلة القاعدة ، احليلجية اقزام الثاني والثالث، ستانية الاخير ، ثنائية التقويس ، صغيرة القد. جلوده طيبة عطرية غنية بالزراندين .

١١٣٧٧ - زُرُونْد دَالِمِ الْخَصْرَةِ ، سُوْرَنِيَّات *Aristolochia sempervirens* (S). *Aristolochie toujours verte* (F)

نوع من الزراند ساقه مدادة قليلة التحريش تطول نحو ١٥٠ سم. اوراقه عروية قليلة الشكل مستطيلة مدبة اقزام الاخير. نصلها مائل للبرشة ، لامع الغضار الزاهي. ازهاره الى الصفرة المصلمة بالاحمر .

١١٣٧٨ - زُرُونْد سِيْفُو ، مَسْهُوْرَة

Aristolochia macrophylla (S). *Aristolochia siphon* (F). نوع من الزراند ساقه مدادة عارضة تطول من ٥ الى ١٠ امتار . اوراقه قليلة الشكل يملوا بعض الزغب . ازهاره كبيرة مقوسة لونها الى الصفار الحطلي يملو تحطيط ابيض .

١١٣٧٩ - زُرُونْد صِيْنِي

Aristolochia moupinensis (S). *Aristolochie de Moupin, A. de Chine* (F).

نوع من الزراند هذه الصين. ساقه مدادة عارضة تطول من ٥ الى ٨ امتار . اوراقه متعصبة النصل اعناقها مدبة الزغب. ازهاره صفر يملوا من الداخل تقيج احمر .

١١٣٨٠ - زُرُونْد مَسْهَدَب

Aristolochia fimbriata (S). *Aristolochie frangée* (F). نوع من الزراند ساقه متعصبة تملو نحو مترين . اوراقه مستديرة شبه مقطوعة. ازهاره مهدبة الخنار صفحتها الخارجية قسقية اللون اما الداخلية لمخططة .

١١٣٨١ - زُرُونْدِي اَبِيَسِي

هو المبنابة الثنائية النصل. اطلها .

١١٣٨٢ - زُرُونْد بَات

Aristolochiaceae (S). *Aristolochiáceae* (E).

فصيلة نباتات مدادة عارضة او متعصبة. اجنتها وانواعها كثيرة الهند مهدبة البلاد الحارة . اوراقها متعاقبة مستقيمة. ازهارها ابيلة الاكثران ، فردية التجميع ، كبيرة القد . ثمارها كابر سداسية القلق. منها انواع طيبة حميدة النتج .

١١٣٨٣ - زُرُونْدِيْن ، اُوسْتُولُوحِيْن

Aristolochina (F). *Aristolochin* (E).

جنس جمالي فضاء مر العلم يستخرج من جلور بعض انواع الزراند اغصانها :

Aristolochia serpentaria

Aristolochia clematidis

الزراند الشباني

الزراند الطلياني

١١٣٨٤ - زُرُونْدِي ، زُرُونْدِي

Parage (F). *Folding* (E).

قليلة اللحم واللماز .

١١٣٨٥ - زُرُونْدِي دَكِيكَة ، عَسْمِيَّة مَلُونَة

Brotilomia metuclosa (S). *Brotilomia metuclo-*

١١٣٨٦ - زُرُونْدِي ، شاي المكسيك

Chenopodium ambrosioides (S). *Chénopode fausse-ambrosie, Ambrosia, Thé du Mexique, Thé de Sibitsa, Thé des Jéuites* (F). *Mexican tea, Wormseed, Mexican goose-foot* (E). *Mexikanisches tee-kraut, Teagesselfuss* (D). *Ambrosia, The del Mexico* (I).

نوع من الاثنية وهو نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة السرمقيات. يملو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقه مستطيلة الشكل ، نصلها زغب البشرة متجعج الصفعة المنددة . ازهاره صغيرة القد تانبية الاكثران || اوراقه عطرية عمية تستعمل استمال الشاي .

١١٣٨٧ - زُرُونْدِي ، سَارْمَنْت

Sarment (F). *Vine-shoot* (E).

هي السرح ، قصب الكرم .

١١٣٨٨ - زُرُونْد ، هو حار الزرد ، اطلها .

١١٣٨٩ - زُرُونْدِي

Vestibule

الجزء الداخلي من القرح يبتدئ بعد حاجز الكبة وينتهي عند عتق الرمح .

١١٣٩٠ - زُرُونْدِي ، هي فلك زرده ، اطلها .

١١٣٩١ - زُرُونْدِي ، مَسْجَرَج

Zébré (F). *Striped* (E).

نمت وصني يبر عن الخطوط المعترضة الانقباضية الطول والقرض التي تملو اقواب الحيوان كما هو الحال في حمار الزرد .

١١٣٩٢ - زُرُونْدِي ، زُرُونْدِي ، بَلَسَان

Sturnus (S). *Stourneau* (F). *Starling* (E).

جنس طير من فصيلة الزروريات. انواعه ستة منها



زربيع

Bernage (F). ١٧٤٠٢ - زُرْزُكَة الرَّعَايَة
هو الزرور المكنون من خليط من البذار يستعمل كملف
اخضر .

Drogall ١٧٤٠٣ - زُرْزُكَة الْعَصْفَر
هو زرع الحبوب قبل المطر . والعصر أول سقاية يسقاها
الزرور من المطر .

Semences (F). Seeds (E). ١٧٤٠٤ - زُرْزُكَة
هو الحب للمد الزرع . راجع بذار . يقال اعطي زرة
ازرع بها ارضي || والزرة : فرخ القيقبة .

Glabé, Sol (F). ١٧٤٠٥ - زُرْزُكَة ، مَسَاوَكَة
Glebe, Sol (E). الارض التي تزرع .

Sole (F). Break, Field (E). ١٧٤٠٦ - زُرْزُكَة ، عَمْرَكَة
كل زراعة من الزراعات التي تتعاقب في ذات المكان .

Céréaline (F). Cerealin (E). ١٧٤٠٧ - زُرْزُكَة
هو عنصر الخبز الموجد في النخالة ويقال له سبورين .

Fritolée, Bouques (F). ١٧٤٠٨ - زُرْزُكَة *
Leaf drop streak (E). مسماء المهندس عادل ابو النصر ومرض يجهد اوراق البطاطاء

وبينهم من قال « مرض يجهد اوراق البطاطاء » || وهو
ضرب من سرج البطاطاء يولد الى يوروس لا يصيب القرنة
فيحور شكلها الطبيعي من الاستدارة الى الاستطالة
وين البقيع الى المردني بعد ان يزيد حتى غور المويينات .
اما النباتات المصابة فيجدو نخيلة الفروع المزدعة ،
صفرة الاوراق المنكشة المنجنية بالاخضر المانيق والباهت
والاصفر ثم يتجدد نصلها وتلتوي اطرافه وصله نحو
الارض || اضراره متفاوتة التندير لانها تعود الى طاعة
اليوروس وعلى انتشاره || يكالغف بالتصايب البذار
السليم وباختيار الاربة الفقيرة لان فقر التربة مع شدة
الحرارة تشتتاه كثيرا .

Scornita ١٧٤٠٩ - زُرْزُكَة *
حلقة من حلقات بطن الحشرة الذي يتركب من عدة
زرايين .

١٧٤١٠ - زُرْزُكَة * ، زُرْزُكَة الشَّرَق
Elanus melanopterus (S). Elanion mélanoptère (F).
Black-winged kite (E).

طائر من الزراوين ينتمي الى عمارة الحدا وفصيلة
الصقريات . موطنه الشرق الاوسط وافريقية ، يكثر في
مصر وسورية . رأسه وسنقه سود . ظهره وذنبه
الرمادي الازرق . بطنه ابيض . منوره اسود . عيانه
قزوينتان . غذائه الى الصغار اليرقات || يلدن عشه
في الاجار الرقيقة . قوته القواصم والجراد ويخلف
الحشرات .

Colombine (F). ١٧٤١١ - زُرْزُكَة الْحَمَام
Columbine (E).

سماد عشوي في بالازوت ويسائر العناصر الغذائية .
يعتبر من الاسمدة الجارية .

١٧٤١٢ - زُرْزُكَة الطَّيْرِ هو البيتية ، الحلبا .

١٧٤١٣ - زُرْزُكَة هي الزبور الصغير ، الحلبا .

القواطع والارابه . تعيش جماعات . قوتها الحشرات
ويبيض البذار . تتميز بريشها الاسود اللامع المرط ،
بامتلاحة اجنتها ويقصر اخذائها || عثن في الاجمار
انها تحسن سعدا من « ال » يضافت على مرتين في
السنة || اشهر انواعها ما يتبع .

١٧٣٩٣ - زُرْزُور أُرْجَوَانِي
Sturnus purpureus (S). Ectourneau pourpre (F).
طائر من الزرور موطنه ايران والافغان ، ريشه ارجواني
متنشر بالابيض . طوله نحو ٢٠ سم . سره قليل العدد .
يألف للناقص والمقاصب ويجاري الماء .

١٧٣٩٤ - زُرْزُور أَسْوَد
Sturnus unicolor (S). Ectourneau unicolore (F). Spotted starling (E).
طائر من الزرور طوله نحو ٢٠ سم . قويه سوي اللون
الاسود اللامع . يعيش اسراب كبيرة العدد يجوب البلاد
من الهند الى جنوب اروبة .

١٧٣٩٥ - زُرْزُور الْبَادِيَة ، سَوَادِيَّة
Onychognatus (S). Onychognata, Ectourneau noir (F). Grackle (E).

طائر من الزرايزر يألف البادية يكثر في شبه جزيرة
سينا فوه الى السودان يملو موج ائزرق . قوامه
حر منقاره اسود . يألف الادغال واجمار اللست .

١٧٣٩٦ - زُرْزُور الْهَشْد
Sturnus splendens (S). Ectourneau splendide (F). Splendiferous starling (E).
طائر من الزرور قويه متراكب الالوان الزاهية الجميلة
المرطبة فيها الاسود والاخر والجزوي والاصفر والابيض
والخضلي . طوله نحو ٢٢ سم . يألف المراهي ويجاري الماء .

١٧٣٩٧ - زُرْزُور مَالُوف *
Sturnus vulgaris (S). Ectourneau vulgaire, E. commun, Saisonnet (F). Common starling (E). Star (D).

طائر من الزرايزر القواطع يجوب الشرق الاوسط واروبه
وافريقية النائية . طوله نحو ٢٢ سم . قويه الى السواد
اللامع يملو موج ائزرق واخضر ورقشة يضافت بخلف
سحم فضفا بين الظهر والصدر والبطن . منقاره سختي .
عيانه كستينان || قوته الحشرات والديدان والحلزون
والحرب والآخر العنينة .

١٧٣٩٨ - زُرْزُورِيَّات
Sturnidae (S). Sturnidae (F). Sturnidae (E).

فصيلة طير من رتبة الجواثم اجنتها واطرافها مدهية .
اجنتها ريشة متوسطة القد . اجنتها مستطيلة .
اخذائها قصيرة . اسرارها قوية . منقارها مخروطية الشكل
مدقة الطرف . اقواها مدهية الالوان المختلفة || اشهر
اجنتها الزرور والسمسر واللينات والبنفاف .

١٧٣٩٩ - زُرْزُكَة هو البر باريس ، الحلبا .

١٧٤٠٠ - زُرْزُكَة
Emblaver (F). To sow with wheat etc. (E).
حرث الارض وسدعا ويغروا .

١٧٤٠١ - زُرْزُكَة ، زُرْزُكَة
Céréales (F). Cereal, Corn crops, Grain (E).
كلمة شاملة تطلق على النباتات الزراعية الموصية . من
فصيلة التجيليات التي تزرع لاستنار حبوبها كمنشوية
الذئانية .



زرزور الهند



زرزور مالوف



زرن



زور

١٢٤١٤ - زُرْف *
Parisoreus (S).

Mésangeal (F). Siberian Jay (E).

جنس طير من فصيلة الزرقائيات ورتبة الجوارح سنيات الخاتير. له نوعان واحد أسودى والآخر كندي. يألف الاقلام الباردة والقفابات وأسراج الصنوبر انحصار صنوبر سمير || جسمه معتدل القد طوله نحو ٣٠ سم. قوته الى القفص الصنوبرية بامتلاكه الرأس قوته اسود. معقاده غروفي الشكل ، شديد الصلابة ، جناحه معتدل الطول. ذئبه رتاجي الرقاع يستدير الطوف. سحقة حبه ذئبية اللون. رصفاء الى السمة المظلمة || قوته الحشرات والبذور ويعجن بلور صنوبر سمير في تجاويف الاشجار لتفتر كزخمية لفصل الشتاء || يائن حشه في الاشجار القريبة من سطح التربة. الاثني تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها وسطها نحو ١٧ بيضا بينما الذكر يئين لما للفناء.

السهم. رؤوسها غروفيّة ، كبيرة الاشداق ، كثيرة الاسنان للفكية والحنكية .

١٢٤١٨ - زُرْفُون

Zircon حجر بلوري مركب من سيليكات الزرقيونيوم. ثقته النقي يراوح من ٥٠ الى ١٧٠ صلاحيته نحو ٧٠٢ لونه حاد الاستقرار يراوح من الاصفر البرتقالي الى الاحمر، لمعانه بلوري المراج. هو شائع الاستعمال في الصياغة يعتبر من الاحجار الكريمة البالية الى المزية الزاينة او الخاسة .

١٢٤١٩ - زُرْفُونِيوم

Zirconium معدن باهي الاتوم مركزة بين الاوليونيوم والسيلايوم. رمزه (Zr) وزنه الاتومي ٨٩.٩٦ .

١٢٤٢٠ - زُرْفِيَاكِيَّة

Murina (F). Moray (E). هي الشقي ، من الاسماك البحرية المفترسة ، اطبا .

١٢٤٢١ - زُرْفَب

هو القلقوس ، اطبا .

١٢٤٢٢ - زُرْفَكَة

Penil (F). Penile, Penial (E). الجزء الخلارجي العلوي من القفرج .

١٢٤٢٣ - زُرْفَكَاة ، زُرْفَكَة

Zingiber zerumbet, Anomum zerumbet (S). Zerumbet, Anomum savagae (F). Wild ginger, Broad leaved ginger (E). Zerumbet, Wilder ingwer (D). Zenzaro blanco, Z. salvatico (I).

نبات بري جلموري طيب من فصيلة الزنجبيلات منته البلاد الحارة. مسنه يطر الهم وزيل روائح الخمر والصلب وماشبه. وهو منه معوي يغلى الرياح ويغري القلب. ساقه منتصبه حولية تطلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها متعاقبة ، تفصلها سناني الشكل جامد الصفعة . ازهارها هامة كبيرة القند ، كبريتية اللون .

١٢٤٢٤ - زُرْفَكُولَة ، زَهَر التلج

Chionanthus (S). Chionanthe, Arbre de neige, A. à franges (F). Fringe tree, Snow-drop (E). Schneeflockenbaum (D). Chionanto, Fior di neve (I).

جنس اشجار وشجيرات وشجيرات برية وزينة من فصيلة البترونيات . جلدوها اسطوانية غروفيها ولتقدم سطحة . اوراقها عابطة متعاقبة بسيطة للتصل الجلد . ازهارها متكونية التنجبع ، ثلاثية التركيب ، بيضاء اللون || اشهر انواعها الزينية مايل .

١٢٤٢٥ - زُرْفَكُولَة الشَّرْقِيَّة ، زُرْفَكُولَة صِينِيَّة

Chionanthus retusa (S). Chionanthe de Chine (F). شجرة سبروتية تطلو من ٥ الى ٨ اثمار . اوراقها اخضالية مشقوبة القاعدة ، مدببة القصة. تفصلها بطول من ٤ الى ٧ سم. ويغرس من ٣ الى ٤ . عروقه باردة خالية البشرة . شكلها الزهري منتصب الاوتكاز ، ازهارها عطرية العرف صبرية القند تطلو نحو ٢ سم. || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٤٢٦ - زُرْفَكُولَة فِيرَجِينِيَّة

Chionanthus virginica (S). Chionanthe de Virginie (F). شجيرة سبروتية تطلو من ٣ الى ١٠ اثمار . اوراقها سنانية للتصل الجملة تطلو من ٨ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٩ سم. || شكلها الزهري مثالي الاوتكاز .



زرف



زرفوة مبدولة



زرباد



زربوك الشرقي

١٢٤١٥ - زُرْفُوم ، جَرَبُوتُ البَحْرِ

Conger (S). Congra (F). Congra (E).

جنس اسماك بحرية يبيض من مفتوحات المثانة عامات الاصيل وفصيلة الزرقونيات . انواعها المعروفة اربعة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها مسطيلة ، حرياطة ، عادمة السهم . تطلو من متوين الى اربعة امتار . اقلها تختلف مع الانواع ، رؤوسها شبه غروفيّة . اقلها كبيرة الاشداق . شاربقة القفص العليا . اسنانها فكية وحكنية ، جميعها ذرية . مناسها انابيب صعيقة تحمل مقدم الحظ . حينها كبيرة مستديرة معتدلة التفوز . زمامها الظهري فردية مسطلة ، قليلة الرمش تمتد من اواخر الزمام الاول الى طرف اللؤل . تقاطعها الترجية التي تمتد ايضا من اواخر الزمام الثاني الى طرف اللؤل . زمامها الخوضية والذيلية منعدلة || اشهر انواعها الزرقونية المبدولة .

١٢٤١٦ - زُرْفُومَة مَبْدُولَة * ، جَرَبُوتُ البَحْرِ

المَبْدُولَة ، ثُون بَحْرِيّ ، حَرْمُوط

Conger conger, Conger vulgaris (S). Congra commun, Anguille de mer (F). Conger-eel (E).

نوع من الزرقوم . سمكة بحرية مفترسة يبيض . اسطوانية فسيحة تقبل سطح اضلاع شمارة المناطق الحارة والمعتدلة الحارة . لتفصل مربع المسنور حيث تكثر الاسماك الصغيرة ولا تمتد من الجنب ابدا كانت إن حل الشطوط الرملية أو بين الصخور || جسمها مستطيل الشكل ، بطول من ٣ الى ٤ اثمار . تقارها عادم السهم ، غروي السطح المائس || فوجها الى الزبدية الزرقاء يبق من القدر ويظهر من البطن || تحلبها الجسدوية لا تختلف من تحلبة الجلس اي الزرقوم || تسرح غالبا في الليل . صيدها يستلزم عدة خاصة اسحبها شص مثلت الحراب وضبط متين لا يفلت فيه الاحتكاك بالصخور || لحمها متوسط الصفت ماكوك .

١٢٤١٧ - زُرْفُومَة

Congridae (S). Congridae (F). Congridae (E).

فصيلة اسماك بحرية مفترسة يبيض من مفتوحات المثانات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من احافير الخلفية الباسيد من الاباح الثاني . اما الماصر منها فتقلل البعد يمتد الى جنس واحد يعني زرقوم || اسطوانية بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اجسامها مسطيلة ، عادمة

١٧٤٣٦ - زُونِجَة * ، اُرُوَا كَوَكِي

Agrostis verticillata (S). *Agrostide verticillée* (F).
Switch grass (E). *Haargras* (D). *Pennacchlin* (I).

نبات حشوي بري سولي من النجيليات يطول من ٢٠ الى ٥٠ سم. أوراقه سائبة ضمية التجميع. يكثر في الاربة المتصلة الاندماج والطلوعة ، ترعاء الماشية وتستحبه .

١٧٤٣٧ - زُونِجَة * ، زَعْفَرَان الْجَبَلِ ، زَهْرَان

Bulbocodium vernum (S). **المرج**
Bulbocode printanier, *Campanetta* (F). *Meadow saffron* (E). *Lichtblume* (D). *Colchico di Spagna*, *Croco rosso* (I).

نبات يصل بري من فصيلة السورتيانيات يكثر في البلاد الجبلية والمرج الرطبة. شكله بين السورتيان والزعفران. يصله سمراء اللون. أوراقه ثلاثية العدد ضيقة التصل المستطيل المحين. شراخه قرمي الانتشاب يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. زهرته وردية أو بنفسجية اللون، كمية التفتل من أزهاره ينساق من نسيان الى حزينان يقال ان أزهاره صبغتها الجبال لا تخلو من الفوائد الطبية غير المقررة .

١٧٤٣٨ - زَوَيْعَة **Emblavure** (F).
Land sown with wheat etc. (E).

هو الحقل وكل مزروع سمه وكرب وبلر وأثير .

١٧٤٣٩ - زَوَيْعَاء * **في رباح الفايين ، اطلبه .**١٧٤٤٠ - زَوَيْعَاء * **هي الدخلة السوفلية طائر من الدسل .**١٧٤٤١ - زَوَيْعَاء ، شَلْبَعَة هَرِيصَة ، أَم ذَنْقِيس **Eutropius niloticus** (S).

سمكة نهرية مأكولة من فصيلة السلوبيات يكثر وجودها في النيل والنجرب .

١٧٤٤٢ - زَوَهْرِب * **Zosterops** (S).

Zosterops (F). **Zosterops** (E).
طائر من فصيلة الزطروبيات . موطنه بعض الاقاليم الحارة من الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية || جسمه صغير القد اعين القوام بطول نحو ١٢ سم. لونه الى الخضار الزهني . رأسه وبنجاحه وذنبه الى الخضار اللامس . عيناه مظلقتان بالابيض . شفة عينه الى الخضار الزهني . ذقنه مقلقة وبجمل . ريشه ابيضان اسمران || قوته الحشرات الصغيرة والفرش والذباب والحمام || يذئن في الاجمار الرميعة . الاث تنفع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بتدوية الذكر نحو ١٣ يوما .

١٧٤٤٣ - زَوَهْرُوبِيَّات * **Zosteropidae** (S).

Zosteropidae (F). **Zosteropidae** (E).
فصيلة طير من الجوارم ريققات المتناير . اجناسها وأزواجها المعروفة نحو ٨٠ موطنها معظم المناطق الحارة من العالم القديم . تألف الثنايات والاسراج والحدائق وتقترب من المساكن الريفية || اجسامها صغيرة القد ، ريشة القوام . أثوابها متباينة التفتيش يكثر فيها الاخضر || قوتها الحشرات الصغيرة والفرش والذباب والحمام وبعض البذور البرية .

١٧٤٤٤ - زَوَصِج ، زَوَصِج **Alto-estracus**

هو للقيم الابيض الرقيق الخفيف البعيد .

أزهاره عطرية البرق تطلق من ٢ الى ٣ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٤٤٧ - زُرُونُف **Ruisseau** (F). **Rivuleux** (E).

هو الجبل الثاني الذي يسحب في النهر . ج زرايف .

١٧٤٤٨ - زُرُونِج **Arsenic**

عنصر شبه مطلق سحابي اللون عديم الرائحة والطعم يوجد في الطبيعة متزجاً بغيره من العناصر بكميات غشيلة متفرقة القدر كما انه يوجد في ماء البحر وفي جسم الانسان || دوز (As) وزنه الذري ٧٤.٩١ . ثقله النوعي اذا كان متلوها ٧.٥ وان كان لا متلوها ٧.٥ || يستعمل باستخلاصه من مركباته الطبيعية وهو مع مركباته الصناعية من العناصر السامة القاتلة . مركباته الصناعية عديدة تستخدم في شتى الحقل اخصها مقايمة وبادة الحشرات الزراعية كما انها تستعمل في الطب لتقوية البلية وفي علاج بعض الامراض الجلدية .

١٧٤٤٩ - زُرُونِج أَحْمَر **Réalgar** (F). **Réalgar** (E).

هو كبريتور الزرنيخ الطبيعي .

١٧٤٥٠ - زُرُونِجَات **Arsénates** (F). **Arsenates** (E).

مركبات صناعية ترتكز على الزرنيخ تستعمل في مكافحة الحشرات النباتية . اهمها استمالا :

Arsénate de plomb (F). **Lead arseniate** (E).

Arsénate de cuivre (F). **Copper arseniate** (E).

Arsénate de soude (F). **Salt-wort arseniate** (E).

١٧٤٥١ - زُرُونِج * **Crossandra** (S). **Crossandre** (F). **Crossander tree** (E). **Franzenbeutel** (D). **Crossandra** (I).

جس جنات زريقية مسرة من فصيلة الاثنيات . انواعه خمسة منها الهند وافريقية الشرقية . أوراقها اهليجية متعاقبة . ازهارها نوري التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها عطرية مستندة لثلاثت القنطرة الجبلية الشكل . ألوانها تختلف مع انواعها منها الابيض والاسفر والاحمر والمخض .

١٧٤٥٢ - زُرُونِج * **Garrulus** (S). **Geal** (F). **Jay** (E).

جس طير من فصيلة الفراريات وربة الجوارم . انواعه ١٢ جميعها بقدر الهامة . رؤوسها كبيرة ، متنايرها جالسة قوية . أثوابها ملونة جميلة الزاويق || وهو يقبض الاصوات كالبيده . قوته جميع انواع الحشرات الكبيرة والقار والظاء والصابير الصغيرة والبلوط والحبوب والفاث || أشهر انواعه ابو زريق والقيق .

١٧٤٥٣ - زُرُونِجَة **Enclos** (F). **Enclosure**, **Paddock** (E).

هي الحظيرة من خشب تحجز فيها المواشي .

١٧٤٥٤ - زُرُونِجَة الخُفَرِ **Porcherie** (F).

هي الخفارة ملوى الخنازير .

١٧٤٥٥ - زُرُونِجَة الطُيُور **Pigsty**, **Piggery** (E).

هي الحديقة ، اطلها .



زورين



زورباب



زريقية



زردية



زطروب

اوراقه مدينة القاذبة ، تصلها عادم التخصيص أو قليله
اخضر اللون على صفحته ، أنزب الصفحة السفلى .
نورته الزهرية كثيفة تد من ١٥ الى ٢٠ زهرة ، زياه
الجسم ، عشريئة الاسدية . ثماره حراء اللون ، صغيرة
لقد ، قطرها يراوح من ٤ الى ٧ م .

١٧٤٥٤ - زُحُرور أَزْهَب

Crataegus tomentosa (S). *Aubépine tomenteuse*, *Epine tomenteuse* (F).

نوع من الزحورور يملو من ٥ الى ٦ أمتار . شوكه
معتدل اللد قليل الكثافة شديد الصلابة . اوراقه بيضية
معيقة الشكل ، زياه النصل على صفحته . نورته تد من
٢ الى ٧ أمتار . زهرته عشريئة الاسدية الحراء اللون .
ثماره بيضية أو اجاسية الشكل ، برقالية اللون .

١٧٤٥٥ - زُحُرور أَسْوَد ، بَيْت

Crataegus nigra (S). *Aubépine noire*, *Epine noire* (F).

نوع من الزحورور يملو نحو ٣ أمتار . اوراقه مديقة
التخصيص . تصلها خلى البشرة على صفحته . نورته
متوسطة القد تد من ٥ الى ١٢ زهرة . زهرته مدينة
الاسدية ، خاسية الملقات والبريقات . ثماره كروية
الشكل ، لونها كى السواد ، قطرها نحو ٢ م .



زجيرة

١٧٤٥٦ - زُحُرور أَصْفَر

Crataegus flava (S). *Aubépine jaune*, *Epine jaune* (F).

نوع من الزحورور يملو من ٢ الى ٧ أمتار . اوراقه
مدينة القاذبة ، تصلها عادم التخصيص أو قليله ،
لونه كى الخضار البحرى . ثماره لحد مستطلة حراء اللون ،
نورته تد من ٢ الى ٥ أمتار . زهرته كبيرة اللد عشريئة
الاسدية الورديئة اللون . ثماره صفراء اللون ، برقالية المراج ،
قطرها يراوح بين ١٢ و ٢٠ م .

١٧٤٥٧ - زُحُرور الأودية * ، زُحُرور أَحْمَدِي

Crataegus monogyna (S). *Aubépine monogyna*, *Noble épine* (F). *Hawthorn* (E). *Spitsdorn* (D). *Bianco spino* (I).

نوع من الزحورور ، هربى الشكل ، رطب فى الاودية .
يملو من ٤ الى ٥ أمتار . اوراقه بالقة التخصيص .
تصلها مسن الحافة أنزب الفلج والبرق على الصفحة
السفلى . نورته تد من ٧ الى ١٢ زهرة . زهرته احادية
الملقة والبريقية . ثماره فردية العجبة ، مخططة الاوران ،
قيا الاسفر والبرق والالاحر جميعها صغيرة اللد قطرها
نحو ٥ م .

١٧٤٥٨ - زُحُرور أَفْرِيكِيَّة

هو الاعراس الافريكى ، امطيه .

١٧٤٥٩ - زُحُرور جِرْمَانِي

هو اللسة ، امطيه .

١٧٤٦٠ - زُحُرور عَوْصِي الرَّق

Crataegus prunifolia (S). *Aubépine à feuilles de prunier*, *Epine à feuilles de prunier* (F).

نوع من الزحورور يملو من ٣ الى حشرة أمتار شوكه
قصير اللد . اوراقه غنيئة الشكل تصلها خلى السلع
والبرق على صفحته السفلى . نورته تد نحو ١٢ زهرة .
زهرته خلية الجسم ، عشريئة الاسدية . ثماره صفية اللد
بيضية الشكل حراء اللون ناشفة البيق .

١٧٤٦١ - زُحُرور سِيْنَا ، زُحُرور مَوْسِي

منهم من قال حليق موسى . يعرف بشوك النار ، امطيه .



زحورور الاودية

١٧٤٤٥ - زُحُوبَل *Cotonier* (F). *Cotton-tree* (E).
هو جنة القطن فى زين حلها .

١٧٤٤٦ - زُحُوبَلَة *Seau* (F). *Pail*, *Bucket* (E).
دلو يمتلئ بها .

١٧٤٤٧ - زُحُوبُوب *Microrrhiza* (F).
نمت ترميقي ، يملك على كل نبات صغير الجذور دقيقها .

١٧٤٤٨ - زُحُوبَلَة * *Nepticula* (S). *Nepticula* (F). *Nepticula* (E).

حشرة من فصيلة الزيرليات وريئة حرشقيات الاجنحة .
اصطفاها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراج
التي تكثر فيها السويليات || جسمها صغير اللد ، كيف
الخمل . بطنها نحو ٧ م . رأسها معتدل الحجم . خطها
صغير . ملساها قصيران . عيناها صيرتان ، بارزتان .
زبانها عيطيان . جناحهاا الخلفيان مستعرضا الاهداب .
ظنايب قانجهاا الخلفيين رباعية المناسخ الحادة . ثوبا
الى البنى . اجنحتهاا جملة بالآخر || الاثنى امين قدأ من
الذكر واجت ثوباا منه || السرعة لاهة ، تمسح على وزن
التصال . تركيب جميع نباتات الفصيلة السولية .

١٧٤٤٩ - زُحُوبَلِيَّات * *Nepticulidae*, *Stigmellidae* (S). *Nepticulidae*, *Stigmellidae* (F). *Nepticulidae*, *Stigmellidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشقيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المحررة نحو ٣٣٠ منشرة فى جميع اقطار العالم ||
اجناسها صغيرة ، كيفية الخمل . رؤوسها معتدلة الحجم .
اعطاشها وملابسها نصيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قرنيها
الاستشعارية عيطية ، مسطيلة . اجنحتهاا عضة ،
مستطيلة . اهداب اجنحتهاا الخلفية ودية . ظنايب قوائهاا
الخلفية رباعية المناسخ . بطنها مستعصق . الواجهاا جانبية
الالوان || اساريما لاهة . اكمال عاداتهاا يتم على
نصال الاوران الملتوية ضمن فهاالج متحدة الخمل ||
اشهر اجناسها الزيربية .

١٧٤٥٠ - زُحُوبُوب هو ستر البر ، امطيه .

١٧٤٥١ - زُحُرور *Crataegus* (S). *Aubépine*, *Epine* (F). *Hawthorn*, *White thorn*, *May* (E).

جنس الشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات
انواعه مدينة بطنهاا كثير اللونين فى جبال حيش البر
المختص . تتميز بشوكهاا وصلابة اعشاشهاا . اوراقهاا
جمادة النصل . ازدهااا نورية التجميع صغيرة اللد .
ثمارهاا غنية الشكل مخففة الاوران قل منها المأكول .
اعرف وأشهر انواعهاا ما يتبع .

١٧٤٥٢ - زُحُرور أَحْمَر *Crataegus sanguinea* (S). *Aubépine rouge sang*, *Epine rouge sang* (F).

نوع من الزحورور يربق فى الاقاليم الباردة يملو من
٣ الى ٧ أمتار . الشواكه قليلة . فروعها حراء اللد .
اوراقه بيضية مقعصة . نورته قليلة الزهر . زهرته
عشارية الاسدية . ثماره صغيرة اللد قطرها نحو ١١ م .
لونها كى الحرة النورية .

١٧٤٥٣ - زُحُرور أَخْضَر *Crataegus viridis* (S). *Aubépine verta*, *Epine verta* (F).

نوع من الزحورور يملو من مترين الى حشرة أمتار .

١٢٤٦٨ - زُغُرُور شَالِك * شَوْكَة حَادَة

Plastron

الحاف الجزء الامامي من كؤل الحشرة وحاف الجزء السفلي من السلخانة .

١٢٤٦٩ - زُغُرُور شَالِك ، جَادِي ، جَسَاد ،

جِيَهْمَان ، دَكْهَمَان ، رَادَن ،

رَبَهَمَان ، صَفَرَان ، كُوكِيَا ، زَمْبِيل

Crocus (S). Safran, Crocus (F). Saffron, Crocus (E).

جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات . انواعه وضروبه واهاله عديدة منها البرية والزراعية معظمها صباغي وبعضها طبي || شجارتها قصيرة القند . ازهارها مستطيلة انابيبا دقيقة الجسم بقية الطرف . اوراقها ضيقة النصل الخند || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

Crocus candidus (S). زُغُرُور أبيض

Safran blanc, Crocus blanc (F). White saffron (E).

نوع من الزعفران شراعه يملو من ٨ الى ١٠ سم . زهرته بيضاء البتلات ، صفراء المتق الداخل . ساحتها كاملة مهدبة ، شرعافها عادي || اوراقها غبيطة مستطيلة ، ماسة النصل . ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

Crocus vernus (S). زُغُرُور الربيع

Safran printanier, Crocus printanier (F).

نوع من الزعفران ، ضروبه كثيرة المدد . شراعه يملو من ٦ الى ٢٠ سم . زهرته بنفسجية اللون خلية المتق صفراء الانبوب . ساحتها كاملة ، شرعافها عادي || اوراقها مستعرجة ، عرض نصلها يراوح بين ٥ و ٨ سم . ازهاره يستمر من شباط الى اذار .

Crocus biflorus (S). زُغُرُور ثنائي الزهر

Crocus biflorus (S). Safran biflore, Crocus biflore (F).

نوع من الزعفران ضروبه كثيرة القند والالوان . شراعه يملو من ٨ الى ١٦ سم . زهرته صفراء الصلحة الخارجية بيضاء او زرقاء الداخلة . ساحتها كاملة ، شرعافها عادي || اوراقها ضيقة النصل المتق المائل البتلة || ازهاره يستمر من كانون الى شباط .

Crocus chrysanthus (S). زُغُرُور ذهبي

Crocus chrysanthus (S). Safran jaune d'or, Crocus jaune d'or (F).

نوع من الزعفران مهدب الشرق الاوسط والبلقان ، شراعه يملو من ٥ الى ٨ سم . زهرته ذهبية اللون ، بتلاته المتق ، صفراء الانبوب . ساحتها جزئية مهدبة . شرعافها عادي . اوراقها غبيطة ، مستطيلة النصل ، غشنة المتق . ازهاره يستمر طوال شهر اذار .

Crocus syriacus (S). زُغُرُور سُورِي

Safran de Syrie, Crocus de Syrie (F).

نوع من الزعفران يكثر في البلاد السورية . شراعه يملو من ٨ الى ١٢ سم . زهرته صفراء اللون يملوها تزييح عايق . ساحتها كاملة ، شرعافها عادي . اوراقها ضيقة مستطيلة الطول || ازهاره يستمر من كانون الى اذار .

١٢٤٦٩ - زُغُرُور شَالِك * شَوْكَة حَادَة

Crataegus oxyacantha (S). Aubépine commune, Epine blanche, Senelle (F). White thorn, May-bush, Quick (E). Gemeiner dorn, Hagedorn (D). Marruca blanca, Blancospino, Ceresella (I).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ٥ أمتار . شوكه معتدل القند ، كثيف التجميع . اوراقه مقصصة . نصلها سنن الحافة خلى الصلحة السفلى . ثورته تمد من ٧ الى ١٢ زهرة . زهرته ثنائية اللقطة والثرينة . ثماره ثنائية الصلحة ، مختلفة الالوان لها الاسفر والاخر . جبهها متوسطة القند ، قطرها نحو ١٥ مم .

١٢٤٧٠ - زُغُرُور شَالِك

Crataegus orientalis (S). Aubépine d'Orient, Epine d'Orient (F). Eastern thorn (E). Weissdorn (D).

نوع من الزعرور يملو من ٥ الى ٩ أمتار . اوراقه قليلة التجميع ، نصلها كائنه اللون خلى البتلة حل صفحتي . ثورته كثيفة التجميع تمد من ٧ الى ١٥ زهرة . زهرته رباعية او خالصة اللقطة والثرينات . ثماره صغيرة القند جميعها حجم الكرز البادي .

١٢٤٧١ - زُغُرُور شَالِك

Crataegus crus-galli (S). Aubépine ergot de coq.

Epine ergot de coq (F).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ١٠ أمتار . شوكه مستطيل نعيم . اوراقه اعليجية الشكل ، صفة الحافة ، حادة التجميع او قلابية . نصلها لامع البتلة حل صفحتي العليا . ثورته الزهرية تمد من ١٥ الى ٢٠ زهرته عشارية الاسدية الوردية اللون . ثماره الى الحشرة ، صغيرة القند ، ناعمة السوط .

١٢٤٧٢ - زُغُرُور شَالِك * نَلَك

Crataegus azarolus (S). Aubépine azaroller, Azaroller, Argéroller (F). Azarole tree, Neapolitan medlar (E). Azaroldorn, Azarolbaum (D). Azarolo, Azaruolo (I).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ١٢ م . شوكه قليل الكثافة معتدل القند . اوراقه قليلة التجميع نصلها لامع الصلحة العليا . ثورته الزهرية تمد من ٥ الى ٧ زهرة . زهرته عشارية الاسدية الوردية اللون . ثماره الى الحشرة ، صغيرة القند ، ناعمة السوط .

١٢٤٧٣ - زُغُرُور شَالِك * نَلَك

Crataegus azarolus (S). Aubépine azaroller, Azaroller, Argéroller (F). Azarole tree, Neapolitan medlar (E). Azaroldorn, Azarolbaum (D). Azarolo, Azaruolo (I).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ١٢ م . شوكه قليل الكثافة معتدل القند . اوراقه قليلة التجميع نصلها لامع الصلحة العليا . ثورته الزهرية تمد من ٥ الى ٧ زهرة . زهرته ثنائية او ثلاثية اللقطة والثرينات . ثماره لليلة العلم ، كبيرة القند ، قطرها نحو ٢ سم .

١٢٤٧٤ - زُغُرُور شَالِك * نَلَك

Crataegus coccinea (S). Aubépine écarlate, Epine écarlate (F).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ٧ أمتار . اوراقه قلبية او مقنطرية القامة . نصلها دائم التجميع لونه الى الخضار الباهت ، ثورته الزهرية متوسطة الكثافة . زهرته خلية الجسم ، عشارية الاسدية . ثماره قمرزية اللون قطرها يراوح من ٨ الى ١٥ مم .

١٢٤٧٥ - زُغُرُور شَالِك * نَلَك

Crataegus cordata, C. phaeopyrum (S). Aubépine à feuilles en cœur (F).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ٩ أمتار . اوراقه قلبية الشكل ثلاثية التجميع . ثورته صغيرة القند تمد من ٣ الى ٥ ازهار . زهرته عشارية الاسدية . ثماره حمر الى صفرة القند ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ مم .

١٢٤٧٦ - زُغُرُور شَالِك * نَلَك

Crataegus cordata, C. phaeopyrum (S). Aubépine à feuilles en cœur (F).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ٩ أمتار . اوراقه قلبية الشكل ثلاثية التجميع . ثورته صغيرة القند تمد من ٣ الى ٥ ازهار . زهرته عشارية الاسدية . ثماره حمر الى صفرة القند ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ مم .

١٢٤٧٧ - زُغُرُور شَالِك * نَلَك

Crataegus cordata, C. phaeopyrum (S). Aubépine à feuilles en cœur (F).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ٩ أمتار . اوراقه قلبية الشكل ثلاثية التجميع . ثورته صغيرة القند تمد من ٣ الى ٥ ازهار . زهرته عشارية الاسدية . ثماره حمر الى صفرة القند ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ مم .

١٢٤٧٨ - زُغُرُور شَالِك * نَلَك

Crataegus cordata, C. phaeopyrum (S). Aubépine à feuilles en cœur (F).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ٩ أمتار . اوراقه قلبية الشكل ثلاثية التجميع . ثورته صغيرة القند تمد من ٣ الى ٥ ازهار . زهرته عشارية الاسدية . ثماره حمر الى صفرة القند ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ مم .

١٢٤٧٩ - زُغُرُور شَالِك * نَلَك

Crataegus cordata, C. phaeopyrum (S). Aubépine à feuilles en cœur (F).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ٩ أمتار . اوراقه قلبية الشكل ثلاثية التجميع . ثورته صغيرة القند تمد من ٣ الى ٥ ازهار . زهرته عشارية الاسدية . ثماره حمر الى صفرة القند ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ مم .

١٢٤٨٠ - زُغُرُور شَالِك * نَلَك

Crataegus cordata, C. phaeopyrum (S). Aubépine à feuilles en cœur (F).

نوع من الزعرور يملو من ٣ الى ٩ أمتار . اوراقه قلبية الشكل ثلاثية التجميع . ثورته صغيرة القند تمد من ٣ الى ٥ ازهار . زهرته عشارية الاسدية . ثماره حمر الى صفرة القند ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ مم .



زعرور شالك



زعرور عادي



زعفران طويل الزهرة

١٢٤٨١ - زُفْطَان *
Hesperophanes (S).

Hesperophanes (F).
جنس حشرات غاشية من فصيلة القرنيقيات. أنواعه عديدة، جميعها متصلة الله، مستطيلة الشكل، طولها ١٢-٢٠ مم. أجسامها زاهية، قرنها الاشمادية مستطيلة منقطة. ألوان ألوانها ترلوح بين الخشن والبي. تسرح من الغروب الى الفجر || يرقاتها ترتك وتفسر جميع أنواع الخشب اليابس بما فيها الاششاب المشغلة الخشبية.



زعفران لبياني



زعفران غزني



زفطان



زفطان اريك

١٢٤٨٢ - زُفْطَان لُزْمَك *
Hesperophanes cinereus (S). Hesperophanes

candré (F). Hesperophanes cinereus (E).
حشرة غاشية خاشية من فصيلة القرنيقيات ورتبة مفصلات الاجنحة. تألف ارجل السنتان وبهايات الحور والمساكن الارضية، غناصها غاشية تمش على اوراق النبات. يرقاتها غاشية تركب السنتان والحور والاعشاب الخشبية المشغلة || جسمها متوسط الله بطول من ١٦ الى ٢٢ مم. ثوبها الى الشقة السوداء يطولها مزاج اريك يمد الى الحبل الكثيف الاطلس اللين. رأسها مستطيل الجرم. عيناها صغيرتان. زباناها مستطيلان مهدبان. ظهرها خشن للزهر القارح اللامع. غداها متشابها التحزيز الخفيف القاطب، كثيفتا الحبل. ارسافها رباعية المثلث الظاهرة || الاثنى اكبر قدما من الذكر واكد ثوبا منه واتصر زبانا || جيلها ثلاثي الحول. تظهر الحشرة الجملانة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواسط آب. تسرح من الغروب الى الفجر || القربة بطيئة التنشئ تترك الكلال الجسموري بعد التلق بنسب ٣٢ شهرا. جسمها شبه مردني الشكل بطول نحو ٣٢ مم. ثوبها الى الخشن الاصفر المالح. رأسها يمر || طول الاكبر الذي يستوجب نحو ٤٠ يوما يتفشي ضمن صليحة مركبة من مواد نباتية مجبوبة بالريال.

١٢٤٨٣ - زُفْطَان أَكْهَب *
Hesperophanes gris (F).

حشرة مؤذية من القرنيقيات تدعى زفطان اكين، اكلها.

١٢٤٨٤ - زُفْطَان الين *
Hesperophanes gris (S).

Hesperophanes gris (F).
حشرة غاشية مؤذية من فصيلة القرنيقيات ورتبة مفصلات الاجنحة. تألف ارجل اكين اكين دون سواها. غناصها تمش على الاوراق والحاء. يرقاتها تسرح الانداد والاضغان والجفوع || جسمها متوسط الله بطول من ١٢ الى ٢٠ مم. ثوبها الى الكهبة يطولها حل اربه ورتبة شهية. رأسها مستطيل الجرم. عيناها كبيرتان نافذتان. زباناها مستطيلان دقيقان. ظهرها مذهب القوط اللامع. غداها كثيفتا الحبل واغرب || الاثنى اكبر قدما من الذكر واجت ثوبا منه واتصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواخر حزيران. تسرح في الليل. تلفد بعد ظهورها باسرع واسد. تمتع المكن رؤيا تطفها مادة غروية تشبه في مكنها || القربة منذ ادراكها الكلال الجسموري تطول من ٢٢ الى ٢٥ مم. ثوبها الى البياض اللين. جسمها مستطيل الرأس والصدر والقسم الاوسط من البطن وينتهي بطرف

١٢٤٧٦ - زُفْطَرَان طَوِيل الزَهْرَة *
Crocus longiflorus (S). Safran à longue fleur, Crocus

à longue fleur (F).
نوع من الزعفران مهده جزر البحر المتوسط. شراعه يملو من ١٠ الى ٢٥ سم. زهرته صفراء الانبوب. يرتقالية المثلث، ليلكية البلات، يملوها تزيح بنفسجي. اسديتها صفر. سمانها مقطوعة، يرتقالية اللون. شرعائها شجج || اوراقه ضيقة التصل للمثلث اللين، المائل البشرة || ازهاره يفسر من تشرين الاول الى الثاني.

١٢٤٧٧ - زُفْطَرَان عُرْيَان الزَهْر *
Crocus nudiflorus (S). Safran à fleurs nues, Crocus

à fleurs nues (F).
نوع من الزعفران شراعه يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. زهرته بنفسجية البلات. سمانها منقسمة، قدية الشكل يرتقالية اللون. شرعائها اري || اوراقه ضيقة مستطيلة. يملو يمل بعد ذبول الارض ثوبا وكونية مستطيلة || ازهاره يفسر من ايلول الى تشرين الثاني.

١٢٤٧٨ - زُفْطَرَان لُبْنَانِي *
Crocus zonatus (S). Safran zoné, S. du Liban, Crocus zoné (F).

نوع من الزعفران مهده جبال لبنان شراعه يملو من ٦ الى ١٠ سم. زهرته ليلكية اللون يتلاتها مقطوعة، منها خلي البشرة، حايق الصفار. انبوبها خشن اللون. سمانها كاملة صقية الشكل. شرعائها حادي || اوراقه خيطية غنية مستطيلة || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين.

١٢٤٧٩ - زُفْطَرَان مَخْرُومِي *
Crocus officinalis, C. sativus (S). Safran officinal, S.

d'autumn, S. cultivé, Crocus officinal (F). Safran, Crocus (E). Echter safran (D). Zafferano, Croco fiorito, Croco domestico (I).
اعرف انواع الزعفران واسمها منذ اقدم المهد || غروبها كثيرة المهد. شراعه يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. زهرته بنفسجية البلات، ليلكية المثلث، صفراء الانبوب. اسديتها بيض. سمانها حطرية الراتحة مستطيلة. شرعائها ثنائي القلعة || اوراقه خيطية ضيقة. ازهاره يفسر من ايلول الى تشرين الثاني || يستخرج من زهره وصبر يملو زيت طيار كثير اللثع || يحرق زهره حطري العرف من اللثع يستعمل في القلب وفي الروائح العطرية وفي الصباغ. والجزر الواحد من مسحه يصنع من ألف جزء من الماء. اي ان غراما واحدا من مسحوق الزعفران يصنع ١٠٠ لتر من الماء || ومن الرينة البلية فازعفران يملو البحر ويقوي الاصاب وينشط القلب ويرسه ويحب ابياء ويدبر البول والطمث ويسهل الولادة اذا تسمرت. وهو مفاد للتشنج ويظهر في الاذن ليسكن آلامها.

١٢٤٨٠ - زُفْطَرَان مَوْشَع *
Crocus versicolor (S). Safran versicolore, Crocus versicolore (F).

نوع من الزعفران شراعه يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. يملو عند قاعدته شراعه قصير || زهرته حطرية الراتحة، يضاء اللون، موشعة بالبنفسجي. سمانها كاملة. شرعائها مزدوج التركيب || اوراقه خيطية، مستطيلة، خلية التصل || ازهاره يفسر من شباط الى اذار.

رقباتها غبراء اللون، قصيرة القد، تركيب جلود الكرة فقرتها وتغيرها .

١٢٤٩٠ - زَعْفَرَانُ الْخَرْثُوبِ * ، مَكْرُومُ النَخْلِ *
Macrotoma palmata (S). Macrotome du palmier (F).
حشرة خاشبة من القزنييات طويلة نحو ٤ سم. لونها الى
السرّة الخضرة . زباناها طويلة متعقبة . تسرح في الليل .
تجتمع مكثا على جلود النخل فيقتف من رقات فراء
اللون ، زباناها الجسم ، سوداء اللبب تنشر الجلود
وتعطها .

١٢٤٩١ - زَعْفَرَانِيَّات *
هي القزنييات فصيلة حشرات من طيريات الاجنحة ،
اطلها .

١٢٤٩٢ - زَعْفَرَانِيَّة *
Nageoire (F). Fin (E).
الزعنفة هي عضو الحركة الانقباضية في الحيوانات المائية .
ج زعنفت . ولزنايت تقسم حسب موطئها في الجسم الى :
سديرة وبطنية وظهريّة وشرجية وذنيّة .

١٢٤٩٣ - زَعْفَرَانِيَّاتُ الْأَدْنَامِ *
Pinnipèdes (F). Pinnipedia (E).
رَبِيَّة حيوانات لبونة ألفن حياء البحر والبر . انواعها
المعاصرة للمرونة ٣٦ تنضم الى ١٢ جنس ينجمها ثلاث
فصائل كما هو مبين في الجدول التالي || اجسامها شبه
وضعية الشكل ، متفارقة الطول والحجم . اطولها تراوح
من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم. رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة
جاسقة . اذانها ومنافقها ملحومة . اسنانها متباينة الاشكال
والحجوم لكنها وحيدة الصيغة عند كل فصيلة . اعناقها
قصيرة واذانها كلكت . قوائمها خاصة الاصابع الكمامة
الخطاب والمملوطة ما يسجلها كازناتاف || قوائمها الاسماك
والقتريرات والبرغوات . ملجئها الحيائي يختلف مع اختلاف
الانواع . معظمها فريّ جماعي وبعضها زويبي .

١٢٤٩٤ - زَعْبِج *
Crossemant (F). Croak, Croaking (E).
الزعب هو صوت الغراب كالنبيب والنتيق .

١٢٤٩٥ - زَعْفَرَان * ، هُوَ الْخَرْثُوبُ ، اطلها .

١٢٤٩٦ - شَرْشُورُ جَيْسَل *
Fringilla montifringilla (S). Pinson de montagne, P.
d'Ardennes (F). Mountain finch, Brambling (E).
Bergfink (D).

نوع من الشرشور طوله من ١٨ الى ١٩ سم. رأسه
وظهره ذهبي الى السواد الازرق . جناحه مخطط بالابيض .
عقله وسدره الى الصبغة البرتقالية . بطنه وزنكاه بيض .
اطلاه مرقشان بالاسود || يعيش اسراب كبيرة تجوب
البلاد في طلب الحبوب والاش . قوته الحشرات اغصها
الذباب ثم يزور النباتات القريبة اغصها البرية || ينش
في الاجمار . انثاه تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها
بتأدية الذكر نحو اسبوعين .

١٢٤٩٧ - زَعْفَرَان *
Cycloconium
جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات والفطريات
جربه الكتيديّة مهمة الشكل والترتيب . هيفه محبوب
للمناطق الخلفية داخل المسافات الامدية الى ان يتحرق

مذيب || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى
ثلاثة اسابيع ينغفي في التفق الذي احضرته البرقة .

١٢٤٩٥ - زَعْفَرَانُ الْخَرْثُوبِ * ، زَعْفَرَانُ
مَسْتَم *
Hesperophanes fascicu-

latus (S). Hespérophanes fasciculé, Longicorne du
caroubier (F). Hesperophanes fasciculatus (E).
حشرة خاشبة غاشبة مؤذية من فصيلة القزنييات ورتبة
معدنات الاجنحة . تألف الاشجار الزراعية والبرية اغصها
الخروب والين والينوت والينوت والينوت والينوت ... خنافسها
تبش على الارواق . رقاتها تسردب الافئاد والاغصان
والجلود الاخضر منها واليابس تصطبها وتكويها || جسمها
متوسط القد يطول من ٢ الى ٢٠ سم. ثوبها الى الكمامة
يطولها زغب اطول ومشفة وبذاء . رأسها مستطيل الجرم .
عينهاا كبيرة . زباناها دقيقان مستطيلان . ظهرها
مستطيل المسطح ، مستدير المؤخر الاسف . غدهاا كتيفا
اللون والنتيق || الاثاا اكبر قدا من الذكر واكد ثوبا
منه والتمس زبانا || لها جيل واحد في الجيل . تظهر
الحشرة الجملقة في اواسط حزيران . تسرح في الليل . تساله
بعد ظهورها يسرع واحد . تمت الممكن تحت الحياء وبين
الفتشور || البرقة ، عند بلوغها الادراك تمام ، تطول من
٢٠ الى ٢٥ سم. جسمها مردي الشكل ، حطلي اللون ،
اظهر الموج ، ابرر الرأس والفكين والشرج ، مبرر الهلب
التمصير النقيق .

١٢٤٩٦ - زَعْفَرَانِيَّة *
Vireux (F). Vireux, Noxious (E).

لتم تعريفي يطلق على النباتات او المواد النباتية التي
رائحتها الكريهة وطعمها القس ينان عن وجيد عنصر ضال
قد يكون جسميا للمادة .

١٢٤٩٧ - زَعْفَرَانُ الْأَعْمَدَةِ * ، هَيْلُورُوبِ *
Hyloterpus bajulus, Callidum bajulus (S). Hylotrupe,
Longicorne des charpentiers, Capricorne domestique
(F). House longhorned beetle (E). Hausbock, Balkenbock (D).
حشرة خاشبة من فصيلة القزنييات طويلة نحو ١٦ سم.
لونها الى السرّة الخضرة طولها زغبية غبراء || تركيب
الصنوبر حيث تجمّع مكثا فيقتف من رقات تنشر
الخشب وتطليه . تمرّ في بنوع خاص اعمدة التلفون
وباايشه .

١٢٤٩٨ - زَعْفَرَانُ الْخَنْطَةِ *
Calemobius filum (S). Algüillonnier, Saperde

grile (F). Grain borer (E). Getraidebohorer (D).
حشرة غاشبة من القزنييات صغيرة القد طولها نحو ١٢ سم.
لونها الى السرّة تمليها زغبية ملطولة . قوتها الاستشمارية
دقيقة وطويلة || تظهر في اواخر ايار ، تجمّع مكثا
على قصب الخنطة تحت السابل فيقتف من رقات
سفيرة تنشر القصب وتقرضها تقصب كسرها وصقوا
السنبلة على الارض .

١٢٤٩٩ - زَعْفَرَانُ الْكَرْمَةِ *
Vesperus xatarti (S). Vespère des vignes (F).
Grape vesperus (E). Vesperus xatarti (D).

حشرة من القزنييات طويلة نحو ٢٠ سم. لونها الى الصفار
الحطلي . زباناها مستطيلة . انثاه نصفية القند المنرج .



زَعْفَرَانُ الْخَرْثُوبِ



زَعْفَرَانُ الْأَعْمَدَةِ



زَعْفَرَانُ الْخَنْطَةِ



زَعْفَرَانُ الْكَرْمَةِ (ذَكَرُ وَانْثَى)



زَعْفَرَانُ النَخْلِ



زَعْفَرَانُ

نمطيات الأقسام

النمطية	عدد الأجناس والأقسام	أشهر الأقسام
أُتَارِيَات	جنس واحد و ١١ نوعا	أُتَارِيَة عَرَقَة . أُتَد جَبر أُتَارِيَة سِيْلَظَر أُتَارِيَة كَلْفُورِيَّة أُتَارِيَة دِيَّة
فُتُيَات	عشرة أجناس و ٢٣ نوعا	فُتَّة بَدَلَة فُتَّة عَرَقَة فُتَّة سِيْلَظَر فُتَّة جَبر فُتَّة عَرَقَة مُتَرَس فُتَّة جَبر
فُتُيَات	جنس واحد ونوعان	فُتَّة



زغاف الزيتون



زغبارة المشمش



زغب

الأدوية ليكن جرابه الكندي الذي تملوه سبعة من الكتلانث المؤثرة الكروية الشكل ، السمراء اللون .
أنواعه قليلة أعرفها زغاف الزيتون .

١٧٤٩٨ - زُغَاغ الزَيْتُون *
Cycloconium oleagineum (S). El de pason des feuilles d'olivier (F).

نظر مجهرى ركب زويتين حوض البحر المتوسط .
مظهره الخارجي يقع قلبية تشبه عين الطاووس ، حجمها براوح من ١٠ إلى ١٠٠ م . ركب نصال الأوراق البالية على صفتها . تظهر في أواسط الصيف وتقوم حتى أواخر الشتاء حيث تغلص رويدا رويدا . تبدو سمراء اللون سوداء المحور واختار . تكثر على الصفة العليا وتقل على السفلى وقد تصعب المالحق والتواقي || يكالغ باستعمال سائل بوردر على ثلاث مرات . الأولى غلاخ شهر آب والثانية في تشرين الأول والثالثة في شباط .

١٧٤٩٩ - زُغَاغ هو الاثنا السفى ، اطليا .

١٧٥٠٠ - زُغْبُورَة Figue-fleur (F). Fig-flower (E).
ضرب من التين كبير لقد سبك التشور حلو العلم .

١٧٥٠١ - زُغْبُورَة Duvert (F). Down (E).
أول ما يبدو من الرئش والشر وتقل صفارها ولونها . وهو في بعض الأوراق ولها غل (Bloom).

١٧٥٠٢ - زُغْبَارَة Stigma
جنس فطور مجهرية من عارة الريدانيات وفضيلة الطحيات || جربه الكندية قصيرة ديوية ، قهريه التجميع . كنانة فردية ، موهوة ، بيضية أو مردية الشكل || أنوعه قليلة والأذى المند أعرفها زغبارة الدلب وزغبارة المشمش .

١٧٥٠٣ - زُغْبَارَة الدُّب Stigma platani (S).
نظر مجهرى يمتري الدلب بالورقة . مظهره الخارجي يقع صندرية مستديرة قطرها نحو ٢ م . ركب النصل على

١٧٥٠٤ - زُغْبَارَة المِشْمَش *
Stigma briosiana (S).

نظر مجهرى ركب ثمار المشمش في طور نوما الأخير .
مظهره الخارجي يقع مستديرة مملحة اللون ، حراء الحار ركب بشرة الثمرة فطرها وتقودها إلى الانحلال بعد أن تثير طسها الذي يكتبس بعض المرات .

١٧٥٠٥ - زُغْبُورَة *
Muscardinus (S).

Muscardin (F). Smil dormouse (E).
جنس حيوانات قاضية من فصيلة قترقديات . أنواعه قليلة ، موطنها الشرق الأدنى وأروبة || جسمها صغير القد طوله ٨ سم . وذئبا ٧ . رأسها اسطبي الشكل . صيها مستديرة . أذناها بارزتان كبيرتان . ويرعا ليد الزغب الناعم القصير . ذئبا اسطوي . رأسها ظهرها وذئبا إلى البيضاء الإغبر || تألف الثبات والادغال القريبة من الحقل المزروعة . تتسلق الأشجار بشفة . قترها البندق والجوز والخنطة وتختلف آثار البنية أعصها الصرعة .
الأنثى تضع ٤ أداوس تبصر وتكسى بعد وضعها بأسبوعين . بيائها الشثري يدوم نحو ستة شهور . جبرها وكن تدبر في صدع شجرة تكثره بالحشيش الناعم الصوف .

١٧٥٠٦ - زُغْبُورَة هو الزنجبج ، اطليا .

١٧٥٠٧ - زُغْبُورَة هو ابن أوى ، راجسه .

١٧٥٠٨ - زُغْبُورَة Amaracus (F).

Amaracus (E).
ضرب من اللرو وريق اللور خلي النصل مستحب العرف .

١٧٥٠٩ - زُغْبُورَة *
Stigmella

جنس فطور مجهرية من عارة الزغاميات وفضيلة الطحيات . كنانة بيضية قشاه نحو ١٤١٤ ميكرون .

الى الصفار الباهت || ازهرها يستمر من نيسان الى ايار .

Primula sinensis (S). - زُعْدَةُ الصَّيْنِ
Primevère de Chine (F).

عشبة معمرة رفيعة تنبت في المزارع . اوراقها مقسمة رطلة ، نصلها خلى البشرة جبر المسام القوية || شرانها يملو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهاره ثلاثية الالوان المتراكبة . زهره خفيفة البوق ، مستنقعة القاعدة المستعرضة . لونها يختلف مع الشروب منها الياض والوردي والازرق والاحمر والبنفسجي || ازهرها يستمر طوال الشتاء .

Primula glutinosa (S). - زُعْدَةُ دَبَقَّة
Primevère glutineuse (F).

عشبة معمرة سبوتية اوراقها مستطيلة مخروطية ، نصلها غدي البشرة النبكة ، حتاره مغشاي التسنين || شرانها يملو نحو ١٥ سم . ازهاره تده من ٣ الى ٧ لونها الى البنفسجي الزاهي ، عرضها فواح المسطر . ازهرها يستمر من حزيران الى تموز .

Primula elatior (S). - زُعْدَةُ شامِخَة *
Primevère élevée, Coucou élevé (F).

عشبة معمرة . اوراقها اهليجية ذلقة ، نصلها اخضر الصفحية العليا ، بحري البطل || شرانها يملو نحو ٣٥ سم . ازهاره كثيرة العدد لونها الى الصفرة ، انصافها الى الخضرة الباهتة بترتيب ابيض || ازهرها يستمر من اذار الى ايار .

Primula verticillata (S). - زُعْدَةُ ضَمِيكَة *
Primevère à fleurs verticillées (F).

عشبة معمرة ترطب في الشواطئ البحرية . اوراقها اهليجية الشكل تطبل من ٢٥ الى ٣٥ سم . نصلها وسيد الفلج ، خلى البشرة ، قليل التسنين || شرانها يملو من ٣ الى ٤٥ سم . ازهاره ثنائية الفصمة . كثيرة القند ، فواحة الحرف ، ذخية اللون || ازهرها يستمر من ايلول الى ايار .

Primula spectabilis (S). - زُعْدَةُ قاصِرَة *
Primevère remarquable (F).

عشبة معمرة ترطب في الاربة الكلسية . اوراقها سنانية ، نصلها خلى البشرة النبكة ، مسن الحافة الضرفوية المختار || شرانها يملو من ١٦ الى ٣٥ سم . ازهارها سداسية او خمالية التجميع لونها الى الابيضاني يملو ملوج وردي || ازهرها يستمر من حزيران الى تموز .

Primula luteola (S). - زُعْدَةُ كَبِيرِيَّة
Primevère soufrée (F).

عشبة معمرة سبوتية . اوراقها اهليجية تطبل من ١٥ الى ٣٥ سم . شرانها يملو نحو ٣٥ سم . ازهاره صغيرة القند كثيفة التجميع كبريتية اللون || ازهرها يملو طوال شهر ايار .

١٧٥٢٢ - زُعْدَةُ كَثِيرَةِ الزَّهْرِ *

Primula floribunda (S). **Primevère floribonde (F).**

عشبة معمرة ترطب في الشواطئ البحرية . اوراقها بيضية ، مستطيلة ، مقنطرة الطرف . نصلها ازغب البشرة مبهر للمسام القدية ، حتاره لاقياسي التسنين || شرانها يملو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهاره مستعرضة الشكل ، كثيرة العدد ، كبريتية اللون || ازهرها يستمر طوال الشتاء .

وربغاته كروية ، جوية التجميع ، عابقة اللون || ازهاره قليلة العدد والاذى تنقل على اوراق بعض اشجار الحرجية دون ان تفتقها . مظهرها الخارجي بقع صغيرة مستديرة خلية ، شقراء اللون جوية المختار ، تركب التنصل على صفحته السفلى .

١٧٥١٠ - زُفْيِي *. **Tomenteux (F).** **Tomentosus (E).**

نمت وسمي يطلق على اجزاء النبات المغطاة بزغب ليد نام يشبه نفث الثعلب .

١٧٥١١ - زُفْيِيَات *

Bombacées (S). **Bombacées (F).** **Bombacées (E).**

قسم من فصيلة الخبازيات يشمل بعض الاجناس والعدد من الانواع مظهرها اشجار كثيرة دائمة سنها البلاد الاستوائية . ازهارها خشوية ، خاسية البتلات ، كثيرة السدية . ثمارها خفية الشكل تلتف بزورا فريدة او عديدة بنشاحا زغب نام التلة صعيها .

١٧٥١٢ - زُفْيِيَة *

Bombax (S). **Bombax, Bombace, Quindier, Fromager (F).** **Silk cotton tree (E).** **Sinddenbaumwollbaum (D).** **Bombace, Bambiagia (I).**

جنس اشجار كبيرة دائمة من الزليبات . انواعه عديدة مهيما المناطق الاستوائية .. جميعها سريمة التنو غليظة الجذع تعلو من ٢٥ الى ٢٥ م . اوراقها زنادية مركبة خاسية الورديات البيضية الشكل . ثمارها حقائق مستطيلة تلتف عدة بزور ينشاحا زغب نام جدا قصير القيلة لا يصلح لقلل || بزورها مأكولة بعد التخميص ويستخرج من اوراقها مادة دمنية لها استعمالها في البلاد الحارة .

١٧٥١٣ - زُعْدَةُ كَاب *. **Chiromèle (F).** **Chiromel (E).**

جنس مغناطيس من هامة الجاهل . موطنه ملقة والملايو . انواعه قليلة العدد تتميز بفرطها السطوانية المقنطرة ، بأذائها المنسبة العالية وبانصافها السلية البارزة . يعيش جماعات متوسطة العدد . يسرح في اوائل واواخر اليل ، قوته الحشرات . يالفت بجوايف الاشجار الحرجية والمفلور والكهوف .

١٧٥١٤ - زُعْدَةُ ، زَهْرَةُ الرَّيِّحِ

Primula (S). **Primula (E).** **Prmel (D).** **Primavera (I).**

جنس نباتات عشية من فصيلة الريميات . انواعه كثيرة العدد منها المحلية والموطن والمعمرة . مظهرها بري وبشها ترابي . جميعها تنجيمية ، اوراقها قرصية الانتصاب . ازهارها سبوتية التجميع يرتكز على شارين دقيقة . ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان كوسها خاسية للتسنين ، توعاها خاسية للتخميص ، انانها اسطوانية الشكل ، لمدتها شاذية لا متدعة . حقائقها خاسية المضارب || اعرف ولشهر انواعه ما يتبع .

١٧٥١٥ - زُعْدَةُ أَذْيِيَّة ، أَكْأَن الدُّبِّ الوَحْشِي ، أَكْأَن الضَّعِيع

Primula auricula (S).

Primevère auriculée, Orelle d'ours sauvage (F). **Auricula, Bear's ear (E).** **Aurikel primel, Aurikeln (D).** **Primavera auricula, Orecchio d'orso (I).**

عشبة معمرة . اوراقها بيضية مسطوية الشكل . نصلها بحري اللون ، خلى البشرة ، مسن الحافة الضرفوية المختار || شرانها يملو من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها



زُفْيِي



زُفْيِيَات



زُفْيِيَة



زُفْيِيَة كَثِيرَةِ الزَّهْرِ

٢٠ سم. ازهاره لا تلبية التجميع. مدعها يراوح من ٢ الى ٢٠ لونها ال الوردي يملو ملج بنفسجي. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٣٠ - زُغْدَة وَرْدِيَّة *Primula roses* (S). *Primavère carminée* (F).

حشة معمرة سبروتية. اوراتها اطيحية تطول نحو ١٥ سم. نصلها جيل الحصار الزاهي سنن الحافة. شرانها يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهاره قليلة العدد كبيرة لثقة لونها ال الحمر الوردية الزاهية || ازهاره يستمر من ايار الى نيسان.

١٢٥٣١ - زُغْدَة يَابَانِيَّة *Primula japonica* (S). *Primavère du Japon* (F).

حشة معمرة سبروتية. جلورها عاتمة لفرقة. اوراتها اطيحية مسطحة. نصلها مثلثي الحافة يطول نحو ١٥ سم || شرانها يملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ازهاره متراكبة الاراس التي تمد من ٣ الى ٦. زهره مستعرة الشكل لونها ال البنفسجي الموشح باخضر || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٣٢ - زُغْرُغْ *Aquifère* (F). *Aquiferous, Water-bearing* (E).

نمت تعريفية يطلق عل الطبقات الارضية التي تحوي بعض الماء او الكثير منه.

١٢٥٣٣ - زُغْرُغْ *Aquiculture, Culture hydroponique* (F). *Aquiculture, Fish-breeding* (E).

الزهرية او الزرعة المغرقة هي الزرعة في الماء بدون تربة. يصار اليها بتلوب العناصر الغذائية المعدنية في الماء فيمتصها النبات وينمو ويشمر كما لو كان مزروعا في التربة.

١٢٥٣٤ - زُغْرُغْ *Aquigène* (F). *Aquigenous* (E).

نمت تعريفية يطلق عل كل كائن يحيا في الماء او يعيش فيه.

١٢٥٣٥ - زُغْرُغْ عَجَبَالِيَّة *Cursorius* (S). *Courvite* (F). *Coursor* (E).

جنس طير من طوال الساق وعضلة الزنزقيات. انواعه المعروفة حشرة اصطناع الصمغ الاسود والافريقية || اسمها صغيرة لثقة. اطولها تراوح من ٢٢ الى ٢٧ سم. مناقبها مسطحة. دقيقة. اجنتها ذلقة. اذنانها قصيرة. مستعرة. مقبلة الاطراف. سيقها زارواها محملة. اوتابها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر واخضر || امرف انواعه واشهرها الزغزغ الاصفر.

١٢٥٣٦ - زُغْرُغْ أَغْبَسْ * *Cursorius isabellinus*. *C. cursor* (S). *Courvite isabelle, Courvite gaulois* (F). *Cream-coloured coursor* (E).

طائر من الزغزغ. اسنانه يمد من صمغ الشرق الاوسط الى افريقية الشرقية والنيابلية لانه من الصمغ التي تجوب القناري في طلب الفرز || جسمه متوسط القند يطول نحو

١٢٥٣٧ - زُغْدَة لَرَجَة * *Primula viscosa* (S). *Primavère visqueuse* (F).

حشة معمرة ترطب في الازربة الرملية. اوراتها بيضية مسطحة السطح، نصلها كثيف. المسام اللينة القوية الرائحة، لونه ال الحصار الاصفر || شرانها يملو من ٦ الى ١٥ سم. ازهاره لبسة التجميع المصنولي، فواحة السرف، بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٣٨ - زُغْدَة مَكْرَدَة *Primula grandis* (S). *Primavère géante* (F).

حشة عمولة سبروتية. اوراتها مسطحة كبيرة القند قليلة الشكل. نصلها كثير المروق، قليل الزغب، لاجابي التكتين || شرانها يملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. ازهاره مسطحة متدلية، لونها ال الصفار الباهت || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٢٥٣٩ - زُغْدَة مَحْزُونِيَّة * *Primula officinalis* (S). *Primavère officinale, Coucou officinal* (F). *Cowslip, Paigle* (E). *Gartenprimel, Schlüsselprimel* (D). *Primavère, Primula odorosa* (I).

حشة معمرة سبروتية يقال انها طيبة تنفع الصدر والامعاء. اوراتها مسطحة ذلقة. نصلها اخضر الصفرة العليا، يحمر السفلى || شرانها يملو من ١٠ الى ٣٠ سم. ازهاره جرسية اقماعها بيض، ابوالها ملحية، اعناتها خاسية الزقفة البرتقالية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٢٥٤٠ - زُغْدَة مَحْطَطَة *Primula vitacea* (S). *Primavère rayée* (F).

حشة معمرة. اوراتها خفيفة مسطحة. نصلها مائل البشرة، دقيق التكتين || شرانها يملو نحو ١٥ سم. ازهاره كثيفة التجميع. حراء اللون، كلوصها جرسية الشكل تملوها حشة خطوط بيض || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٢٥٤١ - زُغْدَة مَرْبَرَكَة *Primula hirsuta* (S). *Primavère hérissée* (F).

حشة معمرة ترطب في الازربة الرملية. اوراتها بيضية الشكل. نصلها يمتد المسام اللينة الحمراء التي تملو عل مسطحته || شرانها الزهري يملو من ٣ الى ١٠ سم. ازهاره مستعرة الشكل، قليلة، تمد من ١ الى ٣. غناتها ابيض، سارها وردي او ليكي اللون || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

١٢٥٤٢ - زُغْدَة مَبْغِيَّة *Primula helodoxa* (S). *Primavère gloire des marais* (F).

حشة معمرة ترطب في الاراضي الرطبة. اوراتها سنائية النصل الملتص الاطراف || شرانها يملو من ٦٠ الى ٨٠ سم. ازهاره متراكبة الاراس التي يراوح مدعها من ٦ الى ٨. زهره مقمرة القناعة، صفراء اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٤٣ - زُغْدَة مَهْدَبَة *Primula marginata* (S). *Primavère bordée* (F).

حشة معمرة ترطب في الازربة الكليكية. اوراتها اطيحية الشكل. نصلها لحمي التجميع، حطرها متقارب التكتين، مهدب الحافة || شرانها يملو من ٥ الى



زغدة لرجة



زغدة يابانية



زغزغ اصفر

شفاغان، قوائمها مستقيمة، قصبية. ثوبها الى الصبغة الناعية المالح || تنص الاثني المكن في لحاء الاشجار فيقتف من يقات صغيرة، غطية الشكل، بقية اللون تردب السواء وتميش عليه حتى الاكمال.

Zaghouana

١٢٥١٧ - زُفْلَان * ٥

نظر مجري من فصيلة السحاميات ورتبة العنانيب يركب بعض نباتات الفصيلة الزرقية واعضاها الحشيش. مظهر الخارجي يقع صغيرة مستديرة لاقبسية التجميع تصيب الاوراق الجديدة الناعية تقسبب لها تقسّم التسج الحلوية وتتمج وينجمها رفعة في البشرة تبدو كالبثور الى ان تتشجر عن بويغات كالحباب لونها الى الخبوة || يكافح عند ظهوره باستهلاك سائل يورده لاهلوا ١ %.

Amanida (S), Amadine (F).

١٢٥٤٨ - زُفْلِيم

جنس صافير صغيرة القد من الجوامث الخروفيات المتأقير. انواعه عديدة موطنها البلاد الحارة. جميعها بحجم الدوري. الثوبيا متراكبة الالوان الجميلة. تألف الاهدال والنباتات المبردة الاشجار. قوتها يزور وحويب التبيليات وبعض الحوام والديدان والحشرات الصغيرة || تفتن في الاشجار. اناتها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين. وذلك على ثلاث مرات في السنة || اشهر انواعه الزعيم الطروق.

١٢٥٤٩ - زُفْلِيم مُطْرَق * ٥، ذُبْعُ التَّيْسِي

Amanida fasciata (S), Amadine à collier, A. bandé, Cou coupé (F), Cut-throat (E).

نوع من الزعيم حجمه حجم الدوري الصغير. ثوبه الى الكمية الصبغية يملوها زعيم ابيض واسود. عسراه ويصقه يبيض. زوره مطروق بخط ارجواني يتنه من مؤخر العين اليسى الى مؤخر اليسرى. جناحاه ذهبي سود. موطنه افريقية الشرقية والشمالية. سره يد من ٢٠ الى ٤٠ || يالف حياة الدجج ويتكاثر بسهولة لكنه لا ينزر.

Amanidinidae (S).

١٢٥٥٠ - زُفْلِيَمِيَّات * ٥

Amanidinidae (F), Amadinidae (E).

فصيلة طير من الجوامث خروفيات المتأقير. اجناسها وانواعها عديدة منظفها من صافير المناطق الحارة || تتميز باجناسها الصغيرة وبمناقيرها الخروفية القصيرة وباذنابها المقنطرة التي يلفب فيها تقصر. اجنسها مستدة الطول. انوبها جملة الالوان الزاهية. ارشاعها دقيقة || جميعها تألف القفص، بعضها مستحب الزققة. قوتها يزور التبيليات || احرف اجنسها واشهرها الزعيم والطرور واليداس ...

Satinée (F), Satiny (E).

١٢٥٥١ - زُفْل

صغير الريش ونص بفسهم به ريش لتمام. قال المتني : وكان المرور من زف الزلال .

١٢٥٥٢ - زَقَالَة صُغِيرَة الْعَمْد * ٥

Rhiphophorus subdipertus (S), Rhiphophorus à élytres réduits (F), Rhiphophorus subdipertus (E). حشرة وائمة ناعمة خاشرة من فصيلة الزناريات ورتبة عمديات الاجنحة. تألف الاماكن التي تكثر فيها التفويغات

٢٥ م. ثوبه اخيس اللون. رأسه ازرق المالح. عيناه مكملتان بالاسود الذي يمتد كالخط حتى القفن. قوامه واباهره حطية الزققة. كلاء صفر الاطراف و حر المابية. زفان قنبه مرفوعة بالاسود والايض. حقله منه حطية اللون. سقاء الى الزققة البسرية. رصاف واصابه بلون البرل || يذنب انصومه بين الخبارية التي تكتنفها الانشباب المتراكبة الكثيفة. انشاء تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها فصيلتها نحو ١٥ يوم بينا الذكر يولن لما انلناه.

١٢٥٥٧ - زُفْلَة

Zygote

١٢٥٣٨ - زُفْلَة

Brindilles (F), Sprigs (E). الزف: دق الحطب : اطراف الشجر الصغيرة واعمال الروث والورق.

Pontederia (S), Pontederia (F).

١٢٥٣٩ - زُفْلِيل * جنس نباتات شبيهة برية وزييتية من فصيلة الزفليلات. انواعها ثمانية جميعها جسمية متعينة وبالية سورها شمراخية متعينة تفتني بالسنايل الزهرية. ازلها جملة الشكل، سداسية الانقسام، زرقاء اللون || اوراقها متعينة كبيرة لقد طيلة النسل، عنقها ملاق مستطيل يطوق بها حل سطح الله || تزرع القزين لكثبان تحض الصغ.

١٢٥٤٠ - زُفْلِيلِيَّات

Pontederiacae (S), Pontederiacae (F), Pontederiacae (E).

فصيلة نباتية من وحيات الفلقة ستورات الزور. نباتاتها اعشاب جسمية الجلفوع. اوراقها قرصية الانتشاب، مستقيمة الزناد، قليلة النسل. ازلها متبيلة للتجميع تقدم حل شمراخ يعلى الاوراق || منبها المناطق الحارة تعيش في المنافع والمياه العذبة الرائدة.

١٢٥٤١ - زُفْلُون

Pigeonneau (F).

Young pigeon, Squab (E). فرخ الحمام ما دام زق. يقال زفل المائر فرعه اذ زقه.

١٢٥٤٢ - زُفْلِيل هو الاديض الصغير، اطلبه.

١٢٥٤٣ - زُفْلِيلُ التَّيْسِي

هو الحيوان التتير، اطلبه.

١٢٥٤٤ - زُفْلِيلِيَّة هي لبن المروج، اطلبه.

١٢٥٤٥ - زُفْلِيَّات، زُفْلِيَّات

Olives sauvages (F), Zif (E).

١٢٥٤٥ - زُفْلِيَّات، زُفْلِيَّات وهو مثل البق الصنار يكون اخضر ثم يبدو فيسول في مرارة وصمته مثل صبة البق. يتركول ويطيح ويصلى ملؤه حتى يكون وبها كرب المتب.

١٢٥٤٦ - زُفْلِيَّات طَالِيَّة

Zygoneura frivola (S), Zygoneura frivola (F).

حشرة مؤذية من فصيلة الشباريات. تألف جميع المواقع القنالية والحائق والمساكن || جسمها صغير القد يطول م ٤ الى ٥ م. راسها مكور. عينها متلاصقتان مع البق. الذكر مفترقان عن الاثني. زباناها خيطيان. صدرها شبه يفضي الشكل. ورشاعها كبريا لقد، عددا الخضاب،



زفل



زفوان



زفيم مطروق



زقالة صغيرة العمد

Alaternbaum, Alaternkrenzborn (D). Alaterno, Ilatro, Putine (I).

نوع من الأبنى مهدد شرق البحر المتوسط. يوجد في بعض المناطق الجبلية اللبنانية والسورية. ينمو من متر إلى خمسة أمتار. أنصافه وأزهاره مزرقة، وأوراقه عريضة، كملحة، متعاقبة. نصلها سنن الحافة يحمل من ٤ إلى ٦ أزواج من العروق الماصعة. أزهاره عديمة البتلات، خمسية الإسدية وتنفصل الذققة، ثنائية أو ثلاثية البهار. ثماره كروية، حمضية القند، ناعمة البنية، تنمو حراة اللون ثم تسمر وتتبدل مع النضج. يقال إن تقع ثماره وأكلها ونشبه يسهل المعدة ويقوي الكبد والعظام ويذهب باليرقان.



زفرين اللبان

١٢٥٦٠ - زُفُونِ لُبْنَانِي * ، عُوْدُ الْخَيْرِ

Rhamnus libanensis (S). Nerprun du Liban (F).

نوع من البقي ينمو في جرد لبنان. وهو جنبة صغيرة تنمو نحو ١٥٠ سم. ساقها متعقبة خشبا حطلي اللون. أنصافها وأزهارها خالية اللحاء. لورائها متعاقبة بيضية. نصلها جبانة النسيج، كثير العروق التي يبلغ عددها من ١١ إلى ١٥ زوجا. أزهارها خشوية خمسية التركيب. ثمارها كروية نورية حمضية القند ناعمة البنية تنمو حراة اللون ثم تسمر مع النضج. يقال إن تقع ثماره يفيد الكبد والعظام ويلعب باليرقان.



زفرين لبناني

١٢٥٦١ - زُفُورَاف * Vane fort et soutenu (F).

High and sustained wind (E).

الزفراف والفرزفة: الريح الشديدة المهبية في دمام.

١٢٥٦٢ - زُفُونِ Tonnelle (F). Arbour (E).

خسنة من حديد أو خشب تنموها نباتات عريضة.

١٢٥٦٣ - زُفَافِ Expiration

خروج الهواء من الرئتين وهي حركة طبيعية تتبع الاستنشاق أي دخول الهواء الجري إلى الرئتين.

١٢٥٦٤ - زُفَافِ * ، قَرْجِيسَ لَسِيْمِي

Zephyranthes (S). Zephyranthe (F). Zephyr lily, Swamp lily (E). Zaphirblume, Flammenlilie (D). Zeffr (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة القرعيات. الأنواع نحو ٢٠ منطها زراعي جميل الزهر المخطط الألوان. شماعتها جوفاء. أزهارها فردية. لورائها غيقة النصل، قليلة العدد، تنمو متعاقبة قرب اتباج الزهر. أشهر أنواعه الأثينية ما يتبع.



زفر

١٢٥٦٥ - زُفَافِ الْبَيْصِ Zephyranthes candida (S).

Zephyranthe blanc (F).

نوع من الزفر شمراخه ينمو نحو ٢٠ سم. أوراقه اسطوانية مغطاة بتليل نحو ٣٠ سم. زهرته بيضاء اللون لا عرف لها. أزهاره في أيلول.

١٢٥٦٦ - زُفَافِ أَصْفَرِ Zephyranthes citrina (S).

Zephyranthe citrin (F).

نوع من الزفر شمراخه ينمو من ١٠ إلى ١٥ سم. أوراقه ضيقة النصل الباليغ المتخذ تليل نحو ٣٠ سم. زهرته صفراء اللون طولا نحو ٥ سم. ساقها مغطاة بمغصنة. أزهاره في آب.

والصيرليات. عناقها تموش على رسيق الإزهار ويتلها. يرقاتها تلتهم ذبي الزناير واسارع اقتدان ويترها من الحشرات. جسمها صغير القند يعلو من ٥ إلى ٨ م. ثوبها إلى السرة المخططة الصنائية المخرج. وأنها صغير الحجم. زبانا مشطبان. عيناها صغيرتان ماصحتان. ظفرها جعتان صغيرتان. رؤسها شافان كبيران يطنها مستعرض الشكل. أوصافها رباعية المثل في الزوج الخلفي، خنثيتها في الزوجين الأمامي والوسطي. لها جبل واحد في الحلق. تظهر الحشرة الجملانة في أوائل حزيران وتمتدح حتى أواسط أيلول. تسرح في النهار. تسافد في أواسط آب. تمتدح المكان قرب غشوات الزناير وفي المواقع القريبة من مجموعات الأساريح. البقرة عند بلوغها الأذكاء تمام تطول نحو ١٣ م. جسمها مبط الشكل، مستطيل القند والرأس، مستطيل القدر، سداسي الأرواح، ضلع التكرير، الجبر اللين، ودي المخرج، عتاي الرأس، أسمر الأرواح والشرج. طود الأكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوما ينقضي في التربة تحت الجملانة.

١٢٥٥٣ - زُفَافِيَّات * Rhaphiphorides (S).

Rhaphiphorides (F). Rhaphiphorides (E).

فصيلة حشرات وأشعة شافرة من رتبة غمديات الاجنحة. اجناسها وأزواها المعروفة قليلة العدد منطها من حشرات البلاد المعتدلة الحرارة وبعضها من حشرات حوض البحر الأبيض المتوسط. تألف نباتات الغمديات والشفويات. يرقاتها شافرة تموش على ذبي الزناير. أجسامها صغيرة القند أو معتدلة. رؤوسها مستديرة. زباناتها متجانسة الاشكال منها الخنثية والمروحية والمخططة، تتكرب من ١٥ أو ١١ فصلة. كولاسها وأغادها لاجنسية الشكل والقند. أوصافها الخلفية رباعية المثل اما الوسطى والأمامية فخنثيتها. المهر اجناسها الزنائلة والميمس.

١٢٥٥٤ - زُفَتِ Asphaltis (F). Asphalt (E).

نوع من الحمر كيف المادة السوداء اللامعة يستعمل مجبويا مع كسر الحصى في تنطية وصف الطرقات لتثبيت تكديدها ووقايتها.

١٢٥٥٥ - زُفَتِ، قُفِيرِ Empoiser (F). To pitch (E). قفير.

طل أو لاط التي يالزق.

١٢٥٥٦ - زُفَدِ Ciré, Lorum (F). Cere (E).

الزفد خشاء يعلف قاعلة المتقاد عند بعض فصائل الطير انصها الجوارح والحمام والبطاوات. ومن الكاترة من استعمل كلمة قير و دلالة على الزفد في حين إن القير هو القفران.

١٢٥٥٧ - زُفَرِ Tuteur (F). Prop (E).

هو المسند الذي تدعم به الشجرة الفتية.

١٢٥٥٨ - زُفَرِيَّاتِ Clématées (F).

سبط من فصيلة الكبريات.

١٢٥٥٩ - زُفَرِينِ الْجُرْدِ * ، نَبْتِ مَشْرُوكَاتِ ،

أَلْبَسِيسَ ، أَمْلَيْسَ ، عُوْدُ الْقَيْسِ

Rhamnus alaternus (S). Nerprun alaternus, Alaterno, Bourgue-épine (F). Alaternus, Barren privet (E).

في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في القفار . تساقد بعد ظهورها بنمو ستة اسابيع وتفتح المكنة رزماً لتلقحها في الجائفة وتحت الاشجار والحجاة || البرقة عند بلوغها الادراك تمام تطور نحو ١٥ م . جسمه رمدي الشكل ، كثيف الحلب ، حنطي اللون ، اسمر الرأس والرواجب والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع يتقضي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية .

١٢٥٧٢ - زُفِيرِيَّات * Zuphiidae (S). Zuphiidae (F).

فضيلة حشرات لاحة وقائمة من رتبة جمادات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف المواقع الرطبة وفضفاض الاطعم والبيوتات || جميعها صئيرة القند فلما يتجاوز طول الواحد منها ٢٠ م . اجسامها خالية للتقار ، متباينة الالوان الزاهية . رؤوسها كروية ، عضوية الاصداغ ، تركتزر على اعناق دقيقة اسطوانية الشكل . عيونها قليلة التنوع كواسلها قليلة العرض ، شبه غليظة الشكل . ارجلها مسطوية ، مستديرة الأطراف || تسرح في القفار وتبيت في الليل . تسمى بصره وتعتبر نطفة . قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر ولا تتغذى من الضيوف من الحشرات الدنيا || اظهر اجناسها الزفير .

١٢٥٧٤ - زُقْ Abecquer, Embecquer (F). To feed (E).

زق الطائر فرشه : اطعمه بمقار : راجع أنزل .

١٢٥٧٥ - زُقْ ، تَسْمِين Gavage (F). Cramming (E).

اطعام الطيور الداجنة قسراً طاماً خاصاً بنية تسميتها .

١٢٥٧٦ - زُقْ Asque (F). Ascus (E).

خلية نباتية تتصلب الى كيس صغير ينفث فيه بوغ الفطور الزقية . ج. أنفاق .

١٢٥٧٧ - زُقْداء ، هَبْح Crl du hibou (F). Cry of the owl (E).

صوت البرم حل اختلاف اجناسه .

١٢٥٧٨ - زُقْداح ، زُقْج Crl du singe (F). Cry of the ape (E).

انزاع والزقج : اسم صوت القرد خاصة والفصلك كلاك .

١٢٥٧٩ - زُقْدو Fusicoccum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات يتميز بويضة البكنيدية التي تنشق عضوية ثم ترق تصعد الاذمة والبشرة . وهي شفافة ، لينة التركيب ، حنطية الجول . تصطبها رديئة المياه ، مسطوية الخلق . بروتانها بيضية شفافة . انواعها قليلة لا ينتمى منها افرار تمشق السانية .

١٢٥٨٠ - زُقْدو السدْرَك Fusicoccum cedrelae

فطر مجهرى يصيب سوق وافصان السدراك . مظهره الخارجى بلخ مسطوية طولها من ٢٠ الى ٤٠ م . تركيب الحاء السوق والانصاف تفرزها وقد تسبب بها فناءه || يكافح بالاكش والتطهير والمالي بالستوك .

١٢٥٨١ - زُقْدو اللوز Fusicoccum amygdali

فطر مجهرى يصيب اغصان اللوز واقلاده فيمرل سير التسع

١٢٥٧٧ - زُقْدو حافنين Zephyranthes sessilis (S). Zéphyranthe sessile (F).

نوع من الزفير شرخه يملو نحو ٢٠ سم . اوراقه نحيلة اسطوانية تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . زهرته عطرية حساسة تطول من ٤ الى ٥ سم . لونها الى الكيفاش الموشح بالاحمر . ساقها ثلاثية || ازهاره في نيسان .

١٢٥٧٨ - زُقْدو فيرجية Zephyranthes stamesco (S). Zéphyranthe de Virginie (F).

نوع من الزفير شرخه يملو نحو ٣٠ سم . اوراقه ضيقة مجددة زاهية الخضار تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . زهرته عطرية تركتزر حل زباد يملو الشراف المزدوج الفلقة . طولها نحو ٨ م . لونها يستقر على الكيفاش الثلثي بعد ان تكون بياضاً موشحاً بالوردي || ازهاره يستمر من ايار الى سبيران .

١٢٥٧٩ - زُقْدو موشح Zephyranthes versicolor (S). Zéphyranthe versicolore (F).

نوع من الزفير شرخه يملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقه ضيقة مدنية الزام الاخضر تطول نحو ٣٠ سم . زهرته حلوة تركتزر حل زباد قصير يملو الشراف . طولها نحو ٥ سم . لونها يستقر على الكيفاش الموشح بالوردي يملو موشح اخضر . ازهاره يدمم طوال فصل الشتاء .

١٢٥٨٠ - زُقْدو وردى Zephyranthes rosea (S). Zéphyranthe rose (F).

نوع من الزفير شرخه يملو نحو ١٥ سم . اوراقه ضيقة التصل المسطح تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . زهرته عطرية صغيرة القند تركتزر حل زباد مسطح يملو الشراف . طولها نحو ٢ سم . لونها وردي يملو موشح ليكي || ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

١٢٥٨١ - زُقْدوس * Ziphius (S). Ziphius (F).

جنس حيوانات بحرية لينة عظيمة الهامة من المحريات متاثلات الانسان فضيلة التبريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اسطاني ، مسطح جمار العالم || اجسامها كبيرة ، شبه وضية الشكل ، مدممة الاثاق ، غروية الرؤوس الضخمة ، صغيرة الاطعام . انواها الى الخضار اللين الاقزق الموشح ، بطنها الى الكيفاش المسامي || سطحها الحلياني جامي . انواها متوسطة العدد الذي يراوح من ٥٠ الى ٢٥٠ زبياً .

١٢٥٨٢ - زُقْدوس عطر * Zuphium olens (S). Zuphium olens (F).


حشرة قائمة من فصيلة الزفيريات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف المواقع الرطبة وفضفاض مجاري الماء . قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر وما تسطيع اقتناصه من الحشرات الدنيا . تتميز برائحها العطرية المائنة التي تم من وبيضا الى بعد متر || اجسامها صغيرة القند طولها من ٧ الى ٩ م . ثوبها الى الثلثة السراة تعلوها تزاريق سوداء اللون . رأسها صغير الجرم ، اسود اللون . عيونها صغيرات . زباناتها عظيمات مستطيلة . ظهرها مستعرض الخصر لا يلتصق كامل البطن . جرابها ناعمة . ارجلها خاسية المعقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة



زفير



زفير من



زقار اللوز

١٢٥٨٧ - زَقَقَهُ شَالِمَةً *
 Plotus anHINGA (S).
 Anhinga vulgaire (F). Common darter (E).
 نوع من الزققة. طولها نحو ٩٠ سم. قوتها قريب من قلوب جنسها تكثر فيه الزققة البيضاء. موطنها مناطق وشفاف أنهار وبحيرات القريفة الوسطى وأمريكا الجنوبية والوسطى. وهي لا تفارق المياه العذبة إلا عند الاستراحة في ظاهرة أنهار.



زَقَقَ أَشْفَقِ الْبَطْنِ

١٢٥٨٨ - زَقَقَاقُ ، زَقَقَاقُ ، دَمَشَقُ
 Charadrius (S). Plover (F). Plover (E).
 جنس طير من فصيلة الزقزقيات. أنواعه عديدة صغيرة ومتوسطة الحجم. جميعها من القواطع تجوب المناطق والقيعان والمراعي وكثبان الرمل في أجسامها رفيقة. مناقيرها أقصر من رؤوسها. أجسامها ذلقة. أركانها رفيقة ونحيلة. ألوانها مزاجية الألوان. أذنابها موجهة بخطوط مستعرضة. قوتها الحشرات والديدان على اختلاف أنواعها. تنش في الفصوص تدره في منظر ما معرضه الجنوب وتكلمه بقى الحشائش الناعمة. أذنابها تبيض من ٢ إلى ٥ يبيضات تحضنها وسطها نحو أسبوعين.



زَقَقَ شَالِمَةً

١٢٥٨٩ - زَقَقَاقُ النَحْسِ
 Yennau à caroncule (F).
 هو الكتاب ، طائر من الزقزقيات ، أعليه .

١٢٥٩٠ - زَقَقَاقُ الرَّمْلِ الْمُطَوَّقِ

Charadrius hiaticula (S). Grand plover à collier, Gravelot hiaticule (F). Ringed plover (E).
 نوع من الزقزق كبير الجثث يتميز بطقه المستعرض الاسود ويقامحه الجلوبين في سره كبير اللبد. يألف لكثبان الرملية ويصاحب الأجر .



زَقَقَاقُ نَفِي

١٢٥٩١ - زَقَقَاقُ شَامِي
 Vennau (F).
 طائر يعرف باسم شهره وهو أبو طيط ، أعليه .

١٢٥٩٢ - زَقَقَاقُ فَيْفِي *

Squatarola squatarola (S). Pluvier argenté (F). Grey plover, Swiss plover (E).
 نوع من الزقزق كبير الحجم، البطن القوي، يلق في الربادي القضي المواجه في سره متوسط اللبد. يألف المروج والمراعي وشفاف الأعوار .

١٢٥٩٣ - زَقَقَاقُ مَدَهَب *

Charadrius suratus (S). Pluvier doré (F). Golden plover (E).
 نوع من الزقزق يحوي بلاد حوض البحر المتوسط . ثوبه الشوي يتخلل عن ثوبه الريسي . ظهوره اسود نسبي تعلوه نمشة سرخسية الشكل ملحية . زوده وصدره إلى السواد اللامع يملو توشع أصفر ويحيطه أطار أبيض . يلقه وروايقه ونمكة يلق . عيانه يمتقله وقائمته سود في أسرابه متوسطة اللبد . يألف المروج والمراعي . قوته الحشرات والديدان .



زَقَقَاقُ مَدَهَب

١٢٥٩٤ - زَقَقَاقُ مُسْلَحٍ
 Hoptoptère (F).
 طائر من الزقزقيات يدعى تهبوج ، أعليه .

ويشتهر ألبتو || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل تركب الحاد منه أبعد الأبرام . تبدو غيرة اللون ثم حنطة ، كدوم من نيسان حتى أيلول حيث يضيئ أثرها || أضراره زعيدة لا تستوجب المكالمة .

١٢٥٨٢ - زَقَقَاقُ أَشْفَقِ الْبَطْنِ *

Oxynotus rufiventer (S).
 Oxynota à ventre roux (F).
 طائر من الجوارح مشربيات المنايير وفضيلة الثعريبات . أعطانه مدغسقر وبعض جزر المحيط الهادي . يألف النابات والحدائق والجنائن . قوته الحشرات والذباب والحمام || جسمه صغير الله ، حجمه حجم الدوري . قوب الذكر متداخل الاسود والازرق والاشهب الاخير . يلقه إلى الشقعة . ذنبيه زجاجي الريش ، مزرق الاسود . قوب الانثى إلى الشقعة الموجهة بالاسمر اللتام || يلقه حده في الانجرار الرفيعة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ إلى ٦ يبيضات . القرض يستمر نحو ١٣ يوما .

١٢٥٨٢ - زَقَقَاقُ
 Eurytostomus (S). Eurytostome (F).
 جنس طير من الجوارح وأهانت المنايير وفضيلة الثعريبات . أنواعه المعروفة ستة أعطانه بعض المناطق الاستوائية والحارة من العالم القديم || أجسامها قريبة الشبه بالثعراق . مناقيرها قصيرة مستعرضة الاشدان . أجسامها كبيرة ، ذنوب الاطراف . أذنابها مستقيمة الطويل و شقعة الطول . المستدير . ألوانها إلى الزققة السعفاء المواجه ومنها إلى الزققة الخضراء أو الجلوبية للمواجه || قوتها الحشرات والديدان .

١٢٥٨٤ - زَقَقَاقُ
 Crier (oiseau) (F).
 زَقَقَاقُ : صوت .

١٢٥٨٥ - زَقَقَاقُ
 Plotus (S).
 Anhinga (F). Anhinga, Darter, Snakebird (E).
 الزققة ج زقق ، جنس طيور مائية من كليات. القديم طوليات الريش . ألوانه قليلة موطنها بعض أنهار وبحيرات المناطق الحارة . من طيورها أناسا تمكث في مكانها حتى يكاد يقبض عليها فصوص في الماء وتخرج بعيدا || أجسامها رفيقة مستقيمة ، طيلها يراوح من ٨٥ إلى ٩٥ سم. أعنتها اسطوانية . بالغة الطول . رؤوسها صغيرة مستقيمة . مناقيرها اسطوانية الشكل مفرقة للمناظرة . أذنابها طويلة . قوائمها قصيرة مستعرضة . الانزكان الميكلي . أركانها قوية . أقدامها مستعرضة . أذنابها إلى السواد اللامع يملو مراح أخضر . رؤوسها إلى الكهبة السمره . ظهورها وبسوانها منشقة . أيلهاها ومناكبها وكلاهما مخططة بالأبيض . أعنتها وسنابرها جلوبية || قوتها الاسماك والقشريات والشفادح . تنش في الانجرار . أذنابها تبيض من ٤ إلى ٥ يبيضات تحضنها بمناوبة ذكرها نحو ٤ أسابيع || أشهر أنواعها الثمانية والبالغة .

١٢٥٨٦ - زَقَقَاقُ بَاسِلِيَّةُ
 Plotus vallanti (S).
 Anhinga vallant (F).

نوع من الزققة موطنها بعض المناطق الاسيوية والافريقية . تكثر على ضفاف النيل وبحيرات ودي العراق وتركيا . وهي لا تفارق المياه العذبة إلا لتتقم على الانجرار أو حضور الجرف . طيلها نحو ٩٥ سم. قوتها قوب جنسها يكثر فيه المواجه الأخضر والازرق وتقتل فيه نسمة التنبش بالابيض .

١٢٦٠٢ - زَقَبُوت الْأَثَل *

Stearapis squamosa (S). *Stéarapis des tamaris* (F).
حشرة من الناصعات طولها نحو ٣٠ م. ثوبها إلى الخضار
الزبردي، حمار ظهرها إلى السمرة يعاوها مراح أحر.
يرقاتها تركب فروع وأغصان الأثل فتفسد الخشب
وتعطب.

١٢٦٠٣ - زَقَبُوت الْخَوْخ *

Bupreste du prunier (F).
حشرة مشهورة باسم ناصعة الخوخ، أظلمها.

١٢٦٠٤ - زَقَبُوت الدَّرَائِي *

Bupreste noir du pêcher (F).
حشرة تدعى ناصعة الدرائق السوداء، أظلمها.

١٢٦٠٥ - زَقَبُوت السَّنْدِيكَان *، نَاصِعَةُ السَّنْدِيكُوت
Coræbe bifasciatus (S). *Bupreste du chêne*,
Coræbe bifasciatus (F). *Oak burncow* (E). *Zwei-*
bindiger Prachtkäfer (D).

حشرة من الناصعات طولها نحو ١٥ م. ثوبها إلى الخضار
المذهب || يرقاتها تعيش على فروع وأغصان السنديان
فتفسدها وتؤذيها.

١٢٦٠٦ - زَقَبُوت الصَّنُوبَر *، نَاصِعَةُ الصَّنُوبَر
Chalcophora mariana (S). *Bupreste des pins* (F).

حشرة من فصيلة الناصعات طولها نحو ٢٨ م. ثوبها
إلى الخشن الأسع الملبج ينحرف إلى الاسود في آخر
مهيحا. طيراتها سريع زق || يرقاتها تركب قلف
الصنوبر فتفسده وتعطب الشجر.

١٢٦٠٧ - زَقَبُوت الْوَرْد *

Bupreste du rosier (F).
حشرة تدعى ناصعة الورد، أظلمها.

١٢٦٠٨ - زَقَبُوت نَسَاعِي الْبَحْج *

Buprestis novemmaculata (S). *Bupreste à*
9 points (F). *Buprestis novemmaculata* (E).

حشرة غاشقة عاشبة من فصيلة الزقزقيات ورتبة غديات
الاجنسة. موطنها يرم معظم أسواق حوض البحر الأبيض
المتوسط. تألف المواق التي يكثر فيها الصنوبر والبروز
والشربين والسرور. خنافسها تعيش على ما تقتضيه من نصل
الأوراق. يرقاتها تعيش تحت القلف والحاء دون أن تتعدى
على الشجر || جسمها متوسط القد بطول من ١٥ إلى
٢٠ م. ثوبها إلى السواد الأسع المراح. غدها وكوسلها
مقبحة بالأسفر. رأسها صغير أجرم ينفرد تحت الكوسل.

عيناها كبيرتان بارزتان. زباناها غشيان، منفرجان.
فكهاا ضليمان. كوسلها قبلي الشكل. ظهرها مستدل

الاحاديذاب. غدهاا بليغتا التصغير المتوازي المخطوط
القائمة. أرباعها خاسية السفل || الانثى اكبر قدما من
الذكر وأضعف بطنها من واكد ثوبا || جيلها ثنائي الحول.

تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اواخر
الربيع. تسرح في الجبال وتبيت في الليل || اليرقة بطيئة
التنود لتدرك الكمال الجسموري بعد التفت بنحو ١٢
شهرا. جسمها مستطيل المقدم، مستقيم المؤخر، بطول
نحو ٤٠ م. ثوبها إلى البياض الاغبر. رأسها اسمر اللون

١٢٥٩٥ - زَقَزَق مَطَوَّق *

Charadrius dubius curonicus (S). *Plover à collier*,
P. de rivage, *Gravière*, *Alouette de mer*, *Gravelot*
naïf (F). *Lesser ringed plover* (E).

نوع من الزقزاق صغير القد، اسود المنقار البسيط،
مستدير العين الكسلا، مطوق الصدر، احمر القائمة
واقدم || سره متوسط السدد. يألف المنابع وصفات
الانهار والشلوط.



زَقَزَق مَطَوَّق

١٢٥٩٦ - زَقَزَق نَاعِصِي

Hoploptère épineux (F).
طائر يدعى نهيوخ ناعص، أظلمه.

١٢٥٩٧ - زَقَزَقِيَّات *
Charadriidae, *Charadriidae* (S). *Charadriidae*, *Charadriidae* (F).
Charadriidae, *Charadriidae* (E).

فصيلة طير من رتبة طول الساق. اجناسها واتواعها
عديدة متماثلة الاشكال والاخلاق والامادات. تتميز
بسرة دمها على الارض وبمناقيرها المركبة من جزين جز.
غشروني يمتد من القاعدة حتى ثلثي المنقار يسير قرفي
يكون الثلث الاخير حيث الطرف والمقلط.

١٢٥٩٨ - زَقَزَق، شَرْد *
Gezoullier (F).
To chirp, *To warble* (E).

زقزق ورد الحمار: رابع سرته وطرب به. والزقزقة شاملة
لجميع الناصيات اما التفريد فنحاصر ببعضها.

١٢٥٩٩ - زَقَزَقِي *، تَمَلَّة الْأُرْجَنْجَيْن *

Iridomyrmex humilis (S). *Fourni d'Argentine* (F).
Argentine ant (E). *Argentinische Ameise* (D).

تملة صغيرة القد، دقيقة الجسم، تقطو نحو ٣ م. ثوبا.
إلى السمرة الخشبية. صدرها بيزارمزا اقل سمرة من رأسها
وطيها. التملة الكسلا الشق، الجفنة، تقطو نحو ٦ م. ||
تقيم زبها في أي مدع كان أو داخل المنازل أم خارجها.
جراتها كيرة. عددها بعد ثلاث سنوات لا يقل عن
٢٠ ألفا وقد يبلغ ٤٠ ألفا بعد خمس سنوات || حاملاتها
شديدة النشاط. سرعة الحركة، تسطو على معظم انواع
النمل. صر قفها يتكلم من ولوج جميع الاساكين للذك
فتها لا حد له لانه يشمل جميع المواد الغذائية وأخصها
الحرم والمواد السكرية || يقال انها انتقلت من الاربعينين
إلى قضى اماكل اوروبية منذ ثلاثة اجيال. وانتقلت من
اروپة إلى اساكيل الاسود بنفس الطريقة. وهي
الآن من حشرات سواحل حوض البحر الأبيض المتوسط.

١٢٦٠٠ - زَقَع *
Chant du coq (F).
Crowing of the cock (E).

هو صياح الديك. زق الديك: صلاح.

١٢٦٠١ - زَقَبُوت *، نَاصِعَة
Bupreste (F).
Buprestis, *Golden beetle* (E).

جنس حشرات من فصيلة الناصعات انواعه عديدة جميعها
حيلة الشكل والالوان الزاكية النحاسية الملبج. تعيش
في المنافع الممتدة الحارة. هي ضوئية للسرح سريعة
الطيران والحركة || يرقاتها غاشقة تعيش على مختلف
الاشعاب وعلى جذور وسوق النباتات العشبية.



زَقَزَق



زَقَبُوت الْأَثَل



زَقَبُوت السَّنْدِيكَان



زَقَبُوت الصَّنُوبَر



زَقَبُوت نَسَاعِي الْبَحْج

قليلة منها المناطق الاستوائية. جلبوها بحديقة تنود في الماء. سقيا بذرات صغيرة. لورافها قرصية الانتساب، خسية التجميع، بتلية الشكل، فضلة النصل المخنن الشارف الأطراف. أنماطها فردية محورية لأشعة. يقال أن لورافها تنحب بالزحار وتنقل بول الدم.

١٢٦٠٩ - زَيْتُون فَكَّام *

Capnodis carbonaria (S). *Capnode carbon-nier* (F). *Capnodis carbonaria* (S).

حشرة خاضعة لائحة مذبذبة من الزيتونيات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف الموائل التي تكثر فيها أشجار الأوز والخروج. خنافسها تعيش على الأوراق والبراعم. يرقاتها تتجمل الشكير والخشب وتغصب الجلود تحت سطح التربة || جسمها كبير القدر يطول من ٣٥ إلى ٤٥ سم. ثوبها إلى السوداء القطنية تملو حلة مملوءة. رأسها مستعرض الجرم، عينها كبريتان، زباناها خيطيان، ظهرها ذق الخوض، مستند الطرف الفارقة الاخفش. غمداهما شديقتا الصلابة، ارساها حامية العقول || جعلها ثنائي الحول. الاثنى اكبر قدما وانصر زبانا. تظهر من نوسان الى حزينان وتعيش نحو ٢٠ اسبوعا || البقرة دقيقة مرقاة بلطية التنو. تطول نحو ١٠٠ سم. ثوبها الى البياض الاخير. رأسها اسود. فكاهما ضليمان.



زيتون فكام

١٢٦١٩ - زَلَّة * هو فرخ القاطنة.

١٢٦٢٠ - زَكَاة

الزكاء : ما انخرجه أحد من الثمر (التاج).

١٢٦٢١ - زُكَم * هو الخنان، اطليه.

١٢٦٢٢ - زُكَاة * (F). Cytologie (E).

هي السيولوجية أي علم الخلايا. وهي علم يبحث في ماهية الخلايا وتطوراتها الحياتية من جميع النواحي أن جسمودية او كيميائية او خلافا.

١٢٦٢٣ - زُكَاة حَيَوَانِيَّة * (F). Cytomologie (E).

فرع من الزكاة يبحث في ماهية الحيوانات.

١٢٦٢٤ - زُكَاة نَبَاتِيَّة * (F). Cytobotanique (E).

فرع من الزكاة يبحث في ماهية خلايا النباتية.

١٢٦٢٥ - زُكْبَة * (F). Sperme des insectes (E).

هو افراز اللقد التناسلية الذكورية عند الحشرات.

١٢٦٢٦ - زُكْبَة * (F). Cytoblaste (E).

الزكبة جيلة الخلية النباتية.

١٢٦٢٧ - زُكْبِي * (F). Cytologique (E).

كل ما هو يخص بالزكابة أو مائل اليها.

١٢٦٢٨ - زُكُون، زُكُون، زُكُوم * (F). Zaccou, Zacon (E).

هو الحلج من السلايات، اطليه.

١٢٦٢٩ - زُكِيَّة * هي الافاتوسه، اطليا.

١٢٦٣٠ - زُكْبِيَّة، صَرْك * (F). Sore (E).

مجموعة الاعضاء التناسلية في بعض الفطور.

١٢٦٣١ - زُكَاة المَكُون * هي مرة السمر، اطليا.

١٢٦٣٢ - زُكَة * (F). Zilla (S).

جنس نباتات شبيهة برية محولة من فصيلة الصليبيات.

١٢٦١٧ - زَلَم * هي العالم المائي * (F). Pistia (S).

Pistia, Codonopistia (F). Water lettuce, Tropical duck-wood (E). Wasserzalat (D). Pistia (I).

جنس نباتات نجمية مائية من فصيلة النرجسيات. انماه



زيم



زيمية

1٢٦٤٣ - زُحَابَة ٥ Zelocova, Abelica (S).

Zelcova, Késki, Orme de Sibérie (F).
جنس اشجار حرجية من البقيعات وفصيلة الانجريات .
انواعه قليلة . اشجارها كبيرة القد تصل من ١٥ م ٣٠ م .
انتاعها ثنائية الانتساب . اوراقها ثنائية الصنف ظاهرة
البروق ، بيضية الشكل ، مسننة الحافة ، قصيرة
العتق . ثمارها باسمة بحجم الحمص .

1٢٦٤٤ - زُكَم ٥ حوب القزم ، اطلبه .

1٢٦٤٥ - زُكَم ٥ ، وَيَر Dendrohyrax

جنس حيوانات لبونة قاسمة من فصيلة الدماينات .
انواعه ٦ موطنها الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية .
انواعها سوية اللون الابيض الاكسل . موطنها الى الصغار
التي . راجعها العليا غليظة ، مبرها جاحشة . قوائمها
قصيرة . اذانها ثنائية الاطراف . تألف الاجراس والغابات
وتتسلق الاشجار بخلاف الانسان الذي لا يقوى على ذلك .
قوتها اثنان ونواحي الاشجار وبعض الاعشاب . اذانها تقع
من ٣ الى ٤ اذراس رصعها من ٦ الى ٧ اسابيع .

1٢٦٤٦ - زُكَمَاء ، صُكْرَة Faucon femelle (F).

الزئاع والصقرة : أنثى الصقر . Female hawk (E).

1٢٦٤٧ - زُكَمَة Caroncule (F). Caruncle (E).

قال الخليل : الزئاع كمن في طيرها معلقة كالزئاع
وما زلتان .

1٢٦٤٨ - زُكَمَة ، شُؤْرَة Gabarit, Gabari

أخوخ أو رسم أو تخطيط شيء ما بشكله الحقيقي وكامل
قياسه الحقيقية الواقعية .

1٢٦٤٩ - زُكَمَة Fleurs de myrte (F).

الزئاع : نور الريحان . Flowers of myrtle (E).

1٢٦٥٠ - زُكُل ، زُكُلَة Glissement (F).

Sliding, Slipping (E).
حالة الشيء المنزلق أو حركة انزلاق الشيء .

1٢٦٥١ - زُكُلِيَّة ٥ Oncidella (S).

Oncidella (F). Oncidella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات ممليات الارجل
الرئوية . فصيلة الزنجبيات . انواعها المتناسرة المعروفة
عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المحتلة الحارة ||
اصداؤها معتلة اللحم ، ثنائية المصارع الانتساوية ،
شبه اهليبية الشكل ، قليلة الاحدياب الصاصي . الاتحاد
يلوحها من القمة الى الطرف الخلفي اخميد نافر غروي
الشكل يضيق مع اقترابه من القمة .

1٢٦٥٢ - زُكُلِيَّات ٥ Oncidellidae (S).

Oncidellidae (F). Oncidellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات ممليات الارجل
الرئوية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع
بحار العالم || اصداؤها ثنائية المصارع الانتساوية .
تمتدح على الصخور والنبوت البحرية القريبة من الشواطئ .
سرحها دجوي || اشهر اجناسها الزكلية .

1٢٦٥٣ - زُكُلِيَّة ٥

اسم سمكة بحرية يطلق على الكبدية المشفراء (Vicille)
ويطلق على الزكول (Savonnier) .

انواعها المعروفة اربعة منبها الشرق . اوراقها حرجية .
ازهارها ليلية . يقال انها لا تنقل من بعض المنافع
الطبية .

1٢٦٥٣ - زُحَاب ٥ Cronartium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الزغابيات يتصل بالخصص
الميرة التالية :
١ - مفاكه تنيش وتتكاثر تحت ادمة النبات المنحار .
٢ - صفاته الانثوية جرابية المسائل وجيوب عاقلها
تنتقل من بونيات ثملوية السطح .
٣ - ذماته وسادية متضبة رباعية الاخية .
انواعها عديدة تنقل على اوراق واغصان النبات اشهرها
واعرها ما يلي .

1٢٦٥٤ - زُحَاب الصُّوَر ٥ Cronartium ribicola, Peridermium strobili (S).

Rouille des pins à 5 feuilles (F).
فطر مجهرى يتصل على اعداب الصنوبر فيطبا ويصيب
ذويها وسطيها . ويصيب العاء فيقرحها ويتغشاها
ويصلب الاشجار وقد ينفذها الى اليابس .

1٢٦٥٥ - زُحَاب الصُّوَر ٥ Cronartium flaccidum, Peridermium coruni (S).

Rouille de la pivoine (F).
فطر يعيش طوره الاثدي على لحاء الصنوبر وطوره
العاصي على القوائم . مظهره الخارجي على الصنوبر
صفت لا قياسي الشكل والحجم لونه يتأرجح بين الاحمر
والاصفر مركب الاغصان والاذنان من اواسط ايار الى
اوائل تموز فيقرح العاء ويصلب الاغصان المصابة .
وهو على الزوايه يقع لقياسه الشكل والحجم والتجميع
تركب نصل الاوراق من صفاتها السفلى تقرب ارتقاء
البشرة وانفجارها ثم صلب السيج وذيله .

1٢٦٥٦ - زُحَابِيَّات ٥ Cronartiaceae (S).

Cronartiaceae (F). Cronartiaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من ربة الدماينات قليلة الاجناس
والانواع . تتميز بعلاماتها الانثوية الشكل والتجميع .
اذاها جرابية تملح سطح الانسية المنحارة . ذماتها
وسادية او هدية لشكل . بونياتها صنترة كروية .
اعرف واشهر اجناسها الزحلاب والكروبيكس .

1٢٦٥٧ - زُكُلِي ٥ Sismique (F). Sismic (E).

نعت تعريفى يطلق على كل ما له علاقة بالزلازل وبالزلازل
الانسية .

1٢٦٥٨ - زُكُلِيَّات ٥ هو الاندريست ، اطلبه .

1٢٦٥٩ - زُكُم Garçure (F). Chap (E).

شروق سطحية في اطلاب شروق البقر والمزى .

1٢٦٥٠ - زُكُب ٥

زئاع وزئاع رأى الشام : وبر اي نبت عليه الور .

1٢٦٥١ - زُكُم Parc (F). Park (E).

الروضة المتفرقة الريانة جادت مياهها وكثر طيرها .

1٢٦٥٢ - زُكُم Museum des canidés (F).

هو غنم الكليات واشمالها . Muzzle of canidés (E).



زحلاب الصنوبر



زحلاب الزوايه



زئاع



زئاع

ظهره مشع بالابيض والابيض الاكثر والاسود. قوامه ومناكه وطرفاته ونمطه سود. بطنه وباطن مقعده وكعته بيض. وصداه الى الرعدة الزرقاء. الذكر اصفر جنة من الاثني واثنى لونا واصلب شكية. عيوب الجبلد في طلب اللقوت والمصيف والمشي. يات الجبلد والقنابات والاصراج. يمش منه بين فروع الاشجار الباسقة. انشاء تحفن من رقتين الى ثلاث رقات نحو الشهر. يئلس قوته عنه الصالح الباكر. يرغب في الجبلد اللينة ينشرها مها كانت جلوسها قاسية.



زيلة

١٢٦٦٠ - زُمَاحِيَّات *Sarcophages*
فضيلة من القصور تقضي الى ربة الجوارح. اجناسها الحالية تلية تشمل الزباج والكنكور.

١٢٦٦١ - زُمَاح *Cri de l'austuche (F). Cry of the ostrich (E).*
صوت القملة وفي الصالح صوت النعام.



زاج

١٢٦٦٢ - زُمَاحُ * *Berita (S). Fîsteur (F). Morning-clock (E).*
طائر من فصيلة القراييات. انواؤه المروعة ثلاثة موشيا استرالية وصيانية. يات الير والاصراج البصرة الاجمار ويقتر من الاساكن الاطاة ولتالز الرقية. جسمه كبير القد بطول نحو ٤٢ سم. قوه اسود اسم. لقله وظهوره الى البياض الاخير. لواحض جناحه وذنبه الى البياض الناصع. مقفاده غرغري الشكل اذق العين. حلقة عينه كسنية. جناحه كبير القد بلفظ اللب. ذنبه فيه مقطوم الطرف. وصداه الى السمرة السوداء. اخلاقه هنية. من مزاياه انه يهاجر فريده الحانه منذ الصباح الباكر. يقات صوته قريية تشبه بختات الزمار ما دعي الى تسميته بالزمار. قوته الاشرار على اغلاط اجناسها وانواعها وانصها الكبيرة ينشأ الجراد. يمش منه في الاجبار البورية لظل المستدة الانزفاج. الاثني تحفن من موشين الى ثلاث موشات في الحول. حصفها تراوح من يمشين الى ثلاث يمشات تقوم بانزعجها دين الذكر الذي يمين لما النداء.



زاج ملكي

١٢٦٦٣ - زُمَاحُ الرَّمَل *طائر من القنقع، اطله.*

١٢٦٦٤ - زُمَاحَاتُ البَحْرِ *Synagchidae (S). Synagchidae (F). Synagchidae (E).*
فصيلة اسماك بحرية من ربة عسليات الجبال اجناسها وانواعها عديدة اشهرها زمارة البحر وسمان البحر.

١٢٦٦٥ - زُمَارَة البَحْرِ *Synagchus (S). Synagchus (F). Synagchus, Pipe fish (E).*
جنس اسماك صغيرة مسطوية. اجسامها غرغرية الشكل دقيقة المؤنر المتسلف كالصين. وروسيها مسطوية كالقنثار الانطس الطرف. تحمل زعنفة ظهرية واسعة تقابلها فيه زعنفة بطنية متناحية في الصغر. انواؤه عديدة موشيا. جمع بحار العالم. اسرفها واشهرها زمارة البحر الابرية.

١٢٦٦٦ - زُمَارَة البَحْرِ الابرية * *ابو زُمَارَة Synagchus acus (S). Synagchus algutia, S. trompetta, S. serpens de mar (F). Needle pipefish (E).*
نوع من زمارة البحر بطول نحو ٥٥ سم. تكثر في البحر الابيض المتوسط وقرب شواطئ المحيط الاطلسي.

زمارة البحر الابرية

١٢٦٥٤ - زُمَاحِيَّة * *Brugnon (F). Nectarine (E).*
هي الياض ثمرة اللوزان مها كان شكلها وقد صار اسنادها الى التار المرطاة البشرية. ج زليق.

١٢٦٥٥ - زُمَاحُ *Zillo*
مادة سامة ترتكز على مشقات التالوم. عرضها التجاري المعروف ياتي على شكلين: الشكل الاول حبوب مسبوكة تستعمل القضاء على الفيران والكمبار والمانجس. والشكل الثاني مجنون وضع خصيصا للاستعمال في مختلف انواع العلوم وهو يقضي على الجرذان والارانب والكمبار واشباهها. انما يجب على كل من يستعمل مستحضرات الزليق ان يكون ملدرا فيبعدا عن متناول الطيور والحيوانات الداجنة لانها مؤذية وقد تكون مية.

١٢٦٥٦ - زُمَاح * ، زُمَاح *Herpethocherus (S). Macagus (F).*

جنس طير من حارة البزاة وفصيلة الصقريات. انواؤه قليلة جميعا من الجوارح الصغيرة القد طولها يراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم. انواؤها موشية بيوشة قلب فيها الجوزة. ارياضها شاسعة. وروسيها غليظة. مناسرها قوية عمودية. سواقطها مسطوية. اذناها مستعدة. ارسافها ثخينة. غالبها سادة. الواحدة زجبة. ارسافها قليلة العدد. عيوب الجبلد في طلب المصيف والمشي. تألف عماري الماء والطراف القنابات. قوتها الاناوي والعظاء والموهيات واغرات وبعض الاسماك. يقال انه لم ياكل احد من لحمها الا مات. قال الشاعر:

«أهل الهدي أصبحت لم عرو
ليت شمري أم ظلفا الزباج»

١٢٦٥٧ - زُمَاح *Sarcophage*
جنس طير من كواسر القصور وفصيلة الزباجيات. انواؤه قليلة جميعا كبيرة اذقة بلقاء الثوب. وروسيها وانعافها غفيرة. سواقطها العاليت. ارسافها سرسة غالبها قوية. قوتها الجبلد اللينة ومنهم من قال ان الزباج يخالط القمل من مهده. اعرف انواؤه واشهرها الزباج الملكي وزباج امريكة.

١٢٦٥٨ - زُمَاحُ كَلِفُورِيَّة *Pseudogryphus californianus (S). Sarcophaga de California (F).*

طائر من الزباج طول نحو ١٢٠ سم. وبسطة مقعده ٢٥٠ سم. ثوبه اسود. مقعده ابيض. رأسه اغفر الرشي. كبير المرفوف. اجسد الاذن والزلف. غليظ المنسر. الاصف البيرة. يمش منه على الحفصين وبين عثايلت المنصور في الجبال الربية. انشاء تحفن من رقتين الى ثلاث رقات نحو الشهر. يئلس قوته على الدار. يرغب في الجبلد اللينة موته امريكة الشالية انصها كليفورية.

١٢٦٥٩ - زُمَاحُ مَلَكِي * *Sarcophagus gyparcus papa (S). Sarcophagus royal, S. papa (F).*

طائر من الزباج يعرف باسم ملك القصور طول نحو ٩٠ سم. وبسطة منطقيه ١٩٠. رأسه اغفر الرشي خري اللون. منسره غليظ الشكل اسود الانتشاب اخر الهيكل اسفر البيرة المقطوعة المقفاه. عره يرتقالي اللون. عتفه اغفر اصفر. جويق مطوق بالازرق.

Plumes sus-caudales (F). زَمْجِي
Sus-caudals feathers (E)
من ريش ذنب الطائر مركزة بين الانفيك والزنكي .
منهم من قال اصل ذنب الطائر (Croupion) .

١٦٦٧٧ - زَمْجِيل ، لَحْسَانِيَّة ، زَرْبَقِي الْبَرِّ
Lachenalia (S). Lachenalia (F). Tiger lily (E).
Lachenalia (D). Lachenalia, Giglio leopardo (I).
جنس نباتات صلبية من فصيلة الزنبقيات . انواعه كثيرة
البلد . اوراقها صفيحة الشكل . ازهارها سنبلية او
عقودية التجميع يحسبها شراخ اجوف رفيع . اشهر
انواعه البزينة ما يلي .

١٦٦٧٨ - زَمْجِيل سَحْبِي
Lachenalia orchoides (S). Lachenalia-orchis (F).
نوع من الزمجيل . اوراقه صفيحة الشكل لحية التسج
حرفية الخطار المنزج || غمرانه يعلو من ١٠ الى
٢٥ سم . ازهارها سنبلية التجميع ، جرسية الشكل ،
عاطفة البتلات ، عطرية الرائحة ، يمشد اللون يعلوها
مواج ازرقة او صفراء اللون يعلوها مواج احمر || ازهاره
يدوم طولا شهر ايار .

١٦٦٧٩ - زَمْجِيل مُعْدَتِي
Lachenalia pendula (S). Lachenalia pendula (F).
نوع من الزمجيل . اوراقه صفيحة الشكل لحية التسج
تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ || غمرانه
يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم . ازهاره جرسية الشكل ،
عقودية التجميع . متدلية الاوتكار . تحمل صفان من
البتلات الخارجية اقصر من الداخلية لونها الى الحمرة .
اما الداخلية فتصلها بتنجسي اللون ومقصبا لصفية .
ضروبه عديدة تتميز بالوانها || ازهاره يستمر طولا
كانون الاول والثاني .

١٦٦٨٠ - زَمْجِيل يَاقُوتِي *
Lachenalia rubida (S). Lachenalia rubis (F).
نوع من الزمجيل . اوراقه سنبلية الشكل تطول من ١٢
الى ١٦ سم . وتعرض نحو ٣ || غمرانه يعلو من ١٥ الى
٢٥ سم . ازهاره جرسية الشكل عقودية التجميع تعد
من ٥ الى ١٥ زهرة لونها ياقوتي تلباتها الخارجية اقصر من
الداخلية || ازهاره يدوم طولا شهر ايلول .

١٦٦٨١ - زَمْصَاط *
Clasterosporium
جنس ظفور مجهرية من عمار الريديات وفضيسة
الحماضيات ، كنانة يضيئة ، مستطيلة ، مدورة ،
جانبية التقسيم ، تذكر حل حيث غليظ يقوم مقام
الحرب || انواعه قليلة ، اعرفها زحاط ابن وزحاط
الشندر .

١٦٦٨٢ - زَمْصَاط الْيُنْ *
Clasterosporium coffeanum
نظر مجهرى يركب اوراق البن فيزفيا || مظهره
الحماضي يقع صغرة مبرقة تملو النصل حل صفحته
الغليا . ثيلو صفراء اللون ، سمره الخطار تسع وتضرب
على السرة يملوها حل قليل الكثافة اشهر اللون يقدوما
الى الذوبان واليباس .

١٦٦٨٣ - زَمْصَاط الشَّوْكَر *
Clasterosporium putrefadens
نظر مجهرى يركب اوراق الشندر فيسبها || مظهره

Hétérogénéité (F). زَمَاع ، زَمَع
Heterogeneity (E).
هو علم الانجسام الجسوري والشكل الذي يعلو بين
عختلف افراد القرب الواحد في الموقع الواحد .

١٦٦٨٨ - زَمْصَاع *
Pleurotoma (S).
Pleurotoma (F). Pleurotoma (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الاربيل
وخصلة الكريزيات . انواعها المصاهرة المروقة عديدة
منتشرة في مغار بحار البلاد الحارة || اصنافها غروطة
محلقة ، دقيقة الاطباق ، مستطيلة الفتحات الميزابية
الاطراف ، حيلة الاوان والترايق والزفره . اسفاتها
قوية للمادة .

١٦٦٩٩ - زَمْالَة *
Bécillière (F).
Livestock trailer (E).
الزالة شاحنة معدة خصيصا لنقل البائم .

١٦٦٧٠ - زَمْام
Herbes hautes (F).
High herbs (E).
هو العشب المرتفع .

١٦٦٧١ - زَمْالَة
Invalidité, Incapacité de
travail (F). Disability, Incapacity for work (E).
صفة ما هو لاشري او غير مستوفي الشروط ، والصبر
والقدور وعلم الاحلية .

١٦٦٧٢ - زَمْت * ، اَبُر قَلَمُون *
Pyrrhocorax (S).
Chocard, Corbin chocard (F). Chough (E).
طائر من الغربان ريع الجفة طول نحو ٤٠ سم . ثوبه
اسود اللون اخضر المروج . منقاره اصفر ، عيناه صليتان ،
رساه وغالبه حر || موطنه حوض البحر المتوسط . يعيش
اسرابا كثيرة العدد . قوته الديدان والحشرات والحبوب
والتأثر اصعبا البنية || يذش حشه في صواعق الصغور
والمغاور . الاثن تحضن وسدا من ٤ الى ٥ بيضات
لونها الى الياض الابر يعلو ثوبه اصفر .

١٦٦٧٣ - زَمْت الْجُرْد * ، عَيْقِي *
Pyrrhocorax alpinus (S). Chocard des Alpes (F).
نوع من الزمعت وهو طائر من الغربان ريع الجفة طول نحو
٤٢ سم . ثوبه الى السواد الاخضر المروج . منقاره الى
الصغار الحظي . عيناه غروبيتان . رساه وغالبه الى
الحمرة الجردية || موطنه جبال سويس البحر الابيض المتوسط
يجبرها الى الحماض والوديان في فصل الشتاء ثم يعود اليها
في اواسط الربيع || يأنف الحياة الجماعية ، سره لا يقل
من ثلاثة ازواج ولا يفوق العشرة || قوته الحشرات والديدان
والتقريات والحبوب والتأثر ولا يصف من جيفة ايها
شامدا || يذش في صواعق الصغور وفي المغاور والاطلال .
انتاه تحضن وسدا من ٤ الى ٥ بيضات تبنيها حيلة
الرقعة اللامسوية التوزع .

١٦٦٧٤ - زَمْجِ هو الزباج ، اطليه .

١٦٦٧٥ - زَمْجِ الْمَاء * ، لَوْرُس ، لَوْرُس
Larus (S). Mouette, Golland (F). Gull (E).
جنس طير من رتبة كليات القدام طوليات الريش
الابيض . يطرن اسرابا فوق الماء فينتظن من السلك .
انواعه عديدة منها الجركة والحوري والدغبة والدنكة
والورنس والزروبي والسكي والسويدي والعصبة والورنس .



زَمَاع



زَمْت



زَمْت الْجُرْد



زَمَجِ الْمَاء



زَمْجِيل يَاقُوتِي



زَمْصَاط الشَّوْكَر

١٦٦٩٣ - زُمْكَه في الزراع ، راجع .

١٦٦٩٤ - زُمْكَه ، زُمْكِي ، قُظْن ، Croupion (F).
Parson's nose (E).
منبت ذنب الباطر .

١٦٦٩٥ - زُمْكِيَّات Haloragae, Cercodiales (S).
Haloragées, Cercodiales (F). Haloragae, Cercodiales (E).
فصيلة نباتية من بدايات الباقع ، ذوات القلتين ، مستطيلات القممات ، ملتصحات الجص : اجتماع ثمانية



زهر ، زمبر

اما انواعها فنحو ١٠٠ نباتاتها اشباب وينيات بعضها مثقبي وصال . ازهارها غشوية صغيرة القذ غطسلة الالوان .

١٦٦٩٦ - زُمْكَه Dessalage, Dessalage (F).
Removal of salt (E).
الزلمة ازالة الملوحة من الماء .

١٦٦٩٧ - زُمْكُلُوم Exobasidium
جنس فطور مجهرية من فصيلة الزولويات يتطفل على بعض النباتات الزينية فيؤذيها بعد ان يجعد اوراقها ويلوي غشيبها || اشهر انواعها واغرضها الزوليل الياباني .



زهر مجري

١٦٦٩٨ - زُمْكُلُوم ياباني Exobasidium japonicum, E. azaleae (S). Fausse-croque de l'azalée, Gallie foliaires de l'azalée (F).
Azalea galls (E). Ohrtappchenkrankheit der azaleen (D).
فطر مجري يتطفل على الجلسان (ازالية) فيؤذي ويجهت .



زوليل ياباني (١)

مظهره الخارجي يجهد في الاوراق وتشويه في البرام والنواهي التي يملونها القطر حيث تبدو كأنها منطقة باروسة خالية بيضاء اللون تكتنف بعض الورقيات تسحب تقلص الخشب وتحول فيها المواد النشوية الى سكرية . يكاثف بقطع الانصاف المصابة وينضج النبات بسائل يورده المركز ١٪ او يسهل الفواطر الحجرية .

١٦٦٩٩ - زُمْكُلُوميات Exobasidiaceae (S).
Exobasidiaceae (F). Exobasidiaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية من رتبة العماميات . اجناسها

وانواعها نحو ٦٠ منها فطور مرضية العمامات تتكون بين الخلايا النباتية هييفا قصيف البنية رزني الصميم ينشأ تحت الطبقة الادمية . ومنها فطور دوسية العمامات التشمية البسيطة المراثث الخيطية المتفصلة || اشهر اجناسها واغرضها زراعي الزوليل .

١٧٧٠٠ - زُمْسَ Period (F).
Période (F).
اسم شامل يقد على الوقت وهو عليه المقام . فالزمن المطلق وهو من اجبات المتلفعة . حالة استمرارية لا نهاية لها ولا علاقة لها بالمداد او الحركة || والزمن في العلوم الطبيعية كالفلك مقاس لا تعداد وجبدي لا علاقة له بالمكان || والزمن النسبي الذي يقاس بظاهرة طبيعية معينة كدوران الارض حول الشمس يدعى الزمن الشمسي || والزمن الحسلي هو الحقبة التي مروت بها الارض في تكونها .



زوليل ياباني (٢)

١٧٧٠١ - زُمْسَكة Fonte de neige (F).
Melting (E).
الزهملة سيلان الثلج بعد ذوبانه .

الخارجي بقع صغيرة مستديرة حطية اللون مراد الحمار يملونها خل لفي تركيب الاوراق تفسدها وقد تصيب المشائل تفسدها .

١٧٨٤٤ - زُمْر ، زُمْرِي ، زُمْرِيَّات Gasterosteus aculeatus (S). Epinoche commune (F).
Stickleback (E).
سمكة بحرية من فصيلة الزيريات . صغيرة القذ طولها

من ٣ الى ٥ سم . جسمها عديم القلوس . وعانها ثلاثية . تشبه بالوشكها النانئة المتفاوتة القذ ، ثلاث منها ظهريه وواحدة بطنية .

١٦٦٨٥ - زُمْرِيَّات زُمْرِيَّات Spinachia spinachia (S). Epinoche de mer (F).
Pride-back (E).
سمكة بحرية من فصيلة الزيريات . اصالتها بعض مناطق

الحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . تألفت معاشب المهاج والتفتاق . الاثني عند التراب زين التشرة ، من نوسان الى حزيان ، تسلم مع الذكر عشاً من اثث تحبكه بين النباتات البحرية وتلتصق بمادة غروية قفرزما الكلي . الذكر يحرس على السر ولا يغادر الش إلا بعد التلح || جسمها صغير القذ ، نحيل الجرم ، بطول من ١٣ الى ٢٠ سم . غطها مثل الاسطاة . فها سنن للكلين . جسمها عديم السيف باستثناء الجانبين المهيئين بنسور ، ٤ سرفقة . زعنفتها الظهرية خلفية الارتكاز يستيقها صف من المناس يد من ١٣ الى ١٥ . زعانفها المحورية صغيرة متضبة الشكل || غطها متوط الصف غير مرطوب فيه .

١٦٦٨٦ - زُمْرُوكَة ، فِسْكة Groupe (F).
Group, Clump (E).
مجموعة نباتية تنصف بذات الاشكال الخارجية او تتحل ببعض الصفات الجنبية المقررة .

١٦٦٨٧ - زُمْرُود Emeraude (F). Emerald (E).
نوع من الزيريد وهو حبير بلوري كريم لونه يراوح من الاغصير الى الازرق . غرو به عديدة الصغرا اقلها ازرقة واشدها لمعة .

١٦٦٨٨ - زُمْرُومُوكَة في المروسة ، اطليا .

١٦٦٨٩ - زُمْرِيَّات ، زُمْرِيَّات Gasterosteidae (S). Gasterostéidés (F). Gasterosteidae (E).
فصيلة اسماك بحرية ونهرية من السمكيات الشائكات الزعانف . اجناسها وانواعها ثلثة العدد جميعها دقيقة الاجسام الصغيرة . البحرية منها اكبر قدماً من النهرية .

١٦٦٩٠ - زُمْرُومُوكَة هو الارسيون ، اطليا .
١٦٦٩١ - زُمْع Guêpe mâle (F). Male wasp (E).
الزيرور لا ابرة له . وهو الذكر من الزناير .

١٦٦٩٢ - زُمْعة في البرعة بوجه عام . وهي الابنة التي تخرج منها النورة او المنقود الزمري . وهي حنة زائدة وراء القلف ، في كل قائمة زمستان . يقال فرس ولفاء الزرع . وهي ايضا الشجرة اللدانة في مؤخر رجل الشاة .

١٦٦٩٣ - زُمْعة في البرعة بوجه عام . وهي الابنة التي تخرج منها النورة او المنقود الزمري . وهي حنة زائدة وراء القلف ، في كل قائمة زمستان . يقال فرس ولفاء الزرع . وهي ايضا الشجرة اللدانة في مؤخر رجل الشاة .

١٧٧٠٨ - زَيْمَر هو الزر ، اطليه .

١٧٧٠٩ - زَيْمَر هو خرطال فوا ، اطليه .

١٧٧١٠ - زَيْمَر تَبَوِي هو الخرطال الريان ، اطليه .

١٧٧١١ - زَيْمَكَة Fabraea

جنس فلور مجهرية من السقديات وفضيلة الخشاريات يتميز ببدلته الصغيرة الحجم التي تتكون داخل الساق الأديم ثم تنجس نحو الخارج حيث تنفلق . بونها ثنائي الخلية . بونها متصالبة شفعية رباعية اشهر انواعه اللؤبية الثلاثة التالية .

١٧٧١٢ - زَيْمَكَة السَكْرَجَل * Fabraea maculata, Diplocarpon soraneri, Entomopeziza mespilii, Stigmates mespilii, Entomosporium maculatum (S).

نظر مجهري ركب اوراق السرفيل ويصيب الثآزر وقد يترى اوراق الاجناس والاكيليا || مظهره الخارجي على اوراق السرفيل ، بقع صغيرة شبه مستديرة تطرأ من ٢ الى ٣ سم . تبدو مبرقة على صفة التصلب العليا || تنكأثر نغم كامل النصل . لونها وردي ثم مرجاني ويعتني الى الجفوة المابقة || وهو حصل الاجناس بقع بقات اللون صفرة اللثة مستديرة مبرقة على كامل النصل || اما في الاكيليا فظهر بقعه براوح من ٣ الى ٤ سم . وهي مبرقة الزوايا مبرقة على كامل النصل ، تكثر قرب اطرافه || اضراره منوطه برطوبة التربة المرتفعة بالموايل الجوية المواتية || يكالغ باستعمال سائل بوردو المخلوط ٨٠٪ على مرتين ، المرة الاولى بعد تمام الاوراق واثنائية بعد الاول بثلاثة او اربعة اسابيع .

١٧٧١٣ - زَيْمَكَة التَسْرِين * Fabraea earliana, Mollisia earliana, Diplocarpon earliana, Marssonina poenae (S).

نظر مجهري ركب اوراق التسرين والشيلك فيطلبها . مظهره الخارجي بقع قرنية لا قياسية الشكل ولحمي تظفرها براوح من ٢ الى ٦ سم . ركب الاوراق كما تنتشر نغم كامل النصل حيث تشل الحركة النسبية . وقد ركب اهن الثآزر فيصيب مقولها || يكالغ مكاملة المنفعة باستعمال سائل بوردو المخلوط من ٨٠ الى ١٪

١٧٧١٤ - زَيْمَكَة الرُودَة * Fabraea rosae, Diplocarpon rosae, Marssonina rosae, Actinonema rosae (S).

نظر مجهري يصيب اوراق الرود فيطلبها ويسبب تقربها . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل ولحمي تقرب فيها الاستدارة لونها الى الجفوة المابقة ركب النصل على صفحه العليا تضط النسيج بعد الاخلايا وتسبب الاجناس الباك ما يؤدي الى رقت النود وعدم انتظام الدورة الحياتية الحولية || يكالغ باستعمال سائل بوردو المخلوط من ٨٠ الى ١٪ يضاف اليه الصابون المخلوط ١٠٪ او باستعمال الكبريت الميكروني الممزوج ١٠٪ زروينات الرصاص بمعدل ٩٠٪ كبريت ١٠٪ زروينات تشقير على الكبات من السبع الى الثمان مرات .

١٧٧١٥ - زَيْمَكَة ستاكيليدوم * Stachydidium

جنس فلور مجهرية من السقيات وفضيلة الطحيات . هيفه الكنديه متعصب ، متعصب ، عاكب اللون ، يحمل في اطرافه كتلته بسيطة ، شفافة ، بيضيه جشوية التجميع .

١٧٧٠٢ - زَيْمِج * Cenangium

جنس فلور مجهرية من الزيجيات وفضيلة الخشاريات . سداته ملونة حافتها الجانب تتكون وتنمو داخل الامة قسب انقلاتها . كتاته غصية ، بونها ثنائي التجميع ، اعليها للشكل ، بسيط التركيب ، وسيد الخلية ، شفاف اللون او حنطي || له نمطان مؤذيان زيج الحور وزيج الصنوبر .

١٧٧٠٣ - زَيْمِج الحُور * Cenangium populeum, Dothichiza populea (S).

نظر مجهري يصيب الحور في حالة نيطه وقد يمتد مظهره الخارجي بثور حنطية اللون تنشئ اللحاء تلخه يوشاح الى الصفرة فالبياض . ركب الاوراق في بائد الامر ثم ينتقل منها بمشيج الى الاثنان والاضغان والسوق || يكالغ بقتل الاضغان المبرقة وبتهوير الجروح وينفع للمثل يسال بوردو .

١٧٧٠٤ - زَيْمِج الصَّنَوْبَر * Cenangium ferrugineum, C. abietis, Dothichiza ferruginea (S).

نظر مجهري ركب الصنوبر فيؤذيه وقد يصيب موه . مظهره الخارجي احمرار يصيب هدب الصنوبر ، حل سد زامه الاول ، فيطوح به وينفلق بمشيج الى الاثنان والاضغان فمطها ويذيلها ثم يمت الشجرة به اذ يغضب غصنها بالسورة وبد ان يكسبه بعض الصلابة القاسية العالية .

١٧٧٠٥ - زَيْمِجِيَات * Cenangiaceae (F).

عازرة فلور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بسداتها القرصية ، المبرقة ، الخدية ، او الصلبة الجسم ، القائمة حل ونية لينة . تكالغها متشابهة مع كالكها التشعية . بونها مديد الاشكال غطفت التركيب وبيها هو وسيد الخلية في الزيج اذ به شفعي اخلايا مديد في النطر || له جلسان شويران ها الزيج والفر .

١٧٧٠٦ - زَيْمَكَة Epicoccum

جنس فلور مجهرية من عازرة الطحيات وفضيلة الكتيبات . ونيته شارة . جره الكنديه كرودية ، قصيرة اللون . كتاته طرفية كروية مابقة السورة . انزاه قليلة اللد والاذى جميعا رية تيش على حاء الاضغان اليابسة وحل المواد ثنائية للتملة .

١٧٧٠٧ - زَيْمَر ، مَرْوَسُ الدَنْشِ Erythrozepiza glitinea (S).

Erythrozepiza glitinea (S). Trompetzère, Moros (F). Trumpeter bullfinch (E). طائر من فصيلة الترسوريات . وهو من الصائير القواط التي تجرب البلاد في طلب الرزق . سره براوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ سم . صفور . اصنافه منه من الجزيرة الى افريقية الشرقية والبالية جميعها في اواخر الربيع ويؤد اليها في اواسط الخريف || طولها نحو ١٣ سم . منقار غروبي الشكل قصير اللثة . جناحه مستطيل ذلق . ذنب فارق . ثوبه الى الصبغة الرابية يطلمها مروج وردي ، يتميز بصياحه الحاد الذي يشبه التزير . يألف البحر والجبال ولا يبتعد عن الماء . ينش في تجاويف الصخور . اثناء تحفن من ٤ الى ٥ بيغات . قوته الحشرات والحوام والزور البرية .



زيج الحور



زيمكة السرفيل



زيمكة التسرين



زيمكة الرود

1٧٧٢ - زَنْكاري، حَيْرَمِي
Zoniiforme (F).
Belt-shaped (E).
نمت وصفي يملئ كل ما كان شكله كالزئزر أو الخزام.

1٧٧٢٦ - زَنْكَاط الصَّيْفِي*
Byturus aestivus (S).
Byturus d'été (F). Byturus aestivus (E).
حشرة وأشعة ثائرة من فصيلة الزناطيات ورتبة مفصليات الأرجل. موطنها بعض مناطق البلاد المحذلة الخمرية من الشرق الأدنى وأروبة. تألف البراري والاحراج البقلة والأودية الغظلية والمناطق الرطبة. خنافسها تعيش على مثل الزناط وطلعها. يرقاتها تعيش على التراب البرية وأخصها معص المصع || جسمها صغير اللد يطل من ٣ إلى ٤ م. ثوربا إلى السرة الصهباء يملؤها خل سحلي. رأسها مستدق الجسم. عينها صغيرتان بارزتان. زناطها صولجانيان حقيقان. ظهورها قليل الإحدايداب مستدير المخضر اللامع، غلافها كثيفتا الخمل والزيب. أرواغها خماسية الخمل، حجة الخال || لها جيل واحد في الخيل. تظهر الحشرة الجملدة في أوائل أيار وتعيش حتى أواخر تموز. تسرح في التراب وتبيت في الليل || البرية بطيئة النمو تطول مدة الإدراك التام نحو ٦ م. جسمها مبطط الجسم، مستطال القدم والرأس، مستدق المخضر، صفائي الأرواغ، سحلي اللون، أصر الرأس || طول الأكامل للدي يسمر من ١٢ إلى ١٥ يما نم في التربة ويتفشي ضمن صلجة سمكة لشقاء المركب من مواد عضوية ورايب.



نُصَيْمَةُ المَوْز

1٧٧٢٧ - زَنْكَاطِيَّات*
Byturidae, Tricixidae (S).
Byturidae, Tricixidae (F). Byturidae, Tricixidae (E).
فصيلة حشرات وأشعة وثائرة من رتبة غمديات الاجنحة || اجنحتها وأرواغها قليلة العدد. مهدا يشغل معظم مناطق البلاد المحذلة الحرارة والتمسرة نحو البادية. خنافسها تعيش على مثل الزناط. يرقاتها تنخر التراب وتطوّر داخلها || اجنحتها صغيرة اللد، مستطيلة الشكل، خلية التفشار، مستمرة الرؤوس، صولجاني الزناط المركبة من ١١ فصلة. أحمادها مستطيلة لاسعة. جرائها مستدقة. أرواغها خماسية الخمل تتميز بصغر البقلة الأليل والرقابة || أشهر اجناتها الزناط.

1٧٧٢٨ - زَنْكَاي، مَحْرُوف
Biceus (F).
Chamfered edge (E).
أداة تستعمل لسفر في الخشب وليريه.

1٧٧٢٩ - زَنْكَايَة
Kozleria (S). Kozleria (F).
جنس نباتات خشية، برية، مرموعة، حولية أو معمرة من فصيلة النجيليات. أنواعها المعروفة مدونة منها يتعد من الشرق الأوسط إلى بعض أسواق أروبة || جميعها خشية متوسطة الارتفاع. صفها شيل، مستطيل. ازهارها عتودي منتصب.



زَنْكَاط صَيفِي

1٧٧٣٠ - زَنْكَايَة*
Ceroasporella (S).
جنس طيور مجهرية من فصيلة الطليحيات. تنجيز مجرجه الكتيبة الدغلية القليلة الفروع. كنانة اسطوانية أو مخروطية الشكل، مدونة الطائر للمرضة || أنواعه كثيرة تركب أوراق كنبات. أرواغها باقم.

1٧٧٣١ - زَنْكَايَة الدَّرَاقِين*
Ceroasporella persica (S).
طير مجهرية يركب أوراق الدراق. ظهوره أخارسي

أنواعه قليلة تركب المواد الخشبية السائرة إلى الإغصان ومنها نوع يصيب الموز فيؤذيه.

1٧٧٣٦ - زَنْكَايَة المَوْز*
Stachylidium musae, S. theobromae (S). Bout de cigare de la banane, Maladie du bout de cigare (F).
فطر مجهرية يركب ثمار الموز في أقطانها وتشورها فيحطها ويشوها ويؤذيه لهاها بعد أن يقوده إلى الإغصان. وقد يمتري ثمار الكاكاو فيحطها || يكتمل ظهورها الخزان وينشع الموز المحفوظ بسائل شيرلان المحلول ٢٪. 1٧٧٣٧ - زَنْكَايَة
Dessèchement (F). Drying up (E).
هو تجفيف المواد العضوية.

1٧٧٣٨ - زَنْكَايَة
Nervula (F). Nervula (E).
الزئز الصب اللين الذي يجمع بين الأعصاب الرئيسية في وشن الحشرة. ويؤذيه أيضا رلة ج زئز وزئلات وزئان.

1٧٧٣٩ - زَنْكَايَة
Algucion caudal (F).
زناية المقرب: أربتها التي تلدج بها.

1٧٧٤٠ - زَنْكَايَاتِ البَشَر*
Crinoides (F).
Crinoides (E).
صف حيوانات بحرية من قسم الشوكيات. رتبه وصالته وأجناسه وأنواعه كثيرة العدد. معظمها من متحجرات الاحباب الغابرة. للماصر منها منتشر في جميع بحار العالم أخصها بحار الأقاليم الحارة والمستدلة الحرارة || اجناسها مركبة من قاعدة وساق وتويع وطباب. طليها مستدير الشكل يحمل في نغم الصفعة أعمليا الفتر والسرم. توحيها خماسية القواس المستطيلة ومنها خماسية جزء || جميعها في أبلر مهدا، مستقرة || تتحول بعد ذلك إلى حيوانات ثابتة في موطنها أو منتقلة تسرح حيث نشاء || أشهر فصائلها الماصرة القنطوطيات والحماسيات.

1٧٧٤١ - زَنْكَايَة مَكْرَدَرَة*
Empicoris vagabunda (S). Empicoris vagabond (F).
حشرة قاتصة من فصيلة الدرويات ورتبة غنطلات الاجنحة. جسمها صغير اللد، يطل نحو ٨ م. رأسها صغير الجسم. قصير الخمل، أصفر اللون. خطمها مستدق الطول. عينها بارزتان. زناطها مستطيلان || ميلقان. كويلان. أصفر اللون يملو خطمها طولي ومترقش أصر. يجنبها صغيرة مزوانة سمراء. يلقها وتلورها إلى الصغار النش. قائمتها الامسايتان مجوزتان قنقسي إلا أن اللور عادم الخمش || تسرح في التراب. تألف الخنايات ولما ساكن الريفية. يكثر وجوها قرب المياه القذرة لأنها تقنقن الحشرات التي تعيش في هذه البيئة.

1٧٧٤٢ - زَنْكَايَاتِيَّات*
Didymospora (S).
Didymosporites (F).
عارة فطور مجهرية من فصيلة الطليحيات. تتميز ببيوتها النائية الخلية. اجناسها سمكة: الباقوق، البلسولة، البوليتريسيوم، الخبل، الزفانغ، الكرذانة والمبارة.

1٧٧٤٣ - زَنْكَايَة
Tige florale (F). Stem (E).
عضو نباتي خشبي أو لني أو عشي منتصب الإزكاز مستطيل يحمل الزناط.

1٧٧٤٤ - زَنْكَايَة
ذباة صغيرة تكون في الحشوش ج زناير (السان).

١٧٣٩ - زَيْتَقِ أَحْمَر * ، زَيْتَقِ مَرْتَقُون

Lilium martagon (S). *lis martagon*, *Martagon* (F). *Martagon-lily*, *Turkish-cap lily* (E). *Martagonlilie*, *Turkenbündel* (D). *Giglio martagone*, *Martagone*, *Turbante* (I).

نوع من الزئبق يملو من ٦٠ إلى ١٣٠ سم. ساقه اسطوانية قوية مغطاة بالاجر. اوراقه اسطوانية النصل ضمية التجميع ، كثيرة العروق || ازهاره كروية الرائحة كثيرة العدد تطول من ٣ الى ٨ سم ، لونها الى الحمرة البغضوية الباقية يملوها تنميش جزوي . متاكها تبلغ ١٥ م. م. ظلها احمر || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٧٤٠ - زَيْتَقِ اِفْرِيقِيَّة هو القصر ، اسطبله .

١٧٤١ - زَيْتَقِ الْاَبْرَاج

هو البرجبة ، من الزنابق ، اسطبله .

١٧٤٢ - زَيْتَقِ الْاَسْتَاَنَةِ ، زَيْتَقِ خَلْفَقُوْتِه

Lilium chalcedonicum (S). *Lis de Constantinople* (F). نوع من الزئبق يملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ساقه زهاب . اوراقه كثيرة العدد صنية القند ثلاثية وخامسة العروق . ازهاره عادية الريف قليلة العدد ، من ٢ الى ٦ ، لونها ارجواني تطول من الناحل وقطة حمراء || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٧٤٣ - زَيْتَقِ الْاَنْد

Lilium andinum (S). *Lis des Andes* (F). نوع من الزئبق يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقه اسطوانية دقيقة . اوراقه خلية تطول من ٣ الى ٦ سم. وتعرض شراعه الزري يملو من ٥ الى ١٠ سم. || ازهاره قليلة الريف وألده تطول من ٨ الى ١٠ سم. لونها الى الصفار المشرب الحمرة . متاكها تبلغ ١٢ م. م. ظلها جزوي || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٤٤ - زَيْتَقِ الْبَيْتَر هو الزبير من الزنابق ، اسطبله .

١٧٤٥ - زَيْتَقِ الْفَيْرُوْج * ، ذَكْن الْحِيْمَة

Ophiopogon japonicus (S). *Ophiopogon japonicus*, *Muguet du Japon*, *Herbe aux turquoises* (F). *Japanese snake's beard* (E). *japanische schlangennbart* (D). *Erbe della turchine* (I). نوع من ذقن الحية الزئبقية . اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. نصلها جميل الخضر تقطعه خطوط بيض وسفر شراعه الزري يملو من ٥ الى ١٠ سم. || ازهاره صنية القند ليلكية اللون تطول نحو ٧ م. || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران . تمام صنية الشكل فيروزية اللون قوام من تموز الى كانون .

١٧٤٦ - زَيْتَقِ الْهَنَار

اسطبله لشكة .

١٧٤٧ - زَيْتَقِ الْوَادِي

هي اللقمة من الزنابق ، اسطبله .

١٧٤٨ - زَيْتَقِ الْبَانَان

Lilium japonicum (S). *Lis du Japon* (F). *Japanese lily* (E). نوع من الزئبق يملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. ساقه خلية اسطوانية . اوراقه متعاقبة تطول من ٧ الى ١٥ سم. وتعرض نحو ٢ عروق ثلاثة او خمسة || ازهاره صنية

يقع سر تلو لتصل على سفحه العليا يقابلها حل الصنعة السفلى يقع خلية ربادية اللون || ازهاره زهيدة قليلة الاذى لا تتسبب للكثافة .

١٧٣٧ - زينة القطن *

Cercospora gossypii (S).

فطر مجهرى يركب اوراق القطن ، ظهوره الخارجي يقع لاقياسه الشكل والحجم توهم النصل على سفحه العليا || ازهاره زهيدة لا تتسبب العتاية .

١٧٣٨ - زينة شالكة *

Cercospora herpotrichoides (S). *Champignon X* (F).

فطر مجهرى يقال ان اتحداه مع الصريان يقع اشد الاذى في بعض الزروع منها الحنطة والشبر || ظهوره الخارجي يقع لاقياسه تكثر فيها الاصابة تركب اتحاد الصفات ثم مقده الاصابات تقضي الارزاق والسوق وقد تسبب الزروع وتلاوي || يكافح مكافاة الصريان .

١٧٣٤ - زَيْتَان

هو الصيد من الذباب الساع ، اسطبله .

١٧٣٥ - زَيْتَان

Minioptaris (S). *Minioptaris* (F). جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . انواعه قليلة العدد . رؤوسها مخروطية ، فرائسها مقلوبة . آذانها متعقبة القند منفصلة . السنتها واجنحتها مستطيلة . اجسامها ريشية طويلا يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ م. يسلطها من ٣٢٠ الى ٤٠٠ م. ولذاتها من ٥٠ الى ٦٠ م. انواها بين الكهبة والسمة || موطنها الشرق الاوسط واروبة الجنوبية واوربية الشرقية والشمالية || طيراتها خفيفت سرع وشبه طيران الخفاف . تعيش ازواجا او جماعات قليلة العدد . تألف المخابر والكهوف واوقاف الصغور والبيوت الخفية . قوتها الحشرات والحوام .

١٧٣٦ - زَيْتَان

الزنابق : بقلة حارة حريفة مصفحة . من ابي حنيفة .

١٧٣٧ - زَيْتَقِ

Lilium (S). *Lis* (F). *Lily* (E). *Lilie* (D). *Giglio* (I).

جنس نباتات عشبية بصلية من فصيلة الزئبقيات . سوقها صنية مستقيمة موقرة . اوراقها القرصية والسوقية رمية النصل مستطيلة . ازهارها هامي الازنكار حقيقي التجميع . ازهارها كثيرة الحجم ، جميلة الشكل ، فواصة العرف ، متعددة الالوان || اصرف انواعه واشهرها ما يتبع .

١٧٣٨ - زَيْتَقِ اَبْيَض * ، اَزَاذ

Lilium candidum (S). *Lis candida*, *Lis blanc*, *Béton de St Joseph* (F). *White lily*, *Bourbon-lily*, *Madonna-lily* (E). *Weisse lillie*, *Marienlilie* (D). *Giglio bianco*, *G. della madona* (I).

ويعرف باسم زئبق مار يوسف. نوع من الزئبق يملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراقه عديدة متعاقبة تطول من ١٠ الى ١٩ سم. || ازهاره عديدة ، فواصة العرف ، تطول من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الالبيض يملو تيش احمر ورقية قرمزية . متاكها تبلغ ١٢ م. م. ظلها اصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .



زينة شالكة



زئبق ابيض



زئبق احمر



زئبق الفيروزج

الشكل كثيرة طول من ٦ إلى ١٢ سم. وتقرض من ١٢ إلى ٢٥ سم. || أنهارها طرية ، قليلة البدن ، مختلفة الألوان يكثر فيها الأصفر والبرتقالي والوردي والاريجاني || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٧ - زَيْتِي زَنْجَبِيلِي

هو الفتحولي نبات جميل الزهر ، اطله .



زيتي انمر

١٢٧٥٨ - زَيْتِي صِينِي *
Lilium sinicum (S).
Lis de Chine (F). Chinese lily (E).

نوع من الزئبق يملو من ٣٠ إلى ٩٠ سم. ساقه اسطوانية الشكل ، حراء اللون ، زباد . اوراته كثيرة البدن تطول من ٥ إلى ١٠ سم. وتقرض من ٨ إلى ١٢ سم. || أنهارها حادة البرق قليلة البدن لونها الى الصفار الكبريتي يملو تنديش لمود . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها عايق الصفار || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٩ - زَيْتِي طَرْكَلِيْسِي هو الزئبق ، اطله .



زيتي بيري

١٢٧٦٠ - زَيْتِي طَوِيل الزَّهَر *
Lilium longiflorum (S). Lis à longues fleurs (F).
White trumpet-lily (E). Königslilie (D). Giglio lungo (I).

نوع من الزئبق يملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه اسطوانية قوية . اوراته متعاقبة تطول من ٧ إلى ١٤ سم. وتقرض من ٨ إلى ١٥ سم. أنهارها طرية البرق تطول من ١٢ إلى ١٨ سم. لونها الى البياض اللطيف . متاكها تبلغ ٢ سم. طلها أصفر || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٦١ - زَيْتِي عَشَكِيْ

هي الحلة من الرنجات ، اطله .



زيتي صيني

١٢٧٦٢ - زَيْتِي خَمِي
Lilium speciosum (S).
Lis brilliant (F).

نوع من الزئبق يملو من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. اوراته حديدة متعاقبة تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. وتقرض من ٤ إلى ١٢ سم. || أنهارها طرية كثيرة البدن تطول من ٨ إلى ١٢ سم. لونها الى البياض المشج بالاحمر الخمر . متاكها تبلغ ٢٠ سم. طلها آخر || أنهارها يستمر من تموز إلى ايلول .

١٢٧٦٣ - زَيْتِي قَلْبِي الْوَرْدِي

Lilium cordifolium (S). Lis cordé, L. cordiforme (F).
نوع من الزئبق ينشئ الازرية الكلية . يملو من ٩٠ إلى ١٥٠ سم. اوراته مدققة مستعرضة قليلة الشكل نصلها جميل الخضار الزاوي تملو ماجة قرمزية || أنهارها بقية الشكل ، عقوبية التجميع تطول من ١٠ إلى ١٦ سم. لونها الى البياض الاخير تملو نمشة قرمزية من القاعل ونضراء من الخارج . متاكها تبلغ ٢ سم. طلها آخر . أنهارها يديم طول شهر تموز .



زيتي طويل الزهر

١٢٧٦٤ - زَيْتِي كَرُولِيَّة
Lilium carolinianum (S). Lis de la Caroline (F).

نوع من الزئبق يربط في الازرية الرلية . يملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. اوراته اهليلية الشكل نصلها مالمش البشرة عايق الخضار || حدد أنهارها يراوح من ١ إلى ٢٣ ، لونها الى الصفار البرتقالي || أنهارها صيفي .

العرف ، اقية الازنكار تطول من ١٠ إلى ١٨ سم. ياطلها ابيض ، ظاهرا ودي . متاكها تطول نحو ٢ سم. طلها آخر || أنهارها يستمر من تموز إلى آب .

١٢٧٤٩ - زَيْتِي أَنْمَر * ، زَيْتِي هَرْطَقْ

Lilium pardalinum (S). Lis panthère (F). Leopard-lily (E). Tigerlilie (D). Giglio pardo (I).

نوع من الزئبق يملو من ٩٠ إلى ١٨٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراته حديدة تطول من ١٠ إلى ١٨ سم. وتقرض من ٢٥ إلى ٥٠ سم. || أنهارها كثيرة البدن حادة البرق تطول من ٥ إلى ١٠ سم. لونها الى البرتقالي الزاوي تملو رقطة قرمزية كركشة الثمر . اسديتها مستطيلة . متاكها تبلغ ٢٠ سم. طلها جهوري || أنهارها يستمر من تموز إلى آب .

١٢٧٥٠ - زَيْتِي بَهْرِي *
Lilium tigrinum (S).
Lis tigré (F). Striped-lily (E).

نوع من الزئبق يملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. ساقه جهورية اقون زباد الحاء . اوراته متعاقبة متباعدة ، خاسية او سباحية البرق . تطول من ٧ إلى ١٥ سم. وتقرض من ٦ إلى ١٥ سم. || أنهارها حادة الرائحة كثيرة البدن تطول من ٥ إلى ١٠ سم. لونها الى البرتقالي الباهي يملو تخطيط جهوري اسفح المراج || أنهارها يستمر من تموز إلى آب .

١٢٧٥١ - زَيْتِي بَرَوِي
Lilium browni (S).
Lis de Brown (F).

نوع من الزئبق يملو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراته متعاقبة تطول من ١٢ إلى ١٧ سم. نصلها عايق الخضار يملو موج آخر || أنهارها حديدة متدلية تطول من ٨ إلى ١٢ سم. لونها الى البياض اللطيف تملو رقطة خطية الاطار بنفسية المحور . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها جهوري || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٢ - زَيْتِي بَرْتُقَالِي
Lilium croceum (S).
Lis orangé, Lis safrané (F).

نوع من الزئبق ينشئ الازرية الكلية . يملو من ٥٠ إلى ١٢٥ سم. ساقه ضعدة زباد . اوراته متعاقبة مستطيلة . أنهارها حادة البرق كثيرة البدن تطول من ٧ إلى ١٢ سم. لونها الى الصفار البرتقالي . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها آخر || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٣ - زَيْتِي بَرْوِي

هو البرجية من الزئبق ، اطله .

١٢٧٥٤ - زَيْتِي بَهْمِي
Lilium superbum (S).
Lis superbe (F).

نوع من الزئبق يربط في الملقاق الرلية . يملو من ٩٠ إلى ١٨٠ سم. ساقه قوية جامدة . اوراته سنائية التصل ، مدبة || أنهارها كثيرة البدن حادة البرق لونها الى البرتقالي تملو نمشة جهورية || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٥ - زَيْتِي عِلْدَدُوْهُ هو زئبق الاسنانة ، اطله .

١٢٧٥٦ - زَيْتِي رَشِيْقِي
Lilium elegans (S).
Lis élégant, L. de Thunberg (F).

نوع من الزئبق ضرابه كثيرة البدن تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها مستدلة الشانة عنبدة . اوراتها اهليلية

Liliaceae (S).

١٧٧٧٣ - زَيْبُونِيَّات

Liliacées (F). Liliaceae (E).

نفسيلة نباتية من وحدات الشفلة اجناسها وانواعها كثيرة
المند منها الزنبق والبصل والثوم والجلينج الخ .

١٧٧٧٤ - زَيْبُونِيَّة هي السحاح ، اطبله .

١٧٧٧٥ - زَيْبُول ، زَيْبُول

Pénis des insectes (F). Penis of insects (E).

الزنبيل قضيب ذكر الحشرات على اختلاف فصائلها .

١٧٧٧٦ - زَيْبُول هو الزنبق ، اطبله .

١٧٧٧٧ - زَيْبُور

الزيبور : شجرة عطرية في طول الدالية ولا عرض لها .
وطيها مثل ورق الجوز في منظره وريحه . وطا نور
مثل نور المشر ابيض مشرب وطا حل مثل الزيتون سواء .
فاذا نضج اشده سواده وسلا جدا يأكله الناس كالزبيب
وطا عصمة كعصمة البنداب وهي تصبغ اللحم كا يصبه
الفرصاد . تدرس غرسا . واحداها زنبورة وزنبارة
وزنبورة (السان) .

١٧٧٧٨ - زَيْبُور Vespas (S). Guêpe (F). Wasp (E).

جنس حشرات من فصيلة الزيبوريات . انواعها عديدة
جميعها جارية ، باذلة ومفترسة . اعرافها واشهرها
ما يتبع .

١٧٧٧٩ - زَيْبُور جرمانِي Vespas germanica (S). *

Guêpe germanique (F). German wasp (E). Deutsche waspe (D).

نوع من الزيبور الواسع الانتشار . ذكره يطول من ١٣
الى ١٥ سم . انتاه من ١٦ الى ٢٠ وعاملته من ٩ الى
١٤ سم . يقيم عشاه في التربة ، يبنيه بالواد الخشبية
المتحلة التي تبو كالورق ١٥ سم . ظاهرها ابيض اللون
الى ١٠٠٠٠٠ زيبور . قوته البار والقوم وما يقتنصه
من حشرات .

١٧٧٨٠ - زَيْبُور شائع * ، زَيْبُور عادي

Vaspas vulgaris (S). Guêpe commune (F). Common wasp (E). Gemeine waspe (D).

نوع من الزيبور البائد ، الجارس ، الصغير القد ، الصم
الانتشار، ذكره يطول من ١٤ الى ١٥ سم . انتاه من
١٦ الى ٢٠ وعاملته من ١٥ الى ١٠ سم . يقيم عشاه
في التربة ويمل الاشجار والحيطان يبنيه بالواد الخشبية
المتحلة . ثوله يد اقل من مئة . لسته مظلة .

١٧٧٨١ - زَيْبُور شرقي Vaspas orientalis (S).

Guêpe orientale (F).

ويعدى الزيبور الاجر . نوع من الزيبور الشائع في
الشرق الاوسط . ذكره يطول من ٢٠ الى ٢٤ سم . انتاه
من ٢٥ الى ٣٢ وعاملته من ١٦ الى ٢٠ . ثوله الى
الحشرة الصفراء . رأسه وبشرته اشد سمة من بطة . اجسته
نارية . يقيم عشاه في اي مكان كان . وهو مفترس ،
بادن وجارس ، يقتنص النحل ويؤرض البار السكرية
عند ادراكها اخضاها المنب والتين والبسر .

١٧٧٨٢ - زَيْبُور صغير * ، دَبَر ، زَرْقَطَة ،

نَسَوَة

Pollistes gallicus (S).

Polliste, Guêpe française (F).

نوع من الزيبور الصغير القد . ذكره يطول من ١٣ الى

١٧٧٨٥ - زَيْبُونِيَّات Liliun canadense (S).

Lis du Canada (F). Canadian lily (E).

نوع من الزنبق يربف في الاربة المتوسطة الانسلاج
والرطوبة . يطو من ٥٠ الى ١٣٠ سم . ساقه قوية .
اوراقه قليلة المند نصلها جامد التسج ، خلي الصفحة
السفل ، خامي او سباعي المروق . يطول من ٧ الى
١٠ سم . ويبرض من ١٥ الى ٢٠ سم . انتاه
متحيلة قليلة المروق . لونها الى الوردي تملو مشة
قمرية . متناكها تطول نحو ١٠ سم . ظلمها اجر .
انزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٧٦٦ - زَيْبُونِيَّات Liliun auratum (S).

Lis doré du Japon (F).

نوع من الزنبق يطو من ٩٠ الى ١٨٠ سم . ساقه قوية
اوراقه متحيلة متجانسة تطول من ١٥ الى
٢٢ سم . وتبرض من ٢ الى ٣ سم . انتاه حطرية
المروق كثيرة المند تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . لونها ابيض
البياض اللامعي يملو من الداخل تنسج ارجواني
ويطو شارط ذهبي اللون يقيم البتلة الى تسين . متناكها
تبلغ ٢ سم . ظلمها اجر ١١ شروبه وماله عديلة
تختلط بالوانها التي يكثر فيها او يقل الاصفر اللامعي .
انزهاره يستمر طوال الصيف .

١٧٧٦٧ - زَيْبُونِيَّات مرْتَعُون

ويكتب مرتاعون . هو الزنبق الاجر ، اطبله .

١٧٧٦٨ - زَيْبُونِيَّات مرْتَعُون هو الزنبق الاجر ، اطبله .

١٧٧٦٩ - زَيْبُونِيَّات ملكِي Liliun regale (S).

Lis royal (F).

نوع من الزنبق يملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقه حليية
الماء عادمة الاوراق حتى اقزام الثاني ١١ انزهار حطرية
كثيرة المند تطول نحو ١٥ سم . ظاهرها ابيض اللون
يملو توشع وردي . باطنها الى الصفار الذهبي يملو
مواج اسفل . متناكها تبلغ ١٥ سم . ظلمها ذهبي اللون .
انزهاره يستمر من تموز الى آب .

١٧٧٧٠ - زَيْبُونِيَّات هنْري Liliun henryi (S).

Lis de Henry (F).

نوع من الزنبق يملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه قوية
زياه . اوراقه متعة تطول نحو ١٥ سم . وتبرض نحو ٣
مرقوا عديلة نصلها خلي الصفحة السفل ١١ انزهار
عديلة تطول من ٦ الى ٩ سم . لونها الى البرتقالي تملو
نخسة سواده . متناكها تبلغ ٨ سم . ظلمها اصفر . انزهاره
يستمر من آب الى ايلول .

١٧٧٧١ - زَيْبُونِيَّات واشْتَنْز Liliun washingtonianum (S).

Lis de Washington (F).

نوع من الزنبق يملو من ٩٠ الى ١٨٠ سم . ساقه قوية
جامدة . اوراقه السفل خسية التسج . سداسية المند
او اكثر . اما البتلة فتتألف ١١ انزهار حطرية كثيرة
المند تطول من ٤ الى ٨ سم . لونها الى البياض الموشج
بالقرمزي . متناكها تبلغ ١٢ سم . ظلمها اصفر .
شروبه عديلة منها الوردي والابيض والقرمزي اللاميق .
انزهاره يستمر من تموز الى آب .

١٧٧٧٢ - زَيْبُونِيَّات Lilial (F). Lilied (E).

نمت وصني يطلق على ما هو شبيه بالزنبق كفوك يياش
زيتني .



زيبور جرمانِي



زيبور شائع



زيبور صغير



زيبور كبير



زينة البطاطا



زُنة النِّل



زُنة الزُّرَيْتُون



زُنة الشَّوْطَر



زُنة الصُّرْبَا



زُنة القَرْوَل

مظهره الخارجي يقع بيضية الشكل مبشرة أو كثيفة التجميع ، قطرها يراوح من ٦ الى ١٠ م. لونها زيتوني ، عموماً أبيض ، أطرافها اسمر ، تركب النصل فتؤذيه وتغيب الأوراق وتفسدها ٥ يتكاثر باستعمال سائل يورود أو بعض الفواطير المركزة على المركبات السبائية .

١٢٧٩١ - زُنة الجُنْجُل ٥

Cercospora cantuariensis (S).

نظر مجهرى يتطفل على أوراق الجنبيل ٥ مظهره الخارجي يقع مستديرة بمادة اللون ، جوية الاطراف تركب النصل على صفحتيها العليا يقابلها على السفلى يقع خلية، حنطية، زائجة الموضع ٥ انحراف زائجة لا تستوجب المكافحة .

١٢٧٩٢ - زُنة الزُّرَيْتُون ٥

Cercospora didosporioides (S).

نظر مجهرى يتطفل على أوراق الزُّرَيْتُون ٥ مظهره الخارجي يقع فسيحة مهمة الحديد مظهره اللون ، يفسده الموضع تسبب ذبول الأوراق وإحمرارها .

١٢٧٩٣ - زُنة الشَّوْطَر ٥

Cercospora beticola (S). *Cercosporiose de la betterave* (F). *Leaf spot of beet* (E).

نظر مجهرى يتطفل على أوراق الشَّوْطَر في المناطق الرطبة . مظهره الخارجي يقع كثيرة العدد ، لا يقاسية الشكل والحجم ، مبشرة على صفحة النصل ، لونها الى البصرة يطولها حنار اخر . تقضي على البصرة فتطرحها ثم تمتطعها ويشتاق خيل التركيب فني اللون يسير بها الى البطل . انحرافه قد تكون باهقة لانه يؤثر على نسبة المواد السكرية . يتكاثر باستعمال اكيلكوريد للنحاس عيار ٥٠٪ على الشكل الآتي :

- ١٣ جزوا اكيلكوريد النحاس .
- ١٢ جزوا دقيق .
- ٧٥ جزوا تلك .

يستعمل تغذية على النبات بمعدل ٤ كلو لترم الواحد .

١٢٧٩٤ - زُنة الصُّوْبَا ٥ ٥ زُنة دِيَاو ٥

Cercospora ditau (S).

نظر مجهرى يركب أوراق الصُّوْبَا ويؤذي النبات . مظهره الخارجي يقع صغرية كثيرة العدد. لونها الى الجورة تركب النصل فتؤذي ثم يورع مساحت ٥ يتكاثر بظهور البذار ويستعمل احد الفواطير الحديثة المركزة على المركبات السبائية .

١٢٧٩٥ - زُنة القَرْوَل ٥

Cercospora fabae, C. personata (S).

نظر مجهرى يتطفل على سوق وأوراق القَرْوَل ٥ مظهره الخارجي يقع لا يقاسية الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ٧ م. تركب الاوراق والسوق. يفسد سمره اللون متطعها ٥ حالات متناوبة دقيقة الحنار لوناً الى البصرة . تقضي على الاوراق وتبطل النبات ٥ يتكاثر بظهور البذار بحلول الفورولين وينفخ نباتات الموسوعة بسائل يورود الحنار من ١- الى ١٠٪ .

١٢٧٩٦ - زُنة القَرْنِيَّات ٥

نظر مجهرى يتطفل على أوراق سوسق بعض القرنيات انحصار الفضة والذئبل والحشوقة ٥ مظهره الخارجي يقع مستديرة او بيضية الشكل ، لونها الى البصرة لها حالات متناوبة صفر الحنار تطرح بالنج الحنارة فني الى النبات ونمو .

١٦ م. انتاه من ١٥ الى ١٧ وحاملته من ١٠ الى ١٤ . ثوبه اسود اللون يطول تفتح اصفر . حشاه صغر القند ، قمرى الشكل ، يقبسه على الجنيات والاشجار البقلة يركزه في دهامة رسيدة قصيرة . قوله لا يمد اكثر من ٥٠ م. قوة الال السكرية والذئبل وبض الحشرات والسقم .

١٢٧٩٣ - زُيُور كَبِير ٥ دِيُور

Vespa crabro (S). *Frelon, Guêpe frelon* (F). *Hornet* (E).

نوع من الزُّيُور ، كبير القند واسع الانتشار . ذكره يطول من ٢١ الى ٢٧ م. انتاه من ٢٦ الى ٥٥ وحاملته من ٢٥ م. رأسه اصهب اللون . جشته الى السواد الموضع بالسرعة . زبانه وارسله حر . حشاه لاصق قمرى يقبسه في اي مكان كان . ثوبه لا يقاسي العدد لكنه لا يقل عن ٥٠ م. ولا يفوق ١٠٠٠ م. وهو من الزناير البقعة الغرسية البائدة الجارسة يلسع الانسان ان ضايقه ولسنته مؤلمة مؤذية .

١٢٧٩٤ - زُيُورِيَّات ٥

Vespidæ (S). *Vespidæ* (F). *Vespen, Faltenwespen, Papierwespen* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحسرة . اجتماعها وانواعها عديدة مظهرها من الحشرات الاثرية النظام الجامعي البعشي . فيها الذكر والانيث وبالمادة الحنث . ثوب اعشاشها من الاوراق والالياف الخشبية المصروفة فتقضيها في التربة وعلى الحيطان وبين غشائيات الصنوبر وفي تجاريف الاشجار وطليها ٥ جميعها مفترسة بائدة وجارية .

١٢٧٩٥ - زُيُورِيَّات ٥ هو ليسون اضاليا ، اطليه .

١٢٧٩٦ - زُيُورِيَّات ٥

جنس نباتات طيبة معمرة من فصيلة الساجيات انواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والشتلات منهاها المناطق الحارة والاشترائية ، او رافها منطقة متعاقبة طيبة او رحيمة النصل . انماها علفية التجميع ناجية . جنودها طيبة مقوية .

١٢٧٩٧ - زُنة ٥ صفة اثرارة المروية قليلا .

١٢٧٩٨ - زُنة ٥

Cercospora جنس فطور مجهرية من الريديات وفصيلة الفصليات . جريه الكنديية مستطيلة الشكل ، سمره اللون ، فسيحة الانتشار ، قوسية الانكناز . كذلكه مستطيلة قاعدية او جانبية الانتشار ، مؤثرة كثيرة الاقسام التسمية البند ٥ انواعه عديدة ، اعرفها واشهرها ما يتبع .

١٢٧٩٩ - زُنة البطاطا ٥

Cercospora concors (S). *Cercosporiose de la pomme de terre* (F). *Leaf spot of potato* (E).

نظر مجهرى يتطفل على اوراق البطاطا ٥ مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٤ م. لونها الى البصرة تملوها نقط سود تركب الاوراق على صفحتيها فتؤذيها وتؤذي بالانتاج حشاش يراوح قدرها من ٢ الى ٢٥ ٪ . يتكاثر باستعمال الفواطير المركزة على الكابريت والنحاس .

١٢٧٩٠ - زُنة البُن ٥

Cercospora coffeicola (S). *Maladie des yeux bruns du caféier* (F).

نظر مجهرى يتطفل على اوراق البُن فيؤذيها ويشوه الثمار .

تراكيب بعض التوابل والمستحضرات الصحية الشرقية . ويستخرج منها شرابات شائعة الاستعمال .

١٧٨٠٧ - زَنْجَبِيل مِيْمَا *Zingiber mioga* (S).
Gingembre mioga (F).

نوع من الزنجبيل يُزرع في تايوان . يملو نحو ١٠٠ سم . أزهاره سنائية كبيرة القد . سبلته الزهرية كثيفة التجميع . أزهاره بيضاء شريطها صفر || مهدد الإلحاح وهو من النباتات البرية التي تعيش وتجدد في كل تربة وموقع ومكان .

١٧٨٠٨ - زَنْجَبِيلِيَّات *Zingiberaceae* (S).
Zingibéracées (F). *Zingiberaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقة الواحدة || اجناسها وأنواعها عديدة جميعها جدمورية مهددا المناطق الاسيوية الحارة || أشهرها الزنجبيل والخلنجيان والكرشم والحال والقرنياد .

١٧٨٠٩ - زَنْجُفَر * هو الزريقون ، اطليه .

١٧٨١٠ - زَنْجُجُور * سَمَك الْكَرَاكِي *Esox* (S). *Esoce*, *Brochet* (F). *Pike* (E).

جنس اسماك نهري من فصيلة الزنجوريات . انواعه هـ جميعها نهمة . مستطيلة الشكل ، واسعة الفخذ ، دقيقة الخطم المفلطح ، حادة الاسنان القوية . طولها يراوح من ٥٥ الى ١٠٠ سم . وزنها من ٥ الى ٢٥ كيلو . اكلها الى الريدة الرصاصية تنقب مع اقترابها من ثيج الطهر . جوارثها مجزأة بالايض . يطولها الى الصحة . لحها حادي او دون الوسط .

١٧٨١١ - زَنْجُجُورِيَّات *Esocidae* (S).
Esocidés (F). *Esocidae* (E).

فصيلة اسماك نهري من مفتوحات الفئات . اجناسها وأنواعها عديدة معظمها من اسماك المناطق الباردة ، جميعها نهمة مستطيلة الاجسام ، مفلطحة الرؤوس والاسنم ، قوية الاسنان الحادة || أشهر اجناسها الزنجبور .

١٧٨١٢ - زَنْدَلْ

زندت البقرة والثانة زندا : اخبرجت رحها عند الولادة .

١٧٨١٣ - زَنْدَكْ ، زَنْدَكَة *Rachis* (F). *Stalk* (E).

محور السبلة والحزيرة والسفوف والارواق المركبة وغيرها .

١٧٨١٤ - زَنْدَك الْعَبْدَ هو الكارلين الشائع ، اطليه .

١٧٨١٥ - زَنْدَك بَيْسَلْ ، زَنْدَك لَيْل *Elephant (grand)* (F). *Elephant (great)* (E).

الفيل الكبير الجنت .

١٧٨١٦ - زَنْدَكْدَلْ * *Cistudo* (S). *Cistude* (F).

جنس حيوانات زحافة مفترسة من السلاحيه وفصيلة الحسبيات . تعيش في المياه العذبة . تألف البعيريات والانهير والمناقم || تتميز بان حافة ذيلها لا تحكم أطواق حل الجسم . قوتها الحشرات والرخسويات والاسماك الصغيرة والصفاغيد || لها ثومان فقط الزندل الادرع وزندل المرقم .

١٧٨١٧ - زَنْدَكْدَلْ أَرْدَغ * *Cistudo lutaria* (S).
Cistude boeuf (F).

نوع من الزندل . موطنها بيند من الشرق الاقصى الى اوروبا . تألف المناقم زحافات الانهير والبعيريات || جسمها يطول

١٧٧٩٧ - زَنْدَك الْكَرْمَةِ * *Cercospora vitis* (S).

فطر مجهري عيم الانتشار يتطفل على اوراق الكرمة . مظهره الخارجي يقع مستديرة حنطية اللون ظاهرا يراوح من ٢ الى ١٠ م . تركيب التصل على صفحته || اضراره لا تسمى الاوراق ولا تتسبب المكائفة الخاصة .

١٧٧٩٨ - زَنْدَك الْكِشْفِش * *Cercospora marginalis* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الكشفش . مظهره الخارجي يقع مستديرة او مقرنة الزوايا ، سمراء اللون ثم رمادية تركب التصل دون ان تؤذي .



زَنَّة الْكَرْمَةِ

١٧٧٩٩ - زَنْدَك الْوَرْد * *Cercospora circumscissa* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الورد والخرج والدارقن . مظهره الخارجي يقع مستديرة سمراء اللون فتوح بالتسج المتخامرة فتسبب يباسها وانحسارها || اضراره قليلة . ينشط في المناطق الساحلية التي يشهها الضباب .

١٧٨٠٠ - زَنْدَك الْوَرْد * *Cercospora rosicola* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الورد . مظهره الخارجي يقع مستديرة ملهه اللون تركب التصل على احدى صفحته اضراره لا تسمى التشويه .

١٧٨٠١ - زَنْشُكاري *Dysentaria* (F). *Dysentery* (E).

مرض معد يحدث عوارضه فرط الانطلاق البطن . سببه فضيات او تفاحات .

١٧٨٠٢ - زَنْشُكَرْ ، زَنْشُكَار *Verdet* (F).
Verdigris (E).

اسم شامل يطلق على مختلف استنسل النحاس اضراره اللون . محاليله تستعمل في مداواة ومكافئة بعض الامراض الفطرية .

١٧٨٠٣ - زَنْجَبِيل *Zingiber* (S).

جنس نباتات عشبية جدمورية مسمرة من فصيلة الزنجبيليات . انواعه عديدة منها البرية والعلبية والزراعية . جذاميرها قرنية الشكل مقعده . سوقها مرققة تشبه سوق الكتان . اوراقها حاشية متناحية سنائية التصل . اذرعها سبلية التجميع حامية الاوتكنا يحيطها شراخ لبي التركيب سرقي الاوراق || أشهر انواعها ما يلي .

١٧٨٠٤ - زَنْجَبِيل الْكِلَاب هو لفلل الماء ، اطليه .

١٧٨٠٥ - زَنْجَبِيل شَمِي *Zingiber officinale*, *Amomum zingiber* (S). *Gingembre officinal*, *Amome des Indes* (F). *Indian ginger*, *Common ginger* (E). *Gingiber*, *Ingwer* (D). *Zenzero*, *Zenzavero*, *Pepe zenzero* (I).

١٧٨٠٦ - زَنْجَبِيل مَقْرُونِي * *Zingiber officinale*, *Amomum zingiber* (S). *Gingembre officinal*, *Amome des Indes* (F). *Indian ginger*, *Common ginger* (E). *Gingiber*, *Ingwer* (D). *Zenzero*, *Zenzavero*, *Pepe zenzero* (I).

نوع من الزنجبيل يُزرع لاستهلاك الطبي والعصامي . يملو نحو ١٥٠ سم . أزهاره سنائية متاجبة التصل . سبلته الزهرية لينة . اذعان صفر يتلتها برتقالية منشفة بالايض || جذاميره صارية العرف ، لاذعة الطعم ، تحوي زيوت طيارة وواد نشوية وغروية مخلفة . وطري مقرية القلب ، مرققة ، تنشط الباء وتذكى . تنقب من الارياح وعسر الهضم وتحمب للنصر كما أنها تدخل



زنجبور



زَنْدَلْ أَرْدَغ

الاشجار الحرجية واعصها الصنوبريات || اشهر انواعه
زئينة اللاريس .

١٧٨٢٨ - زَنْدُكُلْ اللاريس *

*Dasyscypha wilkomnil. Trichoscypha wil. (S).
Chancer du noëze, C. du pin sylvestre (F). Cancer
of larch (E). Lärchenkrebs (D).*

فطر مجهرى يركب افئاد واعصان اللاريس فيعطيا
ويولدوا . مظهره الخارجى لطخة ترصية مردية الشكل
طويلا يراوح من ١ الى ٤٠ سم . تركب القشرة فتصلها
وتشققها وتؤدي القسم الذي يعلوها فتخلل اوراقه وتسقط .
وهو يميل ذات الشيء في الصنوبر البري || يكافح
بتفريده الاشجار الكثيفة لان المنفعة ترتكز على النمو
الذي يحول دون انتشار هذا الفرم .

١٧٨٢٩ - زَنْدُكُلْ هو الرجلة او السويق .

١٧٨٣٠ - زَنْدُكُلْ

Puccinistrum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يتميز
بدهاماته الجولية الوثيرة ، السطيلة ، المغشية انشاء ،
الشفعية الانقسام ، الثنائية او الرباعية الاشعبة .
انواعه قليلة وانسارها كذلك ، تنطلق على اعداب التنوب
ويركب التصل على صفحته السفلى فيسي الى سير النمو
الطبيعي دون ان يفتقر الى الطب .

١٧٨٣١ - زَنْدُكُلْ

Cercosporina

جنس فطور مجهرية من الرابديات وفصيلة الطلعيات .
حرجه الكثيرة سمراء اللون ، اسطوانية الشكل ، قرصية
الانتساب قوية الانتشار ، كنانة مسطيلة ، طرفية
او جانبية الانتساب ، مثقوبة ، شفعية الانقسام .
انواعه عديدة قليلة الاذى معظمها امريكية او صينية
الهد .

١٧٨٣٢ - زَهْدَاك

Pernébia (F). Permeable (E).

ارض زهدا : لا تسيل الا من مطر كثير .

١٧٨٣٣ - زَهَار

Flauriste (F). Floriz (E).

من تتامل بسنة الازهار او يهبها .

١٧٨٣٤ - زَهْدَم *

*Falco eleonora (S).
Faucon éléonora (F).*

طائر من الكولج وفصيلة الصقريات . صغير الجثة طوله
نحو ٣٧ سم . ابر الصدر والرجلين اسمر الطاهر والسفلى
غنيش الجناح والظل قوته الجناح والرجل على اختلاف
انواعها . وهو من القواطع محبوب كمال بلاد حوض البحر
المحيط . يألف مجاري الماء والشلوط البحرية .

١٧٨٣٥ - زَهْر التنج

شجرة تزيينية تسمى زرباطك ، اطلبه .

١٧٨٣٦ - زَهْر العنبر

هو الزرهون ، اطلبه .

١٧٨٣٧ - زَهْر العفاه

هو اليبسة ، اطلبه .

١٧٨٣٨ - زَهْر الكبريت

*Flour de soufre (F).
Flowers of sulphur (E).*

مسوق الكبريت لتمام يستعمل في الزراعة لمكافحة
بعض الامراض الفطرية اعصها الامداد .

نحو ٣٠ سم . ذبلها يضيي الشكل ، مستطيل الاسطيداب .
نوعها الى السرة المنقطة والسجبة بالاصفر . رأسها مستطيل
الجرم . ذبلها قليل الشفاعة ، دقيق الطرف ، يطول نحو
٥ سم . || لحما كامن الصف مأكول في بعض بلاد
اروية .

١٧٨١٨ - زَنْدُكُلْ مُكْرَم *

*Cistudo dentata (S).
Cistude dentale (F).*

نوع من الزندل . موطنها بعض مناطق اهد والبلاد المجاورة .
تألف المنافع والادوار والبيجرات || جسمها يطول نحو
٢٧ سم . ذبلها يضيي الشكل ، مستطيل الاسطيداب مخرم
الحافة . ثوبها الى الخضار الاسمر يطول تنقيط اثير واصفر .
رأسها مستطيل الجرم . ذبلها منقطة الشفاعة ، مستعرض
الطرف يضيي نحو ٤ سم . || لحما كامن الصف ،
مأكول من بعض القبائل .

١٧٨١٩ - زَنْدِيَاَت العيون

*Podophthalmos (F).
Podophthalmos (E).*

رئة من الفشريات ليات الصدف تشمل عدة فصائل
تجسمها ثلاث مراتب : مشقوقات الارجل وبزويجات
الارجل وعشاريات الارجل .

١٧٨٢٠ - زَنْدُكُلْ

هي الاندروخت ، اطلبها .

١٧٨٢١ - زَنْدُكُلْ

*Zannichellia (S).
Zannichellia (F).*

جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة عرائس الماء .
انواعه المروفة قليلة العدد ، اصلها بعض مناطق البلاد
المعتدلة الحرارة . تنبت في المنافع وفي اغصان مجاري الماء ||
اوراقها شبيهة ، ثلاثية ، نصلها غروية الشكل . ازهارها
محورية الانتساب ، وحيدة الشق || اعرف انواعه زَنْدُكُلْ
المشمعي (Z. palustris) .

١٧٨٢٢ - زَنْطِين و زَنْطُجِين

Xanthéine, Xanthogène (F).

مادة واثنية مبلولة في سطر الازهار ، لونها الى الصفار
الاصفر ، لا تبلور ولا تزال مجهولة التركيب .

١٧٨٢٣ - زَنْدُكُلْ هو الخاصين ، اطلبه .

١٧٨٢٤ - زَنْدُكُلْ هي الافة ، اطلبها .

١٧٨٢٥ - زَنْدُكُلْ

الشجرة لا ورق لها كاهها رئة الشاة (البان) .

١٧٨٢٦ - زَنْكُوبَا و زَنْكُوبَا

*Zanobia (S).
Zénobie (F).*

بينة وحيدة الجنس والوع من فصيلة الحنجيات تملو
من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها عروة متعاقبة يضيي
الشكل نصلها بلدي السج مابك الخضار || ازهارها
جلجية الشكل ، بيضاء اللون ، مقربة للآبر الرباعية
التركيب || ازهارها يثمر من سزبان الى ايلول .

١٧٨٢٧ - زَنْكُوبَا *

Dasyscypha

جنس فطور مجهرية من الزفريات وفصيلة الحشريات
يصير ظهوره الصغيرة القرصية المحلية . تكاته غروية .
يضع ثنائي التركيب ، مدني الشكل ، شفاف ، يصري



زئينة اللاريس



زهدم

١٢٨٥٩ - زَهْرَةُ السَّمَاءِ الْجَمِيعَةِ راجع جوليانه .

١٢٨٦٠ - زَهْرَةُ الشَّعَاءِ اطلب كيمنيس .

١٢٨٦١ - زَهْرَةُ الشَّمْسِ في اللدائن ، اطلبه .

١٢٨٦٢ - زَهْرَةُ الْعَصَلِ في السلية ، اطلبها .

١٢٨٦٣ - زَهْرَةُ الْعُطَّاسِ في الأرنكة ، اطلبها .

١٢٨٦٤ - زَهْرَةُ الْعِنَقِ في الترانسيوم .

١٢٨٦٥ - زَهْرَةُ الْعَتَكَبُوتِ في القم ، اطلبه .

١٢٨٦٦ - زَهْرَةُ الْعِصْدِ في النجد ، اطلبه .

١٢٨٦٧ - زَهْرَةُ اللَّيْلِ

في النسيكة من الرجبيات ، اطلبها .

١٢٨٦٨ - زَهْرَةُ الرُّجْجَانِ في الكنتية ، اطلبها .

١٢٨٦٩ - زَهْرَةُ الْمُشْتَرَى

في لخيس المشتري ، اطلبه .

١٢٨٧٠ - زَهْرَةُ شَعْرِيَّةِ في القشاة الثعبانية .

١٢٨٧١ - زَهْرَةُ مَكَايُورِ في الابيجية ، اطلبها .

١٢٨٧٢ - زَهْرَةُ مَحْبُوبَةٍ في القمر اطلبه .

١٢٨٧٣ - زَهْرِيَّ (F). Floriforme (F).

تمت وصفي يعلق عل ما هو شكله كالزهر .

١٢٨٧٤ - زَهْرِيَّاتُ (S). Helotiscase

(F). Hélotiscase (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشرات ورتبة

الرقبات . أجناسها وأزواجها عديدة تتميز بسدائها الحسية

القصية أو القرصية الشكل القائمة على ودية جلدية الرقبت .

بونها تختلف الأشكال والترتيب يكثر فيه الانتظام

الشعبي من الثنائي الى الثلاثي || لها جفان ملوَّبان

الزينة واللحن .

١٢٨٧٥ - زُهْمٌ ، زُهْمَةٌ ، مَنَحٌ ، قَتَمٌ ، نَمَةٌ ،

نَمَسٌ Rance, Rancissement (F).

Rancid, Rancidity (E).

فساد المواد اللدنية على احتلالها . سببه التأكسد وما يليه

من فعل المرأثم . تتأخذ رائحة قوية مسهجة وطعم

حريف كرهه .

١٢٨٧٦ - زُهْمُ (F). Animaux non ruminants

(E). No ruminant animals (E).

الزهم ما لا يجر من الحيوان .

١٢٨٧٧ - زُهَيْرُ (F). Polyanthe (F).

كثير الأزهار .

١٢٨٧٨ - زُهَيْرَةٌ (F). Fleuron (F).

زهرة صغيرة ابتدائية يتألف منها قرص الرئيس في أزهار

فصيلة المركبات .

١٢٨٧٩ - زُهَيْرَةٌ (F). Florule, Floscule (F).

هي الزهرة الصغيرة . وكل زهرة من أزهار السنبلة تدعى

زغيرة .

١٢٨٣٩ - زَهْرُ الْكَسَائِينِ

هو التيجال نبات عشبي زخيفي ، اطلبه .

١٢٨٤٠ - زَهْرُ الْقَوْلُوثِ هو البليس ، اطلبه .

١٢٨٤١ - زَهْرُ الْمَسِيحِ هو السبع ، اطلبه .

١٢٨٤٢ - زَهْرُ النِّسَمِ ، زَهْرُ الْحَوَاكِ

هو الأبرنس ، اطلبه .

١٢٨٤٣ - زَهْرُ صَرِيمٍ هو القطرم البنفسجي ، اطلبه .

١٢٨٤٤ - زَهْرَاكُ

الزهراء : البقرة الوحشية . والثور الوحشي : أثير .

١٢٨٤٥ - زُهْرَكُ ، زَهْرَكُ (E). Vénus (F).

كوكب سيار ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي . يعتبر

ألم الكواكب المروية . يبعد عن الشمس نحو ١٠٨

ملايين كيلومتر ، وهو بذلك يكون اقرب اليها من الارض .

ظهور من الشرق عند الفجر يعطيه لقب نجمة الصبح .

وظهوره عند الغروب يعطيه لقب نجمة الليل ونجمة الراعي .

سرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو ١٢٤٩٢٠ كيلومتر

بالساعة . دورته المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق

٢٢٥ يوماً || للمتحمسون يدعون الزهرة السمك الاصفر لانها

في السعادة دون المشتري وانما فوا اليها الطرب والسرور

والهجر والالفة والشفق .

١٢٨٤٦ - زُهْرَكُ (F). Fleur (F).

الزهرة هي البصير النباتي المختص بالتناسل لحفظ الكيان .

تتشأ الزهرة من برعمة وتتألف من تحت يحوي به سوار

خارجي يعرف بالكأس وسوار داخلي يعرف بالتويج

ينتهي بالبتلة ويصل عند انقلاب قاعدته الداخلية مجموعة

الاسدية التي تتألف الاضواء الذكورية || اما تحت الذي

يضمن الاضواء الانثوية فيشكل المخر حيث المحيط

تتلوي اللقطة المكونة من ثلث وبسم .

١٢٨٤٧ - زَهْرَةُ الْأَلَامِ في الآلامية ، اطلبها .

١٢٨٤٨ - زَهْرَةُ الْفِرْدُوسِ في الاندرواس . اطلبه .

١٢٨٤٩ - زَهْرَةُ الْفَالَاوُثِ في ينفج الثالوث ، اطلبه .

١٢٨٥٠ - زَهْرَةُ الْفَلَجِ

في النسيكة من الرجبيات ، اطلبها .

١٢٨٥١ - زَهْرَةُ الْجُرُوبِ في السكايبوزا ، اطلبها .

١٢٨٥٢ - زَهْرَةُ الْجَنَّةِ

اطلب زلف الملوك شجرة زينة جميلة الزهار .

١٢٨٥٣ - زَهْرَةُ الْحَجَرِ في جوز جتهم ، راجعه .

١٢٨٥٤ - زَهْرَةُ الدَّمِ في انقلاب اللص ، اطلبه .

١٢٨٥٥ - زَهْرَةُ الرَّيِّجِ في الزففة ، اطلبها .

١٢٨٥٦ - زَهْرَةُ الرِّمَالِ في الارناويه ، اطلبها .

١٢٨٥٧ - زَهْرَةُ السَّاعَةِ اطلب الآلية زرقاء .

١٢٨٥٨ - زَهْرَةُ السَّلْحَفَةِ في الحليين نبات زخيفي .



زوان ايطالي

12894 - زَوْجَعَة • Zooléa (F). Zoogloa (E).
وكان من البكتيريا جسمها مادة غروية في اشكال مختلفة قيو كالحطاط المتكاثف في السوائل وكجسمية من النقط والكتل في الجلود .

12895 - زَوْجَع • Pizomètre (F). Piesometer (E).
جهاز يستعمل في قياس انضغاط السوائل .

12896 - زَوْجَعَة • Pizométrie (F). Pizometry (E).
علم يبحث في انضغاط السوائل .

12897 - زَوْجَعِي • Pizométrique (F). Pizometric (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالزوجة .

12898 - زَوْجَحَن • Clerus (S). Clérade (F). Clerus (E).
جنس حشرات غشبية من فصيلة الزوسنيات . انواعه المعروفة نحو ٤٥ منتشرة في جميع مناطق العالم باستثناء الباردة . اجسامها صغيرة اللد ، مسطحة الشكل . ارجلها غشقة الاطراف المجلعة والمبضعة || مسرعا نهاري . قربتها رقيق ازهار الفصيلة الخيمية || يرقاها مقترنة تعيش تحت لحاء الاشجار المقطوعة اليابسة || أشهر انواعه زوسن النمل المعروف ايضا بوق النمل .

12899 - زَوْجَحَن النحل • Clérade des abeilles (F).
حشرة تدعى بوق النمل ، اطليها .



زوان معمر

12900 - زَوْجَحِيَّات • Clérades (F). Clérades (F).
Clérades, Checkered beetles (E). Buntkäfer (D).
فصيلة حشرات من ليات اللد ورتبة عديمات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٧٠٠ جسمها ٣٢ جنسا || اجسامها مسطحة ، نحيلة . قوائمها زائغة . جيلة . كواسلها صغيرة . قربتها الاستعمارية صولجانية الشكل ، مركبة من ١١ فصلا || اطرافها تشبه سطح اصقاع الامام واخصها المتناقص الخامة والمضللة الحمرية || يرقاها مقترنة تدعى في معظم يرقات الحشرات الخالصة || أشهر اجناسها الزوسن والقرنوف والفتوس والمشرق والسكروبة .



زوسن

12901 - زَوْجَع زَاهِر • Anthicus floralis (S). Anthicus floralis (E).
حشرة وائمة غاشلة دامت من فصيلة الزودعيات ورتبة عديمات الاجنحة . مسطحة بعض اصقاع الجلود الممتدة الحمرية من الشرق الاقصى واربية . تألف الجداري والمواقع الغلة . غناصها تعيش على رقيق الاطراف وبتلاتها . يرقاها تعيش على المواد النباتية المنحلة || جسمها صغير اللد يطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبا الى السرة القلابة باستثناء الكويل ويقتد الطفران ظاهريا الى المعصية يطولوا ملح صناعي في الذكر . وأنها شبه مستدير الجسم . زياتها غشيان . صناعها صغيرتان . طفرانها مستدير الطرف الاصح . غلها قليلا الصغير . ارجلها الاربعة والوعلى خاصة البغل . رصعا الخليلان رباعا المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط نيسان وتبقى حتى اواسط تشرين الاول . تسرح في التبار



نوع زاهر

12880 - زُهَيْرِيَّة • Flosculeuse (F). Floscular, Floscious (E).
هي الزهرة المركبة من عدة زهيرات .

12881 - زَوَائِين • Olivaria, Olivette (F). Olive-plantation (E).
هي بستان الزيتون او كرم الزيتون .

12882 - زَوَائِف • Reptiles
هي الزحافات ، راسها .

12883 - زَوَائِف الحشيد • هو الحطاف ، اطليه .

12884 - زَوَائِف • Asoles (F). Basis (E).
حجارة كساف الاتي الاول من البناء .

12885 - زَوَال • Extinction
هو انقضاء المدة القانونية .

12886 - زَوَال الإلتزامات • Extinction des obligations (F). Extinction of obligations (E).
هو انقضاء المدة القانونية بين الدائن والمدين بمقتضى احد الاسباب المخصوص عليها قانونا وهي : التخلي والبراءة والقسامة والتقدم والفسخ والابدال واتحاد اللنة .

12887 - زَوَال اليد ، زَوَال الحيكارة • Dépossession (F). Dispossession (E).
هو عدم التصرف باليمن الذي كان وضع اليد يميزه .

12888 - زَوَان ، زَوَان • Lolium (S). Lolium (F). Darnel (E).
جنس نباتات عشبية حولية وحمولة وبمر من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة . اوراقها عسفية النصل . ازهارها مشبيلة . منها البرية التي تلت في المروج والحروث ومنها الزراعية المعروفة والبخسورية || أشهر انواعها ما يلي .

12889 - زَوَان اِيطَالِي • Lolium italicum (S). Ray-grass d'Italie (F). Italian darnel, l. ray-grass (E).
نبات عشبي حول قابل الاستنشاق يزدح في المروج والمراعي والحدائق .

12890 - زَوَان حَكَلِي • Lolium arvense (S). Ivrle des champs (F).
نوع من الزوان البري ينبت في الحقول والحروث . كثرته مؤذية لانها تقصر بالزروع .

12891 - زَوَان مُسْكِر • هو الحطاف ، اطليه .

12892 - زَوَان مُعَمَّر • زَوَان اِنْكِلِيزِي ، نَسِيلَة • Lolium perenne (S). Ivrle vivace, Ray-grass anglais, Gazon anglais (F). Ray-grass, Ryegrass, Red darnel, Lawn-grass (E). Raygrass, Dauerhalm, Engliches ryegrass (D). Lolio perenne, Lolio vivace, Lajessa (I).
نبات عشبي معمر يعضوي معمر قابل الاستنشاق زراعت منتشرة في معظم البلاد .

12893 - زَوَائِع • هو التبرغ ، اطليه .

بيضاء اللون ، قطرها نحو ٤ سم. || توريدها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٩٠٦ - زَوْدَعَات *
Scaphopoda (F).
Scaphopoda (F).

الزودقيات فئة من الرغويات وحيدة الفصيلة والجنس .
انواعها نحو ٣٥٠ اشهرها الناتكة .

١٢٩٠٧ - زَوْدَقِي الْيَاسَمِين * * زَوْدَقِي كَمَيْمِه *
Limenitis camilla (S). Sylvaín azuré, Petit
Sylvain (F). White admiral Butterfly (E).

حشرة متراكبة الألوان الجسيمة من فصيلة الزودقيات ورنية
سرغيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة ورنية
الشرق الاذن وأوروبية . فراشتها جارية قوتها رشيح الاغبار .
سرقتها تعيش على الحمايات والياسمينات || جسمها متوسط
القد بطول نحو ١٨ سم . بطنها تراوح من ٤٨ الى ٥٢ سم .
رأسها مستد الجرم . عيناها كيرتان . زبابانها موطئان .
جيشنها وبطنها الى البني الاسود الموالج || فراشتها متراكبة
الاسودان والزخارف والتزيين فيها الاسود والازرق
والابيض والاكسل والاشقع والابيض || لها جمل واحد
في الخيل . تظهر القراشة في أيار . تسرح في النهار .
تعاثل بعد ظهورها ستة اسابيع وتفتح الممكن طعاماً مستطيلة
على نصال اوراق النبات المائل || السرعة تطول نحو ٣٥ سم .
تواليا الى الخضار البشري يطول غشائها جانبيا ورديان
قشائها يمشر الحلب الدقيق . رأسها اسود . رواجيسها
الصدريه صفراء اللون اما البطنية فخضراء || طول الاكسال
الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلبة متأسكة
النسج .

١٢٩٠٨ - زَوْدَم *
Xozimia (S).
Xozimia (F). Xozimia (E).

خيشة عريضة يمر بها تراب الارض المرتفعة الى الارض
المنخفضة .

١٢٩٠٩ - زَوْدَمِيَّة *
Zoximia (S).
Zoximia (F). Zoximia (E).

جنس اشعاب برية بحولة أو معمرة من فصيلة الخبيبات .
انواعها المعروفة قليلة العدد متنبها بعض المناطق الحارة من
الشرق الاذن || سفها مستضفة فراء . منها الزبينية
الهاء . ومنها المغالية . جلودها خليطة ، مغزلة الشكل .
اوراقها متعاقبة ، ريشة ، لاقامية التضريس . انفراسها
ميرقاني التجميع . انزعارها بياض اللون . اشهر انواعها :
زوزيمية افسينية الورق (Z. abcinthifolia) .

١٢٩١٠ - زَوْدَع *
Tranche (F). Slice (E).
هي التقلعة من البليخ ونحوه . يقال زمت له زودة من
البليخ . ج . زوج .

١٢٩١١ - زَوْدَعَات *
Adelomycetis.
Fungi Imperfecti (F). Adelomycetis (E).

رنية فطور مجهرية عديدة المراتب والفصائل والاجناس
والانواع . معظمها من الفطور اللاقمية التي تطور .
تكاثرها عديد الاشكال ، نواتجها الفرونية التي كانت
من صفاتها المميزة ، تسير الآن ركاب العلم الحديث
الذي قضى على ما كان يكتنفها من غموض || مراتبها
اربع وهي الزفانينات والصنباينات والميفانينات والميسفانينات .
اما فصائلها فتتسع وهي الدلايات والفرديات والصديبات
والكتينات والكحيبات والطحليات والمناينات واهلكيات
والوطحيات .

وتبيت في الليل || البرقة التي تترك الكال الجسوري بعمر
اربعة اشهر تبقى حتى اوائل آذار حيث تدخل في طور
الاكسال فتصل الى حورية وينها الى خنفساء . جسمها
عند تمام نموها بطول نحو ٧ سم . ثوبا الى البياض الاخير .
رأسها الى السرة السوداء . وهي فسادية الروابج ،
مستطبة الطرف الدلق .

١٢٩٠٢ - زَوْدَع مَزْر *
Anchicus quisquilius (S). Anchicus insigni-
flant (F). Anchicus quisquilius (E).

حشرة مبدولة واثمة خاضعة دامت من فصيلة الزودقيات
ورنية مفصلات الاجنحة . موطنها سخط اصقاع العالم .
تألف البراري والمواقع الدفلة وضفاف البحاري الماء .
خنفسائها تعيش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها
تعيش على المواد النباتية المتحللة والصائرة نحو الانحلل ||
جسمها صغير اللد ، خلي القشار ، بطول نحو ٣ الى ٤ سم .
ثوبا الى السرة الكستنية يطولها في ظهورها زناران صنبايان .
رأسها يبرسي الشكل بطول قرن قلاب يمتد حتى طرف الخيل .
صفيها صغيرتان . زبابانها خيطيان . غمدانها متباعدة
التحزيز ، كتيها الخيل . ارسافها الامامية والوسطى
خامسة المقول . رسداه خلفيان رباعيا المقول . غالبها
صغيرة || لها جمل واحد في الخيل . تظهر الحشرة الجليدة
في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في النهار
وتبيت في الليل || البرقة التي تترك الكال الجسوري بعمر
اربعة اشهر تبقى حتى اوائل شهر آذار حيث تتحول الى
حورية . جسمها عند تمام نموها بطول نحو ٧ سم . وهو
اسطواني الشكل ، مستطيل المقدم ، مستطيل الخوشر
فسادي الروابج . ثوبا الى الصفرة القدسة . رأسها كستني
اللون || طول الاكسال الذي يتم عادة تحت الجلالة والذي
يستمر نحو ٢٥ يوما ينقضي طلياً من كل غلاف .



زودع مزر

١٢٩٠٢ - زَوْدَعِيَّات *
Anthididae (S).
Anthididae (F). Anthididae (E).

فصيلة حشرات واثمة خاضعة دامت من رنية غدييات
الاجنحة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها
من حشرات اليلاد الحارة . تألف الاشعاب والنباتات
الجنية والمواقع الرملية وضفاف البحاري المائية والمناقع
والاواور || اجسامها صغيرة اللد ، خضرة الشكل ،
مستعرضة الرؤوس ، مستطيلة الزوايا الخيطية المركبة من
١١ فصلة . ابراج جبرانها خامسة المقول باستثناء الزوج
الخلفي فانه رباعي المقول || يرقاتها دامت تعيش على المواد
النباتية الصائرة نحو الانحلل || اشهر اجناسها الزودع
والنظفوس .

١٢٩٠٤ - زَوْر *
Poitrail, Thorax (F).
Breast, Chest, Thorax (E).

هو وسط الصدر بقل ما ارتفع منه الى الكتفين او ملتقى
اطراف عظام الصدر حيث اجتمعت .

١٢٩٠٥ - زَوْرَاه *
Plagianthus (S).
Plagianthus (F). Plagianthus (E).

مجيرة برية وتزبينية من فصيلة الخبيبات . ساقها فراء
تلوم نحو ٣ الى ٦ امتار . اثنادها واثانها متعصب . اوراقها
عابلة متعاقبة ، معتقة ، تطول من ١٠ الى ١٥ سم . نصلها
مرطاه سنة اخطار . حيلة الخضار الزاهي . انزعارها غسمة
التجميع ، محورية الانكازة ، مستطيلة المالحق ، متعالة ،



زودع الباسم

١٢٩١٢ - زَوْعُونِيَّة

Zoogonia (F).

Zoogony (E).

الزوعونية علم يبحث في تطور الحيوان. راجع شاة.

١٢٩١٣ - زَوْعِيَّات

Pédipalpes (F). Pedipalp (E).

رَبَّة من المَكَبِيَّات تتميز بامتطالة الزوج الأول من أرجلها فيبدو كزبان الحشرات.

١٢٩١٤ - زَوْفٌ *، جَسْمِيٌّ، حَسَلٌ، أَشْتَانِ دَاوِدَ

Hysopus officinalis (S). Hysop officinale (F). Common hyssop (E). Echter ysaop (D). Isoopo sacro (I).

نبات عشبي بري طبي من فصيلة الشفويات. ساقه ليفية

منتصبة فروعها تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه لائقة

سائقة، متغابلة. نصلها سناني الشكل بحري الخضار

يطول من ١ إلى ٣ سم. ويمرض نحو ٤ سم. صفته

منسقة كثيفة اللند الطرية || أثماره ضئيلة بحورية

زرقاء اللون. أوراقه وإزهاره طرية الرائحة || أثماره

يتمس من حزن إلى ايلول || وين اسمائه إيسوف

وهي لغة عبرانية أما كلمة زَوْفًا فاصلاها الميرفوفي زيت.

منافعه الطبية عديدة. تلعب أثماره منه وعاضم. أوراقه

وأفانته تقي من السعال وتقوي المعدة. زينه الطري

المستخرج بالتقطير يستعمل في عدة مستحضرات طبية.

١٢٩١٥ - زَوَّلَمٌ

Palpimanes (S).

Palpimane (F)j Palpimanes (E).

جنس حناكب مفترسة من فصيلة الزووليات. أنواعها

المعروفة متوسطة العدد أطلها جميع أصناف البلاد الحارة

من العالم القديم || أجسامها صغيرة اللد أسطوانية الشكل

مضغوطة تطول من ١٢ إلى ١٥ م. أثوابها إلى الحمرة

الجزئية أو القنزوية. تتميز بامتطالة الزوج الامامي

من الجرازم الذي يستعمل لالتقاط الفصص ولا يستعمل

لقتيب.

١٢٩١٦ - زَوَّلَمِيَّات

Palpimanidae (S).

Palpimanidae (F). Palpimanidae (E).

فصيلة حناكب من رتبة الزئوليات. أجناسها وأنواعها

المعروفة نحو ٧٠ موطنها البلاد الحارة من العالم القديم ||

جميعها مفترسة، متوسطة القد أو صغيرة. تتميز بخلف

يطربها من الصفائح البنية التي تفصل اللسانين من بعضها

البفسر، وبغلافه جوامزا الامامية التي ترفعها دوماً ولا

تستعملها السير || غائبها أجناس حورية اللون تحملها

تحت الحجارة والحزاز والطالب || أشهر أجناسها الزوول.

١٢٩١٧ - زَوَّلَمٌ

Démarche du Corbeau (F).

الزَوَّلَم: مشية القراب. وهو الخطر المتخارب في تحركه

جسد المائي.

١٢٩١٨ - زَوَّلَمِيَّت

Zéolithe (F). Zéolithes (E).

مادة صخرية.

١٢٩١٩ - زَوَّلَمِيَّت

Zonite immaculé (F).

حشرة من فصيلة اللبوديات تدعى صفورة، أطلها.

١٢٩٢٠ - زَوْقَرٌ *

Venus (S).

Vénus (F). Venus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخياشم

معديات الايجل وفضيلة الزوهرجات || أنواعها المعروفة

متوسطة العدد، منتشرة في سطر بحار العالم || أصدافها
شبه صيوانية الشكل، متساوية المصارع، ثلاثية
الاستان الرقيقة. أصدافها مائلة أو متماثلة التحيز
اللتيق. أطرافها مسنة الحار. ماضيها ثنائية، طليقة،
مهذبة الأطراف || تعيش منتشرة في القوال المغمورة بالماء
قرب الشواطئ وصيحات الاثر || لحوبها مأكولة، جيدة
الصنف.

١٢٩٢١ - زَوْهَرِيَّات

Veneridae (S).

Vénéridés (F). Veneridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخياشم

معديات الايجل || أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة

منتشرة في سطر بحار البلاد الحارة والمتحدة الحرارة ||

أصدافها شبه قلنسوة الشكل، متساوية المصارع،

ثلاثية الاستان الرقيقة. ماضيها ثنائية، انبوية،

طليقة، معتدلة الطول، مهذبة الأطراف || أعرف أجناسها

وأشهرها الزيرير والشويف وبالقرة.

١٢٩٢٢ - زَوْهَمِيَّات

Protohémiptères (F).

رَبَّة حشرات منقرضة من طبقة الصفاكات. أحافرها

تعود إلى الحقبة الخامسة واللاحقة من الأياج الاول،

للمعولة أيضا بالحقبة البرية || الاسم العلمي يرمز إلى

أنها من اسلاف صفيحات الإجنسة وقد تبين فيما بعد أن

الاتاء المقدر ينقصه الكثير من الأدلة الراجعة.

١٢٩٢٣ - زَوُّلُوجِي

Zoologiste, Zoologue (F).

Zoologist (E).

مخصص بعلم الحيوانات.

١٢٩٢٤ - زَوُّلُوجِيَّة

Zoologie (F). Zoology (E).

علم الحيوان وهو فرع من التاريخ الطبيعي يبحث في

الحيوان.

١٢٩٢٥ - زَوُّلُوجِيَّة زَرْاعِيَّة

Zoologie agricole (F). Agricultural zoology (E).

علم الحيوانات الناجية أي الزراعية.

١٢٩٢٦ - زَوُّلِيَّت

Zoolite (F). Zoolite (E).

الزووليت البقايا المغمورة المتصجرة من كل حيوان.

راجع صيفة.

١٢٩٢٧ - زَوَّلَمِيَّت، زَوَّلَمِيَّت

Mercure, Hydrargyre (F). Mercury (E).

الزئبق عنصر معدني سائل. وهو المعدن الوحيد السائل

يوجد في الطبيعة منفرداً أو متحداً بمناصر أخرى مختلفة

التركيب || رمزه (Hg - هـ) وزنه الذري ٢٠٠.٦١

ثقله النوعي ١٣.٦١ لونه فضي. يجمد في ٤٠° مع تحت

الصفر ويؤين في ٣٥٠° مع || مركباته عديدة تستخدم

في مختلف الأغراض أهمها الصناعية والبلية.

١٢٩٢٨ - زَوَّلَمِيَّت مَصْعَدٌ

Sublimé de mercure

١٢٩٢٩ - زَوَّلَمٌ، زَوَّلَمِيَّت، زَوَّلَمِيَّت

Rugissement (F). Roaring, Roar (E).

صوت إلأسد.

١٢٩٣٠ - زَوَّلَمِيَّت

Ocellé (F). Ocellus (E).

الزَم: عين الحشرة أو بسيطة أو مركبة.



زَوْعُونِيَّة



زَوَّلَمِيَّت

١٩٩٣٩ - زَيْت زراعي، زَيْت أَيْسِي

Huile minérale, H. blanche (F). Mineral oil (E).
يستعمل من تقطير القطران والكشط وهو ما كونه فمال
يستعمل في المكافئة الشوية .

١٩٩٤٠ - زَيْتَه هي غنارية الصحراء ، اطليا .

Olea europaea (S). Olivier (F). * زَيْتُون *
Olive tree (E). Echter Ölbaum (D). Olivo, Ulivo (I).
شجرة مثمرة من فصيلة الزيتونيات . أطبقها إقليم حوض
البحر المتوسط يمتد من فلسطين إلى إسبانية ومن مراکش
إلى تونس . شروبا عديدة جميعها دائمة ، بطيئة النمو ،
طويلة العمر ، سطوها شخنة عجرا ، قشورها سنجابية
مقلعة كاشية ، انصافها غليظة ، افنانها مستدقة . اورقها
عروة ، صغيرة اللد ، معنقة ، متقابلة ، سنانية النصل
الكامل البسيط الجامد || انزعارها سليل التسجج ، ابلي
الارتكاز سليلته تدعى سيلة . انزعارها خشوية ، صغيرة
جلجلية الشكل || ثمارها لحية السويق ، خضراء اللون ،
بيضة او مستطيلة . صمها غشوية صلبة . برورها
لوزية || تتكاثر بالبذر والغفل والفسال والشطف .
جميع شروبا سريرية تمشي وتشر في مختلف الاربعة
لا تحصى سوى المنافع وكثرة الطرية . وهي متناوبة الحمل
زاعمة غير انه يحسن تسليها لان التسميد يحول دون بده
التناوب بين الحمل والشح .

١٩٩٤١ - زَيْتُون البَرِّ هو الفتنة الزيتية ، اطليا .

١٩٩٤٢ - زَيْتُون بَرِّي هو السَّم ، اطلبه .

Olive * زَيْتُونَة *
ثمرة الزيتون توكول ويستخرج منها الزيت بالصر .

Olivacé, Olivâtre (F). * زَيْتُونِي اللون *
Olivaceous (E).
نمت وصي يطلق عل ما كان لونه كازيتوني .

Oleaceae (S). * زَيْتُونِيَات *
Oléacées (F). Oleaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات القلقين . اجناسها وانواعها كثيرة
العدد تنتمي الى ثلاثة اسباط : الزيتونيه والمرانيصة
والياسمينية .

Oléifère (F). Oleiferous (E). * زَيْتِي *
نمت تمرني يمر من وجود المادة الزيتية كدوكول الخروع
نبات زيتي .

Huileux (F). Oily (E). * زَيْتِي *
ما كان شكله كازيت .

Oléine (F). Oleine (E). * زَيْتِين *
احد مركبات الزيتون الدهنية والشعوم الجامدة .

Table astronomique (F). * زَيْج *
Astronomical table (E).
قائمة حسابية فلكية ترتكز عل تتابع دوران بعض
الاجرام السماوية بموجب ترتيب سماوي خاص ويص
للتورة . اما الاجرام التي تتألف منها الدورة فهي برزخية
المرج والشمس والقمر وسيلاد والقمر وزحل والمشتري .

Accroissement (F). Increase (E). * زَيْكَاة *
هو حق زيادة حصة الارث فيما او تقل احد او بعض
الورثة من حصتهم .

Tord-nez, Mouchette (F). * زَيْكَا *
Twitch, Barnacles (E).
لاقط غشي تضغط به جيفة الفرس فيدل .

* زَيْكَا *
هو المستورد قد من فصيلة البسويات .

Décorateur (F). Decorator (E). * زَيْكَا *
من تامل مهنة الزين .

Chlamydera (S). * زَيْكَا *
Chlamydère (F).
جنس طير من فصيلة الخريشيات . انواعه المعروفة سبعة
موطنها بلاد اسطرية . ملهيا الحيالي زويبي في الربيع
والصيف ثم جلي . تألف الغابات والادغال . قريبا الكبار
اغصها الدراق والشمش والين والموز والبرقتال وبعض
الزور وجميع انواع الحشرات || اجسامها متدلة اللد ،
تعطلي من ٢٤ الى ٣٠ سم . اوتها خفلة الالوان جميعها
مبقعة وبشوية يقتنازع قفنة الالتشاب . اناثها عادمة
للقنازع ، بلغة الالوان || من ميراثها انها تقم بالقرب
من امشاشها سارعا مسقية بالرش تربتها يختلف
الايام ، الملحة تبسطها سد من القضايا المحبوبة لتعليها
الاناث كلما اشتهت السفاد || احرف انواعه واشهرها
الزيران المبرش .

* زَيْكَا مَبْرَش *
Chlamydera maculata (S). Chlamydère tacheté (F).
نوع من الزيران . موطنه بعض مناطق اسطرية . يألف
الغابات القريبة من الحدائق والسران . قوته التار والبزور
والحشرات || جسمه متدل اللد ، يطول نحو ٢٧ سم .
ثوبه اسود الصفرة العليا المبرقة بالابخر والاصفر
والبرقتالي . صدره وبلته واثنيكه الى الفرة يطولها مزلج
اصفر قفنته برتقالية اللون . ثوب الاثي ابيض من ثوب
الذكر واقل وشفة منه || يدن حشه في الاجمار الرقيقة
ويشم سرعه حيث يستطيع . الاثي تحسن مرنان في
الحول وتضع في كل مرة من بيضتي الى ثلاث بيضات
ترخها بمثابة الذكر .

١٩٩٤٣ - زَيْكَاة ، عَشْبَة هندية
Hemidesmus indicus (S). Hémidesme indien,
Salsaparilla de l'Inde (F). Indien sarsaparilla (E).
Halbaden, Indische sarsaparilla (D). Salsaparilla
d'India (I).
جنية عارضة معمرة من فصيلة الصلصليات . اورقها
معنقة قلبية ، نصلها اخضر الصفرة العليا ، عاين
السفل . انزعارها متشككية التسجج ، عويودة الارتكاز
سلوانة || يقال انها لا تخول من المنافع الطبية . تستعمل
للتزين .

١٩٩٤٨ - زَيْت *
Huile (F). Oil (E).
سائل دعي نباتي او حيواني يستخرج من ثمار وبزور
النباتات الزيتية ومن ضخوم الحيات وغيرها || والزيتون
تقسم الى طيارة وثابتة وجامدة وبنافة . جميعها أقل كثافة
من الماء ولا تقرب فيه . تستعمل في اغراض مختلفة
اغصها الطعام والاضادة وصناعات الصابون والشح .

١٩٩٤٩ - زَيْت *
Huile (F). Oil (E).
سائل دعي نباتي او حيواني يستخرج من ثمار وبزور
النباتات الزيتية ومن ضخوم الحيات وغيرها || والزيتون
تقسم الى طيارة وثابتة وجامدة وبنافة . جميعها أقل كثافة
من الماء ولا تقرب فيه . تستعمل في اغراض مختلفة
اغصها الطعام والاضادة وصناعات الصابون والشح .



زيران مبرش



زيتون



زيتونة

١٢٩٥١ - زيتون

هو اكسيد الرصاص السليم. له لون حرة القنبر. قتله النبي ٤٦. صلاته من ٢ الى ٣ يستعمل في دهان الحديد لانه يمنع عنه الصدأ.



زيتون

١٢٩٥٧ - زيتون صرصور

Cicadatra quadra (S). *Cigale criarde* (F). *Psosiph cicadatra* (E).

حشرة صرارية من فصيلة الزيتونيات. جسمها يطول من ٢٢ الى ٢٧ سم. بسطة تراوح من ٥٥ الى ٦٤ سم. || ثوبها الى الكسني الاسمر تملو زخارف بريقالية في الرأس والكتول. وفي جانبي البطن الصلصة السفلى من البطن سوداء. رأسها مستعرض ضخم. عظمها مثلث الطولي. صيغها كيرتان. زباناها صفيران. كويلها شبه مربع. اجنتها فضائية، شفافة، مدبجة بالاسود. قوائمها نشطة مهدبة || تسرح في النهار. تتميز بكثرة مرصرتها. تألف الحراج والمخالفات القديمة الانهار.



زيتون البحر

١٢٩٥٨ - زيتون صرصور

Lyrissus plebejus (S). *Cigale commune* (F). *Common cicada* (E).

حشرة صرارية مبهولة من فصيلة الزيتونيات. جسمها مستطيل يطول من ٣١ الى ٣٧ سم. بسطة تراوح من ٨٥ الى ١٠٥ سم. || ثوبها كسني اللون اسفح الحراج. الصلصة السفلية من البطن الى الصلبة عليها حثار اسود يتقلب الى الاصفر عند مؤخر البطن || رأسها مستطيل الجرم يملو تجلجع ابيض واثني. عظمها غرزي الشكل. صيغها كيرتان. زباناها صفيران. ديقان. كويلها عمودى، تجلجع بالاصفر. بطنها شبه مربعي الشكل. اجنتها فضائية شفافة، قليلة المروق، كثيرة الانصباب. قوائمها نشطة، مهدبة || تسرح في النهار. مبهولة في جميع الحراج اما يكثر ويوجد على الصنوبر.



زيتون الصنوبر



زيتون الغاب

١٢٩٥٩ - زيتون

Barbus. في اطراف الرش.

١٢٩٦٠ - زيتون

Zizania (S). *Zizania, Riz d'eau* (F). *Water oats* (E). *Wasser reis* (D). *Zizania* (I).

جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة النجيليات. انواعه عديدة اورانها صفية النسل. زنادها متكونة لتجميع المواد النشوية || الشجر انزلها: الزيتونية العريضة الورق (*Zizania latifolia*) وهي عشبة مسرة مأكولة الجلع منها نباتات منافع الصين. والزيتونية الكندية (*Zizania canadensis*) وهي حولية تزرع بها المأكول.



زيتون صرصور



زيتونية

١٢٩٦١ - زيتون

Perameles (S). *Péramèle, Bandicoot* (F). *Bandicoots* (E).

جنس حيوانات جلمة لاجه من فصيلة الزيتونيات ورتبة الجرابيات || انواعه المروفة حسة موطنها بلاد استراليا || اجسامها ريمية تطول من ٤٥ الى ٦٥ سم. بما فيه الذنب. رؤوسها اسفينة الشكل، مستطيلة المقاطع الدالة. اذنانها كاسية تطول من ١٥ الى ١٦ سم. || قوسا الديدان والحشرات المختلفة والسائل.



زيتون

١٢٩٦٢ - زيتونيات

Peramelidae (S). *Peramelidae* (F). *Peramelidae* (E).

فصيلة حيوانات جلمة لاجه من رتبة الجرابيات. اجسامها المروفة اربعة موطنها بلاد استراليا. رمتها الاجراع || اجسامها صغيرة القند، مستطيلة الشكل، جسمها لا يتجاوز حجم الارنب. رؤوسها اسفينة مستطيلة المقاطع. قوائمها الخلفية اطول من الامامية. نظام تركيب اسامها

١٢٩٥٢ - زيتون

Cigale (F). *Seventeen year locust* (E).

جنس حشرات من فصيلة الزيتونيات انواعه عديدة طولها يراوح من ١٦ الى ٤٥ سم. وبسطة من ٤٥ الى ١٠٥ سم. قوائمها غشلة الايلان يكثر فيها الاسود والاسمر والابروي. تميل على بعض الاجراع الحربية والزراعية اعصها الصنوبر تتميز بصورتها الحادة للاستقطعة المزعجة كلها تقول فيها زيتون.

١٢٩٥٣ - زيتون احمر

Tibicen haematodes (S). *Cigale rouge* (F). *Red cicada* (E).

الاسم العلمي بمعنى زيتون احمر. حشرة صرارية من فصيلة الزيتونيات ورتبة حشرات الاجنحة. جسمها كبير القند، يطول من ٢٨ الى ٣٨ سم. بسطة تراوح من ٧٦ الى ٨٦ سم. || ثوبها الى الصنابي الاحمر المالح. رأسها مستطيل مستعرض يملو تجلجع اخضر واخر واصفر. عظمها مثلث الطولي. صيغها كيرتان جاسطتان. زباناها ديقان. صفيران. كويلها مربع الشكل، تجلجع بالابخر والاخر والاصفر. حية بطنها اخر. اجنتها فضائية، ملطها مبروقها رصاصها عتابة اللون. قوائمها صغيرة مهدبة || تسرح في النهار. تألف الحراج والقدابات.

١٢٩٥٤ - زيتون البحر

Scyllarus latius (S). *Scyllarus, Cigale de mer* (F). *Shrimp* (E).

حيوان من القشريات عشاريات الارجل. مبهولة في مياه السواحل البنانية.

١٢٩٥٥ - زيتون الصنوبر

Cicada orní, Scutiger orní (S). *Cigale panschée* (F). *Orni cicada* (E).

حشرة صرارية من فصيلة الزيتونيات. جسمها مستطيل الجرم يطول من ٢٣ الى ٢٨ سم. بسطة تراوح من ٦٨ الى ٧٨ سم. || ثوبها الى البني الاشعث يميل في الرأس والكتول والبطن. رأسها مستطيل تملو زخارف وزاويين. عظمها غرزي الشكل. صيغها كيرتان جاسطتان. زباناها ورشي الشكل عند الذكر، عظمي عند الانثى. كويلها مجي. يميل بالابروي. بطنها اصفر اخيد. اجنتها فضائية تملو، في الزوج الامامي، بعض التكت المسر || تسرح في النهار. رمتها الحراج اعصها حراج الصنوبر.

١٢٩٥٦ - زيتون الغاب

Cicadetta sylvestris (S). *Cigale sylvestre* (F). *Wood cicadetta* (E).

حشرة صرارية من فصيلة الزيتونيات. جسمها شبه وشي الشكل، يطول من ١٨ الى ٢٢ سم. بسطة تراوح من ٤٦ الى ٥٤ سم. || ثوبها الى البني الاسمر يملو تجلجع عتابي في الرأس والكتول. رأسها عريض. عظمها مستطيل الطولي. صيغها كيرتان. زباناها صفيران. كويلها شبه مربع. بطنها غرزي الشكل، عتابي اخيد. اجنتها فضائية، عتابة المروق والاصباب. قوائمها صغيرة مهدبة || تسرح في النهار. تألف القابات وانهار ضفاف مجاري الماء.

١٢٩٦٨ - زَيْفُون صَغِير الْوَرَق

Tilia cordata, *T. parvifolia* (S). *Tilleul à petites feuilles* (F).

نوع من الزيفون الزبني. مهدد أروبة. ثمرته تملو من ٥ إلى ٢٥ م. أوراقها قليلة الشكل، صغيرة القد. نصلها حلق الصفحة العليا، أزرق السفلى. ثماره صغيرة الحجم خالية من الانسلح || ازهاره يستمر من حزيران الى عوز.

١٢٩٦٩ - زَيْفُون فَهِيّ، جَيْسُون

Tilia argentea (S). *Tilleul argenté* (F).

نوع من الزيفون الزبني مهدد الشرق الاوسط. ثمرته هريفة الشكل. لثانها خلية الحاء. أوراقها متوسطة القد، نصلها حلق البشرة فني اللون والمالح. ثماره بيضية الشكل بيضة الفصول || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٩٧٠ - زَيْفُون مَنُغُولِيّ

Tilia mongolica (S). *Tilleul de Mongolie*, *T. à feuilles de vigne* (F).

نوع من الزيفون الزبني مهدد الصين. ثمرته تملو من ٢ الى ٨ م. أوراقها صغيرة القد ثلاثية الفصوص نصلها سنن الحافة، مائل البشرة. ثماره خالية من الاصلح. ازهاره يدوم طوال شهر تموز.

١٢٩٧١ - زَيْفُون مِيَشُوكِي

Tilia michauxi, *T. neglecta* (S). *Tilleul négligé* (F).

نوع من الزيفون الزبني. مهدد أمريكا الشمالية. ثمرته تملو من ٢ الى ٢٥ م. لثانها حر السماء. أوراقها تملو من ١٠ الى ١٧ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى يصفر عند دخيل أغريف || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.

١٢٩٧٢ - زَيْفُون هُولَنْدِيّ

Tilia platyphyllos, *T. europaea* (S). *Tilleul de Hollande* (F).

نوع من الزيفون الزبني مهدد أروبة. ثمرته تملو من ٢٠ الى ٤٠ م. لثانها زهاب الحاء. أوراقها تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا، حلق السفلى الموشة بالازرق. ثماره اجاسية الشكل، خاسية الفصول البارزة || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٩٧٣ - زَيْفُونِيَّات

Tiliaceae (S). *Tiliacées* (F). *Tiliaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مهدد القامالات. اجناسها وانواعها عديدة منها الاجار والشجيرات والجنابات والاشباح. أوراقها متعاقبة. ازهارها فردية او متقوية للتجميع، عمودي او تاجي الارتكاز. ازهارها غشوية، صغيرة القد، عطرية الرائحة.

١٢٩٧٤ - زَيْفُون الْحَقْل

Lycops arvensis (S). *Lycopsida des champs* (F).

نبات عشبي بري معروف من فصيلة الحسبيات. شكله قريب الشبه بالاشوة. يختلف عنها باظهاره المرققة الانابيب || ساقه متضبة، قليلة الفروع، تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. أوراقها متعاقبة، لينة، مزينة النصال. ازهاره طرفي الارتكاز. انقاره بنفسجية اللون في اولى هبلها ثم زرقاء. تنويره يستمر من حزيران الى آب || يعتبر من النباتات المروية المسنة والمدرية.

لا يختلف عن النقر. اجرة انثاء متعدة الراسبة تلتف ثمانية اطراف وتتفتح من الوراء || اشهر اجناسها الزيزب والكر وب.

١٢٩٦٣ - زَيْفُون عَنكَبُونِيّ، زَيْفُون شَكْرِيّ

Styphus schaefferi (S).

Styphus araeformis (E).

حشرة نائلة دامت من فصيلة الجمليات وثنية مفصلات الاجنحة. تألف المواق التي يكثر فيها البراز. تمش على جسمها صبر القد بطول من ٦ الى ١٠ م. قوسا الى السواد الكامد. رأسها مستعرض الشكل. زباناها دقيقان. صينها صغيرتان. ظهورها ضيق الطرف المقطوم الذي لا يلمع كامل البطن. ارسافها خاسية الفصول || الذكر اكبر قدماً من الانثى واصلق قوساً منها وقصر سريراً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع ويبقى حتى اواخر الصيف. تخرج في التبار. تشاف في شهر آب. تنح المحكن في البر وتطمره في التراب || البقرة عند بلوغها الكمال الجسموري تطلو من ١٤ الى ٢٢ م. جسمها مستطيل الجسم، ضلع الكثير، قصير الرواجب، شحلي السنين، جتري الرأس || طوره الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع ويتقضي في التربة.



زيفون عنكبوني

١٢٩٦٤ - زَيْفُون

Tilia (S).

Tilleul, *Tilio* (F). *Linden*, *Lime tree*, *Lime-blossom*

tea, *Lindenbaum*, *Linde* (D). *Tiglio* (I).

جلس اشجار حرجية وزبينية من فصيلة الزيفونيات. ازهارها عديدة لوانها متعاقبة، متعاقبة، عابدة. ازهارها عطرية، نورية، عمودية، خاسية الفصول واليافيت متعدة الاسدية. احشائها صناعية. تقودها ليفية تستعمل استعمال القنب. ازهارها وأوراقها طيبة مرققة وبيضاة القطن. تسكن السمك وتفيد الصدر. تهلئ الاصاب كالابرير وتفيد الى النوم. ويستخرج من زبونها مادة هندية شائعة الاستعمال الطبي || اشهر الوله ما يتبع.

١٢٩٦٥ - زَيْفُون الشَّرْقِيّ

هو الخلاف الضيق الورق، اطليه.

١٢٩٦٦ - زَيْفُون امْرِيكِيّ

Tilia americana, *T. glabra*, *T. nigra* (S). *Tilleul d'Amérique* (F). *American lime-tree* (E).

نوع من الزيفون الزبني. مهدد أمريكا الشمالية. ثمرته تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. أوراقها تملو من ٩ الى ٢٠ م. وتعرض من ٦ الى ١٥ سم. نصلها مائل البشرة عابق الخضار، سنن الحافة، مستطيل المتق. ثماره كروية خالية من الانسلح || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.



زيفون شائع

١٢٩٦٧ - زَيْفُون شائع، زَيْفُون مَبْدُول

Tilia vulgaris (S). *Tilleul commun* (F). *Common lime-tree*, *C. lindae* (E).

نوع من الزيفون الزبني. مهدد أروبة. ثمرته تملو من ١٥ الى ٢٥ م. أوراقها متوسطة الحجم. نصلها سنن الحافة، مدبب القصة، ياهت الخضار. ثماره مستطيلة، خاسية الفصول البارزة || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.



زيفون الحقل

١٢٩٨٧ - زَيْطُولُ أَصْفَر

Ixia viridiflora (S).
Ixia verto (F).

نوع من الزيتول شرعاه يعلو نحو ٣٠ سم. سبلته قصيرة. ازهارها كبيرة اللد لونها الى الاخضر تتوسطها بقعة سوداء. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٩٨٣ - زَيْطُولُ أَصْفَر

Ixia lutea (S).
Ixia jaune (F).

نوع من الزيتول شرعاه يعلو نحو ٣٠ سم. سبلته بيضاء. ازهارها كبيرة اللد ، فليسة البرف المستحب ، صفراء اللون || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٢٩٨٤ - زَيْطُولُ بَهِي

Ixia speciosa (S).
Ixia superbe (F).

نوع من الزيتول شرعاه يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. سبلته طويلة نحو ١٥ سم. تحمل من ٦ الى ٧ ازهار كبيرة اللد حراء اللون || ازهاره من ايار الى حزيران .

١٢٩٨٥ - زَيْطُولُ عَدَكي

Ixia paniculata (S).
Ixia en panicule (F).

نوع من الزيتول شرعاه يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره ملطحة التجميع ، كبيرة اللد ، مستطيلة الاطراف، لونها الى الالبيض المشع بالاحمر . بقعها الوسطى سود . ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

١٢٩٨٦ - زَيْطُولُ مِسْبَال

Ixia polystachya (S).
Ixia à plusieurs épis (F).

نوع من الزيتول شرعاه يعلو نحو ٣٠ سم. يحمل ٣ سبلات ازهارها بكثيفة التجميع قطرها نحو ٢ سم. لونها الى الالبياض الناصع . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٩٨٧ - زَيْطُولُ مَلْطُخ

Ixia maculata (S).
Ixia à macule (F).

نوع من الزيتول شرعاه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. سبلته قصيرة . ازهاره بكثيفة التجميع لونها الى البرتقالي المشع بالالبيض والملطخ بالاحمر . بقعها الوسطى زرقاء اللون . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٢٩٨٨ - زَيْفَان

Déviation (F). *Deviation* (E).

الزيفان والزيف هو التغير الطارئ على الاتجاه الطبيعي مما كان سببه .

١٢٩٨٩ - زَيْفَم

Eau salée, saumâtre (F).
Salt water, Briny water (E).

يقال للين المالحه عين زيفم ويقال للين المذبة عين ميم .

١٢٩٩٠ - زَيْفَاء

Daphniphyllum (S).
Daphniphyllum (E).

شجرة كبيرة دائمة من فصيلة القربونيات . مهدا بعض اصقاع الشرق الاقصى . ساقها تنمو نحو ١٥ م. اوراقها سنانية الشكل تطول من ١٢ الى ١٨ سم. وتقرض من ٥ الى ٧ سم. نعلها جلدية ، غضر الصفحات العليا ، طسل السفل . ازهارها ثنائية المسكن ، حذيفة الجرم ، عتقودية التجميع ، محورية الارتكاز . الذكورية منها عديدة القصل والاسدية . اما الانثوية فتلاية المياس . ثمارها لحية زيتونية الشكل والحلم تحوي عصمة واحدة صغيرة .

١٢٩٩٥ - زَيْفَوِي *.

Embertia cirys (S). *Ziti* (F).

طائر من الجوارم وفصيلة الثشوريات . موته معظم مناطق اروية مجموعا في طلب المصيف والمشت . قوته الحشرات والبروز || جسمه صغير اللد يطول نحو ١٦ سم. ثوبه جميل الالوان المتناقلة تكثر فيه الشبهة الزقاء يعلوها تمشيع اصفر واخضر ، وتمشيع اسود في الرأس والجنح ، وايض واثنع في الصدر والبطن . زوره اسود . محمره الى الشقة. عيانه مكلحات بالاسود. منقاره صغير الجرم. ذنبه غارق الطرف .

١٢٩٩٦ - زَيْفَوِيَات

Cicadidae (S).
Cicadidae (F). *Cicadidae* (E).

فصيلة حشرات من صفيات الاجنحة المتجانسة . اجناسها وانواعها كثيرة اللد تتميز باجنحتها الشفافة . بذوائجها الثلاثية الزئام وباصوات ذكورها الصرصرية . جميعها من حشرات المناطق الحارة والمستقلة . حشرات الكاملة تعيش من ٦ الى ١٠ اسابيع قوتها للفس الذي تحبب منه افنان مختلف الانهار || انثاها تفتح نحو ٤٠ مكتة في عام الانصاف والافناد الباهية تفتتح من ربات تعيش في التربة نحو اربعة اعوام حل جلور مختلف الالماشب والنبات.

١٢٩٩٧ - زَيْفَوِيَات *

Sisyridae (S).
Sisyridae (F). *Sisyridae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذافات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة اللد ، نحو ٣٠ ، منتشرة في معظم المناطق المعتدلة الحارة والمعتدلة نحو الباردة . تألف صفاف مجاري الماء . انثاها تجمع الحكن على النباتات المائية || اجسامها صغيرة . بسطة اجنحتها تراوح من ١٥ الى ١٦ سم. رؤوسها شبه مكورة . عيونها جاحظة . قرونها الاستعمارية عينية مستطيلة . اجنحتها شبه متساوية بين الزوجين . كواسلها قصيرة . بطونها اهلجية الشكل . انثاها قصيرة المزوات || يرقاتها مائية ، مفرمة || لشهر اجناسها الزيزيرة .

١٢٩٩٨ - زَيْفَوُورَا

Ziziphora (S). *Ziziphora* (F). *Zizifora* (I).

جنس نباتات طيبة ، برية وسولية من فصيلة الثشويات الترجمات . انواعها ٨ جميعا برية منها الشبية للعادة والتبسية والجنبية . اوراقها مقابلة ، كلمة ، سنانية زغية . ازهارها محورية وتاجية .

١٢٩٩٩ - زَيْفَلَة

هي الارض الرصاصة ، المطبة .

١٢٩٨٠ - زَيْفَلَة

هي للاهرة الربداء ، المطبا .

١٢٩٨١ - زَيْطُول *

Ixia (S). *Ixia* (F).
Corn lily (E). *Klebschwertel* (D). *Ixia* (I).

جنس نباتات يسلم من فصيلة السوسيات لوانعه المعروفة ٣٥ جنسا تربوية وصناعية . اوراقها قرصية الالتفاف مستطيلة ، نعلها ضيق الصفة الجلمدة المتصبة . جملزها الزهرية تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ازهارها سليل او حلقى التجميع . ازهارها جملة الشكل والالوان الزمائية . يستخرج من نعلها عصارة لزبة صناعية || لشهر انواعه الزيبونية ما يتبع .



زيفي



زيفول

١٢٩٩٨ - زيتانة فضية * Ablette (F).

Small bleak (E).

سمكة بحرية صغيرة القد فضية اللون تطول من ١٢ إلى ١٥ سم. حراشفها لؤلؤية المادة، صناعية، تلمس على الشرق وروح الشرق. تستعمل في صناعة اللؤلؤ الكاذبة.

١٢٩٩٩ - زيتب * Zkibel, مسك رصي ،

Polistes tuberosa (S). زيتب طرابلسي

Tubéreuse, T. des jardins (F). Garden tuberosa (E). Echte tuberosa (D). Tuberosa (I).

الواحدة زينة. نبات عشبي يصل صسمي مسمر من فصيلة الوردية. أوراقه خضراء مستطيلة مخددة النصل. ثمراته الأزهر سائي الشكل ، موزق ، يطول من ٧٠ إلى ١٥٠ سم. ازهاره سائي التجميع. ازهاره مستطيلة، جميلة، بيضاء اللون، فواحة العرف الذي يستخرج من ازهاره بالتقطير حطر فاخر عيّن. ازهاره يستمر من حزيران إلى تشرين.

١٣٠٠٠ - زيتكة هي انصالي كسموس ، اطلها .

١٣٠٠١ - زيتكية * Zinnia (S).

Zinnia (F). Youth and oldage (E). Zinnia, Schmuckzinnia (D). Zinnia, Fiori stellini (I).

جنس نباتات من فصيلة المركبات معقودة التبريد على اسم الطبيب البوتاني «زين» انواعها وفروها كثيرة المند جميعها عشبية حولية زينة مهدا للمكسيك. سوطها فراء تعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. اوراقها حاشنة متعاقبة جميلة الخضار. ازهارها رؤسية، فردية، تاجية الارتكاز ، عديدة الالوان السوية أو الموشحة. وهي من النباتات السروية المبلولة في جميع الحدائق، ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

١٢٩٩٩ - زيتونات Chromoporiées

مارة تطور مجهرية من فصيلة الطحيات . اجناسها ثلاثة : الأفيوكلاديم ، الميسايوفوز واليكروسترويه .

١٢٩٩٢ - زيتع القلع : ضرب من البوع صغار .

١٢٩٩٣ - زيتلوز، كسيلوز، عخبوز Xylose

مادة سكرية تستخرج من قصب اللوز الصغراء وقش الخنطة وعشب الزان ونبات الطويل الخ .

١٢٩٩٤ - زيتمكل Zymase

خيرة كيميائية تحول سروب السكر الى كحول وغاز كربوني .

١٢٩٩٥ - زيتولوجية * Zymologie (F).

Zymology (E).

الزيمولوجية علم التخمير أو الاغيار .

١٢٩٩٦ - زيتاب Zinebe

فاطور زراعي شديد اللع لا يلقي النبات يرتكر حل مادة كربمات الزنك يستعمل في مكافحة الامراض الفطرية اعصها الملبدير .

١٢٩٩٧ - زيتانة ، سمكة يضاء Salmo (S). Able, Poisson blanc (F). Bleak (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشبوطيات . انواعه عديدة موطنها بميرات واهر الشرق الاذل وأروية . جميعها صغيرة القد دقيقة | اعرف انواعه واشهرها الزيتانة الفضية .



زيتانة فضية



زيتب



زينة



س



ساج

13008 - سكاركة ، وليكمة Lamelle (F).

رأية صغيرة من الزجاجة متاحة في الفكة تستعمل لتغطية القنطرة المطلوب فحمها تحت الجهر .

13009 - ساج * ، دلب هندي Tectona (S). Tack, Tek' (F). Teak-tree, East Indian oak (E). Teakbaum, Indische eiche (D). Tek (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الساجيات . انواعها ثلاثة جميعها اشجار ضخمة دائمة وظلمة . اوراقها متعككة ، متقابلة ، رقيقة الشكل . نصلها خالي البشرة ، بارز العروق والشرايين . اغصانها عتقودي التجميع ، متصب الجلس ، ناهي الاوتكاز . اغصانها عتقوية صطرة ، بتلاتها ليس . ثمارها نوبوية كروية مأكولة . اغصانها شديدة الصلابة . وقصها كثيفة الاذرات المتراصة التي تحمّل دون الانفصال بالمواليد الخارجية . تستعمل خاصة في صناعة السفن .

13010 - ساجو Sajou

هو السوس قود من فصيلة السوسيات .

13011 - ساجول ، سوجل ، سوجلكة Clisse (F). Wicker (E).

غلاف القارورة يحبك عادة بالقضبان الخفيفة او بقند القصب .

13012 - ساجوم Moullant (F). Wetting (E).

كل سائل شديد اللبونة واللزوجة يضاف الى الادوية الزراعية ليزيد انتشارا واصفاً .

13013 - ساجيات Verbenaceae (S).

Verbenacées (F). Verbenaceae (E). وتعرف أيضاً برعي الحام . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التعملة . اجناسها وانواعها كثيرة

13002 - ساجي Septennal (F). Septennial (E). هو ما يدوم سبع سنوات او ما يمارد كل سبع سنوات .

13012 - ساجي Gagnant (F). Winner (E).

الذي خيل الحلية وهي عشرة عند العرب اولاً السابق المعروف بالهلي ثم المسلي ثم المسلي ثم التالي ثم المراتح ثم الماطف ثم الحظي ثم الخويل ثم الطم ثم السكت .

13014 - سابينيات ، سبتد يات ، سبتد ياتات Sepindaceae (S). Sapindacées (F). Sapindaceae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة مستقلة التعلالات . اجناسها 118 تشمل زهاء 1000 نوع . منها الاشجار والشجيرات والجنات والفسلفات والاشواب . اغصانها رباحية او لحسية التركيب . ثمارها كعبورية او نوبية .

13015 - سابيوت ، سابيوط Carpe (F). Carp (E).

هو الشبوط ، اطبل .

13006 - سابييا Sabia (S).

Sabie (F). Sabia (E). جنس نباتات جنسية معمرة من فصيلة السابيات . انواعها سبعة معظمها زراعي قزنيي || اغصانها كبيرة ، حملة ، حراء اللون ، كثيرة الاسدية الصفراء الملهبة || تزود في المراكن لانها تنقى البرد .

13007 - سابييات Sabiaceae (S).

Sabiaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة التعلالات مرتفعات البليس . اجناسها اربعة وانواعها نحو 20 جميعها جنات صغيرة واعشاب معمرة منها بعض مناطق افريقية الاستوائية والحارة || اشهر اجناسها السابيا .



سافراس

١٣٠٤٧ - سائل أرضية
Tige souterraine (F).
Underground stem (E).
هي الساق التي تنمو في التراب كالجنود .

١٣٠٤٨ - سائل حو
Ramier (mâle) (F).
Ring-dove (male) (E).
هو ذكر الورشان .

١٣٠٤٩ - سائل سوداء
Jambe noire (F).
Black leg (E).
وصم بكيري يركب البطاطا في سوقها ويدنأها فيلخيا
اشد الانى . مبيه الكروية البكنورية اطلها .

١٣٠٥٠ - سائل عاركة ، سائل عكة

Tige grimpante (F). Climbing plant (E).
هي التي ليس لها من لقوة ما يكفيها للانتصاب فتسلق
غيرها وترتكز عليه .



سافرية

١٣٠٥١ - سائل عكولة
Tige tuberculeuse (F).
Tuberous stem (E).
هي الساق المكونة من الدرن والساقل .

١٣٠٥٢ - سائل متكفية ، زاحفة

Tige rampante (F). Prostrate, Runner (E).
هي التي لا تستطيع الانتصاب في الهواء فتزحف على
الأرض .

١٣٠٥٣ - سائل ملتفة ، عنبية ، عطفة

Tige volubile (F). Twining plant (E).
ساق تلتف على دعامتها .



سافرة

١٣٠٥٤ - سائل متعصبية ، صعدكة
Tige dressée (F). Dress stem (E).
كل ساق تستطيع الانتصاب بطلها .

١٣٠٥٥ - ساكن
Stator
نمت تمرني يعلق على القسم الثابت من الحركات
الآلية .

١٣٠٥٦ - ساكي ، سكي
Pithecia (S).
Saki (F).
جنس قرد امريكية من فصيلة السبريات . انوله ٦
مولها شال ابركة الجنوبية || جميعا كسلانة قليلة
الحركة . اجسامها ربة . ورونها مستديرة شارفة الوجة .
قوامها متوسطة الطول . اذنانها طويلة جللة لا اخاذة
اوتاجا سوية الااليان يكثر فيها الاسر وشحاته . شموها
قليلة الكثافة متوسطة الطول . تألف الثباتات الثقيلة .
تسرح في الليل . مرتها الاشجار . جماعها قليلة العدد .
قوتها الفار والاسل .



ساكي

١٣٠٥٧ - سالك ، سلك
Serpent noir (F).
Black snake (E).
الانى السوداء الثوب .



سائل أسفغ

١٣٠٥٨ - سائل العروس هو القطيفة اطلها .

١٣٠٥٩ - سائل أسفغ
Selatosomus latus (S).
Taupin bronzé (F).
حشرة من الساليات طولها نحو ١٦ مم . ثوبها الى السرة
السفاد يملوها بواج اخضر || تركب ازودع والبقول .
رقبتها اسطوانية مسطحة كقوي جلود حلة نباتات .

١٣٠٥٥ - ساسفراش ، ساسفرا
Sassafras (S). Sassafras, Bois odorant (F). Sassafras
tree, Ague tree (E). Sassafrasbaum, Fenchelholz
(D). Sassafraso, Sassafrasso (I).

شجرة وسيدة الجنس والوع من فصيلة الفاريات . منبها
كثا وقطوريه . شخبها صناعي اصفر اللون ، خفيف
الوزن عطري العرف . اوراقها تشمل اشمال القليلات
والثوابل وذلك بمد تجفيفها وتحمها .

١٣٠٦٦ - ساسم هو الايتوس ، اطله .

١٣٠٦٧ - ساسمة
Ebénisterie (F).
Cabinet-making (E).
الاسمة نجارة الساسم اي الايتوس وغيره من الاشباب
الفاخرة المائلة .

١٣٠٦٨ - ساطور
Fendoir (F). Cleaver (E).
آلة حادة يقطع بها اللحم والعظم .

١٣٠٦٩ - ساعه
l'Horloge (F). Horologium (E).
الساعة كوكبة نجوم مقيمتها الجنوب . مركزها فوق كوكبة
النهر . عدد نجومها ٢٤ لها من المرتبة الخامسة .

١٣٠٦٠ - ساهو
Sagou (F). Sago (E).
دقيق نشوي مدق يستخرج من لب جلود بعض
التخلبات والسكاسيات التي تنبت في البلاد الحارة .

١٣٠٦١ - ساهوليه ، شجرة الساهو ، نعل
الشفا
Sagus rumphi, Metroxylon
sagu (S). Sagoutier (F). Sago-palm, Sago tree (E).
Sagapalm (D). Sago, Sagou, Palma de stoffe (I).
جنس اشجار معمرة من فصيلة النخلات . مبدعا البلاد
الطارة يستخرج من لب جلودها مادة نشوية مغلقة تسمى
سافر لها فاتها عند قوم تلك البلاد .

١٣٠٦٢ - ساف
Crin (F). Coarse hair (E).
شر الذنب والهلج .

١٣٠٦٣ - سافركه
Sparganion (S).
Sparganier (F). Reed-grass, Bur-reed (E). Igelkol-
ben (D). Sparganio (I).
جنس نباتات جذمورية مائية معمرة من فصيلة البولييات
انواعها المبرونة ثمانية . اوراقها متعاقبة لافنة مسطحة .
نصلها مرياني الصلصة الضيقة . ازهارها ابطة الانكاز
وعذبة ، فسية التجميع ، متباينة ، كروية الشكل .
اشهر انواعها شريط الماء .

١٣٠٦٤ - ساق
Jambe (F). Leg (E).
من اعضاء الحيوان وهي بين الفخذ والعرقوب .

١٣٠٦٥ - ساق
Tibia
هي في الحشرات العضو المستقيم الكائن بين الفخذ
والرُبع .

١٣٠٦٦ - ساق ، جلدع
Tige, Tronc (F).
Trunk (E).
هي المحور الاصل في النباتات الوعائية . تقوم على
الجلد وتقلو صعدا في سطر النبات وتوصل الانصاف
والورق والبر .

* ١٣٠٦٥ - سالكول حتملي *

Agriotes niger, *Elatér niger* (S). *Taupin velu*, *Agriote velu* (F).

نوع من السالكول طوله نحو ١٢ م. قويه الى السواد القسبي تملو خلة غبراء. يكثر وجوده في اوائل الربيع. يركب مع رقاته الجوزية اللون زروع الحطة والشعير وسائر التصيليات الزراعية والبرية والشوئدر وشاتل التبغ في الخقل.

١٣٠٦٦ - سالكول مشير *
Taupin rayé (F). هو سالكول الحصيد، اطله.

١٣٠٦٧ - سالكول منقط *، لائق منقط *
Lacon punctatus (S). *Lacon ponctué*, *Taupin ponctué*, *Lacon punctatus* (F).

حشرة غاصلة مفترسة من فصيلة السالكولات وربة معدقات الاجنحة. تألف غابات الصنوبر وأحراجة. غناها تمشل على بعض اوراق النباتات البرية وعلى ابر الصنوبر. يرقاتها تعيش على المواد الخشبية المتحللة وعلى ما تقتنصه من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد، يطول من ١٦ الى ٢٠ م. ثوبها اسود اللون تملو حرافش فضية شديدة الصغر تبدو كالتقط. رأسها كبير الحجم. فكاهها ضليمان. عيناها صغيرتان. زباناها عظيمان. ظهورها مستدير الطرف للاحسف. ارسافها خلمية المقل || الاثن اكبر لدا من الذكر واكد ثوباً منه واقتصر زبانا || جيلها رباعي الخيط. تظهر الحشرة في اوائل حزيران وتعيش حتى اواخر آب. تسرح في النهار. تسالط بعد ظهورها باسبوعين وترز للمكن في التربة تحت الجفلة || البرقة سلكية الشكل، ثنية اللون ثم تصفر مع تقدم العمر || طول الكمال الذي يستمر نحو سبعة اسابيع ينقضي في التربة على حد يراوح من ١٠ الى ٢٠ م.

١٣٠٦٨ - سالكولات *
Elatéridae (S). *Elatéridés* (F). *Elatéridés*, *Snapping beetles*, *Click beetles*, *Wireworms* (E). *Feldschnellkäfer*, *Schnellkäfer*, *Drathwürmer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة مهديات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد. زباناها مركبة من ١١ فاصلة وهي غشبية الشكل او مشابرة او مشطية. ارسافها خلمية المقل. من ميزاتها انها اذا رقت على ظهورها او وضعت كذلك تسقط لامتدادها ثوبها الطبيعي ونظماً ترفعها بضع سلتصمات ترافها قرقة خاصة. رقاتها اسطوانية مستطيلة، اجسامها قوية جلدية، لونها الى الصفرة العنابية || تركيب جلود وبيولور وصافل عدة نباتات.

١٣٠٦٩ - سالكولوم *، بكتدولس جبكي
Selinus (S). *Sélin* (F). *Milk parsley* (E). *Kummel-silge* (D). *Appio di montagna* (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الحميميات. منه البلاد المعتدلة المناخ. يكثر في بعض اقاليم سويس البحر المتوسط. يقال انه لا ينمو في المناطق الطبية المجبة للتصدية.

١٣٠٧٠ - ساءم *
Paltre (F). *To graze* (E). ساءم الماشية تادها الى المرعى ورعاه.

* ١٣٠٦٠ - سالكول اطحل *

Lacon murinus, *Brachylacon murinus* (S). *Taupin gris* (F).

حشرة من السالكولات طولها نحو ١٦ م. ثوبها حتملي تملو رقة للحداد. تركيب بيلات الورد واوراق بعض النباتات فتقرضها || البرقة صفراء اللون سلكية الشكل كثيرة الفقدور تركيب جلود الزروع والشوئدر والبطاطا وشاتل الاجار المشرية.

١٣٠٦١ - سالكول التبع *
Agriotes ustulatus (S). *Taupin noir*, *Agriote noir* (F).

حشرة من السالكولات طولها نحو ١٥ م. لونها اسود لامع. يكثر وجودها في اواسط الربيع، تعيش على مختلف النباتات البرية وتقتضم سوق شتول التبغ، عند جملها، يمتص على سطح التربة. يكافئ باستعمال اسد الحوافير الفصاة متفجرة على التربة عند آخر حرارة بقايا التشتيل.

* ١٣٠٦٢ - سالكول الحصيد *

Agriotes obscurus, *A. lineatus*, *Elatér segetis* (S). *Taupin des moissons*, *T. rayé*, *T. obscur*, *Agriotes des moissons*, *A. rayé*, *A. obscur* (F). *Striped elaterid beetle*, *Click beetle*, *Dark elaterid beetle* (E). *Saatschnellkäfer*, *Feld-Humusschnellkäfer*, *Düsterer-Humusschnellkäfer* (D).

اسم يطلق على عدة حشرات من السالكولات اجسامها متشابهة يصعب معها تمييزها. طولها يراوح من ٧ الى ١٠ م. الارباعا بنية اللون تملوها مشقة خلية. اتحادها جملة. رقاتها اسطوانية الشكل، مستطيلة القد، جلدية البرقة، صلبة التركيب، بنية اللون. ذنبية المسنوج تركيب مع رقاتها تخلف الزروع والبقول والتبرغ.

* ١٣٠٦٣ - سالكول الرياض *

Selatosomus cruciatus (S). *Taupin des futaies* (F). حشرة من السالكولات طولها نحو ١٢ م. لونها حتملي. فهدعا الى الصفرة النبراء تملوها خطوط سود || تركيب الاجار الحرجية والاربية اعصها السنديان والترنوين.

* ١٣٠٦٤ - سالكول بصاق *

Agriotes sputator (S). *Agriote cracheur*, *Taupin cracheur* (F). *Agriotes sputator* (E).

حشرة مؤذية غاصلة لاهمة من السالكولات معدقات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشالية. تألف المروج والمراعي والغلي والناقل. غناها تعيش على اوراق النباتات الحرجية والبقولية وعلى بيلات الاجار اعصها اذارا الفصيلة الصنوبرية. يرقاتها تعيش على جلود التصيليات والجزر والشوئدر || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ م. ثوبها الى الصفرة السوداء الكستنية المالح. رأسها معقودب الشكل يطول في مقدم الجنبية شبه ازار يمتد بين الزبائين. زباناها عظيمان طويلان. عيناها صغيرتان. كسلها معقل الايدياد، كثيف التشطيل والخل.

ارسافها خلمية المقل || الاثن اميز قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقتصر زباناها ونظماً بقاء || جيلها رباعي الخيط. تظهر الحشرة في اوائل الربيع وتبقى حتى اوائل الصيف. تسرح في النهار. يرقاتها بطيئة النمو لا تترك الكلال المسموري الا بمس ثلاث سنوات فيصبح طولها اذ ذاك نحو ١٨ م. ويستقر ثوبها على الصفرة النبراء السقاء المالح || طول الكمال الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوماً وينتهي بظهور الحشرة الجملانة.



سالكول اطحل



سالكول التبع



سالكول الحصيد



سالكول الرياض



سالكول بصاق



سالكول غط



سالكول خلي



سالكولوم

- 13071 - **ساق** Vénimeux (F). Venomous (E).
نمت تعريفى يطلق على كل حيوان حوى بعض السم ؛
او باستطاعته القلق سم لسا أو هنا الخ
- 13072 - **ساق أبرصى** هو الورقة ، اكلها .
- 13073 - **ساقك** Ichtyophaga, Placivora (F).
Ichtyophagous, Piscivorous (E).
مفرد بالسلك من مختلف الحيوان والبر .
- 13074 - **ساقيل** Limitvora (F). Limitvorous (E).
الذي يعيش في الاسماك والاولاد ويقتات من محتوياتها
المضوية .
- 13075 - **ساقور** Diamant brut (F).
Rough diamond (E).
هو اللسان الخام كما يوجد في الطبيعة (راجع ساق) .
- 13076 - **ساقه رؤى** Citharoxylum (S).
Citharoxylum, Côtelet, Bois fidèle (F). Fiddle-
wood, Savannah wattle (E). Gaigenholzbaum (D).
Legno fidèle (I).
جلس شجيرات برية من فصيلة الساجيات مهددا لبلاد
الاسعولية . اشجارها عذبة ، حمئة ، تستعمل في صناعة
آلات الطرب .
- 13077 - **ساقف** Caprophage (F).
Caprophagous (E).
نمت تعريفى يطلق على كل حشرة تعيش على ساق
القطانبات .
- 13078 - **ساقه** Produire alternativement (F).
To produce alternately (E).
ساقه الشجر : حل ساقه وتناوب اخرى . والشجرة الساقه
تسمى ساقه .
- 13079 - **ساقية** هي كناعورة . ج سواق .
- 13080 - **ساقج** Fumifuge (F).
Smoke-preventing (E).
نمت تعريفى يطلق على كل شيء او مادة تهدد الدخان .
- 13081 - **ساقج** Vent violenc (F).
Strong wind (E).
الرياح الشديدة الريح .
- 13082 - **ساقه** ، ذئب الكلب Cynosurus cristatus (S). Cynosurus, Crételle des
prés (F). Dog's tail-grass (E). Echtes lammergras (D).
Ventolans dei prati, Lentoians crestata (I).
نبات عشبي طافي بري من فصيلة النجيليات وسيط
المكشريات . مهدد حوض البحر المتوسط . يملو نحو
٦٠ سم . يتكرر في الحشاب والجبال وفي المراعي الطبيعية .
ثم جيد الصنف مغروب فيه .
- 13083 - **ساقهكة** Vent fort (F). High wind (E).
هي الريح القوية الهبوب تحرك الشجر .
- 13084 - **ساقور** Holo
الساقور كالماتة والظفورة ينفذ القشر بدارة .



ساق

- Dominant 13085 - **ساقك متفوق**
صفة السائل البيولوجي للطلب .
- 13086 - **ساقس** Palefrenier (F).
Groom, Ostler (E).
حامل يمسح اذيل فيقدم لها الطعام ويمسحها ويمسحها .
- 13087 - **ساقف** Assimilable
هو من المواد الغذائية ما كان قابلا لتفصيل .
- 13088 - **ساقيل الميزان**
ساق الميزان نجم يسير وراء نجوم برج الميزان فيبدو
كأنه يسوقها .
- 13089 - **ساقيل** Fluide (F). Fluide (E).
صفة الاجسام اللامسكة الاراث ، والسوائل تقسم الى
تسعين السوائل اللامسكة والسوائل الغازية .
- 13090 - **ساقيل** Bouillie (F). Wash (E). **محقول**
السائل حسب الاصطلاح الزراعي غليظ مالح مركب
من مواد مختلفة مذابة او معلقة في الماء . والسوائل
الزراعية عديدة تستعمل في مكافحة الحشرات والاورام
الفطرية .
- 13091 - **ساقيل بورغو ، محقول بورغو** Bouillie bordelaise (F). Bordelaise wash (E).
سائل مركب من كبريتات النحاس مع الكلس في الماء
يعدل ١٪ سلفات النحاس وقدره كلس حراق يضاف
القياس ١٪ كالزين . وهو اقدم الفواشير واعمالا انتشارا .
خصائصه ميزان عطيفة سببا انه يفيد النبات دون
ان يذوي الارواح ويسببها . يلتصق جيدا بجميع الاجزاء
التي يلتصقها . لا يحترق عليه من الوجبة الحسنة وعش
ثم الذي يحمله بمشاكل الجميع || وهو يمسح بمرج
معلق الكلس الحراق (الخام) مع مخلول سلفات النحاس
بنسبة واحد الى واحد او ٢ الى ٣ او ٤ الى ٤
او ٤ . واختلف هذه النسب يمد الى اختلاف النبات
والوسم الفطري للتقصير وزين الاستعمال . ويجب الا
يعزب من بال احد ؛
١ - ان النحاس هو المنتشر الفعال في هذا السائل .
٢ - وجوب تخفيف هذا السائل في اوعية خشبية او
فخارية .
٣ - مراعاة تماثل نسبة الكلس من سلفات النحاس
لان زيادة الكلس تلحق بفاقة السائل كفاطور كما
وان زيادة النحاس تذي فاعليته الفاسدة بالساق
والبشرة .
٤ - ان غليظ بورغو الجاهز المورق في الاسواق
لا يوازي السائل المنكح تخفيفه في الزمرة .
٥ - ان افضل ما يحضر واستعمل يربيا .
- 13092 - **ساقيل بورغوني** Bouillie bourguignonne (F).
سائل مركب من سلفات النحاس وكبريتات الصودا
مع الماء يعدل ٢٪ سلفات النحاس مع ١٪ كبريتات
الصودا . ولا يجوز استعمال هذا المخلول قبل ان يأكس من
زوال ساقفه ويمن ذلك باستعمال ورق الفرنشول الاحمر
فان ازرقته الورقة عند تطبيقها بالخليل كان السائل
قلوبيا وصح استعماله والا اضيف اليه ملوحي الكبريتات
حتى زوال اللون الاحمر .

١٣٠٩٢ - سائل حاشوري

Bouillie insecticide (F). Insecticide wash (E).

هو ما صنع خاصة للقضاء على الحشرات التي تتغذى على النباتات الزراعية وقد يختلف باختلاف المادة النشطة التي يتركز عليها ونسبة عنصرها الجاف.

Bouillie arsenicale (F). سائل زرنيحي (E).

كل سائل حاشوري يدخل في تركيبة الزرنيخ. ولما كان الزرنيخ من السموم الفتالة لذلك يجب استعماله بدرجة لا أن لا يتسبب استخدامه أبداً زمن الإزهار والمعد.

Bouillie au savon (F). سائل صابوني (E).

يتركب من كبريتات النحاس والصابون في الماء وذلك بمعدل ٢٪ كبريتات النحاس مع ٢٪ من الصابون. وقد يضاف مذوب الصابون حتى أزرقاق ورقة الطرشول.

Bouillie fongicide (F). سائل فاشوري (E).

هو من السوائل ما جعل خاصة لمكافحة التطور والقضاء عليها.

Bouillie cuprique (F). سائل نحاسي (E).

هو كل سائل كانت إحدى مواد النحاس من مركباته المتصهرة الرئيسية.

١٣٠٩٨ - سائل نووي

Enchylème, Suc nucléaire (F). Enchylème, Nuclear succus (E).

هو السائل اللطيف الذي يحيط بالجذبة.

١٣٠٩٩ - سائل هضم

Suc digestif (F). Digestive succus (E).

عصارة حامضة طبيعية تفرزها المعدة لتسهيل هضم الطعام وتخليه.

١٣١٠٠ - سائلة ، سائلة

Liste en tête (F). من شيات الخيل يعي لفرة التي تسيل على قصبه الانث .

١٣١٠١ - سائلة

Quadrupède herbivore (F). Herbivorous quadruped (E).

السائمة كل راعية من الدواب . ج سوائم .

١٣١٠٢ - سبائك

Alchiba السبا نعيم من كوكبة الغراب ويدهى أيضاً غياه ويتقار الغراب .

١٣١٠٣ - سبائك

السبا : البدو يحمله الليل من بلد الى بلد . ج سبايا .

١٣١٠٤ - سبائك ، سبائك

Vin (F). Wine (E). هو الخمر الجيدة . والسبائك : بياح الخمر .

١٣١٠٥ - سبائك

Index (F). Fore finger (E). السبابة والسبة والسبابة والمشيحة هي الاصبع التي تلي الإبهام .



سبائك

١٣١٠٦ - سبائكيات

Pterophoridae (S). Pterophoridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٦٠٠ منتشرة في معظم اسواق العالم || تسرح من الدروب الى قصبه الليل . طوائها خفيف الحركة ، محتدل القرصه والجرم || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، قضيفة . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ، ناشرة . قرونها الاستشعارية نحيلة . ملابسها نحيلة . مراهقها مستطيلة . حلماتها مقعده . بطونها سهيفة الحمل ، عادمة الزغب . روافشها صغيرة ، مستطيلة الشكل . الامامية منها ثنائية الاصابع المنثقة الاطراف ، الخلفية ثلاثية الاصابع المستقيمة . جرامها تامة النور . ظنايبها الخلفية مستطيلة ، ثنائية المناسخ الطويلة || اساريها مستطيلة الاجسام ، زبده . تموش داخل الثمار او داخل الافناد التي تنقبها وتغذها || خادراتها تحمي طور الاكمال مؤبسة معلقة بالحصيفة او مؤزرة بحيط حريري المادة .

١٣١٠٧ - سبائك

هو البستان المد لزراعة البقول ، راجع بستان خضر .

١٣١٠٨ - سبائك

هو الزيل ، راجع .

١٣١٠٩ - سبائك

علم يبحث في التغيرات الدورية التي تطرأ على مستوى سطح المياه في مكان معين .

١٣١١٠ - سبائك

Sargus annularis (S). Sargus spirallion, Sargus, Spartin (F). Sar, Sargo sparus (E).

سمكة بحرية من السرغوس وفصيلة الفرغيات . تكثر في المتوسط . جسمها صغير القد ، بيضي الشكل . نوبا الى الكهبة الفضية يملؤو تجنبح بافت . وفي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

١٣١١١ - سبائك

Bouldre (F). الموضع المنخفض لجميع النفايات من تراب وواضخ .

١٣١١٢ - سبائك الطير

Oiseaux de proie, Rapaces (F). Rapacious birds, Birds of prey (E). رتبة من الطير تدعى الجوارح .

١٣١١٣ - سبائك الأسماك

Heptandre (F). لمت وصني تعريفي يطلق على الازهار المسببة الاضواء الذركية .

١٣١١٤ - سبائك

Heptagone (F). كل شكل هتاسي سبع الاضلاع .

١٣١١٥ - سبائك

Heptagyne (F). لمت وصني تعريفي يطلق على الازهار التي يحمل وزجها سبعة اقلام .

١٣١١٦ - سبائك

Bague (F). Ring (E). السبائك خاتم في رجل الطائر من جارح وغيره .

١٣١١٧ - سباق الخيل (F). Course de chevaux (F). Horse-race (E).

ركض الخيل لمعرفة أكثرها صلابة وقوة وصلابة وتجاعة . وسباق الخيل من أنواع الرياضة التي اشتهر بها العرب . وكانت خيل السباق تعرف بالحلبة (راجع سابق) . وسباق الخيل يجري الآن في ميادين خاصة وفقاً لنظم مرمية الاجراء يتتبع بها كل صاحب جواد .

١٣١١٨ - سبائك (F). Moustaches des animaux (F). Whiskers (E).

السبال عند الحيوان كالسودل او الشارب عند الانسان . وهي مجموعة من الحلب تملو الشفة العليا .

١٣١١٩ - سبائك (F). Sabal

جنس نباتات برية و زيربونية من فصيلة النخلات . انواعه عديدة . معظمها جلبي وبعضها شجري . اوراقها زنادية ، مروحية . ازهارها كالفوري سحرها كثير القزوع . جانبها نصفية . ازهارها عشوية ، لائحة الزركاز . ترتيبها ثلاثة البلات . ثمرها كروية الشكل ، صغيرة القد ، سوداء اللون ، ثلاثية البذور ، غير مأكولة . اشهر انواعه ما يلي .

١٣١٢٠ - سبائك أدسون * (F). Sabal adsonii (S). Sabal d'Adson, S. glabra (F).

ساله شتوية . اوراقه مروحية ، هيئة التشرم ، قشرها نحو النسر ، لونها الى الأخضر البهري ، زلادها متصب الزركاز يملو نحو ٩٠ سم . || يشكو من مقوره الاشمالي الذي يقوده الى كثرة الفسائل .

١٣١٢١ - سبائك أمير (F). Sabal blackburniana (S). Sabal prince (F).

بطي . النمو ساقه تملو نحو عشرة امتار . قشرها يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . اوراقه حيلة الخضار . الباقي قشرها نحو ١٥٠ سم . زلادها باحت اللون ، جانبي الزركاز يطول نحو ٨٠ سم . || يرغب في المواقع الرطبة ويحب في الحدائق المحصنة .

١٣١٢٢ - سبائك مكسيكي (S). Sabal mexicana (S).

Sabal du Mexique, S. serruati (F). بطي . النمو . جذعه يملو نحو ٦ امتار . اوراقه مضفرة قشرها لا يقل عن ١٣٠ سم . زلادها منشاري الحافة يطول من ٧٠ الى ٩٠ سم . || اقليمه الشولفي البحرية . يرغب في الاراضي الرطبة والمواقع الدافئة .

١٣١٢٣ - سبائك مؤتف * (F). Sabal umbrellifera (S). Sabal paraol (F).

نوع من السبال . موطنه جزر الانثيل وبني وكوبا . جذعه متصب ابيض يرتفع من ٨ الى ١٠ امتار . اوراقه كبيرة ، مروحية ، قشرها نحو ٢٠٠ سم . لونها الى الخضار البهري . زلادها مؤتف شائك يطول نحو ١٠٠ سم . || يرغب في الارربة المعتدلة الانساج والرطوبة .

١٣١٢٤ - سبائك لجيمي (F). Sabal minima (S). Sabal acule (F).

نوع من السبال العادم الجذع . اوراقه مستطيلة الزناد . نصلها كثير التشرم ، جميل الخضار الزلاني || يرغب في الارربة الخفيفة المعتدلة الرطبة ، بمعنى المواقع الباردة . تكثر زراعته في المراكب .

١٣١٢٥ - سبائك نخلي * (S). Sabal palmetto (S).

Sabal glaucescent (F). ساله قصيرة . اوراقه طويلة الزناد ، مستطيلة الخوص المنتعجة . مستطيلة الزرع . كثيرة التفريش . نصلها الى الخضار البهري وتحسين عند انصاف زلده الثالث . يرغب في الارربة المنصبة الانساج والرطوبة . يزرع في المراكب والحدائق . يتكاثر بالبذر .

١٣١٢٦ - سبائك (F). Considérant (F). Preamble (E).

هو في القرب المحقوقي احد الاسباب التي تبين عليها الحكم سواء اكان قضائياً ام اداليا .

١٣١٢٨ - سبب (F). Cause

هو القصد الذي يلزم في سبيله شخص نحو شخص آخر . وقد يكون ناقماً وعاطفاً ورافعاً وعطوفاً وصورياً الخ .

١٣١٢٩ - سبب الابتلال (F). Rescisoire (F).

هو السبب الاصل الذي بني عليه الابتلال .

١٣١٣٠ - سبت * (S). Alcea scifolia (S).

Alcée rose, Passe-rose, Rose de mer (F). Andwerp hollyhock (E). Stockrose (D). Altes rosea (I). نوع من الخيلاني وهو نبات زراعي زهري ممر يملو من ٥٥ الى ١٠٠ سم . ساله فرطه . اوراقه عشائية . نصلها خامسي التفريش سنن الحافة . ازهاره كبيرة مكسية قشرها نحو ٥ سم . لونها الى الحمرة الوردية . ازهاره يستمر من حزيران الى الجليل .

١٣١٣١ - سبت (F). Pneu tannée (F).

Tanned leather (E). جلد البقر وكل جلد مدبوخ لا شعر عليه . وان كان عليه شعر ووبر وصوف فهو مصحب .

١٣١٣٢ - سبتفلموم * (F). Septoglossum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات . انواعه ثلثة اللد والاذي تنيش على الانداد والاوراق . || كئانه فسية التجميع ، تنيش اللون ، ثلثا في الادة . بوياته مستطيلة الشكل ، مؤترة ، وربة الانقسام الثلاثي او الخامسي || اشهر انواعه سبتفلموم الشيليك .

١٣١٣٣ - سبتفلموم الشيليك * (F). Septoglossum fragariae (S).

فطر مجهري يركب اوراق الشيليك البهري والزراعي . مظهره الخارسي يقع سماء اللون ، فزينة الاطار ، مرقعة الزرايا ، قشرها يراوح من ٣ الى ٨ سم . تركيب نصل الاوراق توتجها || يتكاثر بتغير الحليل من ١٥ الى ١٧ ٪ بواسطة الحامض الكبير في الحليل من ١٥ الى ١٧ ٪ .

١٣١٣٤ - سبتفوميكس * (F). Septomyxa

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات . انواعه عديدة معظمها رمية تركيب الاعشاب المقطوعة والمواد العضوية . تتميز بوياتها المحصنة الناشئة في الطبقة الادية . كئاندها مستطيلة ، مؤترة ، شائعة ، قياسها نحو ٣×١٥ ميكرون .



سبال ادسون



سبال نخلي



سبت



سبتفلموم الشيليك

الرطبة وتتغذى على نشاطات اشم الشمس || يلعو على الأساط والأغاد يقع صغيرة عديدة مبرحة أو كيفية التجميع نقل الحركة التنسية وتكونت لنمو || في سبيل الوقاية يمسح حطب البصل في أماكن موهبة ثم ترمضه بعض الوقت لاشعة الشمس المباشرة .

١٣١٤٢ - سبجة الشهبان

Colletotrichum claviae
نظر مجهري يركب اوراق الشهبان فوطجيا || مظهره الخارجي نقط سود مبرحة تملأ صفحة التصل تضيق سبر التنفس وتكونت التنويسي الى الاضرار والالزاح || يكافح باستعمال اللسائل النحاسية الحيدة بمعدل ١ %

١٣١٤٣ - سبجة الكتان

Colletotrichum lini
نظر مجهري يركب الكتان في مختلف ادوار وتكوين من حين انتشار البزرة في التربة حتى الاضرار وتكوين البزور الجديدة || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة فضاء اللون سمراء المائلة تركب السوي والاوراق وتتلحظ الزهرة وانحاءها || يكافح بتطهير البذار بواسطة الاملاح الفلزيقية .

١٣١٤٤ - سبجيل

Spigelia (S). Spigelia (F).
جلس نباتات شتية حولية او مسمرة من فصيلة الورديات . انواحه ٣٠ بعضها زينة ومنها البري الطبي . سوفها نزهاء . اوراقها متعاقبة لائحة لائحية الشكل . ازهارها انبوية . ثمارها جرداء كروية الشكل صغيرة القد . بزورها دقيقة . اشهر انواحه مالي .

١٣١٤٥ - سبجيل طبي * ، عشبة الهند

Spigelia anthelmia (S). Spigelia anthelmintica (F).
Indian pink, Worm grass (E). Indisches wurmkraut (D). Spigelia, Erba de bachi (I).

نبات عشبي طبي بري حولي يلعو من ٢٥ الى ٤٠ سم . اوراقه متعاقبة سنائية الشكل . ازهاره دقيقة لونها الوردية ، باطنها اصفر ، ثمارها جرداء كروية صغيرة القد || اوراقه وازهاره وسوقه طيبة موعودة وطاردة للديدان .

١٣١٤٦ - سبجيل ماريلاندا

Spigelia marylandica (S). Spigelia de Maryland (F).
شتية سبروتية مسمرة تلعو من ٤ الى ٩٠ سم . اوراقها كاملة . نصلها يضيي الشكل ، ذات اقسام الاخير ، خلي المروق . ازهارها مستطيلة خماسية التخصيص . صفراء اللون كمارها كروية مزدوجة || ازهارها يمش من ايار الى تموز .

١٣١٤٧ - سبجيليات

هي الورديات نصيلة نباتية ، اطباها .

١٣١٤٨ - سبجي ، قلايدي

Moniliforme (F). Moniliform (E).
لمت تمريري يدل على شكل خاص من اشكال الزباني ونحوها قوامه فواصل سبية متتابعة ثقبه البهجة او القلادة .

١٣١٤٩ - سبجينة ، عديقة

Sreptococcus (F). Sreptococcus (E).
ويقال لها مكورة سبية ومكورة عقدية . بكثيره مستديرة الشكل شائعة توجد في كل مكان . تكثر بنوع خاص في المواد المغانة .

١٣١٤٥ - سبج

Ochropsora
نظر مجهري من نصيلة الورديات وحيد الجنس النوع يتميز بالبيات المبردة وبدماماته الاسطوانية الشكل القصيرة القد والتلطيظ القامدة || يتفعل على الثيرة فيركب الاوراق حل صفحتها السفلى . مظهره الخارجي يقع نصيلة لائحية الشكل والحجم لونها الى الصفرة ثم تتحول الى الخنثي حيث يرفع البشرة وتقرسها || اضراره زديدة لا تتسبب للكافة .

١٣١٤٦ - سبجة

Colletotrichum
جنس تطور مجهري من نصيلة الورديات . يتميز بحله الملون القائم على التسميات الكثيرة || انواحه عديدة وفوطية ، اعرفها ما يتج .

١٣١٤٧ - سبجة الاسبانج

Colletotrichum spinaciae (S). Anthracnose de l'épinard (F). Spinach anthracnose (E).
نظر مجهري يركب اسفل الاسبانج فيصيب يباس الاوراق مظهره الخارجي يقع يضي طمرا من ١ الى ٢ سم . تركب نصل الاوراق حل صفحته . قصاته سرفلية ، كتابه وشية مستوية او قليلة التجميع ، قيلمها ٣×١٧ ميكرون || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية .

١٣١٤٨ - سبجة البطاطا

Colletotrichum stramentarium, C. solanicoles (S). Darcose de la pomme de terre, Enroulement flasque (F).
نظر مجهري يصيب البطاطا فيسطب للشع ويقرح الودن . مظهره على السوي قبل الاضرار وبمده سقم ويحل واستاطلة ثم قليل وانفلات في الاوراق يقع يباس التصل . وهو من الدمرات والجلود والسوي ، حتى ارتفاع ٢٠ سم . يقع صغيرة مفرقة الزوايا ، فضاء او سمراء اللون باضة اللون . ومنه قطع البزرة المصابة يسلط ، حل مقطعا ، ويوجد حلقه صفراء او سمراء اللون تملأ المنطقة القشرية . يقال انه لا يعيش في المناطق التي تلعو ٦٥٠ مترًا وانه يرغب في المناطق الظليلة || يكافح بتطهير البذار وباحتجاب الاربة الموربة .

١٣١٤٩ - سبجة البندورة

Colletotrichum phomoides
نظر مجهري يركب ثمار البتورة قرب ادراكها نضجيا . مظهره الخارجي يقع مستديرة غالية اللون مبرحة ثم مراكية تشبه البشرة ثم الب || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية وبهم من يضيف الكبريت .

١٣١٥٠ - سبجة الحمضيات

Colletotrichum gloeosporioides (S). Anthracnose des citrus, A. des limes (F). Anthracnose of limes, A. spot, A. tear-stain (E).
نظر مجهري يصيب بعض اناجس وانواع الليمون منها الاراج والليمون الهندي والخامض والمحو والتانج والبرتقال . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سمراء اللون تركب نصل الاوراق يقابلها جفاف في نواحي الاثنان فيصيب يباسها . يكافح باستعمال سائل بوردر المحلول ١٪ او غيره من الفولباير الحديثة .

١٣١٥١ - سبجة الزيتون

Colletotrichum circinans (S). Anthracnose des lilacées (F). Anthracnose of lilacosa (E).
نظر مجهري يركب بصل الزيتون وسوقه . يسلط في المواق



سبجة البتورة



سبجة الحمضيات



سبجة الزيتون



سبجيل طبي

١٣١٦٦ - سيروة المتوسّط

نوع من السيرو يعرف بأبي اليسر، الحليه .



سيد شام

١٣١٦٧ - سيرو غولة ، شيفككة

Spergula (S). *Spergula*, *Spergula* (F). *Spurry* (E). *Spark*, *Sparck* (D). *Spergola* (I).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من القرنفليات .
سوقها خضراء غبراء . اولها ثلاثة لافقة متعاقبة غريبة الشكل .
ازهارها فردية ، زنادية ، صغيرة القد ، ريمية || اشهر
انواعها السيروغولة الحولية .



سيرواله

١٣١٦٨ - سيرو غولة حكيمة *

Spergula campestris (S). *Spergula des champs*, *Spergula* (F). *Sylvan spurry* (E).

نوع من السيروغولة الزراعية الحولية تنمو من ٢٠ الى
٥٠ سم . تزدهج في الرباعي الاستوائية لانها تنبت من
الاصشاب للشفقة اللطيفة التي تغني الاقدار الحلوب وتغنيها
على الدرد .



سيروغولة حكيمة

١٣١٦٩ - سيرووت ، سيروتي

Rustique (F). *Rustic* (E).

لمت تعرفي يطلق على كل نبات لا يتطلب تربة صينة
ومناخ خاصة ويقتضيه

١٣١٦٦ - سيرو ٥

جنس شجرات عشبية من فصيلة القرنفليات || انواعها
عديدة . اسمائها متنوعة القد وسيرو . زياتها شوكية ،
مستطيلة ومقومة . رقائقها تعيش على المواد الخشبية الحية
واليابسة || اشرف انواعها واسمها ما يلي .



سيرود امير

١٣١٦٧ - سيرود اشهر ٥

Saperda carcharias (S). *Saperda chagrinata*, *Grande saperda* (F). *Gross popular borer* (E). *Grosser Pappelbock* (D).

نوع من السيرود طوله يراوح من ٢٢ الى ٢٨ سم . نوبه
الى الخيطي الاخير تملو نغمة سوداء . عليه غصن لكتلة
اصعب اللون || يرقته غاشقة تفرس جلود الحور
كثيرة لفضله .



سيرود البندق

١٣١٦٨ - سيرود البندق ٥

Oberon linearis (S). *Saperda du noisetier* (F). *Oberon linearis* (E). *Haselbock* (D).

نوع من السيرود طوله نحو ١٣ سم . نوبه الى السوداء
الاسف . زياتها واربعه صفر || يرقته تركب اشد
البندق تفرسها وتسبب يباسها .



سيرود الحور

١٣١٦٩ - سيرود الحور ٥

Saperda populea (S). *Saperdu du pappier* (F). *Popular borer* (E). *Kleiner Pappelbock* (D).

نوع من السيرود طوله نحو ١٣ سم . نوبه حتى اللون ملو
مراجل بني . عليه كثيف التجميع اسفر اللون || يرقته
تركب الحضان واثنان الحور تفرسها وتعلبها .



سيرود سلمي

١٣١٧٠ - سيرود سلمي *

Saperda scalaris (S). *Saperde echelle* (F).

نوع من السيرود طوله نحو ١٦ سم . نوبه الى الخيطي
الاطول المواجه يملو تجزيع وزدائس سود تشبه السلم .
عليه قليل التجميع اسفر اللون || يرقته غاشقة غالبة
تركب مختلف الاشجار والاصشاب اسمها السليمان
والجوز والحور والتفاح والكرز تفرس غدا وشكير الاشجار
الحية والاصشاب اليابسة .

١٣١٥٠ - سيروة حي اللقح ، الحليه .

Marais salzet, *Selin* (F). *Salt marsh* (E).

كل ارض تركبها المياه البحرية وتسبب فيها الملح .

١٣١٥٢ - سيرويات

رتبة من الحالبات اجناسها وانواعها كثيرة العدد تنسج
الى نصليين الروكيات والصرويات .

١٣١٥٣ - سيرو

سيد الفرخ بدا ريشه يشبه .

١٣١٥٤ - سيرو

ما يطلع في رؤوس النبات وراعه قبل ان ينشجر . ج اسباب .
والسيد ما تلبه من الشر او الور .

١٣١٥٥ - سيرو

الجزء الباقي من البزرة او الحبة .

١٣١٥٦ - سيرو

Caprimulgus (S). *Engoulevent* (F). *Goatsucker*, *Nightjar* (E).

جنس طير من فصيلة السيديات . النوع ٧٥ مقترنة
في جميع الاقطار . اجسامها مستطيلة . رؤوسها حلقة
مقلطحة . مناليتها صغيرة . اشداها . واسعة . انماها
قصيرة . اجسامها غشقة مستطيلة . اسنانها قصيرة
مسرلة || تقترن في الارض بين الاصشاب والادغال .
انماها تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها من ١٦ الى
١٨ يوما || جميعها من الرواس القواطع . قريبا
الغدرات حل اختطافها || اشهر انواعها السيد القاطع
والدعوة .

١٣١٥٧ - سيرو شامك ٥ ، ابو شامي

Caprimulgus vulgaris (S). *Engoulevent commun* (F). *Common nightjar* (E).

نوع من السيد طوله ٢٨ سم . وريشته ٥٨ سم . ريشه
شديد النعومة متوسط اللون لونه الى القمرة والسواد يملو
تديج وتديج وتؤشج || وهو من القواطع يحوي البلاد
في طلب المصيف والشمي يقترن في لبنان بغير النش .

١٣١٥٨ - سيرويات

Caprimulgidae (S). *Caprimulgidae* (F).

فصيلة السيديات من رتبة الجوارح للثدييات اللاتير .

١٣١٥٩ - سيرو ، استيكل ، ارجماس

Soudage (F). *Souding* (E).

نحري حتى الطبقات الارضية وتناموها .

١٣١٦٠ - سيرو

Glaréoles (F). *Glaréoles* (E).

جنس طير من السيديات القرنفليات . انواعها المعروفة
١٥ جميعها من القواطع . اسرارها قليلة العدد . تألف
الشعيرد الزلية والمناخ السيقة . انواعها رصاصية اللون .
اعتناها ويطونها بيش . قوادها واطراف ادناها ، الغافة
سود || اشهر انواعها سيرو المتوسط .

١٣١٦١ - سيروكية *

Sobralia (S). *Sobralia* (F).

جنس نباتات تربينة من السليبات . منها اريكة
الوسلي . ازهارها خلية البفرة ، حبة الشكل ، مزركشة
الالوان الغلة الزلية للوانج || تزدهج في الماكن
والعاصري .

Sepsis (S). **سَيْسِيدَة** ١٣١٨٢
Sepsis (F). **Sepsis (E).**
 جنس حشرات من فصيلة السبسيديات ورتبة ذوات الجناحين. أنواعه المعروفة عديدة أصلاتها مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٦ م. رؤوسها شبه مكورة ، مستقلة ، حولها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل. ملاسها غامرة . أخطاها صغيرة . كولسها شبه اسطوانية ، محزورة . بطونها خفيفة القاعدة والمؤخر . وراشها قليلة الخضاب. قوائمها مستطيلة . أطواها كبيرة ، جميعها وحيدة اللون || الجملانة تعيش على رقيق الأزهار اغصانها الخشبية . البرقة نائلة او دامتة .

Sepsidae (S). **سَيْسِيدِيَّات** ١٣١٨٣
Sepsidae (F). **Sepsidae (E).**
 فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وألوانها المعروفة عديدة منتشرة في جميع أقطار العالم || أجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها مكورة ، مستقلة ، حولها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . ملاسها صغيرة او غامرة . بطونها خفيفة القاعدة والمؤخر . وراشها قليلة الخضاب . افخاذ وفنابيب قوائمها الامامية والخلفية مزودة بمخاض حادة || ذكور بعض أنواعها مجهز بلدد تنضح افرازات عرفها كعرق الخنثوق || الحشرة الجملانة تعيش على رقيق الازهار او على المواد النباتية او الحيوانية الجزئية المتحلل . البرقة قد تكون غاضلة او دامتة او لائلة او للابسة || الشهر اجناسها السبسيدي .

Tribu (F). **سَيْسِيدَة ، قَيْسِيدَة ، رَيْسِيدَة** ١٣١٨٤
Tribe (E).
 مركزه في تصنيف الاحياء بين الفصيلة والجنس . لذلك فالفصيلة تشمل بعض الاسباط والسبط يشمل عدة اجناس .

Sepit ١٣١٨٥
سَيْسِيدَة نبات كاللبن مرعى جيد (السان) .

Septupler (F). **سَيْسَع** ١٣١٨٦
To increase sevenfold (E). ضاحك الشيء سبع مرات .

Bête féroce (F). **سَيْسَع ، سَيْسَع ، سَيْسَع** ١٣١٨٧
Carnivorous animal (E).
 هو الحيوان المفترس . ج . أسع وسباع م . دببة . ومن الطيور ما أكل اللحم غليظا . وأرض سبه اي كثيرة السباع .

Sepit ١٣١٨٨
سَيْسَع هو الجبيل ، اطلبه .

la Bête (F). **the Beast (E).** **سَيْسَع** ١٣١٨٩
 كوكبة نجوم مشهورة باسم القلب ، اطلها .

Baguer (F). **To ring (E).** **سَيْسِق** ١٣١٩٠
 سبق الطائر اذا جعل السباق في رجليه .

Epi (F). **Ear of corn (E).** **سَيْسِكَة** ١٣١٩١
 السيلة والسبيلة : السنبلة من الحنطة وقمحها . وهي ايضا شكل من اشكال الازهار قوله محور تجتمع حوله الازهار وتتصاقب || يقال اسبل الزرع : اذا غرست سبلته .

Glaeolidae (S). **سَيْرِيَّات** ١٣١٧١
Glaeolidae (F). **Glaeolidae (E).**
 فصيلة السم من الزرقائيات تنتمي الى رتبة طواك السك .

Cypris (S). **سَيْرِيَّس** ١٣١٧٢
Cypris (F). **Cypris (E).**
 جنس حيوانات مائية من القشريات الدنيا الصفيات وفصيلة السبربيات . أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم انهر وبحيرات وبتاقع العالم القديم || اجسامها عديدة الصغر ، حادة التسكم ، مستطيلة الزباني . أخطها ملونة ، ملسة ، رقيقة ، ثنائية المصارع الصغية المادة .

Cypridinidae (S). **سَيْرِيَّيَّات** ١٣١٧٣
Cypridinidae (F). **Cypridinidae (E).**
 فصيلة حيوانات مائية ، بحرية ونهرية ، من القشريات الدنيا الصفيات || اجناسها وأنواعها كثيرة العدد بعضها بحري والبعض الآخر نهري || تتميز بأخطها الثنائية المصارع الصغية || أشهر اجناسها وأكثرها انتشاراً السبربي .

Sey ١٣١٧٤
سَيْرِيَّك هو نصف المعروف ، اطله .

Seps ١٣١٧٥
سَيْسَس
 من سمم الحيوان لفرق الذكور امين الملوف . هو اللعانة ، واجبها .

Gongyle ocalé (F). **سَيْسَسْ أَنْصَر** ١٣١٧٦
 هو اللعانة النمرة ، اطلها .

Seps chalcidé (F). **سَيْسَسْ مَحْفُظ** ١٣١٧٧
 هو اللعانة المحظية ، اطلها .

Savane (F). **Savanna (E).** **سَيْسَب** ١٣١٧٨
 هو المفازة الشاسعة للترامية الاطراف كرت مروجها واشجارها الطويلة المرمية .

Felis ruppelli (S). **سَيْسَب** ١٣١٧٩
Chat de Ruppell (F). **Cat of Ruppell (E).**
 نوع من السنائير البرية قريب الشبه بكتاف . موطنه الحيشة والندوة ويصر . جسمه يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . وزنه من ١٦ الى ١٨ سم . ثوبه الى الصبغة الرمادية يمتزج مع اقترابه من شمس الظهور ويعلو ويمرغ .

Seyistan ١٣١٨٠
سَيْسَتَان هو الديق ، اطله .

Cybister (S). **سَيْسَتَر** ١٣١٨١
Cybister (F). **Cybister (E).**

جنس حشرات مائية مفترسة من عمديات الاجنحة وفصيلة الكيزويات . أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم اغصانها المناطق الحارة . اكثر انواعه يألف المياه العذبة وبعضها بحري . قوتها كل ما تيسر من حشرات وقشريات وبلابيط واسماك صغيرة || اجسامها كبيرة اقتره ، املحبيبة الشكل ، مبطلة . تتميز بكبر قوائمها الخلفية ايجافية الشكل والاستمال . أطواها سرية الألوان المابقة يكثر فيها الجروي والكسني والبي والاشهر اللامس .



سبرس



سيسب



سبينيلس

Cabus (S). **سَبُون** *، **سَجُون** *
Sajou (F). Sajou, Sapajou (E).
جلس قرد امريكية من فصيلة السبونات. أنولاه ١٩
موطها يمتد من البرازيل الى نيكاراغوا || اجسامها
رشقة. رؤوسها صغيرة. قوائمها متوسطة الطول. اذنانها
كاسية معلقة لا اعادة. اذنها قصيرة الشعر اليد
التيان الاولان || تألف القنات. مرتها الاجرام
تسريح في قمها || جماعها قليلة العدد تتألف من
ذكر وثلاث اناث ويضئ الجراء || قوتها الجار والبرام
والشحات ويضئ الطير.

Cabidae (S). **سَبُونِيَات** *
Cébidés (F). Cébidés (E).

فصيلة قردة من المكاربات موطها البلاد الامريكية.
انواعها المروفة ٦٦ تنجسها ١٥ اجناس. تتميز بجلودها من
الاضواء والكتائب. باستطاعتها اجسامها الرشقة وباذنابها
الاخاذا || تألف النباتات والارواح الكثيفة الرطبة.
تعيش على الاجبار تنقل حليها بقعة مدعشة. جماعها
تد من ٢٠ الى ١٥٠ || قوتها الجار والبرام والحشرات.
انثا تقسم من جرد الى جردون || اما اجناسها
فهي التالية بالترتيب الابجدي: آكل، اواكرى،
كركيل، دروكلي، ساي، سيوس، ستور،
كرزوريكسي، كليترش، لقوقيش.

١٣٢٠٣ - **سَبُون دَهَنِي** هو الدرع، اطله.

١٣٢٠٥ - **سَبُونَه** هي اليسان الاسود، اطله.

١٣٢٠٦ - **سَبُون**، **ثُوم قَسِي**
Allium fistulosum (S). Ciboules (F). Welsh onion (E).
نبات يصل عمره من فصيلة البقوليات. اولاه قمرية
الانتساب متصبية تطول نحو ٣٠ سم. يتصلها شراخ
اجوف يصل نحو ٥٠ سم. تكلمه قمرية كثيفة، سيوانية
الفكل، اذها يضئ اللون غمر المراج || ضرره
الرعاية عديدة جميعها ترطب في الارابة البالية الخفيفة.
وي تستعمل كحلبة وليس كحمة.

Crin (F). Coarse hair (E). **سَبُونِي**
السبي من الفرس: شعر النامية والرف والذنب.
فروس غثيف السبي. الرواسدة سبية.

١٣٢٠٨ - **سَبُونَج** هو الجيار، اطله.

١٣٢٠٩ - **سَبُون**، **كَحُول**

Alcool, Esprit-de-vin (F). Alcohol (E).
سائل يستخرج من تقطير التينة او صير العنب المختصر
او غيرها من التار والحبوب وغضف المسواد النباتية
المختصرة || وهو سائل شفاف. سويج التبخير،
حاد الحليم يكرى الحلق. يغلي في ٧٨ + سغ. ويجمد
عند ١٣٠ - سغ.

١٣٢١٠ - **سَبُونِي** هي اللون الابيض، اطله.

١٣٢١١ - **سَبُونِي**
نوع من مالك الحزين يضئ بلشون جبار. كنيته ايويلزاد

١٣٢١٢ - **سَبُونِي** هي ذنب الصلب، اطله.

١٣٢١٣ - **سَبُونِي** هي الابل، راجه.

١٣١٩٢ - **سَبُونِي امريكي**
Jaguarondi (F). **سَبُون** مفرس يضئ جنورتي، اطله.

١٣١٩٣ - **سَبُونِيَات**
هي السبونات فصيلة نباتية، اطله.

١٣١٩٤ - **سَبُونِي لَس**
Spondylus (S). Spondyle (F).
بحار متوسط القند حديد النواي السلفية يكثر في بحار
البلاد الحارة.

١٣١٩٥ - **سَبُونِي** هي الاغراس الامريكي، اطله.

١٣١٩٦ - **سَبُونِيَات**

Sapotaceae (S). Sapotacées (F). Sapotaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، وحيدات النواة،
مرتقات الحبس. اجناسها ٣١ مهدا المناطق الاستوائية
والحارة. فيها الاجبار والشجيرات والجنات. اولها
متعاقبة، كلملة، جليلة النسل. اذها ابطية الارتكار.
ثمها حشوية الشكل. يستخرج من مطم اجناسها صارة
صلبة صناعية تدعى طبرخي || اشهر اجناسها الاغراس
والبرام والاباجان والكنيت.

١٣١٩٧ - **سَبُون**

Sébeste (F). Norway haddock, Rosefish (E).
جلس اسماك بحرية من شالكات الزمانف وفصيلة الجلائخيات.
انواعها المروفة نحو ٣٥. جميعها من اسماك بحار المناطق
الباردة والمعتلة الحارة || اجسامها متوسطة القند وشيرة.
سهلها مبرافي الشكل، شالك المقصة. زعانفها الظهرية
متعاقبة تتميز بشدها الشالك الاطراف. اولها زاهرة
الالوان الزاينة || اعرف انواعها واشهرها سبيبة المتوسط.

١٣١٩٨ - **سَبُونِي الشوسط**

Sebastes dactylopterus (S). Sébaste de la Méditerranée (F). Méditerranéen Rosefish (E).
سمكة من السبوج اسطالها البحر الابيض المتوسط. طولها
نحو ٢٢ سم. ثوبا الى الريدة الفضية الموهجة بالاعضر
الوردي. زعانفها جلدة وبزركفة بالاعضر القراسي
المراج. زعانفها الشرجية مملحة بمنخس حاد || لحمها
كامن الصنف مأكول.

١٣١٩٩ - **سَبُون**

Ardoise (F). Slate (E).
حجر طوي التركيب سهل التصفيح ورصاصي اللون
ازرق المراج او اسود. يستعمل استعمال القرميد في تغطية
سقوف البيوت.

١٣٢٠٠ - **سَبُونِي**

Sporonema
جلس فطور مجهرية من فصيلة الاولويات. انواعها قليلة
عمودة الازن. بكتينياتها تدور مظلة ثم تنزلق عند
الطراف جيلا. بكتينياتها يضيء او اسطوانية الشكل،
سبيبة شفاقة.

١٣٢٠١ - **سَبُونِي**

Saka-colour, Bluish-grey (E).
نمت وصفي يطلق على ما كان لونه لون السبور.



سَبُونِي المرتبط



سَبُون



سَبُون

S. nux vomica سترينكوس النقي* جوز النقي

S. ignatii إينياس ، فول إينياس

S. icaia إيكاجيا

S. dewevrei دويلري

S. colubrina كولوبرينا

S. ligustrina ليفسترينا

من فئة النباتات الجعالية التي تسمم الدم والتي كان استعمالها على الحرايب شائعاً فيما مضى عند زواج أفريقية وأمريكية نخص بالذكر :

S. toxifera سترينكوس توكسيفرا

S. rouhamon روهامون

S. curara كراور

S. castelnaei كستلي

لحاء الجاهريا طيبة وبهشها يبيد الكلب والجملاد .

١٣٢٢٢ - سترينكوس القترع ، لكند ، لكند

Strychnos potatorum (S). Strychnos des buveurs (F). Clearing nut tree (E). Bergkrähenaugenbaum (D). Noce potatora (I).

شجرة من السترينكوز حديثة المنبت كبيرة دائمة . ثمارها مأكولة اللب ، بزورها حادة العناصر السامة ، روق الماء المكر وتنقيه .

١٣٢٢٣ - سترينكوس النقي* ، جوز النقي

Strychnos nux-vomica (S). Strychnos vomiquier, Vomiquier (F). Nux vomica tree (E). Brachnussbaum (D). Noce vomica, Fungo di levant (I).

شجرة دائمة متوسطة القد ، ساقها كهيأة السعد ، اغصانها مرسة . افتادها شائكة . اوراقها بيضية النصل ، خاسية البروق . ازهارها حامى الايتكاز . ازهارها خضراء اللون . ثمارها كروية بحجم التفاح لونها الى الصفار البرتقالي . سيقانها لباني التركيب ، لبيض اللون مأكول . بزورها نحو ١٥ وهي لاقياسة الشكل ولقد . لونها الى الكهية البدرام يملها زغب هليي الشكل اسمر اللون .

وطه البزور نحوي :

١ من الى ١.١٩٪ سترينكين

٧ الى ١.٥٪ بروسين

ويستدل من الهيدروليز ان تركيبها النضوي يشمل ١.٥٪ من المنوز و٨.٥٪ من الفلكنكوز .

١٣٢٢٤ - سترينكوس النوبة

Strychnos innocua (S). Strychnos inoffensis (F).

شجرة من السترينكوس مدها النوبة ثمارها مأكولة اللب اللذيذ الحام . بزورها حادة العناصر السامة تستعمل في بعض المستحضرات الطبية الموية .

١٣٢٢٥ - سترينكوس إينياس* ، فول إينياس

Strychnos ignatii (S). Strychnos ignatier, Fèves de St Ignace, Vomiquier, amer (F). St Ignatus bean (E). Bittere Ignatie, Ignatienbaum (D). Fava di Sant' Ignazio (I).

جنية عارضة سريعة من السترينكوز . مدها جزر الفيليين وزرع في الكوشئين والحد الشرقية . اوراقها بيضية الشكل ذائقة . ازهارها بيض . ثمارها كروية بحجم البرتقال الصغير . قشورها ملس ، لونها الى الصفار

١٣٢١٤ - صيت الحشن في البلادين ، اطلبه .

١٣٢١٥ - صيت حنديجكة في وزال الشرق ، اطلبه .

١٣٢١٦ - سقالة

Résidu (F). Résidu (E). هي الرذالة من المواد النباتية للمصونة كتفل ، لسان والشوندر والزيرون .

١٣٢١٧ - سترانج

Stratège, Stratégiste (F). Stratégus, Stratégic (E). من كان اختصاصه السترجة .

١٣٢١٨ - سترانجي

Stratégique (F). Strategic (E). ما هو نخص بالسترجة على اختلاف اعدادتها .

١٣٢١٩ - سترجكة

Stratégie (F). Strategy (E). السترجة فن تنظيم القوى الحربية والسياسية والاقتصادية والمعنوية عندما تدعو الحاجة إن في حالة الهجوم أم في حالة الدفاع . وبالتالي تعتبر السترجة للسياسة فن ترتيب وتجهيز وتوجيه جميع الاعمال المتتوية في إطار مصلحة معينة .

١٣٢٢٠ - سترطوسوم

معدن اصفر اللون يوجد في الطبيعة مزوياً ببعض المعادن والعناصر اغصانها الرصاص ويها البحر (ست-ست) وزنه الاتوني ٨٧.٥ وتقله النوبي ٢٥.٤٥ || نالته الكهرناتية ضعيفة . يتركك الماء بالحرارة الطبيعية ويترج مع الكور واليود والكريت . اما اطلاقه الصناعية المختلفة فهي ما يتجم من مزيج مختلف الحامض .

١٣٢٢١ - سترينكوس ، سترينكوز

Strychnos جنس نباتات برية وزراعية . من فصيلة اللوفانيات . انواعه ٦٥ تقسم الى ثلاث فئات . فئة النباتات الصحية ، الطبية ، غير المؤذية . فئة النباتات السامة . وفئة النباتات الجسالية (الكرارية) . معظمها اثمار وجبهيرات وبنينات عارضة وبهشها عسبي || مدها البلاد الاستوائية . اوراقها منقطة متعاقبة كاملة . ازهارها حلقة التجميع ، ابطية او قاجية الايتكاز . ثمارها كروية الشكل ، برتقالية الحام ، لحمية اللب ، ليفية القشرة . بزورها تحوي بعض الجواهر السامة والمواد الطبية النافعة ، والقلوية السامة كالسترينكين والبروسين والكرار . لحاء الجاهريا يستعمل في علاجات الاراضى الجلفلة . اغصانها تنفع الاراضى الصلبة || من فئة النباتات غير المؤذية والطبية نخص بالذكر :

سترينكوز ايبولا

S. iboga إيبوكرا

S. innocua إينوكرا

S. potatorum بوتاتوروم

S. spinosa سبينوزا

S. vacuosa فاكاكوا

S. coeculoides كوككولويد

S. melanocarpa ميلانوكاربا

من فئة النباتات السامة التي تقضي على الجهاز الحوي

نخص بالذكر :



سترينكوس النقي



سترينكوس إينياس

١٣٢٣٣ - سكارين (F. Searine) (E). مادة دهنية قوامها الكليسيرين وأحد الحامض الدننية. تستخرج خاصة من لحم الحيوانات لا سيما لحم الالبسة.



مثل ناسك

١٣٢٣٤ - سكتيكية

السكتيكية طائر يشبه البهام (محيط المحيط).

١٣٢٣٥ - سكتير هو الفارس، اطلبه.

Schre (F). Sown (E).

١٣٢٣٦ - سكيوكة

رسنة قياسية مؤلفة من جهاز خاص يتعصب متراً مكعباً واحداً من الحطب.



سنتور، زباط

Seyre chod (F).

١٣٢٣٧ - ستيروس سايو

هو المبان لاسار، اطلبه.

Stryanus

١٣٢٣٨ - ستروانوس

جنس فطور مجهرية من عائلة الميزاتانيات فضيلة الكميبيات. يتميز بكمياته البارزة الطرف الغزبي الشكل. كتائله طرية الاكثر سمية تصبح سمراء اللون في انواعه قليلة جميعها روية تعيش حل المواد النباتية والعضوية المتحللة.

Scilbospora

١٣٢٣٩ - سيليبيسبور

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريديات. انواعه قليلة العدد والاشكال تركيب طلاء بعض الفريديات الحرجية. يتميز بخصائصه الكيميائية الملائمة التي تقلل بوبها من فتحة شديدة تصدها بعد التلوث في بوبها اسطوانية - مخروطية، موطرة، وباعية الانقسام، سمراء اللون.



ستيلسبور

١٣٢٤٠ - سيثروب جيتو

Scythrops novae-Hollandiae (S).

Scythrops géant (F).

طائر من فصيلة القيقويات وربة المتسلقات، موطنه بيند من ماليزيا الى استراليا في جسمه كبير لكنه يطير نحو ٦٠ سم. يسلط نحو ٩٠ سم. قويه الى الكهبة المرقطة بالابيض والاسود. رداؤه الى انخضار الزئي المالح. متفاده كبير وضلع. حنة حنة مائية اللون. حنة مطوقة بجوار اسوط في اخرته حنة كنة كثير الجبل والحلر. يعيش جماعات قليلة البند الذي يراوح من ٦ الى ١٢. قوته الزرعيات يحل اصدلها متفاده الصلح ثم الزور والحشرات اصحاب الحيات الاجنسة والجراد في طيران طويل الشروط قليل التصيد والتجيب في الاثني لا تفش بل تقع البيض في اصفاش فريدا من البليز ولا تقع في العش الواحد اكثر من بيضة.



سثروب جبار

Endouire (F). To coat (E).

١٣٢٤١ - صج

سج الحلاط: سمحه بالطين الرقيق. والسمية هي المشبة التي يملأ بها البطين وفي المائلة والملاق وللط واللطا.

Enduc (F). Coating (E).

١٣٢٤٢ - صججج

الحلاط الرقيق مما كان مصدره وبها كانت غايته.

Pleuronectes (S).

١٣٢٤٣ - سنجاس

Pleuronecte (F). Pleuronect (E).

جنس اسماك بحرية يعيش من فصيلة جانبيات العمود وربة للمساوات في انواعه المرفقة عشرة. اصنامها شطوط البسر

الترتقال. سيقها لابي مر الطم. يزودها من ١٠ الى ١٢ لونها الى الكهبة الزرقاء المالح يملأون زغب طلي الشكل.

وهذه البزور تحوي: ٥٠٪ من البتركتين

١٠٪ من البترسين.

٠٠٣٪ من البترانين وغيرها ...

ويستدل من المبدولين ان تركيا البتراني الضوي يشمل ٤٤٪ من المنور و٦٠٪ من البتركتوز.

iboga (S).

١٣٢٢٦ - سريكنوس الغابون

Strychnos du Gabon (F).

نبات صبي جزيل اللغ يدهى ليدوها، اطلها.

١٣٢٢٧ - سريكنوس شاليك

Strychnos spinosa (S). Strychnos épineux (F).

نوع من السريكنوز مهدد مفسكر. وهو شجرة صغيرة اللقد شائكة، ثمارها برتقالية الشكل والحجم. لهاها مأكلي زهر الصاندة السكرية المشبعة الطم. يزودها قليلة العدد عادمة العناصر الجمالية.

١٣٢٢٨ - سريكنوس فاكاكوا، سريكنوس

Strychnos vacuuous (S).

مدهفسسسكر

Strychnos de Madagascar (F).

نوع من السريكنوز يكثر في مفسكر. ثمره خشنة اللقد سرسه. ثماره كروية طهرها نحو ٥ سم. لهاها برتقالي اللون مأكلي، صاندة فزرة، لليلة، مستحبة وذكية العرف. يزور ثمار قليلة العدد، غالية من العناصر الجمالية غنية بمادة البتركتوزين القلوية لكنها لا تقوي الجسم البشري.

١٣٢٢٩ - سيكرورزا في السقلاب السوي، اطله.

١٣٢٣٠ - سكتل

Néophron (F). Naephron (E).

جنس طير من الكواسر ينتمي الى فصيلة النسريرات. انواعه قليلة جميعها كبيرة الجثة تتميز برأس اصليح وحتى اخضر يسقط طويل وذنب قصير ويشر احسن البيرة الشدية الانعاق في اشهر انواعه السدل اتناك.

١٣٢٣١ - سكتل لاسيك

Naephron pileatus (S).

Naephron moine (F).

نوع من السدل طوله نحو ٧٢ سم. يسلط نحو ١٦٠ سم. ثوبه الى السرة الكنتية. عقه اخضر الريش اخضر اللون. ولسه اصليح اخر. مله اترق. رصاه وضاهه رصامية. موطنه البلاد الحارة والمعتدة. يعيش جماعات. سره لاقياس البند. يأنف ضواليا للذن والاسكار في قوته الخيف وقامة للذن. انشاء نبيض ثلاث يضاها تحضها بمنارة الذكر نحو ٤ اسابيع.

١٣٢٢٢ - سكتتور * و زباط * Myctes (S).

Stancor, Hurleur, Singe hurleur (F). Howler, Howling monkey (E).

جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات. انواعه ستة موطنها غابات البرازيل والباراغواي والبناتالا. اجسامها ربة، وروسها غليظة. اصنامها بارزة. على ذكورها كثيفة الشعر الطويل. اذنانها مستطيلة اسنائة. الالها سوية الالوان يكثر فيها الاسمر في قوتها البرام والازمار والاوراق والبار. اناتها تقع جروا واحدا.



سحابة

Lima (S).

Lima (F). Lima (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم عادات المصايد وفضيلة السحابة. انبعاثها المعروفة نحو ٤٠٠ بعضها من متحجرات الاراضي الثانوية والبعض الآخر، المعاصر، منتشر في جميع انحاء العالم || اصدافها شبه غروبية الشكل، متساوية المصاريح، شامخة التخذيد، ملونة بكثرة في الالوان الفروشي بالاحمر. بعض انواعها يطول نحو ٢ سم. || تعيش في الرمال وتنتقل بسرعة مدحقة تجديداً بمجرعها.

Varanidae (S).

Varanidae (F). Varanidae (E).

اسم شامل يطلق على بعض اجناس القورل. تتميز باستقامة اجسامها وبالسحب الملتصقة الزقية. اوتابها زائفة الاوتان تانك الويل الذي تعيش فيه.

Limidae (S).

Limidae (F). Limidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم، عادات المصايد وانواعها المعروفة متوسطة البند. معظمها من متحجرات الاباح الثاني. الانواع القليلة المعاصرة منتشرة في جميع انحاء العالم || تتميز باصدافها الشامخة التخذيد، بكثرة في الشكل القروشي || اعراف اجسامها واشهرها السحابة.

Cerbera (S).

Cerbera. Mangrove latex (F). Indian mango tree (E). Ostindischer mangosbaum (D). Cerbera (I).

جنس اشجار دائمة خضرة كبيرة اللد من فصيلة الفليانيات. انواعها قليلة اورثاقها ملونة متناوبة الحلجوية اصدافها جلدي للنج عايق الخضر. ارجاعها يضر او ودية شامرا يضيء الشكل ولقد، وحيدة المصبة الكبيرة الصلبة. وهذه الاشجار جميع اجزائها من الساق الى الورقة والثمرة غزيرة العصارة الجسمية الممتعة.

Puccinia

١٣٢٧٨ - سحابة، صرقة جنس فطور مجهرية من فصيلة السحبابات تتميز بعلاماته الانزاسية الشكل التي تغلب فيها الانتعاش والفسحة. مشبه الفطري يعيش ويتكاثر على غلات النج النباتية. فاعله شاملة مدمرة او متقلبة مرصقة التجميع. انواعها المكونة المعروفة عديدة عليها اسمها ما يتبع.

١٣٢٧٩ - سحابة اسفحة، سحابة الحبيطة

Puccinia triticea (S).

Rouille brune du blé. R. b. du froment (F). Orange leaf rust (E). Braunrost des weizens (D).

فطر مجهرى شديد الاضرار يصيب القمح في جميع اصابته فينفذ الانتاج ويؤدي الصف اذ يلقعه بعض المواد الغذائية. مظهره الحلبي يهود قرصية مدمرة، لانظمة، مستورة الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ١٥ سم. تركيب النصل على صفحته ولا تصف من القمم والساق وصفيحات السنبال. ثيو صلبة اللون، برتقالية الاطراف، ثم تنحرف الى الخمرية فالسفرة. تنضج من خيرات بيضة شديدة التصبغ لونها الى السفة تتطير ككباب || يكافح بمشاكل الكبريت الميكروبي او احد الفطريات الزراعية المرتبطة على الكبريت واملح النحاس.

Aérobiose (F).

١٣٢٦٤ - سحابة حياة الكائنات السحابة (الهوائية).

١٣٢٦٥ - سحابة، هوائية، هوائية

Aérobique (F). Aerobic (E).

نمت ترميني يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء.

١٣٢٦٦ - سحابة، هوائية، هوائية

Aérobie (F). Aerobe (E).

صفة الكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع العيش منقطعة عن الهواء.

Libanotis (S).

Libanotis (F). Mountain spigul (E). Echte hallwurz (D). Libanotis (I).

جنس نباتات عشبية برية من السحاريات وفضيلة الخياميات. انواعها ١٠ اقليمها المناطق الجبلية جميعها معروفة تنسب للملحة. اورثاقها مركبة مفرقة. سيقانها ليفية غزيرة العصارة.

Poumon (F). Lung (E).

١٣٢٦٨ - سحابة السحابة والسحر والسحر: الرقة.

Sedilindes (F).

١٣٢٦٩ - سحابة سبط من فصيلة الخياميات يشمل عدة اجناس اصحاب السحابة والقمرة والفيل والسحابة والبادجان.

١٣٢٧٠ - سحابة الزئبق

Bacterium savastoni, Phytomonas savastoni (S). Bactériose de l'olivier, Tuberculose de l'olivier, Tumeur bactérienne de l'olivier (F).

وسم بكتيري يصري الزيتون يتركب بعض الانواع الفتية الضعيفة ثم ينتشر ويضم معظم الانواع والافاضان. مظهره الخارجي ذليل عشبية التركيب لاقياسية الشكل والحجم والانشقاق، تغلب فيها الانتعاش تقفي على البثرة والفكر لانها تتركز على اللادة الخشبية وتسفرها في نفسها فتصل دين تبادل النسخ او وصوله || يكافح بطنج الاشجار المصابة بحلول فليوسيكينات البوديم المركز ٠.٥٪ وذلك بعد قطع جميع الاجزاء المصابة وسحقها. وقد يحسن تسميد الزيتون بالمواد الضوئية مع اجتناب كثرة الازوت.

١٣٢٧١ - سحابة

Dumping (F). Dumping (E). السحابة عمل اقتصادي تمارسه بعض البلاد على حمل صادراتها او على انواع مينة منها تعرضها في الاسواق الخارجية بسعر ادنى من السعر المحلي حتى وادف من ثم التكلفة.

Pécule (F). Peculium (E).

١٣٢٧٢ - سحابة المقتر من السحل. وما اكتسبه وقته لنفسه المرووس. وما قتر لنفسه السجين او الاسير طيل مدة عقوبته او امره.

Ecole (F). Shell (E).

١٣٢٧٣ - سحابة هي قشر ابر والشعر ونحوه.



سحابة الزئبق



سحابة



سحابة



سحابة اسفحة

١٣٢٨٥ - سُحَامُ الزَّرْعِ *، مَرَقَ الزَّرْعِ *

Puccinia graminis (S). Rouille noire, Rouille linéaire des céréales (F). Stem rust of grain (E). Schwarzrost (D).

نظر مجهرى يصيب أكثر النباتات النجيلية وأخصها الزرع فيطبع الصف والسايل ويطلق الفطر بالمصقول. مظهره الخارجي بثور قرعية تملأ نصال الصف فتبدو صفيرة مستديرة ثم تكبر وتتصلب حتى تبلغ ١٢ م. لوها يكون إلى الشقرة المائقة ثم ينحرف نحو السرة عند ارتفاع بشرة النسيج التي يعقبها التفتير ويملأ النبار البويي || وقد يركب الزينات والسيليات فينتجها ببؤره وفروحه الخيطية التي تنتهي نهاية بثور الصف. انحراراً قد تكون حبيبة فياً لو مكنته الغوامل الجوية من سرعة الانتشار || مكافحته صعبة تستوجب الكثير من العناية. يكافح :

أولاً - باستعمال الفطروب المروقة بقوة مانعها والتي صار اختيارها اقليمياً في هذا السيل أو الفطروب الباكورية كالفلورس أورور (Florence aurea) الذي صار اختياراً في لبنان وهو يقاوم هذا الورم لانه يدرك باكراً قبل انتشار السحام.

ثانياً - بالاجتناب الاكثار من عنصر الزرود لانه ينشط المواد البينية والخضرية ويؤخر الإدراك فيمرض الزرع إلى الإصابة.

ثالثاً - باستعمال الكبريت الميكروني تفعيلاً على الزرع عند ظهور الورم. وهناك فواظير أخرى عديدة يمكن استعمالها لكنها باهظة الثمن.

رابعاً - بالقضاء على جميع نباتات البربريس (الأثرارة) القريبية والبيضة من الحقل لأنها الزوج الثابت والبؤرة الحقيقية التي يعيش فيها عليها السحام.

١٣٢٨٦ - سُحَامُ الزَّرْعِ الْأَصْفَرِ *، مَرَقُ الْأَصْفَرِ *

Puccinia glumarum, P. rubro-vers (S). Rouille jaune des céréales (F). Yellow rust of wheat (E). Gelbrost (D).

نظر مجهرى شديد الاذى يصيب الزرع في جميع أصنافه وعلى اختلاف أنواعه وضروبه || مظهره الخارجي يتتابع على ثلاث مراحل. في الاول بثور صفر صغيرة اللقد متصقة متتابعة على شكل الخيطي تركب النصل في زامة الاخير بمزارة عروية. وقد يبلغ امتدادها ٢ إلى ٣ سم. ويعد محيطها المتوازية من الثلاثة إلى الستة. وفي المرحلة الثانية اصفرار على ينصل الصف يتبعث في الزمان الاخير على شكل قند متقطعة متوازية تحمل في جوفها بؤر السحام الاصفر الزاهي. وفي المرحلة الثالثة بثور حبيبة الشكل رافعة تركب الصف بدون انتظام وتصيب السوق والاغداد والسايل. صفرتها غامقة ذخية اللون || يكافح بالكبريت الميكروني تفعيلاً على الزرع منذ المرحلة الاولى. كما يمكن تلف جميع النباتات الخضرية وذلك باستعمال المبيدات الخاصة. ومن المستحسن أيضاً سرق الحقل أو أثر الحصاد.

١٣٢٨٧ - سُحَامُ السَّيْسَمِ *

Puccinia anthrini (S). Rouille du moflier (F). نظر مجهرى واسع الانتشار يتطفل على السيم فيطبع الأوراق ويضعف النبات وقد يصيب موته || مظهره الخارجي بثور صفيرة مستديرة حبيبة اللون غبراء الاطوار خضية التجميع تملأ نصال الأوراق على صفحاتها السفلى

١٣٢٨٠ - سُحَامُ التُّرْشُولِ *

Puccinia helianthi (S). Rouille du tournesol (F). Sunflower rust (E).

نظر مجهرى واسع الانتشار يتطفل على مختلف أنواع وضروب الترشول. يركب الأوراق فيؤذيها وقد يصيب جفاتها وسوقها باكراً. مظهره الخارجي بثور صفيرة مستديرة لاقليمية التجميع والارتكاز لوها إلى الصهبة المائقة تركب النصل على صفحة السفلى تغطى النسيج وترتدق القسغ وتصب الصفات قلقة انتاج اللباد || يكافح باستعمال الادوية الفطورية اخصها المركزة على عنصرى الكبريت والنحاس.

١٣٢٨١ - سُحَامُ التُّرْشُولِ *، مَرَقَ التُّرْشُولِ *

Puccinia bromina (S). Rouille des bromes (F). Bromus rust (E).

نظر مجهرى يتطفل على جميع أنواع وضروب الترشول وهو كثير الانتشار في اوروبا وأفريقية الشمالية || مظهره الخارجي بثور قرعية مبرمة أو متاخفة طول النصل على صفحة العليا فتبدو صفيرة اللون وردية الاطوار الضيق ثم تنحرف إلى الجؤرة ويبقى عليها حتى تنجبرها || يكافح عند الاقتضاء مكافضة غير من السحام.

١٣٢٨٢ - سُحَامُ الثُّومِ *، مَرَقَ الثُّومِ *

Puccinia alli (S). Rouille de l'ail (F). Garlic rust (E).

نظر مجهرى يتطفل على بعض نباتات الفصيلة الزنبقية وانحصار الثوم والكراث فتركب الأوراق دون أن يقع بها الاضرار. مظهره الخارجي بثور لوها إلى الصهبة، مصغرة ذائغ الفطر تملأ نصل الأوراق بدون انتظام ولا قياس ثم تنحرف تدريجياً نحو الجؤرة البنيصية وينتشر عليها حتى تنجبرها || انحراره زغبية لا تستوجب المكافضة.

١٣٢٨٣ - سُحَامُ الْخَازِيَاَتِ *

Puccinia malvacarum (S). Rouille des malvacées (F). Hollyhock rust (E). Malvenrust (D).

نظر مجهرى يصيب أكثر الخازيات في اوراقها وسوقها وزادها فيطبعها ويلبها || مظهره الخارجي بثور صفيرة تركب الأوراق على صفحاتها السفلى وتركب السوق وكثير الزهر. تبدو برتقالية اللون يحيطها اطوار بتفسي ثم تنحرف إلى الجؤرة السوداء حيث ترغف كالتماليد دون أن تغير البشرة. وبعد ذلك بارية أو خسة اسابيع تظهر ذائغ الفطر على التنايل فتبدو حبيبة اللون ثم تتحول إلى حبيبة خضية يعلوها سراج ايض. يكافح باستعمال اوكسيكلورير النحاس المفلول ١٪ عند ظهور الفطر وينتفخ مرة ثانية موصداً به الاول باسيوين || ومنهم من استعمل رينثانات ليرتقى ويحى مليئة اذا امتلئت في هذه الامر ولكنها تصعب عدية النفع عند ظهور الملائع.

١٣٢٨٤ - سُحَامُ الدُّوْمِ *، مَرَقَ الدُّوْمِ *

Puccinia maydis, *Aecidium oxalidis* (S). Rouille du maïs (F). Maize rust (E).

نظر مجهرى يتطفل على الذرة في جميع البلاد والاقاليم. أثيراته تعيش على الجافس ومنها تنقل إلى الذرة. وهو من صنف الذرة ذائغ مبرمة كثيفة التجميع تركب النصل على صفحته بمزارة الفلج فيبدو النسيج النحار قليل الخصب اشقر البثور المتحبة بالاصفر ثم ينحرف لوها إلى الاصعب فالخيطي المايق || انحراره غالباً محدودة لا تستوجب العناية.



سحام الترشول



سحام الترشول



سحام الثوم



سحام الخازيات



سحام الذرة



سحام الزرع



سحام الزرع الاصفر



سحام الميسم

سُحَام الشَّعِير - سُحَام قَصَب السُّكَّر



سحام الشعير



سحام الشيفان



سحام الكرز



سحام الكرز النائم



سحام الخيلون



سحام النعنع



سحام قصب السكر



سحام الهندباء

السفل قصب جفاف النسيج والنصل || وهو على السوق يبور مبشرة قليلة العدد لأنها إلى الصبغة الباهية الحليئة للون || يكافح يظلم الأوراق المصابة ويضعف النبات يساقط بورود الخيلون ١/٢

١٣٢٩٣ - سُحَام الكَشْمِي

Puccinia ribis (S). Rouille du groseillier (F).
نظر مجهرى يتطفل على الكشمش فيؤذي به وقد يمتد ظهوره الخارجي بقع نسيجة تركب نصل الأوراق النامية فتلوها . تبدو شذراء الخيلون ثم تنصرف إلى السرة الزخامية وتتفتت يبيض النسيج المتناثر التي يتبعها يابس النصل وضعت الشجرة || يكافح باستعمال امد السوائل الفلوكسيلية الحاملة ١/١ نصفًا على الكشمش قبل ازهاره .

١٣٢٩٤ - سُحَام النَعْنَع

Puccinia menthas (S). Rouille des menthes (F).
نظر مجهرى يتطفل على بنس القفولان اصعبا النعنع . مظهره الخارجي يبور مبشرة مهاد الخيلون تركب الأوراق على صفحتها السفلى وتتلو الجليلير وتلوي تصرفل سير النسل وتسلب ذبول الأوراق وصفتها بعد أن تبين التلوي وتسلب حين سيال نشاطها || يكافح بالتتابع وحرق النباتات المصابة قبل تقضي الوم . بين المستحسن من النعنع بالازوت النيتريكي الذي يخلصه على مقاومة هذا الفطر .

١٣٢٩٥ - سُحَام الحَلِيَّة

Puccinia asperagi (S). Rouille de l'asperge (F). *Asparagus rust* (E). Spargelrost (D).
نظر مجهرى يتطفل على سوق الحليون فيطبلها ويؤذيها . مظهره الخارجي يبور لمبة الشكل ودية التي تلو السوق مبشرة بدون انظام تصرفل سير النسل وتضرر النبات . يكافح باستعمال مئة وسائل اولها سائل بورود نصفًا على النبات . ثانياً الكبريت تمعيراً على التربة والنبات . ثالثاً ديتيركرازيلات السوي . رابعها زرع القروب للنبات التي تقاوم هذا الفطر .

١٣٢٩٦ - سُحَام الحَشْدَبَاء

Puccinia elichorii (S). Rouille des chichorées (F).
نظر مجهرى يتطفل على اختلاف أنواع وفروبو اغتياهه فيصيب الأوراق ويصلها || مظهره الخارجي يبور وافضة مستديرة لأنها إلى الصبغة تلو النصل على صفحته السفلى تضطبه وتمزق نحو النبات || يكافح باستعمال سائل بورود الحلي من ٥٠ الى ١٪ حين ظهور الموراض .

١٣٢٩٧ - سُحَام قُرْمُزِي

Puccinia purpurea (S). Rouille du sorgho (F).
نظر مجهرى يتطفل على قلة البيضاء فيؤذيها ويضعف انتاجها || مظهره الخارجي بقع نسيجة قزمية الخيلون تلو الصف وأغاده تضطبه وتضيء الى نحو النبات بعد ان تمرق سير نشه || يكافح بمكافحة غيره من السحام .

١٣٢٩٨ - سُحَام قَصَب السُّكَّر

Puccinia kuehni, *Uromyces kuehni* (S). Rouille de la canne à sucre (F).
نظر مجهرى يصيب قصب السكر حين ان يؤذيها فيصيب له حلياً يذكر || مظهره الخارجي بقع مسطيلة او مردية الشكل مبشرة بدون انظام قليلة العدد تركب

تتسبب تغيير بشره النسيج وصلب الأوراق الذي يهبط مع النبات ويؤذي به || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني تمعيراً على النبات مثل ظهور الفطر على ان تعاد العملية من المرات إلى الثلاث مرات . ومنهم من ينصح باستعمال سلقور البيليسوم الحمول ٥٠٠ ٪

١٣٢٩٨ - سُحَام الشَّعِير * ، مَرَق الشَّعِير *

Puccinia hordei, *P. anomala* (S). Rouille naine de Forge (F). Barley rust (E).
نظر مجهرى يتطفل على الشعير فيؤذي ويضعف من مقدوره الانتاجي ومن صفاته المشفوفة في صناعة البيرة . مظهره الخارجي برة صغيرة تلو نصل المصبغة عند غرب الزرع وتكون برة واحدة على النصل الواحد . تبدو يضاء الخيلون ثم تنصرف نحو البريقال وتتفتت عند الفجانبها بالون الاصعب الامر || يكافح بمكافحة غيره من السحام .

١٣٢٩٩ - سُحَام الشُّوْثَان * ، مَرَق الشُّوْثَان *

Puccinia coronata, *P. coronifera*, *P. heli* (S). Rouille couronnée de l'avoine (F). Crown rust of oats (E). Kronen rost des hafers (D).
نظر مجهرى يتطفل على الشوثان وعلى بعض التصيليات البرية . أثباته تمحض عسل التصيليات والخلانيات . تظهر خلال شهر حزيران فتسهر بقع مرساة سفر أو حر مستديرة صغيرة على صفحة النصل السفلى يقابلها على الصفحة العليا انتضاعات في النسيج والبرورة لأنها إلى الجروة || وهو على عصف الشوثان ضائع مبشرة بدون انظام تركب النصل ورطبه على صفحتها قدير يقع مستديرة ومستطيلة مبشرة ومترامية كالخلاء لأنها إلى الصبغة الزخامية ثم تنصرف إلى الجروة وتتفتت بالون البنفسجي المائل || يكافح بمكافحة غيره من السحام بعد القضاء على ودجه الطبيعي للنبات أو الخلف .

١٣٢٩٠ - سُحَام الصَّبَا * ، مَرَق الصَّبَا *

Puccinia vineae (S). Rouille de la pervanche (F).
نظر مجهرى يركب مختلف أنواع القصب فيؤذيها وقد يتجعب حلياً || مظهره الخارجي يبور مستديرة كبيرة السوق والفروع . تبدو مهاد الخيلون ثم تنصرف نحو الحليط حيث تتغير من بور حلياً لمر || اما الارزاق المصابة فتتغير القدر رافعة النصل الخيلون المهدم الحليط || يكافح عند ظهور الوم يستعمل سائل بورود الحلي ١٪

١٣٢٩١ - سُحَام الكَرَز * ، سُحَام لَدَرَأَقِن *

Puccinia cerastii, *P. pruni-spinosae* (S). Rouille du cerastier, R. du pêcher (F). Rust (E). Zweischenrost (D).
نظر مجهرى يصيب الكرز والدراق والوجع فيؤذي بعض اوراقه دون ان يقع بها اضرار تذكر || مظهره الخارجي بقع سفر تركب النصل على صفحته السفلى يقابلها على الصفحة العليا موج احمر او بنفسي يدوم بعض الوقت ان تنحصر البرة من بور حلياً او اصعب الخيلون .

١٣٢٩٢ - سُحَام الكَرَزِيَان * ، مَرَق الكَرَزِيَان *

Puccinia chrysanthemi (S). Rouille du chrysanthème (F).
نظر مجهرى يصيب الكرزاني في اوراقها وسفها فيؤذيها . مظهره الخارجي يبور مبشرة مستديرة مبشرة قليلة العدد لأنها إلى الصبغة الزخامية تركب الأوراق على صفحتها

تتركب من ١١ فصلة . احادها لاسفة . جرامها نشطة .
ارسانها ثلاثة المقل || اشهر اجناسها السحليل والسهبية .

Traffic Illicita (F). **سُحَات** - ١٣٣٠٤

Illicit traffic (E).
السُّحْتُ والسُّحْتُ الرقاعة المحظورة أو ما سقطت من
مكاسب عرمة .

Bourgeon à fleurs (F). **مَسْحَنَة** - ١٣٣٠٥
Blossoms bud (E).
الاية القليظة في اللمن .

Abrasion (F). **مَسْحَج** - ١٣٣٠٦
Abrasion, Attrition (E).

السج الاستهلاك بالاحتكاك المستمر كسج الأسنان
في القم وكسج مياه البحر لصخور الجراح .

Traumatisme (F). **مَسْحَجَة** - ١٣٣٠٧
Traumatism (E).
الأثر الذي يحدث من غشش أو جرح . ج مسج ومسجوج .

Broyage (F). Crushing (E). **مَسْحَق** - ١٣٣٠٨
دق الشيء اشد الدق .

Pécune (F). **مَسْحَل** - ١٣٣٠٩
السحل النقد من الدراهم .

Chaetodon (S). **مَسْحَل** - ١٣٣١٠
Chétodon, Poisson papillon, Demoiselle, Bando-
lière (F). Butterfly fish (E).

جلس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعها عديدة
جميعها صغيرة القد ، قصيرة ، مبطلة ، عرسها يوازي
ثلاثة ارباع طولها . لوانها جميلة زائفة متراكبة عليها
تجميع مفرس متقابل وزركشة بيضاء لامة || موطنها
بحار البلاد الحارة . انواعها المبرودة في المتوسط
ثلاثة :

Chaetodon saxatilis (S). محل الصخور ، تنقرت
Chétodon saxatilis (F).

Chaetodon argenteus (S). محل نضي
Chétodon argente (F).

Chaetodon maculosus (S). عروسة البحر .
Chétodon maculé (F).

Salap **مَسْحَلَب** - ١٣٣١١
مادة نقوية تستخرج من بعض انواع السحلب الزراعي .

١٣٣١٢ - **مَسْحَلَب** * **عُصَى الْقَحْلَب** ، **عُصَى**
الكَتَب ، **قَاتِلِ اَخِيهِ** ، **سَطُورُون**

Orchis (S). Orchis, Barbène, Sazyron, Salap (F).
Orchis, Lizard orchis (E). Bockerslenszunge (D).
Orchide, Satirione, Testicolo di cane (I).
جلس اشباب عشقولة ممرمة من فصيلة السحليات .
انواعها للمبردة نحو ٨٠ معظمها بري وبهشها زراعي
وتربسي . يستخرج من ساقها بعض انواعها مادة نقوية
يصفها يطلع كالجليب ويؤكل || اعرف انواعها
واشهرها :

Orchis maculée **سحلب أبيض**
Orchis d'Anstolie **سحلب أنانولي**

نصل الصف . فهو حطية الين عملة جملة شبة
تبتية ثم تنصرف نحو السرة وتبين على سحرها حتى انفجارها .

١٣٣١٩ - **سُحَامٌ مَشَات** * **مَرَقِي الشَّيْخَم** *
Puccinia dispersa (S). Rouille brune du seigle (F).
فطر مجهرى يتطفل على التيلم فيؤذي . مظهره الخارجي
يبدو قرحية ميمرة بدون انتظام تركب النصل على
صفحيه وتصيب الاحاد والوق وصيفات السنايل .
يتلو مستدرة صغيرة لونها الى الصبغة ثم تكبر وتفتش
فينصرف لونها الى الجلوة وتفسر من يوغ هبابي لونه
الى الجلوة السراء || يكاثف كثيره من السمام .

١٣٣٠٠ - **سُحَامِيَّات** *
Pucciniasae (S). Pucciniasae (F).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة السحاميات تتميز بظلالها
الانزاسية التركيب والانتظام || دعاماتها فردية أو
عديدة الانزاسية . بينياتها فردية أو شعبة الانقسام عمولة
على احيات (ركائر) شاذلة فروية أو ملوطة جامدة
وسرعة السط . ذنباتها خادسة تجمع الامينات كشيء
كانت || اجناسها عديدة . اشهرها زوايا واقتصاديا
الثانية التالية : السمام ، الفشول ، الصدفة ، الصنعة ،
الضبعة ، الظفرة ، الكشنة والمسيلية .

١٣٣٠١ - **سَحْلَبُ الْمُوَافَقَة** (F).
Right of consent (E).

عمل يميزه القانون يقضي بالماله الموافقة المتفق عليها .

١٣٣٠٢ - **مَسْحِيل لِمَرِي** *
Endomychus coccineus (S). Coccinella écarlate (F).
Endomychus coccineus (E).

حشرة دامت من فصيلة السحليات ورتبة مدميات الاجنحة.
قالت القابات والاسراج . حنافسها ويرقاتها تمش على
الفطور وامشاجها وعلى المواد النباتية المنطحة || جسمها
صغير القد وطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها الى الحمرة
القرنزية يملوها في وسط كوسلها بقية سوداء ويملونها في
ظهورها اربع بقع سود ، يشجان في كل شد . رأسها
معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلان ،
صفا الاطراف . ظهرها ضيق الخضر المستدير اللاتس
قدها محززان ، كفيها الخسل . ارسانها ثلاثة المقل ||
جا لها واحد في الحلق . تظهر الحشرة الجلادة في اوائل
ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتستن
في الليل || البرقة عنه يملوها الكيال الجسوري تطول نحو
٨ م . جسمها سكي التركيب ، قليل التقويس ، سداسي
الرواسب ، اسر القين ، جزوي الرأس ، كيف الزنب ،
سيدر الخبل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة
اسباع يقضي تحت قشور الاجحار المائلة ضمن صلبة
متساكة الفشاء المركب من مواد نباتية معوجة بالرياح .

١٣٣٠٣ - **مَسْحِيلِيَّات** *
Endomychidae (S). Endomychidae (F).

فصيلة حشرات دامت من رتبة مدميات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المبردة قليلة العدد مدها البلاد المعتدلة الحارة .
تألف الموطن المسوية الرطوية حيث تتكاثر الفطور التي
توسل عليها || جميعها صغيرة القد ، اهلجية الشكل
تحتل المركز الوسطي بين القرنيات والدمسقيات . رؤوسها
مستدرة . زباناها معتدلة الطول ، صفة الاطراف .



سحام مشات



سحليل قرني



مسحل



مسحلب



سحلية

حينما صغرتان تلصقها احيان شفاقة متحركة . اذاثما غانتا الغشاء الصواني الاخير الثلاث . عنقها متوسطة الطول والشخانة . جلدها متناح التنايل الدقيقة . ذنبها سريع الطرب والانقسام . قريبا الى الصهبة الجزوية المنسقة يملوا موج الحمل اغبر ينسجم مع الحيطان واخفاية التي تكثر من المكوث عليا || يباتها الششري يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعا . تحسر قشلاها يند غروبها من يباتها ياسبورع وتساقد يند ذلك ياسبورع || الاثني تبس من ٦ الى ١٢ شلفة تطرها في الربل او في المواقس الاجنوية المعرض للناقة || تسرح في التهار وتتلاق السطوح السموية . قتها الحشرات الصغيرة والديدان والباب والحوم || تستبر من الزحافات النافعة .

١٣٣١٩ - سحلية عصفراء * ، سحلية عصفراء ،

عقلاية عصفراء (S). *Lacerta viridis* (S).
Lézard vert (F). Green lizard (E).

حيوان يروض من الظاء وفضيلة السقايات . موطن البلاد المعتدلة الحارة || جسمها يطول من ٢٢ الى ٢٦ سم . الاثني اكبر قدما من الذكر . رأسها عراني الشوزن . حينما لوزيتان تلصقها احيان شفاقة متحركة . اذاثما غانتا الغشاء الصواني الثني الثلاث . عنقها متوسطة الطول والشخانة . اسامها دقيقة مجهزة بالظاير حادة . جلدها متناح التنايل الدقيقة . ذنبها سريع الطرب . قريبا اخضر اللون ، اسف المروج ، تملو قبة عمراء زينة تنتهي عند قاعدة الذنب . الذكر يتبزم بزماء اللون ويلزق النسر || يباتها الششري يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعا . والاثني تبس من ٨ الى ١٦ شلفة تطرها في الاجنات والديال || تأتف المروج والاماكن الرملية . تسرح في التهار الاثني برفقة الذكر وتبتم منه في حمر واحد || قتها الحشرات والديدان والباب والحوم . تستبر من الزحافات النافعة .



سحلية الحيطان



سحلية عصفراء

١٣٣٢٠ - سحلية رشيقة * ، سحلية رشيقة ،

عقلاية رشيقة (S). *Lacerta agilis* (S).

Lézard agile, Lézard des souches (F). Agile lizard (E). حيوان يروض من الظاء وفضيلة السقايات . موطن البلاد المعتدلة الحارة . الاثني اكبر قدما من الذكر . جسمها يطول من ١٨ الى ٢١ سم . رأسها عراني الشوزن . حينما صغرتان ملصقتان يابها شفاقة متحركة . اذاثما غانتا الغشاء الصواني . عنقها متوسطة الطول والشخانة . جلدها متناح التنايل الدقيقة . ذنبها سريع الطرب والانقسام || قريبا الى الصهبة السمراء المنسقة بالاسود والابيض . يباتها الششري يستمر نحو اربعة اشهر . الاثني تقع من ٦ الى ١٢ شلفة تطرها في الديال . تأتف العمران والوبر عل السواء . تسرح في التهار . حبرها حيث تركب في الليل تفق سطيل تقفده تحت جلوح الانهار المنسقة على التربة || قتها الحشرات الصغيرة والديدان والباب والحوم || تستبر من الزحافات النافعة المفيدة .



سحلية رشيقة

١٣٣٢١ - سحلية وكود * ، سحلية وكود ،

عقلاية وكود (S). *Lacerta vivipara* (S).

Lézard vivipare (F). Viviparous lizard (E).

حيوان سريو من الظاء وفضيلة السقايات . موطن البلاد المعتدلة الحارة || جسمها يطول من ١٥ الى ١٨ سم . الاثني اكبر قدما من الذكر . رأسها عراني الشوزن . حينما



سحلية وكود

Orchis de Gallée	سحلب جليلي
Orchis melle	سحلب ذكر
Orchis à larges feuilles	سحلب عريض الورق
Orchis papilionacée	سحلب فراشي
Orchis des marais	سحلب مئني

١٣٣١٢ - سحليات ، شحريات

Orchidaceae (S). Orchidacées, Orchidées (F).
Orchidaceae (E).

فضيلة نباتية من وحيدات الفلقة . منتبها الاقاليم الحارة . انواعها المعروفة نحو ٢٥٠٠٠ تضم الى ٩٥٠ جنسا تنجمها خمسة اسباط : البايوبيات والچوثلويات والحاجبيات والسحاب والزنيليات || جميعها ثنائية السائل ، قرصية السوق ، مستطيلة الارزاق الكاملة . ازهارها متباين الاشكال . ازهارها جميلة الالوان الفزائية ، بعضها صلي العرف الفواح وبعضها حديد لا عرف له او كرية الزجاجة .

١٣٣١٤ - سحلية * ، سحلية * ، سحلية * ،

Acacia (S). Acacia, Homme pendu (F).

جنس نباتات مصفولة من فصيلة السطيات . انواعها المعروفة ٧ اصنافا تمتد من الهند الشرقية الى اوروبا الوسطى والاجنوية || اولها خلية ، مياضية ، صمكة النصال ، جميلة الخضار . شراعه الزهري قرصي الانتشاب . ازهارها سلبية التجميع ، مثدية || سطها يرطب في الارابة الرملية ويحبس بمجود في الجصية || يستخرج من صنفها السحلب .

١٣٣١٥ - سحلية ، سحلية

Lepus (F).

Young rabbit (E).

هي كل اذن صغير اقلع من الحرق وقار له .

١٣٣١٦ - سحليات

Chaetodontidae (S).

Chaetodontidae (F). Chaetodontidae (E).

فضيلة اسماك من العظمايات الاشكاليت الزمانف موطنها بحار المناطق الحارة الاستوائية . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها صغيرة القد اجسامها مغطاة بيشية او مستدرة الشكل . الارباب متراكبة الالوان المزخرفة ، الفزائية الجميلة || اشهر اجناسها :

Chelmo	التشع
Pomacanthus	البحر
Hemitochus	الذنفوب
Ploax	الرباني ، الرببي
Chaetodon	السحل
Zanclus	الشوش
Holocentrus	الطويل ، الكنف

١٣٣١٧ - سحلية ، هي البطاية ، اطبا .

١٣٣١٨ - سحلية الحيطان * ، سحلية الحيطان ،

عقلاية الحيطان (S). *Lacerta muralis* (S).

Lézard des murailles (F). Wall lizard (E).

حيوان يروض من الظاء وفضيلة السقايات . موطن البلاد المعتدلة الحارة || جسمها يطول من ١٩ الى ٢٢ سم . الاثني اكبر قدما من الذكر . رأسها عراني الشوزن .

Mellerax musicus (S). السحون الغريد *
Mellerax chanteur, Autour chanteur (F).
Mellerax polygonus (S). السحون المسنح
Mellerax rayé (F).

وهما من الجوارح الثلاثة لانهما يقضيان على جميع انواع الاناعي والمظاظ والوزغ والخشرات .

Cryptostictis ١٣٣٢٨ - سَحْبَة *
 جنس فطور مجهرية من فصيلة البصليات . يتميز ببكتياته البيضاء المجردة في طبها باهداب متعطفة . انواعه قليلة العدد والاوى تركيب بعض النباتات الحرجية .

١٣٣٢٩ - سَحْبَة مَقْمُومَة *

Bembidion ustulatum (S). **Bembidion brulé (F).**
 حشرة قاضية ناعمة من عذبات الاجنحة وضعية الرقائيات . موطنها يمتد من الشرق الاطلس الى اوروبا . تألف المواقع الرطبة اعصها ضفاف مجاري الماء ، حيث تكثر الديدان والخشرات الصغيرة || جسمها يطول من ٥ الى ٦ سم . راسها وكولها الى الخضار الاملس . يهدأها الى السيرة الكسئية الخضراء المولج . فكها ضلجان . ذبائها دقيقة . جنتها صغيرتان ناشزتان . ظهورها قليل الاسدياد ، مستدير الطرف الاثف ، ثنائي التبرزيز القدي القاطب . اراسها خامة البقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجلائدة في الربيع وتبقى حتى الخريف . تسرح في النهار || البرقة عند تمام الادراك تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الجرم ، قائم السرة . راسها وفرجها ودواجيبها الى السواد القصبي || طورا الاكمال يستمر نحو ٥٠ يوما ويقتضي ضمن فلات وام في لفق قليل الاتحاد تحمله البرقة في الجلائدة او في النبال .

١٣٣٣٠ - سَحْبَة *
Leptoconchus (S).
Leptoconque (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عذبات الاريل وضعية الرخويات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جدار البلاد الحارة من العالم القديم ، اعصها البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصداؤها صغيرة رقيقة ملونة جرابية الشكل فسيحة الجيوب دقيقة الاعقاب الطائية . تعيش لاصقة بمذائع الرجزان او بصخور الحشاف المعصورة .

١٣٣٣١ - سَحْبَاتِيَّة *
Septobasidiaceae (S).
Septobasidiacées (F).
 فصيلة فطور مجهرية من رتبة التعاميات وسيدة الجنس . حديثة الاتواع . ظهورها تتكفل بالاشتراك مع القرزيات التي تسير عليها على عدة نباتات منها الحشفيات والاجناس والاشجار والسليان ... || كان مهدا امريكة الجنوبية وقد انتشرت الآن في معظم اقطار العالم .

١٣٣٣٢ - سَحْبَة *
Huile de radis (F).
Radish oil (E).
 مادة زيتية طيبة تستخرج بالعصر من بذور الفجل . متلفها وفوائدها عديدة تستعمل في علاج الاذراع والامراض المعوية وصعوات المرارة .

١٣٣٣٣ - سَحِيل *
Phelloderme (F).
Phelloderm (E).

نسيج نباتي قليل السلق يفصل الطبقة اللغنية من الخشب .

لوزيتان صغيرتان تلتفها ايجان شفاة متحركة . اذنهما غمختا الغشاء الصلياني الاخير الغلاف . متفها قصيرة مستطلة . جلدها متابع التماثيل الدقيقة . ذنبها مستقيم الطرف سريع السلب || ثوبا متراكب الاولان ، اسفح المولج ، يتكرر فيه الاخضر والجوزي والجوزي والخشبي وتلمو خطوط من النقط متضاربة الاولان من الياض الى الاسمر والاسود || يباها الثقب يستمر نحو اربعة اشهر . والاثنى تقص من ٦ الى ١٢ بحليلة طول الواحدة منها لا يتجاوز ٢٥ م . || تألف المروج والحدائق وضفاف الانهار ومجاري الماء ويبيت السكن الرطبة . تسرح في النهار || قوتها الخشرات الصغيرة والديدان والذباب والحولم || تعتبر من الزواجات الناعمة .

١٣٣٣٢ - سَحَابَة *
Sorosporium
 جنس فطور مجهرية من فصيلة الراخويات . طياها رسيمة الحلية تجمعها حواشد لائسمة الجسم تنفكك منه بلوشها من بويئات فردية || انواعه قليلة اشهرها سماء الدخن وسماء الترفليات .

١٣٣٣٣ - سَحَابَة الدخن *
Sorosporium panic-milicet, Sphaelotheca panic-milicet, Uesiago panic-milicet (S).
 فطر مجهرى يركب مبيض ذرة الدخن فيسحق الى بيرة يورغ وضريات . وقد يصعب كامل الاضرار فيسحق على حثاها كائنا اكانها اهداب فم تلموها التكاثر وتلفها الارواح الثلاثة || يكتفى غالبا ذلك بتعطيل البذر اما بمحلول الفرمول المركز ٠,٥ ٪ او بمحلول سلفات النحاس المركز ٥,٥ ٪ .

١٣٣٣٤ - سَحَابَة الترفليات *
Sorosporium saponariae (S).
 فطر مجهرى يصعب بعض الترفليات يركب . قرص الزرة عند انتفاب البيلات حيث يكون سحابة البورية الحنطية الابن الى ان تبلغ كامل دورها الحياتي فتفلق من غيرات حنطية السرة ودية المولج || يكتفى بنقل ورسق الاضرار الموصية .

١٣٣٣٥ - سَحْبَة *
 وكلاء يشبه السحيرة ابيض ينبت في البراق والاكمام ، ولست بمشبه ولا تجر وي اقرب الى الحفرية والصليان . وقال ابو حنبل السمع ينبت تحت الصليان والصليان والكتكث الا انه يطول فحيا في الساء ، وربما كان طول السحبة طول الرجل والشمع (السان) .

١٣٣٣٦ - سَحْبَة * ، شَيْكَل
Schéma (F).
Diagram, Drafte (E).
 غنط تخطيطي يوضح نسبة ابعاض الدالة ومختلف علاقاتها في الموضع المقصود .

١٣٣٣٧ - سَحُون
Mellefax
 جنس طير من البراة وضعية الصقريات . حديد الذن ، قوي الشكبة ، ريع الجلة طوله نحو ٥٥ سم . يسقط تراوح من ١١٨ الى ١٢٢ سم . موطنه افريقية الشرقية والوسطى . يألف مجاري المياه . قوته الاناعي والخشرات . يأن في الاشجار الرطبة اذانه تحفص في وفات نحو ٤ اسابيع || له نومان فقط :



سماء الدخن



سحون غريد



سحيرة شعرة



سحبة

13344 - سحابة (F). *Estor fontalis* (F). *Fontal water* (E).
ماء أصفر غليظ يخرج من المشية عند الوحم .

13345 - سحابة هو السلف ، اطلبه .

13346 - سحابة (F). *Agneau or Agnelle* (F).
Lamb and Ewe lamb (E).
ولد للفنان أو لغير ذكر كان أو أنثى ج تلحج وتخال
وسلان .

13347 - سحابة (F). *Berrage*
حاجز يقام في وسط البحر إما لتخفيف سرعة الاندفاع
المياه ولما تحزنها ويمكن تصريفها عند الطلب أو لزيادة
من طاقتها الولدة .

13348 - سحابة هي الحلة الكبيرة ، اطلبها .

13349 - سحابة (F). *Diplonténa* (F).
نمت تفرقي يطلق على كل زهرة عدد أهديتها ضعف عدد
البساتن أو القناعات .

13350 - سحابة سحابة (F). *Cebrio gigas* (S).
Cébrion giant (F). *Cebrio gigas* (E).
حشرة خاضعة عاشبة من فصيلة السدابيات وربة فضلات
الاجنحة . تألف الاسراج والحدائق . غناصها خاضعة
قوتها ما تقضم من اوراق النبات . يرقاتها خاضعة تعيش
على جلود الاشجار وسطحها || الذكر بطول من ٢٥ الى
٢٨ م . ثوبه ثنائي اللون كسني الرأس والكتف والظهر
البطن والجراميز . رأسه كبير الجرم . عناء كبيرتان .
زبانه دقيقان . ظهرها مستطيل الشكل ، مستدير الطرف
اللاصق . بطنه فاخر المركب المخطئ القرون || الانثى
تطول من ٢٤ الى ٢٨ م . جسمها عار عديم الاجنحة .
غداها جعدتان متفلتان . زباناتها قصيران مستطلان .
بطنها اعطليجي الشكل ، مستطير الجرم ينهي بترك
مدب الطرف || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة
الاجلولة في اواسط آب وتعيش حتى اواسط تشرين الاول .
تفرح في الليل وبيت في النهار || ليربة مدونة الشكل
تطول عند ادراكها التام من ٣٢ الى ٤٥ م . وهي مداسة
الرواجب ، صفراء اللون ، فراء المويج ، كسنية الرأس .

13351 - سحابة (F). *Pincho* (F).
Lath, Slat, Strip of wood (E).
لوح صتير من الخشب الرقيق .

13352 - سحابة (F). *Cabrionidae* (S).
Cabrionidae (F). *Cabrionidae* (E).
فصيلة حشرات عاشبة من ربة غدايات الاجنحة ||
اجتناسها وانواعها قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق
المتدلة الحارة . تألف الاسراج والحدائق والجنان . يرقاتها
عاشبة تعيش على جلود الاشجار || اجسامها متوسطة
لقد تميزت بالاختلاف الاصاعي بين الذكور والاناث .
ذكورها مجنحة ، مستطيلة الاعمار والزباني المشدودة
لكتين . الانثى ملو ، مامدة الاجنحة ، قصيرة الاعمار
المنطقة ، صغيرة الزباني السمكية المختلفة . جراميزها
نشيطة . اصنافها خاضعة القمل || اشهر اجتناسها السحابة .

13353 - سحابة (F). *Examina* (F). *Stamen* (E).
العضو الذكري في الزهرة . وهي مركبة من حامل يسمى

13334 - سحابة (S). *Melanopsis* (S).
Mélanopside (F). *Melanopsis* (E).
جنس حيوانات مائة من الرضويات سديات الارضيل وفصيلة
الديفيديات . انواعها المروعة غريبة منتشرة في معظم اصقاع
البلاد المتدلة الحارة . تعيش في المياه العذبة || اصنافها
شبه اعطليجية الشكل ، سوداء اللون ، يربية الاغصان ،
مفرطة الفجوات المستطيلة || اجسامها مستطيلة . رؤوسها
مقنونة ثنائية الجراس القروية المستطيلة المعينة .

13335 - سحابة بقلة . ج حماء (السان) .

13336 - سحابة (F). *Terre franche* (F).
Thorough soil (E).
السحابة والسحابة والسحابة . الارض البنية الحرة ،
تصلح لحظ الزراعات .

13337 - سحابة ، أبو ميثير (F). *Gryllomorpha dalmatina* (S). *Gryllomorpha* (F).
حشرة دجوبة عديمة الاجنحة من فصيلة الجديديات . ذكرها
اصفر قدام انتائها بطول من ١٢ الى ١٤ م . والانتى
تطول من ١٧ الى ١٩ م . ثوبها الى الصفار الخليلي تطوى
رشفة سراد . ارجلها سداسية . زباناتها عظيمة ، مستطعة ،
فاقة الحبل . مركبها كاليرى يحاط بقرون ضفوفين ||
تعيش في الاماكن القليلة المظلمة وفي الحافز والظلم .
سرحها دجوبي يتد من الدفش الى الفرس . قوتها جميع
المواد الغذائية باستثناء الحوم وله تفضل المواد النباتية على
غيرها .

13338 - سحابة (F). *Symphodial, Sympodique* (F). *Symphodial* (E).
ما كان السعد من ميزاته الجسورية او العداية . كقولك
انتاشي ضادي او نحو ضادي كما هي الحال في بعض
الظهور الدفيا .

13339 - سحابة (F). *Piumula* (F). *Piumula* (E).
السحابة البرش التي تمت اجنحة الطير .

13340 - سحابة (F). *Sphaeritaceae* (S).
Sphaeritaceae (F). *Sphaeritaceae* (E).
مارة ظور مجهرية من فصيلة السطويات وربة الزقيات
اجتناسها وانواعها المؤدية عديدة || تميزت باصنافها الصلبة
العابقة الالوان التي تطلق من سمام مستمرة . اما
ارتكاز اصنافها فقد يكون فرديا او نسبيا تجمع ربة
واحدة || اهرق اجتناسها التي تهم الاقتصاد الزراعي .
الدامق ، الدافعة ، الروزائية ، القصصان ، السوط ،
التيترديه ، الكدوة ، المصاع ، الشبح ، والتفيلة .

13341 - سحابة هو الانذر ، اطلبه .

13342 - سحابة (F). *Bithid* (F). *Bithid* (E).
هو ما يخرج من بطون ذوات الحفر او ذوات اكل
فيل ان تأكل .

13343 - سحابة ، جملوك (F). *Bithid* (F). *Bithid* (E).
التصاق عضون نباتيان ببعضهما بعض كورقين او
صوليون .



سحابة



سحابة



سحابة



سحابة

سرسها سدوي . تدو عل الارض بشفة وتلتاق الاجمار
برفاة || تدن اشائها اما في تجاوياف الاجمار القريبة
من سطح الارض او بين الاصناف الشائعة للترابكة ||
اشهر اجناسها السدان والبزبور .

Stratigraphia (F). **سدائك** *
Stratigraphy (E).
جزء من الحفلة يبحث في الصخور المتسدة .

Stratigraphique (F). **سدائي** *
Stratigraphic (E).
ما له علاقة بالسداكة كفتوك درس التربة السدائي .

Bécote, Bétzolz. **سدكم** *
Bécours (F). Swallet, Sink-hole (E).
السداء حاجز صني يتدفق جري الماء .

Syma (S). **سدك** *
Symé, Halcron-acie (F). Syma (E).
جنس طير من الاجرام واعانت الخناير وفضيلة القرائيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها استرالية وجزر الزانج .
تألف المنافع ونسفات الانهر واخوارها . قوتها الاسماك
الصغيرة والبلابل والقرشيات || اجسامها رمية صغيرة .
ستاليفها كبيرة مسنة الافلاك مما جعلها تتسكن من الاسماك
بسهولة . اثوابها الى الربة يطولها مزاج ازرق اخضر في
الراس والرداء والجناتين والقلب . صدورها الى الربة
الصناينة .

Aculte (F). Recalpt (E). **سد** *
راجع اسوتي .

سد * **سد** * **سد** *
Rhamnus spina Christi, Zizyphus spina Christi (S).
Nabka, Nabquah, Epine du Christ, Julabier d'Orient (F).
Christ's thorn, Nabk tree (E). Christdorn,
Christdornbrustbeere (D). Spina di Cristo, Giugliolo di Palestina (I).

شجرة برية شائكة من فصيلة البنيقيات . مهدا فلسطين
يقال ان اكابيل الشوك الذي وضع على رأس السيد المسيح
كان منها . لشوكها شقية ، غزيرية ، قوية ، جامدة ،
ذرية لنها الى الساني . يحسبها شدة الصلاة شائع
الاستعمال الحربي || يستعمل في السياجات الحية فيفرس
على ابعاد تراوح من متر الى مترين .

سد * **سد** * **سد** *
هو الفدان ، اطلبه .

سد * **سد** * **سد** *
شربين الاكاجور

Cedrea odorata, Toona odorata (S). Cédrel odorant,
Toons odorant, Acajou femelle, Faux-acajou (F).
West Indian cedar, False cedar (E). Bastard cedar,
Barbadoceder (D). Cedro acajou, Cedrella odorosa (I).

توه هو الاسم المندى . شجرة حرجية وتربيتية من فصيلة
الايزونديات . تلون من ١٥ الى ٢٥ م . ورائها مركبة .
وريقاتها وتربة راوح حددا من ١١ الى ٢٣ . نصلها
مالس البشرة . مسن الحافة لونه الى الخضار الباهت .
ايزارها طلي التجميع . اثمارها غشوة ، جلجلة

الحليل ينهي طرفه العلوي بجزء مستقيم يعرف بالثير
او الشك ، يتكون حادة من فصين مستطيلين يفرزان
ويحضنان جذوات الفلق . ج اسنية .

Scaminal **سدائي** *
تمت تمرين يطلق على كل ما له علاقة بالاسدية .

سداد *
هو التفتب ، راجعه .

Bouchon (F). Cork (E). **سدادكة** ، **فلينكة** *
هي السهام التي يسه به قتر القارورة وما اشبه .

Sedlore **سداسي** * **الزهر** *
ما كانت اثارها سداسية التجميع .

Héxandre (F). **سداسي** * **الاسدية** *
ما كانت اسبته سداسية التركيب .

Hexapode (F). **سداسية الأرجل** *
Hexapod, Hexapoda (E).
اسم شامل يطلق على جميع الحشرات سداسية الأرجل
للسناوية . انحصار فرشات حشرقيات الاجنحة .

Hexapécate (F). **سداسية التفرات** *
Hexapetalous (E).
سفة الازهار المركبة من ست بتلات .

Hexactinellidae (F). **سداسية الشعور** *
Hexactinellides (E).
رتبة من الاشبح السواني .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Fusidium .
جنس طور مجهرية من التوسيات وفضيلة الطحيمات .
انواعه قليلة العدد والاذى . بعضها رمية تركب خاء
الانسان الباهية .

Phytogénétique (F). **سدك** *
Plant-breeding (E).
السادة علم يبحث في انتخاب ونتاج اجود البذار .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Seringope (S). Seringope, * **سدك** *
Perroquet nocture, Kakapo (F). Kakapo (E).
طائر وسيد الجنس والنوع من فصيلة السدائيات . موطنه
زيلانة الجديدة . يألف الغابات والبراري الكثيرة المش .
ملجته الحلي زويي . سرجه سدوي يستمر من القروب
الى الشجر . فيه آثار الياينة والمسائل والزواي واخشرات
واسارهما والفاء || جسده كبير القد . راسه قروب
لقبه برأس القنادة . ذنبه شبه غزولي الشكل . محتدل
الطلي . ثوبه الى الخضار المظفر المجاجات يطو تجميع
وتسبح اصفر في الرداء والجنات والصدور والطين ، وقلقة
شديدة السرة في القلب .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Phréntis (F). Phréntis, * **سدك** *
Phrenitis (E).
التهاب الحجاب .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Phrénique (F). Phrenic (E). **سدك** *
سدة الفيات *
Seringopidae (S).
Seringopidae (F). Stringopidae (E).
فصيلة طير من التسفقات يخلو الشكل . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها زيلانة الجديدة
واسترالية || كثير برووسها الشبية برووس القناد .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Phréntis (F). Phréntis, * **سدك** *
Phrenitis (E).
التهاب الحجاب .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Phrénique (F). Phrenic (E). **سدك** *
سدة الفيات *
Seringopidae (S).
Seringopidae (F). Stringopidae (E).
فصيلة طير من التسفقات يخلو الشكل . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها زيلانة الجديدة
واسترالية || كثير برووسها الشبية برووس القناد .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Phréntis (F). Phréntis, * **سدك** *
Phrenitis (E).
التهاب الحجاب .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Phrénique (F). Phrenic (E). **سدك** *
سدة الفيات *
Seringopidae (S).
Seringopidae (F). Stringopidae (E).
فصيلة طير من التسفقات يخلو الشكل . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها زيلانة الجديدة
واسترالية || كثير برووسها الشبية برووس القناد .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Phréntis (F). Phréntis, * **سدك** *
Phrenitis (E).
التهاب الحجاب .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Phrénique (F). Phrenic (E). **سدك** *
سدة الفيات *
Seringopidae (S).
Seringopidae (F). Stringopidae (E).
فصيلة طير من التسفقات يخلو الشكل . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها زيلانة الجديدة
واسترالية || كثير برووسها الشبية برووس القناد .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Phréntis (F). Phréntis, * **سدك** *
Phrenitis (E).
التهاب الحجاب .

سدك * **سدك** * **سدك** *
Phrénique (F). Phrenic (E). **سدك** *
سدة الفيات *
Seringopidae (S).
Seringopidae (F). Stringopidae (E).
فصيلة طير من التسفقات يخلو الشكل . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها زيلانة الجديدة
واسترالية || كثير برووسها الشبية برووس القناد .



سدائي



سدك



سدك

Cardia (F). Cardia (E). صدك ١٣٣٨٠

السلة هي قبة المريء مركزها بالقرب من القلب .

Stratifier (F). To stratify (E). صدك ١٣٣٨١

سدك التبر . لقد بسطها فوق بعض نبي صدك .

Inclination (F). Inclination (E). صدك ١٣٣٨٢

السك والجلية والميل واحد .

Route-en-train (F). صدك ١٣٣٨٣

Station kept with mass (E).

الفصل الذي تعرض عليه الآلات للاستيثاق من ودقها فإذا ضمنت يذري عليها من السجل للشتب .

Scydmæna (S). صدك ١٣٣٨٤

Scydmæna (F). Scydmaenus (E).

جنس حشرات من فصيلة السديميات وربة غدييات
الاجنحة . انواحه المرفوعة حادة منتشرة في بعض افطار
البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هياها ،
تطول نحو ٣ م . رؤوسها طليقة ، صغيرة ، شبه مكورة .
حيثما بارزة . تاذيرها صغيرة . ملابسها الفكية مسطحة .
قرونها الاستشعارية صولطانية ، مهدبة الفصل . كواسها
معدنية . احمادها لاسحة ، عادمة التشنج . قوائمها نشطة ،
مهذبة الاضداد والفتايب والاراسخ . اولياها رسيمة الون ،
تكثر فيها الجوزة فالشفقة قاصصة || جميعها دامة
تميش في التيرب والجلافة والرددي التباي ونعت القشور
والحما .

Scydmaenidae (S). صدك ١٣٣٨٥

Scydmaenidae (F). Scydmaenidae (E).

فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة ، اجسامها وانواعها
المرفوعة حادة منتشرة في مسطر افطار البلاد الحارة والمعتدلة
الحرارة || اجسامها صغيرة ، تطول من ٢ الى ٧ م .
رؤوسها صغيرة ، مكورة . حيثما بارزة ، تاذيرها وفكورها
لانظامية ، ملابسها مسطحة . قرونها الاستشعارية
صولطانية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسها لاقامية
الشكل ، تكثر فيها الاسطالة . احمادها لاسحة ، عادمة
التشنج . قوائمها نشطة . ارباسها خاسية العقل || جميعها
دامة تميش بين القشور والحطاب وفي الرددي التباي
وفي التيرب || اشهر اجسامها السديمون والسديمون

Indute (F). Indutium (E). صدك ١٣٣٨٦

في عباي يوبد في اوراق السرخس يحسن الاكاثم
او اكياس البرخ . وهو ايضا انشاء الرقيق الذي يخلط
البرد ويكن الحشرات .

Cydne (S). Cydne (F). صدك ١٣٣٨٧

جنس حشرات صغيرة ومتوسطة القدر من فصيلة القاسيات .
اتواحه نحو ٦٠ مظهرها مركبات الالوان الباقية كالاسود
والاسمر يعيش على الاضداد البرية يحسن تسها .
اشهر انواحه المؤنثة السديمون والسديمون

Cydne bicolor (S). صدك ١٣٣٨٨

Cydne bicolor (F).

نوع من السديمون صغير القدر يشبه بشكل مطلق الجسم
يطول نحو ٨ م . ويعرض ٥ قووه ابلق الون . رائحته
كزكية ركب القيثول والكرية فينص التلغ ويؤذي
النبات .

الشكل ، متدلية ، يضاء الون ، حرة الرائحة المتحة .
نماها يزور جلة جنة || عشها جبل الون يشبه
الاكاسو ويستعمل اسمها . رائحته رائحة تقرب من
رائحة الارز .

Cádrón (F).

١٣٣٧٦ - سيدرون

شجرة تلح سيبا ، اطبا .

١٣٣٧٧ - سيدريت التيجليات *

Sideritis lithargyria (S). Sideritis des grami-
nées (F). Sideritis lithargyria (E).

حشرة ملوكة من فصيلة السقيات وربة حرشيات
الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا
وافريقية الشمالية . فراشها جارية قفها رقيق الاثمار .
مرستها توش على صف التيجليات || جسمها متوسط
القد يطول نحو ١٧ م . بسطها نحو ٣٧ م . رأسها صغير
الجرم . منها كيرتان . زبانا عيطان . مرستها معتدل
الطول . حيثما ويطن الى الخطي الاصفر المولج ||
روشتها الاماميان الى الخطي الصنابي المولج تملو نقطة
وعلى يضاء وتقرص حادري اسمر . وروشتها الخلفيان
الى الصخرة تملو شحة سمراء || لها جبل واحد في الجبل .
تظهر البراة في حزيران ويقي حتى آب . تسرح في الليل .
تعاظل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتضع للكل لسطا
مستعيلة على الصفحات السفلى من نصال الازراق ||
السرقة تطول نحو ٤٠ م . جسمها اسطواني الشكل . نوبا
الى الصغار الداس تملو سمة خطوط قاطبة سمراء الون
وسمة خطوط مفرقة جزوية الون . رأسها اسمر . مدبا
الى السمرة للقباء . وارجاها شديدة السمرة || طور الاكاثم
الذي يسمر نحو ١٥ يوما ينتفي في التربة حيث تنفذ
السرقة على عمق ٤ او ٥ م .

١٣٣٧٨ - سيدريت مكدوك *

Sideritis vicellina (S). Sideritis vicellina (F).
Sideritis vicellina (E).

حشرة من فصيلة السقيات وربة حرشيات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية .
فراشها جارية قفها رقيق الاثمار . مرستها تمش على
صفت التيجليات وعلى اوراق النباتات المروية || جسمها
متوسط القدر يطول نحو ١٧ م . بسطها نحو ٣٧ م . رأسها
معتدل الجرم . منها كيرتان . زبانا عيطان . مرستها
روشتها الاماميان الى الصخرة تملو شحة صناعية وخطوط
مفرقة سمراء الون وتقرص حادري اسمر . وروشتها
الخلفيان الى الصخرة تملو شحة سمراء . احمادها الى
السطحة النقصية || لها جبلان في الجبل . تظهر فراشة الجبل
الاول في ايار وفراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في الليل .
تعاظل بعد ظهورها بنحو خمسة ايام وتضع للكل على
الصفحات السفلى من نصال الازراق التي تلبس التربة ||
السرقة تطول نحو ٤٠ م . جسمها داس القشور . نوبا
الى الصغار الرقي الاصفر المولج يطو سمة خطوط قاطبة
سوداء الون وسمة خطوط مفرقة صفراء . رأسها الى
السمرة الاربعونية . مدبا الى الركة . وارجاها الى السمرة
القائمة || طور الاكاثم الذي يسمر نحو ١٥ يوما ينتفي
في التربة حيث تنفذ السرقة ضمن جلاب من التلغ

١٣٣٧٩ - صدكسي

Sexcupler (F). To sexcuple (E). صدكسي

جمل الشبه ستة اشعاف .



سدريت التيجليات



سدريت مؤنثة



سدمن



سدنوس ابلق

والبحيرات والمناقع || اصداها متباينة الاشكل والاحجام
يكثر فيها الشكل المزدلي المتساوي الخالطة حتى القبط ||
اعرف اجناسها واشهرها السديفة والصحية .

١٣٣٩٩ - صدكيم ، رَهَج Stratus
نوع من الغيوم وهو خطوط من السحب الشفافة الرقيقة
المستطيلة تملأ الاقن وتنتد عوارثه .

١٣٤٠٠ - صدكيم Nébuleuse (F). Nebula (E).
سديم سُدُم . متطورات شمالية تبدو كشدة نجوم عاتقة
الضوء المبهج عل هيئة صباية يضاء || اختلاف اشكالها
ومعالمها وماحياتها المقدرة دعى الى ترتيبها في عدة فئات .
اشهرها السديم الحلزونية ثم المنتشرة فالخسفية فالغازية فالقائمة .

١٣٤٠١ - صدكيم Archégonie (F).
Archegonium (E).
السدن قصبة تحضن البضو التناسلي الانثوي من الطعالم
والكبديات ومستورات الزهر الوراثة . وفي السدن تربية
البويضة القابلة للاخصاب .

١٣٤٠٢ - صدكيم Apothéca, Apothécie (F).
Apothecium, Shield of lichen (E).
هي ثقت الحزاز واشباهه من النبات . قسم وتضخم الجراثيم
التناسلية .

١٣٤٠٣ - صدكيم Ruta (F). Rue (E).
جس نباتات خشية ربة طيبة معمرة من فصيلة السليديات.
اوراقه متعاقبة مركبة ازهاره حركوني
التجميع ، هامي الارتكاز . ازهاره خنطوية رباعية
البتلات ، شمالية الاسدية || اشهر انواعه ما يلي .

١٣٤٠٤ - صدكيم البهر Ruta montana (S). Rue sauvage, R. de montagne (F).
Mountain rue, Wild rue (E). Bergrante (D). Ruta
montana, R. flinocchina (I).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي طيب يري يملو من ٤٠
الى ٨٠ سم. ساقه ليفية خلية الصماء . اوراقه ثلاثية
التشريح والتفريرض الضيق || ازهاره الى الصفرة .
منافع الطبية دون منافع السذاب الحزني واقل فاعلية .

١٣٤٠٥ - صدكيم الماعز Rue de chèvre (F).
Goat's-rue (E).
هو المكنانة الحزنية ، اطبا .

١٣٤٠٦ - صدكيم سوري Rue angustifolia (S). Rue d'Alep, R. à feuilles
étroites (F). Syrian rue, Aleppo rue (E). Aleppo
rue (S). Ruta frangula (I).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي يري طيب يكثر في
بعض المناطق السورية . يملو من ٣٠ الى ٧٠ سم.
اوراقه جالسة سنائية . تشريحها فشق التفريض، لانياسي
الشكل . ازهاره الى الصفرة . بتلاتها قارصة مشرشرة .
منافع الطبية تمتاز منافع سذاب البهر .

١٣٤٠٧ - صدكيم عَطِير Ruta suaveolens (S).
Rue parfumée (F).
نوع من السذاب وهو نبات عشبي زراعي تربى معم
يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه كاملة مستطيلة ملوثة
الطرف تطول نحو ٢ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم. ازهاره

١٣٣٨٩ - صدكيم مُدْهَب الرُكْبَانِي Cydnus flavicornis (S).

Cydnus à antennes dorées (F).
حشرة من المذفوس وفضيلة القبابيات . جسمها صغير
القد ، مفلطح ، شبه بيضي اللون ، يطول نحو ٤ سم .
قويها الى الجائرة يملوها موج يراوح من الخنط الى الاسود .
رأسها شبه مكور ، اطرافه الداعلية مجهزة بطبق من الهلب
القصرى الشائك . خطها مستدل اللون . عينها صغيرتان
نازحتان . زباناها قضيما اللون . كويلها يثير الجانيين
مالمس الوسط . يطلها كثر الهلب المنسطح . قنارها
شفاف . قوائمها نشطة . فئانيها الامامية مويطة الاطراف
الشائكة || مرتها اصحاب الشطوط . يكثر وجودها عل
الزبل حيث تتنم بصرمة مدحقة || راجعها كريمة .



سحفة

١٣٣٩٠ - صدكيمات الجناح Mecoptera, Ptenoptera (S). Mécoptéroïdes, Pén-
noptères (F). Mecopteroïdes, Pécnoptera (E).
طيفة حشرات مجنحة تشمل اربع رتب وهي
الاجنسة بحرفشيات الاجنحة وذات الجناحين ومادانات
الاجنسة .

١٣٣٩١ - سُدُوم Nébuloité (F). Patch of haze (E).
هو الدخن ظل الغيم وعلى حبه اشم الشمس .

١٣٣٩٢ - صدكي Rosée de la nuit (F).
Night dew (E).
السدى هو لى الليل . ويلى السدى ما كان في اول الليل
والسدى ما كان في آخره .

١٣٣٩٣ - صدكي Datta varta (F). Sour datta (E).
السدى هو البلع الاخضر قبل ان يلو .



سذاب البهر

١٣٣٩٤ - صدكيم Planché à dessin (F).
Drawing-board (E).
المغية لوح من الخشب ملجوم الاطراف مربع الشكل
او مستطيل .

١٣٣٩٥ - صدكي Schedir
السدري نجم نير من كوكبة ذات الكوس . يميرون عنه
في الجدل العام بالتميم الفا من الكوكبة المذكورة .

١٣٣٩٦ - صدكيم Aréole (F). Aréole (E).
تؤلل قلمسوي الشكل ازغب البشرة او شائكةا يكون
في حاء بعض النباتات اسمها الصبار .



سذاب سوري

١٣٣٩٧ - صدكيم Melanis (S).
Mélanis (F). Melanis (E).
جس حيوانات مائية من الرضويات منليات الاصيل
وفضيلة السديليات . انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ منتشرة
في جميع اصقاع العالم . تعيش في المياه العذبة الراكة
القليلة النور || اصداها مدوية حلزونة سوداء اللون .
اجسامها مستطيلة . رؤوسها مقنطرة ثنائية القواس المميعة .

١٣٣٩٨ - صدكيم Melanilides (S).
Mélaniides (F). Melanilides (E).
فضيلة من الرضويات منليات الاصيل . اجناسها وانواعها
عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في الانهر

صفراء اللون ، صطرية العرف الزغدي || أزهاره يستمر
من حزيران الى ايلول .

١٣٤٠٨ - سداب مخزني * ، قيسجبن تين
Ruta graveolens, R. hortensis (S). Rue officinale, R.
fetide, R. des jardins (F). Common rue, Herb of
grace (E). Raut, Garten raut (D). Ruta, Ruta del
giardini (I).

نبات عشبي طبي يعلو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. ساقه
أخضراء مصلية . تصل أوراقه فوق التفرع . لونه ال
أخضر الأزرق . أزهاره سفلية اللون يتلاها مقمر
الشكل متشعبة الصفحة ، مسنة الحافة // وهو خراج
كثيره أرائحه مر الطعم ، للاع ، حريف . يتخرج
بالفتلير دهن طيار له مناعه الخفية . يستعمل
منشطاً للشهية ومدراً لقطط وسهبا للحمية وخافضا للحرارة
بمصادا للجذع ولأرداء البدن .

Rutaceae (S). Rutaceae (F). Rutaceae (E). ۱۳۴۰۹ - سید اکبریان

فصيلة نباتية من ذوات اللبنتين ، مسقلاات القملات ، مرتزعات الميخس . انواها كثيرة البلد تبلغ ٧٠٠ اجناسها ٨٠ تصمها ٩ اسباط . جميعها من نباتات الاقاليم الحارة والمعتدلة . فحسا الاجار والشجيرات والاشحاب . اوراقها لا قياسية الارتكاز منها المتعاقبة ومنها المتعاقبة ازارها خشوية . ثمارها يزود بصيغة او جزء مدينة الانسية .

13410 - مير، مِرَّة، مِرْوَة. Frul(F), Spwn(E).
بيضة السمكة ولحمي صغتر. ج. سره وسرو.

Frayer (F), To spawn (E).
سرا السمك : باض .

١٣٤١٢ - سراء
السراء : شجر تتخذ منه القصب الواحد سرامة . (اللسان) .

١٣٤١٣ - مَرَّابِيَّة هي الكبريتة ، اطلها .

١٣٤١٤ - سراج الفتوة هو السورنجان ، اظنه .

١٣٤١٥ - مَرَايِجُ الْفُطُورِ هـ الخرم، اظنه

۱۳۴۱۶ - مَرَّاجَة هي زنان اخیل ، واجهه .

١٣٤١٧ - میراجیہ * ، سَرَقِج شائع ، قصب
ذہبی ، غوغر الماء

Lysimachie vulgaris (S). *Lysimache commune*, Chasse-bois, Herbe aux cornelles (F). Common loosestrife, Yellow loosestrife (E). Goldfelberich, Gemeiner Weiderich (D). *Lisimachia vulgare*, Mazza d'oro, Cosaria (I).

نوع من السرمج وهو نبات شجيري ممر يطول من ١٠٠
الى ١٥٠ سم. أوراقه متقابلة ضيقة ثلاثية. نسلها
سنانى الشكل خلى البشرة. أزهاره حمراء التجميع. ثوبها
ذهبي اللون. فصلها بحر اختار للمهدب || أزهاره يستمر
من حزيران الى آب. يرغب في الاربة المتوسطة الانساج
والرطوبة.

Fougères, Filicales (F).
Ferns (E).

صفت من شعبة مستورات الزهر الوضائية. يشمل السرخس
الانحشار وكبرية البئر وغيرها. مركزها في سلم الرقي
النباتاني يأتي بين الحزازيات وبدايات الزهر. وهي من
النباتات الجذور الحقيقية، فصالها واجنتها وانزواها
المختصرة لا تحصى لأنها كانت أكثر النباتات انتشاراً
فيها حجباً. أما البنا المعاصرة فنحو 1٥٠ وانزواها
لا تقل عن ٦٠٠٠. وبنا طبقات الفحم الحجري سوى
الفحم وسجيرا ما تراكم وتكسب من السرخس وغيرها في
الحقبة الكربونية في دلتا أكثر من ٣٠٠ مليون سنة.

۱۳۴۱۹ - سرادکا
السراة والسراد من الثمر ما اضر به النطش فيس سقط
قبل يثمه .

۱۳۴۲ - سرازان - هو النظم ، اطلبه .

Sénilitéé (F), Senility (E), ٥ ١٣٤٢١ - صرکة
 المرأة الوطن الجمهوري الذي يحمل بالرجل عند الشيعة،

١٣٤٢٢ - سَرَاوِيلُ الطُّكُوكِ هي الشعبية، اطلها .

١٣٤٧٢ - صِرَآئِيَّةٌ ، هَدَوِيَّ Contagion, Infection
 قابلية انتقال الامراض الميكروبية من فرد مريض
 الى آخر سليم .

Cave (F). Case, Cellar (E). مَسْرَب - ١٣٤٢٤
محلّيز تحفظ فيه بعض الحاصلات الزراعية المتناعية أو
غيرها كالخمر والجبن النخ.

Collecteur (F), Collector (E). ١٣٤٢٥ - حَرْب
مصرف كبري تفتحي اليه مياه المصارف فيسببها الى
المشقة .

13426 - سِرْب
Troupe, Troupeau, Banc de poissons (F), Troop,
Flock, Herd, Drove, Shoal of fish (E).
اسم شامل يطلق على القطيع الكبير من الطير والحيوان
السمك.

13427 - سُرْبَة ، سُرَيْف Rangée de vigne (F).
 Range of vine-branch, Row of vine-branch (E).
 الصف من ثمرات الكرمة.

Serapis (5). ١٣٤٢٨ - سرّيس
Sérapias (F). Serapis (E).

جنس لياقات برية ممررة من فصيلة السحليات . انزاهه
المروقة خمسة منبتها حوض البحر الابيض المتوسط ||
سوقها شمراعية منتصبه جوفاء . اوراقها متعاقبة خاضعة ،
مستطيلة ، متساكنة التصلب الضيقة . انزهارها هامي شبه
سنبل التجميع . انزهارها كبيرة ارجوانية اللون او جفوية ||
جسم انعامه ثمانية زوج في المراكز .

Stromateus (S). ١٣٤٢٩ - سترماتوس
 Stromateus (F). Stromateus (E).
 جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة
 الاسقمريات . اماكنها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة



سذاب مخزنی



عمرأجية

١٣٤٤٠ - سربوطة * Ceratode (F).

هو ديب الحوت، جنس اسماك كبيرة القد تعيش في المياه العميقة.

١٣٤٤١ - سربوطة * Ceratophorum

جنس ظهور بحيرية من الرديانيات وفصيلة السطحيات. يتميز بكتلاته المؤثرة للشفية الانقسام الباقية اللون التي تحمل في اطرافها بعض السطوح المحلية القريبة الشبه بالزبان || انواعها قليلة العدد والادى تركب الارواق دون ان تغطيا .

١٣٤٤٢ - سربوطة * Ceratosoma (S).

Cératosome (F). Ceratosoma (E). جنس حيوانات بحيرية من الرغويات مميزات الاربيل خلفيات الخياشيم وفصيلة الدوريسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اصنافها بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها عريضة مستطيلة عديدة الظهور الثلاثية التحويات. رؤوسها ثنائية القياس، غياشها ضيقة التجميع تركيز على سطحيات انبوبية قواعدا تلاصق قواعد التحويات الظهريه الاخرى. ارجلها زوجية متدلة الطول ضيقة .

١٣٤٤٣ - سربوطة * Cerithinella (S).

Cérithinelle (F). جنس حيوانات بحيرية من الرغويات مميزات الاربيل وفصيلة السربويات. انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من مستحزات الطبقية الجبورية والبيض الآخر منتشر في سطح بحار البلاد المعتدلة الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اصنافها صغيرة، ردينية الشكل، متشابهة الحلوثة حتى الانقلاب. فوئتها ضيقة، ارفقتها مستقيمة. رؤوسها صغير، لها مربع الشكل والخلف. لاستساها مستطيلتان.

١٣٤٤٤ - سربوطة * Ceratites (S).

Cératite (F). Ceratites (E). جنس حيوانات بحيرية من الرغويات رؤسيات الاربيل رديانيات الخياشيم وفصيلة السربويات. انواعها المعروفة قليلة العدد جميعا من المستحزات. اصنافها تشتر من الحقبة البرية الى التراسية || اصنافها اسطوانية الهيكل قرصية الشكل، كثيرة المحزبات والصلوح النافرة المتفرعة.

١٣٤٤٥ - سربوطة * Nucella (F).

Nucellus (E). السربية او النسلية مجموعة النسخ الوثنية التي تتألف منها الكتلة المركزية في بويضة النباتات بديات الزهر .

١٣٤٤٦ - سربويات * Ceratitidae (S).

Cératitidae (F). Ceratitidae (E). فصيلة حيوانات بحيرية من الرغويات رؤسيات الاربيل رديانيات الخياشيم || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعا من مستحزات اواخر الاباج الاول واولى الاباج الثاني || اعرف اجناسها السربيت .

١٣٤٤٧ - سربوطين * Séroline (F).

نوع من الخفايش الضيقة يدعى عشاف الليل ، اطلبه .

انواعها المعروفة خمسة تتميز باجسامها المحلية الشكل، وزياداتها الظهريه والكثيرة المتجلية المقنرة || رؤوسها صغيرة ، غلظتها قمعية مستديرة ، ملتحفا بقية تكاد تكون منقسمة || ألوانها مختلفة الالوان تكثر فيها الرتبة القلبية الموج || اعرف انواعها واشهرها سربوطة الحنوط .

١٣٤٤٨ - سربوطة الحنوط * Stromateus

Stromateus fiatola (S). Stromateus fiatola, S. de la Méditerranée (F). Stromateus fiatola (E).

نوع من السربوطة . سمكة بحرية يبيض . اصلها البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير القد ، مبط الجرم ، محني الشكل ، بطول نحو ٢٠ سم. ثوبا الى الرتبة المرجانية الضيقة الموج تتبع عند الظهور وتتر وتزهر عند البطن وبعدها تسليج ذهبي في الشطر الاخر من الجانبين || رأسها صغير القد . غلظتها شديد المقعر ، متغير الطول. زعانفها الظهريه والكثيرة مستطيلة ، مقنرة ، متجلية الشكل . زعنفتها لليلية غائبة مستطيلة الجناح || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٣٤٤٩ - سربوطة * Stromateus

في السحام . اطلبه .

١٣٤٥٠ - سربوطة * Stromateus

في الاشران نبات من الخلدات ، اطلبه .

١٣٤٥١ - سربوطة الأرض * Stromateus

في الاشران السري ، اطلبه .

١٣٤٥٢ - سربوطة البحر * Stromateus

في قصبة الماء ، اطلبه .

١٣٤٥٣ - سربوطة السحر * Stromateus

في اشران السحر ، اطلبه .

١٣٤٥٤ - سربوطة الفرس * Stromateus

سرة الفرس نجم نير من كوكبة الفرس الاطلي مركزه على السرة .

١٣٤٥٥ - سربوطة التجفف * Stromateus

في اذن جودا من الفطور للأكل ، اطلبه .

١٣٤٥٦ - سربوطة * Cyrtostoma (S).

Cyrtostome (F). Cyrtostoma (E). جنس طير من الجوام رديقات المتأثير وفصيلة المغريات . انواعها المعروفة سبعة ، اصنافها القارية الاسرائيلية وجزر ماليزيا || اجسامها رديية . متناظرة مستطيلة ، غرزية الشكل ، قليلة التفويص . اذنانها صغيرة . ارجلها دقيقة، مستعدة الانقطاع . ارجلها الى الخصرة الزقية الموج و بطونها الى الصغار الكبيرتي . اعناق ذكورها زبرجدية تحاصي الموج || قوتا الحوام وديق الاتزار .

١٣٤٥٧ - سربوطة * Carthilopsis (S).

Carthilopsis (F). جنس حيوانات بحيرية من الرغويات مميزات الاربيل وفصيلة السربويات. انواعها المعروفة عديدة ، بعضها من مستحزات الطبقية الطباشيرية والبيض الآخر منتشر في بحار البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اصنافها غروبية، متشابهة الحلوثة حتى الانقلاب. سطحيات قليلة القدر ، ضيقة التجميع والتعزيز المقنرة || اعرف انواعها السربوية المدرة (C. tubercularis) .



سربوطة الحنوط



سربوطة



سربوطة



سربوطة



سربوطة

١٣٤٦٠ - سَرَحْسُ سَبَّحِ الْأَرْضِ *

Asplenium ruta-muraria (S). Asplénie des murailles, Rue de muraille, Sauve-vie (F). Wall spleenwort, Wall-rue, White maidenhair (E). Maner steinfarn, Steinfarn (D). *Asplenio ruta muraria*, Solva vita (I).

نوع من السرخس يربط في الموانع الكلسية الرطبة. يصل من ٦ إلى ٢٠ سم. أوراقه كثيرة للتشريح والتفريش تشبه أوراق الفينير. ضلها عاقبة الخضار، نصلها باحت اللون الأخضر. مرجته، حبة الزغب، حلالة المراج. أكياسه البوقية تحيط مستطيلة، حريانة. يقال أنه من النباتات الطبية يفيد الكبد والطحال.



سرخس البرية

١٣٤٦١ - سَرَحْسُ لَافَن

Osmunda cinnamomea (S). Osmode balsamique, Fougère fleurie (F). Osmund, Flowering fern (E). Riesenfarn (D). *Osmunda cinnamomea*, Felce florida (I).

نوع من السرخس يربط في المناطق والغابات الرطبة. يصل من ٦٠ إلى ٩٠ سم. أوراقه الغنية النابضة سلازنية الشكل، زينة البشرة، زينة آخر اللون. وريقاتها متساوية الحجم والأركان. خيطة النصل اللزب المفضة. مرجته، حبة الزغب، حلالة المراج. أكياسه البوقية المتفوية تتجمع طولها نواص. حنطي اللون دقيق الحيط || زوايته البريئة شاملة. ينمو في المراكز لكنه ينشئ الجفاف وكثرة النور.



سرخس ذكر

١٣٤٦٢ - سَرَحْسُ لِحَاءِ الْفِيلِ *

Asplenium trichomanes (S). Faux-capillaire (F). Bristle-fern, Common spleenwort (E). Brauner, Streifenfarn (D). *Asplenio poltrico*, Erba rugginina (I).

نوع من السرخس يكثر في الموانع القليلة الرطبة. يصل من ١٠ إلى ٢٠ سم. أوراقه مستطيلة متساوية العرض. ضلها سوداء اللون. وريقاتها يضيء النصل الأخضر. مرجته عاقبة الخضار، حبة الزغب، حلالة المراج. أكياسه البوقية، مستطيلة، حريانة || وهو من النباتات الطبية. يقال أنه يفيد تفحم الطحال.



سرخس سبع الارض

١٣٤٦٣ - سَرَحْسُ مَحْفُولِي *، سَرَحْسُ عَيْشِ الْفَرَّ، كَفَّ الشَّصَرِ

Phyllitis scolopendrium, *Scolopendrium vulgare* (S). Scolopendre officinale, Langue de cerf (F). Bird's nest fern, Hart's tongue fern (E). Vogelnest, Echse hirschaenge (D). *Phyllitis*, *Lingua di cervo*, *Fillitide* (I).

نوع مبدول يكثر في الموانع الرطبة بين الصخور ومن مدخل المغاور. يصل من ١٥ إلى ٢٥ سم. جذاريه فسيحة، غليظة، منتصب. أوراقه خيطة النصل المستطيل. مرجته حشفية البشرة يصلها زغب دقيق. سلائل أكياسه البوقية غليظة التركيب عديدة الاشكال المزخرفة || وهو من النباتات الطبية. تقيم جليده يقيض على اللدودة الوحيدة ويستخلص من جذاريه وأوراقه بعض الزيوت العطرية ولثايتها لما استعملها الطبي.



سرخس لحاء الفيل



سرخس غزفي

١٣٤٦٤ - سَرَحْسُ مُسْتَن، سَرَحْسُ شَوْكِي

Dryopteris aculeata (S). *Dryopteris aculeata* (F). Wood fern, Prickly shield fern (E). Schildfarn, Penkstaarn (D). *Aspidio* (I).

نوع مبدول يصل من ٣٠ إلى ٩٠ سم. جليده قليل الاستعداد. أوراقه جامدة النصل وأغصان وريقاتها غليظة التسج تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. حطايه مستن

١٣٤٤٨ - سَرَحْج

Selle (F). *Saddle* (E). ضرب من الرجال يوضع على ظهر الدابة فيقيد عليه الركب.

١٣٤٤٩ - سَرَحْجَنَ

وزع السرجين على التربة.

١٣٤٥٠ - سَرَحْجِين، سَرَحْجِين

مزيج من المواد الخشوية والنباتية المختصرة للمنحلة في التراب والغنية بالنضار الآزوتي.

١٣٤٥١ - سَرَحْج

Inermis (F). *Thornless* (E). كل شجر لا شوك فيه.

١٣٤٥٢ - سَرَحْج

هو القشة نبات من الكبريات.

١٣٤٥٣ - سَرَحْجَاب

Eonycteris spelaea (S). *Eonycteris das cavernae* (F).

جلس حيوان من فصيلة الوطواطيات أنواعه المرفقة نحو ١٢ جميعها بهاء صلبة لينة، طولها يراوح من ٩ إلى ٢٥ سم. بطنها من ٢٥ إلى ٣٠ سم. أظفارها إلى الرتبة المنطية السمرات المختلفة المراج. رؤوسها قصيرة، فرائطها مدببة مضبوطة. أنسبها مستطيلة || موطنها الشرق.

تألف الكهوف والمغاور. مسرحها من اللسق إلى الفخبر. قوتها التار على اختلاف أنواعها.

١٣٤٥٤ - سَرَحْجَان

هو اللب، اطلة.

١٣٤٥٥ - سَرَحْجَة

السرح في الآلة، اطلة. ثمرا كالنبت يسمى الآلة.

١٣٤٥٦ - سَرَحْجَاب

هو النعام، اطلة.

١٣٤٥٧ - سَرَحْسُ الْبَلْقُوطِ *

Asplenium adnathum-nigrum (S). *Oradille noire*, *Capillaire noire* (F). *Black maidenhair*, *Black spleenwort* (E). *Schwarzer streifenfarn* (D). *Aspleno nero* (I).

نوع من السرخس يكثر في أراجح السنتيان وبين الصخور وعلى مجاري الماء. يصل من ١٠ إلى ٤٥ سم. أوراقه كثيرة التشريح والتفريش. نصلها حيل الخضار قلاصم، ضلها سوداء. مرجتها قليلة الزغب. أكياسها البوقية ممرام اللون، حنطية الشكل، سركفة حريانة. يقال أنه من النباتات الطبية يفيد المعدة والأمعاء.

١٣٤٥٨ - سَرَحْسُ جَحْصَاص

Dryopteris robertiana (S). *Dryopteris calceolea* (F). نوع من السرخس يربط في التربة الكلسية ولا ينشئ التشريح. يصل من ١٥ إلى ٣٥ سم. جليده مداد أوراقه متباعدة الانتشاب. ضلها حنطية اللون نصلها أصفر المسفة العليا، أخضر المرحمة، أزغب البشرة. زكاته مريانة يحميها حار كيث أزغب أصفر اللون.

١٣٤٥٩ - سَرَحْسُ ذَكُور *، شُرُود

Dryopteris filix-mas (S). *Fougère mâle* (F). *Male fern*, *Male polypody* (E). *Wurm-schildfarn*, *Manich-wurm* (D). *Felce maschia* (I).

نوع من السرخس المبدول يصل من ٤٥ إلى ١٢٠ سم. جليده قليل الاستعداد. أوراقه غليظة الفصيح كبيرة النصل الشنتي اللون. مرجته حشفية البشرة. سلائل زكاته كلية للشكل، مسنة الحافة || يحيد في جمع الموانع القليلة الرطبة.

والأوراق . طول الذكر منها يراوح من ٤٠ الى ٦٠ سم. والآن من ٥٥ الى ٧٥ سم. ثوبها أخضر اللون . أوتيلها الامامية قوية مستطيلة . بطنها مبط بشكل لا تكمن على النبات بدون حرك . قوتها ما استطاعت اليه من الحشرات والمواد من من ميزاتها الخاصة ان اناتها تفرس ذكورها على أثر الكرم .



سرعوب شائع

١٣٤٩٢ - **سِرْعَافَةُ الْبَحْرِ** (F). Manteo de mar (F).
دودية بحرية من القشريات قدي شكلية ، اطليبا .

١٣٤٩٤ - **سِرْعَافِيَّات** (S). Mantidae (S).
Mantidae (F). Mantidae, Soothsayers (E).
نفسية حشرات من مستطبات الاجنحة . ثوبها انساب الاخضر . اوتيلها الامامية مدقة القنص . قوتها الاستمارة دقيقة مستطيلة .



سرعوقة

١٣٤٩٥ - **سِرْعَافِيَّات** ، **زُرْدَجِيَّات** (F). Sermontoux (F).
Sermontoux (E).
لست تمرني يطلق على كل نبات اخصانه مستطيلة ليلية غشوشة يسهل التناولها كسروع الكرم .

١٣٤٩٦ - **سِرْعَافِيَّات** (F). Engder (F).
هو قشيب الكرم الذي يقلم طولاً من قصد .

١٣٤٩٧ - **سِرْعَافِيَّات** (F). Sargasso (F). Sargasso (E).
جنس نباتات بحرية من الالغيات السرو وصفية القشريات .
انواعها المروطة قليلة العدد ، منتشرة في جميع بحار العالم
اخصها بمسار المناطق الاستوائية والحدية . يفي من العنايات ، اكبر نباتات بحرية سرعوقة ، اطولها تراوح من ١٠٠ الى ٩٠٠ متر .



سرعاف

١٣٤٩٨ - **سِرْعَافِيَّات** (F). Proctolytropæres (F).
Proctolytropæres (E).
رنية حشرات من طيقة حشرات الجناح . اضعفها تعود الى الحلقية البرمية اي الخامسة من الاباج الاول
كانت تتميز بكبر القند وبمستطالة الاجنحة .

١٣٤٩٩ - **سِرْعَافِيَّات** ، **بَيْضُ الْأَرْضِ** ، **عُفْطِيَّة** (S). Crepis (S). Crépide, Crépide (F). Crepis, Hawk's beard (E). Grundfuss (D). Crépide (I).
جنس نباتات شبيهة حولية او معمرة من فصيلة المركبات .
انواعها كثيرة العدد منها جميع اجزاء النبات الحولية والحدية
والباردة . جلوهها عديدة غليظة . سوكها زياد الماء قليلة اللزوق . اقراصها الزهرية متباينة الاحجام والالوان .
انواعها الزراعية قليلة العدد اعرفها على .



سرعوقة

١٣٥٠٠ - **سِرْعَافِيَّات** (S). Crepis sibirica (S).
Crépide de Sibérie (F).
شبيهة معمرة تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها متعاقبة ،
حاشية ، سنائية ، ذقة . تسلمها يطول من ١٥ الى ١٥ سم .
لونه الى الخضار الباهت . انوارها وردية ثلاثية او خماسية لتجميع انبها الى الصفرة يطولها زغب اسود
ازهارها ينشمر من ثور الى آب .

١٣٥٠١ - **سِرْعَافِيَّات** وَرْدِيَّة (S). Crepis rubra (S).
Crépide rose (F).
عشبة حولية تملو من ١٠ الى ٤٥ سم . جلوهها يفي الشكل . سلقها قليلة الفروع . اوراقها البغل مفردة

١٣٤٩٤ - **سِرْعَافِيَّات** ، **شَلَاوَا** (S). Chelara (S).
جنس عقارب جهرية من الدنقيات ونفسية الطحليات .
جهره الكنديية حزيمة التجميع ، يبقية الاطراف ، تملوها كتال .
اسطوانية شغافة مسحية الارزكاز والترتيب ان انواعه قليلة اعرفها سرعاف السديان .

١٣٤٩٥ - **سِرْعَافِيَّات** (S). Chelara quercina (S).
فلر جهرية يركب الاوراق ليليلها ويقتضي على الشجرة .
ظلمه الخلابي يقع قرصية خلية لالسية الشكل والحجم سراد اللون تركب الاوراق تقضيها الى اللؤلؤ السرمع الذي يعقب يياس الشجرة .

١٣٤٩٦ - **سِرْعَافِيَّات** (F). Vitace (F). Quickness (E).
المسافة التي يقطعها جسم متحرك في وقت محدد .

١٣٤٩٧ - **سِرْعَافِيَّات** (F). Pampre (F). Vine-branch (E).
قشيب الكرم الغض الرطب .

١٣٤٩٨ - **سِرْعَافِيَّات** (F). Circumnutation (F).
Circumnutation (E).
السرعة حركة مروحية تلاصق في نغمة الساق وسوط الجذر عندما يكون النبات في طور النمو البطولي .

١٣٤٩٩ - **سِرْعَافِيَّات** (S). Ictis, Mustela (S).
Belette (F). Weasel (E).
سرعووب ج سرايب . جنس حيوانات مفترسة من فصيلة السروبيات .
انواعه ٣٥ اقسامها مستطيلة ، جرانها قصيرة .
الولها كثيفة الور تميل مع اقترابها من لوج الظهر وتثبت عند البطن
الشجاعة يسرح في الليل والناهار . يمدد على الارض ويشلق الاجزاء ويوم ويطنس في الماء . قوته القار والجرذان والناجل والطيور العاجنة والسمالير والوزغ والخشرات
جنسه سرب ينفذ في التربة او دوج يصفر بين الصفور او كناس يهر في شقوق الاجزاء .
انك تقص من ٤ الى ٥ جوار مرقين او ثلاث مرات في السنة .

١٣٤٩٠ - **سِرْعَافِيَّات** (S). Ictis nivalis, Mustela vulgaris (S). Belette commune (F). Common weasel (E).
لوع من السروبيات موطنه تسبح اديان يمتد من الهند الى ادرية . طولها نحو ١٨ سم . وذيها ٤ .
الانثى اصفر من الذكر . راسه غزويي الشكل . عظمه مقنوم . اذناه صديقتان مستديرتان .
لونه الى الصفرة الجذوية صدو ويكس وياطون جرانها يبيض
في ثلث النباتات والاصراج وصفات الاجزاء وضواحي الباسكر .

١٣٤٩١ - **سِرْعَافِيَّات** (S). Mustelidae (S).
في فصيلة السموويات ، اطليبا .

١٣٤٩٢ - **سِرْعَافِيَّات** ، **قِرْسُ التَّحِي** ، **حَصَاكُ الْقِيَّاس** ، **حَصَاكُ الْيَلْبَس** ، **أَبُو صِلَاح** (F). Mantis religiosa (S). Mantis religieuse, Prie-Dieu (F).
Mantis, Soothsayer, Praying insect (E). Europäische Gottesanbeterin (D).
حشرة مفترسة من فصيلة السروبيات غريبة الشكل

١٣٠١٧ - سَرْخُود بَرْي

Anthriscus sylvestris (S). Cerfeuil sauvage, Chérophylle (F). Wild chervil, Cow parsley (E). Wilder kälberkropf (D). Cerfoglio salvatico (I).

نبات عشبي بري محلي. منه المروج والمرابي الجبلية. جلده مستطيلة فائقة يقال إنها لا تخلو من بعض العناصر الجحالية الصارة بالحول.

١٣٠١٣ - سَرْخُود بَكِّي

Anthriscus cerefolium, Scandix cerefolium (S). Cerfeuil cultivé (F). Chervil (E). Kerbel, Kälberkropf (D). Cerfoglio coltivato (I).

بقلة زراعية حولية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها مأكولة مستعدة العلم، فواحة الحرف البطر || تجود في جميع الأتربة المحضلة الانساج.

١٣٠١٤ - سَرْخُود عَطِر * و سَرْس

Myrrhis odorata (S). Myrrhis, Cerfeuil musqué (F). Myrrh, Sweet fern, S. cleya (E). Spanische Süssholde (D). Mirride, Finocchiella odorata (I).

جلس نباتات شبيهة حزامية معمرة من فصيلة الشبقيات. أنوعها قليلة الممد منها البرية والزراعية. البرية صغيرة الجذور المستطعة. ساقها ترتفع نحو ٧٠ سم. أوراقها مركبة كبيرة اللد، خلية النصل الثلاثي التقليل. رائحتها ذكية الحرف تشبه الأليسون || أما الزراعية فجلودها حزامية الشكل، غليظة اللحم. كانت ولا تزال من النباتات المفيدة الانتشار لأنها ترطب في المناطق البحرية الكثيرة الضباب.

١٣٠١٥ - سَرْخُود لَفْشِي *

Chaerophyllum bulbosum (S). Cerfeuil bulbeux, C. tubéreux (F). Turnip rooted chervil, Parsnip chervil (E). Rubenkälberkropf (D). Cerfoglio bulboso (I).

نبات عشقولي بقلي محلي. جلده لفي الشكل كبير اللد. ساقه تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقه مركبة، خلية النصل ثنائية أو ثلاثية التقليل || جلده أبيض الحباب، سكري العلم، يحوي من المواد الغذائية ما قدره نحو :

٣,٥ ٪ مواد ازوتية

١,٤ ٪ مواد دهنية

٢٧,٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وهو من النباتات التي ترطب في الأتربة الحارة الخسبة للفسقية العناصر الغذائية.

١٣٠١٦ - سَرْخُود أسود * *Salamandra atra* (F).

واحد من أسود.

١٣٠١٧ - سَرْخُود مَبْدُول * *Salamandra atra* (F).

هو السمندل المبدول، اطلبه.

١٣٠١٨ - سَرْخُودِيَّات * *Urodela* (F). *Urodela* (E).

رتبة حيوانات من صف الضفادعيات. اجناسها وأنوعها كثيرة الممد جميعها أربع فصائل || معظمها مائي وبعضها قريب. تتميز بمراء جلودها وما تنقسمه من مواد أكالة سامة || أشهر فصائلها السمندليات.

١٣٠١٩ - سَرْخُودَة * *Acarvule*

السرخولة هي الكنية التي لا يمكن تمييز جيلها عن القصعة البرولية.

كلوراك المتبداء. أزهارها ووليمية مستطيلة، المالحق، لونها الالويدي يتصلها تشبيح حاقن || شوح أوراقها وأزهارها عند البرق، يقبه اليد || أزهارها يتسمر طولك الصبغ والخريف.

١٣٠١٢ - سَرْخُود * هو ينور البربر، اطلبه.

Sargus (S).

Sargus (F). Sargo, Sargus (E).

جلس اسماك بحرية من القرشيات الشائكات الزعانف. أنوعها عديدة جميعها يقبض الشكل مفطعة. رؤوسها غليظة وقصيرة. زمانها الثانية فائقة. سقمها حولي رقيق || ألوانها عديدة فيها القفي واللحي والمرجاني والاسمر الزيتوني || أشهر أنوعها الاربعة التالية : السرخوس المألوف والسرخوس والسياس والحلارة.

Sargus (F).

١٣٠١٤ - سَرْخُود حَذَادِي

هو السرخوس المستدير، اطلبه.

١٣٠١٥ - سَرْخُود مَأْلُوف * *Sargus vulgaris* (S).

Sargus commun (F). Common Sargo (E).

نوع من السرخوس ينتمي الشكل، بقفي اللون، حاقن الظهر، يكثر في البحر المتوسط || يتغير من الاسماك المادية المتوسطة الصنف.

١٣٠١٦ - سَرْخُود مُسْتَدِير * *Sargus rondeletii* (S).

Sargus mouchon, Sargon (F).

نوع من السرخوس مستدير الشكل، مستطيل الزعنفة اللونية الفائقة. ثوبه أحمر اللون يملو موانع قفي وتؤنس ودي. ظهره أحمر من جانبيه وبطنه. يكثر في البحر المتوسط || يتغير من الاسماك المادية المتوسطة الصنف.

١٣٠١٧ - سَرْف * *Apathique* (F). *Apathetic* (E).

نمت ترميمي يملو على من كان عديم الشعور ويتغير بالكسل والتغور.

١٣٠١٨ - سَرْخُود * *Chenille* (F). *Caterpillar* (E).

اسم ترميمي يملو على رقات القراشات منذ لونها حتى دخولها في طور الحادة.

١٣٠١٩ - سَرْخُود مَبْدُول * *Syrphus corollae* (S).

Syrphus angustatus (F).

حشرة نائمة من السرخديات. شكلها كالبابية. طولها نحو ٨ م. رأسها أصفر اللون. يملها جندج بالأسود. تنح مكها على الأوراق التي يركها الارق فينشق من رقات دويدية، حلقية الشكل، فضاء اللون تلتقن الارق وتقتدره.

١٣٠٢٠ - سَرْخُود مَبْدُول * *Syrphus boissae* (S).

Syrphus aeneus (F).

حشرة نائمة من السرخديات. شكلها كالبابية. طولها نحو ٩ م. رأسها أصفر. يملها منظر ضبوط وزلاكن سيد || رقاتها مفترقة تقضي على الارق.

١٣٠٢١ - سَرْخُود * هو الاطريال، اطلبه.



سرخوس مألوف



سرخوس مستدير



سرخوس مجلد



سرخوس مزهر



سرخول بري



سرخول بقلي



سرخول عطر



سرخول لفي

١٣٥٢٠ - سُرُون أبيض الذرقة *، سُرُون

الزُرُوع
Anisoplia leucaspis (S).
Anisoplia arvicola (F). Pastoral chafer, Cereal chafer (E).



سُرُون أبيض الذرقة

شبه يرمني الشكل، أصفر اللون، غطاه غروطي. مكها شديد النشط. عينها كيرتان قرنيتان. زبانا دقيقان صغيران. صدرها إلى القرقة السفلى. يمشي كالبليلة، أصفر اللون، صلب الملامح. قوائمها إلى الصفرة السناوية. وثنائها خطيا الخصبان || تظهر الحشرة الجبلية من أيار إلى تشرين الأول، مسرحها البراري والقبائط. قوتها رقيق الانصار || الاثني أكبر قنأ من الذكر تنجح مكها في برز الحويان فيقتف من يرقات ثلاثة تعيش على البراز حتى الاكمال.

١٣٥٢٤ - سُرُون البصل *

Eumerus strigatus (S). Mouché des oignons, Eumère décharné (F). Lesser bulb fly (E). Kleine Zwiebelmückenfliege, Zwiebelmückenfliege (D).



سُرُون

حشرة صغيرة من السُرُونيات طولها من ٧ إلى ٨ مم. لونها إلى الخضار الأصفر طولها ثلاثة وراكس مسر || تظهر في أيار ثم تنجح مكها على أوراق البصل والقرنبيط والبطاطا فيقتف من يرقات تقرض الاقراص الجبلية والنباتات.

١٣٥٢٥ - سُرُون القمح *، سُرُون

Méridon aequitrans, M. clavipes (S). Méridon, Mouché des narisses (F).



سُرُون انصم

حشرة من السُرُونيات طولها من ١٥ إلى ١٧ مم. انصم من النحلة، زبانه الجسم، لونها إلى البنية || تظهر في أيار. تنجح مكها على أوراق الترس وبشر الأورقيات فيقتف من يرقات تنجح ثورا نحو القرن السبلي فتقرض ولا تتركه إلا عند آخر السلاخ قبل أن تتصلب إلى ملدء كزبد.

١٣٥٢٦ - سُرُون أبيض

Orthoneura elegans (S). *Orthoneura élégante* (F).

حشرة ناعمة من فصيلة السُرُونيات. جسمها كثيف أخضر، صغير القنأ، يطول من ٧ إلى ٩ مم. رأسها مخبط أسود الخضار. غطاه وبكها صغيران. صدرها إلى أبيضان. زبانا دقيقان صغيران. صدرها إلى الخضار الملعب. يمشي شديد السرعة، أخضر الخمار. قوائمها إلى البنية السوداء. وثنائها قسطنطينا الخصبان || تظهر الحشرة الجبلية في الصيف. ممرها البراري والحقول والزرود. الاثني أكبر قنأ من الذكر، تنجح مكها على سوق النباتات التي يركبها الأول فيقتف من يرقات شديدة الصغر تسمى وراة الارق فتقرض.



سُرُون البصل

١٣٥٢٧ - سُرُون يثت *

Syrphidae (S). *Syrphidae, Hover flies, Flower flies* (E). *Schwefelfliegen, Schwebfliegen* (D).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين اجناسها وانواعها عديدة لا تقل عن ٧٠٠٠ جنسها صغيرة القنأ خضرة. طولها يراوح من ٣ إلى ٢٠ مم. رؤوسها بفسضة صغورها. قوتها الاستشعارية ثلاثية القواسم. ألوانها زاهية متعدة. نمط اجناسها يعيش على شجر الاثمار، وفيها الحواكة والنباتات || مكها دقيق الجسم لاقباصي الشكل والوضع والجنس. قد تنجح على فروع النبات أو تقتطف به في الماء الزاكن أو الآسن أو ترز في الارق وفي بعض النماط || يرقاتها خضرة، صغيرة، شكلها شكل السلق. لونها إلى البنية وفيها الأخضر والأصفر والحلي. يبي والنجمة أو حواكة أو نائلة. مظهرها ارضي وبشرها عالي والارضية منها تلم الأوراق التي تركبها وتقرض الاقراص الجبلية والنباتات.



سُرُون الترس

حشرة واثمة غامضة مؤذية من فصيلة الجبلية ذرية سفدت الاجنسة. مظهرها يشبه مظهر المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى الى اوروبا واوريقية الشالية. تألف المزارع والحقول. خضفها تعيش على افرار النباتات المختلفة الانواع وعلى صفت الجبلية. يرقاتها تعيش على جلود الزروع والنباتات المروية || جسمها صغير القنأ، يطول من ٧ إلى ١٠ مم. لونها إلى الخضار الامس تملو في القصد زركفة صفراء. رأسها صغير الجسم. يمشي بمظهر تحت الكول. عينها صغيران، بارزتان. زبانا مرقبان، صغيران. كولها مخبوط الشكل. جرمها معتدلة الطول، مائلة الانحدار، مسنة القناتيب. ارساخها خاسية العقل، مهدبة الحواشي || الاثني اميز قنأ من الذكر واملظ بنأ واطول سرأ واكد ثورا || لها جبل واحد في الحقل. تظهر الحشرة في أوائل أيار وتبقى حتى اواسط تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة بطيئة النمو لذلك الكال المسجور به التفتت بنة أشهر. جسمها مقوس يطول نحو ٢٢ مم. لونها إلى الخليل. رأسها والخلقة الصفرة الاثني إلى البنية || طور الاكمال يسمر من ٤٥ إلى ٥٥ يوما.

١٣٥٢١ - سُرُون

Carophytum (S). *Cérophytte* (F). *Carophytum* (E).

جنس حشرات من فصيلة السُرُونيات ذرية غفبات الاجنسة. انواعها الممرقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من المالحين القدم والجبلية || اجسامها مسطوية الشكل، هيأة، تطول من ٥ إلى ٩ مم. رؤوسها معتدلة الجسم والشرور. عينها صغيرة، بارزة. تأثيرها وبلاسها نظامية. قوتها الاستشعارية مسطوية عند الذكور، مشاربة عند الاناث. كولها مخبوط مطوية للقدم والمخمس. الحماة لاحقة، تحية التمدد القناتيب، قوائمها نشطة. اثوابها ملونة || تألف لنباتات التي تكثر فيها الاجحار الورقية كالصفاص والحور والسندباد، لانها تعيش مع يرقاتها في الجروع النخرة.

١٣٥٢٢ - سُرُونيات

Cerophytidae (S). *Cerophytidae* (E).

فصيلة حشرات من سفبات الاجنسة. اجناسها وانواعها الممرقة متوسطة العدد، منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة والحارة || اجسامها صغيرة القنأ، مسطوية الشكل، معتدلة البسيط، تطول من ٥ إلى ٩ مم. رؤوسها معتدلة الجسم. عينها صغيرة، بارزة. تأثيرها وبلاسها نظامية. قوتها الاستشعارية مسطوية عند الذكور، مشاربة عند الاناث. مركبة من ١١ فصلة. كولها شبه مكورة. الحماة لاحقة، تتميز باستقامة مداور القناتيب الرصلي والخلقية. ارساخها خاسية العقل. اثوابها ملونة || تألف للنباتات التي تكثر فيها الاجحار الورقية حيث تعيش في جلوسها النخرة || أشهر اجناسها السُرُون.

١٣٥٢٤ - سُرُون اعظم *

Rhinia rostrata (S). *Rhinia à grand rostre* (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة السُرُونيات. جسمها متوسط القنأ، يطول من ٩ إلى ١١ مم. رأسها كبير الجسم،

١٣٠٢٧ - سركوستوماتيدات (S). Sericostomatidae (F).
 فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، سمرار اللون. اجنحتها امتدلة الطول، كثيفة الخمل الذي يغطي الاصاب والرق. اللباس الفلكية عند الذكور مستطيلة الخمل المرموس الذي يبدو كالتفاح امام الرصد. وتتميز ذكورها ايضا بقصير زنايلها المسننة الطرف || اساريمها تنيش في المياه الجارية ملحوة بجليب، نهاية الاشكال، ويكثر فيها الخروطي .
 اشهر اجناسها :

Sericostoma (S). السركوستوما
Goera (S). القوروي
Silo (S). السيلو
Curnocia (S). الكوروسيا
Lasiocephala (S). اللاسيوسيفالا

١٣٠٢٨ - سركوپ قناسي البعج (S). Cercopla quinqueangulata (F).
 حشرة من فصيلة السركويات . جسمها صغير القد يطول نحو ٩ م. ثوبها الى السواد الاسفع تملو خس بقع حر . رأسها مستعرض ، قليل التنو . خطمها مستدل الطول . صناعها صغيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كويلها محذوب . حقيقتها صغيرة ، عرصة . ظهورها كامل الحنجية ، لاصف . روثانها غشائيان ، شفافان . بطنها اسود على صفحتيه . قوائمها شبيهة سواد اللون || مبدولة في كل مكان . قوتها النسخ تنصه من اوراق الاصناف .

١٣٠٢٩ - سركوپ عدسي (S). Cercopla sanguinea (F).
 حشرة من فصيلة السركويات . جسمها صغير القد يطول نحو ١٢ م. ثوبها الى السواد الاسفع الملتصق بالامر . رأسها مستعرض ، قليل التنو . اسود . خطمها مستدل الطول . صناعها صغيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كويلها محذوب . حقيقتها مزوانية . ظهورها كامل الحنجية ، لاصف ، شديد الحمرة الاريجوانية ، متبعج بالاسود . روثانها غشائيان ، شفافان . بطنها اسود على صفحتيه ، احمر الحيد . قوائمها الى السواد || يكثر وجودها حيث تكثر الاصناف والنباتات الدغلية . قوتها النسخ تنصه من الارواق .

١٣٠٣٠ - سركوپيات (S). Cercopidae (F).
 فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصيرات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها يألف البلاد الحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة مبطن . رؤوسها مستديرة . نواحيها ثنائية الزناب . عوضا كبيرة . قرونها الاستعمارية صغيرة ونحيلة . تتميز بظنايبها الخلفية المادنة الاكفار ، لكنها مجهزة بمنانيس حادة . وتتميز ايضا بالقفز يساعد على ذلك استطالة قوائمها الخلفية .

Fibranea (F). سرق
Scapla fibre (E).
 نسيج اصطناعي اكثر لاذعة من الرود ، سده قصير القيلة يجمع بالقتل .
١٣٠٢٩ - سرق (F). Acroclini (S).
 جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات . انواعها عديدة تنبت بوفرة في الاساقح المعتدلة . منها نوع واحد زواحي ترابي يغطي السرق الوردى .

١٣٠٣٠ - سرق وردى (F). Acroclini roseum (S).
Acroclini rosea (F). Everlasting, Immortelle flower (E). Schmaier sonnenfugel (D). Acroclini (I).
 نوع من السرق وهو نبات عشبي حولي ترابي . يطول من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه متعاقبة لاطة . نسلها سناني الشكل ، ضيق الصفحة . ازهاره رؤسية قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الوردى ، حادها ابيض || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٣٠٣١ - سرقاط زباني الاصابع (S). Suricata tetracycla (F).
 حيوان لبون لاص وحيد الجنس والنوع من فصيلة اقربادات موطنه بعض مناطق افريقية الجنوبية || جسمه صغير القد ، قريب القبة بالنسس . طوله نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٥ سم . قوائمها قصيرة رباعية الاصابع ، خفيفة الجرائن ، اصعبها الاسبية . جلده كثيف الوبر . وبزهر اخر القاعده والقمم الاسفل ، اطول القمم الاصل المشوب بعض الصغار . لذلك ربياه صغيرتان مطوختان بالاسود . ذنبه الى الخطم الصفراء واستثناء الطرف الاسود . ظهوره يمتد بالاسود || ملجعه الحياتي جاني . يألف الحولية الرملية حيث تنفر له سهولة استنار الاوتار . قوته القويوات اصعبها الجردان والثثان ثم يصل النباتات الدفصية .

١٣٠٣٢ - سرق (F). Vin scarbe (E).
 هو القليل الحار الطعم ولا يكون ذلك الا في الخمر الجديدة التي يتنصها بعض السكر .
١٣٠٣٣ - سرقين (F). Compose
 هو السباد القوي المختبر الناعم من مختلف ارباخ وكثافة واقدار للزراعة يضاف اليه بعض الكلس بمعدل ١٠٪ تسهيل لتحويله واشتار ورسمة تميله نيا بعد .

١٣٠٣٤ - سرقيني (F). Humigane (E).
 لمت تريني يطلق على كل مادة تنتج الدبال .

١٣٠٣٥ - سرق (F). Corque, Cornicula (F).
Small horn-shaped cup (E).
 زائدة قرنية مزدوجة لاقسية الشكل تتحلل بما الحشرات المستقيمة الاجنحة مركزها تحت آخر رتبة فوق الحلقة الشريعية مثل سرك الهيك الذي يشبه الجلم .

١٣٠٣٦ - سرك (F). Perdrix (female) (F).
Partridge (female) (E).
 انثى الجمل .



سرق وردى



سرقاط زباني الاصابع

الى السرة الكستنية . فكادما غليمان . وهي سداسية
الرواسب ، ثلاثية الحالب الطرفية ، محورة الحلب الجانبي .

١٣٥٤٨ - سرموكود * *Ovovivipare (F).*

Ovoviviparus (E).
نمت تفرني يعلق على الحشرات البنية اللونية كما في
بعض القترزيات والذباب التي يتم حخن مكبها وقلقه
داخل الجسم عند طرف الانطوية .

١٣٥٤٩ - سرموج * *Anus*
هو غرغز القفل اي طرف المني المستقيم .

١٣٥٥٠ - سرموج * *Ephippiger ephippiger (S).*
Ephippigère, Porte-selle, Porte-hotte, Hotteux (F).
Ephippiger (E). Setzelschracke (D).

جندب من القترزيات ثوبه الى الصفار الخشن . طوله
٢٧ الى ٤٠ سم . كسبه كبير القدر مسروج ،
يعطو تهلجج متصالب اسمر اللون . زبانا دقيقتان
مستطيلتان . مرز كالكسيف شكلان واستقامة . مجاديه
شدنية القصير . اجنسته ريزية . انفاده كبيرة . سيقانه
دقيقة لا تمكن من القفز المستمر . يتكرر ويجهه في الزواحي
وبين الاشجار وحل الارض البور . قوة القفز الاغصير .
وقد يركب الكروية فيقضي على عليها ويلبثها .

١٣٥٥١ - سرموكيات * *Mégascopéus (F).*
Mégascopéus (E).

رنية حشرات متفرقة من طبقة الطباكات . اساطيرها
تعود الى الحقبة الاخيرة من الالاج الاول المعروفة ايضا
بالحقبة البرمية || اساطيرها تقل عن ان حشرات
كالت كبيرة القدر ، قضيفة الاجسام ، مفترسة كما هي
الحال عند الياسيب المعاصرة .

١٣٥٥٢ - سرمجان * *Aeschna (S). Aeschna (F).*

جلس حشرات مفترسة من السرمانيات . انواعه عديدة
تقرب قرب الماء قريبا الذباب والحوام وبعضها يقرض
التحلل .

١٣٥٥٣ - سرمجان شائع * *Gomphus vulgatissimus (S). Aeschna commun (F).*

نوع من السرمان طوله نحو ٨٠ سم . جوشه اغصير اللون
يعطو تسليج اسود . يملكه مستطيل الشكل بترتبه تهلجج
اصفر . ارجله سود || يقرض الذباب والحوام والتحلل .

١٣٥٥٤ - سرمانيات * *Aeschnidae (S).*

Aeschnidae (F). Aeschnidae (E).
فصيلة حشرات من رنية الرطافات . اجنستها وانواعها
عديدة تتميز بقرط طرانيها وباستمرار اجنستها عند الراسة .
انثاها تسرع في الماء الراسة تفضلت بمكبها على سطحه .
مسطها من الحشرات المفيدة لانها تقتدر الحوام .

١٣٥٥٥ - سرموج * *Lysmachia (S).*

Lysmachia (F). Loosestrife (E).
جنس نباتات عشبية مسيرة من فصيلة الربيديات . انواعه
نحو ٥٠ مسطها بري وبسطها ترابي . اورلقها متعاقلة
وسبا غصية ثلاثية ارض رطابية التسجيع . ازهارها حامية
الارتكاز . عشوية متصبة او سبلية || منسبا
الجلد الحارة والمعتدلة . ترطب في المواقع الرطبة . اشهر
انواعها ما يتبع .

١٣٥٤١ - سرموكود * *Sarcodes (F). Sarcodes (E).*
السرموكود مادة حيوانية عادمة الاغذية والشرابون .

١٣٥٤٢ - سرموكويل * *في ذبابة السم ، اطلبها .*

١٣٥٤٣ - سرموكولة * *Sarcococa (S).*

Sarcococque (F). Sarcococca (E).
جنس جنات معمرة من فصيلة البقيسات . موطنها الشرق
الاقصى . سيقها فراء متصبة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .
ازهارها صغيرة لاجابية الشكل . ازهارها وحيدة المسكن
صفراء اللون . ثمارها نووية .
انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٣٥٤٤ - سرموكولة مسكندرية القوق * *Sarcococca rusdolia (S).*

Sarcococque à feuilles de fige (F).
نوع من السرموكولة . ساقه زبانه المعاد متصبة تملو من
١٢٠ الى ١٥٠ سم . اورلقه شبيهة بارواق الصفصاف ،
تطول من ١٠ الى ١٢ سم . ازهارها الى الصفار الكبريتي .
ثماره بيضية الشكل ، ارجوانية اللون .

١٣٥٤٥ - سرموكولة صفصافية القوق * *Sarcococca saligna (S).*

Sarcococque à feuilles de saule (F).
نوع من السرموكولة . ساقه زبانه المعاد متصبة تملو من
١٢٠ الى ١٥٠ سم . اورلقه شبيهة بارواق الصفصاف ،
تطول من ١٠ الى ١٢ سم . ازهارها الى الصفار الكبريتي .
ثماره بيضية الشكل ، ارجوانية اللون .

١٣٥٤٦ - سرموكولة هوكر * *Sarcococca Houkeriana (S).*

Sarcococque de Houker (F).
نوع من السرموكولة . ساقه تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم .
اورلقه احليجية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ سم . ازهارها
الى الصفار الباق . ثماره نصف كروية الشكل سيوا
اللون .

١٣٥٤٧ - سرموكولة بنفسجية * *Carocoma violacea (S). Carocoma violet (F).*

Carocoma violacea (E).
حشرة طيبة واثقة غاشلة واثمة من فصيلة الملوذيات ورنية
معدنات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة
الحارة من اقاليم القديم . تألف البراري . غشاشها تعيش
على ازهار فصيلة المركبات . يقاتها والجمه تعيش على ما
تستطيع اقتحامه من الدب والمكن || جسمها متوسط القدر
يطول من ١٢ الى ١٤ سم . ثوبها الى الزرقه البنفسجية
يعطوها موانج اغصير . رأسها مستدير الشكل . زباناها
صنوبريات . عيناها صغيرتان . ظهورها مستدير الطرف
اللاصق || من ميزاتها انها تقفز عنه لسها مادة صفراء
اللون كروية الرائحة . وان جهازها التنفسي وطوارها يحسن
مادة لائقة تنبع الجلد بتدر الجاء والايلاج . ويتر ما يجعلها
من الحشرات الطليعية . اما نسبة البلايين الموجودة فيها
فتتراوح من ٩٠ الى ١٠٠٪ || الاثاق ابيض قدام من الذكر
وابيض ثوبيا منه وادخس يطن || لها جيل واحد في الخيط .
تظهر الحشرة المجلدنة في اواسط ايار وقبض حتى اواخر
تموز . تحسر في النهار || البرقة تطول نحو ٢٠ سم .
جسمها مبسط الشكل ، اسمر اللون ، اغبر الموانج . رأسها



سرموكولة بنفسجية



سرموج



سرمان شائع



سرموج

معتقة، متعاقبة، كبيرة اللقد، شاربة، غليظة الشكل. نصلها حديد المروق، كثير التجميع، لونه إلى الخضار المائل || أوراقها تستعمل أكل السبانخ. أما بزورها فطرية سهلة وقوية.

١٣٥٦٤ - سرمق بحري * ، قطف بحري ،

Atriplex halimus (S). **حلم**
Arroche marin, Pourpier de mer, Halime (F).
Ses-orache, Ses purslane (E). Meerportulak, Ständmelde (D). Porcallana marina, Disciplina frasturn, Malochia (I).

جنية برية غشوية تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ترطب في المواق الساحلية الشرقية على البحر. أوراقها مأكلة وقد تملأ. يكثر استعمالها في بعض المناطق الاسبانية والانكليزية.

١٣٥٦٥ - سرمق بري * ، قطف بري

Atriplex hastata (S). Arroche des champs (F). Wild orache (E). Spiessmelde (D). Atriplice astata (I).
عشيرة برية حولية تكثر في الحقول المزروعة. أوراقها مستطيلة سنائية. ترعاها الماشية ليحسن حالها ويجيد درها.

١٣٥٦٦ - سرمقيات

Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (S).
Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (F).
Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها اولواها عديدة. اصطلحوا البلاد للمتلفة الحارة. جميعها احشاش وبنبات بعضها يرطب في السبانخ المالح.

١٣٥٦٧ - سرمقيات

Dictyoptera (S).
Dictyoptères (F).
رؤية حشرات تقتني إلى طبقة الورديات، تشمل عدة فصائل اشهرها بنات وردان والسرمقيات. اجناسها وانواعها زهاء ٤,٠٠٠ اكثرها من حشرات البلاد الحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة.

١٣٥٦٨ - سرمقيات

Serombus gallus (S).
لوع من اللداع يمكن منه اطعام الطيب.

١٣٥٦٩ - سرقة خشنة * ، مكينة * ، (سكان المصفر)

Cerinte (S). Cérinthe, Mélinet (F). Honeywort (E).
جلس نباتات عشبية مثالية طرية برية حولية او معمرة من فصيلة الحشقيات. الوانها المعروفة نحو ١٢. جميعها احشاش فراء. أوراقها متعاقبة حاشية بحرية اللون. ازهارها سفلية التجميع، صغيرة اللقد، صفراء اللون اورادية. تفرز رقيقاً صلي المادة يحمره التمل || أوراقها طرية تستعمل في علاجات العين. يزود تسكن للمصن لروايح الجنب والظهور. وفرقة منه مع الزعفران والبصل يمد الطهر كمين على الحمل. وهو ينج الباء || اشهر انواعه ما يلي.

١٣٥٧٠ - سرقة خشنة * ، مكينة خشنة *

Cerinte aspera (S). Cérinthe rugueuse, Mélinet rugueux (F).
نوع من السرقة المخترقة البرية الخولية. عشباتها تملو من ٥٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها اطليعية الشكل، اذنياتها

١٣٥٦٩ - سرمق زراعي الورق

Lysimachia quadrifolia (S). *Lysimache à 4 feuilles* (F).
نبات معمر منه امريكة الثباتية. يملو من ٣٠ إلى ٩٠ سم. ساق زينة. أوراقه متعاقبة، لاطئة، ضمية، ربابية. نصلها اخضر اللون على صفحته. ازهاره كبيرة اللقد، فريدة، ابطية الارتكاز، طويلة الزنادة متدلية. لونها إلى البياض اللتي || ازهاره يستمر من حزيران إلى آب.

١٣٥٧١ - سرمق شامع

مشهور باسم سراجية. اطباء.

١٣٥٨ - سرمق حقيقي

Lysimachia atropurpurea (S). *Lysimache pourpre noir* (F).
نبات حولي او عويل يملو نحو ٦٠ سم. ساقه سرقة. أوراقه متعاقبة اطليعية. نصلها مائل البشرة، اخضر الصفحة العليا، طاق السفل. ازهاره متوسطة الكثافة متدلية. لونها إلى الحرة العنقية || ازهاره يستمر من تموز إلى ايلول.

١٣٥٩ - سرمق مزول

Lysimachia ephemerum (S). *Lysimache éphémère* (F).
نبات معمر يملو نحو ١٥٠ سم. ساقه سرقة. أوراقه لاطئة، متعاقبة، سنائية. نصلها بحري اللون. ازهاره حشوي ومنتصب، مستطيل. ازهاره صغيرة اللقد، يضاء اللون || يزهر من تموز إلى آب. يرطب في الارربة الكلسية.

١٣٥٩٠ - سرمق شسبل ، سرمق عيني

Lysimachia barystachys (S). *Lysimache à gros épis* (F).
نبات سروي معمر منه الصين. يملو نحو ٦٠ سم. ساقه زينة. أوراقه متعاقبة اطليعية. نصلها خيل البشرة اخضر الصفحة العليا بحري السفل. ازهاره سبل الشكل كثيف التجميع. ازهاره صغيرة اللقد يضاء اللون || يزهر من حزيران إلى تموز.

١٣٥٩١ - سرمق حوشم

Lysimachia punctata (S). *Lysimache ponctuée* (F).
نبات معمر يملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه زينة. أوراقه متعاقبة ضمية ثلاثية او رباعية التجميع. نصلها سنائي الشكل، خيل البشرة على صفحته. ازهاره صفراء اللون يطولها تيجيح آخر ويتهيب وودي || ازهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

١٣٥٩٢ - سرمق ، قطف

Atriplex (S). **Arroche** (F). **Orache** (E).
جلس نباتات برية، عشبية حولية او غشوية معمرة من فصيلة السرمقيات. الوانها عديدة منها الاقاليم المعتدلة. ساقها غزيرة العصارة اللينة الزجة. أوراقها متعاقبة. ازهارها قياسية متباعدة الالوان || اشهر انواعه ما يلي.

١٣٥٩٣ - سرمق ابيض * ، قطف ابيض

Atriplex hortensis (S). Arroche des jardins, A. épinard, Belle-dame, Bonne-dame, Chou d'amour, Follette (F). Orache, Butter leaves, Mountain spinach (E). Gartenmelde, Grünkraut (D). Atriplice, Spinaccone, Bells dama, Bletons (I).
بقة زراعية حولية تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها



سرمق ابيض



سرمق بحري



سرمق بري



سرقة

مستطيلة . نصلها مهدب الحافة المسننة ، معون البشرة على صفحتها . أزهارها متدية ، توبجاتها أرجوانية اللون ، صفر الأطراف . أزهارها يستمر طوال شهر تموز .

١٣٥٧١ - سَرَقَتْهُ صَغِيرَةٌ ٥ ، مَلِكُنَا صَغِيرَةٌ ٥ ،
حَشِيشَةُ الْبَرَصِ (لِسَانُ الْعَصْفُورِ الصَّغِيرِ)

Cerintho minor (S). Cérinthe petite, Málnée minor, Petit mélindet (F). Small honey-wort, Waxflower (E). Gelbe wachablume (D). Erba valola (I).

نوع من السرنته القشرية البرية وهي عشبة حولية تنمو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها مستديرة الأذنات ، فضية الشكل. تنصلها مدون الصفحة العليا. ازهارها إلى الأصفر الكبريتي ويملأها عند قواصلها بتجيج خيالي السند البصر.

يوجد في احر. ازهارها يستمر من ايار إلى تموز.

١٣٠٧١ - مَرْكَبَةُ مَالِسَة ٠ ، هَلْبَنَةُ مَالِسَة ٠
Cérinthe glabrâ (S). Cérinthe glabre, Mélilot glabre (F).

نوع من السرته المنثريه المعصرة . يجلبها تلو نحو ١٠ سم .
أوراقها بيضية الشكل ، دقيقة الاذنينات . نصلها مائل
البشرة على صفحتيه . أزهارها ذهبية اللون محبة النصوص .
أزهارها يستمر من أيار الى آب .

١٣٥٧٣ - سِرْكَتُهُ مَكْتُوبَةٌ ٥ ، مَكْتَبَةٌ مَكْتُوبَةٌ ،
(لِسَانُ الْعُصْفُورِ الْجَبَلِيِّ)

Cerintho retorta (S). *Cérinthe retournée*, *Mélinet*
retortu, *M. de montagne* (F). *Honey-wort* (E).
Wachblume (D). *Cerinta* (I).

١٣٥٧٤ - مَرْكَبَةُ مُنْطَخَةٌ، مَكِينَةُ مُنْطَخَةٌ
Cerinth maculata (S). *Cérinthe maculée*, *Mélinet maculé* (F).

لوع من السرته المشرقة المعمرة . مجلتها تملو عن ٩٠
 ال ٧٠ سم . أوراقها أهليجية مسطحة ، أذيتها
 مستديرة . تصلها مدرن الصفحة العليا . أزهارها نارية
 اللون يعلها عند قواعد فصوصها تبتج أزرق || أزهارها
 يستمر طوال الصيف .

Mosaïque (F). مَسْرُجٌ ٥ ، فُسَيْفَسَاءُ
Mosaic (E).

جلس اوصام يورسية فتأكد حليمة الانواع تصيب النيات
تؤذيه وقد تقضي عليه. يوارسها ذرية القند لا تشاهد
بالبحار العادية لان طولها يراوح من ١٠ الى ٢٠
مليميرون. وهي تعيش داخل للفسج النباتية وتتغزل
لقيا مع النسخ بواسطة الجروح والاغاديش والخشرات
القاضية والماصة ل اشهر انواعه واعمرها سرج البطلان
والتي والبنورة والشكل.

١٣٠٧٦ - مَكَّةُ الْعَرَبِيَّةُ *

نوع من السرج قسيه يوارس اسطوانية الشكل مختلفة

الاحجام قطرها من ١٥ الى ٥٠ مليكريز. اشهرها
 انواعها انتشاراً يورس Y ويورس A ويورس X ويورس S
 ويورس F ويورس M. كل منها يشكل ضراً بغيره له
 ميزاته الخاصة. جميعها مؤذية تعطب الازراق والسرور والاساق.
 من الاوصام للتصعية التي حيز العلم حتى
 الان من معالجتها والقضاء عليها. فالقاية باجتناب
 البدار الملوث والارتداء اللزوة والزيارات المائلة القرية
 هي خير حاية مستطاعة الآن.

١٣٥٧ - مَرْنَجُ التَّبَعِ *
Mosaic du tabac (F).
Mosaic disease of tobacco (E).

وع من الفرنج تنبيه يولس مركبة قضائية للشكل
مطلوب من ٢٠ إلى ٢٥ ملياريون تنقل مع السلع
في سائر اعضاء اللجان الارواق والبالق في مظاهرة
الخاصة، في الارواق الفنية، على عاقبة وابتداء
للتحسية الشكل والفرقبة تلو صفحة التصل وتفرقة
في غنطل الاشكال التشويعية الغربية اعصها الاستعالة
بالتفرقة والتجسيد والانتكاش. واذا اخرى الارواق
بعد اكمال نمطها يتقنها دون ان شوية فكلمها

١٣٥٧٨ - مَرْنَجَة * ، فِيلَادِلْفُس

Philadelphus (S). Seringa (F). Syringa. Mock orange (E). Jasmingartenstrauch, Falscher Jasmin (D). Stirlingia, Floro d'anglo, Pazzienza (I).

جسین شجیرت بریة و تریلتین من فصيلة السرفیسات (القیلیات). اولها نحو ۱۵ سوقیا فرها . فرها متعاقبة . اولها حادبة ، مدقة ، متعاقبة ، یضیة . التصل الحسن الحلة || زهارها کبيرة القد ، حجلة الشكل ، خضقة التجمع ، لفتیة ابلات المنبسة ، الشجر الاشجیة ، یضاه الاول . یضها قلع الحرف الشجر المتدل القدر . اشهر اولها تریلتین ما یتیم .

Philadelphus hirsutus (S). مَرْنَجَة زَبَّاه. ١٣٥٧٩
Syringa hirsuta (F).

شجرة سبروية مهددة بالانقراض. تملو من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم. أوراقها طويلة من ٣ إلى ٦ سم. نصلها منشوري الحافة، خالي الصفحة السفلى. أزهارها حادة البرق، بيضاء اللون قطرها نحو ٣ سم. تزهر في حزيران.

١٣٥٨٠ - مَن كُنْجَا شَاكِعَا

Philadelphus coronarius (S). *Syringa communis* (F).
شجرة سبروتية عديدة القلوب مهددة القتل وأوربيت.
تتولد من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ سم. أوراقها تتولد من ٧
إلى ١٢ سم. تتصلها سنان الشكل، مائل الصلابة العليا،
خالي السفل، مهددة الحافة إلى أزهارها نواحة الأزهر
يضاء اللون، غلبة التجميع، كبيرة القند، الأزهر
نحو ٤ سم. أزهارها يتسمر من أيار إلى سبيران

١٣٥٨١ - مِثْقَالُ صَفِيَّةَ الْوَرَقِ

Philadelphia microphyllus (S). شجرة صغيرة
أوراقها بيضاوية طولها نحو ٣ سم. فصلها أزغب الصف
السفل. عديم التسنين || أزهارها صغيرة القد ، عروق
الزئعة ، بيضاء اللون || أزهارها يستمر طوال الصيف



صبري محمد البطاطا



سرخی التبغ



مسئله

١٣٥٨٧ - سُرْتَجَة عَادِيَة السُرْف

Philadelphus inodorus, *Doutzia corymbosa* (S). *Seringa inodora* (F).

شجرة سبروتية مهددة أمريكية الثنائية. تطلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها بيضيه مديبة المصقة. تطلو من ٦ الى ١١ سم. نصلها من الحافة، خلى المروق || انزعارها عمادة السرف، و ترة التجميع، فردية او ثلاثية، قشرها نحو ٤ سم. لونها اليباض المالحى || انزعارها يستمر من ٤ الى ٥ اسابيع ابتداء من لوائل ايار .

١٣٥٨٢ - سُرْتَجَة كَبِيْرَة الزَهْر

Philadelphus grandiflorus (S). *Seringa à grandes fleurs* (F).

شجرة روفية مهددة أمريكية الثنائية. تطلو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها بيضيه تطلو من ٨ الى ١٤ سم. نصلها مالى الثيرة، مشاري الحافة || انزعارها قليلة السرف، يضاء اللون، كبيرة اللد، قشرها نحو ٦ سم. نصلها الزهرية مستطيلة قليلة الكتلة || انزعارها يستمر من نيسان الى ايار .



سُرُوْف صِيَاد

١٣٥٨٤ - سُرْتَجَة مَكْسِيْكَة

Philadelphus mexicanus (S). *Seringa mexican* (F).

شجرة سبروتية مهددة المكسيك تطلو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها حرة صغيرة اللد تطلو نحو ٥ سم. نصلها جلدي الصفرة من الحافة || انزعارها حرة الرائحة، يضاء اللون يعلوها، عند انكشاف بتلاتها، من الداخل، تنمش اربوينا || انزعارها يستمر من سربان الى تموز.

١٣٥٨٥ - سُرْتَجِيَّات

Paleoptera (S). *Paleoptères* (F).

شعبة سحرات من طائفة المهنجات أصلا. تشمل حاليا طليتين واربع رتبة ترميها ما على :

١ طبقة الببسيات التي تشمل رتبة الالفوطيات ورتبة الزعنفيات .

٢ طبقة العوسيات التي تشمل رتبة الجحليات ورتبة الرماشات .



سُرْمِيْت بَحْر

١٣٥٨٦ - سُرُوْف

Bald buzzard (F).

السُرُوْف ج سرائيف، جس طير من العقبان وفضيلة التصريقات. انواعه عديدة جميعها من القواطع: اجنبتها مستطيلة ذلقة. منارها قوية، شديدة الانحناف، عصبة البرة الذرية || يالغ الانهر والبحيرات والسطوط البحرية. قوة الاسماك. يلمن منه في الاشجار الزقية او حل الصغور الثالثة قرب مجاري الماء. اناته تحسن وصفا من ٣ الى ٤ رفقات نحو الشهر || اشهر انواعه واحدها السُرُوْف السباد.

١٣٥٨٧ - سُرُوْف صِيَاد *، سُرُوْف يَحْمَرِي، عَكَب نَسْرِيَة

Pandion haliaetus (S). *Bald buzzard* (F). *Asprey* (E).

نوع من السُرُوْف ريع اجنة طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم. ريشه من ١٣٠ الى ١٤٠ سم. واهم صفته ويطه يغص. صدره مديج وينمش. ظهره الى السمرة ذبه بجراح يستطوط سُرُوْف متساوية. عيناه الى الصفرة الباقية. مسره وضالته سود || يالغ السطوط البحرية ومجاري الماء. قوة الاسماك .

١٣٥٨٨ - سُرْمِيْت

Cirrhites (S). *Cirrhites* (F). *Cirrhites* (E).

جس اسماك بحرية من فصيلة السرميات. انواعه المعروفة ستة، اصطلحا المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها اطيالية الشكل تطلو من ٢٠ الى ٢٥ سم. جميعها فردية الزعانف الظهرية المستطيلة الكثيرة المناعس. زعانفها الشرسية ثلاثية المناعس الحادة. اقلها متباينة الالوان منها الاصفر والاشهب والاصفر البحري والاحمر والاريد الرصاصي، جميعها مزودة الظهر والجوانب || اعرف انواعها واشهرها السرميت الجلع .

١٣٥٨٩ - سُرْمِيْت مَجْدَع

Cirrhites maculatus (S). *Cirrhites maculé* (F).

نوع من السرميت. اصطلحا البحر الاحمر. تعيش قرب الجبالح. لجلتها الخياطي جملي. جاعاتها متوسطة العدد || جسها اطيالي الشكل، متغل التسطيط، يطلو نحو ٢٥ سم. رأسها خالفت الجبهة، اسر الاذن يعلو تنقيط اصفر. عظمها قصير. شفتها دون الصط. صيها كيرتان، مستديرتان، نادرتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة، قلابة، القمم الامامي منها تسامي المناعس الختالية الطوك، المرقطة بالجلوي. زعانفها الصدرية والحوضية كبيرة. زعنفتها الشرسية ثلاثية المناعس المنسقة الحادة. زعنفتها الذيلية مقنطية الطرف || لونها ال لشبه، يعلوها في ظهرها وجانبها تيجج وتجميع اسر || لحمها متوسط الصفت، مأكول.

١٣٥٩٠ - سُرْمِيَّات

Cirrhitidae (S). *Cirrhitidae* (F). *Cirrhitidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكات الزعانف. اجسامها وانواعها المعروفة عديدة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة || اسماكها متحدة اللد، اطيالية الشكل، تطلو من ٢٠ الى ٢٥ سم. سفنها صغير الحجم مستدير الشكل. زعانفها الظهرية والشرسية تحمل مناعس حادة || اعرف اجناسها واشهرها السرميت.

١٣٥٩١ - سُرُو

Cupressus (F). *Cupress tree* (E). *Echte yprusse* (D). *Cipresso* (I).

جس اشجار حربية وزينية من سبط السوروبات وفضيلة السوروبات. انواعه نحو ١٥ تنليتها السوروبية العامة ترتكر من الميزات التالية: يتألفها موزقة، راعمها مشاة بالاوراق. اوراقها حرة، فلسية، متعابله، مقلقة، مرصوسة على ازمة سفوف يبي ساعدة القاعدة والزام الاويل || انزعارها طرية وسيدة اللق المسكن، والذكورية منها كثيرة الاسدية وتبيوب الروع || ثمارها اكرار كروية الشكل تتألف من جراحات مسطبة، ليفية، جامدة يراوح طولها من ٦ الى ١٤ || يزورها صغرة مجنعة لا قياسية الشكل والحجم || اشهر انواعه ما يتبع .

١٣٥٩٢ - سُرُو أُرِيْزُونَة

Cupressus arizonica (S). *Cuprés de l'Arizona* (F).

شجرة سبروتية سرية التو مهددة اريزون من امال امريكة. تطلو من ٢٠ الى ٢٥ م. يتألفها دقيقة، لاقياسية الانتظام. اوراقها رائحة، قلبية، شديدة الصغر، لونها الى اخضر الازرق. رعمها رائحي ايض اللون. انزعارها الذكورية كبريتية اللون الى الانثوية

١٣٥٨ - سُرُو مَكْنَاب

Cupressus macrabiana (S). *Cypress de Mac Nab* (F).
شجرة جادسة بطيئة النمو مهدبا كليفورية. تنمو
٢٥ الى ١٠ متر. بناتها قصيرة جامدة لاقياسية
الارتكاز. اوراقها فلسية، مستعرضة، رافعة، صمها
رائتي ابيض اللون. اكرانها عذائية المرامات || ترطب
في الاقاليم الحارة والارضية السميكة الغور المتوسط
الامتداد والمرتفعة.



سرو شائع

١٣٥٩ - سُرُو تَحْيِيس، سُرُو الْخَبِير

Cupressus funebris (S). *Cypress pleureux*, *C. funebris* (F).
شجرة سبروتية سريعة النمو. مهدبا قصير. تنمو من
٢٥ الى ٢٠ م. بناتها نظامية، مبططة، جيلة الخضار
البات. اوراقها مديية، حديشة الخضر الزاهي. اكرانها
صغيرة قطرها نحو ١٢ م. جراتها من ٦ الى ٨ لونها
ال زبدية البسود || تحيد وتنمو في جميع الارضية.

١٣٦٠ - سُرُو

Ovipare (F). *Oviparus* (E).
هو كل حيوان يتكاثر بالسرور البسود او البسود، راجع بيوض.

١٣٦١ - سُرُوِيَّة

Cupressinées (F).
سبط من فصيلة الصنوبريات يشمل السرو والبربر والبتونيا
والسنديوك والسنديوس.

١٣٦٢ - سُرُوِيَّات

Chitridinae (S). *Chitridinées* (F). *Chitridinae* (E).
مرتبة من رتبة الفطور البشبية تشتمل على فصليتين
الصنوبريات والمروليات.



سرو كليفورنية

١٣٦٣ - سُرُوِيَّة

Oolithe (F). *Oolithe* (E).
آربة كلسية مسنوبة الى الجودية ذاتها كسر البسود.
اشهرها.

سُرُوِيَّة بِيض

Oolithe blanche (F). *White oolithe* (E).

سُرُوِيَّة حديدية

Oolithe ferrugineuse (F).

سُرُوِيَّة دُخَانِيَّة

Ferruginous oolithe (E).

سُرُوِيَّة كَبِيرَة

Oolithe grande (F). *Big oolithe* (E).

١٣٦٤ - سُرُوِيَّة، سُرُوِيَّة، سُرُوِيَّة

Lapex, *Lapex*
دبار طبيعي لاقياسي البسود والامتداد عذد سطح البسود
الجسمي، ج. اسرة.

١٣٦٥ - سُرُوِيَّة

Criquet (F). *Locust* (E).
هو الجراد من أي جنس او نوع كان.

١٣٦٦ - سُرُوِيَّة

Certhium (S). *Certhium* (E).

سُرُوِيَّة

Cérithie (F). *Cerithium* (E).

سُرُوِيَّة

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الاربع
وفصيلة السريثيات. انواعه للرغوة كثيرة البسود بعضها
من متحجرات الانحساب الاول وبسوها محاسر منتشرة
جميع جدار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها متباينة
الاشجام، جميعها غروطية عذنة وبسوها تشنيد الجولي.
الأنواع سوية تنقلب فيها الخضبات القاتمة.



سرو

١٣٦٧ - سُرُوِيَّة

Rigole (F). *Trench* (E).

سُرُوِيَّة

جري ماء الساقية او الري.

فالى الخضر البحري || اكرانها صغيرة لشد قطرها نحو
٢٥ م. لونها الى الجودية يلوها حل صماني. جراتها من
١ الى ٨ م. وهي جيلة الشكل شائعة الامتداد الزهني.
تحيد في جميع الارضية ولا تنحس الكلسية.

١٣٥٩٣ - سُرُو بَحْرِيّ الْكُون

Cupressus glauca, *C. lusitanica*, *C. coutantii* (S). *Cypress glauque*, *Cedre de Goa* (F).
شجرة سبروتية في الاقاليم الحارة، جادسة في المعتدلة.
مهدبا المكسك. تنمو من ٢٥ الى ٣٠ م. بناتها
نظامية، رطابية الانحلال، بحرية اللون. اوراقها
مديية عذائية الرشح الرائتي بحرية الخضر. ازهارها
الذكورية صفراء اللون يلوها موالج اوسجول اما الانثوية
فال زبدية المزودة بالبسود || اكرانها صغيرة
بشبية الشكل لونها الى الجودية القاتمة || تحيد في جميع
مواقع ساحل البحر المتوسط وفي كل تربة.

١٣٥٩٤ - سُرُو تَحْلِيَاكِيَا

Cupressus torulosa (S). *Cypress toruleux* (F).

شجرة سبروتية في الاقاليم الباردة والمعتدلة، جادسة في
الاقاليم الحارة. مهدبا حلما. تنمو من ٢٥ الى ٤٠ م.
بناتها نظامية، قياسية، دقيقة اللد، فسقية اللون.
انحلالها وخرابها مديية. اوراقها حديشة الصفر عذائية
الخضر. ازهارها الذكور صفراء اللون اما الانثوية
فال الزبدية البشبية. عذبا اخر اللون ناعم الرقة.
اكرانها صغيرة. جراتها مقرنة || لها قربان مهوران.
Cupressus torulosa corneyana, *C. tor. majestica* (S).

١٣٥٩٥ - سُرُو شَائِع

Cupressus sempervirens (S). *Cypress commun* (F).
شجرة سبروتية سريعة النمو مهدبا صوب البحر المتوسط
فروجا عذائية تنمو من ٢٥ الى ٣٠ م. بناتها دقيقة،
غيراه اللون، لاقياسية الارتكاز. اوراقها فلسية،
حديشة الصفر، عذائية الخضر، رائتي الرائحة. قطر
كرزها يراوح من ٣ الى ٤ م. ويحد جراتها من ٨
الى ١٤ || اقلها المناطق الحارة والمعتدلة. لا تنمو
كثرة الصقع وبسودها. تحيد في جميع الارضية. تفضل
الري. تنمو لشد الريح || فروجا المهورات
حسة، اعمارها السمية ما يلي:

Cupressus sempervirens contorta, *C. s. fastigiata*,
C. s. horizontalis, *C. s. thuyaeifolia*, *C. s. variegata* (S).

١٣٥٩٦ - سُرُو كَشْمِيرِي

Cupressus
cashmiriana (S). *Cypress du Cachemire* (F).
شجرة رطابية بطيئة النمو مهدبا لشد ولدت. تنمو من
١٠ الى ١٥ م. بناتها نظامية تحيلة دقيقة. اوراقها
بحرية الخضر. انحلالها وخرابها متباينة الانحلال.
اكرانها كروية قطرها يبلغ ١٥ م. جراتها من ٨
الى ١٢ لونها الى الحلي الماني || تنمو من اجل
الانواع الزبدية كنها قليلة الانتشار نظرا لعلابها
الترية والمروية.

١٣٥٩٧ - سُرُو كَلِفُورْنِيَا

Cupressus goveniana (S). *Cypress de Californie* (F).
شجرة جادسة بطيئة النمو مهدبا كليفورية. تنمو من
١٠ الى ١٥ م. بناتها تحيلة، قصيرة، جالسة الانتعاب.
اوراقها عذائية الخضر. اكرانها كروية قطرها نحو
٢ م. جراتها صفراء اللون يلوها موالج ببسود لاصع.



سريع



سركة



سرولة المرسط



سطاقس النائع



سطاقس جرمانى

١٣٦٠٨ - سُرِّيَّات * Cerithiidae (S).

١٣٦٠٨ - سُرِّيَّات * Cerithiidae (S).
 فصيلة من الرغويات مغليات الارجل مشطيات الخياشيم .
 اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات
 الاقحاف الاول والبعض الآخر منظر في جمع
 بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اصنافها غروبية
 حلزونية ، قريبة القوابل الثائرة ، مفرغة الاحاديد ، شبه
 مستديرة القلفة المنحنية بناتج بحسي الرأس || اعرف اجناسها
 واشهرها السريت والسروتونه والسروتونه والسوتية والبيلس .
 ١٣٦٠٩ - سُرِّيَّات * Didelphus (S). Serigue (F).
 جنس حيوانات راسمة من الجرابيات . انواعه المعروفة
 ٤٠ موطيا امريكية الوسطى والجنوبية . اجسامها مستطيلة
 الشكل طويلا يراوح من ١١ الى ٥٦ سم . واذا نجا من
 ٧ الى ٣٨ سم . رؤوسها اسطوانية . اذنانها كبيرة مستديرة .
 اعنتها غليظة . جرابها قصيرة . ظافرها سادة . اذا نجا
 اخاذة ، مستطيلة ، كاسية الزام الاول حشوية الثاني والثالث
 والرباع || اجرة اذنانها كبيرة لقد مطاة . املاؤها
 ودية الترتيب يراوح مدها من ٧ الى ٢٥ . محبل الاثني
 بنوم ٢٥ بيضا تنصع على اثره من ٤ الى ١٦ دوصا .
 وهي من الحيوانات الشاذة تسرح في الليل . قوتها
 الحشرات عمل اختلاف انواعها والرحلات مع الاقاصي
 والصائغين . يربصها ويأكل السمكية عند الحاجة .
 ١٣٦١١ - سُرِّيَّات * Serica (S).
 جنس حشرات خافضة من غفديات الاجنحة صليحيات
 لقرن حوضه الجلابيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠
 منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها مغلطسة ، شبه
 اهليجية الشكل ، ممددة الرأس والكولوس والقص ، تطول
 من ١٤ الى ١٨ سم . رؤوسها مستعرضة . متاكها للفاضة .
 عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية مرققة ، صفيحية
 الالمفات . احمادها شديدة لاسفة . قوائمها نشيطة ،
 متعطة الضفلة . اثنائها وحيدة اللون السوي يكثر فيها
 الكسني ثم الاصعبر والاسود والاسمر ، جميعها سلاء المراج ||
 تعيش على المواد النباتية المختلفة .
 ١٣٦١٢ - سُرِّيَّات * Sérigue (F). Serica (E).
 جنس حشرات خافضة من غفديات الاجنحة صليحيات
 لقرن حوضه الجلابيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠
 منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها مغلطسة ، شبه
 اهليجية الشكل ، ممددة الرأس والكولوس والقص ، تطول
 من ١٤ الى ١٨ سم . رؤوسها مستعرضة . متاكها للفاضة .
 عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية مرققة ، صفيحية
 الالمفات . احمادها شديدة لاسفة . قوائمها نشيطة ،
 متعطة الضفلة . اثنائها وحيدة اللون السوي يكثر فيها
 الكسني ثم الاصعبر والاسود والاسمر ، جميعها سلاء المراج ||
 تعيش على المواد النباتية المختلفة .
 ١٣٦١٣ - سُرِّيَّات * Seriola (S).
 Séríole (F). Seriola (E).
 جنس اسماك بحرية من الاسمديات شاكلات الزمائف .
 انواعها المعروفة نحو عشرة . اصلاتها بحار البلاد الحارة
 والمعتدلة الحارة || اجسامها كبيرة لثقة ، اهليجية
 الشكل ، تطول من ٥٠ الى ٩٠ سم . القوابل الى الرتبة
 الفصية المراج تبق وتقتد سميتها مع الاتراب من تيج
 الظفر وتزهر وتبيض عند البطن . زعنفتها الظهرية مستطيلة
 منقسمة الى جزئين لامتداوين ، الجزء الخلفي نظامي
 مستطيل ، الجزء الامامي صغير القذ ، ناشر المناسخ
 اعصها المنخس الامامي المؤذي لطح الرأس . زعنفتها
 الذيلية فارة || اشهر انواعها واهرها سرولة المرسط .
 ١٣٦١٤ - سُرِّيَّات * Seriola dumertii (S). Séríole de la Méditerranée.
 S. argentée (F). Silver seriola (E).
 نوع من السرولة . سمكة بحرية يبيض . اصلاتها البحر

الايض المتوسط . مسرعا يمي ولا تقترب من التقاف
 والمجادح الا في الربيع والخريف || جسمها اهليجي
 الشكل يطول من ٨٠ الى ٩٠ سم . قوابل الى الرتبة الفصية
 تزرق وتقتد زعنفتها عند الظهر وتزهر وتبيض عند البطن .
 رأسها محتل الجرم ، قصير الخيط . صيها كيركان .
 فكها الاسفل يتقدم الاعل . اسنانها كثيرة العدد . زعنفتها
 الظهرية مستطيلة منقسمة الى جزئين لامتداوين . الجزء
 الامامي ونشي الشكل ناشر المناسخ الحادة اعصها الاول
 المنطقتا نغور الرأس . الجزء الثاني نظامي الشكل ،
 عادم المناسخ . زعنفتها الذيلية فارة || لحمها متوسط
 الصنف ، مأكلي .

١٣٦١٥ - سُرِّيَّات * Cluvé (F). Hard-headed (E).
 كل سمكة اثنى لا يزال جرابها الشلبي ملء بالسر تمت
 بالسريرة .

١٣٦١٦ - سُرِّيَّات * Sociologie (F).
 Sociologie (E).
 السوسيولوجية علم يبحث في الجماعات البشرية وفي النشاع
 الاجتماعية .

١٣٦١٧ - سَطَائِقُ
 وجمرة تنبت في التدار في اطراف المياه رعاها المشاة وينسل
 بورتها الدروس (القسان) .

١٣٦١٨ - سَطَائِقُ Pillar (F). Pillar (E).
 كل عمود فالت ترتكز عليه السلطنة واثبها .

١٣٦٢٠ - سَطَائِقُ Stachys (S). Epilaira (F).
 جنس نباتات برية ويزينية من فصيلة الشفويات .
 انواعها زهاء ٢٠٠ معظمها عشبي وبشها جنبي . سوطها
 فراء . اوراقها كاملة ، متعاقبة ، منقطة . ازهارها سلبية
 التجميع تاجية الازتكاز اكثرها صطوة || اشهر انواعها
 يتبع .

١٣٦٢١ - سَطَائِقُ Stachys palustris (S). Epilaira des marais, Ortie des marais, Ortie morte (F). Marsh betony, Clown's all-heal, Marsh wound-wort (E). Sumpfzest (D). Scabbiosa palustris, Spigo fiorito (I).
 نوع من السطائس وهو عشبة برية ومقيمة تملو نحو
 ١٠٠ سم . ساقها فراء . اوراقها مقنطوة . ازهارها
 ارجوانية اللون . تستعمل في تطيب بعض الملل الجملانية .

١٣٦٢٢ - سَطَائِقُ جرمانى * Stachys germanica (S). Epilaira de Germanie, Sauge molle, Stachyde, Epi flauri (F). German stachys, Downy wound-wort (E). Deutscher ziest, Ziest (D). Stachide germanica, Spica fiorita, Madre salvia (I).
 نوع من السطائس وهو عشبة برية ويزينية سمرة .
 تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقها مغلطسة زياء اللحاء .
 اوراقها قليلة القامة . نصلها خلى البشرة ، مسن الحافة .
 ازهارها ودية اللون ، فضية السلة ازراء || ازهارها
 يستمر من سوزان الى ايلول .

١٣٦٢٣ - سَطَائِسُ سَبْيَلِيَّةٍ * ، إِرْوَالِيَّةٌ ،

سَطَائِسُ سَبْيَلِيَّةٍ

Stachys recta, S. procumbens (S). Espièdre droite, Crapaudine (F). Upright hedge nettle (E). Bergziest (D). Erba giudea (I).

نبات عشبي طليحي يرمي من السطاس. يطول من ٤٠ إلى ٨٠ سم. ساقه قليلة الفروع زينة السواد. أوراقه سنانية. نصلها خالي البشرة يبدو كأنه فضي. ازهاره مستطيلة الشكل كثيفة الخضر || كان شائع الاستعمال الطبي وقد اعمل لكراهية رائحته.

١٣٦٢٤ - سَطَامُ (E). Origine (F). Origin (E).

هو الاصل ج سلم.

١٣٦٢٥ - سَطَامُ * ، أَمْرُ مِلْطَقُ *

Anastomus (S). Anastome (F). Anastomus (E).

جنس طير من طول السال وفصيلة المغالان. ازهاره المبروة قليلة العدد اسطفا بعض مناطق افرقية الوسطى والشرقية والهند وجزر الزايج. ملجتها الحيائي جامي. يتكرر ويوجد قرب الشطوط ويجاري الماء. قوتها الاسماك والفساد والتمارين والزرع || تتميز بمضامة متابعها المستطيلة للشطوط الحمود الناضجة كالمشاش. اعناقها وقوائمها مستطيلة. اذنانها قصيرة. اجنتها لاحقة. اقنوبها الى الياض الاغبر بالسقاء الاذناب واطراف الاجنحة السود.

١٣٦٢٦ - سَطَلَاةٌ

هي سطح سقف البيت من اي طابق كان.

١٣٦٢٧ - سَطَحٌ Surface

١٣٦٢٨ - سَطَحٌ ، مُسْتَوٍ Plan

١٣٦٢٩ - سطح مُتَشَاكِلٌ (E). Quadric (F). Quadrique (F).

١٣٦٣٠ - سطح مُسْتَوٍ Surface plane (F). Level surface (E).

١٣٦٣١ - سَطَوَاكٌ هو الجدار القيد ، اطلبه .

١٣٦٣٢ - سَطَوْرٌ * Suthora Nipalensis (S).

Suthora du Népal (F).

طائر ويعد الجلس والنزع من الجوارم غروبليات المناظر وفصيلة الترفيفات. موطنه يتعد من الهند الى الصين ، يتكرر ويوجد في غابات التنبال. ملجته الحيائي جامي. انواعه قليلة العدد. قوته الحشرات ومكثها ويرقاتها وثمار وايزور البرية || جسمه شبيه بالقرقف الكبير. طوله نحو ١٥ سم. يتميز بقوته القصيرة وبذنبه المروحي الشكل حته الانقباض. ثوبه الى الخضار البنفسجي الماجة. يمتد الى البركة الصفراء اللواج .

١٣٦٣٣ - سَطَوْرِيُونٌ هو السطوب ، اطلبه .

١٣٦٣٤ - سَطَوْرُجٌ (E). Insolation (F). Sun-stroke (F).

هو الشمس ، اطلبه .

١٣٦٣٥ - سَطَاذِيٌّ (F). Carex, Lâche (F).

Carex, Sedge (E). Sedge (D). Carico, Lica (I).

جنس نباتات جلمودية ممرمة من فصيلة السدييات .

انواعه المبروة زهاء ٥٠٠ سقها لثالية الاعلى . اوراقها

بامتلاحة سقها وهي عصائية الشكل ثلثية الحروف الحادة التقاضية . ازهارها وحيدة الثقل متبيلة التجميع . جذاميرها طليحة مبرقة || اشهر انواعها ما يليح .

١٣٦٣٦ - سَعَادِي الرَّسَلُ * Carex hirta (S).

Carex hirsuta, Lâche des sables (F).

نوع من السادي يطول من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه مستطيلة البصل القصير القالب الحرف. ستابه فقيصة اللون. يعيش في الروال القاطلة ويستعمل لثنيها كاتب .

١٣٦٣٧ - سَعَادِي بَلْدَنَسِيْسُ * Carex baldensis (S).

Carex baldensis (S). Lâche du Mont Baldo (F).

نوع من السادي يطول من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه مستطيلة شبيقة . سلبته الازهرية قصيرة مستعرضة لثنتها ثلاث اوراق صغيرة شائكة || يرفب في المواقع الجبلية والارابة الكلسية .

١٣٦٣٨ - سَعَادِي شَمْرَاغِي * Carex acrospes (S).

Lâche à hampe (F).

نوع من السادي . قصبته ساقه شمراغية الشكل تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقه شبيقة مستطيلة اقصر من فصية الساق. حذوكه الازهرية يطول من ٨ الى ٢٠ سم. وهو عديد السنايل المنسية بالانهب والاخضر || يرفب في المواقع الظليلة والارابة الرطبة .

١٣٦٣٩ - سَعَادِي شَعْبُوْدِي * Carex beccana (S).

Lâche à grappes (F).

نوع من السادي يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه تطويل من ٧٠ الى ١٨٠ سم. نصلها جلدي السنج ، اريوطي الحظار . ازهاره حذوكي التجميع ، ستابه كبيرة اتقد لنبا الى الحسرة || يعيش في المراكن والنازل .

١٣٦٤٠ - سَعَادِي مَدَاكٌ

نوع من السادي يعرف بالنب ، اطلبه .

١٣٦٤١ - سَعَارٌ هو الكلب مرض عيبت ، اطلبه .

١٣٦٤٢ - سَعَاظُ Fragrance

الريح الطيبة من كل شيء واذهر واخضر والثار وغيرها .

١٣٦٤٣ - سَعَبٌ (E). Strer (F). To stretch (E).

سحب الشيء مطه وتسمب الشيء تطلد .

١٣٦٤٤ - سَعَكَةٌ Capacité, Contenance (F).

هي القصور الاستياقي (E). Capacity, Excant, Area (E).

١٣٦٤٥ - سَعَقَرٌ ، سَعَقَرٌ Thymus (S).

Thym (F). Thyme (E).

جنس لبلات عشبية خشبية ممرمة من فصيلة المغفويات. انواعه عديدة جميعها من الاثورية . مهادها البلاد المتحدة . اوراقها صغيرة ، كاملة ، متعاقبة ؛ نصلها غدي الصلبة ، ازغب البشرة ، فده مصصاة الارشاد ذرية الجسم فنية بطر التيميل || ازهارها صغيرة اتقد ، حطرية الحرف ، وديسة اللون الى اريكة . اشهر انواعه يتبع .



سطائس سبلي



سطام



سطر



سعادى رشالى سعادى شمراغى



سعادى شعبودى سعادى مداك



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ شَرْقِي

١٣٦٦ - سَعْتَرُ الْبَرِّ * ، سَعْتَرُ بَرِّي ، زَعْفَر

Thymus serpyllum (S). Thym serpolet. T. sauvage, Serpolet (F). Creeping thyme (E). Feldquendel, Thimian (D). Timo serpillio, T. salvatico, T. cedraeo, Serpillio (I).

نوع من السَعْتَرِ يملو نحو ٢٥ سم. ساقه فراء، فروصها السفلى أغنية الانتصاب، ثم ترتفع. أوراقه أحليجية. نصلها مهبط الفصم، يبارز البروق، خلل البشرة. أزمان وريدية اللون. يستخرج من أوراقه وأزهاره التيسول.

١٣٦٧ - سَعْتَرُ الْبَرِّ * ، سَعْتَرُ قَرْنِي ، حَافَا

Thymus capitatus (S). Thym de Crète (F). Headed thyme (E). Kretischer thymian, Kopfthymian (D). Timo di Crète (I).

نوع من السَعْتَرِ يملو من ٢٥ إلى ٦٠ سم. ساقه لينة. أوراقه بيضية الشكل، العلوية منها أعرض نصلًا من السفلى وأقل زغبًا وصلًا. أزهاره وريدية اللون. أوراقه وأزهاره بلسمية العرف والمخ يستخرج منها حطر السَعْتَرِ.

١٣٦٨ - سَعْتَرُ الْبَرِّ * ، سَعْتَرُ شَرْقِي ، نَعَام

Thymus glaber (S). Thym glabre (F). Wild thyme, Mother of thyme (E). Wilde thymian (D). Sermolino, Timo glabre (I).

نوع من السَعْتَرِ يملو من ٢٥ إلى ٦٠ سم. ساقه خفيفة كثيفة الفروع المنتصب. أوراقه خفيفة، مستطيلة، نصلها حافر الفصم، مائل البشرة، خفيف الحصار. أزهاره وريدية اللون يملوها مويج أبيضاني || يرغب في المواقف الرطبة.

١٣٦٩ - سَعْتَرُ شَاكِبٍ * ، سَعْتَرُ شَاكِبٍ

Thymus vulgaris (S). Thym commun, Farigoule (F). Garden thyme, Pot-herb thyme (E). Thymianquendel, Gartenquendel (D). Timo comune, T. coltivato, Erbuocca, Popolina (I).

نوع من السَعْتَرِ يملو من ٢٥ إلى ٤٠ سم. ساقه كثيفة الفروع الخشوية المنتصب. أوراقه سنائية خفيفة. أزهاره ليلية اللون. يعيش في جميع الأودية. يفضل التربة الرطبة || يستخرج من أوراقه وأزهاره حطر السَعْتَرِ ويحضر به.

١٣٧٠ - سَعْدُ

Cyperus (S). Souchet (F). Sedge (E).

جنس نباتات صفولية، عشبية، معمرة من فصيلة السميديات. أنواعه عديدة، بعضها متعينة من نباتات المناطق الحارة. أوراقها سنائية مستطيلة. سيقانها شراخية يملوها أنوار سليل التجميع تكثفه قمة وريدية طولة من ثلاث أو أربع وريقات || أشهر أنواعها ما يلي.

١٣٧١ - سَعْدُ الْأَحْمَرِيَّةِ

ويسمى سَعْدُ الْهَاجِيَا، منزل من منازل القنبر البانية يتزلفا القنبر في الليلة الخامسة والعشرين. وهو أرملة كواكب متقاربة واحد منها، في وسطها، أنوار الجميع. وقيل إنما هي سَعْدُ الْأَحْمَرِيَّةِ لأن عند طلوعه تخرج الشراخات المختبئة من الأرض || يقبب سَعْدُ الْأَحْمَرِيَّةِ يدعى الزهرة.

١٣٧٢ - سَعْدُ الْبُرُوقِ

سَعْدُ الْبَارِحِ نِجْمَانٌ متقاربان من كوكبة القنبر الأعظم مركزهما في السعد.

١٣٦٤ - سَعْدُ الْهَاجِيَا Baham, Biham

سَعْدُ الْهَاجِيَا نِجْمَانٌ من كوكبة القنبر الأعظم مركزهما على رأس القنبر.

١٣٦٥ - سَعْدُ الْخَصْرِ ، سَعَارُ حُلُو ، عَكُوبُ ،

Cyperus alopecuroides (S). كَرْشِي Souchet à nattes (F). Foxtail sedge, Mat sedge (E). Zypergras (D). Giunco cannellino, Testa di riccio (I). نوع من السعد الجلموري اللباد، شراخه يملو نحو المتر. أوراقه قروية خضية طولها ٧٥ إلى ٩٠ سم. وتعرض من ٨ إلى ٢٠ م. نوته الزهرية فائقة || يعيش في المناطق والأراضي الرطبة. أوراقه تستعمل في صناعة الحصر.

١٣٦٥ - سَعْدُ الْأَذَاكِبِ

منزل من منازل القنبر البانية. وما كوكبان نيران بينهما قد ذراع، في نحر أحدهما نجم صغير كأنه يلعبه لقربه منه || قال بعض علماء الفلك أن السعد الذابح كوكبان متركان على التوالي منها كوكب صغير يكاد يلمس به يسرى الذابح ولذلك سمى العرب السعد الذابح لزمهم أن اللبني شاة وقد ذبحها.

١٣٦٦ - سَعْدُ السُّعُودِ Sedelsuud

منزل من منازل القنبر البانية. وهو ثلاثة كواكب أحدها ير والأخران دوله. والعرب تسميه به || يقبب سعد السعد يدعى الجبهة.

١٣٦٧ - سَعْدُ الْمَطَرِ

سعد المطر نِجْمَانٌ من كوكبة القنبر الأعظم مركزهما على الركنة البينية.

١٣٦٨ - سَعْدُ النَّكَالِ Cyperus natalensis (S).

Souchet du Natal (F). نوع من السعد الجلموري اللباد، شراخه يملو من ٦٥ إلى ١٠٥ سم. أوراقه مستطيلة خفيفة النصل، سنابله متوسطة الكثافة تكثفها قمة ثلاثية الأوراق القصيرة. يرغب في الأودية المتوسطة الاندماج والرطوبة. يعيش في المرائن.

١٣٦٩ - سَعْدُ الْهَاجِيَا Hemam, Homam

سعد الهام نِجْمَانٌ من كوكبة القنبر الأعظم مركزهما على النقي.

١٣٧٠ - سَعْدُ بَلْعِ Alhali

سعد بلع منزل من منازل القنبر البانية. وما نِجْمَانٌ مستويان في الجهرى لمتساويان في القنبر والفسو. وبني الأكبر بالما كأنه يلم الأخر واحد ضوؤه. وهو من كوكبة الدلو، طلوعه الليلة ثبتي من كائني الثاني وسقوطه ليلة ثبتي من آب || يقبب سعد بلع يدعى الطرف.

١٣٧١ - سَعْدُ شَرْقِي * ، سَعْدُ عُسْتَدِيرِ ،

سَعْدُ الْحَمِيرِ ، وَزَيْنِ ، صَبَاحُ الْخَيْرِ Cyperus rotundus (S). Souchet rond (F). Nut-grass (E). Runde zyperwurzel (D). Cipero orientale, Stancia rotunda (I).

نوع من السعد المدام الجلمور. صفاته عديدة، بيضية الشكل، كالقروية الرائحة. أوراقه مستطيلة. شراخه

Cours de change (F).

سر القطع

تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. سنبله خازنة صويالية || يكثر في الارزة الرطبة. يتبر من النباتات الضارة.

Cours légal (F).

سر قانوني

Cours moyen (F).

سر متوسط

١٣٦٦٢ - سعد عطر* Cyperus longus (S).

Souchet odorant, S. long (F). Gellingale, English galangale (E). Galgentwurzel, Langes zypergras (D). Cyparo lungo, C. odoroso, Cunzia (I).

نوع من السعد. جلموده مداد عطر لا صائل له. شراجه تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. لوراه خفيفة الطول || سنبله مروحية الازنكار تكتنفها قبة ثلاثية الاوراق || يعيش في المناطق وعلى ضفاف الماء.

١٣٦٦٣ - سعد مأكولي* هو سب الزلم، اطلبا.

١٣٦٦٤ - سعد مروحي* Cyperus flabelliformis (S). Souchet en éventail (F).

نوع من السعد الجلمودي الزكوي. شراجه اسنفي الجوف، غليظ القاعدة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. لوراه جامدة التصل تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. وتبرش من ٥ الى ١٥ م. سنبله ازهرية مروحية تتجمع جملة الشكل. يزرع في المزارع. يرغب في الرطوبة المستمرة.

١٣٦٦٥ - سعد شطلي* Cyperus alternifolius (S).

Souchet à feuilles alternes, Petit papyrus, Ombrelle (F).

نوع من السعد الجلمودي البامد السائل. لوراه القرصية صلبة اللد، قليلة العدد. شراجه يرتفع من ٣٠ الى ١٢٠ سم. تعلو سنبال زهرية مظلمة الشكل تكتنفها قبة رفيعة ويأرجح عدد اوراقها من ٦ الى ٢٥ || يكثر زراعته في المزارع لانه سبروي وجبل الخصار.

١٣٦٦٦ - سعدان* Singa (F). Ape (E).

السدان ثبت من افضل مراعي الابل له فوك تشه به حلقة اللدي فيقال لها سعدانة (السان).

١٣٦٦٧ - سعدان، قرد* Singa (F). Ape (E).

اسم شامل يطلق على جميع انواع القرد ج سعدين.

١٣٦٦٨ - سعدان، وكلمة* Chêne (F).

زانة قرنية اللادة تعلو قائمة القرس.

١٣٦٦٩ - سعدان* Chêne (F).

سعدانة اللدي = ما اطاف به كاللثة. وهي ايضاً مدخل الجردان من ثلبة القرس.

١٣٦٧٠ - سعدان* Cyperaceae (S).

Cyperaceae (F). Cyperaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة تشمل السعد والسادي وسب الزلم.

١٣٦٧١ - سعد* هو الكلب مرض شيت، اطلبا.

١٣٦٧٢ - سعد، هيتي* Taxa (F). Price, Rate (E).

تريفة الفوائد السنوية التي ينتجها مبلغ قدره ٢٠.

١٣٦٧٣ - سعد* Cours (F). Market, Price, Rate (E).

هو ما يتقدم عليه من البضاعة يماً وشراء على ان تكون الصفقات متتالية كالمتقدمة في المصنف، وسر السوق... وهذا السر قد يكون:

Cours forcé (F).

سر الزامي

١٣٦٧٤ - سعد القابليل* Taux de capitalisation (F). Capitalization rate (E).

هو السعر الذي تكتنه شركات التابليل والتأمين لحساب فوائده الاموال والاحتياطيات.

١٣٦٧٥ - سعد الخصم، سعد التفع* Taux de l'escompte (F). Rate of discount (E).

هو السعر الذي تحسب به كل عمليات الخصم والقصر في يوم معين وسوق معينة.

١٣٦٧٦ - سعد القليلة* Taux d'intérêt (F).

Rate of interest (E).

سر القليلة يكون اما قانانياً وهو ما يقره القانون او اتفاقياً وهو ما يحدده الاتفاق.

١٣٦٧٧ - سعدان* هو الانباز جنة برية تصنع في تخلف الثياب.

١٣٦٧٨ - سعدان* Anabaeas (F). Anabaeas (E).

سبط من فصيلة السمقيات.

١٣٦٧٩ - سعد، حريرة* Caloria

هي الوحدة الحرارية او الوحدة في قياس الحرارة.

١٣٦٨٠ - سعد* Palma (F). Palm (E).

هي قصب النخل وهي مركبة من جريدة تحمل الحوص اي الوريقات.

١٣٦٨١ - سعد* هي القروية، اطلبا.

١٣٦٨٢ - سعد* فراشة حلابة كتي قوية الثياب، اطلبا.

١٣٦٨٣ - سعد* فراشة مؤنية كتي قوية الفراء، اطلبا.

١٣٦٨٤ - سعد* فراشة مؤنية كتي قوية الشوار، اطلبا.

١٣٦٨٥ - سعد* هي القرويات فصيلة حشرات من حشرليات الاجنحة.

١٣٦٨٦ - سعد* Simia scyrus, Pithecius scyrus (S). Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F). Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السعد والسعد ج سالي. وينهم من سماعا الانسان الوشي. حيوان قلمي من فصيلة اشباه الانسان ويرثه القرديات. ثلثه تجاوز ١٤٠ سم. يده تعلو نحو ١٠٥ سم. جسمه كثيف الشعر الغليظ المسطيل || يعيش ذكراً وانثى يتبعها من الصغيرين الى الثلاثة. الانثى تضع ولداً واحداً رضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر ارايج. قوته الكار على اختلاف انواعها يقصب السكر واكثره وبعض البقول. وهو يألف الثنايات للكيفة والنياض البعيدة عن كل عمران.



سعد عطر



سيلة

١٣٦٩٨ - سَمَكَة * Mycetophagus (S).

Mycetophage (F). Mycetophagus (E).

جنس حشرات من فصيلة السفاجيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض غابات وسراخ البلاد المتحددة الحرارة والباردة || اجسامها صغيرة ، متحدة الاحدياد ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٥ الى ٧ م. رؤوسها مستديرة الجرم ، غروبية الشكل. حيونها بارزة. تأشيرها وبلاسلها نظامية. قرونها الاستشعارية ثلاثية. كواسلها متحدة الجرم. احمادها لاحقة ويلوحا تحدي قاطب. قوائمها نشيطة. اوتوبها ثنائية البين || تألف الغابات والخارج تعيش على بعض انواع القفطور من الفاريقيات والسيمات .

١٣٦٩٩ - سَمَكَة جِيَّات * Mycetophagidae (S).

Mycetophagidae (F). Mycetophagidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة ، اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في سطر غابات وسراخ البلاد المتحددة الحرارة | اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها متحدة الجرم. حيونها بارزة. تأشيرها وبلاسلها نظامية. قرونها الاستشعارية ثلاثية. مركبة من ١١ فصلة. كواسلها كبيرة. احمادها لاحقة. قوائمها نشيطة. ارسافها رباعية البقل. اوتوبها ملونة || تألف الغابات والخارج. تعيش على بعض انواع القفطور اعصمها المتشبة الى الفاريقيات والسيمات || اشهر اجناسها السفاجة .

١٣٧٠٠ - سَمَكَة ، كَوْم Coputia, Sallia (F).

Coputia, Covering (E).
نوع ذكر الحويان على الاشي. اذا غرِب الجلود الحبر قيل قما وزا .

١٣٧٠١ - سَمَكَة ، سَكَط Opercula (F).

Gill-cover (E).
السطاط والسطاط ج اسقاط. هو القشاة القفص وفي المادة الذي يسلط التجويف الخيشوي عند الاسماك. وما سقاطان او سقاطان ايمن وابسر .

١٣٧٠٢ - سَمَكَة طَائِفَة * Callimorpha (S).

Callimorpha dominula (S). Callimorpha

tyran (F). Callimorpha dominula (E).

حشرة من فصيلة السقاطيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا الجنوبية والقرية . فرائسها صلبة تعيش على ذخيرتها المعوية . سربتها خاضعة قوتها اوراق النبات واحصوا الحس والهندباء والقرص والنبع ولسان الحمل ... || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ م. يستطاع تراوح من ٤٥ الى ٥٠ م. وأنها متدلة الجرم. حيتاها كيرتان. زباناها ضيقان. مرشها جعفة. حيوستها كيثف الحمل. كسني البين. بطنها احمر يطو مراح وودي وسط لبني قاطب شديد الاسرة || روشناها الاناسيان الى الخضار الاناس تملو بقمع مستديرة صفراء وبقتان برتقائيتان. روشناها المنقلبان الى الحمرة يطو مراح صناعي ويطوق حمار كسني اسود وبقتان وبقة طرية يحمل كامل التزام الاخير. تنضيب روشن الاشي لا يختلف الا بالبرقالي الذي يتحول الى حطبي || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في الليل. تماثل على ظهورها باسوب

١٣٦٩٧ - سَمَكَة

ما تملك من اللغز الاصل من البير ونحوه .

١٣٦٩٨ - سَمَكَة الشَّجُوم

سمك النجوم عشرة وهي سمك بالغ وسمك الاغنية وسمك اللانيم وسمك السمك وسمك الاربية من منازل القمر . ثم سمك نائرة وسمك الملك وسمك البلام وسمك المارح وسمك مطر وسمك البتة ليست من المنازل. كل منها كوكبان.

١٣٦٩٩ - سَمَكَة هو الاغنياء ، اطبا .

١٣٦٩٠ - سَمَكَة ، عَطُوس Tabac & priser (F).

Snuff (E).

مسحوق التبغ يستعمل شأ الكيف ، يستحصل عليه من اوراق التبغ المسحوق بعد تنقيتها ويزجها ببعض المواد العطرية او الحريفة || وقد تحلفت قيمة السوط باختلاف صفته وبنواده الاولى اذا كان مسحوفا تصال الاوراق او شلوحها .

١٣٦٩١ - سَمَكَة هو الماكاك المهيون ، اطبا .

١٣٦٩٢ - سَمَكَة Basoin d'eau (F).

Want water (E).

صنن الزرع والنبات .

١٣٦٩٣ - سَمَكَة ، لَسَاب Coluber lineatus, C. jaculus, C. asotus (S).

Dard, "Serpent volant" (F). Coluber lineatus, C. jaculus (E).

حية يبروس من البراهيات وفصيلة الحفشيات غلليات الاعاميد . جسمها قليل التضامة يطول نحو ١٠٠ م. ثوبا الى الكمية الريداء يطو خط اسود يمتد من الخلف الى طرف الذنب وضمان احمران عايقان ايمن وابسر يمتدان من الشفتين الى الذنب . رأسها لوزي الشكل . زاوية شفتها فسيحة الملاتي . حيتاها صغيرتان ، حادتان . عدد استناتها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاصل من اسفلها اربعة صفات ثابتة خلفية الارتكاز تهرين السم في كل عضو تصببه عندما يرق حتى مستواها الداعلي || تألف الاجراج والمضاهب ، تملق الاشجار وتلقب كالسم من فجرة الى اخرى ومن كل مكان مرتفع الى آخر متفطش || بيتها الشتوي يمتد نحو خمسة اشهر . تسرح في النهار . قوتها الحشرات والوزغ والقطا والفئران والجرب . تنقص في غريبتها الكبيرة الحجم بالتفليس ثم يتبلسا بعد ذلك || اغلاقها شربة . فسيها صغير حاد . تبليق كامل نحوها بمر ١٥ مة وتعيش نحو ١٢٠ مة || الاشي تسلكه بمر خمس سنوات ويقع من ١٢ الى ٢٤ بيضة مجعومة في سجين تطهرها في وقع دافئ جنوبي المشرق || تنحدر من التصابين المخفية .

١٣٦٩٤ - سَمَكَة الإجماس هو حلة الاجاس ، اطبا .

١٣٦٩٥ - سَمَكَة الزَّرْع هو حلة الزرع ، اطبا .

١٣٦٩٦ - سَمَكَة Plante épineuse (F).

Thorny plant (E).

كل شجر له شوك .

١٣٦٩٧ - سَمَكَة ، شَعَاك ، حَمُوق Barbe de bée (F).

Beard of corn (E).

هي حسك شتيلة الحنطة والشعير .



سَمَكَة



سَمَكَة



سَمَكَة طَائِفَة

وتفتح المكن لطخاً على فصائل الأزراق || السرة طول نحو ٤٢ م. جسمها اسطواني الشكل ، مثلث السك ، أسود اللون طول ثلاثة خطوط من النقطة الصفراء وضلعاً الى الزرقاء الرصاصية . ثعلباً متوجهاً بالهلب الاسود || طول الاكامل الذي يستمر من ٢٤ الى ٣٧ يوماً يتبقى ضمن صلبة متينة الهلبك تنسجها السرة تحت ثقلور الانجبار وفي صدوره الهواء .

١٣٧٠٣ - سَفَاطِيَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ *

Callimorpha dulcitis (S). *Callimorpha agreeable* (F). *Callimorpha dulcitis* (E).

حشرة من فصيلة السفاطيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . قرابتها جارية قوتها رقيق الازهار وطلوها . سرتها خاضعة قوتها اوراق النباتات العشبية || جسمها مسطود اللد طول نحو ١٧ م. . بسطاً تراوح من ٥٠ الى ٥٥ م. . رأسها معتدل الجرم . ميناءها كيرتان . زبالها خضيلان . برشها مستطيل . جوشها بني اللون كثيف الخمل . بطنها احر اللون يملو غط ثجبي قلب اسمر || روشتها الانسيابية الى الكنتي الاسود الموج يملو تقيج ابيض . واصفر وزربان من القلق البهش والصفير : رواشن الاثى عادمة التقيج . روشتها الخلفيان الى العمرة البرتقالية يملوها تجميع وتبيض كمنث || غا جمل واحد في الحول . تظهر الفزقة في حزيان . تسرح في الليل . تعاطل بمد ظهورها ينمو اربعة اسابيع وتفتح المكن على الصفحات السفلى من فصائل الاوراق || السرة طول نحو

١٣٧٠٧ - سَفَاطِيَّةٌ *

Cephenium (S).

Cephenium (F).

جنس حشرات من فصيلة المديريات ورتبة عذبات الاجنحة . انبساطها المعروفة نحو ٥٥ مثقبة في جميع اطراف العالم || اجسامها صغيرة ، طولها من ٢ الى ٣ م. . رؤوسها صغيرة شبه مكورة . ميناءها قليلة البروز . قوتها تآشيرها وتكوكها صغيرة . ملابسها كبيرة . قوتها الاستقامية صولطانية . كواسلها مخددة : شبه اريسة الشكل ، الحامدا لاسعة ، عادمة التقيج . قوتها نشيطة . انبساطها وسيدة اللون ، يكثر فيها المجزوي الاسلع فالاسود فالاسلع فالاصفر فالاصفر || تأت المخرج والفتات حيث تكثر الحطاب التي تعيش عليها .

١٣٧٠٨ - سَفَاطِيَّةٌ *

Sphagninées (F).

Sphagninées (E).

رتبة من الحطاب تشل نصليتي السفايات والقرنليات .

١٣٧٠٩ - سَفَاطِيَّةٌ *

Hypophopus seven (S).

Séphen (F).

حيوان بحري من السفقيات الاطلاق وفصيلة القرطونيات . اصطفاه تحت من الخليج العربي الى الصين || جسمها بما فيه القالب يطول نحو ١٨٠ سم. . ثوبه الطوي الى السرة الحطية الموج . ثوبه السفلى الى البيرة اثبتية . منجسه اللابل نحو ١٥ سم. || لحمه متوسط الصنف : مأكول . اما جلده فخاخر الصنف مغروب فيه .

١٣٧١٠ - سَفَاطِيَّةٌ *

Sphagnacées (F).

Sphagnacées (E).

فصيلة من الحطاب تنصلي الى رتبة السفايات اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الطلطب .

١٣٧١١ - سَفَاطِيَّةٌ *

هي الاسطراف ، اطليه .

١٣٧١٢ - سَفَاطِيَّةٌ *

Direction du vent (F).

Direction of wind (E).

وجبة جهوب الريح .

١٣٧١٣ - مُفَجَّرُ الزَّرَق *

Drypes caerulea (S). *Drypes bleue* (F).

Drypes caerulea (E).

حشرة قانصة وانجبة من فصيلة المفججريات ورتبة عذبات الاجنحة . تأت المروج والمراعي وشفايف مجاري الماء . قوتها المواد الضوية وبأ قسطها اقتناصها من الحشرات القذيا || جسمها صغير لقلد طول من ٩ الى ١٠ م. . توجها الى الزرقاء خلي سفي وبويع اسف . رأسها مخروطي صغير . فكها ذربان . ميناءها كيرتان جاسطتان . زبالها عظيمان دقيقان . ظهرها لا يلف السكة



سَفَاطِيَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ



سَفَاطِيَّةٌ



سَفَاطِيَّةٌ



سَفَاطِيَّةٌ



مُفَجَّرُ الزَّرَق

٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل ، أسود اللون ، اصفر التقيج ، مثلث السك تملو في كل ثلثة فسة من الهلب الاثاشر . رأسها اسود . زبالها الى الحطلة القائمة || طول الاكامل يستمر نحو ٢٤ يوماً ويتبقى ضمن صلبة تنسجها السرة بين فروع النبات ولقصبها .

١٣٧٠٤ - سَفَاطِيَّةٌ *

Hymenophyllées (F).

السفاطيات فقة من الرصاص مستورات الزهر الوالية .

١٣٧٠٥ - سَفَاطِيَّةٌ *

Callimorphidées (S).

Callimorphidées (F). *Callimorphidées* (E).

فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة عذبات القرن . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٢٠ معظمها من حشرات البلاد الحارة المنتشرة نحو الاستوائية || جسمها معتدلة اللد ، اجسامها فيه اسطواني الشكل . رؤوسها صغيرة . ميناءها زائفة . قوتها الاستقامية خيطية : بسيطة . ملابسها صغيرة ، جالسة . مراشها كبيرة ، مصطلة . رواشتها الامامية اكبر من الخلفية واقل استدارة منها واكثر ثجبياً وزرಕ್ಕೆ . سفادها جانبية الازدكاز ، مصطلة الجرم . ارتجلها ثامة اللنو ورياعة المنطس || مكها مكور الشكل . اسارها مثلثة النشار ، ضمية الهلب . عاداتها تلتصق بصلبة متينة محدة الهلب || اشر اجناسها السفاطة .

١٣٧٠٦ - سَفَاطِيَّةٌ *

Cochlearius cochlearius (S).

Savaco huppé, Bec-en-cuiller (F).

طائر من طول الساق وفصيلة البشريات . اساطه المناطق الاستوائية الامريكية . تأت صفات البشريات ولطائف مسرحة دجري يستمر طوال الليل . قوته الاساك والفتاين والزرغ والصفادح والرعويات ... || جسمه مكنل معور .

المهرشة الرياح المحوج . يرغب في الاربة العميقة الغور المتوسطة الانتاج والرطوبة الموزونة التركيب الحكسي . ثماره تحسن صفات في الاربة الجنية || يتكاثر بالبذر والتغصن والتفريد والتغصن || ينمو على ابعاد تراوح من ٤ الى ٦ امتار || وهو من الانجبار التي يفسدها التقليل لانه يجد من نشاطها بين مقدورها الانجابي . اشهر شروبه الزراعية ما يلي .

١٣٧١٨ - سكرجكل البرتغالي C. du Portugal
ضرب سيروني ينمو نحو ٦ م . ثماره كبيرة اللد متوسطة الوسط . مزينة الرأس والغلب . لهايا خضر الصارة متوسط النضوة || ينمو في جميع الاربة المعتدلة التركيب العميقة الغور || ينشئ الجفاف وكثرة الكلس والربل .

١٣٧١٩ - سكرجكل الصين
هو الشنط الصيني ، اطلبه .

١٣٧٢٠ - سكرجكل اليابان
هو الشنط الياباني ، اطلبه .

١٣٧٢١ - سكرجكل النجم C. d'Angers
ضرب جاحد يتطلب مواقع خاصة لانه ينشئ الصقيع . ينمو نحو ٤ م . ثماره كبيرة اللد . فزيرة الصارة ، صطرية العرف ، ذكية العلم ، قليلة النضوة || ينمو في جميع الاربة العميقة الغور ما عدا الكلسية والرطوبة .

١٣٧٢٢ - سكرجكل شمسين C. champion
ضرب امريكي واسع الشجرة . فطره شديدة النشط فاختة تنمو نحو ٧ م . ثمارها كبيرة اللد ، ذكية العلم والعرف ، فزيرة الصارة ، قليلة النضوة || ينمو في جميع الاربة المتوسطة الانتاج والرطوبة .

١٣٧٢٣ - سكرجكل عادي C. commun
ضرب سيروني صنع الانتشار يعيش في معظم الاربة والمواقع . ينمو من ٢ الى ٤ م . ثماره كروية متوسطة اللد . لهايا متوسط الصارة ذكي العلم والعرف .

١٣٧٢٤ - سكرجكل هندي
هو الدوسينة عجيبة شجرة ، اطلبه .

١٣٧٢٥ - سكرجكل * Coing (F). Quince (E).
ثمرة السفرجل . لهايا جامد للمكسر حامض العلم ، متوسط النضوة ، يستعمل في المربيات . يزودها لزجة شامة الاستعمال الطبي .

١٣٧٢٦ - سكرس Saxifraga (S). Saxifrage (F).
Saxifraga, Rockfool (E). Steinbrech (D). Saxifrage (I).
جس نباتات عشبية من فصيلة السفسريات . انواعه زهاء ٣٠٠ جميعها عشبية خشبية . اكثرها معمرة ومنها حولية وشجيرة . معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . اورثاها متعلقة ، صغيرة اللد ، لحية النسيج ، لها البيضة والمفرشة والمستنة . تصالها خلي البشرة منتج الصفة . ازدهاها خلمية التركيب . يزودها صغيرة الحجم تكثر فيها الانتشار || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

الفريشة . هذاها تصاحبها التحيز المتساوي الخطوط . ارباها خلمية العقل || لها جيل واحد في الحق . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط آب وتمشي حتى اواسط ايار . تسرح في التبار . تساق في اوائل الربيع وتضع المكن تحت الحشاة والقصور الصلبة وتعلم والحجارة وفي شقوق الاعشاب الناعمة || والبرقة منذ تمام اعدادها تطول نحو ١٥ م . جسمها فيه اسطواني الشكل اسمر القرب ، كثيف الغلب . اسد الرأس والرؤوس والشرج المهبط بركين دقيقين || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينشئ في التربة .

١٣٧١٤ - سكرجوريات * Drypidae (S). Drypidae (F). Drypidae (E).

فصيلة حشرات لاحة من رتبة خمليات الاجنحة . اجناسها وانواعها المهروقة قليلة العدد ، معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف المرامي والنياس والمواقع الرملية || جميعها صغيرة اللد ، جملة الانواع الزراعية الباعة ، رؤوسها مستديرة ، مستطيلة الاطعام والازبال . عيونها جاحطة . كواسلها متضخمة مستطيلة . اجناسها مقلوبة الاطراف ، تصاحب الخفوة المتوازية || تسرح في التبار وتعيش في الليل . تسمى بمرقة وتطير بشفة || قوتها المواد النضوة المختلفة المصادر . اشهر اجناسها السفسجور .

١٣٧١٥ - سيفدليل * Cevadilla (S). Cevadilla (F). Cevadilla (E).
نبات عشبي دولسي طلي معمر من فصيلة السورجانيات . اورثاها قرصية الانتشار ، عصلية الشكل ، مستطيلة اللد ، ازدهان سبلي التجميع يركتز بل شراج دقيق مسط . انجاس صغيرة اللد ، ارجوانية اللون سود المواج . ثمارها جرابية الشكل ، يزودها دقيقة ، مضغمة ، فسيمة اللون || يستخرج من يزود عفة مواد قلوية اقهرها السنفيلين والخربيثين والخلص الخريفي || مسحوق يزوده شديد الفاعلية كان ولا يزال يستعمل في القضاء على القمل .

١٣٧١٦ - سيفدليكين * Cevadilline (F). Cevadillin (E).
مادة فيه قلوية لا تتكبر تستخرج من يزود السنفيل ويظهر .

١٣٧١٧ - سكرجبل * Pyrus cydonia, Cydonia oblonga, C. vulgaris (S). Cognassier, Colgnassier (F). Quince tree (E). Echte quince, Biruquitta (D). Cotogno, Pomo cotogno (I).

السفرجل ج . مغارج صفاريل . ثمرة شجرة من فصيلة الورديات وصيدة الجنس والتروخ عديدة القسود . ثمارها مأكولة وترهب . يزودها طيبة . ينشئ ثمار من مرتين الى ثمانية امتار . ساقها قصيرة سرسة حمراء اللون . اجناسها فاختة متضخمة . اورثاها عابدة ، بسيطة ، كاملة ، متعاقبة ، ينشئ الشكل ، قليلة النضوة . تصالها بارز المروق ، خلي الصفحة السفلي . ازدهاها خلمية التركيب لنشأ الى البياض الوردية . ثمارها كروية الشكل او شبه كروية مستطيلة ، كبيرة اللد ، لحية البشرة ، مسحة العرف ، جامدة اليا . عيونها تألف من ٥ غرفيات تحضن الكثير من البذور || يعيش السفرجل في الاقاليم الحارة والمعتدلة . ينشئ الموضع الطليقة



سندليل



سفرجل



سفرجلة

١٣٧٢٧ - سُفْرَسُ الحَصَى *

Saxifraga granulata (S). *Saxifrage granulée*, Herbe à la gravelle (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراتها حرة ككلوية. نصلها مفصص الحثار. ازهارها كبيرة اللدة، بيضاء اللون، صطرية العرف || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران || يقال انها طيبة، اورتها نافعة تريل البول والحصى.

١٣٧٢٨ - سُفْرَسُ الظِّل *

Saxifraga des ombrages, Mignonnette, Désespoir du peintre (F).

بجلة جادسة معمرة تملو نحو ٣٠ سم. أوراتها احليجية رفيعة، عتقها كثيف الزئب. نصلها مقر الصفصة. صفاري. الحلة || ازهارها مستترفة بيضاء اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. ترطب في اللواتع الليلية التمشية العروطة.

١٣٧٢٩ - سُفْرَسُ حَشِين *

Saxifraga aspera (S).

Saxifraga rugueuse (F).

بجلة سبروتية معمرة ترطب في الارربة الرملية. تملو نحو ٢٠ سم. اورتها غاذقة الرواكيب. نصلها مقر الصفصة، نحو ٣ || ازهارها بيضاء اللون وكسوبا مروج اصفر. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٣٧٣٠ - سُفْرَسُ سَرْمِي *

Saxifraga sarmentosa (S). *Saxifrage sarmentueuse* (F).

بجلة جادسة معمرة تملو من ٢٥ إلى ٤٠ سم. أوراتها مستنية بالايض والاخر. حثار نصلها ارواجي. ازهارها حري الشكل، ازهارها يمش تملوها مشنة صفراء || زهر من ايار الى تموز.

١٣٧٣١ - سُفْرَسُ سَرْمِي *

Saxifraga crustata (S). *Saxifrage incrustée* (F).

بجلة معمرة تملو نحو ٤٠ سم. أوراتها كلوية الشكل نصلها محذب الصفصة، سرجي التجميع، اصفر الحثار || ازهارها حشوكية التجميع غامية الارتكاز لونها الى البياض المشع بالابيض || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. ترطب في الارربة الكلسية.

١٣٧٣٢ - سُفْرَسُ سَرْمِي *

Saxifraga cymbalaria (S). *Saxifrage cymbalaire* (F).

عشبة حولية جادسة تملو نحو ١٥ سم. أوراتها صفرة اللدة، مستترفة الشكل، خلية لو سباعية التجميع الكروي، نصلها مشح بالايض || ازهارها صفرة. ازهارها يستمر من ايار الى آب.

١٣٧٣٣ - سُفْرَسُ طَحْطَحِي *

Saxifraga hypnoides (S). *Saxifrage mousse*, Gazon d'Angleterre, G. turc, G. mousse (F).

عشبة سبروتية معمرة. اورتها مستطيلة الرواكيب اليفضورية. ساقها موقرة تملو من ١٠ إلى ٢٠ سم. أوراتها قوية التجميع. مستطيلة الاثاق الزغبسة الاسطوانية || ازهارها يمش. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران || ترطب في الارربة الرملية واللواتع الجبلية.

١٣٧٣٤ - سُفْرَسُ كُسْطُورِي *

Saxifraga cuscuthaeformis (S). *Saxifrage-cuscuta* (F).

بجلة زاهة معمرة تملو نحو ٢٠ سم. أوراتها مشنة

مكوبة، نصلها خلى البثرة، سنن الحلة. ازهارها حري، قليل الكثرة. ازهارها يمش بطولها مروج اصفر. تيش في اللاكن. زهر من حزيران الى تموز.

١٣٧٣٥ - سُفْرَسُ مَسْفُورِي *

Saxifraga cuneifolia (S). *Saxifrage cunéiforme* (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو نحو ١٥ سم. أوراتها قرصية التجميع. نصلها مخروطي الشكل، اعصر الصفصة العليا، جزوي السفل. ساقها عادمة الورق. ازهارها صفرة اللدة بيضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى آب. تخشى الملوحة الحارة.

١٣٧٣٦ - سُفْرَسُ مَسْفُورِي *

Saxifraga rotundifolia (S). *Saxifrage à feuilles rondes* (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها موقرة. أوراتها كلوية الشكل. نصلها خلى البتاج، خلى البثرة. سنن الحلة. ازهارها مشنة بالاصفر والاخر || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٣٧٣٧ - سُفْرَسُ مَسْفُورِي *

Saxifraga longifolia (S). *Saxifrage à longues feuilles* (F).

بجلة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٨٠ سم. أوراتها مستطيلة. نصلها مقر الصفصة. ازهارها كثيرة العدد، بيضاء اللون، بطولها تجميع اصفر ومقطة حراء || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٣٧٣٨ - سُفْرَسُ مَسْفُورِي *

Saxifraga myota (S). *Saxifrage changée* (F).

عشبة جادسة حولة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراتها متعاقبة احليجية، نصلها جامد الصفصة، مذهب الحثار سنن الزام الاخير || ازهارها حري الشكل. ازهارها مديدة البتلات لونها الى الصفرة بطولها مروج رتقالي. زهر من حزيران الى آب. ترطب في الارربة الكلسية.

١٣٧٣٩ - سُفْرَسُ مَسْفُورِي *

Saxifraga secundata (S). *Saxifrage dressée* (F).

عشبة سبروتية حولة تملو نحو ٢٠ سم. أوراتها مخروطية الشكل، ثلاثية التجميع. نصلها خلى البتاج. ازهارها تير ودية وتلتي بالايض || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٣٧٤٠ - سُفْرَسِيَّات ، مَسْفُورِيَّات

Saxifragaceae (S). *Saxifragaceae* (F). *Saxifragaceae* (E).

السفرييات او القلييات كما سماها بعضهم فصيلة نباتية من ذوات القلتين عطيفة القشالات. اسماها واجمعها وانواعها كثيرة العدد. معظمها نباتات شوية. جميعها خشوية الازهار، قليلة البزور.

١٣٧٤١ - سَكْرَكِيَّة ، سَكْرَكِيَّة

Sphyraea spec (S). *Sphyraea*, Brochet de mer, Espec (F).

سمكة بحرية من شاكات الزنائف وحيدة الجنس والوع. موطنها مياه البحر المتوسط. تتميز بامتلائها. راسها ذلق الخمل. لونها الى الالغشية يتبع من اقترابه من فيج الظهور || وهي من اسماك الشولبي النباتية، جيدة الصنف، مستحبة العلم.



سُفْرَسُ الحَصَى



سُفْرَسُ حَشِين



سُفْرَسُ سَرْمِي



سُفْرَسُ سَرْمِي



سُفْرَسُ طَحْطَحِي



سَكْرَكِيَّة

Spongipellis

١٣٧٤٣ - سَمَكَاتِيَّة

فطر من السيات يركب اششاب يفس الراتنجيات اعصابا التنوب والاسفوفه فيصيب الشفن المكسبي الذي يشقق الخشب ويفصله ، بالطول والعرض ، الى مكعبات متراكبة متتابة عديدة الصلابة تحيطها من جميع جوانبها اغشية للشحج الحليمية الحطعية اللون || اما الفطر فقيقته كلوية الشكل قطرها نحو ٤ سم. اطرافها غائرة متخلية مركبة من طبقتين العليا اسفنجية الميكال سماكتها نحو ٣ م. والسفل ليفية حشوية سماكتها من ١ الى ٥ م . خضابه قليل الالوان يظلم فيها الحطبي والبي . لبابه ابيض . بويضاته اهليلية الشكل طولها من ٣ الى ٥ ميكرون .

Ruscus (S). Fragon (F).

١٣٧٤٤ - سَمَكَاتِيَّة

جس نباتات سرخوية عشبية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها عديدة . سوقها مضامة . رذاتها جلدية ، سنانية الشكل . ازهارها نصليبة الانثخاب . ثمارها عتية حمره اللون . يزورها سيد || اشهر انواعها ما يلي .

١٣٧٤٥ - سَمَكَاتِيَّة ذُلُي ، حَبَّ الثار

Ruscus hypophyllum (S). Fragon hypophylle, Laurier alexandrin (F). Alexandrian laurel (E). Alexandrinischer Iorbeer (D). Rusco a foglie nude, Lauro alexandrino (I).

جنية برية وزينية تملو من ٤ الى ٨٠ سم. رذاتها تحمل من ٥ الى ٦ ازهار . ازهارها ثنية اللون . ثمارها الى الحرة المائلة .

١٣٧٤٦ - سَمَكَاتِيَّة كَبِيرٍ هو الرعد ، اطله .

١٣٧٤٧ - سَمَكَاتِيَّة لَاسِعٍ

Ruscus aculeatus (S). Fragon piquant, Petit-houx, Houx-fraien, Buis piquant, Myrte épineux (F). Butcher's broom, Kneeholly, Box-holly (E). Echter müsedorn (D). Ruscopungente, Brusco (I).

جنية ذلفية برية وزينية ترهب في الاربة الكنسية . تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. رذاتها صلبة ذلقة مديدة لاسعة . ازهارها فردية او ثنائية التجميع ، خضراء اللون . جذابها طيبة لتدخل في بعض المستحضرات النباتية وفي مدقة القيق تلبه الحقم وتقتطع الدم .

١٣٧٤٨ - سَمَكَاتِيَّة لَسَنٍ * ، لِسَانُ الثَّرَسِ

Ruscus hypoglossum (S). Fragon hypoglosse, Langue de cheval (F). Horse tongue, Double tongue (E). Zungenmüsedorn (D). Rusco lingua-pagans, Bislingus (I).

جنية برية وزينية تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. رذاتها لسنة سنانية طولها من ٦ الى ١٢ سم. ازهارها عتقية ثلاثية او خماسية التجميع .

١٣٧٤٩ - سَمَكَاتِيَّة لَيْثُونٍ هو الحرقلة لثانعة ، اطلها .

١٣٧٥٠ - سَمَكَاتِيَّة

Sphnodon (F). حيوان بيوض من غطيات الروس يفس ايضا ختيره ، اطلها .

١٣٧٥١ - سَمَكَاتِيَّة

Sphindidae (S). Sphindidae (E). فصيلة حشرات من غطيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروقة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المحصلة الحرارة

Grain de poussière (F).

١٣٧٤٢ - سَمَكَاتِيَّة

Grain of dust (E).

اصغر ما يكون من ذرات البقيق والغراب وهي التي ترتفع كالتيار .

Sophisme (F). Sophism (E).

١٣٧٤٣ - سَمَكَاتِيَّة

الفسطة برنة استدلالية مغالطة .

Ecal'e d'oignon (F).

١٣٧٤٤ - سَمَكَاتِيَّة

Scale of onion (E).

سقط ج اسفاط . كل طبقة من طبقات البصلة تنحى سقلاً .

Grain de colocynth (F).

١٣٧٤٥ - سَمَكَاتِيَّة

Seed of colocynth (E). سلع .

١٣٧٤٦ - سَمَكَاتِيَّة الْمُتَحَرِّينَ

Catarrhiniens (F). Catarrhiniens (E).

في مجموعة قريود العالم القديم من آف خنزراء متقاربان ويقربها تحت الالف || انواعها واجناسها كثيرة العدد تنحى ثلث فصائل : اشباه الانسان والمجربيات والمجربيات .

Macrocyste (S).

١٣٧٤٧ - سَمَكَاتِيَّة

Macrocyste (F). Macrocyste (E).

نبات بحري من اشنيات البحر . اصلاته معظم بحار المناطق المعتدلة الحرارة || كلالته نشطة قوية . صالة وصيلة السرعة المبط ، تقول من ١٠٠ الى ٥٠٠ م .

١٣٧٤٨ - سَمَكَاتِيَّة

Peau écailleuse (F). Scaly skin (E). سَمَكَاتِيَّة

هو كل جله اعشن كجلد التسلس .

Raja sephen (S).

١٣٧٤٩ - سَمَكَاتِيَّة

سمكة من الثقلين كبيرة القد تقول نحو ٨٠ سم. مرتها قاع البحر .

١٣٧٥٠ - سَمَكَاتِيَّة

Cacospoglia (S). Cacospoglia (E).

ويحى الاسفنج الاجنحة . جس حيوانات بحرية ركنية من الاشويات وخصلة الاسفنجيات . انواعها المروقة قليلة العدد اصلاتها معظم مجاح البحر الابيض المتوسط || تتميز بألوانها القزمية التركيب الاجنحة التي لا تصلح للاتصال .

١٣٧٥١ - سَمَكَاتِيَّة

Siphneus (S). Siphné (F).

جس حيوانات لبونة قاضية جامة من المكريات وخصلة القاريات . انواعها خمسة جميعها صغيرة القد موطنها البلاد الاسيوية من الصين حتى بحر قزوين || اجسامها رمية تقول نحو ٢٥ سم. اذناها ٣ سم. روتوها شبه كروية . عينتا صغيرة . اذانها لافقية . جرابها قصيرة خماسية الاصابع . اطرافها مستطيلة مقوسة جامة تمكها من سرعة الحفر في التربة || انبائها الى الكهبة كثيرا . تبقي عند الظهر . ويبيض عند البطن || قوتها الاحشاب والجذور ويسائر المواد النباتية .

١٣٧٥٢ - سَمَكَاتِيَّة ، سَمَكَاتِيَّة

طائر كثير الاستئان (الميري) .



سَمَكَاتِيَّة



سَمَكَاتِيَّة



سَمَكَاتِيَّة لَاسِعٍ



سَمَكَاتِيَّة لَسَنٍ

١٣٧٧٣ - سِقَائِيَات *Buses, Buteontens (F).*
عجزة طير من فصيلة السُقُودات تشمل خمسة اجناس :
البقاعة ، الصرارة ، الخولم ، النعيل والفرناق . جميعها
ربة الجثة . وروصها خضرة . مناسرها قصيرة عصبية
البرية الدرية . سولطها وانثائها مستطيلة . ارسافها
قصيرة . غالبها قوية . اطافرها شديدة الانقباض || مهددا
العلماء قوتها القواضم والنفقات والحشرات لذلك فهي
من الطيور النافعة || تكثر ابركانها في الاشجار الباسقة
الرطبة . انثائها تقصع من رفة إلى اربع زفانت تحضنها
بنطوية الذكر نحو اربعة اسابيع .



سقاة البهاء

١٣٧٧٤ - سِقَائِيَات *Buteo (S), Buss (F).*
جنس طير من عجارة السقادات . انواعه زهاء ١٧٥ جميعها
ربة الجثة . وروصها خضرة . مناسرها حادة . ارسافها
غليلة وقصيرة . غالبها عفية . اطافرها حادة . سولطها
متوسطة الطول || تلفف الاذنان || قوتها القواضم
على اختلاف انواعها والحالت والطعام والتفادع واشهرات .
لذلك تعتبر من الطيور النافعة الواجب حائتها || اشهر
انواعها ما يتبع .

١٣٧٧٥ - سِقَائِيَات *Buteo desertorum (S), Buss des déserts (F).*

نوع من السقاة موطنها الصحاري والقبلي طولا نحو
٦٠ سم . ثوبها يختلف مع فصل السنة ولكن تلبق فيه
الكعبة الخضرة . ذنبها عريض التجزيع . صفاها الى
الحمرة . مناسرها حطلي النافعة ، اسيد البرية . رسفاها
ورغابها الى الصفرة النافعة .



سقاة شمالة

١٣٧٧٦ - سِقَائِيَات *Buteo borealis (S).*
Buss à queue rouge (F).
نوع من السقاة موطنها الولايات المتحدة الأمريكية
طولا نحو ٨٠ سم . ثوبها الى الكعبة الصنائية . وأنها
وطورها وسقطها ابيض من صدرها ونبها وانتيكها . ذنبها
اخر اقل من طول تجزيع اسير .

١٣٧٧٧ - سِقَائِيَات *Buteo vulgaris (S), Buss commune, B. vulgaire (F).*

Common buzzard (E).
نوع من السقاة موطنها لبحر الارياء يمتد من اقاصي
الشرق الى اطراف اوروبية وافريقية . طولا نحو ٧٠ سم .
ثوبها صديد الالوان يختلف مع فصل السنة وتقدم العمر .
تقلب فيه السرة . ذنبها مستعرض التجزيع . صفاها
جرويتان صدرها ازرق النافعة اسيد البرية . رسفاها
ورغابها صفر .

١٣٧٧٨ - سِقَائِيَات *Buteo lineatus (S).*

Buss à épaules rouges (F).
نوع من السقاة موطنها شرق الولايات المتحدة الأمريكية
طولا نحو ٧٠ سم . تتميز بتمكنها الشائمين الحمراء .
مناسرها ازرق النافعة افسر البرية . غالبها حر . اطافرها
سود . تألف ارجاع البتولا والقيظ والمزارع .



سقاة موشحة

١٣٧٨٠ - سِقَائِيَات *Lacerotides (F), Lacerotides (E).*

فصيلة حيوانات زسطة من ربة السقائيات المشققات
الاسنة . اجناسها ١٨ وانواعها زهاء ١٠٠ اجسامها
شقيقة مستطيلة . ثوبها زاهية الالوان صفراء اللونج .

والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها شديدة الصغر ، شبه
اسطوانية الشكل ، تطول من ٣ الى ٤ م . وروصها صغيرة .
عينها بارزة . تأشيرها ويلاصها نظمية . قرونها
الاستشمارية دبوسية الاطراف ، عشارية الفصل . كولسلها
مستطيلة الشكل . امحادها لاسفة . ارسافها خاسية المنقل .
الارباب ملونة || تعيش على المواد النباتية وخاصة الفطور
التي تنمو على جلعج الاشجار || اشهر اجناسها
السفنوس *Sphindus (S)* . طوله نحو ٣ م . ثوبه
الى السوداء الفضي يملو على ثام . تألف ارجاع حيث
تكثر الفطور التي يعيش عليها .

١٣٧١٢ - سِقَائِيَات *Réformé (F), Reformed (E).*
السفد من الخيل التي قطع عنها السفاد .

١٣٧١٣ - سِقَائِيَات *Echinus esculentus (S), Oursin comestible (F).*

Edible sea-urchin (E).
نوع من الاغنيوس المأكول وهو كروي الشكل ،
مطلوم النافعة ، كثير الشوك . يكثر في البحر الاحمر
ويوجد في المتوسط .

١٣٧١٤ - سِقَائِيَات *Saphir (F), Sapphires (E).*

هو الباليوت الازرق ويلى ايضا لازورد .

١٣٧١٥ - سِقَائِيَات *Fane (F), Haulm, Dead leaf (E).*

هو الشرس يمشل ما سقط من اوراق الاشجار ويشمل
ايضا سرق اوراق النباتات البقية غير المأكولة من
الانسان سرقق واوراق البطاطا .

١٣٧١٧ - سفينة زويضة *Sphaeronomia (S).*

جنس طور مجهرية من فصيلة السفينيات . يكتنفها
غضيرة او سطحية الارتكاز . يهية او كروية الشكل ،
صفراء او عنابية الجول . قصباتها مستطيلة الشب لتتبي
بكتالده يهية || انواعه عديدة مظهرها ربي مركب
الحطب والجماد ديد ان يسلب النبات او يؤذي كثيرا .

١٣٧١٨ - سفينة *Argo, Carène.*

Chariot de mer, Vaisseau des argonautes (F).
Argo, Argo novis, Vela argo, Pyxis (E).
السفينة كوكبية نجوم جنوبية المظج مركزها تحت الكلب
الاكبر || مدد نجمها ٦٤ اميزدا واشهرها النير الذي
على المهادل الجنوبي وهو من المزية الاول وقسمه العرب
« سهيل » وسهيل اسطورة راجعها في الشعرى البانية
ومن النجوم البارزة المائلة الى طله الكوكبة « القوس »
و« مركب القوس » .

١٣٧١٩ - سفينة جوية *Aéronef (F), Alroscif (E).*

السفينة الجوية كل مركب تحته طائفة الفانتيه ، اي
طائفة محركاته ، من الارتفاع عن الارض والسير في الجو .

١٣٧٢٠ - سفينة *الطب نجي وشبكة .*

١٣٧٢١ - سفينة *هر البجع ، اطلية .*

١٣٧٢٢ - سفينة *شكوي*

هو الذي ينظر ماله البقاعة ويوزعها على مستطيتها .

١٣٧٩٢ - سِقْرُوسٌ مُخَطَّمٌ *

Cychrus rostratus (S). *Cychre rostré* (F).
Cychrus rostratus (E).

حشرة مفترسة نافعة من فصيلة السلكوقيات ورتبة مفدمات الاجنسة. تألفت الاجراع. قوتها الحزرون والبراق وديدان الحشرات. جسمها متوسط القد بطول من ١٥ الى ١٨ سم. ثوبها الى السواد الشهي الكامد. رأسها مخروطي ينتهي بنمط مستدق ويكفي غلين خضيين. ميناها صفيرتان. زبائنها دقيقتان مستطيلتان. ظهورها اهليجي الشكل، مذهب الطرف للاتصاف. اوساغها خماسية المقل. لها جليل واحد في الجليل. تظهر الحشرة الجملانة في الخريف وتعيش حتى الربيع. تسرح في القبار. تساقط في نيسان وتجمع المكن ميناها على سطح التربة بين العبل والاوراق اليابسة. البقرة عند تمام ادراكها تطول من ٢٣ الى ٢٧ سم. جسمها مردي الشكل، مبط الجرم، سداسي الراويج. ثوبها الى الطحلة السوداء القاتمة. رأسها وكفاها ورجلها الى السمرة الكستنية. طور الاكمال الذي يستمر من ٣٥ الى ٤٥ يوما يقضي في البيض المويدي الدور الذي تحفره البقرة للاختباء فيه وللإيقاع بقضها.

١٣٧٩٣ - سِقْرِيط *
Scarite (F). *Scarites* (E).
جنس حشرات نافعة من فصيلة السقريطيات. انواعه عديدة جميعها مفترسة. ألوانها سوية اللون يلب فيها الاسود اللامع. تأثيرها قوية. ارجلها الاسامية كبيرة القد جامة. تألف الشطوط البحرية والبحرية غاباتها رية، مخروطية الشكل، حديدية الازنكار النوري. اشهر انواعه ما يتبع.

١٣٧٩٤ - سِقْرِيطٌ اَمَلَسٌ *

Scarites laevigatus (S). *Scarite lisse* (F).
حشرة غشائية تسرح من الشرق الى الغرب. طولها رافع من ١٦ الى ٢٠ سم. ثوبها الى السواد اللامع. غمداء قاطبة الخطوط المائلة المبهمة. موطنها شرافي البحر المتوسط. قوتها كل ما استطاعت اليه سيدها من الحشرات والديدان. مسرحها يقوم طوال الربيع والصيف.

١٣٧٩٥ - سِقْرِيطٌ مَكْرَدٌ *

Scarites buparius (S).
Scarite géant (F).
حشرة دجوية تسرح من الغرب الى الشرق. طولها رافع من ٢٥ الى ٣٥ سم. ثوبها الى السواد اللامع. موطنها شطوط البحر المتوسط. قوتها كل ما استطاعت اقتنائه من الحشرات. مسرحها يستمر من اواخر الربيع الى اواخر الخريف.

١٣٧٩٦ - سِقْرِيطِيَّاتٌ *

Scaritidae (S).
Scaritidés (F). *Scaritidae* (E).
فصيلة حشرات نافعة مفترسة من مفدمات الاجنسة اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اجسامها متباينة القد. ألوانها مختلفة تلب فيها الالوان السوية اخصها الاسود اللامع. تأثيرها قوية. قوتها الاستشارية تركيز على تجاوب مفترسة مركها تحت المويينات. تألف الشواطئ البحرية والبرية. تقترب الحشرات والديدان والحوم.

١٣٧٩٧ - سِقْسَقِيٌّ *

هو الزنقاز. اطلبه.
١٣٧٩٨ - سِقْفَةٌ
Aile (F). Wing (E).
هو جناح الطائر. يقال رفع الطائر سقفيه.

١٣٧٩١ - سِقَايَة هي السقاية ، اطلبها .

١٣٧٩٢ - سِقَايَة الحِطَّانِ

Lézard des murailles (F).
سقاية تدعى سحلية الحيطان ، اطلبها .

١٣٧٩٣ - سِقَايَة مَخْضَرَك

Lézard vert (F).
سقاية تدعى سحلية خضراء ، اطلبها .

١٣٧٩٤ - سِقَايَة رَشِيكَة

Lézard agile (F).
سقاية تدعى سحلية رشقة ، اطلبها .

١٣٧٩٥ - سِقَايَة وَكُود

Lézard vivipare (F).
سقاية تدعى سحلية وود ، اطلبها .

١٣٧٩٦ - سِقْب

Branche mère (F).
Mother branch (E).
النصن الريان الغليظ الطويل الذي يمتد الشجرة ويكون امتدادا لساقها . يقال له في لبنان الملك .

١٣٧٩٧ - سِقْب

ولد الباقية الذكر . قال الاصمعي . اذا وضعت أنثاة ولدا فولدنا ساحة تقسم سائل قبل ان يعلم اذكر هو ام انثى فاذا علم فان كان ذكرا فهو سقب وانه سقب ويقال لانثى سائل .

١٣٧٩٨ - سِقْدَة ، سِقْدَة

Entraineur (F).
To train (E).
سقد وسقده الفرس : فسره . خرج في السمر يسقه ويسقده اتميل . والسقده هو الفرس المفسر .

١٣٧٩٩ - سِقْدَة * ، سِقْدَة

Estrelda minima (S). *Sénégal nain* (F).
مصفور من الجرامم الخروطيات المتأخر. موطنه افريقية الاستوائية. طوله نحو ١٥ سم. لونه احمر اللون تملوه نغمة يفساد. متقار ورجلاه الى الصفرة. يألف الحدائق والحقول وجوار المزارع. قوته البزور والآثار والحشرات والحوام. يربح ويذهب في المطيرة كالخشب لكنه لا يفرد.

١٣٧٩٠ - سِقْدِيَّاتٌ *

Molluscacea (S).
Molluscacés (F). *Molluscacées* (E).
عمارة لطور مجهرية من فصيلة الحشرات ورتبة الزقيات. اجناسها وانواعها عديدة تتميز بسادتها الطليقة السطحية الازنكار. تكاثرها تحسن بويقات بسيطة او عديدة الخلايا. تكاثرها غيظية تشابه التكاثر. لها جنسان مؤنثيان : الذليل والزيقة .

١٣٧٩١ - سِقْرَب * *

Scarabus (S).
Scarabe (F). *Scarabus* (E).
جنس دويبات بحرية من الرضويات ممليات الاربيل. انواعها المعروفة عديدة اعلتها بحار البلاد الحارة والمتلة الحارة. جميعها مفترسة. حلازنها يرمعه الشكل ، مستعرضة الفجوة الرمية ، تطول من ٣ الى ٧ سم. لها ارجلها عديدة ، جميعها مزرقعة وتنقطة بالجزوي الازرقوتي او الكستني او البني .



سقذ



سقارب



سقروس مخم



سقريط املس



سقريط مارد

١٣٧٩٩ - سَقَطَر * ، سَقَر *

من الزعانف الشريفة ويكثر زعانفها الصدرية وبصر زعانفها الظهرية الخلفية الارتكاز || تحسب أحماكها وأرغافها السقلين .

Sparus striatus (S). *Sparus strid*, *Scathare* (F). *Scather* (E).



سَقَطَر

١٣٨٠٤ - سَقَطَر *
لثاحية المنبسطة البريلة من الشط .

١٣٨٠٥ - سَقَطَرَاتُ الْفُطُوم (F). *Tectibranchs* (F).
رتبة حيوانات من الرغويات الطدية غليظيات الخياشيم .

١٣٨٠٦ - سَقَطَرَاتُ الرُّؤُوس *

Stegocéphalus (F). *Stegocéphalous* (E).

رتبة من الصفصيات المتصيرة يمد عيها إلى الإبراج الأمامية وقد انقرض معظمها في أواخر الإبراج الثاني . بعض حيواناتها كانت تشبه التماسيح وبعض الآخر يشبه السحرة . جميعها كانت مصفحة الرؤوس المسطحة .



سَقَطَر

١٣٨٠٧ - سَقَطَل *
Porcellana (S). *Porcellane* (F). *Porcellane* (E).

جنس من فصيلة السقلطيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم ومنها البحر الأبيض المتوسط || أجسامها صغيرة ، بيضية الشكل . ظهورها مغطاة بالإحدياد ، صلبة اللون الجامدة . أرجلها كبيرة ، مهيئة للإطاري بمساندة الزوج الخلفي الصغير الجرم والرجل الارتكاز . ملاحظها قليلة ، مبطلة ، شديدة النقط . زنها غليظة مستطيلة . أرجلها إلى الأخضر اللامع أو الأزرق مغطاة بشفرة صفراء يختلف انتشارها بالنسبة إلى الأنواع .



سَقَطَل

١٣٨٠٨ - سَقَطَلِيَّاتُ *

فصيلة من القشريات عشاريات الأرجل قصيرات الأليل تتميز بشفرة الزوج الخلفي من أرجلها الخلفية في المحيط الظهري بدلاً من المحيط البطني . أجسامها وأرجلها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم .

١٣٨٠٩ - سَقَمُونِيَّاتُ * ، سَقَمُونَدَة

Convolvulus scammonis, *C. syriacus* (S). *Scammonide*, *S. d'Alep* (F). *Scammony plant* (E). *Purgier-winde*, *Syrische winde* (D). *Scammonio*, *Scammona d'Aleppo* (I).

نبات طبي حشبي ليني حارث من فصيلة اللبائيات أورثو متصالية رعيمة مثلثة الأوراق . أزهاره أبوية الارتكاز طويلة الزناد ، بيضة الشكل ، صفراء اللون مشربة اللباض . يستخرج من جلدها صمارة وارتجعية صنية كثيرة الاستعمال الطبي .

١٣٨١٠ - سَقَمُونِيَّاتُ في اللبائيات فصيلة نباتية .



سَقَمُونِيَّاتُ

١٣٨١١ - سَقَطَر مُشِير *

Centropomus lineatus (S). *Centropomus rayé* (F). *Centropomus lineatus* (E).

سمكة بحرية يابوس من فصيلة القرشيات شاكيات الزعانف . أصلها من أقاليم البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الأطلسي || جسمها المثلثي الشكل ، يطول من ٢٥ إلى ٣٥ سم . ثوبها إلى اللونه القفصية . ظهرها فضي اللون ويملأها في جانبيها تشقير تشقير قالب أصفر ذهبي . رأسها مخروطي الشكل ، ذقن الحزم ، كبير الشفق . لها



سَقَطَر مُشِير

١٣٨٠٠ - سَقَطَمُ في القارة الآرية ، أطلميا .

١٣٨٠١ - سَقَطَرُم *

Cynopterus (S). *Cynoptera*, *Mégère sans queue* (F).
جنس سيوان من فصيلة الطوطيات . أنواعه المعروفة قليلة يقال أنها ثلاثة . جميعها أسيرة شرقية ، صغيرة القد ، برءاء ، غليظة قراس ، تصيرة القرفوصة . طولا يراوح من ١١ إلى ١٢ سم . وبعدها من ٥٠ إلى ٥٥ سم . تعيش بجاعات قليلة العدد . تألف التمثل والاشجار الحرجية . قوتها آثار حل اختلاف أنواعها أعصها المنة والغزاة .

١٣٨٠٢ - سَقَطِين * ، مَكَلَاةُ الْبَحْرِ *

Squatina squatina (S). *Squatina*, *Angu de mer* (F). *Angel-fish*, *Angel-shark*, *the Monk* (E).

سمكة بحرية ولون مقترنة من فصيلة السقلطيات . أصلها البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الأطلسي . سرسجها في قدام تقرب من المهاجم والشلوط . قوتها الاسماك البليطة والرغويات والقشريات || جسمها معتدل انتطيط ، شبه صفي الشوزن ، يطول من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم . رأسها غليظ عريض مبط الجرم ، مقنوم الحظ الأمامي . لها طرفي الارتكاز واسع الشفق . استنابها صغيرة مهيئة الأطراف الحادة المتشعبة . عينها كبيرة . منبهاها ونهبها صغيران . زعانفها الصدرية والخلفية كبيرة الحجم فائقة كالجناح . زعانفها الظهرية صغيرة القد ، غليظتها الارتكاز الذي يتنامى قاعدة الحلب ، الخشنة الشريفة طاسة لا أثر لها أما الأليلية فمعدلة الحجم فائقة || جسمها متوسط الصنف ، مسكها جيد يستعمل في صناعة الألبسة الجلدية .

١٣٨٠٣ - سَقَطِينِيَّاتُ *

Squatinidae (S). *Squatinidae* (F). *Squatinidae* (E).

فصيلة أسماك بحرية ولون من السقلطيات ورتبة الاشقوق . أجسامها وأرجلها المعروفة قليلة العدد . أصلها جميع مناطق المحيط المتوسط والناطاق القرية من التناقل إلى المحيط الأطلسي || سرسجها لبي ولا تقرب من المهاجم إلا نادراً جداً . قوتها الاسماك البليطة والقشريات || جسمها معتدل انتطيط ، مخروطية للشوزن ، تطول نحو ١٥٠ سم . رؤوسها مبطلة مقنومة الأعظام . تشيز يتلجيا

الشكل ، مشدود التشاد . ثوبها الى الخضار الاكهب تملو نغمة سمره وسط نجيبي اسود وغطان جانبها الى الجلوة . ويعطوها في كل سكة من سكهها البطينة اربع نقط سود متعينة بالهبط . رأسها الى الجلوة القامة . منها الى الربة السواد . وواجبها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن جلابها من الطين .

١٣٨١٩ - سَقَنْقُور ، عَفَشَكَة ، قَبْزَات

Pressure (F). Pluck, Harslet (E).

هو كل ما له قيمة ثانوية في النضابة كالتربة والقلب والكروش والقوائم الخ .

١٣٨٢٠ - سَكَنْقُورَة

Hangar (F). Outhouse, Shed (E). السقفة والصفة بناء زراعي مكشوف الجوانب او بعضها تحفظ فيه الآلات الزراعية ويستعمل أيضاً لايلاء المحاصيل .

١٣٨٢١ - سَكْ

Araneus (S). Epelre (F). جس حناكب كبيرة القد . انواعه نحو ٨٠٠ موطنها العالم .

١٣٨٢٢ - سَكْ

Gîte du scorpion (F). Lodging of scorpion (E). هو جسر السقرب .

١٣٨٢٣ - سَكْ مَفْجُوع *

Araneus diadematus (S). Epelre à diadème (F). Garden spider (E). Kreuzspinne (D).

نوع من الحناكب المقترنة المجلولة ، ثنائيات الروايا سداسيات المشاق ، من فصيلة الرميبيات || جسمه مشتمل القد يطول نحو ٩ م . عند الصغير وهو ١٥ م . عند الصغيرة . صغرها يرسي الشكل ، صغير القد ، حنفي اللون . حينها زنجيتان ، خيشماء صغيران ، ذربان . لكاه متدلا الطويل . بطنه اهليلجي الشكل ، حنفي اللون تعلوه نقط نظامية تبرز كالدور المرفوف . جوارحه مستطيلة ، كهيئة الملب القصير || يألف البراري والحدائق . شه كبير القد . يتسبه بين الاجار والادغال ، قوته الحشرات والذباب والهوام || يعتبر من الحناكب النافعة اللاذعة .

١٣٨٢٤ - سَكَايُوزَة ، جَمْرِيَّة ، زَهْرَة الْحَرْب

Scabiosa (S). Scabieuse (F). Scabious (E). Skabiose (D). Scabiosa (I).

جس نباتات برية وتربلية من فصيلة الدنسيات انواعه نحو ٥٠ منها الجنيات والاشباب الحولية والحرقة والمعرة . اوراقها متعينة مركبة ومفرقة . ازهارها وريسية طويلة الزناد . جملة الشكل والالوان . كانوا يوزون لها في الماضي القريب عدة خواص طبية منها الشفاء من الجرب والفلس وغيرها من الامراض الجلدية . اشهر انواعها ما يلي .

١٣٨٢٥ - سَكَايُوزَة الْفُولْزَا

Scabiosa caucasica (S). Scabieuse du Caucase (F).

شبة معمرة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ م . اوراقها مسنة الحافة ، جملة الخضار الزاهي || ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٦ م . لونها الى الزرق السبابة || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٣٨٢٦ - سَكَايُوزَة بَسْتَانِيَّة *

Scabiosa purpurea (S). Scabieuse des jardins, Fleur des vœux (F).

شبة حولية عديدة الشروب تملو من ٤٠ الى ٩٠ م .

الاسفل ينضم الاحمل . اسنانها صغيرة ، ذرية ، متعينة . عيناها كيرتان ، ناشرتان ، رفيتا الازنكاز . زعانفها الفهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية كبيرة ، فارقة || لحمها قلح الصفت ، مغرب فيه .

١٣٨١٧ - سَقَنْقُور

Scincus (S).

Scincus (F). Skink (E).

جس حيوانات من الطاء القصرات الاسنة . انواعه ثمانية منها غشاق الانهار والصحارى الاسوية والافريقية . جميعها اكبر من السحالي والخنز . قوائمها خفيفة الاصابع . اذنانها صغيرة . اكثافها بمنجزة ، ظهورها مدببة يسفرو صول . بطونها الى البياض الاثير . كان ولا يزال يستعمل ، بعد تحضيره وتجفيفه بالمخ ، لتبيح الباء والامناظ . وهو شائع الاستعمال في مصر والسودان وغيرها من البلاد الافريقية . ومنهم من قال انه يلهب بالتدريج القوة والقرص والبراع والمفاصل .

١٣٨١٨ - سَقَنْقُورِيَّات

Scincidae (S).

Scincidae (F). Scincidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة الطاء قصيرات الاسنة منها السقنقور واليدفة ورضامة البقر والحكاكة || انواعه نحو ٤٠٠ معظمها من زحافات المناطق الحارة .

١٣٨١٩ - سَقُوطُ الْاَجَلْ (F). Déchéance du terme

ه سقط سن للمئين في الاجل الموزون متعلقاً عندما لا يطم لسطاً مستحقاً بعد انذاره رسمياً بسقوط حقه في الاجال الباقية فيصبح المئين اذا ذلك واجب الاداء . هذا وقد يسقط الحق في الاجل الموزون ، قانونياً ، في ساطي : اضرار الفلاس للمئين او اذا قام للمئين باعمال تحط من قيمة الضمانات المرسوة .

١٣٨١٥ - سَقُوطُ الْاَلْهَوَى

Pérémpion d'instance (F).

هو اعاء اكار كل اجراء في الدعوى يتعذر به المصلي عليه بعد انقضاء مدة مطوعة .

١٣٨١٦ - سَقُوطُ الْيَمْسِ

هو الشركة الصفراء ، المظلمة .

١٣٨١٧ - سَكْنِي ، تَرْوِيَّة

Abreuvement (F). Wacring (E).

هو اسقاء او ارواء الحيوان والنبات .

١٣٨١٨ - سَكَنْقُورَة اَنْثِيَّة *

Scotogramma elegans (S). Scotogramma élégans (F). Scotogramma elegans (E).

حشرة من فصيلة النسيقات ورتبة حرشقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فرائشها جارية قتيها رحيق الازهار . مرشها تعيش على اوراق السرمقيات البرية والزراعية || جسمها صغير القد يطول نحو ١١ م . سبطها نحو ٣١ م . رأسها صغير الحجم . عيناها كيرتان . زباناها غشيان . مرشها مشتمل الطويل . جوشها وبطنها الى الربة || ورشها والامانيان الى الربة الحطية تعلوها زوزة وزركشة متعينة يتخللها بعض البياض . ورشها الخلفيان الى الربة القنراء تدرج مع اقترابها من الطرف الخارصي || لها جيلون في الخليل . تظهر فرائشة الجبل الاول في ايار وتتظهر فرائشة الجبل الثاني في آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو سمة ايام وتحت الكمن لسطاً مستطيلة حل الصفحات السفلى من تصال اوراق السرمقيات || السرعة تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني



سَقَنْقُور



سَقِيَّة اَنْثِيَّة



سَكْ مَفْجُوع



سَكَايُوزَة بَسْتَانِيَّة

الزناد. غشوية التركيب ، خامسة الفصل || أشهر انواعه سكب الغرب .

١٣٨٣٤ - سكب الغرب *

Sanicula europaea (S). *Sanicle d'Europe*, *Sanicle mille* (F). *Common sanicle*, *Wood march* (c). *Echta heilknecke*, *Sanikel* (D). *Sanicula*, *S. maschia* (I). نوع من السكب هو نبات عشبي، جلمووي، طيب، بري، يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. أزهاره وردية اللون. يتصلب في القلب البيطري. أورثه تقييد الإيقار عند الانزعاج وبعد الوضع لانه يستعمل الخلاص أي خروج المشية.

١٣٨٣٥ - سكبية
Scape هي في الحشرة أول قفلة من التزيان.

١٣٨٣٦ - سكبية
Planche basse (F).
Shallow bed (E).
مسطيل أو مربع من التراب حشن وصل متفصلاً عن سطح التربة لاقبال واستقبال ماء السقاية.

١٣٨٣٧ - سكبتيات
Saniculées (F). *Sanicles* (E).
سبط من الخبيئات عديد الاجناس والانواع اشهرها السكب.

١٣٨٣٨ - سكبتينج
هو انجذاب البسم، اطلبه.

١٣٨٣٩ - سكتة، حثيطة، همدكة، غشيرة
دم
Apoplexie, *Coup de sang* (F).
Apoplexis, *Apoplexy* (E).
استحسان شديد مع زف أو رشع أو السكب دموي في النجسة الملع أو غيره.

١٣٨٤٠ - سكر
Bestardeau, *Vanne* (F).
Coffer-dam, *Wazar-gaze* (E).
حاجز يتحرك من فوق الى تحت يعترض طريق الماء فيسمح بمروره أو يمنعه. وهو أيضاً سد يسمح بتحويل الماء من مجرى الى آخر.

١٣٨٤١ - سكر
Sucre (F). *Sugar* (E).
مادة حلوة اللذات متبلورة سهلة اللويان في الماء. كثيرة الانتشار في المملكة النباتية توجد في جلود النبات وسوى واورثه ونحوه || وهو من الوجبة الكيالية يشتم الى مادة بسيطة تدعى غلوكوز كا في الشب وسطر التار. ومادة ثنائية تدعى سكروز كا في عصير قصب السكر والشمشوق... اما السكر من الوجبة الحيائية فهو مصدر الحرارة الحيوانية التي يرتكز عليها كل نفاط.

١٣٨٤٢ - سكر
Saccharifier (F). *To saccharify* (E).
حول الى سكر.

١٣٨٤٣ - سكر العنب
Glucose
هو الغلوكوز، اطلبه.

١٣٨٤٤ - سكر متعكس
Sucre inverti (F).
Inverted sugar (E).
هو السكر الذي صار قابلاً للاستهلاك أي السكروز الذي تحول الى غلوكوز وفركتوز.

١٣٨٤٥ - سكرات
Saccharate
كل مركب من السكر مع اوكسيد معنفي.



سكايوزة حثيية



سكايوزة ورد الحام



سكب الغرب

اورثها ملتصحة، رباعية. خلية التصل || ازهارها كبيرة اللثه لونها يختلف باختلاف الفرب فيها البنفسجي والازرق والبيجي والوردي والايض والاصفر والوشج. جميعها نلحة العرف المشي || ثمارها خلية البشرة، ثمانية التضديد القلبي || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

١٣٨٣٧ - سكبايوزة حثيية *
Scabiosa arvensis (S). *Scabieuse des champs*, *Langue de vache* (F). *Scabious*, *Pin-cushion flower* (E). *Ackergrindkraut* (D). *Scabiosa del camp*, *Ambretta* (I).
عشبة طرية برية معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اورثها ملتصحة مشرودة مستطيلة القفص الوسطي. تصلها زغبية البشرة، الحسل اللون || ازهارها صغيرة اللثه قطرها ٢ سم من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الزرقوة اليلكية. مبرها مسكي العرف || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٣٨٣٨ - سكبايوزة عطورة
Scabiosa canescens (S). *Scabieuse odorante* (F).
عشبة معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اورثها كبيرة اللثه مشرودة، ثمرها قدي الشكل || ازهارها كبيرة الحليم، زرقاء اللون، عطرية العرف. ثمارها خلية البشرة ثمانية التضديد القلبي || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

١٣٨٣٩ - سكبايوزة كبريتية
Scabiosa sulphurea (S). *Scabieuse jaune soufre* (F).
عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٤٥ سم. اورثها كاملة مستطيلة مدنية. تصلها ازغب بالصفحة، الحسل اللون. ازهارها خلية البشرة، كبيرة اللثه، كبريتية اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٣٨٤٠ - سكبايوزة نجمية
Scabiosa scabellata (S). *Scabieuse étoilée* (F).
عشبة حولية تملو نحو ٥٠ سم. اورثها ملتصحة، رباعية، سلتة. تصلها خلي البشرة الحسل اللون || ازهارها مستطيلة الزناد، متوسطة الكبر، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى اليباس اليلقي، حنارها اصفر || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٣٨٤١ - سكبايوزة ورد الحسام
Scabiosa columbaria (S). *Scabieuse columbaria*, *Columbaria* (F). *Small scabious*, *Lilac flowered scabious* (E). *Taubenskabiose* (D). *Scabiosa columbaria* (I).
عشبة معمرة عديدة القفروب تملو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اورثها مفصصة ومسلطة الحلقه. تصلها خلي البشرة بمرى اللون || ازهارها كبيرة اللثه لونها يختلف باختلاف الفرب. فيها الاصفر والازرق والايض والاصفر. ثمارها خلية البشرة ثمانية التضديد القلبي || ازهارها يستمر من سبيران الى تشرين.

١٣٨٤٢ - سكاكة
Aérologie (F).
Aerologie (E).

السكاكة علم يبحث في احوال الجو الرقيق وفي مختلف مساحجه الصاعدة والمنخفضة.

١٣٨٤٣ - سكب
Sanicula (S). *Sanicle* (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الكيبيات. انواعه ثلاثة اورثها طويلة التبريلات كثيفة مفصصة. ازهارها عكولية التجميع، حامية الارتكاز، طويلة

* سَكْسِيد - سِيلِكْسِيَس * ١٣٨٥٨

Cinxya (S). Cinxyde (F). Cinxys (E).

جنس حيوانات زحافة برية وبائية من فصيلة السلحفاة .
أنواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق افريقية اخضا
غنية والبلاد المجاورة || اصنافها متوسطة القد . اذنانها
لاخرة ، عذرة بالطول والعرض ، مفصلي الاطراف
الخلفية ، تطف كمثل الجسم || جميعها حاصلة قوتا
الاحتباب البرية والمائية .

* سَكْسِيَك * ١٣٨٥٩

Saxicava (S).

Saxicava (F). Saxicava (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صليحيات الخياشيم ،
وفصيلة الصليحيات . أنواعها المعاصرة قليلة اصنافها بعض
مناطق البحر الابيض المتوسط والحيط الاطلسي || اصنافها
شبه هرية الشكل ، متساكنة ، غلدة ، متوسطة القد . تعيش
مشابها مستقلة . مصاريها عادية التستين . تعيش
لاصقة بالصخور الكلسية . ليفها غزير المادة كثيفة .

* سَكَّعُ ، بِغُورُ مَرْمَرٌ ، زَهْرُ الْمَسِيحِ ،
عَرَنْتِيْفَا ، وَكَلَفٌ ، حَمِيْرُ الْمَشَايِخِ ،
بَغْلَاَصُ ، وَكَلَفُ ، يَرْبَعٌ ، سِيَكْلَامِنCyclamen (S). Cyclamen, Cyclame, Pain de pour-
ceau, Arthanite, Artanite (F). Cyclamen, Bleeding-
sun, Sow-bread (E). Cyclamenvelchen (D). Cicla-
mino, Tubero florito, Pan porcino (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من فصيلة الربييات
انواعه نحو ١٢ صنفاته مستمرة مبطلة لونها الى الجفرة
الكامحة . أوراقها زائغاة قرصية الانتشاب مستطيلة الزائد .
ازهارها خضابة التركيب ، فردية التجميع ، متحركة
الارتكاز . ثمارها كعابر صغيرة ، كروية ، عديدة
البذور . كان ولا يزال من النباتات المغايرة
التي تشغل في تركيب عدة مستحضرات . وهو شائع
الاستهلاك في الطب البيطري عصاره صنفاته غنية بالسكسين
وهي مادة قلبية غلدة ومنهم من استعمالها في صيد الاسماك .
اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

* سَكَّعُ اُرُوبِي * ١٣٨٦١

Cyclamen europaeum (S). Cyclamen d'Europe (F).
حبيبتة متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم . ثلاثيات الجذرية
عشبة التركيب تتم كامل الصنفه السفلى . أوراقها
قلبية . مستدرة الزوايا ، نصلها جامد النسيج ، اخضر
الصنفه العليا المنسجة بالابيض ، احمر السفلى || اذنانها
مرفقة الرائحة ، ودية اللون ، يطولها مزاج قرمي . مالبقيها
تطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهارها يستمر من تموز
الى تشرين .

* سَكَّعُ البَنْدَلِيَّةِ * ١٣٨٦٢

Cyclamen
neapolitanum (S). Cyclamen mephitain (F).
حبيبتة كبيرة القد قطرها يراوح من ٥ الى ٢٠ سم .
ثلاثيات الجذرية حنارية حنقة || أوراقها قلبية الشكل ،
ميمة الزوايا ، نصلها جامد التركيب ، ابيض التليج
والخامقة . اذعانها بضاء اللون او ودية يطولها عند اعناقها
توشيح احمر . مالبقيها تطول نحو ٢٠ سم . || ازهارها
يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

* سَكَّعُ النَّصْ * ١٣٨٦٣

Cyclamen coum (S).
Cyclamen de Cos (F).
حبيبتة صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم . أوراقها بيضية
١٣٨٦٤ - سَكَّرَان (F). Invert sugar (E).
في خيرة السكر التي تحول السكر الى غلوكوز ولفولوز
قابليتين للاختبار .

١٣٨٦٧ - سَكَّرَان هو النج الاسود ، الحلبه .

١٣٨٦٨ - سَكَّرَان * Scopolia (S). Scopolie (F).

Scopolia (E). Tollkraut (D). Scopolia (I).
جنس نباتات عشوية بطورية معمرة من فصيلة
الكاذجاتيات . انواعها قليلة جميعها زراعية .
سوقها قاذرة . اوراقها مستطبة بسيطة متناحية . ازهارها
فردية ، ابطية ، كوية ، مملحية ، متدلية || اعرف
انواعها ما يتبع .

١٣٨٦٩ - سَكَّرَان اصْفَر Scopolia lurida (S).

Scopolia jaunditica (F).
عشبة زرقانية مهددا الهند . تملو نحو ١٥٠ سم . ازهارها
خضبة التفصيص صغيرة القد تبدو عطره اللون ثم
تتحول الى الاصفر وتقتبي بالابيض || ازهارها
يستمر ٥ اشهر ايام من اواخر آب .

١٣٨٧٠ - سَكَّرَان الغروب Scopolia carnolica (S).

Scopolia de carniole (F).
عشبة معمرة مهددا غربي اوروبية . تملو من ٣٠ الى
٦٠ سم . ازهارها جلوية اللون متوسطة القد || ازهارها
يستمر من نيسان الى ايار .

١٣٨٦١ - سَكَّرَاة هي الزوان ، الحلبه .

١٣٨٥٢ - سَكَّرَجَا * Soldanella (S).

Soldanella (F). Sea bind-weed (E). Straudwindes,
Bärwinde (D). Soldanella (I).

جنس نباتات عشوية برية جبلية معمرة من فصيلة
الربييات . انواعها خسة . سوقها غراخية تملو من ٥ الى
٢٠ سم . اوراقها جلدية مغارة مستديرة . ازهارها فردية ،
هامة ككلال الشراخ . لونها ورجمها يختلفان مع لونها .
لها الاحمر والبنفسجي والازرق والبيجي .

١٣٨٥٣ - سَكَّرُ ثَبَات

هو الابلوج والقديم ، الحلبه .

١٣٨٥٤ - سَكَّرُوز Saccharose (F).

Saccharose, Cane-sugar (E).
هو المادة الحلاوة الموجودة في صلب قصب السكر والشوندر
والقندر والاصفندان . وهو مفشوري التبلور ثقله النوعي
١,٦٠٦ غلوه المائي متيسر .

١٣٨٥٥ - سَكَّرِي Saccharoux (F). Saccharous (E).

يعتوي حل سكر .

١٣٨٥٦ - سَكَّرَان Saccharine,

Sucre de houille (F). Saccharin, Glusidom (E).
هو سكر القند المجري ، مسروق ابيض شديد الحلاوة
كزبد حلاوته ٣٠٠ مرة من السكر المعروف . يستخرج
من قتران القند المجري . يستخره مفرأ بالصمغ
ولا يميزون استعماله الا في السيلة .

١٣٨٥٧ - سَكْسَكُو Talapoin (F).

هو هيريس سكار . الحلبه .

سَكَّرَان

سَكَّرِيَا

سَكِيد

سَكِيد

سَكَّعُ اُرُوبِي

سَكَّعُ البَنْدَلِيَّةِ

ضيقه المؤثر للذب. اتحادها لا تلتصق كامل البطن. قوائمها نسيجة، متصلة الجرم. أثوابها حباتية التخضب منها ربيدة اللون ومنها مبيجة ومزركعة || جميعها دلتة تعيش تحت القشور والقماذ وفي الاخشاب النخرة.



سُجَّع لَبَلِي

١٣٨٧٠ - سُجَّعِيَّات (F). Scaphidiidae (F).

فضيلة حشرات من فصيلة الابنية. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد، منتشرة في معظم غابات المناطق المعتدلة الحارة والحارة || اجناسها صغيرة طولها من ٩ م. رؤوسها مسعرة، ملوطة. عينها صغيرة، بارزة. تكاثرها وفكوكها قياسية. قرونها الاستشعارية لانظامية، منها الصولجانية ومنها الخيطية، جميعها مركبة من ١١ فصلة. كواسلها محدبة، شارقة، تلتصق القسم الاكبر من الرأس. اتحادها مائلة لا تلتصق كامل البطن. بطونها مدببة المؤخر || جميعها دامة تعيش تحت القماذ وفي الاخشاب النخرة وفي تكاثر القشور القاذبة || اشهر اجناسها السكفيد.

١٣٨٧١ - سُكَل (F). Synodontis (F). Schal (F).

الشكل ج أسكال. جنس ابيك نهرية من فصيلة السلوديات تكثر في مياه الانجر الافريقية. تتميز بخصامة شكلها واسوداد لونها وصفر رؤوسها وتذهب ملهاتها البت.



سُكَل

١٣٨٧٢ - سُكَل (F). Ascalaphus (F).

جنس حشرات لافلية من فصيلة السكليات ورتبة شاربانات الابنية. انواعها المعروفة عديدة، مملها بألف الاقاليم المعتدلة واليبس الآخر يعيش في المناطق الحارة او المتوسطة الحرارة || اجناسها متوسطة القدر وكبيرة. بطونها تتراوح من ٣٥ الى ٨٠ م. رؤوسها شبه مخروطية الشكل، كهيئة الملب الخلق. اجنسها مسطحة، بعضها شفاف واليبس الآخر مغطى. جميعها ملوطة. خضابها الرئيسي اصفر او عاجي تلوينها ينج وزخارفها يراوح لونها من الاسمر الى الاسود. قرونها الاستشعارية مسطحة تنتهي بطور من الملب التام سفية الشكل او مطية. صغورها متصلة التذاتة، كهيئة الملب النقي. بطونها اسطوانية او مدونة الشكل، سواء اللون، ملوطة بالاصفر او الالوان العاجي || يرقاتها شبه يفسية الثفرون، متصلة الخيطية، بارزة الخار السكسي الذي يبر كاستان المنشار. رؤوسها مربعة، ناعضة. ملاسها الفكية كلابية الشكل، مسنة من الداخل. جميعها مفترسة تعيش بين الاشجار وتحت الحجارة.



سُكَل

١٣٨٧٣ - سُكَلِيَّات (F). Ascalaphidae (F).

فضيلة حشرات من فصيلة الجناح ورتبة شاربانات الابنية. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم || اجناسها متوسطة القدر وكبيرة. بطونها تتراوح من ٣٢ الى ١١٥ م. رؤوسها شبه مخروطية، كهيئة القزب والملب النقي. عينها كبيرة، جاسقة. قرونها الاستشعارية خيطية، مسطحة، تنتهي بمجموعات من الملب والقرن يكثر فيها الشكل المثلث ثم الصفي. صغورها، من الكول الى اليرباد، زلم. بطونها شبه مدونة الشكل. اجنسها

الشكل تملها مناوج السجج لونه الى الخضار المالح. ازهارها عادية اللون، شديدة الحمرة، صغيرة القدر، مالحيتها طولها نحو ٨ م || ازهارها يستمر من شباط الى اذار.

١٣٨٧٤ - سُجَّع رَيْمِي (F). Cyclamen vernum (F).

حصيلته صغيرة القدر قطرها نحو ٢ م. قلائها الجارية بحورية قرصية. جلودها ضمية الانتشاب || اورثها قلبية، ظاهرها ازرقا، تملها جامد السجج اخضر الصفحة العليا، مالح السفل || ازهارها وردية اللون، قليلة اللون. متوسطة القدر. مالحيتها طولها من ١٠ الى ٢٥ م. || ازهارها يستمر من اذار الى ايار.

١٣٨٧٥ - سُجَّع فارسي (F). Cyclamen de Perse (F).

نبات رقه يتطلب بعض العناية الخاصة. صغوبه عديدة تختلط بالزهرات والازهار وانكالت بثلثها || حصيلته متوسطة القدر قطرها يراوح من ٤ الى ٦ م. اورثها يفسية، تملها مراكب السليج والقرن، مسن الحافة، شديدة الخضار العابق || ازهارها كبيرة القدر، محدبة الاطراف فيها المكسبة والمناوجة والمهدبة. مالحيتها طولها من ٢٥ الى ٣٠ م || ازهارها يستمر من تشرين الثاني الى اذار.

١٣٨٧٦ - سُجَّع كَلْبِي (F). Cyclamen cilicium (F).

حصيلته صغيرة القدر قطرها نحو ٣ م. قلائها الجارية بحورية قرصية. جلودها ضمية الانتشاب || اورثها قلبية مسطحة. تملها مناوج السجج اخضر الصفحة العليا المالح السفل || ازهارها وردية اللون تملها نغمة ارجوانية زرين فائدة البلات. مرها متوسط الارجح. مالحيتها طولها نحو ١٢ م || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين.

١٣٨٧٧ - سُجَّع لَبَلِي (F). Cyclamen libanoticum (F).

حصيلته متوسطة القدر قطرها نحو ٥ م. لونها الى الجوزة. قلائها الجارية بحورية قرصية || اورثها قليلة مسنة الحافة. تملها اخضر الصفحة العليا، جلوي السفل. ازهارها متوسطة الحجم، عريضة الرائحة، وردية اللون، بثلثها مسنة التذاتة. مالحيتها طولها من ١٢ الى ٢٥ م. || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٣٨٧٨ - سُجَّعِيْن، سِكَلَامِيْن (F). Cyclamine (F).

مادة قلبية سامة تستخرج من صغرة السك لتستعمل في مكافحة الحشرات وفي بعض المستحضرات الطبية الليطرية.

١٣٨٧٩ - سُكَلِيْدِي (F). Scaphidium (F).

جنس حشرات من فصيلة السكفيدات ورتبة جمعيات الابنية. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطتها بعض غابات وحراج الاقاليم المعتدلة الحارة || اجناسها صغيرة القدر، اطليجية الشكل، طولها نحو ٦ م. رؤوسها مستعرة، ملوطة. عينها صغيرة، بارزة. قرونها الاستشعارية صولجانية. تكاثرها وفكوكها وبلاسها نظامية. كواسلها كبيرة، محدبة، شارقة، تلتصق معظم الرأس. بطونها

١٣٨٧٩ - سكوري نواس هو توبال الحنيد، اطلبه .

١٣٨٨٠ - سكوليت

جنس حشرات صارة يعرف بالكراشة ، اطلبها .

١٣٨٨١ - سكوليت التين (F). Scolyte du figuier

حشرة مؤذية تدمي كبن التين ، اطلبها .

١٣٨٨٢ - سكوليتات

هي الكراشيات فصيلة حشرات ، اطلبها .

١٣٨٨٢ - سكون (F). Dormanca (E). Dormancy

السكون حالة طبيعية تمر بها معظم الحشرات في بعض اطوارها الانتقالية حيث تتخذ الى السكون التامة وتبطل نشاطها العوامل البيئية .

١٣٨٨٤ - سكوليتات (F). Tyroglyphidae (S). Tyroglyphidae

فصيلة حشرات من رتبة القاربات . اجسامها وانواعها المؤذية قليلة العدد جميعها مجهرية لا ترى بالعين المجردة . اجسامها مستطيلة بيضاء اللون ارجلها ستلية || تركيب جميع انواع الحبوب الخروقة والبار الحنفية والبسكوت والابجبان .

١٣٨٨٥ - سكيت

هو القرقس نوع من الحوام اللامع الساكت .

١٣٨٨٦ - سكيتة الجبن * ، قمل الجبن

Tyroglyphus siro (S). Tyroglyphus, Mite du fromage (F). Tyroglyphus, Cheese mite (E).

حشرة من السكيات طولها نحو نصف ملليمتر . لونها الى البياض الاخير . خطها غريبي الشكل ، ثابت وباص . ارجلها ثمانية . جسمها مغطى بالحب الدقيق المستطيل . تركيب قشور الاجبان الجافة وتصبب جميع المواد النباتية والحويانية المختصرة المنحلة .

١٣٨٨٧ - سكيتة الدقيق *

Aleurobius farinae, Tyroglyphus farinae (S). Tyroglyphus de la farine, Mite de la farine (F). Flour mite, Meal mite (E).

حشرة من السكيات طولها يراوح من شبرين الى اربعة اشرار الخمير . جسمها مغطى بالشكل ، مغطى الحلب المستطيل الدقيق . لونها الى البياض الاخير . وارجلها ستلية اللون تنقص بمحاص دقيقة . خطها بلوطي الشكل ثابت قاصم || تركيب الاجبان واللحودات ويغطي المواد الغذائية الخروقة والدقيق والحنطة والشعير والشوفان والنخالة... وعندما تصيب آبار والدقيق لونها تزدحم اشد الانى || وقد تمى الى الطيور الداجنة التي تأكلها مع الحبوب المنقوعة وتصبب ايضا بعض الامراض الجلدية للانسان الذين يتناولون نقل وتغلب اكياس الحنطة المصابة او الدقيق المطروب .

١٣٨٨٨ - سكيتيات (S). Psychodidae

Psychodidae (F). Psychodidae (C). فصيلة حشرات كثيرة الاجناس والانواع ، منتشرة في جميع انحاء العالم . الحلب قرقيات .

غشائية ، عصبية ، كبيرة ، ملونة وبريئة || تألف البراري والخراج المبعثرة الانجار . يرقاتها مفرسة تمش نحو حولين يكثر وجودها بين الاشجار التي تلامس التربة وتحت البهارات || اشهر اجناسها السكلاف .

١٣٨٧٤ - سككة

هو البع الازرق طائر من الشجوريات .

١٣٨٧٥ - سككة ، سدقة Segment

السكة هي جزء من وحدة ج سكم .

١٣٨٧٦ - سككا *

Sequoia, Wellingtonia, Washingtonia, Gigantabias (S). Sequoia, Wellingtonia (F). Sequoia (E). Echter mammutbaum (D). Sequoia (I).

جنس اشجار سرجية من الطنوسيات وفصيلة الصنوبريات . له تويان وسط فرب هذا غرب الولايات المتحدة الامريكية . اشجارها عظيمة جسيمة طول من ١٠٠ الى ١٢٠ م . اوراقها عريضة ، متعاقبة ، فلسية الشكل ، جميلة الخضار . ازهارها وحيدة اللون والمكمن . اكرانها بيضية لوناً الى اخضرى الباقى . جرحاتها مبيارة . بذورها خفيفة الجناح مرباية للتسليخ .

١٣٨٧٧ - سككا جيتاركا Sequoia gigantea (S). Sequoia géant, Arbre mammoth (F). Big tree, Mammoth tree (E).

شجرة سرريئة سريعة النمو لعل نحو ١٢٠ م . ساقها مستقيمة . نجيلها شديد الكثافة جزوي اللون . شكيرها ابيض غشيا الى السرة الصنانية وهو قليل الصلابة والقوة متوسط الصنف قليل الاستعمال الصناعي . اثناعده وثمانية عشرة . يتألفها خيطة مرتبطة . اوراقها فلسية مستطيلة جميلة الخضار الباقى . اكرانها بيضية الشكل طول من ٥ الى ٨ سم . وتعرض نحو ٤ سم . ترب في الاقاليم القارية وفي الارابة السيلية البذور . ضروريا عديدة اشهرها ما يلي :

- S. g. glauca سككا جيتاركا بحرية اللون
- S. g. pendula سككا جيتاركا زهرية
- S. g. argentea سككا جيتاركا فلسية
- S. g. aurea سككا جيتاركا ملعبة
- S. g. pyramidalis سككا جيتاركا هرمية

١٣٨٧٨ - سككا مخضرة

Sequoia sempervirens (S). Sequoia toujours vert (F). Red wood (E).

شجرة سرريئة سريعة النمو تمل زهاء ١٠٠ م . ساقها مستقيمة . نجيلها شديد الكثافة جزوي اللون . شكيرها سبالي قليل السكة . غشيا الى الجوزة الزاحية جامدة الزينة ، غشيت اللون الكسبي ، جيد الصنف ، شائع الاستعمال الصناعي || اثناعدها وثمانية عشرة ، متدلة . يتألفها خيطة . اوراقها خيطة ثنائية التنصيف طول من ١٠ الى ٢٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم . اكرانها بيضية طول نحو ٣ سم . لوناً الى الجوزة السمر || ترب في الارابة السيلية البذور المنقوعة الرطوية والالتماس . اشهر ضروريا :

- S. a. albo-apica سككا غضراء البوسيكيا
- S. a. taxifolia سككا غضراء تكسيفوليا
- S. a. filifera سككا غضراء خيطة





سِكَّة

لا تؤكل. يتكاثر بالبر إلا يفضل غرس الشجرة كما هي وذلك بعد انتاش بذرهما الذي يحصل منه وضعا في مكان رطب || وهو رطب في الأثرية الخليفة العيقية القنور ويتطلب إلى ساند أو عوائل نباتية يستلحقها .

١٣٨٩٥ - سِكَّة ، حَوْش
Chêrre (F).
To castrate, To geld (E).
انزعز الحصىين في الاسنة والبركاش والبريس ونفيرا .

١٣٨٩٦ - سَل
Manne (F). Hamper (E).
جينة كبيرة من القصب تستعمل في نقل بعض الثيار والحصار .

١٣٨٩٧ - سَل ، قَدْرُون ، سَحَاك
Tuberculeux (F). Tuberculois (E).
مرض معد خطر يمس البصل والصلال والتوت في الحيوان ، والسحاب في النبات .



سِكُون

١٣٨٩٨ - سَلْ وَتَوِي ، قَدْرُون وَتَوِي
Tuberculeux pulmonaire, Phthise pulmonaire (F).
Phthisis, Consumption (E).
مرض معد يصيب الرئة فيطها . كلفه العالم الألماني كوخ عام ١٨٨٢ وهو من الأمراض غير الوراثية إنما يعيش في الهواء والمصايد والفرزات الجسم والملايس والاعصنة وفي حليه الماشية المصابة || تحصل عندها أما باستنشاق الهواء الملوث من طريق الجهاز التنفسي إلى الرئتين أو من طريق الجهاز الهضمي بواسطة الأغذية الملوثة .

١٣٨٩٩ - سَلَاة *
Sarcophorus (S). Sarcophore (F).
جلس طير من فصيلة الزرقانيات اقبل الثوب طويل الرجلين هذه ثقباني الافريقية .



سَلَاة

١٣٩٠٠ - سَلَاة * ، دُوْدَة عَيْطِيَّة
Trichocéphalus (S). Trichocéphale (F). Trichocéphalus, Thread worm (E).
نوع من الديدان السلكية الدقيقة المسطحة . رؤوسها شعرة اطرافها مدبة . تعيش طفيلية في الاسماء اخصها للمي القليل .

١٣٩٠١ - سَلَاح *
Thecopora
جنس طيور مجهرية من فصيلة الثصبيات ، يتميز بدهاماته الخطية اللعاب ، الجولية الزرقاء المسطحة ، الشفوية الانتقام والثانية او الرباعية الاغنية || اليوم قليلة تعيش طويلا الاثدي على الصنوبريات ، الشجر وأرغها سَلَاحُ الْبَرْقُوقِ .

١٣٩٠٢ - سَلَاحُ الْبَرْقُوقِ *
Thecopora palli, T. areolata (S). Routile des pruniers (F).
نظر من السلاج يلقى طوره الاثدي على الصنوبر . ويقتل في طوره النامي على البرقوق والخوخ والكزبر . مظهره الخارجي يقع حر فضلة الزوايا تركب الاوراق على صفحتها العليا يقابلها على الصفحات السفلى بنور قرحية لاقياسية للشكل ولحمي لها إلى الجوزة فالسرة تسب التسج وتنب ذيل الاوراق وسقطها || يتكاثر بالانجاسد من الصنوبر المويود وباستعمال الفواطر الحديثة الخالية من المواد النسيجية .



سَلَاحُ الْبَرْقُوقِ

١٣٨٨٩ - سِكَّة * ، سُرْعُوقِيَّةُ الْبَحْرِ *
Squilla (S). Squille, Mante de mer (F).
جنس دوابات بحرية من القشريات فيات الاصيل . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في مجار البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة . اخفها رقيقة متدبة بالسك المدرية الاربع الاصل . اما السك الاربع التالية طفيلية . يطها كبيرة مسطحة . الزوج الاسامي من قوتها بالغ القسامة والكبر مجهز للخطف كما هي الحال عند السرعوقية || غولها مرغوب لها مأكلة .

١٣٨٩٠ - سِكِين
Coutre (F).
Ploughshare, Coulter (E).
جزء من المحراث حاد الطرف يقطع كتل التراب عموديا .

١٣٨٩١ - سِكِينِي السِّنْ
Caltridenté (F).
Caltrident (E).
من الحيوان ما كانت اسنانه حادة الاطراف ، سِكِينِي الشكل .

١٣٨٩٢ - سِكِينِي الْمِنْدَاد
Caltricroste (F).
Caltricrostral (E).
من الطير ما كان منقاده صلب الطرف ، حاد كالسكين نخس بالذكر القلق والبلشون .

١٣٨٩٣ - سِكِينِي الْفَرْقِ
Cuterfolié (F).
Cuterfoliate (E).
من النبات ما كانت اوراقه سِكِينِي الشكل .

١٣٨٩٤ - سِكِينِي * ، شَيْطُوط * ، كُوسِي
الْفَرْسِي ، شَيْطُوط الْفَرْسِي
Sachium edule (S). Chayote, Chacho, Chuchu (F).
لبات زراعي ممر ويسعد الجلس والنزع من فصيلة القرعيات . مهده بلاد المكسيك ونها انتشر في سائر اقطار العالم . جلوره دنية كبيرة القد . ساهه لينة مسلسلة تطول بسمه امتار . حواقيها ثلاثية او خماسية التركيب . اوراقه متتفة كفية خماسية القصوس والبروق ، تطول وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . اذلولها ابطية الانتساب صفراء اللون ، ذكرية وانثوية . الذركية متعديسة التجميع والانثوية فردية . ثمار تؤكل مطبوخة وهي كبيرة القد بفضية الشكل ، مقنطرة القلب ، مفسلة القشرة المهدوبة ، المتصصة ، البثرة الفتوة . لبها جانبا الملاءة البيضاء اللون يحسن حبة كسنتية الشكل ، كبيرة القد ، حقة القشار ، الملة جزء من لباب الشجرة تحوي العناصر التالية

٩١,٠٠٪	ماء
٢,٢٪	مواد دهنية
٢,٢٨٪	مواد سكرية
٢,١٦٪	مواد ازوتية
٢,٣٤٪	مواد غير ازوتية

دزوات جلوره تستعمل استبدال البطاطا في تون من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ غرام . وتحوي ما قدره ١٥,٠٠٪ من النشا ٢,٥٠٪ من المواد الازوتية
معد دزوات البتة يزارع من ٣ الى ٧ يتعلم منها الثلث أي من البتة الواحدة إلى اللزتين ويجب أن تكون البتة حولية أو محولة أما اذا زاد عمرها عن السنتين تصبح لينة

Blépharite (F). Blépharitis (E). **سلاجي** ١٣٩١١
هو رنة الجفن أو التهاب الجفن .

Anthropologie (F). **سلاجية** ١٣٩١٢
Anthropology (E). السلاجية علم طبائع الانسان .

Lévrier (F). **سلاجي** ١٣٩١٣
Greyhound (E). سلالة كلاب عدامة تصيد الزئبان والأرانب والثعالب
وبنات آوى تتميز باستقامة اجسامها وقوامها .

Monoblepharidae (S). **سلاجيات** ١٣٩١٤
Monoblepharidées (S). Monoblepharidae (E).
فصيلة ظفود مجهرية من مرتبة التسنليات ورتبة
البليضيئات .

Race (F). **سلالة** ١٣٩١٥
Race, Breed (E). جماع افراد متشابهة من نوع واحد تنقل صفاتها
بالوراثة . ومن المستحسن استعمال سلالة في النبات وورق
في الحيوان .

Raciel **سلاجي** ١٣٩١٦
ما هو منوط بالسلالة أو العنصر .

Phalange (F). Phalanx (E). **سلاجي** ١٣٩١٧
السلاميات عظايا في الاصابع .

Phalangides, Pascheurs (F). Phalangide, Mowars,
Harvestermen, Daddy longlegs (E). Weberk-
nachte (D). **سلاجيات** ١٣٩١٨
رنية من المتكويبات زبلاواتها طوال الارجل ذفلاها عشرين
كالخسادين .

Entre-nœud, Mérihalles (F). **سلاجية** ١٣٩١٩
Internode (E). جزء الساق بين عقدتين .

Age de la charrue (F). Plough-beam (E). **سلب** ١٣٩٢٠
نصاب المزارع أو قيلمه . وهو الجزء الجامع لسائر اجزاء
المزارع .

سلب ١٣٩٢١
السلب من القصة : قشرا . والسلب : ماء حجر في
البن يصل منه الخبال وهو اجفى من لبن المقل واصطب .

سلاجي ١٣٩٢٢
السلاج والسلاجية ضرب من الذهب ج سلاج .

سكوت ١٣٩٢٣
Tropaeolum (S). **سكوتية** ، **سكيتية** ، **سكيتوسين** ،
جوككاله

Capucine (F). Nasturtium (E).
جنس نباتات عشبية ليفية مدادة من فصيلة السليزيات .
انواعها ٣٥ معظمها امريكي المنبت . سيقانها عديمة الخواثق .
اوراقها متعاقبة مجنبة ، حاليها لولبية . ازهارها محورية
الارتكاز ، كوروسها ثنائية التركيب ، مهبازية التناعد .
تويجها خمسة البتلات الملقطة . اوراقها . وازهارها
مأكولة قريبة الشبه من الرشاد || احرف واشهر انواعه
ما يلي .

Maematopus (S). **سكاج** ١٣٩٠٣
Hultrier (F). Oyster-catcher (E).

جنس طير من طوال الساق وفضيلة السلاجيات . انواعه
المعروفة عشرة منتشرة في معظم انطار العالم . ملجتها الحيائي
جامي . اسراجها تمتد بعض المئات . جميعها من القواطع
الجلوة . قوتها الرغويات والقشريات والديدان ... ||
اجسامها ربة متوسطة القد . متفادها مسطيلة جالسة .
اجتمعتا شاركة تلحف الانذاب . ارسافها دقيقة معدلة
الطول . اسبابها ثلاث مسطيلة الجرم . مستقيمة
الانفاثين . القصيرة || تدفن في الكفبان والخابب .
انحاصها قدر سطحية يحيطها اطار من حطام الصدف
والقريع . اناثها تقنع من يعضين الى ثلاث يعضات
تحضنها وسعها ٢ اسابيع || احرف انواعه واشهرها
سلاج كشش .

سكاج كندوش ١٣٩٠٤
Maematopus ostralegus (S). Hultrier-pie,
Bécasse de mer, Pie de mer (F). Sea pie (E).

طائر من السلاج . موطنه يشغل معظم انطار العالم القديم .
مستاء البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مصيفه البلاد الباردة .
يألف القشوط البحرية وفضلات الانهر والمستنقعات . شرته
يعد بعض المئات || جسمه متوسط القد يطول نحو ٤٤ سم .
بسطه نحو ٨٦ سم . قوته ثنائي اللون ، اسود الرأس والظهر
والعنق ، ابيض الجبين والجبين والساق والانفك . جناحا
سود النصفه العليا ، يفض الاياهر والنصفه السفلى .
ذنبه ابيض للثم الاطو ، اسود الطرف . حلقة عينه
قرنزية اللون . جوفه برتقالية . متفاده احر القاعدة
والجسم ، اسير الملقط . رجلاه الى الحفرة || اناده لا
تحسن اكثر من يعضين .

Haematopodidae (S). **سكاجيات** ١٣٩٠٥
Hématopodidae (F). Haematopodidae (E).

فصيلة طير من طوال الساق . اجناسها وانواعها المعروفة
قليلة جميعها من القواطع الجلوة . ملجتها الحيائي
جامي . اسراجها وافر العدد . قوتها القشريات والرغويات
والديدان والاسماك الصغيرة || اجسامها متوسطة القد ،
اثوابها ملونة || اشهر اجناسها السلاج وكبيرة الماء .

سلاجيف ١٣٩٠٦
Chelonia (S). Chéloniens (F). Chelonia (E).

رتبة من الزحافات البيوضة تشغل خمس فصائل تتميز
باجسامها المبطنة البنية اللون . رؤوسها صغيرة . امتانها
متوسطة الطول . لذكورها عادمة الانسان . قراؤها غليظة
وصغيرة . بطونها قرنية الكثف . ظهورها مدقة بذهاب .
اما فصائلها فهي : الحسليات والرتريات والقرقيات
والسلحليات والجبنيات .

سكاسكة ١٣٩٠٧
Plasticité (F). Plasticity (E). هي الانطباع ، الطبع .

سيلاتوس ١٣٩٠٨
Région (F). راجع حراية .

سلاكة ١٣٩٠٩
Hirudiculture (F). Leech-breeding (E). هي فن تربية السلق وتكثيره .

سلاكو ١٣٩١٠
Vin de goutte هو ما يسيل من العنب قبل حصره .



سلاج كشش



سلاجي

١٣٩٢هـ - سَلَبُوتُ خَمَلِي، صَلَيبَةُ خَمَلِيَّة،
كَتُوبُ خَمَلِيَّة

Tropaeolum peltophorum (S.). Capucina de Lobb,
C. velue (F.). Lobb nasturtium (E).

عشة ليقية مدادة زباء تطول من ٣ الى ٥ امتار. أوراقها
مجننة، ضلعها يستطيل كالخسكة. أزهارها برتقالية اللون.
تتلاتها السفلى مسنة الحمار او مهدبة || أزهارها يستمر
نحو ٥ اسابيع ابتداء من اواخر تشرين.

۱۳۹۲ھ - سَلْبُوت رَضِیُّ ، سَلْبِیہ رَضِیَہ ،
کَبُوسِیْن رَضِیَہ

Tropaeolum speciosum (S). Capucine gracieuse (F).
 عشية ليلية مدادة تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها
 خاسية للتفصيص وقد تكون سداسية. نصلها خالي البشرة
 على صفحة السفلى. ازهارها أرجوانية اللون. مسطحة
 المهايز، قلبية الثلاث || ازهارها يستمر طوال
 الصيف والخريف.

١٣٩٢٦ - سَلْبُوت صَدِير ، سَلْبِيَّة صَغِيرَة ،
كَنْسِين صَغِيرَة

Tropaeolum minus (S). *Capucine minore*, *Petite capucine*, *C. naine* (F).
عشبة ليلية متسلقة تملأ من ٤٠ إلى ٦٠ سم. أزهارها مستديرة ، أحضانها مسطحة . أزهارها صفراء اللون يملأها تشيج وبخزيم أحمر || أزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين .

١٣٩٢٧ - سَلْبُونُ عُسْقُولِي، سَلْبِيَّةٌ عُسْقُولِيَّةٌ
كَبْرِيَّةٌ عُسْقُولِيَّةٌ

Tropaeolum tuberosum (S). *Capucina tuberosa* (F).
عشب ليفي مدادة زهراته تعليل نحو ١٠٠ سم. جلودها
عسقلية غروطية أو اهليلجية الشكل. اوراقها خماسية
البتلات. فصلها مائل البشرة. ازهارها صغيرة البتلات
المتفرقة، لونها ابيض الصفرة. صقلها مأكله تستعمل
استعمال الطماط.

۱۳۹۲۸ - سَلْبُوت کَیْر *، سَلْبِیَّۃ کَیْر، کَبُوسَین
کَبُوتَہ، اَلْأُخْتِی، طَرَطُور، اَلْأَشَا

Tropaeolum majus (S). Capucine majeure, Grande capuche, Cresson d'Inde (F). Tall nasturtium, Tall Indian cress, Canary creeper (E). Kapuziner-Indianische kresse (D). Astuzzia maggiore, Nasturtio maggiore (I).

عشيه ليلية مدادة عارية تطلو نحو ٣٠٠ سم. ساهبا
ليلية فضة مائة الجملة. جهرها غطية فاح كثيرة
الاستصاف. اوراقها جنبة الشكل، عديمة فاح البقرة
الاسنة، مجرى المضمار. ازهارها لبردة التجميع، عجمدة
الارتكاز، مغشوة البتلات، عديمة الاولان فيها الاخر
الاجنوبي والقرنزي والقرناني والاسفر ٥. وهي خضراء
في المناطق المعتدلة ٥ مسرة في المناطق الحارة ٥ ازهارها
يتمسك طوال السنة ٥ زرع التزيين وكيتا بقل.
ازهارها حريفة الطعم الحسب. ثمارها الفتية تتسعمل
استعمال الكبر في الحلات. يقال ان ازهار واورثها
لا تلحق ٥ التقيينات لغوية

Tropaeolaceae (G). ١٣٩٢٩ - سكتوبريات
Tropaeolacées (F). Tropaeolaceae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الحلقية مستثناة التعلات .

أجناسها وأنواعها عديدة جميعها عشية أو ليغية مفادة وعارضة عادمة الحواقي.

جنس حشرات ملقحة ، وأجنحة ، صغيرة القند ، تعيش في الرتبة . أنواعها قليلة . ذكرها حاملة الجنح . انثاها مجنحة . فرونها الاستعمارية قلاية الشكل . أرسافها ثنائية العقل . اما جهازها التناسل ففقر .

Zoraptera (S). ١٣٩٣١ - سَبُوحِيَّاتٌ ٥
Zoraptères (F). Zoroptera (E).

رتبة حشرات تنتمي الى طريفة الوردانيات . انواعها عديدة
جميعها من الحشرات القاسية ، الواسمة ، الصغيرة القد .
اقليمها البلاد الحارة . تعيش في التراب . انثاها مجتمعة
قاشرة البيوت البسيطة . ذكروها داجمة البيوت عادمة
الجناس . قرونها الاستعمارية قلاية . اوضاعها ثنائية
الجنس .

Sceloporus (S). * ۱۳۹۲۲ - سِلْپُور
Scelopora (F).

جنس حيوانات زحافة من الطاء وقبيلة الميشريثيات .
انواعه المعروفة نحو ٢٥ صبيها من عظام امريكا الوسطى
والشالية . اجسامها صغيرة القد ، صغيرة الرأس والفتن ،
خليفة البطن ، ربة القوائم التشعبة . الارباع خلفه
الارلان يكثر لها الاخضر والاسفر وتخطط قاطب اسود
او جوي . قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والفلهاب
والعولم .

١٣٩٣ - مستبينة هي المهرت ، اطلبه .

Salpingus (S).
Salpinge (F), Salpingum (E).

جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة غمديات الأجنحة. أوله المعروف نحو ١٠٠ مشتركة في جميع القارات العالم. أجسامها صغيرة، جفاد، قفول من ١٠ إلى ١٢ زوجاً. رؤوسها شبه مخروطية الشكل. عيونها بارزة. تأثيرها وميلها ضار. قفولها الاستمرارية متجانسة. قفولها ملطقة القدم، غنية بالخيوط الصنوبر. أحماسها لافحة. قفولها ملطقة القدم. أنثىها وسيدة التي تأثر بها. رؤوسها المسافة البردي والأشهب والبيضاء والأخضر والصفراء والأسود. تألف البراري والمناطق التي تكثر بها الأبقار. ملامحها ورائحة لها رائحة.

Salpingidae (S). • سَلْطَنِيَّات •
Salpingidae (F). Salpingidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة ، اجتماعها وانواعها المعروفة متصلة بالعدد المتكرر في مثل افطار العالم اجتماعها صفة ، اطيالها اشكل في سحنة النبات ، طول من ٣ الى ١٠ م. رؤوسها غريبة الشكل . حبيبات بارقة . تأثيرها وبلاستها ظافية . قرونها الاستعدادية قليلة من رؤوسها ، مركبة من ١١ فصلة . كواسها لاجنحية الشكل والحي . الامدادا لاجنحية . نواتها غريبة . ارساعها خامسة البقل . بسكتها الزوج الخلفي الرباعي البقل . اطيالها ملونة . جميعها رائحة او دامة تعيش على الاجراس او على المواد النباتية النعطة . اشهر اجنحتها البلبين والكثير .



ملیون کپڑے



ملہوج



المجلد



سليبي

الازرق تحوي من ٢٢ الى ٣٥٪ من الزيت الاصفر الصناتي الشائع الاستعمال الصناعي . كسبه على محوي نحو ٥٪ من الزيت من الباتات السبروية المغطاة التي لا تتأثر كثيراً بالأقلام بشرط ان لا تحت فيه الرطوبة . يوجد في جميع الارربة العميقة الفور غير انه ينضج المأكسة المنسوجة .

١٣٩٤٨ - سَلْتَم حَلْطِي *

Brassica napus sylvestris (S). Navette, Chou-colza (F). Nape, Naphew, Winter rape (E). Stackrübe, Kohlrübe (D). Navone, Cavallo navone (I).

نبات عشبي دهني على برقي وزراعي من فصيلة الصليبيات قريب الشبه من السلق الا انه اصفر قدام واحد ساعة . يزدهج اما لاستخراج دهن بزوره التي تحوي نحو ٢٣٪ من الزيت واما كملف القاشية يفيد الفزرع ويهبط الدم .

١٣٩٤٩ - سَلْتَج

Pardreau (F). Young partridge (E). السليح والسلف والسلك : فرخ الحجل . ج سلحمان .

١٣٩٥٠ - سَلْتَج

Poulaitte هو حصص الدجاج من الامعدة المصنوعة للشجبة الذنية بصدر الزيت . متوسط تركيبة الكيلاري :
 ازوت ٢,٥٪
 حامض فسفوري ١,٣٪
 عناصر مختلفة ٩,٢٪

١٣٩٥١ - سَلْتَج

السلج : بهاء الباه في البذران وحيثا كان . يقال ماء البه ماء السليج وماء الكرك .

١٣٩٥٢ - سَلْحَفَة

Tortue (F). Tortoise (E). السلحفاة كوكبية نجوم شمالية الموضع مشهورة باسم قنطرة ، اطلها .

١٣٩٥٣ - سَلْحَفَة

Testudo (S). Tortue (F). Tortoise (E). جنس سلاحف من فصيلة السلحفايات . انواعها ٤١ منتشرة في جميع البلاد الحارة . جميعها ارضية المسرح خاضلة طويلاً بأرواح من ٢٠ الى ١٠٠ سم . ذيلها متوسط الانحداب اسير اللون تملو قتر قرولية مربعة الشكل او مستطيلة ، لوينا الى السرة الزرقونية || تألف المراهي والسويل . تقضي حياتها الشجري الذي يدوم نحو ٤ اشهر في جسر قليل الفود تحفره في التربة .

١٣٩٥٤ - سَلْحَفَة الْبَرّ

Tortue terrestre rude (F). نوع من السلاحف مشهور باسم سلحفاة خشنة ، اطلها .

١٣٩٥٥ - سَلْحَفَة عَشِيَّة *

Testudo scabra (S). Tortue raboteuse, T. terrestre rude (F). Rough tortoise (E).

سلحفاة برية خاضلة من فصيلة السلحفايات . طولها كال تمجلا لا يتجاوز ٢٢ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ٤ سم . الاثنى اعرض من الفيل وأقصر منه . فارق الحلق والبرص نحو ٢ سم . || ذيلها بيضي الشكل تملو قتر قرينة الماددة . ثوبها الى السرة الزرقونية . وأسلها اسطواني الشكل ، اظفر اظفر . تقدها أطع خادم الانسان . لسانها متوسط الطول ملسا . تحتها ذليلة التجماع عند الانكماش .

١٣٩٦٦ - سَلْت هو الشليم ، اطله .

١٣٩٦٧ - سَلْتَة

Panier, Corbelle (F). Pannier, Basket, Hamper (E). سل صغير من القصب أو القضبان الخفيفة يستعمل في نقل الثمار وبعض الخضار وما اشبه .

١٣٩٦٨ - سَلْتَة

في الابداسيون الاسباني عشبة علفية تحففة تسمن عليها الايتار والافنام . انبواها مثمرة تجرهما للتحل .

١٣٩٦٩ - سَلْتَة زَوَاعِي في العرن ، اطله .

١٣٩٦٠ - سَلْتَة عَرَف الْبَلِك في عرن الكرم ، اطله .

١٣٩٦١ - سَلْتَج * ، نَعْبَة (F). Celsia (S).

سلج ج سلايلج . جنس نباتات برية وتربلية من فصيلة الخنازريات . معقودة التصريف على اسم اليوناني المويدي اولات سلايوس (Olaf Celsius) || اوراتها مفرقة . ازهارها عصفوري التجميع . ازهارها صغيرة القند مختلفة الالوان المابقة || عرف انواعها الزراعية يتبع .

١٣٩٦٢ - سَلْتَج اِكْرِي (F). Celsia cretica (S).

Celsia de Crète, Queue d'our de Crète (F). عشبة سبروية محولة مهدا جزيرة اكرت . ساقها تملو نحو ١٠٠ سم . اوراتها متعاقبة لاشعة || ازهارها وردية اللون كبيرة القند . ساقها واوراتها لزجة || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٣٩٦٣ - سَلْتَج عُرْصِي الْوَرَق

Celsia bugulifolia (S). Celsie à feuilles de bugle (F). عشبة سبروية مسمرة مهدا راثية والساحل اليوناني . ساقها تملو نحو ٥٠ سم . اوراتها السفلى غسبية التجميع ، بيضية الشكل ، مفرقة ، فصلها مائل البشرة مائل الخضر || ازهارها الى الصفرة السمر . يطولها تسليج ازرق وولج اسف .

١٣٩٦٤ - سَلْتَج قُرْصِي (F). Celsia glandulosa (S).

Celsie de Chypre (F). عشبة سبروية محولة مهدا قبرص ووسائل الاناذية . ساقها تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراتها متعاقبة خلية وغبية الاتصال || ازهارها صغيرة القند صفراء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٣٩٦٥ - سَلْتَجَان هو الخلقوم .

١٣٩٦٦ - سَلْتَجَة

Huitre (F). Oyster (E). صفة بحرية نيا شوي ، يؤكل . ج سليج . اطلب محار .

١٣٩٦٧ - سَلْتَمَج *

Brassica campestris (S). Colza (F). Colza, Rape, Carcol-oil plant (E). Otraps, Kolza (D). Colza, Napo oleifera (I).

نبات عشبي زراعي من فصيلة الصليبيات . جذره وكثي . ساقه غرامه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراته متعاقبة مفرقة ملتفة ، فصلها خلي الحروق سنن الحافة ، بحري الخضر . ازهاره عصفوري التجميع . ازهاره صغيرة ، رباعية البتلات ، بيضا اللون أو صفراء . ثماره عرولية مستطيلة . بزوره صغيرة دقيقة مستديرة لوينا الى السوداء



سلج



سلج



سلج حقل



سلحفاة عشيّة

١٣٩٨٧ - سلطة المصان * Marasmius sacchari (S).

نوع من السلعة يركب عيدان المصان يقيفي على نموها بعد ان يعلق السلايمات السفلى، عند انتشاب ليابطها، عشيقه اليه الاصفر الذي يسبب احمرار وجفاف العنقه، ثم اصفرار الصف وذبوله في مظهره الخارجي فطر ابيض اللون، يحمل الجسم، اوسمته جرسية الشكل قطرها نحو ١٥ م. يعيش على العيدان المقطوعة. نمته كثيفة الغشور تقسم من ٥ الى ٢٠ في يتكاثر بانتزاع الاقدام والطراريج للميوعة وبالاكثر من الاسمدة الازوتية التي تنشط النمو اليها والخضري.

١٣٩٨٨ - سلطة الموز * Marasmius seminatius (S).

نوع من السلعة يركب اريمة الموز ويظهر فيطليا ويقيفي على الاوراق في مظهره الخارجي فطر صغير اللونه، ساقه اسطوانية تحمله بيضاء اللون. اوسمته صابنية، ظهرها نحو ١٠ م. ثوبها متراكم الاولوان، مظهره البياض والصفرة والخضرة في يتكاثر في اول هذه بانتزاع الاقدام الميوعة وينتفخ الازوتية باحد المركبات النحاسية المحلولة ٢.٢ فيضاف اليها ١.٥ ٪ من الكلس في وبما ان هذا الفطر لا يقرب الا التباينات الضعيفة في المراتق الرطبة. لذلك يحسن اجتناب الاسكان الرطبة واستعمال الاسمدة للمطوية انحصار الازوتية التي تكتسب الالياف والمواد الخضرية.

١٣٩٨٩ - سلطة حبيكة * Marasmius perniciosis (S). Balai de sorcière du caucayer (F).

نوع من السلعة واسع الانتشار يكثر في البلاد الحارة. يركب بعض النباتات انحصار الكاكاو فيجيش الانسان والتموسي، ولده يصيب الثمار فيطرحها في مظهره الخارجي فطر صغير القد. ساقه اسطوانية تحمله جوياء طويلا نحو ١٥ م. لونها الى الصفرة الزاهية. اوسمته كلسوية قطرها من ٢٠ الى ٢٥ م. لونها الى الجوية في يتكاثر بالتقاع وحرق الاجزاء الميوعة وينتفخ الاجزاء بسائل يورده بعد طلي الجروح بالمستحلب البالي.

١٣٩٩٠ - سلطة

سلف البقرة وقشاة : خرج نابها وهي سالخ . والسلموخ في ذوات الاطفال بمنزلة البزبل في ذوات الاطفال لانها اقصي استنجا . قوله البقرة اول سنة حبل ثم تبع ثم جلع ثم ثني ثم رباح ثم مليس ثم سالخ سنة وسالغ سنتين الى ما زاد . وقشاة اول سنة حلق ثم جلع ثم ثني ثم رباح ثم مليس ثم سالخ . ج ع س ج .

١٣٩٩١ - سلف * Alexan (F). Chestnut (E).

من الثوب او ألوان الخيل وهو الذي غطيت شرقته .

١٣٩٩٢ - سلف * Perdreaux (F).

سلف صغير الحجل ان كان ذكرا اما الانثى قسلة .

١٣٩٩٣ - سلف ، مستغف ، كرتب ، كرتاب * Young partridge (E).

سلف صغير الحجل ان كان ذكرا اما الانثى قسلة .

١٣٩٩٤ - سلفات ، كويجات * Scariflage

حرث سطحي بالسلفة تتبشر به ذرات الثوب ولا تقبل .

١٣٩٩٥ - سلفات ، كويجات * Sulfate (F).

اسم شامل يطلق على مختلف املاح الحامض الكبريتي

١٣٩٩٦ - سلطة التقدير * Pouvoir discrétionnaire (F). Discretionary power (E).

هي السلطة التي لم يبين مسلكها بقائمة قانونية تسيير عليها .

١٣٩٩٧ - سلطة القضاء * Autorité de Justice, Judicature (F). Authority of Justice, Judicature (E).

هي السلطة المنوطة لقضاة بان يقضوا بين الناس فيما يتعلق بالنفس والمال .

١٣٩٩٨ - سلطة قضائية * Pouvoir judiciaire (F).

هي التي استندت اليها ولاية القضاء .

١٣٩٩٩ - سلطانين * Crabe (F).

السلطان والسلطانين والتمسح اسماء شاملة تطلق على عدة حيوانات مائية او قازية من القشريات المشاريات الاصيل .

١٣٩٨٠ - سلطانين الصخر * Pouper (F).

حيوان من القشريات يدهي بوزار ، اعطيه .

١٣٩٨١ - سلطانين نهري * سلطان نهري هو سلطان النهري ، اعطيه .

١٣٩٨٢ - صلح * Cissus (S).

Cissu (F). Sorrel-vine, Wild grape (E). Cissu-planta (D). Cisso (I).

جنس نباتات معمرة حرة حارشة من فصيلة الكرديات . انواعه عديدة منها خلية الساق كبيرة الحجم تمتد نحو سبعة أمتار . ومنها متوسطة وصغيرة كسائر المتراوات . يستخرج من جلودها عند حرها عصارة مشروبة نافعة تروي الغليل في اوراقها يبيضا او لونية الشكل . نصلها قليل القرب جميل اخضر الشاحب ، من الحافة . حولها خلية القرب محببة الاطراف . انزلها صغيرة خضراء اللون . ثمارها عنبية صغيرة اللد في ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٣٩٨٣ - صلح مربع * Cissus quadrangulris (S).

Cisse quadrangulaire, Riz du singe (F). Edible stamed vine (E). Wildweinebaum (D). Vite cisse (I).

نوع من السلح اللحاء المارشح الصمغ . هذه البلاد الحارة . يطول من ٥ الى ١٠ أمتار . ساقه زياء . اوراقه معتقة مربعية الشكل ، نصلها خالي البشرة اقرب الزناد والصلح والبروق في تسنها غزير اللادة من العلم يروي الشطن.

١٣٩٨٤ - سلطة في البطقة ، اعطيه .

١٣٩٨٥ - سلطة ، عفدة دركية ، عفدة

عقازيرية * Scrofule (F). Scrofula (E).

علة مدلية للمظهر الخارجي فيها اعتلال في التوازن الثلاثي وانسياع في الجسم يوجب لانتقال مختلف الجراثيم .

١٣٩٨٦ - سلطة * Marasmius

جنس فطور مخفية من الفاريفقيات . انواعه عديدة تركب نباتات المناطق الحارة انحصار الحربية وبعض النباتات المروية منها الموز والصلح في اشيع انواعه واضعها ما يقع .



سلطان



سلح



سلطة المصان

بالخامس الكبريتي . تركيزه التجاري الموصوف بحوي
٤٠ أو ٥٠ ٪ من التيتانيك الصنف ٥
في مكانة الخشرات علولا بالله بمثل يراوح من ٥٠
ال ٢ ٪

١٤٠٠٢ - سلفات
Emprunt (F). Borrowing (E).
السلفة والاقتراض هو القرض .

١٤٠٠٣ - سلفات
Sulfatage (F).
Sulphating (E).
في المعالجة بالسلفات .

١٤٠٠٤ - سلفات
Sulfatage (F).
معالجة الخمر بالسلفات اي بالخامس الكبريتي .

١٤٠٠٥ - سلفات
Sulfurage (F).
في المعالجة بالسلفور وقد تحقن الآرية الزراعية بسلفور
الكبريت لقتله على الأوسام الجرملية والخشرات .

١٤٠٠٦ - سلفور الكربون ، كبريتور الكربون
Sulfure de carbone (F). Sulphid of carbon (E).
سائل طيار حريف لا لون له يحترق قتال الجراثيم
والخشرات .

١٤٠٠٧ - سلفوسيانور
Sulfocyanure (F).
Sulphocyanate, Sulphocyanide (E).
مادة جرسانية قوية في حريف الأمونيوك تقضي على
الاعشاب والخشرات .

١٤٠٠٨ - سلفونترات الأمونيوك
Sulfonitrate d'ammoniaque

سماد كيماوي آزوتي يحوي ٢٦ ٪ من الآزوت نسباً
١٩٥ ٪ آزوت أمونياكي بلي . الأعطال و ٦٥ ٪ آزوت
تبريكي سريع الانفعال والتشليل .

١٤٠٠٩ - سلفيت
Sulfite (F). Sulphite (E).
ملح مركب من حمض الكبريت وبلادة أخرى .

١٤٠١٠ - سلفيديات
Sulfidates (F).
راجع دقيقات .

١٤٠١١ - سلق
Beta vulgaris (S).
Poirée, Bette, Bietta (F). Swiss-chard beet (E).
Beetkohl, Bette, Gartenmangold (D). Bietta,
Bietcola, Costa (I).

نبات حشوي بقلي زراعي من فصيلة البرسقيات . قريب
للشيه من الشبتان . جلوه ودي ليني أو راته قرصة
التجسس ، كبيرة القدة مستطيلة ، نصلها غليظ النضج ،
مالس البصرة ، شديد الخضار ٥ يتكاثر بالبذر .
انتاش يزوره يتم بشرة أيام وقابلية الانتاش تنمو نحو
٦ سنتوات ٥ يوجد في جميع المواقع ويربغ في الآرية
الدهالية للآنية بالنصر الآزوتي .

١٤٠١٢ - سلق الماء
١٤٠١٣ - سلق بيري
هو جار النهر ، اطبخ .
هو حيفس المناع ، اطبخ .

الثانية من تألفه مع بعض المادتين اخصها الحديد والنحاس
والكلسيوم واليوتاسيوم والصوديوم الخ .

١٣٩٩٥ - سلفات الأمونيوك

Sulfate d'ammoniac (F). Sulphate of ammoniac (E).
سماد كيماوي آزوتي ابيض اللون ، دقيق البرفلة ، يحوي
نحو ٢٠ ٪ من الآزوت الأمونياكي البلي . الأعطال
بسبب تربيته وما يتخللها من تحاميل وانفصالات موضعية
تسببها ظروف التربة ورائفها وسائلا الحكمة ٥ وهو
من أشهر الأسمدة الآزوتية ولقدما استعمالاً ، يصنع
ميدانياً ، لكافة النباتات وجميع الآرية التي لا تقتر
الى الكلس اخصها الحرفية التي يراوح ذاقها بين الدرجة
السابعة والثامنة (راجع دائف) ٥ يحسن استعماله باكراً
قبل حاجة النبات الى خمسة أو ستة أسابيع وذلك ليتسكن
من اجتياح شتى التحاميل والاختلالات الآنية لتربيته
وقاهاه تمثله ٥ ويجرد أيضاً طوره في الآرية بعد ذره
لئلا تسرب به الأمطار أو تجرد مياه الري .

١٣٩٩٦ - سلفات البوتاس
Sulfate de potasse (F). Sulphate of potash (E).

سماد كيماوي يتخلل من كلورير البوتاس بعد معالجه
بالخامس الكبريتي ٥ وهو مسحوق ناعم أصفر اللون
أو ابيض يبري من ٤٦ الى ٥٢ ٪ من البوتاس الصنف
مع ٢٥ ٪ من كلورير البوتاس ٥ وهو سريع اللزبان
بالماء وسريع الانفعال والتشليل يصلح لجميع الآرية
اخصها الثقيرة بالكلس (راجع بوتاس) .

١٣٩٩٧ - سلفات الحديد ، كبريتات الحديد ،
زجاج اخضر

Sulfate de fer, S. ferreux, Vitriol vert, Couperose
verte (F). Sulphate of Iron, Green vitriol (E).

ملح متبلور اخضر اللون طعم الحاميل يلوي في الماء
الساخن . يستعمل في التطهير وفي مكانة بعض الامراض
الفطرية اخصها القلار والفوس و البقان ٥ ويستعمل
أيضاً كمشاب يغطي على اللسان والمخيشان والشاء .

١٣٩٩٨ - سلفات الصودا ، كبريتات الصوديوم
Sulfate de sodium, S. de soude (F). Sulphate of so-
dium, S. of soda (E).

ملح ابيض اللون متبلور من اللزاق طالع الاستعمال
البطري يسهل المنة جرته تختلف باختلاف الحيوان .

١٣٩٩٩ - سلفات الكلسيوم ، كبريتات الكلس
هو الجبس ، اطبخ .

١٤٠٠٠ - سلفات النحاس ، كبريتات
النحاس ، زجاج أزرق

Sulfate de cuivre, Vitriol bleu, Couperose bleue (F).
Copper sulphate, Blue vitriol (E).

ملح متبلور أزرق اللون ، حريف القلم النضج ،
يلوي في الماء . تقلله حافض يحترق ورقة اللزفيل
الزرقاء . يستعمل في مكانة معظم الامراض الفطرية
وفي وقاية الامعدة والمساند والمسابك من حيث الخشرات
وقرضها .

١٤٠٠١ - سلفات النيكوتين
Sulfate de nicotine (F). Sulphate of nicotin (E).

سائل قلوي سام يستخرج من ثمن التبغ بعد معالجه



سلق

١٤٠٢٢ - سَلَكُوتٌ أَرْجَوَانِي *
Carabus violaceus (S). Carabe pourpre (F).

حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م. ثوبها إلى السواد اللامع. ظهورها أسفع المواج. جانبها إلى أنضار الازرقاني. تألف الجنائن وأخلاق والإحراج. مسرحها المويحي يستمر من أواخر الصيف إلى أواسط الشتاء. تفتقر جميع أنواع البرقات الصغرة والحزون والبراق.

١٤٠٢٤ - سَلَكُوتٌ بَهِي *
Carabus splendens (S). Carabe resplendissant (F).

حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م. ثوبها إلى الصفرة اللحية يعلو مواج أخضر. مسرحها يستمر طوال الصيف وأخريف. تألف الجنائن والإحراج تكثر في الإقليم الجبلية. تفتقر الحزون والبراق وتختلف الحشرات الدجوية.

١٤٠٢٥ - سَلَكُوتٌ حَقَنِي *
Carabus arvensis (S). Carabe des champs (F).

حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ١٢ إلى ١٨ م. ثوبها إلى الزرقة العابقة يعلو مواج أسفع. مسرحها المويحي يستمر طوال الخريف والشتاء. تألف الحزون. تفتقر مختلف أنواع البرقات.

١٤٠٢٦ - سَلَكُوتٌ مَدَّ هَب *
Carabus auratus (S). Carabe doré, Jardinier, Sergeant, Vinaigrier (F).

حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م. ثوبها إلى أنضار المذهب يعلو مواج زرجي سلم. زبائنها وأرجلها صافية اللون. تألف الحزون وأخلاق والإحراج. مسرحها يستمر من أوائل الربيع إلى أواسط الخريف. تفتقر الحزون والبراق ويمتلك حشرات الدجوية وأجمل.

١٤٠٢٧ - سَلَكُوتِيَّات *
Carabidae (S). Carabidae, Ground beetles (E). Laufkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة عُمَدَات الإيجنة. أجسامها وأنواعها كثيرة العدد. معظمها كبير القد. أثوابها سوية الألوان العابقة اللامعة. تألفها قوية. قرونها الاستثنائية خفيفة. أرجلها طويلة. أرسافها خاصة النقل || تسرح في الليل وتبيل في النهار تحت الإحراج والاشعاب. جميعها من الحشرات النافعة؛ تفتقر الصغرة أعينها الحزون والبراق والفسقيات.

١٤٠٢٨ - سَلَكِيَّات *
Nematoda (S). Nématodes (F). Nématodes (E).

طبقة الديدان السلكية من شعبة المحيطيات تشمل العديد من الفصائل والأجناس والأنواع منها الصفر والمذابح وغيرها.

١٤٠٢٩ - سَلَم *
السلم مجموعة كواكب متعاقبة أسفل من المانة من بينها.

١٤٠٣٠ - سَلَم * ، سَلَم *
Scleria (S). Sclaire (F). Scleria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات سدديات الأبريل وفصيلة السليبات. أنواعه المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في

١٤٠١٤ - سَلَقِيَّاتٌ مُصَلِّعَةٌ * ، سَلَقِيَّاتٌ ، لَبْدَان *
Beta cicla, B. vulgaris foliosa (S). Beta à cardes, Beta-spinard (F). Leaf-beet, Egyptian chard beet (E). Agyptischer beta, Ag. gartenmangel (D). Bietola foglia (I).

حشر من السلق البقل الزراعي يتميز بكبر أوقافه وفلاحة ضلوعها وسماكة نصليها المائل البشرة الشفيرة. الحشرة || يحد في جميع الأتربة البدائية المعدلة الانساج الدنية بالمعصر الآزوي.

١٤٠١٥ - سَلَكَان *
Loup (F). Wolf (E).

هو الثوب والآث سلق. ج سلق.

١٤٠١٦ - سَلَقِيَّة *
Pardreau (F). Young partridge (E). سَلَك *
فرخ الحبليل الذكر، والآث سلكة.

١٤٠١٧ - سَلَك *
فرخ الحبليل الذكر، والآث سلكة.

١٤٠١٨ - سَلَكٌ حَدِيدِي *
Fil de fer (F). Iron wire (E).

الاسلاك الحديدية أنواع منها لملاء تستعمل في تسليد الشجر وغيرها ونسباً شائعة تستعمل في إقامة الحواجز منباً من الصدي.

١٤٠١٩ - سَلَكَان ، دَجَاجَةُ الْحَرَج *
Bonasa (S). Gelinotte (F). Hazelhen, Hazelgrouse (E). Hazelwild (D).

جنس طير من عمارة الضرسيات. وفصيلة الطيوريات موطنه يمتد من شمال البلاد الآسيوية إلى أروبه ونيبال أفريقية الشمالية. يتميز بفقرات الصغيرة وبصر مقادير. ثوبه إلى الخمرية لونه زرقه صباه وبياض وعلو وسواد. طوله يراوح من ٣٥ إلى ٤٥ سم. الآث أصفر كذاً من الذكر. قوة البرام والجوب والآثار من اختلاف أنواعها. يعيش ذكراً وأنثى. يمتد في الأرض يرقب الفصوص بين الأدغال البنية أو بين الخشار وفي تخاليف الصخور. أثناء تقص من ٨ إلى ١٢ بيضة تحضنها وبعدها || له نومان السلكان الشائع وسلكان للشرق.

١٤٠٢٠ - سَلَكَانٌ لَشَرَقِي *
Bonasa severtzovi (S). Gelinotte d'Orient, G. des steppes (F).

طائر من السلكان طوله نحو ٣٥ سم. ثوبه متراكب الألوان والرققة. موطنه شمال البلاد الآسيوية. يألف الإحراج والأدغال.

١٤٠٢١ - سَلَكَانٌ شَائِع *
Bonasa sylvestris, B. betulina (S). Gelinotte des bois, Poule des bois, P. des coedriers (F).

طائر من السلكان طوله نحو ٤٥ سم. ثوبه متراكب الألوان والرققة. موطنه يشمل نصف الأقطار الأوروبية ونيبال أفريقية الشمالية. يألف الإحراج الكثيفة الظليلة.

١٤٠٢٢ - سَلَكُوت *
Carabus (S). Carabe (F). Carabus, Carabid (E).

جنس حشرات دجوية مفترسة نافعة من فصيلة السلكوتيات. أنواعه عديدة منتشرة في جميع الأقاليم الحارة والمعتدلة. أجسامها كبيرة القد. أثوابها عابقة الألوان السوية. من ميزاتها الخاصة أنها إذا ذهرت من شه قلقت من شربها يسائل لأصابع يكثر فيه الحامض السي. رقاتها مفترسة. أجسامها مبطنة تستنق عند الجرافة || أشهر أنواعها ما يلي.



سَلَق مُصَلِّع



سَلَكَان شَائِع



سَلَكُوت أَرْجَوَانِي



سَلَكُوت بَهِي



سَلَكُوت حَقَنِي



سَلَكُوت مَذَّ هَب

جميع بحار العالم . جميعها مقيمة قوتياً بالرخويات والكرويات الصغيرة || أجسامها متباينة الحجم ، يكثر فيها المسفر . أصدافها سلبية ، لامعة ، مرصعة ، محزونة ومعددة ، تحمدها يبلو كالقوى المستعير .

١٤٠٣١ - سلم ، سلم *Acacia flava* (S). *Mimosa blond*, *Acacia blond* (F).

نوع من السبط وهو شجرة من الغطاء مبررة الشوك الحاد . تكثر في البادية . ورقها يمس القتر ويصلح للباغة . الواحدة سلمة .

١٤٠٣٢ - سلم التفرجة ، عكس التفرجة

Dénitrification
تحول يحصل في الاربة الرطبة بتأثير ميكروبات خاصة تحول النتريتات الى نيتريت فامونيك فازوت . وهو بذلك يكون عكس التفرجة وفيه ضرر كبير لان النتريتات اسهل والقرب تميل وامصاصاً من النتريت .

١٤٠٣٣ - سلمون ، سلمون ، سلمك سلمكان *Salmo* (S). *Saumon* (F). *Salmon* (E).

جنس اسماك بحرية - نهريّة مقيمة لاحية من فصيلة السلمونيات . انواعه نحو ٥٠ جميعها كبيرة القند تيلج كامل نمواً بمر ست سنوات حيث يراوح طولها ، بالنسبة الى انواعها ، من ٥٠ الى ٢٠٠ سم || والسلمون من الاسماك التي تعيش وتتكاثر في انحاء البنية وقد تعيش في المياه الملوحة دون ان تتكاثر لانها لا تسر في البحر . اما الايدى في المياه العذبة فتكون صغيرة القند متوسطة الحجم . وهي يحاطها الطبيعة ترسل الى المياه العذبة في التشاير وتسرأ في الكوايت ثم تعود الى البحر بعد لقف سرتها وذلك في اواخر شباط . اما صغبرها فيقيم في الله الملب ردياً يبلغ الحولين فيسيل اذ ذاك الى البحر ويعيش عيشة جنسه ومعادته الفطرية في التجول والتمسرة || اشهر انواعها ما يتبع .

١٤٠٣٤ - سلمون البحريرات *Salmo lacustris* (S). *Saumon des lacs* (F).

نوع من السلمون الايد المتوسط الصنف واللذ . يعيش في المياه العذبة . يبلغ كامل نموه بمر ٥ سنوات . طول يراوح من ٧٠ الى ١٠٠ سم .

١٤٠٣٥ - سلمون البنايع *Salmo fontinalis* (S). *Saumon de fontaine* (F).

نوع من السلمون الايد المتوسط الصنف واللذ . يعيش في مياه البنايع العذبة الباردة . طول يراوح من ٥٠ الى ٨٠ سم . يبلغ كامل نموه بمر خمس سنوات .

١٤٠٣٦ - سلمون صلا ، سلمون مبدول ، سلمون مبروف *Salmo salar* (S).

Salmon commun (F). *Common salmon* (E).
نوع من السلمون الرجل الكبير القند طول ، عند اكمال نموه ، يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . قوته متراكب الاولان . ظهوره اردوازي ويملو موج ازرق . جانبها الى الزبد اللبسية . يسلط الى الحرة || اثناء تسرأ بظرف ثمانية ايام من ٢٠ الى ٢٦ لقف سرته تنقف بعد اربعة اسابيع ثم تتصور وتتلخ وتبلغ كامل نموها النسي بمر ست سنوات .

١٤٠٣٧ - سلمون كليفوريه ، سلمون كينات *Salmo quinnat* (S). *Saumon de California*, *Quinnat* (F).
نوع من السلمون الرجل الجيد الصنف يرغب في مياه المناطق الباردة . طول يراوح من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . قوته متراكب الاولان تقف في ظهور اثره وتنف في بطن الحرة .

١٤٠٣٨ - سلمونيات *Salmonidae* (S). *Salmonidae* (F). *Salmonidae* (E).

فصيلة اسماك من رتبة مفتوحة الثنائيات فيها السلمون والدرنة والحدل الخ .

١٤٠٣٩ - سلمى *Stellaria* (S). *Stellaira* (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية وبحولة وبعمرة من فصيلة القرنفليات . انواعها المبررة عديدة اصنافها مطر اقال البلاد المعتدلة الحارة || سقمها خلية الحاد ، فراه . اوراقها لانظامية الازتكاز ، منها المتصلة والمتعاقبة ، ومنها الممتدة واللاحة والقلبية المتصلب والسانية والرحية . ازهارها فردية او حثولية التجميع . اشهر انواعها :

S. Media (S). سلمى وسطى ، حشفة القززال

S. pubescens (S). سلمى زهاب ، حشفة القززال المرطبة

١٤٠٤٠ - سلميات *Scalaridae* (S). *Scalaritides* (F). *Scalaritides* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الاويل اماميات المتحركة . اجناسها وانواعها للمبررة قليلة العدد متشرة في جميع بحار العالم . جميعها مقيمة . ملجها الحماي ، جماعي ، جماعيات قليلة العدد || اصدافها متباينة الاجسام ، محزونة ، يكثر فيها الشكل المزدني || اعرف اجناسها السلم .

١٤٠٤١ - سلونوغرافية *Sclénographie* (F). *Selenography* (E).

وصف القمر ورمه
١٤٠٤٢ - سلوب *Longiligne* (F). *Longiline* (E).

نمت تعريفه يوصف به الطول في الحيوانات الداجنة .

١٤٠٤٣ - سلوت *Scalotus* (S). *Scalote* (F). *Scalotus* (E).

جنس حيوانات زحافة من الغطاء وفصيلة السقورويات . انواعها المعروفة عديدة . اصنافها غسقة تمتد من الرقيقة الاستوائية الى الشرقية وبجزيرة مدفكر || اجسامها صغيرة ، دقيقة ، حادة الاعتناق ، رؤوسها قصيرة . قوائمها شديدة الصبر وين الاطراف من لا قوائم له . انواعها سوية الاولان يكثر فيها الكتني الاسمر الاسف || قوتها اللباب واغلام ولديان .

١٤٠٤٤ - سلور *Charas* (F). *Silurus*, *Shedfish* (E).
جنس اسماك نهريّة من فصيلة السلورويات . انواعه نحو ١٢ معظمها من اسماك مياه البلاد الحارة . جميعها مخلقة الرأس ، مستطيلة الشكل ، عادية الخرافات || اشهر انواعه سلور الماسي والبربور والبر والياش والشلبة والقرموط .



سلم



سلمون صلا



سلوت



سلور

السرة تنقل على مكن الحرشيات ويدأها أعصها دودة ورق القطن والودعة للقارضة .

١٤٠٥٥ - سكونة الطلياريات *

Inostemma boadi (S).

حشرة صغيرة من السلويات غليظة الجسم ، مستطيلة الأفراس . طولها يراوح من ١ الى ٢ م . تنقل على مكن الطلياريات وتقتني عليه .

١٤٠٥٦ - سكونة القمامية *

Microphanurus semistrictus (S).

حشرة صغيرة من السلويات غليظة الجثة القصيرة طولها يراوح من ١ الى ٢ م . تنقل على مكن جميع انواع القمامية .

١٤٠٥٧ - سكونيات *

Scallionidae (S). *Scallionidae* (E).

فصيلة حشرات نائمة من رتبة فشاتيات الاجنحة المنصورة . اجنحتها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، غليظة الرأس والبطن ، الزوايا الى السرة العادة الموج || تنقل هي ورفقاتها على مكن الثناكب وحشرشات الاجنحة ويمل بعض الديدان واليرقات .

١٤٠٥٨ - سكونى هي الصرد نوع من البتلون ، اطلها .

Amnion, Poche d'eau (F).

Amnion, Bag of water (E).

السل الكيس الذي يكثر فيه الولد حين يخرج من الرحم ، وهو الغشاء الورقي الداخلي الذي يلف المجرى الجنين .

Lyra (F). *Lyra* (E).

١٤٠٦٠ - سيلاني

السيلاني كوكبة نجوم شمالية الخيعة مشهورة باسم قيثارة ، اطلها .

Gymnantha (F).

١٤٠٦١ - سكيب *

نمت تعريفي يطلق على كل نبات زهرته تتكون من الاعضاء التناسلية دون سواها ، اي دون فصل وبيلات ...

Romeria (S).

١٤٠٦٢ - سكيح ، رميركة

Rosmaria (F). *Rosmaria* (E).

جنس نباتات شبيهة حولية بزية من فصيلة اشغاشيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصلاها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سقها فزاه ترتفع من ٢٥ الى ٤٥ م . اوراقها مثقلات ، مركبة ، ريشية التفريش . زواياها طرفية ، فردية ، متعددة الاجسام او كثيفة ، قززية اللون او بنفسجية . الثمرها ...

R. orientalis (S).

السلح الشرقي

R. hydrida (S).

السلح القلبي

١٤٠٦٣ - سكينخة هي القرقة السيلية . اطلها .

Huile de noix de muscade (F).

Oil of nutmeg tree (E).

دعن جوز اللب .

Scyllidae (S).

١٤٠٦٥ - سيلدييات *

Scyllidae (F). *Scyllidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من السلفنقيات القرشيات . اجنحتها وانواعها المعروفة قليلة العدد مشتركة في معظم بحار العالم

Clariss oronthe (S).

١٤٠٤٥ - سلور العامي

Clariss de l'Oronthe (F).

ويسمى السك الاسود . نوع من السلور يكثر في العامي . طولها نحو ٥٠ سم . ثوبه الى السرة الخضراء . لحمه عادي الصنف ، يذلل اللذان .

Silure commun (F).

١٤٠٤٦ - سلور الفرات

Common silurus (E).

هو الجري ، اطلها .

Clariss du Nil

١٤٠٤٧ - سلور النيل

هو القرموط نوع من السلور يكثر في النيل .

١٤٠٤٨ - سلور جتيس *

Silondie du Gange (F).

سمكة ثورية من مفتوحات الخانة وفصيلة السلوريات . اصلاها نهر الجنس اي الفنج || جسمها ايليجي الشكل ، كبير القد ، متدل التليط ، طولها نحو ٢٠٠ سم . راسها صغير الحجم ، غريبي الشكل . عظمها كبير القصد . منهاها كيرتان ، ماصتان . زعنفتها الظهرية الاولى متدلة الجسم اما الثانية فشدودة الصفر . وزعنفتها الثانية لينة . ثوبها الى الوردية السمر الغضبية الموج || لحمها كامن الصنف ، مأكول .

Siluridae (S).

١٤٠٤٩ - سلوريات

Siluridae (F). *Siluridae, Catfishes* (E).

فصيلة الجري والسلور وهي من الاسماك العذبة الحراشف .

١٤٠٥٠ - سطورس ، تاسط ، تيلفس

Nepenthes (S). *Népenthe, Népenthes* (F). *Nepenthes, Pitcher plant* (E). *Kannenstrauch* (D). *Nepente* *Planta da broche* (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة السلويات . انواعها نحو ٣٠ منها البلاد الحارة . جميعها عارشة بزية وريشية . اوراقها متضاربة سانية التصل المستطيل الذي ينتهي بمائل يطول قدره ثم يتحول ويصغر عند طوله فيصبح كالجراب المجاسي يطول غطاءه ويطبق ويلتصق عند الالتصاف يمتنع فيه رحيق سكري حامز لرج تفرزه غد غاصة لا يجذب الحشرات فلذا ما دخلت الحشرة لا تفرق الرحيق ازلفت في السائل وانطبق عليها النطاء فتفرق وتمتل وتصل الى غطاء يمتصه النبات || ازهراره سليل او حثكول التجميع . كذاها صغيرة القد ، ثنائية المسكن || يقال ان منافعها الطبية عديدة .

Nepenthesaceae (S).

١٤٠٥١ - سطورسيات

Nepenthacae (F). *Nepenthacae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات اللفلتين تشمل جنس السلور دون سواه .

La Lévyier, Chiens de

١٤٠٥٢ - سطوريان

chasse (F). *Canes Venatici* (E).

السطريان كوكبة نجوم شمالية الملق مركها بالقرب من الدب الاكبر . نجمها عديدة ابرزها من المرتبة الثالثة . وهي تشتمل على سدين لوليين قريبا الشبه بكلي سيد .

Silur

١٤٠٥٣ - سطور

هو سلويات القليل يستعمل مطهراً للاسماك .

١٤٠٥٤ - سكونة الحرشيات *

Telenomus bombycis (S).

حشرة صغيرة من السلويات طولها مليمتر واحد لها الى



سلور جتيس



سلور



سلوة الحرشيات



سلوة الطلياريات



سلوة القمامية

أغصبا بحار البلاد المعتدلة الحرارة || أجسامها وشمة الشكل تتميز بأقراصها السفلية الإزهار وبسطة زعانفها البالية || أشهر أنواعها الدولة .



سليش ثومس

١٤٠٦٦ - سليش ثومس * ، حشيشة التوتيريل
Scleranthus annuus (S). Scleranthus, Gravelle (F).
Annual knawel (E). Sommerknäuel, Wilder knäuel (D).
Scleranthus, Centigran (I).

حشيشة برية حولية من فصيلة التوتيريليات . ساقها ليفية منتصب . أوراقها لائفة متعاقبة حطية خمرية . أزهارها خشوية ، صغيرة القدة ، حادة الوجع . أزهارها نوري التجميع أبلي وامي الإزهار .

١٤٠٦٧ - سليش وسموم *
Sclerothum

جنس فلور مجهرية من البنيات . مركب الأعضاء النباتية الداعية البياض وله صمغ الأوراق في طرف خاصة . يتبين صمغه الأبيض اللون ، الكسوري الشكل ، التماسك الأطراف والتجميع || أنواره قليلة أفرها الثلاثة التالية .

١٤٠٦٨ - سليش وسموم القزوع *
Sclerothum costantini (S).

فلور مجهرية مركب المنطة والصمغ لبيء إلى تمها . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستطيلة الداعية الشكل والتجميع ، سواء اللون ، تركب النصف والاحداث وتفرح البشرة واللصج || أفرها زبدية لا تصبب للمكانسة .

١٤٠٦٩ - سليش وسموم التوتيريليات *
Sclerothum capivorum

فلور مجهرية مركب بعض البنيات الزنقية أغصبا اليس والثوم || مظهره الخارجي نواس غلي أبيض اللون تلمو بثور سود مستديرة صغيرة . مركب القزوع وقشور الاسفل الخارجية دون أن يلفها .

١٤٠٧٠ - سليش وسموم التوتيريليات *
Sclerothum rhizodes

فلور مجهرية مركب بعض البنيات الكلالية فزوخا . مظهره الخارجي بثور مستديرة سمراء اللون ، قطرها نحو ٢ مم . تركب السورق والأوراق ضيق كأنها مائلة لها . أفرها زبدية وله تصبج جسيمة ليا لو م الرمزي لاه يطلع بالانتاج الضمري || يكاثع بحد الكلا ويتغير أو تفسخ الرمزي ياحد الفواظير للقلامة المتكررة حل الكبريت والنحاس .

١٤٠٧١ - سليش *
Huile (F). Oil (E).

هو الزيت وكيل هو كل دهن صبر من حب .

١٤٠٧٢ - سليش *
Thielaviopsis

جنس فلور مجهرية من البنيات وفصيلة الفطريات . أعضائه سطحية ، تكاته يضيء تحسن ثمان بويئات مستطيلة وسيدة الخلية ، شفافة || أنواره الخفيفة قليلة أفرها سلبية بازيكولا .

١٤٠٧٣ - سليش بازيكولا *
Thielaviopsis basicola (S).

فلور مجهرية يصيب عدة نباتات أعصبا الخبج والبقول والسم والبيغرية ويتغير حرم والجماض والخمس والفساديا والبنفسج || يحتفل حل البنيات النخيلة والبغمية في

١٤٠٧٤ - سليش *
Bilum (S).

Bilum, Eucole (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية أو صمرة من فصيلة السرمقيات . أنواره المبرقة قليلة العدد منها بعض مناطق البلاد المحطة الحرارة من العالم القديم || ساقها قرماء ، خشوية عند الإصواع الصمرة . أوراقها متعاقبة ، شبه قلبية التماسك ، حافة الخصار . أزهارها صغيرة ، يضاء اللون لو وردية أو أرجوانية || تنموها ربيعي .

١٤٠٧٥ - سليش شاكيل *
Emex spinosus (S).

Emex spinosus (F).

نبات شجري بري حولي من فصيلة السرمقيات . يتب طوعا في بعض مصاب وبيبال للقلب البشري من لبنان .

١٤٠٧٦ - سليش *
Caractères intrinsèque (F).

Intrinsic character (E).

هي الصفة الطبيعية للميزة . ج. سلاق .

١٤٠٧٧ - سليش *
Pygope

جنس عظام من فصيلة البليات . أنواره قليلة العدد . أجسامها دقيقة مستطيلة . أنوارها إلى السرة البهراء تلمو رقة سوداء نظامية تكثفها من الففن إلى طين القلب . رؤوسها مغلفة غليظة الحرافش || ساقها البلاد الحارة تعيش بين الحجارة وتحما . قويا الحشرات على اختلاف أنواعها . ثلث الزرعة .

١٤٠٧٨ - سليش وسموم *
Cellulose

هو القسم الخشبي الصلب في النبات . وهو من المركبات الثلاثية .

١٤٠٧٩ - سليش *
Pygopodidae (S).

Pygopodidae (F). Pygopodidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة البليات . أجسامها وأنوارها صلبة . أجسامها دقيقة مستطيلة . حرافشها فلسية متراكبة . أرجلها ثنائية ، زخفية الشكل ، صغيرة رؤوسها غليظة مغلفة . أذناها ملحمة . قويا الحشرات والحوام . أشهر أجناسها البلية .

١٤٠٨٠ - سليش *
Sublimé corrosif (F).

Corrosive sublimate (E).

زئبق مسد أكال يرف أيضاً بكلورودور الزئبق .

١٤٠٨١ - سليش *
Corrosive sublimate (E).

هو المليك ، الطبخ .

١٤٠٨٢ - سليش وسموم *
Selenium (F).

Selenium (E).

معدن جانده وقه الاتي ٣٤ ، ثقله الذري ٧٨ ، يصهر في ٢١٧ °م . وهو يثال الكبريت وإصاليه الكبريتالية تزداد مع القسوة الذي يكسبه .

١٤٠٨٣ - سم *
Venin, Poison (F).

Venom, Poison (E).

هو السائل القوي الذي تفرزه بعض الفرواسف كالانعامي . وهو كل مادة سامة منها كان مصدرها .



سليش وسموم القزوع



سليش بازيكولا



سليش

المسكن || اوراقه وزوايه وصارعة سقة تستعمل في عدة صناعات كالدهانة والصبانة والبلاد || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

١٤١١٢ - سَمَادُ الدِّبَاغِين * ، تَمْتَم

Rhus cortaria (S). Sumac des corroyeurs, Roure des corroyeurs, Corroyère, Vinaigrier (F). Sumach, Tanner's sumach (E). Esstgbaum, Gerbersumach (D). Seimmaco, Scottano romano (I).

هو السباق المعروف للميلول في البلاد البنيانية السورية . فبجيرة عابلة تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم . فروعها زاهية البعد اوراقها مركبة تمد من ١ الى ١٥ ورقة نصليا باحت الخضار خلي الصفة السفل . ازهارها عثكولي كفيف التجميع يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ازهارها خضراء اللون . ثمارها بلسنية الشكل ، جردية اللون ، خلية البشرة . يزورها شديدة الصلابة معقولة || اوراقها دباغية . سوقها ثماره من التوابل الحامضة المانصة المشهورة .

١٤١١٣ - سَمَادُ الصَّبَاغِين ، عَرَبَرَب

Rhus cotinus (S). Sumac des teinturiers, Fustet, Arbres à perruque (F). Smoke tree, Wig tree, Venetian sumache (E). Echter perückenstrauch, Perückenstrauch (D). Sommacco à parrucca, Scutano, Rubione (I) .

بجيرة عابلة تملو من ٧٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها مركبة . ورقاتها سائفة ذلقة . نصليا حايق الخضار ، خلي الصفة السفل . ازهارها تاجي الازتكاز هربي الشكل . اوراقها دباغية وصباغية ، غصبا اصفر اللون .

١٤١١٤ - سَمَادُ الطَّلَاء * ، عَرَبَرَب

Rhus vernix (S). Sumac vernis, Bois chendelle (F). Lac sumach (E). Lackbaum, Firnisumach (D). Sommacco d'India (I).

شجرة عابلة تملو نحو ٦ امتار . ساقها مائلة البعد . اوراقها مركبة تمد من ٥ الى ٢١ ورقة نصليا مسنن الزام الاعبر ينمو حايق الخضار اللامع ثم ينصرف الى الجلود . ويتنفي في اوائل الخريف باحمر البرتقالية || ازهارها ابطي . ازهارها صفراء اللون ، خلية البشرة . ثمارها بلسنية تطرها نحو ٤ سم . يزورها مضلة . ثمارها واوراقها وصارعة قلوية للمادة جساما اروي || عصارها خمرية ، تستخرج باخر ، يصنع منها الكهني الفاسر الصنت .

١٤١١٥ - سَمَادُ الْبَلَك * ، رُحُسُ الصَّنَائِفِي

Rhus verniciflua (S).

Sumac à laque (F). شجرة عابلة تملو نحو ١٠ امتار . ساقها مضلة البعد . اوراقها مركبة تمد من ٧ الى ١٣ ورقة نصليا بطول نحو ١٦ سم . ازهارها هربي الشكل عثكولي التجميع . ازهارها الى الصفار الباهت || يستخرج من ساقها باخر حصاره صمغية لزجة يصنع منها الك الياباني الفاخر الصنت .

١٤١١٦ - سَمَادُ جُمَاعِي

Rhus toxicodendron (S). Sumac à laque (F).

شجرة عابلة تملو نحو ٥ امتار . اوراقها مركبة ثلاثية . نصليا قلبي الشكل ، ذوب النعصة ، اذنب النعصة السفل . ازهارها عثكولي التجميع ، محوري الازتكاز . ازهارها خضراء اللون . ثمارها مجهم وشكل الحصى ، ملها بالبشرة ، صفراء اللون || ثمارها جمالية تحوي بعض المواد القلوية الفتالة .

والانتاج الزايف الاثام || لذلك فالاممجة الكجوية حديثة لانها وضعت ، ولا تزال توضع وترق مع البلم والتقنية سدا لحاجة النبات وظروف التربة والاعلام || تقسم الاممجة الكجوية الى ثلاثة عناصر رئيسية : الازوت ومغنيس الفسفور والبوتاس . ثم تلبها العناصر الثانوية كالكلور والمغنيزيوم والكريت واليورق ، الخ .

١٤١١٧ - سَمَادُ مُرَكَّب

Engrais composé (F).

Compound fertilizer (E).

هو كل سماد سوي كامل او بعض العناصر الرئيسية وقد شاع استعمال الاممجة للصناعة المركبة نظرا لما تحققه من اقتصاد ملموس وين نتائج طيبة .

١٤١١٨ - سَمَادُ مُعَدَّنِي

Engrais minéral (F).

Mineral fertilizer (E).

هو كل سماد مصدره معادن الارض يستخرج ويستخلص في سبيل التربة وراثت .

١٤١١٩ - سَمَادُ وَسِيط

Engrais catalytique (F).

Catalytic fertilizer (E).

هو السباد الكجوي المنصري الذي اذا اخيف الى التربة نطت بمفعلة الخيمية نباتاتها المزودة دين ان تلتقي منه || الاممجة الوسيطة مدينة جيمها من العناصر الثانوية والثالثية . اشهرها الكريت والمغنيزا واليورق المنيزا .

١٤١٢٠ - سَمَكَر

هو السباد المحضر هو الاسم العربي ، اطليه .

١٤١٢١ - سَمَكَرُ شَالِك

هو الاسم الكولاني ، اطليه .

١٤١٢٢ - سَمَكَرَة * ، قَوْدَرِيح ، فِجَلُ الْجِمَالِ

قُسْطُ بَرِّي ، سَيْمُتْرِيُون

Sisymbrium (S). Stymbrion (F). Hedge mustard (E).

Wegersuke (D). Sesambrio, Rapino (I).

جنس نباتات حشوية برية سوية او مصرة من فصيلة الصليبيات . اوراقها متعاقبة مفرفة . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون || انواعها مدينة اشهرها البيرة اخضرية اوراقها وازهارها طيبة نقيها فيه بحة الصوت .

١٤١٢٣ - سَمَكَرِي *

Chauliolumus streperus (S).

Canard chipecu, Chauliolumus, Chipecu bryan, Ridenne (F). Gadwall (E).

طائر مائي وحيد الجنس والذراع من فصيلة الطيائ . طوله نحو ٥٥ سم . ثوبه ابيض اللون . متقال اسود . سقاء الى الحرة البرتقالية . الانثى اصفر من الذكر . صدرها الى الصهبة المنقشة بالاسود || وهو من القواطع محبوب الشرق واورو . يألف البجيرات والناقم . قوته الاشباح المتقنية والغمرات والديان والاسماك || يش منه في المنافع بين الاسل . اثنتا تصع من ٨ الى ٩ فيضات تحضها وسحا .

١٤١٢٤ - سَمَادُ جَوَقِي *

Nappe phréatique (F).

Water ground (E).

هو جملة المياه الجوفية الخزونة في الارض .

١٤١٢٥ - سَمَادِي

Rhus (S). Sumac (F).

جنس الاجار وبجيرات برية وزراعية من فصيلة الراتنجيات . انواعها مدينة . اوراقها متعاقبة ، كاملة التصل او مركبة ، ورية ، ثلاثية الورقيات او ريشية . ازهارها خماسية التركيب ، وصحية المبيض منها الحشوية والضرية وثلاثية



سمارة



سماري



سماد الدباغين



سماد الطلاء



سماد الك

١٤١١٧ - سَمَاق حَرْتَه ، عُرْبُ

Rhus pentaphylla, *R. albid* (S). *Sumac* à 5 folioles (F). Hawthorn like sumach (E). Spitzdorn (D). Sootano alba (I).

شجرة مروة تملون ٤ الى ٧ اثمار. ساقها وورودها شاذكة. اوراقها مركبة ثلاثية او خمسية الورقيات. نصلها مالى البشرة ، مستطيل الشكل ، ثلاثي القسطن. ثمارها حلوة الطعم مأكولة || اوراقها دوائية وصيغية لكنها متوسطة الصنف .

١٤١١٨ - سَمَاق عَطْرِى

Rhus aromatica (S). *Sumac aromatique* (F). شجرة عابلة تملن من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية. نصلها مسن الخلفه حطري الرائحة عند التفرع. ازهارها متشكلى مستطيل يسبق الازهار. ازهارها صفراء اللون || زرع لثزين ترخر من اذار الى نيسان .

١٤١١٩ - سَمَاق كَاذِب ، حَرْبُ

Rhus succedanea (S). *Sumac succédané*, *S. blanda* (F). Tallow sumach, Japanese wax tree (E). Japanischer sumach, Wachsbäum (D). Sommisco da sego (I).

يكثر في الشرق الاقصى شجرة تملن نحو ٦ اثمار. يستخرج من ساقها بالخر مصادة صمغ لزجة يصنع منها اللك الصيني اللذي الذي يعتبر من الاصناف الوسطى .

١٤١٢٠ - سَمَاقِي

Granit, *Porphyra* (F). *Granit*, *Porphyry* (E). حجر السباق وهو حجر صواني قاس اسود اللون او احمر او اخضر او موشح بالاحمر والاصفر والجلوي.

١٤١٢١ - سَمَاك

السماك منزل من منازل القمر الشامية ، ويدعى السماك الاثزل لان ليس امامه شيء في حين ان السماك الرابع الذي لا يثزل القمر ، يتبعه كوكب يقال له راية السماك . وبعض العرب يسمون من السماكين ساقا الاسد || ولب السماك يدعى بطن الحوت .

١٤١٢٢ - سَمَاك اَهْزَلْ ، سَمْبَلَه

Epi, *Spica* (F). *Spica* (E). السماك الاثزل او السنبلة نجم لير من برج العقده . مركزه بالقرب من اليد اذاء السماك الرابع . يبعد عن الارض نحو ٢٠٠ سنة ضوئية .

١٤١٢٣ - سَمَاك رَامِج

Arcture, *Arcturus* (F). *Arctures* (E). السماك الرابع نجم ثير احمر من كوكبة العقده . مركزه بين فطلي البقار اي السوء . ويدعى حارس البقار لانه لا يغيب حتى تحت اشفة الشمس . يبعد عن الارض نحو ٤٠ سنة ضوئية .

١٤١٢٤ - سَمَكَاك

دود في الماء الثلج .

١٤١٢٥ - سَمَاكَة *

Psammodius (S). *Psammodie* (F). جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفضيلة الساليات . ازهارها المروقة تناثر الثة . يصفى من متحمرات الاراضي الثالثة والبيض الآخر ماص نشر في جميع بحار العالم || اصداؤها شبه عظيمة الشكل ،

صغيرة القد . اجسامها صغيرة ، ثنائية الخنايب الطليقة المستطيلة || تعيش في الاسماك والرمال القليلة النور .

١٤١٢٦ - سَمَاقِيَّات

Psammodius (S). *Psammodie* (F). فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم . اجسامها وازهارها المروقة عظيمة عظمتها من متحمرات الاراضي الثالثة || اجسامها صغيرة القد او متوسطه . مستطيلة الخنايب . اصداؤها شبه عظيمة الشكل ، جميلة الالوان المتراكبة الزاهية || اعرف اجناسها واشهرها السالك والدماة .

١٤١٢٧ - سَمَكَم

Fourmi rouge (F). *Reddish ant* (E). السام وتسمى الساسم هي النملة الحمراء .

١٤١٢٨ - سَمَاكَة ، مَخْطَف ، حَمِص

Cypselus (S). *Martinet* (F). *Swift* (E). جنس طير من فصيلة الساليات . ازهاره المروقة ٢٠ جمها من التواطيل ذات الحنك والمخفي . اجسامها مستطيلة . اجنتها عارقة الطول . اذنانها فارقة . ارجلها قصيرة مدرولة . متاهرها صغيرة . اشداؤها واسعة || وهي من الطيور النافذة التي تقضي على الحباب والحلم والبيض وبعض الحشرات الاخرى . تتميز بجريتها الشديدة الكاتكة تحت السليا . طيراتها قائل السرعة . تبنى اوكارها في اجاب الصخور وتحت سطوح البيوت . انها تحسن رسوخا من يفتحن في ثلاث بضيض زهاء اسبوعين . اشهر ازوارها ما يلي .

١٤١٢٩ - سَمَاكَة الصُرُود ، حُرُور

Cypselus melba, *Micropus melba* (S). *Martinet alpin*, *M. à ventre blanc* (F). *Alpine martin* (E). من اكبر انواع السامة . تألف البلاد الجبلية ، يكثر ويوجد في الشرق الاذني وبلطستن . طولها نحو ٢٣ سم . ثوبها الى السواد الضحى . بطنها ابيض ، صدورها موشح بنم اسمر .

١٤١٣٠ - سَمَاكَة رَمْدَاك * ، مَخْطَف اَسْمَر

Cypselus murinus, *Micropus murinus* (S). *Martinet murin* (F). *Little grey* (E). سامة متوسطة القد طولها نحو ١٧ سم . ثوبها الى الرمقة السوداء . عنقها ابيض موشح سوسل البحر المتوسط والبرقية الشرقية والجزيرة .

١٤١٣١ - سَمَاكَة سَوْدَاك * ، حُرُوق

Cypselus apus, *Micropus apus* (S). *Martinet noir*, *M. de murailles* (F). *Black martin* (E). سامة كبيرة القد طولها نحو ٢٢ سم . ثوبها الى السواد الاسفنج يطوى موشح اخضر . زورها ابيض الضحل . تألف جميع بلاد سوسل البحر المتوسط وقد تتوغل في الداخل .

١٤١٣٢ - سَمَاقِيَّات

Cypselidae (S). *Cypselidés*, *Apodidés* (F). *Cypselidae* (E). فصيلة الطيور الساسم من الجوامع اللثريوات المناقير . اجناسها وازهارها مدنية . جمها من الطيور الجاهية التناقل . الصغيرة القد ، المستطيلة الجناح ، السريعة الحركة والخفيفة الطيران || عظمتها من القواطع . قويا الحشرات والحلم .

١٤١٣٣ - سَمَان

Pomacanthus symma (F). سمكة بحرية تسمى حائل سمان ، اطفاها .



سَمَاكَة



سَمَاكَة الصُرُود



سَمَاكَة رَمْدَاك



سَمَاكَة سَوْدَاك

١٤١٤٧ - **سَمْعَاق** (F). *Periosteum* (E).
جليلة رقيقة لينة المادة تنفي العظام .

١٤١٤٨ - **سَمْعَاق** ، **عَكُوس** *Cirro-stratus*
نوع من الغيوم المتصلة البعد مظهرها طبقات متتامة
أفقية الارتكاز وشاحية الشكل مسطيلة يتخللها بعض
الكتل المائية .

١٤١٤٩ - **سَمَخ** *Germination (débüt)* (F).
هو بدء الانتاش . راجع انتاش .

١٤١٥٠ - **سَمْعَة** ، **صِرْم** *Sous-variété* (F).
Sub-variety (E).
السمة ج صمخ . هي افراد من ضرب واحد تتميز بصفات
خاصة جعلها يكتسب بعض الشيء من القرب المتعددة منه .

١٤١٥١ - **سَمْعِيَّة** *Epigenèse* (F). *Epigenesis* (E).
السمة هي الطريقة المتبعة في تمييز... تكوين الاجسام
المركبة عند اضافة ما كان ينقصها أو ما كانت تفتقر
اليه جبروتها .

١٤١٥٢ - **سَمَد** *Engraisser* (F). *To manure* (E).
استعمل المهاد التربة .

١٤١٥٣ - **سَمَر** *Clair-obscur de la lune* (F).
السمر اسم ظل القمر .

١٤١٥٤ - **سَمَر**
هو السعد اللولبي اطلبه . وياء عن ابي حنيفة : « جهر
من المشاء وليس في المشاء اجود غشياً منه ينقل الى
القرى تنفسى به البيوت » الراصة سمرة . ويقال ان
الشجرة التي يبيع تحتها رسول الله كانت سمرة .

١٤١٥٥ - **سَمَرَمَر** * ، **سَمَرَمَر**
Pastor roseus (S). *Martin rosalin*, *Etourneau*
rose (F). *Rose-coloured starling* (E).
بين اسماءه باذنجان وسلكتوت وسفرماي . طائر قنبراني
وحيد الجنس والنوع من فصيلة الثروازير طوله نحو ٢٣
سم . رأسه ورثه وهفهه وبنامه ويكاه الى السواد
الازرق المالح . سائر ريشه احمر ودي . منقشاه
ويجده الى الصفرة في موطنه البلاد الحارة يجمعها في
طلب الصيد والمخفى قوته الجراد والجنادب والقيايط .

١٤١٥٦ - **سَمَرَوِيَّة** * ، **قَصَب** *حر*
Simaruba (S). *Simaruba* (F). *Simarouba* (E). *Simarubum* (D). *Simaruba* (I).
جنس الشجر حرجية طيبة من فصيلة السمر وبيات . انواعه
٦ منها امريكا الوسطى ، سيقانها لمساء الماء تملو
من ه الى ٢٠ م . اورقانها متعاقبة بسيطة او مركبة .
انزاعها متكروني التجميع تاجي الارتكاز . انزاعها خشوية
خامسة البتلات || انشاجها صلبة مفردة اللون فاحرة
الصف . لحاء سيقانها واضحا مرة الطعم طيبة . نقيها
يستعمل في مكافحة الحشرات . يحرق اورقانها وتنتجها
مضاد لسم الاقضي وقد يستعمل في مما لجة السلس وبعض
الامراض الجلدية .

١٤١٥٧ - **سَمَرَوِيَّات** *Simarubaceae* (S).
Simarubaceae (F). *Simarubaceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات القلمات .

١٤١٥٨ - **سَمَانَة** *Callie* (F). *Quail* (E).
واحدة السمان طائر من الطيوريات . يقال سمان الواحد
ولجمع والواحدة سمانة جميعها سمانيات .

١٤١٥٩ - **سَمَانِي** * ، **قِرِي** ، **قَتِيل** *Coturnix* (S).
Callie (F). *Quail* (E).
جنس طير من صمارة الحبيليات وفصيلة الطيوريات
واحدة سمانة وقراية ، جميعا سمانيات يربي . انواعه نحو
١٥ جميعها من القواطع مظهرها صغير . اللد . طولها
يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم . انوارها الى الصبغة الخفيفة
المقل المزدوجة والرامي والكروم قتها الاشباب والحوب
والطوام || الانثى اصغر قدماً من الذكر واهن لوناً .
تدثر انصوبها في الادلخال وبين الاشباب الكثيفة
وروصها بالحشيش التام . تضع من ٨ الى ١٥ بيضة
تحضنها وحدها زهاء ثلاثة اسابيع .

١٤١٦٠ - **سَمَبَلُورَة** *Cymbelophora pudique* (F).
في الطنوس المشقة ، اطلبها .

١٤١٦١ - **سَمَت** *Azmut* (F). *Azmuch* (E).
اصطلاح علمي فلاني يدل على نقطة وهمية واقعة فوق رأس
الراصد تدعى سمت الرأس يقابلها نقطة اخرى تقع تحت
قدم ذات الراصد تدعى سمت القدم او التنظير . وسمت الرأس
والقدم هما قطبا دائرة الافق .

١٤١٦٢ - **سَمَت** *Zénith* (F). *Zénith* (E).
سمت الشمس اي سمت القدم .

١٤١٦٣ - **سَمَت** *Nadir* (F). *Nadir* (E).
سمت الشمس اي سمت القدم .

١٤١٦٤ - **سَمَة** *Stigma* (F). *Stigma* (E).
الجزء الاقل من مقلقة الزهرة وهو الذي يتقبل الويلع .
وهي في الحشرات المقلصة فوعة تنفسية سطحية مباشرة
الاتصال بالانابيب التنفسية .

١٤١٦٥ - **سَمَة** *Necte* (F). *Mating* (E).
مطرة من غوص تبسط تحت الشغل ويعد من الاجنار
المثيرة ليعط عليها ما تثار منها . ج س .

١٤١٦٦ - **سَمَة** ، **عَلَامَة** ، **وَسَم** *Etiquette*, *Marque* (F). *Ticket*, *Mark* (E).
١٤١٦٧ - **سَمَة** *Marcelage* (syrv.) (F).
Marking of trees (E).
علامة يضعها مأمور الاجراع على بعض الاجنار الحرجية
الجارز قطعها .

١٤١٦٨ - **سَمِي** *Zénithal* (F). *Zenithal* (E).
غصن يسمت الرأس .

١٤١٦٩ - **سَمَخ** *السبح* : السبح لا حدة فيه .

١٤١٧٠ - **سَمَاج** *السماج* ، **السَمَج** : القوس الطويل النهر .



سمان



سممر



سمروبه

ماحتان ، زعنفتها الظهرية تمتد من الخلف إلى طرف الذيل .
زعنفتها البالية مستديرة الطرف || لحمها فاخر الصنف ،
مغروب فيه .

١٤١٨٧ - سمكة الشكل
Ichtyomorph (F).
Ichtyomorphous (E).

١٤١٨٨ - سمكة
Vase (F). Silms, Mud (E).
ج سمل وصمك وصمك وصمك . بقية الماء والحماة في
الحوض والقدير .

١٤١٨٩ - سمكة
السلق : لا تقدر لا نبات فيه وقيل القاع المستوي الاسفل
الابر لا يمر فيه . ج سلق .

١٤١٩٠ - سمكة
Rhagio (S).
Rhagio, Lepels (F). Rhagio (E).

جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة ذوات الجناحين.
أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم أقطار البلاد الحارة
والمتدلة الحارة والباردة || أجسامها متفائلة القد تطول
من ١٢ إلى ١٨ سم . رؤوسها كبيرة ، قليلة التكوير ،
مستقلة . حيوها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها
الاستشعارية صغيرة ونحيلة . أعينها مستطيلة . ملابسها
صغيرة . كواسلها كبيرة . بطونها شبه مدنية الشكل .
رواشنها كبيرة ، ملونة . غنايب قوائمها الوسطى والأخلفية
ثلاثية المفاصل الحادة . أظفارها ملونة || تألف الحراج
والغابات والأحالي . جميعها قانصة . يرقاتها وألحج تعيش
في التيرب والخالفة والأعشاب النعرة .

١٤١٩١ - سمكة البيات
Rhagionidae (S).
Rhagionides (F). Rhagionidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . أجسامها وأنواعها
المعروفة عديدة منتشرة في جميع أصقاع العالم باستثناء
أستراليا . جميعها غائلة ، متفرقة || أجسامها متفائلة
القد ، تطول من ٦ إلى ٢٠ سم . رؤوسها قليلة التكوير ،
مستقلة . حيوها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها
الاستشعارية صغيرة ونحيلة . أعينها مستطيلة . ملابسها
صغيرة . كواسلها كبيرة . بطونها مستطيلة . رواشنها
ملونة || أنثاها أكبر قدماً من ذكورها . يرقاتها وألحج
تعيش على ما تستطيع اقتراعه من دويبات تحسح في
محيطها || أشهر أجناسها السليطة والتيريس .

١٤١٩٢ - سمك
Beurre (F). Butter (E).
سلا الزبدة المصنوعة بالمخاض الرية المتينة .

١٤١٩٣ - سمك
Engraisser (F). To fatten (E).
بالغ في تغذية الحيوان لتسمين لحمه وزيادة وزنه .

١٤١٩٤ - سمك نباتي
Cocose, Végétaline
هو دهن جوز الهند أي ثمرة الكاريبيول . وكل دهن مأخوذ
مصدره النبات .

١٤١٩٥ - سمكة
Grièvre (F).
Thrush aviary (E).

طيرة فسيحة مشبكة الجوانب والسقف تستعمل لتربية
السن .

١٤١٩٥ - سمكة
Poissons (F). Fish (E).
حيوانات فقارية من خلق الماء تعتبر من ذوات اللحم
البارد ومن أكل الحيوانات الفقارية || رتبها وخصائصها
وأجناسها وأنواعها نحو ٤٠٠٠٠ . تتميز بأعضائها التنفسية
المركزة على الخياشيم التي تقوم بعملية تبادل الغازات .
وبعضها الحركة التي تستند على الزعانف والمضلات .

١٤١٩٦ - سمكة أحمر
هو النوع ، أطليها .

١٤١٩٧ - سمكة التيرس
Rhombus (S). Turbot (F).
جنس سمك بحرية من فصيلة المفلطحات . أنواعه ٧
موطنها الأقاليم الأطلنطي والبحر المتوسط . جميعها كبيرة
القد مستديرة مبطلة . طولها يراوح من ٤٠ إلى ١١٠ سم .
أولها إلى الصبغة المختلفة المزيج يعلوها شريط أسود .
لحمها للذ اللحم ، فاخر الصنف .

١٤١٩٨ - سمكة الكراكي
Brochet, Esox (F).
Esox, Pike (E).
هو الزنجير جنس سمك بحرية كبيرة القد مستطيلة .

١٤١٩٩ - سمكة سلبان
هو السلبان من الأسماك المشهورة .

١٤١٩٠ - سمكة فقي
هو النسيمة ، أطليها .

١٤١٩١ - سمكة متعرج
Ichtyoche

١٤١٩٢ - سمكة موسى
Solea (S). Sole (F).
جنس سمك بحرية من الملسوات الجانيات اليوم أنواعها
سنة موطنها جميع البحار . أجسامها مفلطحة صغيرة
القد أو متوسطة . طولها يراوح من ١٥ إلى ٦٠ سم .
لحمها للذ اللحم فاخر الصنف . أجسادها أميها ثججا .

١٤١٩٣ - سمكة
Poisson (F). Fish (E).
راجع اسمك . ج سمك وسمك وسمك وسمك .

١٤١٩٤ - سمكة بيشه
هي الزينة ، أطليها .

١٤١٩٥ - سمكة طليوكا
Poisson volant (F).
Fish volant (E).

السمكة الطائرة كوكبة نجوم جنوبية الملقح مركزها تحت
برج الدلو || عدد نجومها ١٧ . جميعها من الرتبة الخامسة
وبادونها .

١٤١٩٦ - سمكة موسى الشككية
Solen solen, Pleuronectes solen (S).

Sole commune, Parérix de mer (F). Sol, Soul (E).

نوع من سمك موسى . سمكة بحرية يروض من فصيلة
جانيات البحر . أصلها منظم بحار البلاد المتدلة الحارة
وأعضها البحر الأبيض المتوسط . تعتبر من أسماك أسلم
الغذاء . جميعها عويجي الحركة || جسمها مبطط الجرم ،
أطليها الثورين ، يطول من ٣٠ إلى ٤٥ سم . تتميز
بالاستلقاء على الجانب الأيسر مما يجعل عينيها في الصبغة
البيضاء من الرأس . فوقها مائة المحيط التي تعيش فيه .
الفصحة التي إلى الخلفي الخلفي المزيج . الصبغة البسرى
إلى اللون البشاد . رأسها صغير الجرم ، أنفها الخلفي
مستل اللشق . فكها الأمامي يتقدم الأسفل . استثنائها
صغيرة ، ذوبة ، عديدة الصفوف . حيتاها صيرتان ،



سمك التيرس



سمك موسى



سمكة موسى الشككية

اللون أو يضاء أو زرقاء . ثمارها نوية عديدة البزور || تنموها ريم .



محكمة

Epacridaceae (S). ١٤٢٠٣ - سَمَجِيان
Epacridaceae (F). Epacridae (E).

فضيلة نباتات جنية وبحلية مسرة من ذوات الثقلتين .
احتباسها وانواعها المروقة قليلة العدد . منها بعض المناطق
الجبلية من البلاد المعتدلة الحرارة || تنبت طوعاً في المواقع
المعتدلة الرطوبة احصاها المراجع والقباهات || تتميز بكثرة
انزعاجها المتتامة كل الاثنا . لونها السائد الابيض ثم
الامر الاسواني والازرق || اشهر احتباسها السمنية .



سنة الدين

١٤٧٠ هـ - مَمْدُوحٌ جَمِيلٌ •

Chloromyia formosa (S). *Chloromyia bella* (F).
 خلي، نضيفة، والقطايات، جسمها ابيض، اقلام،
 اشرار، ويطول من ٦ الى ٩ سم. راسها مستطال القرم،
 شبه مكور الشكل، اسد الى ١١. مناهها اوراقنا قريز تان.
 ملاسها صافية، زبانا متصبغان، سداسيا القصل،
 صعدوا اخضر اللون، جاري المايح، ملحب اخمل،
 يلقها سرسة. يلقها سداسي الشكل، صفر اللون،
 وريشها مستطال، حطبا اللون، قوعها الى السرة
 تأت المايح التي تكرر فيها الاشباب والقبانات ابقيلة
 ريتها دودية الشكل، صمره اللون، تدوي في الخاطلة
 الماد القنافة للنحلة.



سنة محالة

١٤٢٠ - سَمَّيْكَ * ، مَوْلُوت ، سَمَّيْكَ

Salamandra (G). Salamandre (F). Salamander (E).
 من اسمائه لروني وعند سنندل . جنس ذوات زعانة من
 السندليات . انواع عديدة منها الارضية والقاذرة والمائية
 جميعها بطيئة الحركة اسمائها مستقلة الشكل طويلا
 راجح من ١٧ الى ٢٥ سم . ألوانها تختلف باختلاف
 الانواع فيها الاسود والاسود الاصفر والبنفسج والاصفر .
 تتبارأ الحشرات والاعراب || ثم القنصان السندل يدخل
 قنصا او تحرقه وحققة النار ان جلده السندل يفرز
 مادة اكلية قاذرة تظلم الثمر الى حد نصفها . سم السندل



سنة ١٤٢٥ هـ

١٤٣٠ھ - مَمْدُوحُ اَمْدُودِ*، مَوْلَانِ اَمْدُودِ

Salamandra atra (S). Salamandre noire (F).
Black salamander (E).

هرون قاذب سربل من فصيلة السنديات . جسمه مفلطح الشكل . ذباني القزح ، يملك نحو ١٤ سم . تعد الذكر من ١٧ نحو ٢٠ من الاناث . رأس مستدير الخلف واسع الشدق ، كامل للسنين في الفكين . عنده صغيرات جاحشياتنا شكلتها الجفون . خلفه ذيل القصير . ظهوره تتواءم الاسماك الضخالة . ذبه خفيفة القابضة صعدت العروق . ستاع قصيرة وطويلة . قاعدته الاسمانيتا وبعثتا الاصابع اما الخليليان فضهما . قويه قوي اللون اسود تملو وبيضه بنجسبه . يبلغ كمال نموه عرس اربع سنوات وبعثه عن ٢٤ بيضة . يأنث الملقح القريه من الله . يرحل في الليل ويبيت في التجار بين الصخور وتحت الحجاره . قوته الحشرات واسماكها والديدان والرنويات . الحماة تقضم له حلقه الله سريدا كملها الاضاء داما الخياشيم الخارجية . ثم تنقع بها الى الله الحاشي يقيان نحو خمسة اشهر قبل ان يمكثنا من السير الى الارض . يعتبر من الطيور النافعه .



المنهجية



سکھو



سہولت پسند

١٤١٩٦ - سُبُهَة * ، عَصْرُ النَجْمَة

Valeriana locusta, *Valerianella olitoria* (S). *Valerianella* potagère, Milche, Boursetta, Doucette (F). Cornsalad, Milkgrass (E). Ackersalat, Echter Feldsalat (D). *Valerianella*, *Dolce mangiare*, *Dolcetta* (I).
نباتة زراعية من فصيلة الورديات. أورثاها غشبية
مأكلية زروع وعيد في جميع الأتربة المستصلحة
تتكاثر بالبذر. ذورها صغيرة مستديرة
مخاطلة. قوة إنباتها نحو 5 سنوات.

Turdus (5). ١٤١٩ - سِنَّةٌ ، سِنَّةٌ

Grive (F). Thrush (E).
سج وسمان وسمان . جلس طير من القشوريات .
انواعه عديدة معظمها من القواطع . اجسامه مستطيلة ،
ورسها صغيرة ، منقارها جالس . ارضها دقيقة مارية .
الوانها تختلف باختلاف الانواع || قوتها الحشرات
الار . قدن اعشاشها في الاجبار والادك .
يبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بثلاثة الاكوار .
انواعه ما ع .

١٤١٩٨ - مُنْتَهَى الدُّنْيَا ، مُنْتَهَى الْحَيَاةِ

Turdus viscivorus (S). Grive draine, G. du gûl,
G. de brou (F). Midge-thrush (E).
طائر من اوابد الشرق الاوسط واروية . طوله نحو ٢٢
سم. ظاهر ثوبه الى الصبغة السمره يطولها موذج جزوي .
زوره وبطنه وانفيكه الى البياض الاصفر تلبه رقة
سمره || انكه تقطن مرتين في العام . كثر شعبا في
السننبر والستيدان والزان .

Turdus mauris (S). * سُوَيْتَة مَعْرَاكَة ١٤١٩٩ -

Grive mauvis (F). Fieldfare (E). طائر من القواقع خفيف الطيران سريع. يحب الشرق الأدنى وأوروبا والقوقاز الشمالية. يألف الثغرات والأماكن والزوايا والمروج وضفاف الأنهار. طوله نحو ٢٢ سم. لونه ثوب سمكة البحر. يطن الى البياض الأخير ١١ من حبه في الأذنان والبربر والزباب والصبرة. المنة مخفية ماصة ١١ سره كح البندقي فوق الماء.

١٤٢٠ - سنة مائة وثمانين ، سنة ثمان مائة

Turdus musicus (S). Grive musicienne, G. commune, Merle-grive (Fr). Song-crush, Thrush (E).
 طائر من القواطع يحبب الشرق والأروبة وأفريقية الحالية
 والشرقية. طوله نحو ٢٤ سم. راسه رمقه وظهوره بنياناه
 وذنبه إلى الصهبة البسراء تعلوها مراح زيتي. حناجره
 إلى الصلوة. زوره ويصوته وبكك والنيك إلى البياض
 الأخضر يملؤه تشبه اسمر. أنثاه تحضن مرتين في العام.
 ينش في الإذلال والشجرات الحرجية الكثيفة. وهو
 من الطيور القليلة التي تنقل إلى أفريقيا وتردها.

Sminthe ۱۸۷۰۱ - سمنتوس

اطلب عروانة .

Epacris (S). *Epacride* (F). ^{١٠} مَسْنَجَة - ١٤٧٠٧

جنس نباتات جنتية مسرة بيرة وتزيينية من فصيلة
السنجيات . انوارها المعروفة قليلة العدد منها بعض جبال
البلاد المحتلة الحارة من العالم القديم || شكلها قريب
للشبه بالمخنج . سوقها متصبغ فراءه . اوراقها محتاجة عناية
لتصال الضوء اذهاها صلبة مستطلة الاساق حواف



١٤٢١٣ - سَمْنَدُورُ الْعَرَقِ *

Semanotus laurasi (S). *Sémanote du genre-vrier* (F). *Semanotus laurasi* (E).

حشرة غاصلة غاشية من فصيلة القرنيبات ورتبة غمدات الاجنحة. تألف الجروود حيث يتكاثر العرعر والفران والابيل. خنافسها تميش حل الارواق والازهار وخلفا الغرابيب. يرقاتها تركب الجروح والاضنان تنفخها وتردبها حتى الشكير || جسمها متوسط لثقة يطول من ٩ الى ١٢ سم. عند الذكر ومن ١٥ الى ١٨ سم. عند الانثى التي تتميز ايضا بكبر المرو. ثوبها ثنائي اللون ، اسود الرأس والكحول والزبان والبلعن والجرازم ، افصح الظهران الخصب بجمدة متفرقة سوداء. رأسها معتدل الجرم. حينها كيرتبان جاسطتان. زباناها خيطيان مهبان. ظهرانها مستدير الطرف اللاحف عند الذكر || جيلها ثلاثي الجيل. تظهر الحشرة الجمالدة في فينان ويأتي حتى ايلول. تسرح في النهار. تشابه يند ظهورها بنحو ثمانية اصابع. ترز المنكن بين التفتور || البرقة عند الادراك تمام تطول من ١٨ الى ٣٠ سم. جسمها منحوب الظهر ، مبط الملب ، قصير الرواوبج النودية. ثوبها الى السرة يطولها موج اشجع وتفتيح اخر عند من الخلفقة الصدرية الثانية الى الشكة البطنية قبل الاخيرة. رأسها جزوي اللون يغور من الخلفقة الصدرية الاولى || طور الاكمال الذي يستمر من ٥ الى ٥٥ يوما ينقضي عند مدخل آخر تلقى احتفرته البرقة ضمن صلح من المواد النباتية المعجولة بالريال.

١٤٢١٤ - سَمْنَدُورُ *

Scymnorhinus, *Scymnus* (S). *Scymnorhine* (E). *Scymnus* (E). جنس اسماك بحرية سرابدة من فصيلة السمندويات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها البحر الابيض المتوسط وتغلق مناطق المحيط الاطلسي اعصها المنطقة المتحدة المغرب الى البرتغال || مسرحها لحي ولا تشاهد قرب المهاد الا نادرا. قوتها الاسماك الصغيرة والسرطان والقشريات والرخويات و اجسامها اهليجية الشكل ، تطول من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. رؤوسها شبه مخروطية. اعظامها ذلقة ، متفرجة الاضداد. اسنانها صغيرة ، متفرقة الاشكال ، متألثة في الفكوك العليا والسفلى. الزوايا الى الزرقة البحرية الرياء المالح يتبع مع اقترابها من السطح وتبيض وتغير عند البطن ، ويطولها في جوانبها تجلجج اسف منسكس الخطوط المتوازية || حولها بين متوسطة السنس وكاعة. مسوكة فاخرة. مرغوب فيها || اشهر انواعها السمندوة المشقة والسمندوة المساء.

١٤٢١٥ - سَمْنَدُورُ صُفْقِيَّةٌ *

Echinorhinus spinosus (S). *Echinorhine*, *Requin bouclé*, *Bouclé* (F). *Prickly-shark* (E).

نوع من السمندوة. سمكة بحرية سرابدة. اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك البجاج. اخلاطها حنية ، تحشى الانسان وتقتصد عنه || جسمها اهليجي الشكل يطول من ١٥٠ الى ٢٢٠ سم. مسكها عشن ميمر الشكل المشقة متباين عجمية ذرية الاطراف. ثوبها الى الزرقة البحرية الرياء المالح يمين وتقتصد زرقته مع الاقتراب من سطح الظهر ويغير ويبيض عند البطن. ويطولها في جانبها تجلجج اسود منسكس الخطوط. رأسها معتدل الجرم ، ذلق الخط. لها سفلى الايتكاز. شفها معتدل الرحابة. اسنانها متراصة ،

١٤٢١٧ - سَمَنْدَلُ الْمَاءِ * ، سَمَنْدُورٌ ، سَمَنْدُورٌ

Molge (S). *Triton* (F). *Triton*, *Newt* (E).

جنس دويبات زملاقة قازية من السمندليات. انواعه نحو ٢٠. جميعها صغيرة لثقة مسطيلة الشكل مبطلة. حنار ظهورها ثنجي الايتكاز مسن الحافة. حنار اذنانها عديم التسنين. الزوايا مزرشكة وسنحية وبديعية || قوتها البيدان واغلام والحيوانات. تألف الخنافس تعيش فيها حتى فصل الشتاء. بيتها الشري يدوم نحو ٤ اشهر تنحس فيها تحت الحجارة وفي الارباب.

١٤٢١٨ - سَمَنْدَلُ الْمَاءِ الْمَبْدُول

Triton vulgaire (F). اطلب نيوت مبدول.

١٤٢١٩ - سَمَنْدَلُ مَبْدُولٌ * ، سَمْنَدُورٌ

Salamandra salamandra (S). *Salamander* (E). *Salamandra terrestra* (F).

حيوان قازية سرابدة من فصيلة السمندليات. جسمه متوسط لثقة دماي القدام يطول نحو ٢١ سم. عند الذكر ونحو ٢٤ سم. عند الانثى. رأسه مبط ، مستدير الخط. واسع الشفك ، كامل التسنين في الفكين. عيناه صغيرتان جاسطتان. عنقه بالغة القصير. قوائمها قصيرة وفليظة. التامخاتن الاسمانسان ربابية الاصابع اما الخلفيتان فخاصيتها. جلده مشعل القشار. ثوبه الى السواد اللامع يطول تفتيح اصفر عند من الرأس الى طرف الذنب || يعيش نحو ٢٤ سنة. يألف شيفات مجاري الماء. يسرح في الليل ويبيت في النهار بين الصخور وتحت الحجارة. قوته الحشرات والبيدان والرخويات || الاثني تنفع حل حافة الماء من ١٥ الى ٢٠ سنيلاً طول الواحد منها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. تعلق كلمة الاضداد ، كبيرة الخياشيم الخاطبية. وبعد مرور ساعة من الوضع تلتغ الاثني بمصارها في الماء فتبقى نحو سبعة اشهر الى ان تنفلس خياشيمها || يعتبر من القوازيب النافعة.

١٤٢١١٠ - سَمَنْدَلُ كَيْفِ

Salamandridae (S). *Salamandridae* (F). *Salamandridae* (E).

فصيلة من السربويات اجناسها وانواعها عديدة تنحسها اربع عمارات افهرها السندل والسمندور.

١٤٢١١١ - سَمَنْدُورٌ مَبْدُولٌ

Triton vulgaire (F). هو التريت مبدول ، اطلبه.

١٤٢١٢ - سَمْنَدُورٌ *

Semanotus (S). *Sémanote* (F). *Semanotus* (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنيبات ورتبة غمدات الاجنحة. انواعه المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق الباردة. جميعها صغيرة لثقة ميمرة الملب التقيق المستطيل. اجسامها تطول من ٨ الى ١٨ سم. رؤوسها وكولها سود او حر. اخادها معتدلة الاوان منها الاصفر والاشاحب والاحملي والوردي والاسمر والاخضر. جميعها تنحس بالاسود وتفرغها عند اتصافها جدة عابقة اللون يئلب فيها الاسود || تسرح في النهار. تطهر في اواسط نيسان وتبقى حتى ايلول. مرتمة الازهار الحربية والبرية || يرقاتها غاشية تميش على جلوح وانصاف العرعر والابيل والازاب الخ...



سمندل الماء



سمندل مبدول



سمندل العرعر



سمندلة مشقة

١٤٢١٩ - سَمُونُوسُ مُعَقِّبُ الرَّاسِ *

Scymnus frontalis (S). *Scymna à tête noire* (F).
Scymnus frontalis (E).

حشرة غائلة آتية نافعة من فصيلة السمفويات ورتبة غليقيات الاجنحة. تألف جميع الاماكن التي يكثر فيها الاراك لانها مع ريقاتها تعيش عليه || جسمها صغير القند يطول نحو ٣ مم. ثوبها الى السواد القمي يميل في كل غده بقعته حمراء. رأسها صغير الجرم. عيناها بارزتان. زبابانها صقيان دقيقتان. فكهاا نشطتان. ظهورها مستدير الطرف الاخلف. غمدانها شديدا الصلابة. كوكبتها ثلاث. ارساها مستطيلة. ودياعية البقل || اجسامها الحولية لثالة. تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها الشتوي في اوائل الربيع. تسرح في النهار. تتغذى بعد غروبها بياسمين. تمتع المكن لطفاً شغوية البعد على نصال الاوراق || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ مم. جسمها مستطيل الشكل. حطلي القرن ابيض المرج. ابيض الحقل القلبي التجميع || طوط الاكامل قلبي تستمر نحو ثمانية ايام يتغني على النبات المائل حيث تتدل البرقة من نصل الورقة الى ان تم مراحل التطوير وينطلق القفار.



سمونة مساء



سمونوس سوردي



سمونوس معقب الرأس



سوزل



سمور

ردياعية الصفوف في الفكين. عيناها لوزيتان. زانفاتها الظهريّة اثنتان. زانفاتها البطنيّة كبيرة القند تكمل القرجية || تصاد لسحبا الفاعر ولزيتا. لحمها كامن الصنف.

١٤٢١٦ - سِمُونَةُ مَسَاءَ *

Scymnorhinus licta, *Scymnus licta* (S).
Scymnorhina, *Licta* (F). *Scymnus licta* (E).

نوع من السمونة. سمكة بحريّة مقترمة. اصطناع البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك المصايد. احداها رضية لا تشاكس ولا تقرب من الانسان || جسمها ورشي الشكل يطول نحو ٣.٥٠ مم. سمكها مدام القبول والمناخس. ثوبها الى الوردية السوداء البنفسجية المولج يميلها تمفيع اسود من الخط الجانبي الى شبح الظهر وتضيق اخير فايض من الخط الجانبي الى قم العين. رأسها مستدل الجرم. متنفخ الجبهة. ذلق الخطم. لها سفلى الزنكاز. شدقاها مستدل قرجية. اسنانها متوسطة الحجم. مثلة الزوايا. ودياعية الصفوف في الفكين. عيناها لوزيتان. نهماها قرقان صغيرتان زانفاتها الظهريّة اثنتان. زانفاتها البطنيّة كبيرة جمدانيه الفلقة العليا. مزوانية السفلى || تصاد لسحبا الفاعر ولزيتا الجيد. لحمها كامن الصنف.

١٤٢١٧ - سِمُونَةُ يَتَات *

Scymnorhinidae, *Scymnornitidae*, *Scymnidae* (F).
Scymnorhinidae, *Scymnidae* (E).

فصيلة اسماك بحريّة سرود من السمفويات ورتبة الاشلاق اجناسها وازواها المعروفة قليلة العدد. اصطناعها معطر بحار العالم || اجسامها اعليجية الشكل تطول من متر الى ستة اذنان. انواها الى الزرقة البصرة الطمودة المولج يميلها تجطيع مقترض البحر في الجانبيين. مسك بعض انواها مشتقة بدران شاككة. رؤوسها غروطية. اصطناعها ذلق. اشداها مستدلة الانفراج. اسنانها لاجامية الانظام بين الفكين || اناتها معتدلة انتشار تفص في كل مرة. في فصل الصيف. من ٣٠ الى ٤٥ جمراً || اشهر اجناسها السمودة والمريفة.

١٤٢١٨ - سَمُونُوسُ صُورِيٌّ *

Scymnus syriacus (S). *Scymne syrian* (F).
Scymnus syriacus (E).

حشرة غائلة نافعة من فصيلة السمفويات ورتبة غدييات الاجنحة. تألف الحقائق والمبالل وبياتين الحشويات. خنافسها وريقاتها تعيش على القرمزيات والمظفرات || جسمها صغير القند يطول نحو ٣ مم. ثوبها الى السودة الكستنية تملحها تشفيمات حطوية تميد الى الحقل الاصهب القلبي التجميع في الكورول والقمدين. رأسها صغير الجرم. عيناها بارزتان. زبابانها صقيان صغيران. ظهورها مستدير المؤخر الاخلف. غمدانها شديدا الصلابة. ارساها ردياعية البقل || اجسامها الحولية لثالة. تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها الشتوي في اواسط نيسان. تسرح في النهار. تتغذى بعد غروبها من مكثها بياسمين. تمتع المكن لطفاً على مصحات نصال اوراق النبات المائل حيث تعيش القرمزيات والمظفرات. البرقة عند بلوغها الادراك اتمام طول نحو ٤ مم. جسمها اعليجي الشكل. ثوبها الى السودة الكستنية المايقة يميلها نحو اخير || طوط الاكامل الذي يستمر نحو سبعة ايام يتغني على النبات المائل حيث تتدل البرقة وتتدل من نصل الورقة.

١٤٢٢٠ - سَمِينَادُوسُ *

Diplodadum
جلس تطوط مجهرية من التفتحيات وفصيلة البولسيات. جربه الكتيبة متصبية يميلها فروع شمعية لثني بكتانه فردية او شغوية التجميع. كنانده مستطيلة شاككة ثنائية الخلية || انواعها عديدة مظهرها لا يذ. وبهها يتغفل حل المواد الفسوية والنياتية المتحلة.

١٤٢٢١ - سَمُورٌ *

سمور الزروع: لم يظف بليات. السمورة في الزروع هي عدم الاشطاء. والانواع او الفرويق السمورة في القليلة الاشطاء.

١٤٢٢٢ - سَمُورَالُ *

Diastata adusta (S).
Drosophila des fleurs (F).
حشرة صغيرة من المسجيات (ذباب الحقل) يكثر وجودها في اللتاقع وعلى الازهار والثمار الناضجة.

١٤٢٢٣ - سَمُورٌ *

Mustela (S).
Mustela, *Mustela* (F). *Mustela* (E).
جنس حيوانات لاجمة مقترمة من السموريات. انواها عديدة موطنها العالم. تألف الاسراج والقطابات. لتلق الاشجار وتسرح في الليل والنهار || اجسامها مستطيلة. رؤوسها اسفوية الشكل. اصطناعها ذلق مقطوية. اذنانها عريضة كاسية. اذنانها مستطيلة جيلة. جرازها قصيرة. غالبا ذرية حادة || اناتها تضع من ٣ الى ٤ جروا. تيمر بعد وضعها بياسمين وتتسلق الاشجار بعمر ٧ اسابيع.

١٤٢٢٤ - سَمُورٌ صُورِيٌّ *

هو الزربان. لثله.

١٤٢٢٥ - سَمُورٌ شَائِعٌ *

Mustela martes (S). *Mustela commune*, *Mustela commune* (F). *Common martes* (E).

نوع من السمور. طولها نحو ٤٨ سم. ارتفاعها ٢٥ وذنبها ٣٠ سم. فويالها الجوزة الحطية. صفه وذودها وصدرها يبيض. موطنها لحيول الشرق الاقد واروپا. يسرح في الليل والنهار وهو من الحيوانات الجريئة البطافة التهمة التي لا تفت من اي حيوان كان تستطيع اليه سبيلا.

كالاجاص والخوخ والجوز والكتنا. ويركب جلوع بعض الاجار الحرجية كالستيان والقيقب والسبط والمصناف والخور والدلب || مشبه يدخل من الجروح للقدية اليابسة فيسري الالفة ثم القلفة الخشبية الاولى التي يمتلئها بمادة لزجة كالصم تلتصق شيئا فشيئا بعد ان تشقق الخشب بالطلل والمرض على شكل مربعات تحيطها من جوانبها الستة اغشية المشيج البيضاء اللون || اما اللد بعد ذاته فهو كالقصع المتراكبة المنبسطة الحوائط المتصعبة المشربة. يظهر من ايار ال تشرين وهو سريع النمو قطر كتته يبلغ نحو ١٠ سم. فيضته عديدة الاوان يلبث فيها الاصفر الكبريتي ويوجد فيها الحطلي الباقي والزاهي والبرتقالي والوردي والاصهب والاشرق والبنّي والايض الاخير || وهو من القلوع المأكولة لكته يشكو من ملوثة المز الحليم. كانوا ولا يزالوا يستخرجون منه مادة صلبة صفراء اللون.

١٤٢٧٧ - سمية حوشية

Polyporus squamosus, Melanopus squamosus (S). Polypore squameus (F). White rot (E). Schuppiger porling (D).

ظفر من السميات كثير الانتشار يركب جلوع وارويات وجلوع بعض الثباتات الحرجية اخضا الحور والصفصاف والشت والستيان واثران وقد يصيب الثيت والدلب والجوز. تجته كلبية الشكل طويلا نحو ١٠ سم. لونها بني او سحلي. يطولها ستقة من الحرافث الدقيقة الباقية المألج. لياه ابيض اللون طري في اول مهده ثم جلدي عند الادراك. رائحة كرائحة السبل وهو من القلوع المأكولة المستعينة الطعم || اضراة قليلة لانه قلما يعلب الخشب والقالب || يكلف بالظهور بعد انتزاع القلوع وتنظيف الجرح من الشكير اليابس والخشب الموصوم.

١٤٢٧٤ - سميج *Epigène (F). Epigène (E).*
لثت تعريفى يطلق على كل ما اتصف بالهامة.

١٤٢٧٥ - سميدّر *Triton*
هو سميلد الماء، المله.

١٤٢٧٦ - سميدّر هيدول *Triton vulgaire (F).*
هو التوت المبلول، اطله.

١٤٢٧٧ - سميروم *هو الكرفس البري، اطله.*

١٤٢٧٨ - سميم *Calluna vulgaris (S).*
Calluna vulgaris, Bruyère commune, Brando (F). Heather, Common ling (E). Gamales heidekraut (D). Brendolo, Scopa carnica, Erica scopia (I).
جثة برية معدرة من فضيلة الخشنيات. ساقها رفعا تلون من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها غسبة و رابعية، متعابلة. ازهارها رباعية التركيب ليلكية اللون || كثر في المناطق الجبلية الرملية. تستعمل استعمال الشج لقر وفي صناعة المكائس.

١٤٢٧٩ - سميطر

السميطر والسميطر والسميطر اعماء غشقة لطار واحد. يلعى البشون الجبار طويلا حتى جدأ يرى ابدأ في الماء الفسضاح، اطله.

١٤٢٧٦ - سموريات، صرغوريات، هورميات *Musculidae (S). Musculidae (F). Musculidae (E).*
فضيلة حيوانات لاحة مفترسة تشمل السمور والسرورب وابن عرس والقضاعة والقشقم والقربان والقنيزون والرائل الخ:

١٤٢٧٧ - سمولس * لبين الماء

Samolus valerandi (S). Samole, Mouron d'eau (F). Brook-weed, Water pimpernel (E). Samoskraut, Salsbungen, Wasserpimpernel (D). Samolo, Pimpernelia aquatica (I).
ثبات عشبي بري متقني من فضيلة الربيعيات. ساقه متعصب. اوراقه معتقة بيضية متعابلة. ازهاره صفودي التجميع. ازهاره صفيرة اللد يضاء اللون خضامية البتلات. يقال ان عصاره ساقه تلزم الجرح بصره.

١٤٢٧٨ - سموم *Vent chad (F). Hot wind (E).*
الريح الحارة. قال ابو عبيدة السموم بالهار والخور باليل.

١٤٢٧٩ - سميات *Polyporaceae (S). Polyporacées, Polyporiacées (F). Polyporaceae, Polyporiaceae (E).*

فضيلة ظفور من رتبة الدعاميات نكاتها كثيرة الخشب جلدية التركيب او ليلية تحمل على صفحتها السفل بعض السام والتجاويف. يورقاتها شفعية التجميع رباعية خشافة او ملوثة || اجناسها وانواعها عديدة منها سوية ومنها معدرة تتصلق وتمش على الاجزاء البالية من غشفت الاجار الحرجية والسمامية والرزينية والشمرة || مشبهة يسري الماء والفكر والقالب فوسب انحلال حواجز الاروية والخلايا ثم يتغنى بيه الكثيف على الاجزاء الخشبية فيطبخ ويوصمها بصفته القلي او الكسبي او التوروي او الهلالي || ومنها اجناس تتصلق على الانشباب المقطوعة والمصنوعة فتؤذي وتطبخ || اشتهر اجناسها من الربعية الاقتصادية الزراعية : الحافرية، الزار، الساجوج، السنجية، السمية، الطبق، الليليس، القوس، الفزيت.

١٤٢٨٠ - سمية *Polyporus (S). Polypore (F).*
جاس ظفور من السميات. انواعه جلدية منها المأكولة ومنها اللدنية والسامة. يربصها يتصلق على الثبات فيقع به بعض الاضرار.

١٤٢٨١ - سمية البن * *Polyporus coffeae (S). Phitriose du caféier (F).*

ظفر يري من السميات يركب البن على اصفائه الترية. يعيش من الستين الى الثلاث سنوات وقد يعلب الجلود والمالج || ربيها كمية الطل تشأ عنه اربعة الساق اذا بكائته المستطيلة، القفصية الشكل، الزرية التركيب، تمتد الى الجلود وتغشها بشبكة من المشج تمش على ما تفرزه الجلود من مواد سكرية يسبها ونخر الكوشيل. يكلف بالقضاء على الكوشيل التي تمش سقم حياتها خارج الثرة على اصفاء ثباتات الحوائية.

١٤٢٨٢ - سمية السندريكان *

Polyporus sulfureus (S). Polypore sulfureux, Pourriture rouge du chêne (F). Brown checked wood rot (E). Schwefelgelber porling (D).


ظفر يري من السميات يتصلق على سرق الاجار المشربة



سمولس



سمية البن



سمية الستديان



سم

١٤٢٤٠ - **سميقي** *Tanon*

خشية في البئر تحيط بفتح الثور كالطوق وما يسميان.

١٤٢٤١ - **سميك الدكيب** *Crusticoda (F).*

Crassicaudate (E).

نمت تمريني يطلق على كل حيوان متماثل للذب.

١٤٢٤٢ - **سميك الساق** *Crassicaule (F).*

Thick-stemmed (E).

نمت تمريني يطلق على كل نبات ساقه سمكة.

١٤٢٤٣ - **سميك الورقة** *Crassifolia (F).*

Crassifolia (E).

نمت تمريني يطلق على كل نبات يحمل أوراقاً متماثلة.

١٤٢٤٤ - **سبيلقي** *Cephalocaux (S).*

Céphalocaux (F).

جنس الشجار حرجية سبوتية بطيئة النمو من الملقحيات. أنواعه المروفة قليلة العدد. جميعها شرقية النبت منهاها الباهان والصين والهند وإيران. الشجار تملو من ١٥ إلى ٢٠ م. أغصانها متعاقبة. أوراقها أبيض. نصلها ضيق المسافة بطول من ٥ إلى ١٠ سم. ويخرج من ٤ إلى ٦ سم. صفحتي السفل مقوسة إلى خمسة خطوط ثلاثة منها خضف واثنان أضران. أزهارها وسيدة للسكن. طليقة التجميع. أغصانها صلبة جيدة الصنف، شائعة الاستعمال للسنانح واللزني.

١٤٢٤٥ - **سبيلقي** *Tarin common (F).*

هو لكثير المبدول، أغلبه.

١٤٢٤٦ - **سين** *Age*

هي في الحيوان مقدار العمر منذ الولادة. وفي الشجرة هي بدء نموها. وتعرف من الأوراق بلحمس استنها. أما من الشجرة فلهم من مراكز النمو السقية في قطاع ساقها.

١٤٢٤٧ - **سين** *Dent (F). Tooth (E).*

من ج استنان. تعتبر الأسنان من أعضاء الجهاز الهضمي لأنها تقدم بوظيفة مضغ الطعام ولإعدادها في مركزها في استنخ الفك العلوي والسفلي. تتكون من ثلاثة أجزاء التاج واللق والجذر. ومن طيقتين: التاللية للأحفة والجسمية الباطنية للمسقية. ويقسم الأسنان إلى عدة أقسام مرجحها العمل المنوط بكل منها. في الخيل مثلاً، تقسم إلى: ثلثة ورهاية وقارح ولاب وفريس.

١٤٢٤٨ - **سين** *سين* *العجوز* *هي حرن لقم، أغلبه.*

١٤٢٤٩ - **سكنا** *Cassia (S).*

Cassia, Séné (F).

Cassia, Senna (E).

Kassia, Sene (D). *Cassia, Senna (I).* جنس نباتات مدمرة من فصيلة البقوليات. أنواعه زهاء ٤٠٠ منظرها بري وبضها زراعي ترابي. فيها الأعشاب والحيوانات والجناب. أوراقها مركبة، وليفية، شبيهة. أزهارها متفرجة التجميع. أزهارها صلبة أو متوسطة اللد، قصيرة الأنبوب، متراكبة الفصول والتلات. ثمارها قرون غزورية أسطوانية مسطوية. منافعها الطبية موية. أشهر أنواعها الطبية والزييلية ما يلي.

١٤٢٥٠ - **سكنا بري، قاتيل، قاتيل**

Cassia tora (S). *Cassia léodée, C. survaig (F).* نوع من السن البري الطبي. كزبه الرائحة، كثير الأوراق الطبية. سوك يودي سينا والعريش وربي الجزيرة والصعيد. شجيرة تملو من المتر إلى الثلاثة أمتار.

١٤٢٥١ - **سكنا عديكي** *Cassia corymbosa (S).*

Cassia corymbiforme (F).

نوع من السن الأزرق. شجيرة جادة تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خلية الأرواج. وريقاتها سنانية النصل. عناقيدها الزهرية خفيفة الشكل، محورية وتأتيب الارتكاز. أزهارها متوسطة القد، جميلة الصغار. ثمارها قرون ليفية خشبية. صهاربا سلوة العلم زينة. أزهارها يذوم أربعة أسابيع بتبقى في البوترة الأولى من تموز.

١٤٢٥٢ - **سكنا مريكتند** *Cassia marylandica (S).*

Cassia du Maryland (F).

ويسمى السن الأمريكي. نوع من السن الأزرق السبروي. يملو من ٦٥ إلى ١٠٠ سم. أوراقه ثنائية أو تساعية الأرواج. وريقاته أحليسية النصل، كالشكة الكرون. عناقيدها الزهرية كثيفة التجميع. أزهارها إلى الصغار الأزرقين. أزهارها يسمر من آب إلى تشرين.

١٤٢٥٣ - **سكنا مزهار** *Cassia floribunda (S).*

Cassia floribunda (F).

نوع من السن الأزرق. وهو جنة جادة تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خلية الأرواج. وريقاتها سنانية النصل الضيق القرب. عناقيدها الزهرية متكونة الشكل. تاجية الارتكاز. أزهارها كثيفة التجميع. أزهارها يسمر من حزيران إلى تموز.

١٤٢٥٤ - **سكنا سكي** *سكنا سكي*

Cassia scutifolia (S).

Cassia à feuilles aiguës, Séné moka, Cassia séné (F). نوع من السن البري الطبي يكثر وجوده في تمام البحر الأحمر. ثمره صلبة اللد تملو نحو ٢ أمتار. أوراقها خلية أو سباعية الأرواج. وريقاتها صلبة النصل الأخضر اللطيف المائل. تقع أوراقه وقارح سهل السمنة.

١٤٢٥٥ - **سكناج** *Suta (F). Soot (E).*

هي المادة السوداء التي تتجمع وتظلم على جدران الدخان وقد تتصلب كباد أزرق لها لا تملو.

١٤٢٥٦ - **سنحة مبدولة** *Diasa dias (S).*

Diasa common (F). *Common diasa (E).*

حورية من المتاكيب الساعية القناسة ثنائية الروايا، سلمية الماشان، من فصيلة اللبليات. جسمها صغير اللد يملو نحو ٨ سم. عند الذكر وهو ١٢ سم. عند الأنثى. صدرها قصي الشكل، صغير الحجم، اسمر اللون. عيناها زنجيتان. ضففاها صغيران. فكها دقيقان. جرائها متباعدة الطول، كثيفة الملب. يبطا يغيي الشكل، حنلي اللون تتوسطه بقعة بظورية. تألف الأوامر للمساة وتقترب من الساكن الملهة. قنبا الضربات الصغيرة. تسرح في النهار. يباتها الضوي يسمر نحو حبة اشهر. مكذبها صلبة لبطوية الشكل تحركها تحت الحجارة. تعيش الأنثى إلى حين. تجمع المكان وتخصه.



سميقي



سنا مزهار



سنا سكي



سنحة مبدولة

ويعيش الذكر الـ حين يكوم الاثني التي تنقي عليه ||
عشيرة من الدواب المقيمة .

Emeri (F). - سَنَبَدَج ، سَنَبَدَج (F).

Emery (E).
سموق شديد الصلابة ينجم عن تحطيم القرند يستعمل في
صقل وحت وتبك المادن والاخشاب .

Place (F). Ton (E). - سَنَبَك

من اجزاء الحافر عند الخيل .

1٤٢٦٨ - سَنَبَل

هو الثاويين ، اطله ، مه الازرق والحداقي والاطليبي .

1٤٢٦٩ - سَنَبَل هِنْدِي هو اذخر مكى ، اطله .

1٤٢٧٠ - سَنَبَك ، سَنَبَك ، سَنَبَل

Epi (F). Ear of corn (E).

هي ثورة بعض النباتات انحصها النجيلية . والسنبلة
مجموعة من السليلات المتتابعة المركزة على محور واحد .
اما السنبلة فهي وحدة التزير وقد تكون زرية أو شعية
التجميع . ثمارها صوب جافة .

Epiage (F). Earing of grain (E). - سَنَبَك

راجع اسبال .

1٤٢٧٢ - سَنَبَك

شعية من النجيل تعرف بالنجيل الازرق . اطله .

Epi (F). Spica (E). - سَنَبَك

نجم لير من برج المدراء يعرف بالسالك الازل ، اطله .

Cymbula (S). - سَنَبَلَة

Cymbula (F). Cymbula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الايل
وفصيلة السيلوليات . انواعها المرفوعة ثلاثة اعطائها البحر
الايبي المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي انحصها
الجنوبية || اصداها غسرية الماء ، اهلجية الشوزن ،
شالكة الاطراف ، شالقة . اجسامها شالقة ، صغيرة
الزروس ، ثنائية القواطع واليمين ، وبيدة الاعظام .
زمانها مسطحة رقيقة ، بيضية الشوزن || تسع وتقوم
على ظهرها ، بطونها موجهة نحو سطح الماء .

Cymbulidae (S). - سَنَبُولِيَّات

Cymbulidae (F). Cymbulidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الايل .
اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد ، منتشرة في جميع بحار
البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها صغيرة ، اهلجية
الشكل ، معتدلة التنطيط ، غسرية الماء ، متجانسة
المصاريع ، مسطحة الزانفت اي الاربدة المسطحة
البيضية الشوزن || اعرف اجناسها واشهرها السنبولة .

1٤٢٧٦ - سَنَك حَسَكِيَّة ، سَنَك هَالِكِيَّة

Exercice (F). Financial year (E).

هي في الاصطلاحات الحاسبية حساب السنة من المدة
التي تنقضي بين حسابين متتابعين || وهي في الاصطلاحات
المالية حساب المدة التي تنقضي بين ميزتينيتين .

Année-lumière (F). - سَنَك هَوِيَّة

Light-year (E).

السنة الضوئية هي المسافة التي يجتازها الضوء بمدة ٣٦٥
يويا بمعدل ٣٠٠٠٠٠ كيلومتر بالثانية . وقد تبلغ نحو
عشرة آلاف مليار كيلومتر .

1٤٢٧٧ - سَنَبَاعِيَّات

Hypocraeasae (S). Hypocraeasae (F). Hypocraeasae (E).

عمارة فلور مجهرية من فصيلة المشويات ورنية الزرقوت .
تتميز باصنافها البنية الزاوية الالوان || اجناسها
عديدة تختلف باختلاف مثل البرغ وشكل الوثبية وما
تصله من اصناف || افرها من الوجهة الزراعية
الاقتصادية الاجناس التالية : الرءاء ، الماكوب ،
المروحة ، الهوم ، القصبية ، القنار ، الحجة ،
الهكة ، التوبة والوثبة .

1٤٢٧٨ - سَنَك * ، كَابِير ، كَابِيرُوس ، صَاد

Tapirus (S). Tapir (F). Tapir (E).

جنس حيوانات برية من فصيلة السناديات . اولاه خمسة
منها واحد اسوي واربعة امريكية . جميعها كبيرة
الجلقة القصصة ، طليقة الفراس والخطم الذي يشبه الخرطوم
القصير . ثوبها ابيض اللون ، اذنها صغيرة مستقيمة ، ذيلها
بالط القصير || اختلافها حية تعيش في المناطق والاحراج
الكثيفة قوتها الاعشاب ويولدو النبات .

1٤٢٧٩ - سَنَكِيَّات

Tapiridae (S). Tapiridae (F). Tapiridae (E).

فصيلة حيوانات برية وحيدة الجنس تتميز بفخامة الجفة
وطول الخطم وصغر الاذن وقصر الذيل . قوائمها ثلاثية
الاصابع الخلفية .

Gompholobium (S). - سَنَالَة

Gompholobium (F). Gompholobium (E).

جنس نباتات برية جنبة وعضية معمرة من البذراريات
وفصيلة القرنيات الفرافية . انواعها المرفوعة نحو ١٢
منها بعض مناطق استراليا || اوراقها صغيرة النصال
متقابلة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها محورية
الارتكاز او تاجية ، عطرية العرف ، منها الايبس
والاصفر والوردي والايواني || اوراقها وازهارها جمالية
لذيذ الماشية وقد تسب لها التسم ولوت .

1٤٢٨١ - سَنَكَم

Bosse (F). Boss, Hump (E).

حبة في ظهر البير وهي كتلة دنية تعلو السلسلة
القفيرية يستند منها الجمل ما يننيه عن الطعام اذا خلا
جوفه من الغذاء .

1٤٢٨٢ - سَنَكَم

Basifuge (F). Basifugal (E).

امت تعريفه يطلق على كل نبات هامى النوة فقط .

1٤٢٨٣ - سَنَكَاكَة

Production alternative (F). Alternative produce (E).

صفة الاتجار المتناوبة الحمل كالزيتون .

1٤٢٨٤ - سَنَكَن الرَقِي

Lance d'arrosage (S). Sprinkling spear (E).

جهاز يوضع في طرف القنصل أو التبريج لضبط الماء
وتوجيه رشه .

1٤٢٨٥ - سَنَكَانِي

Lancéolé, Lanciforme (F). Lanceolate (E).

ما كان شكله كالسنان .



سناد

* ١٤٢٨٨ - سنجاب النخل

Sclurus palmarum (S). *Ecureuil palmiste* (F). *Palm squirrel* (E).

نوع من السنجاب صغير القذ طولهُ نحو ١٥ سم. وذنبه ١٢، ثوبه ألٍ الصبغة البهلاء ملوهُ ثلاثة خطوط يمش تقطبه من النقرة إلى الذنب ٥ موطه الحث. يألف الأشجار المثمرة أعصها النخل ويقترُب من الأماكن الآلة.



سنجل

Sclurus indicus (S). * ١٤٢٩٠ - سنجاب الهند

Ecureuil de l'Inde (F). *Indian squirrel* (E).
نوع من السنجاب الكبير القذ طولهُ نحو ٤٥ سم. وذنبه ٤٠، ثوبه متعدد الألوان رأسه واذنهُ وصقهُ وأبطلهُ إلى الجلاوة القنزعية للواج. ظهرهُ وذنبهُ وبرازهُ سود. يملك إلى الصغرة الثنية ٥ يألف الإحراج الكثيفة يسرح في البُار. قوته البُار والمعاد البناية.



سنجاب النخل

* ١٤٢٩١ - سنجاب شائع

Sclurus communis (S). *Ecureuil commun* (F). *Common squirrel* (E).

نوع من السنجاب موطنه فصح أفسح الأرباب يمتد من أقاصي الشرق إلى أطراف أوربة. جسمه مستطيل لشكل يبلغ نحو ٢٥ سم. وذنبه ٢٢ سم. ثوبه ألٍ الصبغة الصبانية، صدره ويقله إلى البياض. فرائضه مستعنة شائعة الاستعمال.

Scluridae (S). * ١٤٢٩٢ - سنجابيات

Scluridae (F). *Scluridae* (E).
فصيلة حيوانات لبنة قاضية تشغل عدة أجناس والنبه من الأنواع. أعرف أجناسها السنجاب، الجلمج، والتامبه والمظفل والمربوط والبلطش والبستينوس والبيريس. جميعها مستطيلة الأجسام والأذنان، ملوكة الجراط العليا موطنها العالم. تألف الثبات والأسراج. تتسلق الأشجار، قوتها البُار وتفضل المواد البناية.



سنجاب شائع

* ١٤٢٩٣ - سنجابيات الشؤوب

Sclurimorphes (F).
مرتبة حيوانات لبنة من رتبة القوافم تشغل ثلاث فصائل السنجابيات والحاروديات والهيريات.

* ١٤٢٩٤ - سنجة

Centrospora (S).
جنس فطور مجهرية من الرينديات وفضيلة الطعيات. يتميز بكتانه المستطيلة الملب، المحببة الشكل والقرنوية اللون ٥ يظفل على الأوراق فيقرها ويل البُار فيملها قبل ادراكها ٥ أنواره للمروقة أثنان:

Centrospora acerina (S). سنجة الأسفندان

Centrospora bromi (S). سنجة البرون

* ١٤٢٩٥ - سنجة

Bigarrure (F). *Motley* (E).
أجناع الأشكال والألوان دين رابط أو قواس.



سنجة

* ١٤٢٩٦ - سنجلة

Anergia (F). *Anergy* (E).
السنجلة أخطاء عوارض الالتهابات.

* ١٤٢٩٧ - سنجوس

Pachycephalus (S). *Pachycephalus* (F).
طائر من الجواثم سنابات المنقتر يتسلى إلى فصيلة المهرجات. موطنه يمتد من العراق إلى ماليزية ٥ يحوي سوطاً وعضابها في طلب القوت. قوته الحشرات والبرور وآثار البانة.



سنجوس

* ١٤٢٧٨ - ستروزوم
هو الجسم المركزي الجبري في الحيوان والخلوي في النبات.

* ١٤٢٧٩ - ستروزوم هي العملية، أمليها.

* ١٤٢٨٠ - سترونين

Santonine (F). *Santonin, Santoninum* (E).
جهر نعال يستخرج من عثف أنوار الشج أعصها الشيمان. وهو من المواد الطبية الشائعة الاستعمال.

* ١٤٢٨١ - ستيفراد
مقسوم إلى مئة درجة.

* ١٤٢٨٢ - ستيفرام

Centigramme (F). *Centigram* (E).
الجزء الواحد من أصل مئة جزء قسم عليها الفرام.

* ١٤٢٨٣ - سنثيل

Scintilla (S). *Scintille* (F). *Scintilla* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرنويات صفيحات إجلاليم فضيلة اللوليات. أنواره الممروقة نحو ٥٠ منتشرة من خط العرب إلى خطوط الهند وجزر ألبانيا ٥ أصدانها يبقية الشوزن، ولحمه اللين، ثالثة المصارع، مالة السطوح جميلة الألوان الزائفة.

* ١٤٢٨٤ - سنليلتر

Centilitre
الجزء الواحد من أصل مئة جزء قسم عليها الليتر.

* ١٤٢٨٥ - سنلومتر

Centimetre (F). *Centimetre* (E).
وسدة قياسية مربعة تساوي جزء من أصل مئة جزء الذي يتألف منه المتر. والسنلومتر يقسم إلى عشرة مللومترات.

* ١٤٢٨٦ - سننج، سننج

السنج والسنج هو الثياب، أمليها.

* ١٤٢٨٧ - سنجاب

Sclurus (S). * ١٤٢٨٨ - سنجاب القاب
Ecureuil (F). *Squirrel* (E). *Eichhörnchen* (D).
جنس حيوانات لبنة قاضية من فصيلة السنجابيات. أنواره نحو ٧٥. جميعها صغيرات القذ، مرقعات الجواش. ولها الذئاب طوالب جيليات الصوف. تألف الإحراج والقابات. تتسلق الأشجار بسرعة وخفة. قوتها المواد البناية. تفضل البُار والقرنيمات والزولي. يقال أنها تستلذ بيش الصائير ٥ ترتب أجناسها في صنف الأشجار، مداخلها من الشرق وغارها من الغرب. أناتها تقسم من ٣ إلى ٦ أصداس تبصر يد وضها بانبسور ٥ أعرف أنواره وأشهرها ما يلي.

* ١٤٢٨٨ - سنجاب القاب

Sclurus vistrisus (S). *Ecureuil des jungles* (F).
نوع من السنجاب صغير القذ طولهُ نحو ١٢ سم. وذنبه كذلك. ثوبه ألٍ الصبغة الصبانية ملوهُ ثلاثة خطوط صفر تقطبه من نقرة الرأس إلى طرف الذنب ٥ موطنه سرينديب. قوته البُار. يقترُب من الأماكن الآلة ويدخل المساكن في طلب السكاكر والخلويات والبيض.

من أي نوع كانت ان سنية او غيرها ، او مستأجرا ومن الواجب ان يشتمل على كل شروط عقد النقل .

١٤٣٠٨ - سَنَدٌ ثَلَاثِيٌّ (E). Triptych (F).
هو من السندات الخاصة التي يصرح بها اشتراء بعض الاشياء وقتياً . انحصا السندات على ان يصاد تصدير امثالها .

١٤٣٠٩ - سَنَدٌ قَائِلُ الْإِسْتِزَالَةِ Obligation amortissable (F). Redemnable obligation (E).
هو السند الذي يمكن تسديد قيمته من طريق الاستهلاك .

١٤٣١٠ - سَنَدٌ قُسْطُ التَّأْمِينِ Billet de prime (F). Bonus bill (E).
هو سند أذني يلزم به المؤمن ان يدفع الى المؤمن قسط التأمين في يوم يتفقان عليه .

١٤٣١١ - سَنَدٌ حَامِلُهُ Billet au porteur (F). Bill to bearer (E).
سند يلزم موقه دفع مبلغ معين من المال في موقه معلوم الى أي شخص كان يحمل هذا السند .

١٤٣١٢ - سَنَدٌ لَدَى الْإِطْلَاعِ Billet à vue, B. à volonté (F). Bill payable at sight (E).
سند يلزم موقه ان يدفع الى شخص سمي او لأذله مبلغاً من المال بمجرد تقديم السند اليه .

١٤٣١٣ - سَنَدٌ مُرَوَّرُ Passavant (F). Passe, Permit (E).
سند بيان بضائع خاصة لرسوم جمركية او ضرائب غير مباشرة تفق منها في مرورها الى وقت معين ومن مصلحة محددة .

١٤٣١٤ - سَنَدٌ مُتَدَوِّرُ الْفَدَاوِيلِ Effet négociable (F). Negotiable bill (E).
من السندات التجارية المتداولة بالتحويل والتعامل بها . تحوّر في صيغ خاصة وتكون قيمتها وأجهاه الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد اجل قصير .

١٤٣١٥ - سَنَدٌ مُتَصَرِّفُ Effet bancable (F). Bankable bill (E).
هو السند الذي يحمل جميع الشروط المطلوبة لحسمه من البنك .

١٤٣١٦ - سِنْدَارِيَّةٌ * ، دُوَيْبِرِيَّةٌ * Deuterophoma (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يتشيز بيكتيداته الحبيبة التركيب ، الموضوعة التي ، الخالية من الوثيمة الظاهرة . يوفاته قائمة عند اطراف المشع الذي يلفف جيل البيكتيد الداعل الى لونه الوحيد المعروف والمندوس حتى الآن هو الغالي .

١٤٣١٧ - سِنْدَارِيَّةُ الْحَمِيَّاتِ * ، وَهْمٌ سِكْتُو Deuterophoma tracheiphila (S). Mal sacco (F).
فطر مجهري يصيب البسوت الحامض والارنج . مظهره الخارجي جفاف فباني يحمل بعض الانداز بعد استفرار وذيل اوراقها ببقية جفاف الماء وانحراف لون المادة الخشبية نحو الجوزة الزائفة ثم السرة القائمة || يكالغ بتقليم وحرق الاجزاء الموصوبة وتطهير الجروح .

ملحبه الخيالي جامي . جماعته متصلة السند || جسمه صغير القند بطول نحو ١٨ سم . رأسه كبير الجرم ، متقارع مستد الحجم ، ضلع . جناحه ذلقان . ذنبه مسطيل الشكل ، منطوّم الطرف . ثوبه الى الشقعة السوداء تيقن في الرأس ولرءاء وتغير في البطن . زوره حاجي اللون يطوقه حمار اسود يمتد من قاعدة الشقار الى العين فالمنتق فأمل الصدر . ايلابه منشفة بالاعبر . متقارع ورشاء واصابعه الى السرة القائمة || يدن منه في الاشجار الرقيقة . الاثني تحفن وسدما من ٤ الى ٥ بيضات . الاكر يتن ها الفداء .

١٤٢٩٨ - سَنَخٌ هو الغثروب ، اطليه . ج اسنخ .

١٤٢٩٩ - سَنَخٌ Collet (F). Collier, Neck (E).
السرخ هو الأصل . وهو الجزء من الجذع تقدره التربة . ج اسنخ وسوخ .

١٤٣٠٠ - سَنَدٌ Obligation
كل التزام قانوني يرتكز على عقد رابط .

١٤٣٠١ - سَنَدٌ Billet (F). Bill (E).
كل ورقة مكتوبة تحتوي على التزام يدفع مبلغ معلوم من النقد .

١٤٣٠٢ - سَنَدٌ ، مُسَكَّنَدٌ Titre (F). Bond (E).
هو المحرر الذي يوضح فيه للعدل القانوني او للعد المحامي الذي يحدث آثاراً قانونية كسند الدين وسند الملكية . والسند صيغ عديدة ، أشهرها :

سند إذني Titre à ordre (F).
سند اسمي Titre nominatif (F).
سند إطلاق تصرف الدين Titre paré (F).
سند إشتراي Titre reconnaît (F).
سند أولي Titre primordial (F).
سند تطليقي Titre excusatoire (F).
سند حامله Titre au porteur (F).
سند وهمي Titre putatif (F).

١٤٣٠٣ - سَنَدٌ إِذْنِي Billet à ordre (F). Bill payable to order (E).
سند يصعد من موقه بان يدفع الى شخص آخر مبلغاً معلوماً بعد اجل قصير لدى الاطلاع على السند .

١٤٣٠٤ - سَنَدٌ الْخَوَّلُ ، سَنَدٌ هَبَاكِينِ Warrant
سند أذني يثبت بموجبه دفع بضائع موقه في الخازن السوية .

١٤٣٠٥ - سَنَدٌ الرَّهْنِ الزَّرَاهِي (F). Warrant agricole (F). Agricultural warrant (E).
سند أذني يذنه الزارع الى دائته يثبت به انه رهن له دين تقليه من الحيازة سبتجات زراعية او حتاداً صناعياً ومخاميل ومأرا او عقارات بالقيمة او بالتخصيص .

١٤٣٠٦ - سَنَدٌ الرَّهْنِ الْعَقَارِي Cédule hypothécaire (F). Mortgage schedule (E).
سند مظهر اقتدال كالأوراق المالية يدل على قيد الدين على العقار في السجل العقاري .

١٤٣٠٧ - سَنَدٌ الْفَحْنِ ، لَدَى كَرَةِ الشَّحْنِ Connaissement (F). Bill of lading (E).
إيصال بالضائع لشحونية يقسمه صاحب الشاحنة ،



سندارية الحميات

الاصابع || جسمها صغير لثقله يطول من ١٢ الى ١٥ سم. رأسها مخروطي الشكل. عينها لوزيانية صغيرة. اذناها تختلعا النشأ السوراني الاسمر الغلاف. منها مستعدة القصر والخنقة. ذنبها مستقيم الطول، سريع الانقسام. ثوبها الى الصلبة الخشبية تلوحا رقيقة بمراء وتغطي الجير. ساقها ثوبها كثيف بالفصولة اي انها تلتصق المحيط المحيطة المحيطة فيه || الاذن اكبر قليلا من الذكر ولها ثوبها من ح. تعيش من ٤ الى ٨ يضيأت فطرها في الموائل الجنوبية المرض || تألف الرياح وكثيرا الرمل. تعيش في انفاق تحتلها بين جذور النبات. تسرح في النهار ويبيت في الليل. قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والباب والهامم || تعتبر من الزواقات النافعة.

١٤٣٧٥ - سبتيان الأزغب هو السبتيان الاصفر، اطلبه.

١٤٣٧٦ - سندبادان بطلوط Quercus (S).
Chêne (F). Oak tree (E). Eiche (D). Quercus (I).

جس اجار حرجية من فصيلة السبتانيات. انواعها زهاء ٣٠٠ معظمها اجار كبيرة دائمة. اشجارها صلبة صناعية. اوراقها جامدة جلدية. ثوبها بلوطية حلقة. قشور بعضها فولية واوراقها دباغة || اشهر انواعها ما يلي.

١٤٣٧٧ - سبتيان ابيض Quercus alba (S).
Chêne blanc (F).

شجرة جامدة مهددة ارمكة الشالية. طولها من ٢٥ الى ٣٠ م. ساقها بيضاء اللحاء. ثوبها حلقة تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٧. ثوبها ثلاثي او رباعي التفضيص الجانبي، ازغب الصلبة السلي، ابرط العليا. لونه يتغير مع العمر من الاصفر الباهت الى البنيجي || ثوبها صغير الحراشف. بلوطها طري القشور والباب.

١٤٣٧٨ - سبتيان احمر Quercus rubra, Q. borealis (S). Chêne rouge (F).

شجرة شريفة طولها من ٢٥ الى ٥٠ م. ثوبها وزينها جلوية اللون. اوراقها تطول نحو ٢٢ سم. وتعرض ١٥. ثوبها مستعرض التفضيص، واسع الاطراف، جامد اللينج اللامع الذي يتغير من الخضار الباهت الى الاحمر الجلوية || ثوبها في الشكل مثل الحراشف. بلوطها كبيرة، حلقة، لها الى الحرة السوداء.

١٤٣٧٩ - سبتيان اخضر Quercus ilex, Q. Ballota (S). Chêne vert, Yew, Ballota (F). Evergreen oak, Holly oak, Holm oak, Ballota oak (E). Stechelche (D). Eice, Lccio, Lecina, Quercus verde (I).

نوع شريفي كثير الحشوب يربط في الالة الكلكية. اجارها طولها من ٢٠ الى ٢٥ م. اربابها فلسة. ساقها حلقة اللحاء الصلبة الكلكية. اوراقها حرة، لاقامية الشكل واللينج، ثوبها حلق الحشور اللامع، مره، تد من ٦ الى ١٠ اذواج || ثوبها بجمرة اللون، زينة الحراشف المتراكمة.

١٤٣٨٠ - سبتيان الأزغب Quercus lanuginosa, Q. pubescens (S). Chêne pubescent (F).

شجرة جامدة تربط في الاراضي الكلكية. طولها ٦

Utricularia (S).
Utricularia, Lentibularia (F). Bladder-wort, Hooded water milfoil (E). Wassenschlauch, Grosser wasserhalm (D). Utricularia, Erba vassica (I).

نبات عشبي بري مائي من فصيلة السبتانيات. جلوده حرجية، ساقه طرية. اوراقه مركبة ريشية عيطة. اثماره فردية او مضوية تتجمع وتتركز على السراخ. لها يختلف مع الانواع ثوبا الاصفر والاحمر والاذرق.

١٤٣٨١ - سندبادان Lantibularia, Utricularia (S). Lentibulariades, Utriculariades (F). Lantibularia, Utricularia (E).

فصيلة نباتية من مزدوجيات الفلقة، قليلة الاجناس والاثوار جميعها من النباتات المائية التي تعيش في غمرة الماء او تطفو على سطحه. اشهرها السندباد.

١٤٣٨٢ - سندباد Thibaudia (S).
Thibaudia (F).

الواحدة سدرة. جنس شجيرات برية وفردية من فصيلة الخنثيات. انواعها المعروفة نحو ٤٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية من المابين للقدم والجلد || ساقها فروعها طولها من مترين الى اربعة امتار. اوراقها متعاقبة، سنالية الاتصال الجامدة القامة. اثمارها نسي الجسم، محوري الايتكان. اثمارها جملة الشكل، عديدة اللون. جميعها الى الحرة المتفاوتة التفضيص والملاجيح.

١٤٣٨٣ - سندباد Thibaudia (S).
Thibaudia (F).

شجرة حرجية وسيدة الجلس والنوع من السرويات. مهدا جبال الاطلس. ساقها فروع كثيرة البعد القرية.

بلوطها لينة، طولها من ٥ الى ١٥ م. ثوبها حلقة. اوراقها ضيقة، رباعية، حرة. اثمارها كروية طولها يراوح من ٨ الى ١٢ م. جراتها اربع خير متساوية القد || يستخرج منها صمغ السندباد المشهور. اشجارها فاخرة الصنف طرية اللون.

١٤٣٨٤ - سندباد Callitris (S).
Callitris (F). Arar tree (E). Echter schmuckzapfen (D). Callitris (I).

جس اجار وشجيرات حرجية من السرويات. انواعها نحو ٢٥ ساقها طولها من ٤ الى ٢٠ م. اثمارها كثيفة تتجمع. اوراقها فلسية الشكل، حرة. اثمارها وسيدة اللق والسكن. اثمارها شبه كروية، سدلية او ثمانية الجراحتات الشفيرة الشكل، الخددة. يزورها اهلجية وسيدة الجناح || يستخرج من بعض انواعها صمغ السندباد الذي يشبه صمغ السندباد ويستخدم استماله. لها اجار خنية بالظان. اشجارها راحة، جيدة الصنف شائعة الاستعمال الصناعي.

١٤٣٨٥ - سندباد Pammodromus (S).
Pammodrome (F). Pammodromus (E).

حيوان يربط من البطاء وفصيلة السقايات تاتيها الاسنان، مكثيات الالسة الحرجية، ولبايات الثوم، خاصيات

١٤٣٨٦ - سندباد Pammodromus (S).
Pammodrome (F). Pammodromus (E).

حيوان يربط من البطاء وفصيلة السقايات تاتيها الاسنان، مكثيات الالسة الحرجية، ولبايات الثوم، خاصيات



سبتيان



سندباد



سندباد



سندباد



سندباد



سبتيان اخضر



سندباد ازغب

الحراثة. ثلثو من ١٥ إلى ١٥ م. ساقها لمساء اللحاء. بتانقها مبرحة. أوراقها حرة، بيضية، مسنة الزام الاخير. نصلها جامد النسيج، بحري الخضار، خلي الصفعة السفلى، يطول من ٧ إلى ١٥ سم. ويعرض من ٣ إلى ٦ || تقرونها خلي الحراشف الدقيقة. بلوطها مستطيلة.

١٤٣٣٧ - سيتيكان بلانج، بكتنج

Quercus coccifera (S). *Chêne kermès*, *C. cocciné* (F). *Kermes oak*, *Scarlet oak* (E). *Kermes alch*, *Kermesbaum* (D). *Quercia della cocciniglia*, *Quercia del kermes* (I).

شجرة دقلة مهدها حوض البحر المتوسط تكثر في الاراضي الكلسية، ثلثو من ١٥٠ إلى ٤٠٠ سم. أوراقها حرة، احليلجية، ذلقة، تطول من ٢ إلى ٦ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٥ سم. نصلها صلب النسيج المائل للاع، لونه ا الخضر الزاوي، حذاه مفرس الحافة، فسح الاضلاع، شالك الحلب || تقرونها شالك الحراشف المتراكبة. بلوطها لاس قشرة الحظيلة يطوى توضيح عايق.

١٤٣٣٨ - سيتيكان عصصكي النمر

Quercus conferta (S). *Chêne à glands fasciculés* (F). شجرة سريرية جميلة الشكل ثلثو من ٣٠ إلى ٥٠ م. أوراقها حاملة مستطيلة، نصلها متواج الصفعة. خلي لشيرة السفلى. نصوسه عديدة، متقاربة، ضيقة الاضلاع || تقرونها قلنوسى الشكل، قليل العمق، متراكب الحراشف النقية القوية. بلوطها تطول نحو ٣ سم. يطوها نسيج مستطيل عايق. ثمارها ثنائية او ثلاثية التجميع.

١٤٣٣٩ - سيتيكان روسي، مكلول

Quercus aegilops (S). *Chêne vilani*, *C. aegilops* (F). *Valonian oak*, *Valani oak* (E). *Knoper eiche*, *Valonian eiche* (D). *Quercia da concia*, *Q. della vallois* (I). شجرة سريرية مهدها الشرق الأدنى ثلثو من ٢٠ إلى ٢٥ م. أوراقها حاملة، بيضية، مسنة الزام الاخير، تطول من ٦ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٣ إلى ٧. نصلها جامد النسيج، منشاري الحافة || تقرونها كبير اللد مستطيل الحراشف شائع الاستعمال في البهاية والصباغ.

١٤٣٤٠ - سيتيكان شوشور * ، سيتيكان الفلين

Quercus suber (S). *Chêne liège*, *Surfer* (F). *Cork oak*, *Cork tree* (E). *Kork eiche*, *Korkbaum* (D). *Quercia sughero* (I). شجرة جامدة مهدها بعض مناطق حوض البحر المتوسط. يتكرر ويوجد في افريقية الشالية، ترطب في الازربة القرية. ثلثو من ١٥ إلى ١٥ م. خام ساقها شجيرة قوية القرية. يتفرج منها الفلين. أوراقها حرة، داخلة الخضار، تطول من ٣ إلى ٦ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٤٠ م. نصلها يضي الشكل جامد النسيج، امروا الصفعة العليا المايقة الخضار، اذنب السفلى الطلاء اللين. حروته من ٥ إلى ٧ ازواج || تقرونها غروطي الشكل اطول الحراشف القصيرة المستعرضة. بلوطها متوسط اللد، مدبب الشلام.

١٤٣٤١ - سيتيكان صباغي

Quercus tinctoria, *Q. velutina* (S). *Chêne quercetron* (F). شجرة سريرية ثلثو من ٢٥ إلى ٣٠ م. بتانقها وزيتاتها خفيفة، زبد الليفة، صفراء اللين. أوراقها تطول

الى ٢٠ م. جلدها وكلي. ساقها عذاه متعرجة. قهوها مسطحة، خنقة، سواد اللين. اثنائها وبتانقها زبد اللحاء. أوراقها حاملة، خلية الصفعة السفلى، تطول من ٥ إلى ٨ سم. وتعرض من ٤ إلى ٦ || تقرونها صير اللد، مدبب الحراشف الشاككة. بلوطها دقيقة، مستطيلة، مدووجة، سادة الشلام الاسود.

١٤٣٤١ - سيتيكان أسود

Quercus ferruginea (S). *Chêne noir* (F). شجرة ريفية مهدها ايريكية الشالية. ثلثو من ١٥ إلى ٢٠ م. أوراقها كبيرة اللد تطول نحو ٢٢ سم. نصلها ثلاثي او خماسي التجميع، جامد النسيج، جلدي الحار، خلي الصفعة السفلى || تقرونها يضي الشكل. بلوطها صغيرة اللد، ايرية الشلام.

١٤٣٤٢ - سيتيكان آسي الورق

Quercus myrsinaefolia (S). *Chêne à feuilles de myrte* (F). شجرة سريرية مهدها اليابان. ثلثو من ١٥ إلى ١٥ م. ساقها مسطحة اللحاء. أوراقها حرة، احليلجية، آسية، تطول من ٤ إلى ١٥ سم. وتعرض من ٢ إلى ٤. نصلها غائر المروك امروا البشرة. بحري اللين.

١٤٣٤٣ - سيتيكان أشعر، سيتيكان تركي، لك

Quercus corria (S). *Chêne chevalin*, *C. de Bourcogne*, *C. lombard*, *Cerra*, *Doudier* (F). *Iron oak*, *Mossyup oak*, *Turkey oak* (E). *Zarzelche*, *Turkische eiche* (D). *Quercia cerro*, *Cerro* (I). شجرة سريرية مهدها الشرق الأدنى واروپة ثلثو من ٢٠ إلى ٣٥ م. أوراقها حاملة تطول من ١٥ إلى ١٤ سم. وتعرض من ٤ إلى ٦. نصلها جامد النسيج، عايق الخضار البحري، رياضي او سداسي او ثنائي التجميع. حروته الرئيسية تد من ٦ إلى ١٥ ازواج يتخللها اصابع متعرجة بيضاء || تقرونها قوي الحراشف المشبة الحظيلة البشرة.

١٤٣٤٤ - سيتيكان القورق * ، عذور

Quercus alata (S). *Chêne starle* (F). شجرة سريرية حربية الشكل ثلثو من ٢٠ إلى ٢٥ م. يقال ان مهدها الجزائر وهي مبلولة في بعض جرد جبل وادنتين من تينان. أوراقها حاملة تطول من ٨ إلى ١٥ سم. نصلها جامد النسيج، مفروض الصفعة المستديرة التجميع، تقرونها اطول اللين غروزي الحراشف الحظيلة البشرة. بلوطها كبيرة اللد طويلا نحو ٤ سم. وقطرها ٢.

١٤٣٤٥ - سيتيكان المكس، س

Quercus lusitanica (F). *Chêne à galles*, *C. du Portugal*, *C. des teinturiers* (F). *Dyer's oak*, *Gall oak*, *Nut gall oak* (E). *Eiche gallische*, *Galläpfel eiche* (D). *Quercia della galla* (I).

شجرة سريرية مبلولة، ضيقة اللوحة، متصبة القروغ ثلثو من ١٥ إلى ٢٠ م. اثنائها وبتانقها خلية اللحاء. أوراقها حاملة تطول من ٥ إلى ١٥ سم. نصلها يضي الشكل مفروض الحافة، ضيق الاضلاع، خلي الصفعة السفلى، اتعسر العليا || تقرونها مدبب الحراشف بلوطها مستطيل الشكل، مدبب الشلام.

١٤٣٤٦ - سيتيكان بحري الورق

Quercus glauca (S). *Chêne glauque* (F). شجرة سريرية مهدها اليابان ترطب في المناطق المعتدلة



سيتيكان افراز



سيتيكان صبور

جماد النسيج ، سنن الحافة ، حروف متزاوية الخطوط
عدها يراوح من ٨ الى ١٢ زيباً كل واحد منها يتصل
بسن || تقربها اطليحي الحرافش . بلوطها طويل
نحو ٤ سم قطرها ٢ سم .

١٤٢٤٨ - سِتْدِيكَان لَاطِيهِ الزَّهَر *

Quercus sessiliflora (S). *Chêne sessile*, C. à crochets, Rouvre, Durin (F).

نوع سبروتي عديد الثروب يطول من ٢٠ الى ٣٠ م.
اوراثها مستطلة لا لذنية . نصلها ساهي او ثنائي التخصيص ،
خلي البشرة حل صفحت البقل || تقربها حاد الاذان ،
حقيق الحرافش المتراكبة . بلوط سوي اللون الخلي ،
مليس الشلام .



سِتْدِيكَان كَسْتِي الزَّهَر

١٤٢٤٩ - سِتْدِيكَان لَيْبَان *

Quercus libani (S). *Chêne du Liban* (F).

شجرة سبروتية مهدها جبال لبنان تملو من ١٠ الى ١٢ م.
اثنائها صغيرة اللد لونها الى الصفار الخلي . اوراثها
عابطة تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ .
نصلها جماد البشرة ، مشاري الحافة ، حاقب الصفعة
العلماء القديمة الخضر ، باحت البقل الصفراء الموج .
تقربها يضي الحرافش الجلمدة الحليمة .



سِتْدِيكَان لَاطِيهِ الزَّهَر

١٤٢٥٠ - سِتْدِيكَان صَاقِي *

Quercus aquatica (S). *Chêne aquatique* (F).

شجرة جمادة ترطب في للمواقع القريبة قرب مجاري الماء .
تعلو من ١٥ الى ٢٥ م . اوراثها صغيرة اللد ، قصيرة
العتق ، مفرصة . نصلها يطول من ٤ الى ٨ سم . وهو
اسرط البشرة حل صفحت || تقربها صاهي الشكل .
بلوطها غليظة ، قصيرة ، حادة الشلام .



سِتْدِيكَان لَيْبَانِي

١٤٢٥١ - سِتْدِيكَان صَدْبَب الزَّوْك *

Quercus acuta (S). *Chêne à feuilles aiguës* (F).

شجرة سبروتية مهدها الشرق ، ترطب في للمناطق الجنوبية
المستوية . تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . اوراثها حرة ،
ليضية ، مديبة اقزام الاخير . نصلها عادم التسنين يطول
من ٧ الى ١٤ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . يلو احمل
اللون كليل الزغب ثم يتحول الى الخضر الاصفر .
تقربها متراكب الصفات الحرفية البقية .

١٤٢٥٢ - سِتْدِيكَان صَرْبَكِي *

Quercus mirbecki (S). *Chêne de Mirbeck*, Zâne (F).
Overcup oak, Mirbeck's oak (F). *Quercus alba* (D).
Quercus alba aquatica (F).

شجرة سبروتية ترطب في المناطق المنخفضة لشجرة نحو
الحارة . مهدها افريقية الشالية واسباهي . تعلو من ٣٠
الى ٣٥ م . بانقتها زاء . اوراثها عابطة . مستطلة .
نصلها جماد النسيج مفصص الحافة || تقربها جامد
الاذان ، ثخين الحرافش القصيرة .



سِتْدِيكَان مَرْدَة

١٤٢٥٣ - سِتْدِيكَان مَرْدَة * ، سِتْدِيكَان صَاقِي ، وُور *

Quercus pedunculata, *Q. robur* (S). *Chêne pédonculé*, Roure, Gravolin (F). British oak, Female oak, Red oak (E). Steifeiche, Rozeiche (D). Rouvre, *Quercus pedunculata* (I).

نوع سبروتي عديد الثروب . اثمار حرة الشكل تعلو
من ٣٠ الى ٥٠ م . اوراثها عابطة مستطلة طويلة الزناد .
نصلها رباعي او خمسي التخصيص ، ازغب البشرة يلو
اخضر اللون ثم يتحول ويظهر ان ينعني بالاجر .
تقربها عجب الحرافش الصغيرة .

من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٥ . نصلها
جماد النسيج ، سنن الحافة ، فسح الاضلاع ، خلي
الصفعة البقل || تقربها قلنسوي الشكل . بلوطها
صغيرة وصغيرة لونها الى السرة الحليمة .

١٤٢٤٧ - سِتْدِيكَان صَفصافي الزَّوْك *

Quercus phellos (S). *Chêne saule* (F).

شجرة رقيقة ترطب في للمناطق الجنوبية وفي الاراضي للمستوية
الانماج السميكة الثروب . تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م .
اوراثها مستطيلة مديبة اقزام الاخير ، حسيكة البقصة .
نصلها يطول نحو ١٠ سم . ويعرض ٢ سم . وهو اسرط
البشرة حل صفحت . يلو اخضر اللون وينتهي ، في
الخريف ، الى الحمرية الصفراء الموج || تقربها
قلنسوي الشكل ، دقيق الحرافش ، لونه الى الجلمة .
بلوطها صغيرة اللد ، سراه اللون .

١٤٢٤٣ - سِتْدِيكَان صَيْبِي *

Quercus chinensis, *Q. variabilis* (S). *Chêne de Chine*, *C. variable* (F).

شجرة جمادة مهدها الصين ترطب في للمواقع الباردة تعلو
من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراثها عابطة تطول من ٨ الى ٢٠ سم .
وتعرض من ٣ الى ٧ . نصلها جماد النسيج . سنن
الحافة ، خلي الصفعة البقل التي تدير نفسية اللون .
تقربها متعرض الحرافش القصيرة الصلبة .

١٤٢٤٤ - سِتْدِيكَان طَوِي * ، سِتْدِيكَان التَّوَكْسِي *

Quercus toza (S). *Chêne cauxin*, *C. doux*, *C. brosse*, *C. angoumois* (F).

شجرة جمادة ترطب في المناطق الجنوبية . تعلو من ٣
الى ١٥ م . جلودها مفادة ، غليظة ، غلسلة . اثنائها
زباء العلماء وردية اللون . اوراثها عابطة تطول من ٦
الى ٢٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٧ . نصلها خلي الصفعة
البقل || تقربها مسير اللد متعامد الحرافش القوية .
بلوطها صغيرة ، لونها الى السرة ازيتية .

١٤٢٥٥ - سِتْدِيكَان صَاقِي الزَّوْك *

Quercus laurifolia (S). *Chêne laurier* (F).

شجرة جمادة مهدها امريكية . تعلو من ١٥ الى ٢٠ م .
اوراثها تشبه اوراق اللار . نصلها يطول من ٨ الى
٢٠ سم وهو اسرط الصفحتين ، جميل الخضر الباقين .
تقربها قلنسوي الشكل ، صغر الحرافش القوية .
بلوطها صغيرة اللد ، متخيلة اللون ، يلوها موج صغر زيب .

١٤٢٤٦ - سِتْدِيكَان كَبِير القَمَر *

Quercus macrocarpa (S). *Chêne à gros fruit* (F).

شجرة سبروتية جملة الشكل مهدها امريكية الشالية .
تعلو من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراثها عابطة تطول من ١٠
الى ٤ سم . نصلها خلي التخصيص ، صفحت البلى
جملة الخضر ازباني اما البقل لخميلة البشرة لونها الى
الصمبة || تقربها عبطي الحرافش التي تدير كالاداب .
بلوطها كبير اللد طوله يراوح من ٥ الى ٦ سم . لونه الى
الجلمة .

١٤٢٤٧ - سِتْدِيكَان كَسْتِي الزَّوْك *

Quercus castaneifolia (S). *Chêne à feuilles de châtaigner* (F).

شجرة سبروتية مهدها القوقاز تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م .
اوراثها عابطة ايمارية الشكل كاوراق الكستة . نصلها

الجذع والافاندا . اوراقها غليظة اي انها تغلق من مركبة ريشية ، في عهد الفتوة ، الى غلة بسيطة مبطنة في عهد البلوغ || جميعها من النباتات الراملة مهددا بالبلد الحارة . احرف واشهر انواعها ما يتبع .

١٤٣١٤ - سَنَطُ اَبْيَسْ ، هَرَسْ (S). *Acacia albida*
 Acacia blanc, Mimosa (F). White scacia (E).
 Weisses akazie (D). Albergo blanco (I).

شجرة زينة بمرقطة . ساقها مغطاة بالحاء اوراقها مركبة عابلة . ازهارها زبدية اللون .

١٤٣١٥ - سَنَطُ اَزْرَقْ (S). *Acacia cyanophylla*

Acacia bleu, Mimosa bleu (F).
 شجرة زينة بمرقطة تملو من متريين الى ٦ أمتار . فلها مستطيلة الشكل ، نصلها لإع التسنج الاخضر اللون ، الازرق المواج . متناقها الزهرية صغيرة القد . ازهارها كروية متوسطة الحجم جملة الزبدى للتاج || ازهارها يستمر طول شهر آذار .

١٤٣١٦ - سَنَطُ اَزْهَبْ (S). *Acacia pubescens*

Acacia pubescent, Mimosa pubescent (F).
 شجرة زينة جادة تملو من متريين الى ثلاثة أمتار افاندا ورافاتها زباه . اوراقها عابلة مركبة . اشطاطها خطية الورقات قد من ١٠ الى ١٥ زوجاً . متناقها الزهرية محورية وتاجية الاوتكار . ازهارها خلية المالحق لونها الى الصفرة النائية || ازهارها يدوم طول شهر آذار .

١٤٣١٧ - سَنَطُ اسْتَقْمُولْ

هو ابيضا الحرير ، اطليا .

١٤٣١٨ - سَنَطُ اسْوَدْ

Acacia nigricans, A. rufesfolia (S). *Acacia noiretre, Mimosa noiretre* (F).

شجرة زينة جادة مظلمة الشكل . افاندا ورافاتها مضطمة الزوايا . ورافاتها غنية . اوراقها عابلة ، مركبة ، اشطاطها خيشة الورقات المستطيلة ، نصلها الى الخمس المالحق الاسود المواج . ازهارها فردية او خمسية التجميع ، فواحة العرف الذي ، لونها الى الصفار الكبيرى . ازهارها يدوم طول شهر نيسان .

١٤٣١٩ - سَنَطُ اسْوَدْ اَلْخَشْبْ

Acacia melanoxylon (S). *Acacia à bois noir, Mimosa à bois noir* (F). Black wattle, Green wattle (E).
 Schwarzes akazie, Schwarzwattle (D). *Acacia nera* (I).
 شجرة جادة هريسة الشكل . كبيرة القد تملو من ١٥ الى ٣٠ م . افاندا مضطمة الزوايا . فلها سناية مستطيلة ، نصلها حاقب الخمس الاسود المواج . ازهارها كروية الشكل ، كبيرة القد ، فواحة العرف ، صفارها كبريى . ازهارها يستمر من آذار الى نيسان .

١٤٣٢٠ - سَنَطُ السَنَاطْ ، قَتَادْ ، هَسَابْ

Acacia senegalensis, A. verek (S). *Acacia du Sénégal, Gommier blanc* (F). Gum tree (E). Weissliche akazie, Vereksbaum (D). *Acacia del Senegal* (I).

شجرة مهددا بالبلد الافريقية تكثر في السنغال يستخرج منها اجود الصوغ الحريية .

١٤٣٢١ - سَنَطُ السَّائِلِ (S). *Acacia pycnantha*

Acacia à pompons, Mimosa à pompons (F).
 شجرة كبيرة الحجم ، خمسية الشكل ، تملو من ١٠ الى

١٤٣٥٤ - سَنَطُ يَكَنْ مَسْنَن اَلْوَرَقْ

Quercus dentata (S). *Chêne denté* (F).

شجرة بمرقطة جليلة الشكل مهددا باليابان تملو من ١٥ الى ٢٠ م . بناتقها مستطيلة خفيفة زباه الحاد ، زغبيا اصفر اللون . اوراقها عابلة ، كبيرة ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم . نصلها سميكة التسنج الجامد ، ساهي او ثنائي التجميع . هريسة بارزة خلية البشرة . صفحتها السفلى زبابة طلاء . تفرقها مستطيل الحرافش الخيطية البنية . بلوطها بيضي الشكل ، متوسط الحجم .

١٤٣٥٥ - سَنَطُ يَكَنْ مَسْنَن وُلِيْ

Quercus macedonica (S). *Chêne troyen* (F).

شجرة بمرقطة مهددا بالبلقان تملو من ١٥ الى ١٢ م . افانها خفيفة صغيرة . اوراقها عابلة ، قصيرة المتى ، تطول من ٤ الى ٦ سم . وتعرض نحو ٤ . نصلها جامد التسنج الاخضر على صفحتيه ، سنن الحافة ، عند هريسة يراوح من ٨ الى ١٢ زوجاً || تفرقها شتى الحرافش المستطيلة الممققة .

١٤٣٥٦ - سَنَطُ يَكَنْ مَسْنَن عَسْجَرِيْ

Quercus pauciflora (S). *Chêne des marais* (F).

شجرة بمرقطة تجرد ولا تغطى الرمال القاحلة تملو من ٢٥ الى ٤٠ م . اوراقها تطول من ٨ الى ١٢ سم . نصلها ثلاثي التجميع ، ازغب البشرة . خلل الفلج والمروق || تفرقها صاهي الشكل ، دقيق الحرافش الرقيقة البريئة الطب . بلوطها متوسطة القد ، كسنية اللون .

١٤٣٥٧ - سَنَطُ يَكَنْ يَكَنْ

Cupuliferes (F).
 هي فصيلة ابيليات من ذوات الفلقتين البدييات المتشاكلات .

١٤٣٥٨ - سَنَطُ يَكَنْ

Syndic de faillites (F).
Assignés in bankruptcy (E).
 هو الوكيل القانوني عن المكلف ومن كتلة الدائنين .

١٤٣٥٩ - سَنَطُ يَكَنْ

Anamirta paniculata (S).
Anamirta, Coque du Levant (F). Cockles plant,
Cocculus indicus (E). Kokkalekornstrauch (D).
Anamirta, Coccois di Levante (I).

لبات بري وزراعي ممر وسيد الجلس والقرح من فصيلة القرنيات . مهدد البلاد الحارة احصاه الاسوية . ثمار طيبة ، عطرية ، مسهلة وقيمة شائعة الاستعمال تنهى سم السمك الحله .

١٤٣٦٠ - سَنَطُ يَكَنْ

Plante commune (F).
 هو السمور اشالح ، اطليا .

١٤٣٦١ - سَنَطُ يَكَنْ

Rooted slip (F).
 كل فصيلة او عطف وما اشبه استقلت بطولها وبناتقها .

١٤٣٦٢ - سَنَطُ يَكَنْ

Pointe des vertèbres du dos (F).
 حرف فقار الظهر سنن .

١٤٣٦٣ - سَنَطُ يَكَنْ

Acacia
 بنس الشجار ونباتات برية وصناعية وزينة
 من فصيلة القرنيات . انواعها زهاء ٤٠٠ مغطيا شاك



سائيل



سَنَطُ اسْوَدْ اَلْخَشْبْ

١٤٣٧٨ - سُطُ صَمْعِيّ، طَلَح، أَمْ غِلَان، بَنَك

Acacia gumifera (S). *Acacia gommier* (F). *Marocco gum tree* (E). *Berberische akazie, Talschbaum* (D). *Acacia gommifera* (I).

شجرة من العشاء كثيرة الشوك الحاد الخشن مهددا أفريقية الشالية وقد انتشرت في جميع الاطراف الحارة . يستخرج منها صمغ السط الطيب الرائحة لكثير الاستعمال .

١٤٣٧٩ - سُطُ عَرَبِيّ، قُرْط، شَوَكَة لَيْطِيَّة

Acacia arabica (S). *Acacia arabique, Mimosa arabique, Gommier rouge* (F). *Gum-arabic tree, Egyptian acacia* (E). *Arabischer gummlbaum* (D). *Acacia arabica* (I).

شجرة برية وزراعية مبدولة في الشرق العربي . يستخرج منها الصمغ الاخر وهو متوسط الصنف يعتبر دين صمغ الطلع والمشاب .

١٤٣٨٠ - سُطُ حَرَّعَرِيّ

Acacia juniperina (S). *Acacia-génévrier, Mimosa-génévrier* (F).

جنية تزيينية مبروتية تملو من مَرَيْن الى ثلاثة امتار . انتاجها اسطوانية زباد الحمار . فلها صغيرة الله ، حمرية الشكل ، صلبة التصل ، ذاكثة القعدة ، لونها الى الخضار الباهق . ازهارها سلبية التجميع لونها الى الصفار البهولي || ازهارها يستمر من آذار الى نيسان .

١٤٣٨١ - سُطُ حَسَكِيّ، شَبَّة

Acacia mellifera (S). *Acacia mellifera, Mimosa mellifera* (F).

شجرة تزيينية مبروتية جبلية الشكل تملو من ٣ الى ٥ امتار . مهددا الين وتنام بحر القلزم . اوراقها حاملة مركبة . ازهارها عتقوية التجميع ، صلبة اللون . صمغها قليل الانتزارة جيد الصنف .

١٤٣٨٢ - سُطُ كَذَاب

هو البرويبية السطية ، أطليا .

١٤٣٨٣ - سُطُ كَشَو، كَادَشَنَدِي ، حَمِيرَا

Acacia catechu (S). *Acacia au catechu, Cachoutier, Catéchu* (F). *Catechu tree, Khair tree* (E). *Katechu akazie, Kaca-mimosa* (D). *Acacia di catechu* (I).

نوع من السط اتراني يستخرج منه الكاشور .

١٤٣٨٤ - سُطُ لَوْتِيّ، سَمَر

Acacia spiracarpa (S). *Acacia à spirales, Mimosa à spirales* (F).

شجرة برية وزراعية كثيرة الشوك تسعمل للتجسس سابقا تصيرة . فرمها وانتاجها عديدة متدلية الاطراف . اوراقها مركبة ، حاملة . ازهارها صفراء اللون ، قليلة الكثافة ، خفيفة البرق .

١٤٣٨٥ - سُطُ مُجْتَنِّح

Acacia elata (S). *Acacia alifé, Mimosa alifé* (F).

جنية تزيينية رطبة تملو نحو المتر . اوراقها البالية . فلدية ، قنفا ، جنسية الشكل تنتهي بمسكة سادة . ازهارها الى الصفرة البالية || ازهارها يستمر ٤ اسابيع ابتداء من اواسط آذار .

١٤٣٨٦ - سُطُ حَمَرِيّ

Acacia roseana (S). *Acacia de Récé, Mimosa de Récé* (F).

شجرة مبروتية تزيينية تملو من مترين الى ٦ امتار . انتاجها مضلعة متدلية الاطراف كالقرب . اوراقها فلدية

٣٠ م . فلها منجل الشكل ، مالم الصفحة الالامية الباقية الخضار . عتاقها الزهرية جاسنة مسطيلة . ازهارها كبيرة الله ، عطرية البرق ، لونها الى الصفرة اللحية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٣٧٢ - سُطُ الْعَمَّيَر

Acacia farnesiana (S). *Acacia farnésa, Mimosa farnésa, Cassier, Cassie* (F). *Cassia, Popinac, Sponge tree* (E). *Antillen-akazie, Schwammbaum* (D). *Acacia farnésa, Farnesia odorosa* (I).

جنية مبروتية تزيينية وصناعية تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها حاملة مركبة . امشاطها وزرية ثلاثية او خمسية او سباعية . وزيقاتها عطرية تده من ١٥ الى ٢٠ زيبا || ازهارها كروية ، كبيرة الله ، فواحة البرق الطري يستخرج منها بالتقطير عطر العنبر المشهور || ازهارها يستمر طوال الصيف وانخريف .

١٤٣٧٣ - سُطُ حَطَلِيّ الْوَرَق

Acacia linearis (S). *Acacia à feuilles linéaires, Mimosa à feuilles linéaires* (F).

شجرة تزيينية تملو من مترين الى ٥ امتار . فلها ثلاثي الورق ، نصلها عطري الشكل يطلو من ١٥ الى ٢٥ سم . وعرض نحو ٢ م . ازهارها صغيرة الله ، سلبية التجميع ، زائجة الصفار الكبريتي || ازهارها يستمر طوال شهر شباط .

١٤٣٧٤ - سُطُ ذَمَّاع ، صَيَّال

Acacia seyal (S). *Acacia seyal, Arbre à gomme, Delle* (F). *Shittah tree, Shittim wood, Thirsty thorn* (E). *Seyal akazie* (D). *Acacia seyal* (I).

شجرة برية وزراعية كثيرة الصارة المسلية . صمغها يعتبر دون صمغ القُرْط .

١٤٣٧٥ - سُطُ رَائِبِيّ، سُطُ كَثِير الْوَرَق

Acacia retinodes, A. floribunda (S). *Acacia floribond, Mimosa résineux* (F).

شجرة تزيينية مبروتية دائمة تملو من ١٠ الى ١٥ م . انتاجها لرغصة دقيقة طرية . اوراقها فلدية خفيفة مسطيلة ربيدة البرق . عتاقها ازهرية تالاجية الاينكاراز . ازهارها كروية ، فواحة البرق ، صفراء اللون . ازهارها يستمر طوال السنة .

١٤٣٧٦ - سُطُ مَرَح

Acacia cultriformis (S). *Acacia-coutre, Mimosa-coutre* (F).

جنية تزيينية جاسنة تملو من متر الى مترين . سابقها ورفوها اوراقها مرسة . فلها يهسية الشكل ، جاسنة التلجج البحري اللون . ازهارها عتقوية التجميع ، عتاقها رطلة مسطيلة || ازهارها يستمر ٤ اسابيع تبتدئ في اوائل ايار .

١٤٣٧٧ - سُطُ شَالَع ، سُطُ عَمَّيَرِيّ، مِيَمُوزَا

Acacia decurrens, A. dealbata (S). *Acacia parfumé, Mimosa commun* (F). *Silver wattle, Wattles* (E). *Silberakazie, Weisstliche akazie* (D). *Acacia dealbata* (I).

شجرة مبروتية مبدولة تملو من ٨ الى ١٢ م . انتاجها وانتاجها خلية الحمار . اوراقها حاملة مركبة . امشاطها عديدة . وزيقاتها حمرية . نصلها متوسط الصلصة في التبار ، ثنايا في البلى || ازهارها فواحة البرق ، لونها الى الصفرة الزائجة . يستخرج منها بالتقطير عطر العنبر || ازهارها يستمر من كانون الى آذار .



سط ذاك



سط عربي

الى ٢٠ سم. تتميز بأجسامها الكبيرة المستديرة ، بزنافنها الظهرية المستطيلة الشائعة الشاككة ، بشكل ظهورها وبطنها المقنطرية المتوسر || ألوانها شديدة العمان يكثر فيها الأحمر والأزرقاوي والبرتقالي والوردي والفضي .

١٤٣٩٧- سَطَّ أَثَر ، تَيْسَن

Holocentrum rubrum (S). *Holocentre rouge* (F). سمكة بحرية يعيش من السقف وفضيلة التعديلات . أعضائها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط . يكثر وجودها قرب الشواطئ والمخارج المصرية وألبانيا || جسمها أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى الحمرة الازرقاوية يعلوها موج اسف . رأسها شبه مخروطي الشكل قصير الخيط . عينها كيرتزان بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة كبيرة ، مستطيلة ، شاككة القسم الاسمي . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٤٣٩٨- سَطَّ شَانِي

Holocentrus chani (S). *Holocentre chani* (F). سمكة بحرية يعيش من السقف . أعضائها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط أعضائها المجاميع التركية واليونانية || جسمها أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ١٨ سم. ثوبها الى الزبداء السمر المغايرة الماجات القنسية ، رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخيط . فكها الاسفل يتقدم الاسفل . عينها كيرتزان بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة تتألف من ٢٥ شعاع منها ١٠ متضخية الأطراف الحادة و ١٥ مفصليّة سرسة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف مأكول .

١٤٣٩٩- سَطَّ شَتَم

Holocentrus ghanam (S). *Holocentre ghanam* (F). سمكة بحرية يعيش من السقف . أعضائها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط أعضائها المجاميع الأفريقية || جسمها أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ٢٠ سم. ثوبها الى الكلبة القنسية يعلوها في جانبيها غطان أخضران وصف من الخضسات صغير النقط المستديرة . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخيط . فكها متعادلان . عينها كيرتزان ، بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة تتألف من ٢٥ شعاع منها ١١ متضخية الأطراف الحادة و ٩ مفصليّة سرسة . زعنفتها الذيلية فارقة ، حلالية الشكل || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٤٤٠- سَطَّ مَبْدُول

Holocentrus vulgaris (S). *Holocentre commun* (F). *Common Holocentrus* (E). سمكة بحرية يعيش من السقف . أعضائها معظم أقاليم البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || سرسها المجاميع . ملونها الخياطي كرسوي . جسمها شبه أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ١٨ سم. عراشها ستة الحار . ثوبها متعادل الالوان تقلب فيه التسمية القنسية ويعلوها في جانبيها خط خمس البقع المستديرة البرتقالية اللون . زنافنها الى الزبداء السمر يعلوها موج اسفر . رأسها يبرسي الشكل ، قصير الخيط . شفتها متوسط الانفرج . فكها متعادلان . عينها كيرتزان ، نازحتان ، ولها الارتكاز . زعنفتها الظهرية كبيرة ، شائعة ، مستطيلة تتألف من ١٧ شعاع منها ١١ متضخية الأطراف الحادة و ٦ مفصليّة سرسة . زعنفتها الذيلية

مستطيلة لونها الى الخضار البحري || أنفها سفلية ، ناعمة ، كثيفة التجميع ، متدلية ، لونها الى الصفرة الفاحية || أنفها ينحصر نحو ٥ أصابع يتعق في أوائل نيسان .

١٤٣٩٧- سَطَّ مُسْتَقِيل الْوَرَك

Acacia longifolia (S). *Acacia à longues feuilles*, *Mimosa à longues feuilles* (F). شجرة تزيينية تملو من ١٥٠ الى ٤٠٠ سم. أنفادها فضلة الزوايا . فلها سنان الشكل بطول من ٥ الى ٢٠ سم. ويخرج من ١٥ الى ٢٠ سم. سنايلها الزهرية مستطيلة . أنفادها صغيرة القند شديدة الصفار || أنفادها ينحصر من آذار الى أيار .

١٤٣٩٨- سَطَّ مَشَوَاك

Acacia armata (S). *Acacia armé*, *Mimosa armé* (F). شجرة تزيينية سرودية شاككة تملو من متر الى مترين . فلها فضية الشكل طول نحو ٣ م. أنفادها عشكولية التجميع ، محورية الارتكاز ، لونها الى الصفار الباهت . أنفادها ينحصر من نيسان الى حزيران .

١٤٣٩٩- سَطَّ هِلَالِي

Acacia lunata (S). *Acacia en croissant*, *Mimosa en croissant* (F). شجرة تزيينية سرودية تملو نحو ١٠٠ سم. فلها حلالي الشكل بطول نحو ٢٥ سم. سنايلها الزهرية صغيرة الحجم محوري من ٤ الى ١٥ أنفاد لونها الى الصفرة الشائعة . أنفادها ينحصر من شباط الى آذار .

١٤٣٩٠- سَطَّطَات

Mimosaes (F). *Acacia*, *Mimosa* (E). سهل من فضيلة القرنيات . ألوانه زاهة ١٥٠٠ منها الاجهار والشجيرات والجنات والاشجار السمر . منها الاسقام الحارة والصدئة . اوراقها متعقبة ، مركبة ، ريشية . أنفادها صغيرة متعدية او عشكولية التجميع ، محورية ولحاجة الارتكاز ، لثالية او رباعية او خماسية الاجزاء .

١٤٣٩١- سَطَّ

Jointure des doigts (F). *Jointing of fingers* (E). هي السلاسل التي تصل ما بين الاصابع والرسغ ، ج استماع .

١٤٣٩٢- سَطَّ

Indignation راجع تحم .

١٤٣٩٤- سَطَّ

١٤٣٩٥- سَطَّ هو الارتكاز المشيرة ، اطليا .

١٤٣٩٥- سَطَّ

١٤٣٩٦- سَطَّ ثمرة فضيلة القطنيات كالذول والبلس ولحمية وغيرها . وهي وهاء ذات مصراعين يتفتح به تمام لقمه من بعض البزور .

١٤٣٩٦- سَطَّ

Holocentrus (S). *Holocentrus* (F). جنس سمكة بحرية من فضيلة التعديلات الشاككات الزنايف . ألوانه الملونة نحو ٣٠ ملونها بجار المناطق الحارة . جسمها صغيرة القند مأكولة ، طولها يراوح من ١٢



سَطَّ



سَطَّ لَظَم



سَطَّ مَبْدُول

تقابل الظهيرة . زعنفتها الليلية فاتحة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

سفنقيات

١٤٤٠١ - سفنقيات
مرتبة اسماك بحرية من رتبة الاشلاخ تشمل القرشيات والسفنجيات البحرية .

١٤٤٠٢ - سفنقيات
هو القرن ، اطليه .

١٤٤٠٣ - سفنقيات
Ctenophora festiva (S). Ctenophora agræbilla (F).

حشرة لافقية من ذوات الجناحين وفصيلة السفنجيات . جسمها معتدل القبة قريب الشكل بقصم القيقول يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . لونها الى البسرة المظلمة يعلوها تمجيد وتيج اصفر . زباناها قناديا الشكل ، عذما التجلد . رؤسها الى الصغار الخفي تملو بقية مراء في وسط الزام الاخير || الاتي اكبر قدماً من الذكر . بطنها مردي الشكل . تظهر الحشرة الجلدة من ابار الى تشرين الاول . تألف الحراج والذباب والعدائق والنباتين || تمتع الاتي مكها في غاء الاجار الحرة المظلمة . يرقاتها تعيش مل المواد النباتية والعفوية المنحلة .

١٤٤٠٤ - سفنقيات

في القرنيات قصيلة نباتية ، اطليا .

١٤٤٠٥ - سفنقيات
Sanvitalia (S). Sanvitalia (F).

جس نباتات عشية حولية زينة من الشرفيات وفصيلة المركبات . ازهاره ثلاثة . اوراقها منتنة متعابلة . لصلها يضي الشكل مهدب القاعدة لونه الى الخضار الاضطر . انماها جزوية الرؤس الوسطي ، رتقالية السوات الخارية . يزورها مجتمعة ثنائية او ثلاثية الحك . انماها يستمر طوال الصيف .

١٤٤٠٦ - سفنقيات
Hierofasco (S). Gerfaut (F). Gerfalcon, Gyrfalcon (E).

جس طير من عازة الصقور وفصيلة الصقريات . موطنه البلاد الباردة . الزامه مع جميعا من الجوارح الكبيرة البطة ، الجنية الشكل والمندمام . طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . ويصطاد من ١٣٥ الى ١٥٠ سم || انماها تختلف مع النوع والممر يغلب فيها الابيض . مناسرها قرية منتقاة البرية الذرية الحادة . سواقلها كبيرة القند ، فاتحة الارتفاع . اذناها مستطيلة جالسة . عالجها قوية . تألف الاجراج والجبال المشرقة على البحر . تصيد السحاب والاراب ويصطاد القروم والبيل والاوز والنورس . تكثر في الاجمار البسقة او بين شماليه الصقور البيرة . انماها تبني وتجنس من ٤ الى ٥ دنانير نحو ٤ اسابيع . اما ازلامه ستة فهي :

Gerfaut blanc (F).

سفر ابيض

Gerfaut de Norrège (F).

سفر النروج

Gerfaut d'Islande (F).

سفر ايلند

Gerfaut du Groenland (F).

سفر غروينلند

Gerfaut de Hallbell (F).

سفر هليل

Gerfaut du Mexique (F).

سفر المكسيك

Egretta garzetta (S).

١٤٤٠٧ - سفنقيات

Algetta garzetta (F). Little egret (E).

طائر من البطونيات يحرب المناطق الجنوبية المعتمة من

اليابان الى اروية وافريقية واسترالية || طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى البياض المصاني . مقاره اصغر الانتساب . اسود الجسم . يتميز بريشه الخافي القاهر السن . يعيش اسراباً كبيرة . يألف النلق . قوته الاسماك والقشاد ويصطاد الحشرات . ينش بين الامل والقصب اناته تبيض وتجنس ثلاث يمشات .

١٤٤٠٨ - سفنقيات

Cénomanian (F). Cenomanian (E).

صاف حصيلي يجتر قاعدة سفات الطبقة الطباشير بالماليا .

١٤٤٠٩ - سفنقيات

Sommet d'une plante (F). Summit of plant (E).

ارفع جزء في النبات .

١٤٤١٠ - سفنقيات

Zébu (F). Zebu, Indian ox (E).

السنة ج سم هي الابقار الهندية الرقيقة الحاركة السني الشكل . اطلب دوابي .

١٤٤١١ - سفنقيات

Cyme

شكل من الازهار الثوري قوله ان المالحات الزهرية تتلفا في نقطة واحدة وتبلغ علوا واحدا مسطوريا في الانتساب والازكاز .

١٤٤١٢ - سفنقيات

Arbre à production alternative

١٤٤١٣ - سفنقيات

Sénouin (F). Senouin (E).

صاف حصيلي يشمل النصب الاوسط من الطبقة الطباشيرية العليا .

١٤٤١٤ - سفنقيات

Felis (S). Chat (F). Cat (E).

جس حيوانات صغيرة القند من فصيلة السنوريات وربة القوام منها بيرة وحشية ومنها البسة البية لا يطر منها بيت || اسماء السنور كثيرة اشهرها القند والممر والقبين واليس واليسين والخيخ والحليل والممرس والقلم واليزون والكنيس والمارون والفتاري || اما كته فابو دناين وابو فروان وابو الموش وابو شامخ .

١٤٤١٦ - سفنقيات

Chat tigré (F).

١٤٤١٧ - سفنقيات

حيوان لاسم مغربي يضي مربي ، اطليه .

١٤٤١٨ - سفنقيات

Felis catus, Catus ferus (S). Chat sauvage (F). Wild cat (E).

اكبر انواع السنابر ولشدها بطناً واصليها حيداً . طوله الكامل يراوح من ٧٠ الى ٨٠ سم . جسمه من ٣٨ الى ٤٤ دنانير من ٣٢ الى ٣٦ اما علوه الى الحاركة فوراوح من ٣٧ الى ٤٣ سم . ثوبه الى الصبغة الصفراء والسمراء يملو تخطيط وتجزع اسود || يألف الاجراج ويرح في الليل ويقتل الاجمار . ينسج على كل حيوان ويألف يصطع اليه سيرا .



سفر



سفنقيات



سنور بيري

١٤٤٣٠ - سَهْطِيَّات المَنَاقِبِ

هي مشروبات المناقِب ، اطبخها .

١٤٤٣١ - سَهْطِيَّة Epillet (F). Spikelet (E).

هي وحدة التزوير في شكل الازهار السنبل . يجمدها المرسون المتتابع الارتفاع كل محور واحد يؤلف السبله .

١٤٤٣٢ - سَهْطِيَّة Parapside (F). Parapside (E).

السبله جزء من الحلقة الصلبة الثالثة ، عند الخشرات ، توصل ثلثة اليرباد بالجناح وتثبتها فيه . وهما الثتان يمين ويسرى .

١٤٤٣٣ - سَهْطِيَّات

السنيق كوكب ثير ابيض الضوء .

١٤٤٣٤ - سَهْطِيَّة

Mitra (S).

Mitre (F). Mitra (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل وضيعة السليمانيات . انواعها المرفوعة كثيرة العدد والمعاصر منها يتناهز ٢٥٠٠ اصنافها بحار البلاد الحارة والاستوائية . معظمها يعيش على مدافع الريان || اصنافها عرناصة الشكل ، غروطية الاقطاب الحلزونة مستطيلة الفروج الشقية . اجسامها عادمة التشعور ، صغيرة الرؤوس ، ثنائية الفراش ، مستطيلة الاضراس || انواعها المرسومة في البحر الابيض المتوسط صغيرة القد باعثة الالوان . اما انواع بحار المناطق الاستوائية فكبيرة القد ، جميلة الزخارف والالوان الزاهية || يعيشها في الحشد « مأذنة » .

١٤٤٣٥ - سَهْطِيَّات Mitrada (S).

Mitridae (F). Mitridae (E).

فضيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل اماهيات الخياشيم . اجسامها وانواعها عديدة ، بعضها من متحشرات الاراضي المائية والبيض الآخر معاصر || اصنافها بليلة الحلزونة ، مديبة الاقطاب ، غشقة التجويف القاعدي للانسبوبة الاستدارية || اعرف اجناسها واشهرها السنومة .

١٤٤٣٦ - سَهْطَا ، سَهْطِي

السها والسهي نجم من كوكبة بنات نكش الصغرى .

١٤٤٣٧ - سَهْطَب ، سَهْطَبَة Scappe

البرية والقلاذ وكل منبسط سهل يبعد الاطراف القسيمة الخرامية .

١٤٤٣٨ - سَهْطَة Squame (F). Squama (E).

حشفة صغيرة طبيعية او عارضة .

١٤٤٣٩ - سَهْطِي Squameux (F). Squamous (E).

لمت تعريفي وصي يطلق على الاشقية الحيوانية الحشفية السطح .

١٤٤٤٠ - سَهْطِيَّات Squamates (F).

Squamata (E).

رثة من الزحافات . التصنيف الحديث يقسمها الى مرتبتين : مرتبة الحيات ومرتبة البطانيات .

١٤٤٤١ - سَتُور دَاجِن *

Felis domestica, Catus domesticus (S). Chat domestique (F). Domestic cat (E).

هو القط المعروف بالبيس واخر والحجل والخيخع والبيسن . شرويه كثيرة السند اصنافها المسلم ، الاثني اصغر قدماً من المذكور ، عملها يوم نحو ٩ اسابيع وهي تقع من ٢ الى ٦ جراء تبصر النور بعد وضعها بالسيورين .

١٤٤٤٠ - سَتُور شِيرَازِي * قط الشيرازة

Catus angorensis (S). Chat angora (F). Angois, Angora cat, Persian cat (E).

فرب من السُتُور الداجِن هي الخلق مستطيل الور الجليل الناعم .

١٤٤٤١ - سَتُور مَهْمَكَة * سَتُور مَهْمَكَة

Catus maniculatus (S).

سَتُور مَهْمَكِي Chat ganté (F). Egyptian cat (E).

نوع من الساتير البرية والذاتة مهد بلاد التوبة . قدمه المصريون في عهد الترامنة وانتقل مع الرحالة وقوافل التجار من بلاد الى بلاد فوصل الى اوروبا عن طريق الجزيرة وسورية وتركيا ووصل الى الاندلس عن طريق ليبيا وتونس والجزائر . طوله الكمال نحو ٧٨ سم . جسمه ٤٤ وذنبه ٢٤ ثوبه سوي اللون يمتد عند الظهر . فرائجه رفيعة مجزعة .

١٤٤٤٢ - سَتُور مَنُول * Catus manul (S).

Chat manul (F). Manul cat (E).

نوع من الساتير البرية القوية الشديدة اللطف . هذه جبال وبنات المنول . طوله الكمال ٧٨ سم . جسمه ٥٥ وذنبه ٢٨ اما طول فمحو ٤٥ سم . لونه مزيج من الاصفر والابيض والاسمر رأسه مبيج بالاسود . غذاءه حشرات بالاسر السابق . اذنان صغيرتان . ذنبه مطوق التجزيع بالاسد .

١٤٤٤٣ - سَتُورِي Félin (F). Féline (E).

لمت تعريفي يطلق على كل حيوان ينتمي الى فصيلة السُتُوريات .

١٤٤٤٤ - سَتُورِيَّات Felidae (S).

Félidés (F). Felidae (E).

فضيلة حيوانية من رتبة الفواصم تشمل السنور والاسد والبر والثر والرشق والعتاق الخ .

١٤٤٤٥ - سَتُورَة Nidicole (F).

لمت تعريفي يطلق على فراخ الطير التي تتقف بيشة مرياطة لا تستطيع الاستغناء من ابوها بعض الوقت .

١٤٤٤٦ - سَتُورُوتُو هو الخطاف ، اطله .

١٤٤٤٧ - سَتُورُوتُو الماه

هو التزيم من كليات القدم ، اطله .

١٤٤٤٨ - سَتُور Alternativité de la fructification

صفة الاجزاء المتناوبة الحمل . يقال نبات سنو ورجرة سنه .

١٤٤٤٩ - سَتُورِي ، سَتُورِي Annual (F).

Annual, Yearly (E).

هو كل نبات يزهر في الحول الذي ينبت فيه ثم يذبل ويموت عقب الاجزاء .



سنور داجِن



سنور شيرَازِي



سنور مَهْمَكَة



سنور منول



سِنِيَة

١٤٤٥٥ - سَهْلُون **Vive (F).**

جنس سمكة بحرية مشهورة باسم ترخين ، اغلب ترخين .

١٤٤٥٦ - سَهْلُون صَغِير **Vive pacios (F).**

سمكة بحرية تسمى أيضاً ترخين صغير ، اطاليا .

١٤٤٥٧ - سَهْلُون عَنَكَبُوتِي **Vive araignée (F).**

سمكة بحرية تسمى أيضاً ترخين عنكبوتي ، اطاليا .

١٤٤٥٨ - سَهْلُون مَبْدُول **Vive commune (F).**

سمكة بحرية تسمى ترخين مبدول ، اطاليا .

١٤٤٥٩ - سَهْلُون مَشْعِ الرَّاس **Vive à tête rayonnée (F).**

سمكة بحرية تسمى أيضاً ترخين مشع الرأس ، اطاليا .

١٤٤٦٠ - سَهْلُونِيَّات **Trachinidae (F).**

فصيلة سمكة بحرية تسمى ترخينيات ، اطاليا .

١٤٤٦١ - سَهْرُوج **Haliastur vocifer (S).**

Pygargue vocifer (F). Also called buard, African sea eagle (E).

طائر من الشبيل ينتمي إلى عائلة البشيان وفصيلة الصفرجات .

يقال أنه من أجل البشيان وأحبها وأجلها . موطنه القارة

الافريقية . طوله نحو المتر . ثوبه أبيض فاحش . رأسه

ورقته وعنقه وبجسته وبطنه سفيد وناتك إلى البياض

الثلجي . ظهره وظاهره سفيد وسنمه إلى السواد الأزرق

المزيج . مخالبه صفر . قوته الطير والسمك والبليات

الصغيرة ولا يفت من البشر أبناً شاهده كأن له في

القتانسة لذة خاصة .

١٤٤٦٢ - سَهْرُوك عَقَبَك مُؤَزَّرَة **Pseudoeas, Aquila fasciata (S).**

Pseudoeas, Aquila fasciata (S). Pseudoeas, Alge à queue barrée (F).

طائر من البشيان وسيد الجلس والترح . جسمه مستطيل

القد وصفه كاسي الریش . مخالبه طويلة . ثوبه إلى

السرة الصفراء . منقعه مؤزر بالأبيض . ذنبه مشوح

بخطوط متفرقة لونها إلى البياض الباهي || يمر من

البشيان الأوابد موطنه يمتد من الهند إلى الشرق الأوسط

والإندونيسيا وإيطاليا وإسبانيا وإفريقية الشمالية . يألف

الأنثابت والأرراج ويجري للماء ويصافح السميريات

يصيد البيط والورز والوجع والحوسل والحمام والديج .

يألف حقه في صيد السمور اللينة الثانية . أثناء

تبيضه ولتين تحضنها وحدها نحو ٥ أسابيع .

١٤٤٦٣ - سَهْرُوم **Pseudoeas (F).**

السمور شرب من البشيان يسمى أيضاً السهوك ، اطاليا .

١٤٤٦٤ - سَهْرُوم أَشْكَل **Sahirus dubius (S).**

Sahirus douteux (F).

حشرة من السمير وفصيلة الداسياتيات . جسمها صغير

القد ، مبطط ، اطاليا لشون : يطلي نحو ٨ م . ||

تواليا إلى القرقة البعشجية يطولها مشج شكل يسود فيه

الاعصر فالأصغر فالأصغر || وأنها مستطيل الجسم ، قليل

التكوير . غطسها مستطيل الطول . ميناها صغيرتان ،

ماحتان . زباناها مستطيلان . كوكبها محبب الظهر .

١٤٤٤١ - سَهْل **Plains (F).** Plain, Flat country (E).

سهل ج سهل : هي الأراضي المستوية السطوح .

مصدرا يمد إلى عاملين أساسيين : الارساب أو التحات

والترتية .

١٤٤٤٢ - سَهْم **Action (F).** Share (E).

هو حصة أحد الشركاء في شركة مساهمة . وهو يبادل

جزئاً من مجموع الأجزاء التي قسم إليها رأس مال الشركة .

١٤٤٤٣ - سَهْم ، حِصَّة **Part**

هو جزء من ذمة مالية .

١٤٤٤٤ - سَهْم الإِنتِفَاع ، سَهْم التَّمَتُّع **Action de jouissance (F).**

هو السهم التي دخلت قيمته وما زال حاصله يتقاضى ربحاً

سنوياً عنه .

١٤٤٤٥ - سَهْم الرِّمِي **Kokib**

كوكب تير من برج القوس المعروف ببرج القوس .

١٤٤٤٦ - سَهْم المَاء **Sagittaire (F).**

هو القطعة جنس نباتات مالية من المزاريات .

١٤٤٤٧ - سَهْم التَّصَاب **Action de quotité (F).**

هو كل سهم لا يشارك فيه إلى قيمة معينة من التقد .

١٤٤٤٨ - سَهْم إِتْمِيكَل ، سَهْم مُتَكَمِّل **Action de préférence, A. de priorité (F).**

هو السهم الذي يمانى بالأسبقية إلى السهام الأخرى إما

بزيادة حصته إلى الأربع أو في اقتسام الشركة عند

حلها أو في حق التصويت أو في هذا كله مجتمعا .

١٤٤٤٩ - سَهْم دُو حَلَاة **Action à prime (F).**

هو السهم الذي يصدر بسعر أعلى من سعره الحسي .

١٤٤٥٠ - سَهْم رَأْس المَال **Action de capital (F).**

هو السهم الذي تكافئه حصته في رأس المال سواء أكانت

مبتأ أم لنفذاً يقابله سهم العمل أو سهم الصناعة الذي

تكون الحصة فيه عمل يدنياً .

١٤٤٥١ - سَهْم مَبْنِي **Action d'apport (F).**

هو السهم الذي يسلم إلى الشريك مقابل تقديم حصته

مبتاً .

١٤٤٥٢ - سَهْم حَلَاة **Action au porteur, Titre au porteur (F).**

Sauveur certificate, B. bond (E).

هو السهم الذي لا يبين فيه اسم شخص معين وتكتفي

بإيثاره لأبواب ملكيته .

١٤٤٥٣ - سَهْم مَدْفُوع القِيمَة **Action libérée (F).**

هو السهم الذي دخلت قيمته كاملة أو كان ممدداً لحصة

قدما حاصله مبتاً .

١٤٤٥٤ - سَهْم مُتَكَمِّل ، سَهْم مُتَعَدِّد الأصَوَات **Action à vote plural, A. privilège (F).**

هو من السهام التي تحوز حلتها في الجمعيات العمومية

أسبقاً أكثر مما لحصة السهام الأخرى التي تتساوى

مبها سراً .



سَهْرُوج

١٤٤٧٥ - صَوَاعِد (F). Vaisseaux mammaires (F).
Mammary ducts (E). هي مجاري الحليب في القرسح .

١٤٤٧٦ - سَوَالف (F). Epizootie (F).
مرض المال وملاكه من آفة تسميه .

١٤٤٧٧ - سَوَام مُقَوِّح * (F). Cyanocitta cristata (S). Cyanocitta huppé (F).
Blue Jay (E).

طائر من فصيلة الغربان . يعتبر من أجل طيور أمريكا الشمالية . يألف الإحراج والغابات ، قوته الحشرات والبزوط والثمار والبزود ويبيض المصابير ويحلبها || جسمه متوسط القد بطول نحو ٢٢ سم . صلته العليا ، من قراس إلى القلب ، زرقاء اللون سفاه المواج . صفته السفل من الزور إلى الأنيك ، ورياء اللون يضاء المواج . عند أسد يمتاز بجبهة وفلاة سوداء قلوب عتق . جناحاه وذنبه مجعدة بالأسود والأريد . رأسه عروج بكشفة سوداء يطولها مواج أزرق || يدن عن في الأشجار الرقيقة . الاق تحسن روحها من ة إلى ه يضايت بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

١٤٤٧٨ - سُورَقُفْسُفَات (F). Superphosphate
من الاسمدة الكيماوية الرقيقة . يشل عنصر الفسفور الذي يدخل في تركيب جميع الحوامض والمواد التزلاية الموجودة في الخلايا النباتية || خواصه وصفاته عديدة أبرزها :
- حفن جذور النبات على الانشباب والتكاثر .
- سح النبات على أتران الأتزارار وجودة البزيع وحسن التأثير والمقد ومع الانعلاص .
- تشييط وحماة المادة البنية في السماء وبرادة الجلود وتقوية المناعة الذاتية ومكبتها من السموم في رجه الاوصام الجرثومية .
- الحلول دين شلح الأزوت وعواقبه الوضية فيا لو زادت نسبتة من الممدل الاقص .
والسورفسفات على اشكال منه المادي والمزدوج والمثلث وهذا يمد الى نسبة ما يحويه من الحامض الفسفوري للقبال الدوبان في الماء وفي سترات الامونيكا || يدر على الأربة كاليتراس قبل التزارة ببعض الوقت ويظهر جيدا ذلك تتمكن الحلات الطبيعية مع الانعلاص الكيماوية من تحويلة الى غذاء قابل للتشيل منه حابة النباتات اليه .

١٤٤٧٩ - سُورَفْسُفَاتُ الطَاف (F). Superphosphate of os.
من الاسمدة الفسفورية الضوية الجزيلة النفع يحوي من ١٢ الى ١٨٪ من الحامض الفسفوري القابل الدوبان في الماء وفي سترات الامونيكا || وهو بطي الانفعال ينشط البيئة الجرثومية ويحيا على التكاثر النظمي .

١٤٤٨٠ - سَوَجَر (F). Oléastre (F).
هو خللاص الضيق البزوق ، اطليه .

١٤٤٨١ - سَوَجَر هو الصفصاف ، اطليه .

١٤٤٨٢ - سَوَدَق * ، صَعَرُ البَطْ (F). Falco nigriceps (S). Faucon des canards , Aléto (F).
طائر من الصقور القزاطع التي تجوب البلاد الممتدة الحارة . جنته تقارب جنة الشاهين وهو أفر الريش ،

جملتها وحسبها ظهراتها متعدلا الطول . قشرانها شفاف . بطنها الى السمرة . قوتها مباشرة الحلب القصير || راحمتها كرينة .

١٤٤٦٥ - سَوِير مُطْلَع * (F). Sehirus maculatus (S).
Séhiru maculé (F).

حشرة من السهير وفصيلة القسائيات . جسمها صغير القد ، مقلطح ، شبه يضي الشوز ، بطول نحو ٧ م . || فورجا الى الزقة الحدية المواج يطولها تلطيخ ابيض الشهب . رأسها صغير الحجم . عضها مضط الطول . زباناها مستطيلة . عينها صغيرتان ، غارتان . كسلها قبي الشوز . جملتها وحسبها ظهراتها متعدلا الطول . قشرانها شفاف . بطنها الى السمرة القامقة . قوتها مباشرة الحلب || مرتها الكثير من الاعصاب اعصها الشفويات || راحمتها كرجة .

١٤٤٦٦ - سَهِيْقَة (F). Opercule (F).
Operculum, Cover (E).
هي الغلاف الرقيق الذي يسد مخاروب النحل . وهي غطاء اجنات الحامض . وهي لشاء الفسفوري الذي يلحف مناعير البير الخ ...

١٤٤٦٧ - سَهِيْل (F). Canope (F). Canopus (E).
نجم من كوكبة السيفية يتميز بريق لماله الذي يأتي بمد البرجوس والأبرق . يمد من الأرض نحو ٢٠٠ سنة ضوئية أي نحو مليون مليار كيلومتر .

١٤٤٦٨ - سَهِيْمَة ، بِسَمِيْت * (F). Boelenmitas (S). Boelenmita (F). Boelenmitas (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القزويات وأسيات الارجل مزدجيات الحامض . وفصيلة السهيمات . انواعها المعروفة عديدة ، جميعها من احافير الحقبة الترياسية . حياكلها صغيرة سمية الشكل .

١٤٤٦٩ - سَهِيْمَات * (F). Boelenmitidae (S). Boelenmitidae (F). Boelenmitidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القزويات وأسيات الارجل مزدجيات الحامض . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من صخور الازمنة الفائرة . يبدو ان ظهورها يمد الى العصر البليوري وانقراضها كان في العصر البليثيني .

١٤٤٧٠ - سَوَّهُ التِيْمَة (F). Mauvaine fol (F).
Dichonesty, False-hood (E).
هو معرفة الانسان ما ينطوي عليه عمله اثنائي من حروب واجرام .
١٤٤٧١ - سَوَاك هو الراعب ، اطليه .

١٤٤٧٢ - سَوَاكِيَة (F).
هو زردور البادية ، اطليه وين اسماله ام سليمة .

١٤٤٧٣ - سَوَاكُ الحِنْدَة هو البركشت ، اطليه .

١٤٤٧٤ - سَوَاكس

فجر واحدته سواة . قال ابو جنيبة : السواس من الضفادع وهو شبه بالمرخ له سفة مثل سفة المرخ وليس له شوك ولا ورق ، يطلي في السماء ويستظل تحت وقال ايضا السواسي والمرخ والمنج متشابهة .



سهيمة



سَوَام مُقَوِّح



سودق

اصنع قرأين، اسحق القشر اللين، لثبر البين. راسه وصفته وظهوره وسقمه وذنبه سقم اللوح. مسره وعالجه سودا ين في الانجبار الباسقة الثانية. يصيد للزهر والرمل اعضها الجردان والبط.

١٤٤٨٣ - سَوْتِيَّان، مِيَزُوكَرَب (F).

Mésocarp (E).

هو الجزء المتصل من غلاف الثمرة يعرف باللب في ثمار التفاح. تلطف الحفاة ويلطف الانعكاس حيث المجنة أو البثور.

١٤٤٨٤ - سَوْتِيَّان

هو الزرودة الدائم الخضرة، اطبخ.

١٤٤٨٥ - سَوْتِيَّان، صِرَاحُ الثُّوْلَةِ

Colchicum (S). Colchique (F). Colchicum, Meadow saffron (E). Lichtstume, Zeilose (D). Colchico (I).

جنس نباتات بصلية طيبة معمرة من فصيلة السورتيانيات. ازدهاء ٢٠ مظهرها بري ويضاهي زراعي. مثالها الطبية عديدة اعضها در البول وتسهيل للمعدة وتكسين الاصابا والحلح على السن. ويستخرج منها مادة قاتلة تسمى كلثمين شائعة الاستعمال الطبي || اوراقها قرمية الالتشاب سنائية التصل المستطيل. ازدهاها كبيرة اللثة مسطيلة الانبوب مدنية البتلات المتسوية. ثمارها كسابر حقة الشكل تظهر مع الازداد بد ذبول الزهر واكبات ذوبه. النهر انواعه ما يتبع.

١٤٤٨٦ - سَوْتِيَّان اَبْيَشي

Colchicum candidum (S). Colchique blanc (F).

نبات سبروتي مهده جبال الشرق الاوسط. ديفسته برمية الشكل متوسطة الحجم. اوراقه خفيفة مسطيلة فارقة. ازدهاها صغيرة اللثة، يضاء اللون، طوية المأبر الصفر || ازدهار يستمر من آب ال ايلول.

١٤٤٨٧ - سَوْتِيَّان اَصْفَر

Colchicum luteum (S). Colchique jaune (F).

نبات سبروتي مهده الجبال والافلاك. ديفسته صغيرة الحجم اجناسية الشكل. اوراقه خفيفة مسطيلة، نصلها محدد المسطحة الزاوية الخضار. ازدهاها صفراء اللون، بتلاتها يضيء الشكل خلية البشرة الداخلية || ازدهار يستمر من نيسان ال ايار.

١٤٤٨٨ - سَوْتِيَّان الجبلي، قَرَجِ الارض

Colchicum montanum (S).

Colchique de montagne (F).

نوع من السورتيان مهده المناطق الجبلية ذات الارضية البردية. ديفسته صغيرة اللثة قطرها نحو ٢ سم. اوراقه تطلو من ٨ ال ١٥ سم. وتعرض من ٧ ال ١٢ سم. ازدهاها صغيرة اللثة قطرها نحو ٥ سم. طولها يراوح من ٦ ال ١٢ سم. || وهو السورتيان الطبي المشهور ديفسته تسمى خيرة الصغار وبزاز القطة ولينة برمية.

١٤٤٨٩ - سَوْتِيَّان اخضر

Colchicum autumnale (S).

Colchique d'automne, Veilleuse, Tue-chien, Saffron des prés, S. lézard (F).

نوع من السورتيان الباطل. ديفسته يضيء الشكل

تطلو من ٥ ال ٧ سم. اوراقه متصبغة تطلو من ١٥ ال ٣٠ سم. وتعرض من ٢٥ ال ٥٠ سم. ازدهاها ليكية اللون، كبيرة اللثة، قطر فمها يراوح من ٨ ال ١٢ سم. وطول انبوبها من ١٥ ال ٢٥ سم. || وهو السورتيان الطبي المشهور الذي يستخرج منه الكلثمين.

١٤٤٩٠ - سَوْتِيَّان الشرق

Colchicum byzantinum (S). Colchique d'Orient, C. à feuilles de varaire (F).

نبات سبروتي مهده الشرق. خروبوه زراعية مدية. ديفسته كبيرة اللثة، كروية الشكل، مغطاة القاعة. اوراقه تطلو من ٢٢ ال ٢٥ سم. وتعرض من ٧ ال ١٠ سم. نصلها خطاط المسطحة كمثل الخربوق. ازدهاها كبيرة اللثة مسطيلة الانبوب الابيض، خلية البتلات الوردية اللون || ازدهار يستمر طوال الشتاء.

١٤٤٩١ - سَوْتِيَّان الصخري

Colchicum haumknechtii (S). Colchique d'Haumknecht (F).

مهده جبال الصخر. يرغب في الاماكن الصخرية. ديفسته شبه يضيء قطرها نحو ٦ سم. يطولها حتى يبلغ ٧ سم. اوراقه خفيفة التصل اللثة المسطحة. ازدهاها خلية البشرة، صفراء اللون، وردية الفروق، مسطيلة الانبوب || ازدهار يدام طوال شهر تشرين الاول.

١٤٤٩٢ - سَوْتِيَّان بَرَكِينُون

Colchicum parkinsonii (S). Colchique de Parkinson (F).

نبات سبروتي مهده غابات الشرق الاذل. ديفسته متوسطة الحجم. اوراقه الجليبية مسطيلة، نصلها متراوح الخشار فلان التربة. ازدهاها متوسطة اللثة، انبوبا ابيض اللون، بتلاتها ضلعة وجزية بالابيض والاربعوني، مأرها زرق || ازدهار يستمر من آب ال ايلول.

١٤٤٩٣ - سَوْتِيَّان دَكْشِي

Colchicum decalense (S). Colchique de Decatena (F).

مهده الشرق الاوسط. يزرع للزوين. يستخرج من النباتات الرقية. ديفسته متوسطة اللثة قطرها نحو ٤ سم. اوراقه الارلى سنائية التصل ثم تلبا اوراق خفيفة، ذلقة الزام الاخضر. ازدهاها صغيرة اللثة، وردية اللون، خلية البتلات || ازدهار يستمر من تشرين ال كانون الثاني.

١٤٤٩٤ - سَوْتِيَّان حَرَّيشي الشرق

Colchicum hirsutifolium (S). Colchique à larges feuilles (F).

نبات سبروتي مهده الشرق الاذل. ديفسته متوسطة الحجم. اوراقه خفيفة تطلو من ١٥ ال ٢٥ سم. وتعرض من ٥ ال ٩ سم. ازدهاها مسطيلة الانبوب، بتلاتها مدية الزام الاخضر، خلية البشرة، لونها ال اليلكي يطلو ملح اربعوني، مأرها صفر || ازدهار يستمر من آب ال ايلول.

١٤٤٩٥ - سَوْتِيَّان فَاحِي

Colchicum speciosum (S). Colchique superbe (F).

مهده الشرق الاوسط. يزرع للزوين. ديفسته كبيرة اللثة، قطرها نحو ٦ سم. اوراقه تطلو من ٢٠ ال



سورتيان الحريف



سورتيان فاحي

١٤٥٠٢ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Schizanthus candidus (S). *Schizanthus blanc* (F).
 عشية حولية تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اورانها ورشية
 قليلة الالهيدي واللتنين. ازهارها كبيرة القند مستطيلة
 الانبوب، مفرصة الصفحة السفلى، لونها الالبياض
 الماجي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

١٤٥٠٣ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Schizanthus grahmi (S). *Schizanthus de Graham* (F).
 عشية حولية او حولة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها
 مستقلة القنوع. زلفها مبشر التجميع. اورانها ورشية
 مهدبة. ازهارها كبيرة القند، وردية اللون، صفراء
 التبييض، يرتقلا الزواكش || ازهارها يستمر من
 حزيران الى ايلول.

١٤٥٠٤ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Schizanthus pinneus (S). *Schizanthus penné* (F).
 عشية حولية او حولة تملو من ٢٥ الى ٦٠ سم. ساقها
 قنوع، فرونها كثيفة التجميع زبداء اللون. اورانها
 ورشية مهدبة. ازهارها كبيرة القند بنفسجية اللون صفراء
 التبييض والمروق || ازهارها يستمر من حزيران الى
 ايلول.

١٤٥٠٥ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Schizanthus gracilis (S). *Schizanthus grêle* (F).
 عشية حولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اورانها زبداء
 اللون. ازهارها صغيرة القند ليلكية اللون يملوها تبييض
 بنفسجي حناره اصفر || ازهارها صبي.

١٤٥٠٦ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Charançon (F). *Weevil* (E).
 كلفة شاملة تطلق على معظم الحشرات التي تقرب الى
 فضيلة السويات. ج سون || يبي يعملها خنافس
 صغيرة القند تقرب الحبوب وتوقع بها اشد الاذى.

١٤٥٠٧ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Calandra oryzae (S). *Charançon du riz* (F). *Rice weevil* (E).
Reiskäfer (D).
 حشرة من السويات طويلا من ٣ الى ٤ سم. جسمها
 مستطيل الشكل. لونها الالبياض المخلطة تحمل على غنمها
 اربع بقع حر || تركب شلب الارز وتقرضه قبل
 قشره.

١٤٥٠٨ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Peritelus sphaeroides (S). *Périthè gris* (F).
Peritelus griseus (E). *Grauer Rüsselkäfer* (D).
 حشرة من السويات طويلا يراوح من ٥ الى ٧ سم. لونها
 حنلي اللون يملو زغبة ليرة وولاج اسف || تركب
 برام الانجبار والشجيرات المختلفة الاجناس والانواع بما
 فيها التفاح والقيون والكزبرة والبيج تقرب اطرافها او تقضيها
 وتوقع بها اشد الاذى || يرتقلا تمش في التربة على المواد
 الضوية للنبات.

١٤٥٠٩ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Hylobius abietis (S). *Soukè qattob* (F).
Charançon du sapin, *Hylobius du pin* (F). *Fir-tree weevil*, *Pine weevil* (E). *Grosser branner Rüsselkäfer* (D).
 حشرة من السويات. طويلا نحو ١٠ سم. لونها الالبياض
 الكستنية يملو تبييض مفسفب الزواكش اصفر اللون.
 تركب الاقان واليناق الحولية تفضي عليها. تمرى

٣٠ سم. وتقرض من ٧ الى ١٠، ازهارها كبيرة حلبة،
 لونها الالبياض، لونها الالبياض، لونها الالبياض
 الميخ بالاصفر || ازهارها يستمر نحو ٧ أسابيع
 يتعفن في اواسط ايلول.

١٤٤٩٦ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Colchicum amabile (S). *Colchique gracieux* (F).
 نبات جاذب مهدب الشرق. ديفسته صغيرة القند،
 اورانها خفيفة للتصل باحات الخضار. ازهارها نخلة،
 مستطيلة الانبوب، خفيفة القنوع، اهليلية البتلات.
 يتلها زبداء البشرة الناعمة يملوها تضطبط ويتزعج ودي
 واربراني || ازهارها يستمر طويلا شهر ايلول.

١٤٤٩٧ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Colchicum variegatum (S). *Colchique panaché* (F).
 نبات مروجي مهدب الشرق. ديفسته
 متوسطة القند. اورانها متصبغة لطيف من ٢٠ الى ٣٥ سم.
 وتقرض من ٢٥ الى ٣٥ سم. ازهارها مستطيلة الانبوب
 الالبياض اللون، يتلها خلية البشرة، وردية اللون،
 يملوها مولج اسر || ازهارها يستمر من آب الى ايلول.

١٤٤٩٨ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Colchicaceae, *Melanthaceae*, *Melanthaceae* (F).
Melanthaceae, *Colchicaceae*, *Melanthaceae* (F).
Colchicaceae, *Melanthaceae* (E).
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقة تشل السونجان والمريوق
 وغيرها.

١٤٤٩٩ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Glycyrrhiza, *Liquiritia* (S).
 ريكليس.

Régisse (F). *Liquorice plant* (E). *Süßholz* (D).
Regolizia (I).
 جنس نباتات خشبية معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية.
 انولها مهدبة يعضها زراحي صناعي. تتميز بامتطالة
 جلوريا الجلمورية. اورانها متصافية مركبة وزرية.
 وريقاتها يعضه النمل، عابقة الخضار. ازهارها
 سبلي التجميع، ابي الالبياض. ازهارها صغيرة القند
 لونها يخلط مع الفروع، فيها الالبياض والازرق والبنفسجي.
 غارها قرن صلبة مبطنة. زروها مستديرة مفلطحة.
 احرف واشهر انولها السوس القزني.

١٤٥٠٠ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Glycyrrhiza glabra, *Liquiritia officinalis* (S). *Régisse officinale* (F).
 جنبة صغيرة تملو نحو ١٥٠ سم. جلوريا جلورية
 ممددة اسطوانية الشكل، جرادتها سراء اللون، لها اصفر،
 سكري الحلق. مادته القنعة تسمى «ريجيس» وهو
 سهل خفيف يناسب المرقق والشيوخ والحولاء. يفتح
 الصدر ويقي الكبد. مسحوته شائع الاستعمال الطبي
 ويصنع منه شراب حرق السوس المستحب النافع.

١٤٥٠١ - سُونْجَانْ كَلِيف *
Schizanthus (S). *Schizanthus* (F).
 جنس نباتات عشبية حولية او حولة من فصيلة الخانزاريات
 انولها ٨ سمها زرقية. اورانها متصافية مركبة ورشية.
 ازهارها سني التجميع، تاجي الالبياض. ازهارها
 حلبة الشكل، مفرصة، زغبة الالوان الشله || احرف
 انولها وشهرها ماي.



سوس غزني



سوس ابيش



سوسة الارز



سوسة البرام



سوسة القنوب

جميع أنواع التوب والصنوبر || يرقاتها تعيش على الجملوح الملقومة اليابسة .

١٤٥١٠ - سوسة الجزر *

Liperus coronatus, *Molytas coronatus* (S). Charançon de la carotte (F). Carrot weevil (E).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. ثوبها إلى السواد اللامع || يرقها صغيرة القدر سماء اللون، سوداء الرأس. تركب بطور الجزر فتقرضها وتؤذيها .

١٤٥١١ - سوسة الخنطة *

Calandra granaria (S). Charançon du blé (F). Granary weevil (E). Kornkäfer (D).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٣ إلى ٤ سم. جسمها مستطيل الشكل . ثوبها إلى السمرة الخنطية . تقرض البر وتكثله وقد تصيب السلت والشعير والذرة . يكثر ويوجد في الأهرار والمخازن .

١٤٥١٢ - سوسة الزيتون *

Otiorynchus meridionalis (S). Charançon de l'olivier (F).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٧ إلى ٨ سم. ثوبها إلى السواد القمعي يميلو حلب مبهر وأصفر . ارتبطها حر تركب أوراق الزيتون فتقرض ساقه اتصل || يرقها تعيش في التربة على جملوح النباتات البرية .

١٤٥١٣ - سوسة الصليبيات *

Ceuthorrhynchus assimilis (S). *Ceuthorrhynchus des crucifères*, Charançon de la rave (F). Turnip seed weevil (E). Kohlschotenrüssler (D).

حشرة صغيرة من السوسيات طويلة نحو ٣ سم. جسمها يفي الشكل ، حطلي اللون . تركب بذور الصليبيات اغصانها الفتق والتلجم والخرول والمولفون .

١٤٥١٤ - سوسة القليل *

Lixus algeris (S). Charançon de la fève (F).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٣ إلى ١٢ سم. لها اسنود لاصع يميلو مزاج حطلي || تركب مع ريقها الاوراق والازهار والحبوب .

١٤٥١٥ - سوسة القررة *

Amelorrhynchus melanarius (S). *Ceuthorrhynchus du cresson* (F).

حشرة صغيرة من السوسيات طويلة نحو ٥ سم. ثوبها إلى الحطلي الباقع يميلو تجزيع أحطل اللون مستطيل الخطوط ومنقرضها || تركب أوراق القررة وتمتص سبكها على الزهر يلفظ من ريقات تلتهم الكرميات والبروزور .

١٤٥١٦ - سوسة الكافور *

Otiorynchus ligustici (S). Charançon de la livèche (F).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم. لوبها أبيض اللون ، اسفح المزاج || تركب الكافور وبعض النباتات الأخرى كالكرمة والشمندر والقنصة حيث تقيم البرام والاوراق || يرقها تعيش في التربة على جملوح النباتات .

١٤٥١٧ - سوسة مخددة *

Otiorynchus sulcatus (S). *Charançon sillonné* (F). Vine weevil (E). Dickmaulrüssler, Gefurchter (D).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٨ إلى ١٠ سم. ثوبها إلى السواد اللامع يميلو مزاج حطلي . زياتها زياء

الفاصل، زفها ذهبي اللون . تركب تخلف قنابات الحقلية والكرمة حيث تعيش على البرام . ريقها فتتق بالجملوح وبارقاس النباتات الزينة .

١٤٥١٨ - سوسل *

Schizandra (S). *Schizandre* (F). جنس نباتات جنينة عارضة من فصيلة السوليات . أنواعه ١٢ منها البرية والزرينية . اوراقها عابطة متعاقبة منعقة ، ستانية . ازهارها أبوية أو محورية أو انزكاك || اشهر انواعه الزرينية ما يلي .

١٤٥١٩ - سوسل آثر

Schizandra rubriflora (S). *Schizandre rouge* (F). جنينة مبروتية عارضة تطول من ٣ إلى ٥ أمتار . اوراقها احليجية الشكل تطول نحو ١٥ سم. ازهارها عناقية مستطيلة ، متعاقبة ، لونها إلى الحمرة البالية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٤٥٢٠ - سوسل الصين

Schizandra chinensis (S). *Schizandre de Chine* (F). جنينة مبروتية عارضة تطول من ٤ إلى ٦ أمتار . اوراقها يفسية ذلقة ، نصلها سنن الحلاقة يطول نحو ٨ سم. ازهارها عنقودية التجميع ، محورية الانزكاك ، عديمة البتلات ، من ٩ إلى ١٢ ، عطرية البرق ، لونها إلى الحمرة . ثمارها عنقية ، قريضة اللون ، حامضة الطعم ، مأكولة || ازهارها يستمر من ايار إلى سزيان .

١٤٥٢١ - سوسل كبير الزهر

Schizandra grandiflora (S). *Schizandre à grandes fleurs* (F). جنينة جادحة، عارضة، طولة من ٤ إلى ٦ أمتار . اوراقها يفسية الشكل ، عادية التسنين . ازهارها كبيرة القد ، عنقودية التجميع ، لونها إلى الحمرة القويضة . ازهارها يستمر من نيسان إلى ايار .

١٤٥٢٢ - سوسل مرمرى

Schizandra marmorata (S). *Schizandre marbré* (F). جنينة عارضة طولة من ٤ إلى ٦ أمتار . فروعها اسطوانية ، حراء اللون . اوراقها يفسية ، نصلها عابق الخفسار . احتلقها جوية . ازهارها صغيرة القد مبرية ، متعاقبة || ازهارها يديم طوال شهر ايلول .

١٤٥٢٣ - سوسل هنري

Schizandra henryi (S). *Schizandre de Henry* (F). جنينة مبروتية عارضة تطول من ٣ إلى ٥ أمتار . فروعها ثنائية الاصلع الخيشية . اوراقها احليجية ، ذلقة الزام الاشعر . نصلها جميل الخضار الزماني ، قليل التسنين . ازهارها أبوية ، فردية ، كبيرة القد ، عديمة البتلات ، يبيضاء اللون ، صرية الرائحة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٤٥٢٤ - سوسليات *

Schizandraceae (S). *Schizandraceae* (F). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القملات . اجناسها وانواعها المعروفة لا يتجاوز عددها ١٧ . جميعها نباتات جنينة عارضة . بعضها بري والبعض الآخر قريضي . اوراقها عابطة ، متعاقبة ، منعقة ، ستانية اتصال الجنبية الخفسار . ازهارها محورية أو أبوية الانزكاك ، الانثوي سننيل التجميع ، أما الذكرى قريضي . ازهارها صغيرة



سوسة الجزر سوسة الخنطة



سوسة الزيتون سوسة الصينيات



سوسة القليل سوسة القررة



سوسة الكافور سوسة مخددة



سوسل

اوراقه شيقة للتصل المحين . ازهاره ثلاثية او رباعية
التجميع طول نحو ٦ سم . ثنائيات متعاقبة لونها الى الصفار
البايض . بتلاتها الى الصفار الباقى يطوى لتريق بتسجي
اللون ، حطلي الموضع || ازهاره يستمر من نيسان
الى ايار .

١٤٥٣١ - سوسن أحمر Iris fulva (S).

١٥٠٠ زهاء
تبات جلمودي سبروتي يرغب في الأماكن الرطبة .
ساقه نحيلة طول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها طول
نحو ١٠٠ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ . ازهاره متوسطة القد ،
حامدة للعروق والرق . بتلاتها الخارجية والداخلية حنطية
اللون يطويها تشيع بتسجي وأخضر ، والداخلية منها
ثنائية التفصيص || ازهاره يستمر من حزيران الى
تموز .

١٤٥٣٢ - سوسن الجوزاء Iris unguicularis (S).

١٥٠٠ زهاء
تبات جلمودي حاد الساق ، وسيد الزهرة ، يرغب
في الماوض الجنوبية والاماكن الدافئة . اوراقه عسقية
الشكل ، لتصلها جامد اللنج ، أخضر الصلحة العليا ،
بحري السفلى . زهرته مستطيلة الانبوب ، كبيرة القد ،
فواحة للعرف ، بتلاتها الخارجية والداخلية الى البياض
الزاهي . حطايها ابيض || ازهاره يستمر من كانون
الثاني الى نيسان .

١٤٥٣٣ - سوسن المتألق Iris pseudacorus (S).

١٥٠٠ زهاء
تبات جلمودي سبروتي ميلول يعيش في المواق الرطبة
وحل مجاري الماء وضيافات الانهار . يطول من ٥٠ الى
٢٠٠ سم . اوراقه حنطية الشكل ، بحرية التصل .
ازهاره كبيرة القد حافظة العرف حامدة المرق . بتلاتها
الخارجية والداخلية الى الصفار الزاهي يطوى لتريق حطلي .
ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٥٣٤ - سوسن النمر Iris tigré (F).

١٥٠٠ زهاء
تبات ترقني من فصيلة السوسنيات مشهور باسم حومة ،
اطبا .

١٤٥٣٥ - سوسن باهت Iris pallida (S).

١٥٠٠ زهاء
تبات جلمودي سبروتي يطول من ٦٥ الى ١٠٠ سم .
ساقه نحيلة مستطيلة ، شرانها ابيض اللون . ثنائيات
قبل التلاصق الزهر . ازهاره متوسطة القد . حرقها ليموني
الرائحة . بتلاتها الخارجية والداخلية زرقاء اللون الباهت .
حرقها اصفر الانتشاب ، ابيض الطرف || ازهاره
يستمر من ايار الى حزيران .

١٤٥٣٦ - سوسن بحري Iris halophila (S).

١٥٠٠ زهاء
تبات جلمودي سبروتي يرغب في المواق الساحلية البحرية .
يطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه زباء التصل ، بحرية
اللون . ازهاره متوسطة القد حامدة المرق . بتلاتها الخارجية
بيضاء اللون ، برتقالية المتق ؛ بتلاتها الداخلية مرققة
بالاصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

ملونة ، الذكورية تحمل اربع بتلات والاثوية ثمانية ||
اشهر اجناسها السوسل الذي كان يعتبر في التصنيف
أشابق من فصيلة المفلويات .

١٤٥٣٥ - سوسن Iris (S), Iris (F), Iris (E).

١٥٠٠ زهاء
تبات ثلاث برية وزراعية من فصيلة السوسنيات اتولاه
ساقه جلمودي وبهها دوصي . حطايها
غليظة . اوراقها متعاقبة ، متساوية السطح ، فصلها
مستطيل الصلحة متصل او حصى الشكل . ازهاره
كبيرة القد ثلاثية الانقسام متميز باجزائها الخارجية
المنخفضة الاطراف بينما الداخلية متمسكة وباتلاصها
القصرية التي تعلوها سات نامية ملونة || اشهر انولاه
الزراعية ما يتبع .

١٤٥٣٦ - سوسن أبيض Iris florentina (S).

١٥٠٠ زهاء
تبات جلمودي سبروتي مهده الشرق العربي . يطول من
٦٥ الى ١٠٠ سم . ازهاره كبيرة القد ، فواحة العرف
السطري . بتلاتها الخارجية بيضاء اللون ، زرق الرصاص ،
حرقها اصفر . بتلاتها الداخلية حافية البياض . حطايها
مستطيلة وحيدة اللون الكبريتي || ازهاره يستمر من
نيسان الى حزيران . يستخرج من جلداهه مواد طبية
نافعة ويستعمل من ازهاره مواد عطرية تستعمل في صناعة
الطوب .

١٤٥٣٧ - سوسن الجرد Iris imberbis (S).

١٥٠٠ زهاء
تبات دوصي جانح . مهده افريقية الثنائية . ساقه طول
من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه مستطيلة شبه اسطوانية .
ازهاره متوسطة القد ، صفراء اللون ، بتلاتها الخارجية
مستوية اما الداخلية فقصرية ومفلوية || ازهاره يستمر
من ايار الى حزيران .

١٤٥٣٨ - سوسن إسباني Iris xiphium (S).

١٥٠٠ زهاء
تبات دوصي جانح . ساقه طول من ٣٠ الى ٦٠ سم .
اوراقه مستطيلة ، اسطوانية ، غندة اللون . ازهاره
كبيرة القد متمسكة العرف . بتلاتها الخارجية الى الصفار
الزاهي ، بتلاتها الداخلية بتسجي اللون الانحاص يطوى لموضع
الزهراني || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٤٥٣٩ - سوسن أحمر Iris lurida (S).

١٥٠٠ زهاء
تبات جلمودي سبروتي يطول من ٤٠ الى ٦٥ سم .
ازهاره كبيرة القد ، حار ثنائياتها يجمع قبل التلاصق
الزهر . بتلاتها الخارجية زرق اللقائمة والرق الاول ،
صفير سائر المصطفة للمرة بالبفسجي . حرقها اصفر
الجسم . اسد الطرف . بتلاتها الداخلية صفير الانتشاب ،
زرق الصلحة تعلوها رشفة جوية || ازهاره يستمر
من ايار الى حزيران .

١٤٥٤٠ - سوسن أحمر Iris fulgens (S).

١٥٠٠ زهاء
تبات جلمودي سبروتي يطول من ١٠ الى ٣٠ سم .



سوسن ابيض



سوسن اسباني



سوسن المتألق

١٤٥٤٣ - سَوَسَن رُوذْبَاخ Iris rosenbachiana (S).

Iris de Rosenbach (F).

نبات دقيقي ، عديم الساق ، رف . اوراقة قصيرة .
ازهاره ثلثية البند . بتلاتها الخارجية زبدية الانتشاب ،
بنفسجية السفمة ، عابية الختار . بتلاتها الداخلية الى
البنفسجي الباق ، يملو تجزيع يرتقالي || ازهاره
يستر من شباط الى اذار .

١٤٥٤٤ - سَوَسَن سِنْدْجَار Iris sindjarica (S).

Iris du Sindjar (F).

نبات دقيقي جادح . مهده جزيرة ابن عامر . ساقه
قصيرة تملو نحو ١٢ سم . اوراقة جملة الخضار الزاهي .
ازهاره كبيرة القند ، خافتة العرف . بتلاتها الخارجية
زرقة اللون ، صفراء المرق ، بتلاتها الداخلية اعليجية
للشكل منحنوية اللون || ازهاره يستمر من اذار الى
نيسان .

١٤٥٤٥ - سَوَسَن سَوْرِي Iris hortaei (S).

Iris de Lortet (F).

نبات جلمودي سروتي مهده الجبال اللبنانية السورية .
يملو من ٢٠ الى ٤٥ سم . ازهاره متوسطة القند خافتة
العرف ، بتلاتها الخارجية الى الزرقه السهابة المنشفة والمقرعة
بالخزوة . مررها ذهبي اللون . بتلاتها الداخلية وردية
يملوها تمرق بنفسي || ازهاره يدم طول شهر ايار .

١٤٥٤٦ - سَوَسَن سِيْبِرِيَّة Iris sibirica (S).

Iris de Sibérie (F).

نبات جلمودي سروتي رطب في المناطق الباردة . ساقه
اسطوانية جفاه تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه انشامية
جواه التي تم تستقر عند اككال نوحا حل الاخضر
الباق . ازهاره صغيرة القند حيوية الرائحة . قناباتها دسوة ،
بتلاتها مستوية الشكل ، الخارجية منها يضاء البياض
ثقوبها زرقه زاهية ، والداخلية الى الزرقه البنفسجية .
ضروبها الزراعية عديدة ، فلزهاها الوأنا || ازهاره
يستر من ايار الى حزيران .

١٤٥٤٧ - سَوَسَن شَالِب Iris versicolor (S).

Iris versicolore (F).

نبات جلمودي سروتي مهده امريكا الشمالية . يملو
من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه زبده انتشل . ازهاره كبيرة
القند عادية العرف والمرق . بتلاتها الخارجية بضية الشكل
بنفسجية اللون عابية الوسط . بتلاتها الداخلية وردية
اربعولية او يضاء اللون || ازهاره يستمر من ايار
الى حزيران .

١٤٥٤٨ - سَوَسَن شَبَكِي Iris reticulata (S).

Iris réticulé (F).

نبات دقيقي جادح . ضروبها القزيفية عديدة فلزهاها
بالوأنها واسطاة انانيبها . سقاها اثرية او شديدة القصر .
اوراقها صفية الشكل ، تصلها يملو من ٢٠ الى
٣٠ سم . ازهارها كبيرة القند ، فواسة العرف . بتلاتها
الخارجية والداخلية متشابهة الحجم والون يملوها نضيك
ايض السدة ، اصفر اللحام || ازهاره يستمر من
شباط الى ايار .

١٤٥٤٩ - سَوَسَن شَوْشَان Iris sultana (S).

Iris de Suse, l. doull, l. tigré, l. crapaud (F).

نبات جلمودي رف مهد بلاد فارس . يملو من ١٥
الى ٥٠ سم . ازهاره كبيرة القند عادية العرف . بتلاتها

١٤٥٣٧ - سَوَسَن بَقْلِي ، سَوَسَن دَوْقِي ،

Iris asyrinchium (S).

نبات دقيقي جادح مهده حوض البحر المتوسط . ساقه
تملو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه خطية ، منبسة .
ازهاره صغيرة القند . اسديتها متفحة الاقلام ، لوأنا
الى الزرقه الليمكية بتلاتها الخارجية موشمة بالاصفر .
ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٥٣٨ - سَوَسَن بِيْرْمَرْك Iris bismarkiana (S).

Iris de Bismarck (F).

نبات جلمودي سروتي مهده الشرق الاوسط . يملو
من ٣٠ الى ٤٥ سم . ازهاره متوسطة القند عادية العرف ،
بتلاتها الخارجية الى الصفرة المنشفة والمقرعة بالخزوة
يتوسطها بقية كسنية . مررها اصفر اللون . بتلاتها
الداخلية الى البياض الزهري يملوها تمرق ازرق .
ازهاره يدم طول شهر ايار .

١٤٥٣٩ - سَوَسَن ثَوْرُس Iris tauri (S).

Iris du Taurus (F).

نبات دقيقي جادح . مهده جبال توريس . اوراقه
صغيرة القند ، ضيقة النصل ، مفتحة الخضار . ازهاره
متوسطة الحجم . بتلاتها اعليجية الشكل ملقية . صفحاتها
اللبا لليمكية اللون يملوها تجزيع ابيض ، صفحاتها
السفل الى الخضار الباهت || ازهاره يدم طول
شهر نيسان .

١٤٥٤٠ - سَوَسَن جِرْمَانِي * ، كَف الصَّبَاغ Iris germanica (S).

Iris d'Allemagne, Flambe, Flamme, Iris des jardins, Iris arnes de France, Glaiet bleu (F). German Iris, Blue flower de Luca (S). Deutsche Iris, Blaue Iris, Schwertlilien (D). Iris germanica, Giglio celeste azzurro (I).

نبات جلمودي سروتي لاقياسي الشكل والانتظام يملو
من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ثمران ازهاره قني اللون بنفسي
الرحاس . ازهاره كبيرة القند ، حطرية اللون . بتلاتها
الخارجية بنفسجية ، مررها اصفر . بتلاتها الداخلية
الى الزرقه الزاهية ، سملها مستطيلة ملونة || ازهاره يدم
طول شهر آب . جذامها ، طيبة . ازهاره صناعية
كالسوسن الابيض .

١٤٥٤١ - سَوَسَن عَشَاش Iris humilis (S).

Iris humile (F).

نبات جلمودي سروتي عديم الساق . وسيد الخزرة .
اوراقه صلبية الشكل ، ضيقة ، مستطيلة ، جامدة
النصل الباهت الخضار . زهره لليمكية اللون الزاهي .
بتلاتها الداخلية لسالية الشكل ، اما الخارجية فاعليجية .
ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٤٥٤٢ - سَوَسَن عَسْمَانِي العَرَف Iris sambucina (S).

Iris à odeur de sureau (F).

نبات جلمودي سروتي يملو من ٤٠ الى ٦٠ سم .
ختار قناباته يبيع قبل ابتداء الزهر . ازهاره كبيرة القند
خاتية العرف القلوع ، بتلاتها الخارجية تملو نحو ٦ سم .
صفحاتها زرقاء اللون يملوها تجزيع ابيض واربعولي .
مررها اصفر . بتلاتها الداخلية جمدة السفمة ، صفراء
اللون ، يملوها تجزيع بنفسي ويملو اسفح || ازهاره
يستر من ايار الى حزيران .



سَوَسَن جِرْمَانِي



سَوَسَن سِيْبِرِي



سَوَسَن شَبَكِي

الآزيرية حديثة. يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه زياة التصل البحري اللون. أزهاره متوسطة القد، متعددة الألوان، بتلاتها ملوكة الشكل، حطية الحار، حادة المرق || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

١٤٥٧ - سَوَسَن مَشْتَب * قَسْوَس

Iris foetidissima (S). *Iris fétide*, l. gigot, l. à l'ail, Xyris puant (F). Gladdon, Gladwin, Stinkingiris, Roost-bee plant (E). Korallenschwertel, Stinkende Iris (D). *Iris foetida*, *Fiamma foetida*, *Ricottaria* (I). نبات جلمودي سبروتي يربط في المواقع الظليلة. يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه مفصلة. أوراقه متصلة الشكل، نصلها بأحد الخضار، متن الرائحة عند الفرك. أزهاره متوسطة القد حادة المرق. بتلاتها الخارجية خيفة الصفعة، زرقاء اللون. بتلاتها الداخلية إلى الصفار الموشح بالبنفسجي || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

١٤٥٨ - سَوَسَن مَهْدَب

Iris japonica (S). *Iris frangé* (F). نبات جلمودي سبروتي مهدب الصين واليابان. يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه خيفة الخضار الزاهي اللامع. أزهاره صغيرة القد، حادة المرق والمزق. بتلاتها الخارجية مهدبة الحار، ليلكية اللون، موشة بالأبيض والأصفر. بتلاتها الداخلية موية اللون اليلكي الزاهي. أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

١٤٥٩ - سَوَسَن مَوْشَح

Iris variegata (S). *Iris panaché* (F). نبات جلمودي سبروتي حديث الصروب الزراعية. يعلو من ٣٠ إلى ٦٥ سم. أزهاره حديثة متوسطة القد، قنابها خضراء اللون. بتلاتها الخارجية إلى الصفار المرق بالبنفسجي، مرقها حطلي. بتلاتها الداخلية إلى الصفار. أزهاره يذوم طولك شهر أيار.

١٤٦٠ - سَوَسَن لَحِيْلِي الْوَرَقِ

Iris graminea (S). *Iris à feuilles de graminé*, l. avoine (F). نبات جلمودي سبروتي يعلو من ١٠ إلى ٣٠ سم. أوراقه صفيحة الشكل، جامدة التصل، بحرية اللون، طولها من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره متوسطة القد. بتلاتها الخارجية والداخلية مستديرة الشكل، كبيرة الظنير لونها إلى البنفسجي الموشح بالأصفر || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

١٤٦١ - سَوَسِنَات

Iridaceae, *Iridées* (S). *Iridaceae*, *Iridées* (E). فصيلة نباتية من سيدات الفللة. أجناسها وأزواها كثيرة الحد. أشهرها السوسن والزفران والدلوث الخ.

١٤٦٢ - سَوَسِي

هو الترحمان الحزني، الطبل.

١٤٦٣ - سَوَسِنَات

Curculionidae (S). *Curculionidae*, *Rhynchophora*, *Charanopoda* (F). *Weevils* (E). *Rüsselkäfer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة شمبات الاجنحة. عراوتها وأجناسها وأزواها الممودة حتى الآن زهاء ٥٠٠٠٠ جميعها صغيرة القد. رؤوسها خطية الشكل لتتبي يمتلك قاضم ثقب. فرونها الاستشمارية صولبانية أو مرقية. فواصلها تراوح من ١٠ إلى ١٢. أرباعها خنسية التكوين، رباعية المظهر || مكناها صدير الحميم، كروي الشكل تمتصه الانثى فوديا في ثقبو تمدد

الخارجية والداخلية ودية اللون ملساء الرخاض يعلوها تجرير وتندب أسره، وتوسط الخارجية منها بتسج فصيلة فصيلة السواد || أزهاره يستمر من نيسان إلى أيار.

١٤٥٠ - سَوَسَن شَبِيقُ الْوَرَقِ

Iris stenophylla (S). *Iris à feuilles étroites* (F). نبات دوفسي جاح. مهدب المرق الأوسط. ساقه أثرية. أوراقه خيفة التصل. أزهاره كبيرة القد بنفسجية أو زرقاء اللون يعلوها حطبي شديد البسة || أزهاره يستمر من آذار إلى نيسان.

١٤٥١ - سَوَسَن طَنْجَمَة

Iris tingitana (S). *Iris de Tanger* (F). نبات دوفسي جاح. مهدب افريقية الشالية. ساقه رفيعة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه صفيحة الشكل والتصل. أزهاره كبيرة القد، بتلاتها متساوية الحجم، بنفسجية اللون يعلوها في صفيحة بلق صفر || أزهاره يستمر من آذار إلى نيسان.

١٤٥٢ - سَوَسَن عَكْرَبِي

Iris plantifolia (S). *Iris scorpion* (F). نبات دوفسي جاح. ضروبه الآزيرية حديثة، تتميزها يرتكز حل قد الشراخ ولين الزهرة || شاربعتها الزهرية تملو من ٨ إلى ١٥ سم. أزهارها كبيرة القد، فواصة المرق البطر، بتلاتها ليلكية اللون الزاهي اللامع. أصغرها إلى الصفرة. أوراقها صفيحة الشكل، جامدة التسج، طولها نحو ٣٠ سم. || أزهاره يستمر من كانون الأول إلى آذار.

١٤٥٣ - سَوَسَن قَارِي

Iris persica (S). *Iris de Persa* (F). نبات دوفسي جاح. مهدب بلاد فارس. ساقه أثرية. أوراقه صغيرة وقصيرة. أزهاره كبيرة القد، فواصة المرق البنفسجي. أربها طولها نحو ٦ سم. بتلاتها الخارجية ليلكية اللون، حطية الحار الأزرق. بتلاتها الداخلية صغيرة القد مستديرة اللون || أزهاره يذوم طولك شهر آذار.

١٤٥٤ - سَوَسَن لَقْم

Iris pumila (S). *Iris pygmae* (F). نبات جلمودي سبروتي حديث الصروب الزراعية. يعلو من ١٠ إلى ١٥ سم. أوراقه خيفة التصل البحري اللون. زهره وسيدة طولها نحو ٢٥ سم. قنابها غالبا بنفسجية بتلاتها ملوكة تختلف مع الصروب. مرقها أزرق الجسم أصفر الطرف || أزهاره يستمر من آذار إلى أيار.

١٤٥٥ - سَوَسَن مَهْدَب

Iris aurea (S). *Iris doré* (F). نبات جلمودي سبروتي يربط في المناطق الجبلية. يعلو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه زياة التصل لونها إلى الخضار الباحت. أزهاره كبيرة القد، شراطها أخضر، بتلاتها الخارجية بيضيه الشكل، حطية الحار، ملحية اللون. بتلاتها الداخلية سنانة الصفعة، زاهية الصفار الاقل || أزهاره يذوم طولك شهر حزيران.

١٤٥٦ - سَوَسَن مَلَوَكِي

Iris spatulata (S). *Iris en spatule* (F). نبات جلمودي سبروتي ميلد في المروج الرطبة ضروب



سوسن منن

Pied du champignon (F). **سوكه** ١٤٥٧٤

Tigel of mushrooms (E).
السوقة من الفطر والفطريات ما كان أسفل التربة وقد يقوم مقام الساق في النبات ويسمى أيضاً بالفزروج.

Foire des bestiaux (F). **سوكى الموالى** ١٤٥٧٥
Cattle-fair (E).

سوق يجتمع فيها الناس في أيام معلومة ليوم وطره للماشية.

Aloté (S). **سوكه** ١٤٥٧٦

Aloté (F). Aloté (E). Aloté (D). Aloté (I).
جنس نباتات لحية ممررة من فصيلة الزنبقيات. أنواعه عديدة بعضها عديم الساق. أوراقها خضراء مستطيلة التصلب، غصية التجميع. أنوارها عنقودية يصلحها شراخ بسيط أو مشعب. يستخرج من أوراق بعض أنواعه مصارة طبية مرة الطعم، مذهبها اللطافة تدعى سولمين (Alotme) مشهورة الاستهلاك الطبي. أعرف وأشهر أنواعه ما يلي

Aloté africain (S). **سوكه الإفريقى** ١٤٥٧٧

Aloté africain (F).
شجرة تملو من ٦ إلى ٧ أمتار. ساقها عديمة الفروع. أوراقها طويل من ٤٥ إلى ٦٠ سم. تصلحها باحت الخضر، شائك الحافة والمقصة. أنوارها عنقودية لينة طويل نحو ٣٠ سم. لونها إلى الصفرة الزاهية. أنوارها يستمر من آذار إلى نيسان.

Aloté glauca (S). **سوكه بحري البين** ١٤٥٧٨

Aloté glauca (F).
نبات عديم الساق. شراخه الزهرى يملو نحو ٣٠ سم. أنوارها عنقودية التجميع، وردية اللون، يطولها موج قريزي. أوراقها طويل نحو ٢٠ سم. تصلحها بحري البين، ذلك إزاء الإصفر، عديم الحشف، أسود اللثام القصير. أنوارها صبي.

Aloté zaponaria (S). **سوكه عريض الأوراق** ١٤٥٧٩

Aloté zaponaria (F).
نبات عديم الساق. شراخه الزهرى يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أنوارها حلقة التجميع كبيرة اللثة، حلقة الحمرة الزاهية. أوراقها مستطيلة، مستعصية، تصلحها باحت الخضر يطول نحو ٢٠ سم. حوافها شائك الحافة، مذهب الحلقه أحاد اللثام. أنوارها يستمر من أيار إلى حزيران.

Aloté arboreus (S). **سوكه قرن الكيش** ١٤٥٨٠

Aloté arboreus (F).
شجرة تملو من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ سم. ساقها مستقيمة مشعبة القروص. أوراقها مستقيمة على الساق بدون انقسام. تصلحها تجنين السج، بحري الخضر، يطول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. صفته خشبة، سطوة الانتواء على شكل قرن الكيش. أنوارها عنقودية لينة ليس إلى الحمرة المرصانية. أنوارها يدم من كانون الأول إلى آذار.

Aloté brevifolia (S). **سوكه قصير الأوراق** ١٤٥٨١

Aloté brevifolia (F).
نبات عديم الساق يرغب في المراتق اللطافة. أوراقها طويل من ٣٠ إلى ٤٠ سم. تصلحها إلى الخضر الأزرق، أسيف الحافة، مذهب المقصة، مستطيل اللثام. شراخه الزهرى يملو نحو ٣٠ سم. أنوارها حمر طويل نحو ٤ سم. أنوارها صبي.



سوكه



سولج بحري البين

لأحضانته. يرقمها حجمة الأربل، مقصة، مديبة الطرف. تفيض على غطفت الأعضاء والمواد النباتية والعضوية.

Flagelliforme (F). **سوطي** ١٤٥٦٤

Flagelliform (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان كالسوط شكله ولونه

Flagella (S). **سوطيات** ١٤٥٦٥

Flagellés (F). Flagella (E).
شعبة حيوانات دنيا ويسمى الخلية من صف التجميعات.

Enflagella (S). **سوطيات أصلي** ١٤٥٦٦

Enflagellés (F). Enflagella (E).
رتبة حيوانات دنيا من السوطيات.

Rhizoflagella (S). **سوطيات جذرية** ١٤٥٦٧

Rhizoflagellés (F). Rhizoflagella (E).
رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات.

Cystoflagella (S). **سوطيات مكثية** ١٤٥٦٨

Cystoflagellés (F). Cystoflagella (E).
رتبة حيوانات دنيا من السوطيات.

Choanoflagella (S). **سوطيات مفلوكة** ١٤٥٦٩

Choanoflagellés (F). Choanoflagella (E).
رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات.

١٤٥٧٠ **سوخى** و **كريصوريا**

Cryptomeria (S). Cryptoméris, Sugl (F).
سوخى هو الاسم الياباني، شجرة حرجية وحيدة الجنس والنوع من الطحسويات. مذهبها الياباني. ساقها ترتفع نحو ٧٠ م. قشرها حطبة اللون ممره اللؤلؤ. شوكها أبيض. خشبها أحمر جويدي. اتحادها لفة الأوتكاز. أوراقها غزيرة طول من ٦٢ إلى ٢٥ م. لونها إلى الخضر الأزرق. أنوارها وسيدة الشق والممكن. أكرزها كروية، قطرها براون من ١٠ إلى ٣٠ سم. جراحاتها صغيفة الشكل مقرفة. زوردها مجنسة، مستطيلة، مرباية السنن. وهي من الأشجار البرية المتوسطة النمو. أنوارها المناطق المعتدلة. ترقب في الأرتبة الصيفية الدور المتوسطة الرطوبة. اغناها صنافية جيدة الصنف.

Marché (F). **سوكى** ١٤٥٧١

Market, Market-place (E).
هو المكان الذي تباع فيه الحيوانات والخاصيل والزهر، فتقول سوق الخيل وأسم والفلسر والزهر ...

١٤٥٧٢ **سوكى إنشعبر**

Halle, Marché des légumes (F). Market-hall (E).
سوق تباع فيها البقول والخضراوات والفواكه.

Laburnum (S). **سوكم** ١٤٥٧٣

Laburnum (F).
جنس شجيرات ونباتات برية وزييلية من فصيلة الزنبقيات القرارية. أنواعه عديدة جميعها سرية. أوراقها عابطة، مركبة، ثلاثية الورديات. أنوارها سطوة الزرقاء، عنقودية التجميع، طويلة اللثام، متدللة. أشهر أنواعه السقم الشائع المعروف بالانوس الكاذب، أصله.

Solena (S).

Solen (F). Solena (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وصفيحة السولنات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمه اسطواني الشكل مسطيل تلحفه صفة بالقرب مشطوفة المخضر المنفرج. يعيش منتصباً عميقاً في الرمال العميقة بالماء || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه .

Solenidae (S).

١٤٥٩٠ - سَوَيْكِيَّاتٌ *

Solenidae (F). Solenidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجتماعها وأنها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها مسطيلة || أرجلها اسطوانية ، أصلها شبه غريبة الشكل ، ثنائية المصارع المتساوية || أرواف اجسامها وأشهرها السولن .

Fagaceae (S).

١٤٥٩١ - سَوَيْكِيَّاتٌ *

Fagaceae (F). Fagaceae (E).

هي فصيلة السندليات من ذوات الفلقتين العديمات القامات . تشمل السنديان وإزنان والكسنة .

Eurygaster integriceps.

١٤٥٩٢ - سَوَيْكَةٌ *

E. maurus (S). Souné, Sen (F). Suna pest (E). Aiatische Getreidewanze (D).

وتسمى أيضاً بقصة الزرع. حشرة خاد من فصيلة القامسيات. طولها يراوح من ٨ إلى ١٢ م. جسمها مفلطح الشكل مسطح. ظهرها مجهز بنس صفيحة دقيقة الشكل لها إلى الصفار الزاهي تلوح خطوط مسطوية قليلة الارتفاع وبكتبان جليتان عند انتهابه || موطنها بلاد الشرق الأدنى . تركب الحشرة والشعر وتقع بها إحد الأني لها تنصص للشم تنصص الأسماك وتسمى الذليل. تظهر الحشرة الكاملة في أواخر نيسان ثم تتزاوج بعد ظهورها بامبور . كويها يدمر ينسح ساعات . وبعد كويها بارية أيام تمتع الأني مكها الصغير ، الكروي الشكل ، الأخير اللون ، حل صفحات المصنف العليا ، لطفاً متساوية يراوح عددها من ١٢ إلى ١٤ وكل لفحة تحوي من ١٢ إلى ١٤ مكة تنفخ ، بعد متنها ينحصر ١٠ أيام ، عن يرقات دقيقة تبلغ طولها الحشري بعد انقضاء أربعة أسابيع تكون غلظاً قد مرت بارية انسلخات || والوسيلة شارة في جميع أحوالها لا سيما في الدور الحشري . تكالغ لما يستأكل أسد الحواشير النعامة تسمى حل الزرع فيفشي عليها بكاملها . وأما بحرقها بعد جمعها ضمن أحباب خاصة تستعمل لهذه الغاية . ومن الطرق الناجمة استبدال أنواع الحشرة البلدية بالوراع باكورية تمكن الزرع من الأسلاك والمهيج قبل أن تستكن منه الحشرة .

١٤٥٩٣ - سَوَيْكٌ قَيْصِيَّةٌ * ، لِيغَرِيلُ الْقَيْصِيَّةُ

Colaspidea atrum (S). Négril de la luzerne, Colaspe, Colaspide, Babotte noire (F). Luzerna grub (E). Colaspide atrum (D).

حشرة من التفريل من فصيلة النصارياي جسمها بيضي الشكل ، عذب الظهر . طولها يراوح من ٤ إلى ٦ م. ثوبها إلى السواد اللامع . تمتع مكها حل القصة فيتم من يرقات تلثم الأوراق || تظهر في نيسان وتستمر إلى أيلول . تكالغ باستهلاك الرقيتيون .

Aloë officinal

١٤٥٨٧ - سَوَيْكٌ عَرَبِيٌّ

يسمى بالبالاية ، أجليا .

Aloë striata (S).

١٤٥٨٣ - سَوَيْكٌ مُخَطَّطٌ *

Aloë strié (F).

نبات عديم الساق شراخه الأزهرى يعلو من ٤ إلى ٦٠ سم. أزهاره مظلمة التجميع ، حمراء اللون . أروافه قليل من ٤ إلى ٦٠ سم. نصلها ثخين للتجميع ، عديم الحشفة ، عسلها الصلصة . عسلها شائعة لها إلى الجزيرة . أزهاره يستمر من نيسان إلى أيار .

Aloë plicatilis (S).

١٤٥٨٤ - سَوَيْكٌ مِرْوَحِيٌّ

Aloë éventail (F).

جنية تعلو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أروافها متعاقبة ، ثنائية التجميع ، مروحية الهيئة ، نصلها يعلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. لونه إلى الخضرة البحرية . حذاز مسن الخلق . أسنانه ثخيلة ، بيضاء اللون . أزهاره رقيقة إلى متوسطة اللينة ، طولها يراوح من ٤ إلى ٥ سم. || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران .

Aloë grandidentata (S).

١٤٥٨٥ - سَوَيْكٌ مُسْتَنٌ

Aloë à grandes dents (F).

نبات عديم الساق . شراخه الأزهرى يعلو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أزهاره مسطيلة الشكل رقيقة إلى اللون || أروافه قليل من ٣٠ إلى ٥٠ سم وتعرض نحو ٧ نصلها قليل التجميع يتخرج أنصار الأزرق ، مسن الحافة ، شاكلة الإنسان الحادة المتعاقبة || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز .

Aloë ciliaris (S).

١٤٥٨٦ - سَوَيْكٌ مَهْدَبٌ

Aloë cilé (F).

جنية مرصعة ثخيلة الساق المسطوية التي تطل نحو ١٠ أمتار . أروافها شبيهة لتصل الذي يعلو من ١٠ إلى ١٥ سم. ويعرض نحو ٣ سم. حذاز مهذب الحافة حشفة أبيض اللون || أزهاره عتيقة التجميع لها إلى الحيرة الأزاهية الكلاسة || أزهاره يستمر من آذار إلى حزيران .

Tereksia (S).

١٤٥٨٧ - سَوَيْكٌ *

Téréksie (F). Téréksie (E).

جنس طير من طوالب الساق وصفيحة الزرقايات . أنواعه المعروفة ثلاثة جميعها من الطيور القاطنات مشاعها البلاد الحارة الآسيوية والأفريقية ، صفيها البلاد المعتدلة الحرارة من آسيا الشمالية إلى أوروبا || أرواف أنواعها وأشهرها السويلة الشهاب .

١٤٥٨٨ - سَوَيْكَةٌ شَهْبَاءُ *

Tereksia cinerea (S). Téréksie grise (F).

طائر من السوط قريب الشبه من البريقطة السلطانية . جسمه متوسط القد ، صدر الرأس ، مسطيل للطاق العنق التليل الانتعاش . رأسه وظهوره ورجلاه وذنبه إلى الكهبة الشهاب . زوره وصفته ورجله وظهره وأنتيكه إلى الشهاب كيشية المراج . ذنبه غزوي الشكل ، قصير . ساقه إلى السرعة القليلة . قوة الأشباب والجزور والحشرات . انتاع تثن منها في أنفوس تقيمه بين الأشباب النجيلية المسطوية القليلة الجهد من الماء . جسدها أروع يضاه .



سولن



سولة شهاب



سون



سولة



سويلة القصة

تتميز باستطاعة تلك الأمل التي يتبعها بطن صلب ،
استطيل الجرم ، منبسط الطرف . وتتميز أيضاً بدرجة
انتفاخها التي تبلغ نحو ١٠٠ كيلومتر بالأسعة .

١٤٦٠٧ - سِيَاكِي *
Par série (F).
From series, Standardized (E).
هو في البرق الاقتصادي الإنتاج الآلي بالأسعة .

١٤٦٠٨ - سِيَاكِل *
Sial (F). Sial (E).
اسم اصطلاحي يطلق على القشرة الأرضية الجامدة المكشوفة
بمستطعها من صخور صوانية وبازلتية ، تقدر سماكتها بنحو
٩٠ كيلومتر ، تلتف الطبق فيه المائع الذي يدعى سيده .

١٤٦٠٩ - سِيَاكِلَة
هي السطح اللامع شبيه غا ذك أبيض طوله إذا زرع
سأل منه بين تلك صافية لينة طيبة . ج سيال .

١٤٦١٠ - سِيَاكِلَة
Fascie, Liste en tâches (F).
السيلة والسائلة شبة مستطيلة الشكل كالقائمة .

١٤٦١١ - سِيَاكِيَان
Slamang
هو الجبين السيئ كليل ، اطلبه .

١٤٦١٢ - سِيَاكِيَانِيْدَة
Cianamide, Cyanamide
السياناميد أو الكلس اللازوتي من الاصطناع الكيماوية
التركيبية التي يستحصل عليها بتثبيت الآزوت الجوي
على كربيد ، الكلسيم . لشكائه التجارية الشائعة
الاستعمال ثلاثة :

١ - السياناميد المبريل . يحوي من ٢٠ إلى ٢٤٪
أزوت مع ٧٠٪ كلس . سيبينه سواء اللون ، ثوبية
الرائحة .

٢ - السياناميد المسحوق للزيت . يحوي من ١٨
إلى ٢٠٪ أزوت مع ٩٠٪ كلس ويضاف إليه نحو
٢٪ من الزيت المثلل لتسهيل لثته . مسحوق أسود اللون ،
ذو رائحة ، لثني الرائحة .

٣ - السياناميد القوي أو نيتراسياناميد . يحوي ١١٠٪
أزوت اميدي و ١١٠٪ أزوت نيتريكي . فهو كروي
الجوهر ، حاد الرائحة . اسمر اللون .

١٤٦١٣ - سِيَاكِيَانِيْدَة *
Cyanelle (F). Cyanella (F).
جنس نباتات جنسوية برية وتربيت من فصيلة الزنبقيات .
أزهارها المرفوعة ستة منبتا يحوي نائفاً افرقية انجوية ||
جلدها برية لينة لينة . سفيها شراعية فراء . أزهارها
حاجسة ، مستطيلة ، متعاقبة ، زاهية الخضار . أزهارها
عقودي التجميع . أزهارها صغيرة جميلة ، زرقاء اللون أو
صفراء || تزهر في المراكز إنما تجف في البرد .

١٤٦١٤ - سِيَاكِيَانِيْدِين *
Cyanogène (F). Cyanogen (E).
غاز شديد التفاعلية تتألف مركب من الكربون والآزوت .

١٤٦١٥ - سِيَاكِيَانِيْدِين *
Cyanore (F).
اتحاد السيانوجين مع جسم بسيط .

١٤٦١٦ - سِيَاكِيَانُطُس
Ceanothus (S).
Ceanothus, Ceanota (F). Blue tea bush, Red root
tree (E). Säckelblume (D). Ceanoto (I).
جنس نباتات برية وزينية من فصيلة النبقيات . أزهارها

١٤٥٩٤ - سُوَيْدَة

Albumen, Albumine, Endosperma, Périsperme (F).
Albumen, Albumin, Endosperm, Perisperm (E).
مادة لشفوية أو مدنية أو آسية تكون في البزرة تنتمي
منها للملحقة .

١٤٥٩٥ - سُوَيْدَة
هي الدلول ، اطلبه .

١٤٥٩٦ - سُوَيْدَة سُوَيْدَة
Hypocotyle (F).
Hypocotyl (E).
هو الجزء السفلي من الجنين مركزه بين السنج والقلبتين .

١٤٥٩٧ - سُوَيْدَة سُوَيْدَة
Epicothyle, Tigelle (F).
Epicothyl (E).
هو الجزء الأمامي من الجنين مركزه فوق القلتين فوق
القلبتين تحصيل الباق من نمو .

١٤٥٩٨ - سُوَيْدَة
Phlebocoma (F).
هي السكيت نوع من البيض الصغير الباك .

١٤٥٩٩ - سُوَيْدَة
Egal, Parall (F). Equal, Like (E).
السوي أو المتساوي .

١٤٦٠٠ - سِيَاكِي *
Hale (F). Hedge (E).
فاصل من الأشجار أو جنبات حية يفصل الحديثة أو
الحقل عن غيرها .

١٤٦٠١ - سِيَاكِي *
Planète (F). Planet (E).
السيارة أو الكوكب السيارة جرم فضائي كبير القدر
يدور حول الشمس ويسمى منها الثور كالارض وضارطة
والمرئخ والمشتري ...

١٤٦٠٢ - سِيَاكِي *
Ben (F).
هو ألبان ، اطلبه .

١٤٦٠٣ - سِيَاكِي *
هو سون المنافع ، اطلبه .

١٤٦٠٤ - سِيَاكِي الْبَحْرِي
Xiphias (S).
Espadon (F). Swordfish (E).
جنس اسماك بحرية كبيرة القد من فصيلة الاسقمريات .
أزوارها مدنية يكثر وجودها في بحار المناطق الحارة .
تتميز باستطاعة حلق فكها الأمامي الذي يدعى كالسيف .
أشهر أنواعها سياف البحر المبرور .

١٤٦٠٥ - سِيَاكِي الْبَحْرِي الْمَعْرُوف *
Xiphias gladius (S). Espadon commun, Polsson
épée (F). Common swordfish (E).
نوع من سياف البحر كبير الحجم والسيف والزنفسنة
الظلمرية . طوله يبلغ خمسة أمتار . موطنه المتوسط
والأطلسي .

١٤٦٠٦ - سِيَاكِيَات
Xiphilidae (S).
Xiphilidae (F). Xiphilidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزمائف كانت في
التصنيف الماضي من توابع فصيلة الاسقمريات || أنواعها

المرفوعة قليلة العدد أشهرها سياف البحر والبرامح والسارية .
جميعها من الاسماك البنية التي لا تقترب كثيراً من المياه
والأسفل || موطنها بحار البلاد الحارة غير أنها لا تمتنع
من تغيب أسراب الزنكة والسردين حتى في أمتار البلاد
المحتلة الحارة || أسماها كبيرة القد وشمية الشكل ،



سياف البحر المبرور



سيانة

الاحنة . وهي صورة رِبَلْ قَائِمٌ عَلَى رِجْلَيْهِ الْبَيْسَى وَقَدْ رَفَعَ رِجْلَيْهِ الْبَيْسَى وَهَذِهِ الْيَسَى فَوْقَ رَأْسِهِ وَهَذِهِ الْبَيْسَى رَأْسٌ خُطٌّ . حُدُودُ نَجْوِيهَا ٩٩ شَهْرَاهَا ٩ الْمَرْقُوقُ وَوَأَسْ أَمْلَسْ ٩ وَوَعَاتِي الْفَرَايَا ٩ .

Pommier (F).

١٤٦٢٤ - صَيْبُ

هو الْفَتَاحُ ، أَلْطَبُ .

١٤٦٢٥ - صَيْبُ الْفَرْجِ *

Scythris temperatella (S).

فَرَّاشَةٌ صَغِيرَةٌ الْفَتْدُ مِنْ فَصِيلَةِ الْبَارِيَاتِ تُرْجِي إِلَى السَّمَرَةِ الْكَاكَةِ . اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْإِطْرَافُ . زِيَادَتُهَا عِيَانِيَانِ مُسْتَقِيلَانِ . جِيلُهَا الْخَوَلِيُّ وَاحِدٌ . رِقَّتُهَا تَمُوتُ دَوْدَةُ الْفَرْجِ ، أَلْطَبُ .

١٤٦٢٦ - صَيْبُ الْفَرْجِ

هو الْفَرْجُ ، أَلْطَبُ .

١٤٦٢٧ - صَيْبُ الْفَرْجِ * ، فَكَمَةُ مُتَوَجِّهَةٌ *

Cystophora (S). Cystophora, Phoque & capuchon (F). Hooded seal (E).

سَيَّانٌ بَحْرِي لَبَنٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْفَقِيصَاتِ . أَصْلَاهُ مَجَاحِ بِحَارِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ مِنَ الْفَرْجِ إِلَى الْقُطْبِ وَالْأَرْضِ الْجَدِيدَةِ ۥ طُولُهُ خَمْسٌ ثَلَاثَةُ أَمْثَارٍ . قُوَّةُ إِلَى السَّوَادِ الْأَزْرَقِ الْمَوْجِ تَطْلُو رِقَّتُهُ يَضَاهُ . رَأْسُهُ وَأُطْرَافُهُ سَوْدٌ . يَمُوتُ الْكَرْمُ خُطٌّ فَجَائِزَةٌ تَطْلُو الرُّأْسَ فَزَيْدُهُ تَجِبًا ۥ الْفَرْجُ تَقْضِعُ جَرِيرًا وَاحِدًا فِي الْحُلِيِّ ۥ أَيْضًا الْفَرْجُ ثُمَّ يَمُوتُ مَعَ الْعَمْرِ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ الْتَهَانِي هَذَا الْكَلَامُ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ ۥ قُوَّةُ الْإِسْمَاكِ وَالْفَرْجِ وَثَوْبُهُ وَالْفَرْجِ وَثَوْبُهُ ۥ يَصَادُ مِنْ أَجْلِ فَرْجِهِ الْفَاخِرَةِ الصَّنَفِ . يَنْتَهِي مِنْ أَكْلِ الْفَرْجِ وَيَسْتَمِلُ الْفَرْجِ وَالْأَمْلَسُ وَالْطَّامُ .

Mustel (S). صَيْبُ الْفَرْجِ . كَتَبُ الْبَحْرِ .

Emissole (F). Smooth hound, Prickly hound (E).

لَا يُمْكِنُ اعْتِدَافُ اسْمِ وَكَلْبِ الْبَحْرِ لِأَنَّهُ يَطْلُقُ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ عَشْرَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الْإِسْمَاكِ الْكَبِيرَةِ الْفَقِيرَةِ ۥ وَالسَّيْلِ جَنْسُ اسْمَاكِ بَحْرِيَةٍ وَلَوْدَةٍ مِنَ فَصِيلَةِ الْبَيْبِكِيَّاتِ . أَنْوَاعُ الْمَرْوَةِ قَلِيلَةٌ . أَصْلَاهَا بِحَارُ الْبِلَادِ الْخَالِدَةِ وَالْمُتَحَدَّةِ الْخَالِدَةِ . جَمِيعُهَا مَفْرَسَةٌ وَطَاشَةٌ لَا تَعُفُ مِنْ فَرْجِهِ . سَرَسُهَا الْيَمُّ تَحْمَرُ كَالْحَمْرِ ۥ أَجْسَامُهَا وَشَبِيهِ الشَّكْلِ . تَطْلُو مِنْ ٦٤٠ إِلَى ٢٠٠ سم . الْوَلُجُهَا تَتَوَجَّحُ بَيْنَ الْفَكَلَةِ وَالرَّيْدَةِ الْخَطَاوَةِ الْمَاجَاتِ . رُؤُوسُهَا خُرُوفَةٌ . أَشْدَقُهَا أَشْدَقُ قَصِيرَةٍ مُتَأَخَّرَةٍ . اسْتَأْنَتْهَا صَغِيرَةٌ ، حَامِدَةٌ ، مَتَاسِكَةٌ الرَّصْفِ . نَوَاسِيهَا مَجْزُوزَاتٌ بِصِمَاتٍ سَادَةِ تَتَلَوُّعُ وَتَتَلَوُّعُ حَتَّى الْعَلَبِ . قَصِيرَةٌ تَنْتَهِي بِمَنْعَةٍ مَفْرَسَةٍ الْيَمِّ ۥ زَعَانُهَا تَبَايَنَةُ التَّرْتِيبِ وَالْإِسْكَالِ . الْبَازِيلَةُ كَبِيرَةٌ ، مُسْطَلَّةٌ ، ثَلَاثَةُ التَّغْرِينِ الْفَرْجِ ۥ أَحْرَفُ أَنْوَاعُهَا وَشَهْرَاهَا السَّيْلُ الْمَبْلُوطُ وَالسَّيْلُ الْإِلَاسُ .

Mustel leavis (S). صَيْبُ الْفَرْجِ

Emissole leise (F). Smooth hound (E).

نَوْحٌ مِنَ السَّيْلِ . مَكَّةٌ بَحْرِيَّةٌ وَلَوْدٌ . أَصْلَاهَا الْبَحْرِ الْإِيضِي الْمَوْتِ وَيَمُوتُ مَنَاطِقُ الْبَحْرِ الْإِيضِي أَصْحَابُهَا الْمُتَضَلَّةُ الْمَقْتَدَةُ مِنْ جِبِلِّ طَارِقٍ كَرِي ۥ جَسْمَانِهَا وَشَبِي الشَّكْلِ يَطْلُو مِنْ ١٤٠ إِلَى ١٦٠ سم . ثَوْبُهَا إِلَى الْبَرْدَةِ الْخَالِدَةِ تَزْرُقُ وَتَسْمَرُ فِي الظُّلْمِ وَتَقْبَرُ فِي الْيَمِّ . مَسْكُهَا مَالِسُ الْبَشَرَةِ حَامِدُ الْتَحْيِي ۥ لَهَا كَاغِي الصَّنَفِ ، قُلٌّ مِنْ يَرْجِبُ فِيهِ . مَسْكُهَا شَالِعُ الْإِسْكَالِ الصَّنَافِي . زَيْتُهَا يَجِدُ الصَّنَفِ .

المَرْوَةِ ٢٠ مَنَاطِقُ الْإِيضِيَّةِ الْخَالِدَةِ . أَوْرَاقُهَا عَابِلَةٌ مُتَضَلَّةٌ بِسِطَةٍ . أَزْهَارُهَا خَشْيَةٌ ، خَشْيَةُ الْتَرْكِي ۥ مَلَوْنَةُ الْتَوَيْجِ . شَهْرَاهَا جَرَاهُ ثَلَاثِيَّةُ الْفَرْجِ ۥ أَشْهَرُ أَنْوَاعِهِ مَا يَلِي .

Ceanothus

americanus (S). Céanothe d'Amérique (F).

جَنْبَةٌ مَعْمُورَةٌ تَطْلُو خَمْسٌ ١٠٠ سم . أَوْرَاقُهَا أَهْلِيَّةٌ ، ذَلَقَةٌ ، مَطِيَّةٌ . تَصْلُحُ نَازِلُ الْفَرْجِ ، مَنَاطِقُ الْخَالِدَةِ ، بَحْرِيَّةُ الصَّنَفِ الْإِيضِي ، أَزْهَابُ الْفَرْجِ ، أَزْهَابُ الْفَرْجِ ، تَجْمِيعُ ، قِيَمَةُ الْبَيْبَاتِ الْإِيضِي ۥ أَزْهَارُهَا يَسْتَمَرُّ مِنْ حَزْرَانِ إِلَى آبِ . يَسْتَخْرِجُ مِنْ جُلُودِ مَوَادِّ طَبِيْعَةٍ كَثِيرَةٍ الْتَوَيْجِ تَصْلُحُ فِي مَعَالِجَةِ الْفَرْجِ وَالْفَرْجِ وَبَعْضِ الْحَيَاتِ .

١٤٦١٨ - صَيْبُ الْفَرْجِ عَمَلِي

Ceanothus velutinus (S). Céanothe velouté (F).

جَنْبَةٌ مَعْمُورَةٌ تَطْلُو خَمْسٌ ١٨٠ سم . أَوْرَاقُهَا مُسْطَرَّةٌ ، قَامِدَةٌ ، مُسْطَلَّةٌ الْفَرْجِ الْفَرْجِ الْفَرْجِ عَلَى صَفْحَتِهِ . أَزْهَارُهَا يَضَاهُ الْيَمِّ ، حَفَلُوكَةُ التَّجْمِيعِ ، صَغِيرَةُ الْفَتْدِ . أَزْهَارُهَا يَسْتَمَرُّ مِنْ حَزْرَانِ إِلَى تَوَزِ .

١٤٦١٩ - صَيْبُ الْفَرْجِ صَنْجِي

Ceanothus azur (S). Céanothe azur (F).

جَنْبَةٌ مَعْمُورَةٌ جَانِدَةٌ تَطْلُو مِنْ ١٠٠ إِلَى ٢٠٠ سم . فَرْوُهَا أَهْلِيَّةٌ ، زَيْدُ الْبَحْرِ . أَوْرَاقُهَا مُتَضَلَّةٌ قَلِيلَةُ الْتَسْتِي . تَصْلُحُ أَغْصَانُ الصَّنَفِ الْإِيضِي ، خَلِي الْفَرْجِ الْفَرْجِ . الْيَمِّ . أَزْهَارُهَا كَبِيرَةٌ التَّجْمِيعِ ، سَلِيلَةُ الشَّكْلِ ، مَسْطَرَّةُ الْيَمِّ ۥ أَزْهَارُهَا يَسْتَمَرُّ مِنْ أَيْارِ إِلَى تَوَزِ .

١٤٦٢٠ - صَيْبُ الْفَرْجِ فَيْدَلِرْ

Ceanothus fendleri (S). Céanothe de Fendler (F).

جَنْبَةٌ مَعْمُورَةٌ فَرَّاشَةٌ تَطْلُو مِنْ ١٠٠ إِلَى ١٥٠ سم . فَرْوُهَا بَحْرِيَّةٌ الْيَمِّ . أَوْرَاقُهَا يَضَاهُ ، صَغِيرَةُ الْفَتْدِ ، حَامِدَةُ الْتَسْتِي . تَصْلُحُ مَالِسُ الصَّنَفِ الْإِيضِي ، خَلِي الْفَرْجِ الْفَرْجِ . أَزْهَارُهَا عَفْرِيَّةٌ التَّجْمِيعِ لَوْحًا إِلَى الْيَمِّ الْيَمِّ ۥ أَزْهَارُهَا يَسْتَمَرُّ مِنْ حَزْرَانِ إِلَى تَوَزِ .

١٤٦٢١ - صَيْبُ الْفَرْجِ قُتُوبِي الْفَرْجِ

Ceanothus thyrsiflorus (S). Céanothe on thyrs (F).

بَحْرِيَّةٌ تَطْلُو مِنْ ٢ إِلَى ٦ أَمْثَارٍ . فَرْوُهَا فَعْلَةٌ مَالَةٍ . أَوْرَاقُهَا أَهْلِيَّةٌ ، حَامِدَةُ الْتَسْتِي . تَصْلُحُ أَزْهَابُ الْعُرُوقِ ، يَأْخُذُ الْفَرْجِ . أَزْهَارُهَا قَتَرِيَّةُ التَّجْمِيعِ ، سَلِيلَةُ الشَّكْلِ ، زَيْدُ الْيَمِّ ۥ أَزْهَارُهَا يَسْتَمَرُّ مِنْ أَيْارِ إِلَى تَوَزِ .

١٤٦٢٢ - صَيْبُ الْفَرْجِ مُسْتَنَ

Ceanothus densatus (S). Céanothe densé (F).

جَنْبَةٌ بَحْرِيَّةٌ مَعْمُورَةٌ تَطْلُو مِنْ ١٥٠ إِلَى ٢٠٠ سم . أَوْرَاقُهَا أَهْلِيَّةٌ مَسْطَرَّةٌ ، تَصْلُحُ مَالِسُ الصَّنَفِ الْإِيضِي ، مَكْلُوفُ الْخَالِدَةِ الْيَمِّ ، خَلِي الصَّنَفِ الْفَرْجِ الْفَرْجِ . الْيَمِّ ۥ أَزْهَارُهَا خَشْيَةُ التَّجْمِيعِ ، زَيْدُ الْيَمِّ . أَزْهَارُهَا يَدُومُ طَوَالَ يَمْرِ .

١٤٦٢٣ - صَيْبُ الْفَرْجِ فَرْسُكُوسْ

Persia (F). Persous (E).

سَيَّانٌ أَوْ فَرْسُكُوسْ وَتَمُوتُ أَيْضًا حَامِلُ رَأْسِ الْفَرْجِ ، كَوَكِيَّةٌ مَجْمُوعَةٌ شَالِيَةٌ الْمَقِي مَرْكَزُهَا بَيْنَ ذَاتِ الْكَرْسِيِّ وَبَيْنَ



سَيْبُ الْفَرْجِ



سَيْبُ الْفَرْجِ



سَيْبُ الْفَرْجِ

لونها الى الجوزة تركب قشور الابر قرب ادراكها بقتلها.
يكافح عند ظهورها باستمال احد الانواع البراغيز النملية
الحفلة .



سجل ميدول

١٤٦٣٨ - سيئوئوجيه ، علم الخلايا

Cytologie (F). Cytologie (E).
علم يبحث في ماهية وحياة الخلايا من جميع النواحي ان
جسموية او كيميائية او خلافا .

١٤٦٣٩ - سيئوئورولوجيه

Cytomorphologie (F). Cytomorphologie (E).
الدرس القياسي (المؤلفي) الخاص بالهياكلية او الخلية .



سجلان الزرع

١٤٦٤٠ - سيئوئو٠

Stona (S). Sitona (F).
جنس حشرات صغيرة القدر مسطحة الجسم من فصيلة
المسيات . انولاه عديدة تطول من ٥ الى ١٦ م .
انولاه مختلفة الالوان السوية يكثر فيها الاطلس والخطي.
تركب غشيت نباتات الفصيلة القرنية . افراوها زبدية
لا تتجاوز طب بعض الارواق .



سجلان زبد

١٤٦٤١ - سيئوئو منقط٠

Stona lineata (S). Sténo du pots (F). Sitona lineata (E).

حشرة خاضعة داخية من فصيلة المسيات وذو عمدات
الاجنية . خنثاها تعيش على لوراق القضايات البرية
والزراعية . يرقاتها تركب الجذور لتصلها || جسمها صغير
القدر يطول من ٤ الى ٥ م . ثوبا الى الشبهة الخضراء تملوها
ماجة كستنية جزوية تتقلب مع انكاس البثور . راسها
مستعرض الجرم . حينها كبريات . زياتها راسها
متكها مسطحة الطول . ظهورها مستعرض الحولف الكلاص .
عندما كيفت اتمل ، غشيتا التحزير القاطب . ارسافها
رباعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد من الجيل .
الحشرة الجملانة من نباتها الشوي في اوائل الربيع وتعيش
سبي الابرح تموز . كسر في التبار . قشاة بمد ظهورها
باسبيو٠ . تمتع المكان على فصل الارواق وني التربة .



سجلان لمحة

١٤٦٤٤ - سيئوئو منقط٠

Cétoine (F). Cétoine (E).
السبين مادة دعنية تستخرج من بعض انواع الحيات اعصها
السبر .



سجلان

١٤٦٤٣ - سيئوئو

Scarus algensis (S).
Scara sidjan (F).
سمكة بحرية من نبات مصفار مأكولة طية العلم كان
لها شهرة في المصور للتارة .



سجلان غسك

١٤٦٤٤ - صيج

Raisellament (F).
Run off surface (E).
مقدار الماء الذي يسيل على مسلة معينة من الارض .

١٤٦٤٥ - صيج ، صهر ، صبح ، صبح

Fondre (F). To melt. To cast (E).
ذوب
قاد او درج التي الى حالة اللاتية .

١٤٦٣٠ - سيئوئو ميدول٠

Mustelus vulgaris, Mustelus mustelus (S). Emissola communis, Moutella (F). Prickly bound (E).

نوع من السيل . سمكة بحرية واد . اعطائها فصيلة
الارياح تشمل معظم المناطق اخارة والمحتلة الحارة من
البحر الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || تعتبر من
الاسماك البنية . سرورها عرض البحر || جسمها وشي
الشكل يطول من ١٧٠ الى ٢١٠ سم . ثوبا الى الكلبة
تزره وتتم في الظهر وتير في البطن . سكها مبش
التصيب والويل الصغيرة النملية الحيم || سكها شائع
الاستعمال الصناعي . زيتها جيد الصنف . لحها كان
قل من يرب فيه .

١٤٦٣١ - سيوان

Cétone (F). Chafer (E).
جنس غشاش من فصيلة الحليبات الزواحة المربعة نحو
٢٠٠ جميعها حيلة الالوان الزاوية تعيش على رقيق
الانوار ومن العصاة النباتية التي تمصها سحيا استطاعت.
يرقاتها تعيش على المواد العضوية المنحلة . اشهر انواعها
ما يلي .

١٤٦٣٢ - سيوان الزرع٠

Oxythres funesta (S).
Cétone stictique (F).
نوع من السيوان طولها نحو ١٠ م . ثوبا الى السواد لامع
تملوه رقة يضاء || تركب الزروع قبل الاسبال
تفتحي على القلايا . وتركب الانوار على اعتلاف
انولاه وقد لا تمت في زمام الكربة في ابلان الارواق .

١٤٦٣٣ - سيوان زبانه٠

Epicomets hirsella (S).
Cétone value (F). Blossom feeder (E).
نوع من السيوان طولها يراوح من ٨ الى ١١ م . جسمها
ازغب البشرة . ثوبا الى السرة المابقة تملوه رقة غليظة
من البياض . عندما مشوا يروح زفي اسمهم الخج .
تركب اذوار الانوار المصرة تفتريها ولا تمت من
الورود والانوار الحقلية .

١٤٦٣٤ - سيوان منقط٠

Cetonia aurata (S). Cétoine dorée, Hanneton des roses (F). Flower beetle, Sap chafer, Green rose chafer (E). Goldrosenkäfer, Goldkäfer (D).
نوع من السيوان طولها يراوح من ١٤ الى ٢٠ م .
ثوبا الى الخضار النملية تملوه ماجة ذعية || تركب
الانوار والابر النملية . يكثر وجودها على الورود والابران
والمرابا || رقاتها تعيش على المواد العضوية اعصها
جلود الصنفات المنقطوة .

١٤٦٣٥ - سيو بلازوه

Cytophase (F).
Cytophase, Cytoplasma (E).
هي المادة الاولى اي المادة البروتوبلازمية التي تحرك
بجولة الخلية النباتية .

١٤٦٣٦ - سيو سيورينه٠

Cytoporina (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة المسيات . يكتيها
فضية التجميع تحضها وثيمة درزية الشكل ناكثة . شفرتها
اسطوانية . يورقاتها غليظة مستقيمة شفافة || انولاه
قليلة اعرفها النوع الذي يمتري البين الجوي .

١٤٦٣٧ - سيو سيورينه البولي٠

Cytoporina ceterperda (S).
فطر مجهرية يصيب ثمار البين الجوي تربطها . مشوره
الخارجي يقع مستوية منخفضة السطح طولها نحو ٧ م .

١٦٦٥٢ - سيريس هو الأرجس البري ، اطليه .

١٦٦٥٣ - سيراسيوم Cerastium (S). Céralste (F).
Starry grasswort (E). Hornkraut (D). Cerastio (I)
جنس نباتات عشبية ممرسة من فصيلة القرنفليات . أنواعه
عديدة مظهرها بري وبضها زراعي رئيسي . سويها
وفرعها مزفرية القدم ، زيتها أبيض || أوراقها متعاقبة
نصلها شيق الصفحة . أزهارها عديدة ، كبيرة القد ،
بيضاء اللون || تزرع حل حافة الممرات وفي المواق
الصخرية || أشهر أنواعه مايلى .

١٦٦٥٤ - سيراسيوم أبيض *
Cerastium candidissimum (S). Céralste blanc par (F).
يعلم من ١٢ الى ١٥ سم . فروعها عديدة متراكبة زيتها
كثيف التجميع ، ظلي اللون || أوراقه طول نحو
٢ سم ، وتعرض نحو ٣ سم . أزهاره صغيرة القد شديدة
البياض الثلجي || أزهاره يستمر من أيار الى حزيران .

١٦٦٥٥ - سيراسيوم كبير الزهر *
Cerastium grandiflorum (S). Céralste à grandes
fleurs (F).
يعلم من ١٥ الى ٢٥ سم . زيتها أفرق الالتشاب .
أوراقه غطية طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض نحو ١ سم .
أزهاره تده من ٧ الى ١٥ ، قطر الزهرة يراوح بين ٣ و ٥ سم .
أزهاره يستمر من نيسان الى تموز .

١٦٦٥٦ - سيراسيوم مزفرية ، أذن الفأرة
Cerastium tomentosum (S). Céralste tomentoux,
Argentine, Oreille de souris (F).
يعلم من ٢٥ الى ٣٥ سم . زيتها كثيف التجميع جمد .
أوراقه متعسبة طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ٤
الى ٦ سم . أزهاره مستطيلة ، بتلاتها سنائية الشكل لونها
الى البياض اللاليز || أزهاره يستمر من أيار الى
حزيران .

١٦٦٥٧ - سيريس ، سيلة ، مظهره سيلة
Silo
حفرة مستديرة خاصة أو بلاء موصوف اسطواني الشكل
ملسوط الارتفاع تحفظ فيها ، بعض البوت ، الجوب
والجنود والسائل والكلاء الخ .

١٦٦٥٨ - سيريس
Syrzis
هي بقعة الفل ، اطليه .

١٦٦٥٩ - سيريس ، حنجرع
Huile de sésame (F). حنجرع
Sesame oil (E).
هو دهن السمسم اي زيت يستخلص من بذور السمسم
بعد نقعها بالماء ، وتصفيتها وتحميصها وطحنها لانتاج
الطعمية ثم ترسب الطعمية لفروز السرج عن الكسب .

١٦٦٦٠ - سيريس ، سيريس
Cereus (S). Cierge (F). Hedge cactus, Fench thistle
(E). Kerzenkaktus, Säulenkaktus (D). Cero (I).
جنس نباتات برية وزينة من الصباريات الشولية .
أنواعه زهاء ٣٠٠ تتميز بتاتلها الجسمودي اللائسي .
مظهرها من نباتات المناطق الحارة الارامية . أزهارها
جميلة الشكل وكبيرة القد || اعرف أنواعه وأشهرها
ما يلي .

١٦٦٦١ - سيدا
Sida (F).
هو الخورق جنس نباتات عشبية من الخيايات .

١٦٦٦٢ - سيدا كوية صخره *
Cibaria fulvata (S).
Cidaria laune (F). Cidaria fulvata (E).

حشرة من فصيلة الاثليات ودية حشرغيات الاجنسة .
مرتبطا بشمل بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط
والمناطق الجبلية الشاهة . فراشها جارية قشرا رقيق
الازهار . مرتبها خاصة تعيش على اوراق المروج
والشربن || جسمها صغير تقصيف طولي نحو ٩ سم .
بسطها نحو ٣١ سم . رأسها مستدل الجرم اصفر اللون .
جناها صغيرتان . زياتها غطيان . مرتبها متوسط الطول .
جويها اصفر اللون ، اكلف المواج . بطها اصفر اللون
افتح المواج . وراثتها ، عند الفلقين ، الى الصفار
الكبريتي تملو في الزوج الامامي ثلاث بقع برقالية ||
لما جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح
من الصبر الى فصة الليل . تعاطل بعد ظهورها بمنس
سنة اسابيع وتفتح المكن مبدأيا على الصفحات السفلى
من نصال الاوراق || السرعة طول من ٢٥ الى ٢٤ سم .
جسمها اسطواني الشكل ، ماس انتشار . ثوبها يمان
البينة التي تعيش فيها . ورايتها البنية السلي ماصة ما
يعدو يمس الى القنوس والشب عند الانتقال || طور
الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في الجلالة
ضمن صلجة معتدلة الحيلك .

١٦٦٦٣ - سيدا ، سيدا
قل فيه : حجر ذو ساق قوية تنشر حراق ورياح حريق
غشبه يبيض به فرك الكتان .

١٦٦٦٤ - سيدا ، حنجرع
Cidre (F).
Cider (E).
خر تصنع من صير تفلح السير .

١٦٦٦٥ - سيريس ، قنصير
Tegmen, Secondine (F).
Tegmen, Secundine (E).
هو اللشاش الثقات الباطي الذي يلفف البيضاء والبرزة .

١٦٦٦٦ - سيريس ، سيريس
Ceratophrys (S).
Cératophrys (F).
جنس سفادغ جامة من فصيلة الكدانيات . أنواعه الممرسة
عشرة مدها مظهر بلاد امريكا الجنوبية || اجسامها كبيرة
القد طول من ١٨ الى ٢٢ سم . عند الذكور بين ٢٥ الى
٢٥ سم . عند الاناث . رؤوسها غلظية مسطرفة تملوها
تنوعات غضروفية مجنبة الشكل تكنتت الرأس والحمل وقت
كالجدة عبر الظهر الى السير . حيثها كبيرة مستديرة
جاسنة . اجفانها متوجة بقرن مدية الاطراف غضروفية
اللمدة . فمكوكها السفلى حادة الاسنان . يلاوها المرواية
الصقية كبيرة القد ليموية الشكل والقدر . اصابع قوائمها
الامامية ملطقة . اصابع القوائم الخلفية تصفة الخطاب .
جلوها مثاق || انثيا متراكبة الالوان يكثر فيها الحطى
والاخضر والامر والاباق والصفار والاحمر || تعيش مسط
سباتها التي لا تقل عن ١٥ سنة في البر . تسرح في الليل
وبيت في النهار داخل اندقاط سطحية تحفظها في التربة ||
قشرا الحشرات والقار والجربان والظاء والورغ والاساربع
والديدان .



سيدا صخره



سيريس



سيريس أبيض



سيريس كبير الزهر

البلات للإغصنة . عليها خاسي الاسدية او عشارجا .
بعضها مجهز بقل مستطيل غالبا ما يكون مشطرا منذ
لقاعدة || اشهر اجناسها السبريل .

١٦٦٦٨ - **سيزانية** *
Cyrena (S).
Cyrène (F). Cyrena (E).

جنس حيوانات مائية من الرغويات صليبيات الخياشيم
والارجل بين فصيلة السبرليات . اولها المعروفة نحو
٨٠ متشرة في جميع انهر وبحيرات المناطق الحارة ||
اصداها كبيرة القد ، شبه قلبية الشكل ، لاشعورية
المصارع والاعلى ، ثلاثة الانسان الخرويسية ، ثنائية
المخاطب الطليقة || تعيش في الاسمال . لحمها مأكولة ،
مبيلة الصنف .

١٦٦٦٩ - **سيزنيكس**

مظهر زراعي شديد النفاذية يستعمل في مكافحة بعض
امراض الشؤندر اعصها الارض التي تركب البرور
عند انتشها وكشول الصغيرة الشؤند القوية وصعيت
باريانوم والفويوس || مادته النفاذة تركب على مركبات
ضوية عالية من المائد والازيت عادمة الرائحة لا تؤذي
الانسان والحويان ولا تؤذي على الجلد والاشعة الحاطية .
يستعمل على حالته مسحوقا ناعما جافا بمعدل ٣٠٠
غرام لكل ١٠٠ كيلو من برور الشؤندر والخيار والكتان
والبنورة والقطن .

١٦٦٧٠ - **سيزنيديات** *
Cyrenidae (S).
Cyrénides (F). Cyrenidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرغويات صليبيات الخياشيم
والارجل . اجناسها واولها عذبة ، منها العذبة وهي من
متحيريات الاراضي الجوية ، ومنها المعاصرة وهي منتشرة
في معظم انهر وبحيرات العالم || اصداها صليزية او
قوية الشكل ملحقة بشاهد اخضر اللون او بني . مثابها
ثنائية ، طليقة ، صغيرة او معتدلة الطول . ارجلها صغيرة
الشكل || تعيش منفردة في الاسمال . وقاعها الشؤري ينحسر
من اواسط الخريف الى اوائل الربيع || اعرف اجناسها
واشهرها السبرية والصلفيد والسلام واللغة والفبرية .

١٦٦٧١ - **سيزال** * ، **سيزسل** ، **بهايرة ليزيكية**

Agave sisalana (S). Agave sisal, Chanvre de sisal,
Sisal (F). Sisal hemp (E). Sisalhant, Hanifera (D).
Canapa di sisal (I).

نوع من الباهرة ساقها تلو نحو متر ، قطرها يراوح بين
٣٠ و ٤٠ سم . غراسها يرتفع من ٤ الى ٥ اشجار
اوراقها طويلة من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فصلها بحري
اللون ، حاره خضرودي التركيب ، مقصته ذرية ، لذلها
اسم || اوراقها ليفية صناعية شائعة الاستعمال .

١٦٦٧٢ - **سيزالينديات** ، **عذبات**

Casaplinos (S). Casaplinides (F). Casaplinos (E).
سبط من القزليات اجناته واوراقه نحو ٦٠ منها
الاجار والشجيرات والجنات والاعشاب . اذهارها
غضلة الاكولون يلب فيها الاصفر والاحمر . ثمارها قريبة
مبيلة مستعرة يستخرج منها صلبات حر وصفر .
اشهر اجناسها البتم ، اطلية .

١٦٦٧٣ - **سيزامية** * ، **سيزامية القصب** ،

دودة القصب الكبيرة

Sesamia nonagriodes, S. cretica (S). Sesamia (F).
حشرة من القزليات طولها نحو ١٦ سم . رأسها وصدرها

١٦٦٦٦ - **سيزوس الأرجنتين** (S).
Cierge pasacana (F).

نبات منتصب يصلو من ١٠٠ الى ٥٠٠ سم . ساقه عذبة
الصلوح القليلة المدق . سديراته حطية اللون عليها حروري
الملمس ، ابيض اللون ، يطول نحو ١٢ سم . || اذهارها
دجوية الانبلاج ، متوسطة القد ، تطول نحو ١٠ سم .
لونها الياض الاخضر للمواج || يعيش ويزرع على
شواطئ المتوسط .

١٦٦٦٧ - **سيزوس البرازيل** (S).
Cierge mandacaru (F).

نبات منتصب يصلو من ٦ الى ١٠ امتار . ساقه بحرية
اللون ، رابية او سداسية التضلع . عليها خدام شاك
يطول من ١٥ الى ٢٠ سم . اذهارها كبيرة القد ، يشاهد
اللون ، دجوية الانبلاج . يعيش ويزرع على شواطئ
المتوسط .

١٦٦٦٨ - **سيزوس المكسيك**

Cierge hoppenstedti (S). Cierge de Hoppenstedti (F).

نبات منتصب يصلو من ٦ الى ١٠ امتار . ساقه بحرية
اللون ، عذبة الصلوح البازرة المتضعة . سديراتها بحر .
عليها الحبل ، كثيف التجميع ، لاقاضي الطيل .
اذهارها نهائية الانبلاج ، فصلها ودية اللون ، يتلاها
بعض || يعيش ويزرع على شواطئ المتوسط .

١٦٦٦٩ - **سيزوس بوليفيك** (S).
Cierge de Celo (F).

نبات منتصب يصلو نحو ١٠٠ سم . ساقه عذبة الخضر
مكشبة ، عذبة الصلوح تلتبي بضعة من الحبل قلسوية
الشكل . سديراتها جوية اللون ، عليها اصفر يطول
نحو ٨ سم . يتوسط خدام حطية يطول من ١٢ الى ١٦
سم . اذهارها كبيرة القد ، حراء اللون ، دجوية الانبلاج .
يعيش ويزرع في مناطق التريين .

١٦٦٧٥ - **سيزوس ثلاثي الضلوع**

Cierge triangulatis, C. undatus (S). Cierge trigone (F).

جنية عارضة تنسك بجلودها الحوائية . ساقها لاثية
الصلوح الممتدة . اذهارها دجوية الانبلاج ، يشاهد
اللون ، كبيرة الحجم ، قطرها نحو ٢٠ سم . ثمارها ارجوانية
اللون ، يعيش الشكل والقد ، مأكولة لليلة البطم || تعيش
وتكثر على شواطئ المتوسط .

١٦٦٦٦ - **سيزريل** *
Cyrillus (S). Cyrille (F).

جنس نباتات برية ، جنية ، مصرة ، من فصيلة
السبرليات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، منها بعض
مناطق امريكة الحارة || بعضها منتصب ، قليلة الفروع
اوراقها متعقة متعاقبة ، متقاربة . فصلها سداسية ،
ساجدة ، غائرة الطرف والاصاص . اذهارها خشوية ،
سفلية التجميع ، محورية الارتكاز . يشاهد اللون او
تيتية .

١٦٦٧٧ - **سيزريليات** *

Cyrrilaceae (S).
Cyrillaceae (F). Cyrillaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . تتألف من ثلاثة اجناس
تضم اكثر من ثلاثين نوعا . اصلها الاصقاع الحارة من
البلاد الامريكية || نباتات جنيات وشجيرات . لوراقها
متعقة ، متعاقبة . اذهارها خشوية ، صغيرة الحجم ، سفلية
التجميع . كلوصها خاسية الاجزاء . نوعاتها خاسية



ميروس المكسيك



سيزية



سيزال



سيزامية

١٤٦٨١ - سيمسب

السيمسب والسبب : شجر تنضج منه السهام .

Sesbania (S).

Sesbane, Sesbanie (F). Sesban, Douch plant (E).

Sesbanie, Schnurfrechse (D). Sesbania (I).

جس نباتات معمرة من فصيلة التريبات . ازهاره عديدة
ههنا المناطق الاستوائية والحارة . مسطها بري وبهضها
ترسي . يقال انها من النباتات الطبية يتداوى بها لضعيت
حصى المثانة || اشهر ازهاره الثلاثة التالية :

S. à fleurs écarlates (F).

سيمسان شقيقي الزهر

S. à grandes fleurs (F).

سيمسان كبير الزهر

S. d'Egypte (F).

سيمسان مصري

وهو جنية معمرة صفراء الزهر مأكولة البآر القرية .

Saccostome (F).

١٤٦٨٢ - سيمسكك

هو الصمغية حيوان قاقم من الفأريات .

Séséli de Crète (F).

١٤٦٨٤ - سيمسليوس

هو الثمرعرب أغزلي ، اطبه .

Antirrhinum (S).

١٤٦٨٥ - سيمم ، أنثريوم

Mufler (F). Snapdragon (E).

جس نباتات عشبية ليبية عغشبية من فصيلة
الخانزريات . ازهاره ١٢ منها المعمرة والحولية والبرية
والترابية اوراقها المغل متعابلة الارتكاز اما العليا
لفصاقية ، لصلها يختلف مع الاطوار كثر في الاستطالة .
اشهر اولها ما يتبع .

Antirrhinum orontium (S).

١٤٦٨٦ - سيمم أروسيوم

Mufler oronce, Antirrhine (F). Calf's-snout, Lesser snapdragon (E).

Kleines Löwenmaul (D). Gallinacea, Gallinella (I).

نبات عشبي حولي بري وزراعي . ساقه فرواء متعسبة .
تلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه مسطبة . ازهاره ابطية
الارتكاز فردية التجميع تشبه رأس الكباش . لوها الى
الودي الموشع بالأصفر . تحوي بعض المنافع الطبية
وتؤتى السعال || ازهاره يستمر من حزيران الى
أيلول .

Antirrhinum asarina (S).

١٤٦٨٧ - سيمم أصريته ، عمامة القيس

Mufler petit-asarac, Asarina (F). Bastard asarum (E). Unechte hohelwurz (D).

Asarina (I).

نبات عشبي طوي بري مصر يطو من ٢٠ الى ٦٠ سم .
ساقه زقية فرواء . اوراقه كلبية الشكل . ازهاره عطرية
الرائحة ، كبيرة الحجم لوها الى الأبيض الأسفر تملو
خطوط وردية || ازهاره يستمر من نيسان الى أيلول .

Antirrhinum glutinosum (S).

١٤٦٨٨ - سيمم ذاكيم

Mufler glutineux (F).

نبات عشبي حولي صغير اللد ، ساقه دقيقة زباء . اوراقه
زقية متعابلة . ازهاره متوسطة اللد لوها الى الصفرة الزاهية
يطلو تقطيل آخر || ازهاره يدوم طوال الصيف .

Antirrhinum sempervirens (S).

١٤٦٨٩ - سيمم ذاكيم الخشخاش

Mufler toujours vert (F).

نبات عشبي زخفي معمر ، يطو من ١٠ الى ٢٥ سم .

وروشنا الاميان الى البني المشوب بالصفرة . بطها
وروشنا الخلفيان الى الابداد الغني || ريقها تلو
نحو ٤ سم . ظهرا قزقل اللين . ملها أصفر . تركب
السان واللو والتسح وبغيرها .

Cassim, Céstim (F).

١٤٦٧٤ - سيزوم

معدن من فصيلة الترياسيم قليل الوجود والاستعمال
احادي التكاثر ريز (سز - Os) وزنه الاثني ١٢٢ و ١٢٢
طيله المشوري يتميز بجليه الزايرين اللامين .

Cis (S). Cis (F). Cis (E).

١٤٦٧٥ - سيمس

جس شحات من فصيلة السيمات ودية غديات الاجنحة .
ازهاره المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد الباردة والمعتدلة
الحارة || اجسامها صفيرة ، عصبوية ، اهليجية ، طول
من ٣ الى ٥ سم . وروها صفيرة ، مستعرجة ، ملحقة .
مينا بارزة . تأكلها وبهنا نطانية . قروها الاستشارية
ديوية الاطراف . كرسها كبيرة ، ملبية الشكل .
امحدها لائحة . قوامها نغسية . الوها ملوكة ، يكثر
فيها اللين السري اشبهها الاسر القاتم والكسني || جميعها
حاركة تمشي على مختلف اطوار الفطور اغصها الثاريفقيات
والسيات .

١٤٦٧٦ - سيمس

هو الهامين ، اطبه .

Polinier (F). To polinica (E).

١٤٦٧٧ - سيمس

احلى الصفة او الصيغة السياسية . كوكك سورا
الانتخابات البلدية .

Garrot (F). Withar (E).

١٤٦٧٨ - سيمسك

الحاركة من القرب والحار والبل ج ساسي .

Sium sisarum (S).

١٤٦٧٩ - سيمسارون

Chervil, Chérouis (F). Sidret (E). Zuckermark (D).

Staro, Nini (I).

نبات زراعي معمر من فصيلة السيمات . جلوه صفولية
مسطبة مأكولة قطع كجلوه السليل . لهاها
ايض اللين والمكسر ، نظوي التركيب سكري العلم .

١٤٦٨٠ - سيمسارون كبير

، جمر أبيض

عرق أبيض ، سيمسارون

Peucedanum sativum, Pastinaca sativa (S). Pansal,

Pastinaca blancha, Pastinaca, Garden chervil (F).

Parsnip, Common parsnip, Cow cakes (E). Past-

inake, Echter pastinake (D). Pastina, Pastinaca (I).

نبات عشبي صفولي يقل طلي من فصيلة المركبات .
صفوله حزازي او لقي الشكل . اوراقه مركبة متعابلة .
وريقها متعابلة مغرقة السيل . ازهاره صفر . تملو
برود مغلفة وغدة || مفروها افرقية عديدة
منها البقية المأكولة السائل منها اللقية التي تعتبر من
اجيد الاطعمة وايضا نفا لاها تحوي :

من ٢١ الى ٢٢ ٪ مواد جافة .

من ١٥ الى ٢ ٪ مواد ازوتية .

من ٥٥ الى ١ ٪ مواد دهنية .

من ١٥٥ الى ١١٦ ٪ مواد سكرية .

وهو يرب في الارترية المتوسطة الانعلاج ، السقية اللود .
أقليه البلاد المعتدلة الحارة . يفضل المناطق البحرية
التي يكثر فيها الصباب .



سيس



سيمارون (جلو)



سيمارون كبير



سيمان



سيم اوسيوم



سيم أصريته

١٤٦٩٨ - سَمَّيَاتِيْل ٥ * عَمَقَسَمَة بَمَرِيَّة

Cicindela (S). Cicindèle (F).

جنس حشرات مغمرة نافعة من فصيلة السيستيليات .
أنواعها عديدة جميعها صغيرة القند طولها يراوح من ١٠ الى ١٧ م. اجسادها خضراء مختلفة الموانج تلوها نقط بيض او زراكن ملونة . تكثر اثناء الصيف في الموانج الرملية .
اقليها يمتد من الشواطئ البحرية الى الجبال || اشهر انواعها ما يلي .

١٤٦٩٩ - سَمَّيَاتِيْل الْحَقْل ٥ *

Cicindela campestris (S). Cicindèle champêtre (F).

حشرة من السيستيليات تطلو من ١٢ الى ١٥ م. لونها الى الخضار اللامع الجليل تملو زراكن عاجية لاقامية للشكل . جنسائه واربته قرنزية اللون ملع الموانج .
مرسه يولم من اواخر الربيع الى اوائل الخريف .

١٤٧٠٠ - سَمَّيَاتِيْل الْفَشَاطِي ٥ *

Cicindela cristigata (S). Cicindèle des plaques (F).

حشرة من السيستيليات تطلو من ١٢ الى ١٢ م. لونها الى الخضار النحاسي ، حثار غديها صفلي اللون ،
زراكنها مسلووية || تسرح طول الصيف .

١٤٧٠١ - سَمَّيَاتِيْلِيَّات ٥ *

Cicindelides (S). Cicindelides, Tiger beetles (E).

Sundelsticker (D).

فصيلة حشرات نافعة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القند ، ورووسها مستعرضة . قرونها الاستشعارية خفيفة مركبة من ١١ فاسلة . ارطها دقيقة مسطوية . اجسادها مزركشة .
لونها سريمة الحركه ، خفيفة اللون ، تسرح في النهار وترقب في الاماكن الممرضة للشمس . تقترن ما تستطيع اليه سميته من الحشرات والبرقات والحوام || اشهر اجناسها السيستيل .

١٤٧٠٢ - سَمَّيَاتِيْل ٥ *

Dalbergie risso (F).

حشرة حربية لقشرة الخشب ، اطلب دلبيرية ميسو .

١٤٧٠٣ - سَمَّيَاتِيْل ٥ *

Caesio (S).

Césion (F). Caesio (E).

جنس اسماء بحرية من ثلاثات التوائف بفصيلة المتفوليات .
انواعها المروعة نحو ١٢ اعطائها بحار البلاد الحارة ||
اجناسها شبه بفسية الشوزن تطلو من ١٨ الى ٢١ م .
الوايها الى الفسفة الرصاصية او الفسفية او النحاسية .
زماقتها القهرية شبيهة ، مسطوية ، مؤخرة الى الراء .
الحولية مؤرونية الشكل . القليلة قارئة . رؤوسها شبه مخروطية ، ضيقة الاشداق . حوزها ماسحة || طويها مأكولة ، جيدة الصفت .

١٤٧٠٤ - سَمَّيَاتِيْل وَيَسِيْل سِيَزُون هُوَ الثَّرَة ، اُطْلِبَا .

١٤٧٠٥ - سَمَّيَاتِيْل ٥ *

Clidae, Clidae (S).

Clidae, Clidae (F). Clidae, Clidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروعة كثيرة العدد منتشرة في جميع مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحارة || اجناسها صغيرة ، شبه اطليلية الشكل .
تطلو من ٢ الى ٥ م . رؤوسها صغيرة ، مسطوية . حوزها بارزة . تاشيرها وملاسها نظمية . قرونها الاستشعارية

اوراقها دائمة جلدية النصل . ازهارها صغيرة طويلة الزناد
لونها الى الصفار اللغبي || ازهارها يستمر من سيزران
الى ايلول .

١٤٦٩٠ - سَمَّيَاتِيْل الْوَرَقِ

Antirrhinum molle (S). Muffler à feuilles molles (F).

نبات مشابه لنباتي معمر يعلو من ١٠ الى ٤٠ م . اوراقه
ورقة النصل المسطلي . ازهاره ممتلئة القند طولها نحو
٣ م . لونها الى الصفار الالبيش || ازهارها يولم
طوال شهر تموز .

١٤٦٩١ - سَمَّيَاتِيْل مَاجُونِس ٥ * ، تَمَّ السَمَكَة ،
أَنْفُ الْعَجَل ، أَنْفُ الْفَرَسِ

Antirrhinum majus (S). Muffler des jardins, Gueule de lion, Gueule de loup, Pantoufle (F). Great snapdragon, Dog's mouth, Dragon's mouth (E). Grosses lowenmaul, Hundskopf (D). Antirrhino, Muso di vitello, Capo di bus (I).

لوع من البسم وهو نبات رئيسي معمر . مسطو فراء
تملو من ١٥ الى ٨٠ م . اوراقه لسنة مسطوة متطابقة
في الزايم الاول من البالي ثم تتعاقب . ازهارها كبيرة القند
متفوية الصبيح متخالفة الازاكن تملو كامل الزايم
الاخير من اساق || خروبه حديدية تختلف باختلاف
قندا ويصير ازهارها وريالونها التي تشمل الالبيش والاصفر
والوردي والقرنبي مع ما يتخللها من الالوان المركبة .
ازهارها يستمر من نيسان الى تشرين || وهو ايضا من
النباتات الصناعية التي يستخرج من زورها زيت نافع
ماكل وصناعة اوراقه وازهارها تليق الجمله تسكن نهي
الحوام || يكثر بالباز وفرنس في مسطوح حل ابعاد
ترجي من ٣٠ الى ٥٠ م . وذلك في ابسط الرينج
وبه تكتبي في المثل || يحد في جميع الاثرية الزراعية
ولا غشوى سوى الرطبة والقوية الانتماج لانها تفتش
بعض الازواص القهرية التي توكذي .

١٤٦٩٢ - سَمَّيَاتِيْل سَمَّيَاتِيْلِيَّات

Antirrhinum

maurandiolides (S). Muffler-maurandie (F).

نبات لبني متسلق معمر يعلو من سيزران الى اربعة امار
اوراقه سميكة مسطوة متخالفة . ازهاره متوسطة القند ،
قرنزية الاطراف والفسفة الخارجية . صفحتها الداخلية
صفراء اللون ، خلية البيرة || وهو من النباتات الرقيقة
القليلة الانتشار . ازهارها يستمر من سيزران الى ايلول .

١٤٦٩٣ - سَمَّيَاتِيْلِيَّات

Sismographa, Sismograph (F). Sismograph (E).

جهاز آلي يستخدم في تسجيل الزلازل ليؤمن بمقدار
الاضمار الذي تحدثه الزلزلة ويمكن من تحديد المدى
ومرقة نقطة الانطلاق .

١٤٦٩٤ - سَمَّيَاتِيْلِيَّات

Sismologie (F).

Sismology (E).

السيولوجية علم يبحث في الزلازل .

١٤٦٩٥ - سَمَّيَاتِيَّات

Antirrhineae (F).

Antirrhineae (E).

سبط من فصيلة الكنازريات اشهر انواعه البسم .

١٤٦٩٦ - سَمَّيَاتِيْلِيَّات

١٤٦٩٧ - سَمَّيَاتِيْلِيَّات

هو البسم الاطرم ، اطليه .



سهم ماجوس



سيستيل الحقل



سيستيل الفشاطي



سبون

انواعها الممرقة قليلة البعد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة اغصانها البحر الاحمر - اجسامها كالطبايح ، للفرس الخمار والزين الصمن ، يرتكز على ابريل في ساطعة يحيطها الكثير الكثير من الالاف الثقيلة .

١٤٧١٣ - سيففاليات * Cephaloidae (S).

Céphaloidae (F). Cephaloidae (E).
فصيلة من اللدوس الصنجات الرصاصات تشتمل بعض الاجناس والانواع جميعها في الاصيل القصيرة المشعبة المخرقة ينحيط مستطيلة متعرجة - اصطنانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة - اشهر اجناسها السباد .

١٤٧١٤ - سيففك * Propithecus (S).

Propithecus, Silaks (F).
سيفك هو الاسم للملثاني . جلس حيوانات لينة من اليموريات . انواعها الممرقة ثلاثة موطنها مديسكر - اجسامها رفيقة ، مستطيلة القوائم والذنب ، قصيرة الاذنان ، جلودها سحر . فراقها تختلط مع الانواع منها الاسود والجزوي والاشهب الاصفر - ملثنتها الحيالي جامي . انانها ثنائية الثدي . تسرح في الليل وتبيت في النهار على الاشجار وتقتل عليها بطة طير - قوتها ثمار وبعض المواد النباتية اغصانها الزينات والجزور - اشهر انواعها سيففك المروج (S) Propithecus diadema .

١٤٧١٥ - سيففكة * Certornis (S).

Tragopan, Fisan cornu (F). Tragopan (E).
جلس طير من فصيلة الطيريات . موطنه الشرق . انواعه اربعة جميعها كبيرة الجثة طويلا ، براوح من ٧٠ الى ٨٠ سم . رؤوس كدوها مدبجة بزوائد لحمية فاجية تهب الترون . مثاقيلها قصيرة قوية . سواطعها معتدلة الطول ، انانها مستديرة . اصطنانها حارية حادة الصيغة . اقوابها متعرجة متقاربة ترتكز على الاصهب الجاني يعلو توشح وتوشح وتأثير اخر وايض واسم - قوتها الاغصان والحبوب والارواك والبراعم والثمار والحشرات . يجمعها الانجار الاقلية الاخصان - تنش في الاشجار القليلة الارتفاع . انانها تحسن نحو ١٨ بوصة - اشهر انواعها ما يليق .

١٤٧١٦ - سيففكة تمينك * Certornis temminckii (S).

Tragopan de Temminck (F).
نوع من السيفكة موطنها الصين تألف الاسراج الجبلية الكثيفة .

١٤٧١٧ - سيففكة سوداك الرأس * جمبوس

Certornis melanoccephala (S). Tragopan à tête noire, Jewar (F).
نوع من السيفكة موطن الهند . يكثر غربي حلايا رأسه اسود الغريش ارض المروج .

١٤٧١٨ - سيففون هو التجير ، اطلبه .

١٤٧١٩ - سيففونيا * Siphonis (S).

Siphonie (F). Siphonis (E).
شجرة اجمية وزراعية صنانية من فصيلة اليصنيات . ساقها متعرجة رفيعة . اوراقها معتقة ، مركبة ، لثائية الوريقات اللبضية التصل . فصلها : جبل الخضر ، مالن البيرة - ازهارها طرية ، وسيدة المسكن . يستخرج منها الخمر عصارة طبائية تستعمل في صناعة اقمش انواع المطاط - زواطين الطوي الايام الرطبة وضفاف التبر . زواطينا تستوجب ذكره الري .

ديسية الاطراف ، ثمانية الفصل او عشاريتها . كولسها كبيرة ، مبدية ، تلصق الرأس . اغصانها لاسقة . قوتها نشطة . ارسلها ربابية القمل . اقوابها ملونة - معظم انواعها تألف الحياة الجارية ويصنع عمل السيات والغازيات - اشهر اجناسها السيس .

١٤٧٢٠ - سيففون * Sigona (S).

Sigona (F). Sigona (E).
جنس حشرات قاصعة من فصيلة السيفنيات وربة غذيات الاجنحة . انواعها الممرقة متوسطة البعد ، منتشرة في معظم اقانج البلاد الحارة - اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، طولها من ٩ الى ١٢ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . ميوتا صلبة ، نافذة . قوتها الاستعمارية مستطيلة ، قلادية الشكل . تأثيرها ضاربة . فكوكها نظامية . كولسها غصورية . اغصانها لاسقة ، نملة تصفد القالب . قوتها شديدة النشاط . اقوابها وسيدة اللون ، يكثر فيها الاصيل النحلي للاسفل الاسفل فالجزوي - الحشرة الجبلية قاصعة . سرحها جزوي . البيرة والجمه .

١٤٧٢١ - سيففونيات * Sigonidae (S).

Sigonidae (F). Sigonidae (E).
فصيلة حشرات من غذيات الاجنحة . اجناسها وانواعها الممرقة متوسطة البعد اصطنانها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة - اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، طولها من ٨ الى ١٦ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . ميوتا نافذة . قوتها الاستعمارية قلادية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة . تأثيرها بارزة ، قلبية . فكوكها نظامية . ربابها مدبجة . كولسها غصورية ، شديدة القوام . اغصانها نملة التصفد القالب الذي يمد ٨ اغصان . مكنا شبه اسطواني الشكل تنحصر الاثني فردا في التربة . يربطها سداسية القوائم والسفل . حورياتها مريضة تنحصر في التربة داخل اوكية انبوبية الشكل مسطوية الرأس والذنب . جمع انواعها دجوية المسرح ومثاقيلها التور . معظمها مقترن ويصنع غاضل - اشهر اجناسها السيفون .

١٤٧٢٢ - سيفف * Trichlerus (S).

Trichlerus (F). Trichlerus (E).
جنس اسماء بحرية من فصيلة السيفيات . انواعها الممرقة من اصطنانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة . اجسامها تشبه السيف وهي مستطيلة ذرية مدنية الذنب . رؤوسها غروبية الشكل . ذعانها بطورية تنحصر في مؤخر الرأس الى طرف الذنب . اقوابها الى الحمة الرابدية يعلوها موج لفي شديد القوة .

١٤٧٢٣ - سيفف C.J.F., C.A.F.

سفر البضائع على ذمة شاربيا .

١٤٧٢٤ - سيفف الجبل * In Dorado, Xiphias (F).

Dorado, Xiphias, the Sword-fish (E).
سيف الجبار كوكبة نجوم جنوبية الميخ مركزها بين كوكبي الثور والسيفينة - حلد نجمها ٢٩ اميذا من المربة الزاوية .

١٤٧٢٥ - سيفف الفركيب هو الدليوث ، اطلبه .

١٤٧٢٦ - سيففكة * Cephea (S).

Céphée (F). Cephea (E).
جنس حيوانات بحرية من اللدوس وفصيلة السيفاليات .



سيفون



سيف



سيفاه



سيفن



سيفنة



سيفونيا

١٤٧٢٠ - سيلي الشكل

Ensiiforme (F).

Ensiiform (E).

نمت وصفي يلائق حل ما هو شكله كالسيف .

١٤٧٢١ - سيلي الورق

Ensiifolâ (F).

Ensiifoliata (E).

نمت وصفي يلائق حل الاوراق السيلية الشكل .

١٤٧٢٢ - سيلييات

Trichuriideae (S).

Trichuriidae (F). Trichuriidae (E).

فضيلة اسماء بحرية من شائكات الزعانف اجنحتها وانواعها عديدة اشهرها السيف ، اطليه .

١٤٧٢٣ - سيليتمور

Sycamore (F).

هو الجينز ، اطليه .

١٤٧٢٤ - سيليكا * ، ميلة سيليكا

Salga tatarica (S). Salga, Antilope salga (F).

حيوان عايب لبون يجتر من الغطاء . اطالته الغابرة كانت تقبل جميع المرتفعات الاسيوية والاروية . اطالته الحاضرة محصورة ببعض مرتفعات آسيا الغربية واروية للشرقية || جسمه ربيع لقامة ، متوسط القد ، غليظ العنق والقوائم ، مصطنع الجبهة والالاف والتم واللحم . الاتش جده ، ثنائية الالاف . الذكر جالس القرون المذهب الطرف . ثوبه الى الطلعة اللدراء تفسر قرب الظهور وتبين في القلب والبطن || امله سبعة الفار ، ذكر مانع ثلاث اناث وثلاثة جده .

١٤٧٢٥ - سيليكا

Cigra (F). Cigra (E).

لغافة من الثمن الخشن تتميز بخلها من المواد الثرية عن التبغ . قوامها تن مستعرض الخشن وهي الخشنة تحضت اده مستطيلة لكي الرباط تلتفها صفحة من النصل لكي التقصير او الكاب او الجليلاب .

١٤٧٢٦ - سيليكا ، لكاله

Cigarettes

السكاكة انبوب من الورق اللينق انعام يلف كية من الثمن المهوروم . اشتمالها يوك دخاناً يستشفه المدخن من ثم يطرده مع الزفير بعد الاستنجاح بملحه وتأثيراته .

١٤٧٢٧ - سيليكام

Cycas (S). Cycade (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السيكاسيات . انواعها ١٠ منها المناطق الحارة الاسيوية والافريقية . جذوعها واوراقها تشبه جنوع واوراق النخل غير انها قليلة الارتفاع عن الارض . يهي من النباتات الثنائية المسكن . انواعها متباينة خروطية الشكل . ثمارها زور خضرة فزرة المادة البينية والخشبية المسادة النظم . يستخرج من جنوع معظم انواعها مادة نشوية مأكولة تدعى ساخو لكنها اقل جودة من التي تستخرج من ثمرة الساخو .

١٤٧٢٨ - سيليكام افريقي *

Cycas circinalis (S). Cycade à feuilles en crosse (F). Broad leaved cycas (E). Cycasbaum (D). Cicadée (I).

ثمرة زراعية مهددة افريقية الاستوائية . جلعها يملو من ٣ الى ١٥ م . سفها يخلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ م . غوصه متجمل التحسين . نصه جميل اخضر الساطع ، مدبب القصة الشائكة . يستخرج من جلعها مادة نشوية مأكولة تشبه الساخو .

١٤٧٢٩ - سيليكام ياباني

Cycas revoluta (S).

Cycade du Japon, C. enroulé (F). Cycas palm of Japan (E). Japanischer cycasbaum (D). Planta del cicadée (I).

ثمرة زربية جميلة الشكل مهددة اليابان تعيش حل شواطئ البحر المتوسط . تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ م . جلعها غليظ الشكل ولقد تكسو الحرافد القليلة . سفها يملو من ٦٠ الى ٢٠٠ م . غوصه متقارب التجميع . نصه عايق الخضر اللامع عيب الحنار ، شائك النخسة .

١٤٧٣٠ - سيليكاميات

Cycadaceae (F).

Cycadaceae (E).

فصيلة نباتية من حرايات البزور . اجنحتها وانواعها عديدة اشهرها السيكاس .

١٤٧٣١ - سيليكران

هو الريح اليابس ، اطليه .

١٤٧٣٢ - سيليكرامين

هي السكين مادة قوية سامة تستخرج من البرتغاليا .

١٤٧٣٣ - سيلي

Fluton (F). Fluton (E).

انفادح اي سائل كان وخاصة اللحم نحو لكمة ممتعة من الجسم .

١٤٧٣٤ - سيلي

Torrent (F).

جيدل مجراه شديد الانحدار يسرب المياه بسرعة .

١٤٧٣٥ - سيلي

Sil

ضرب من التراب اللينق .

١٤٧٣٦ - سيليان

Jutage (F). Décharge (E).

غطاء يسيل من الاتش اسماء مدينة اكثرها تدل على امراض في مجاري التنفس .

١٤٧٣٧ - سيليان

هو العلق ، اطليه .

١٤٧٣٨ - سيليان تجسي

هو حشوقة الذباب ، اطليه .

١٤٧٣٩ - سيليانيات

Silanées (F). Silanées (E).

سبط من الترفليات .

١٤٧٤٠ - سيليكة

هي السيرة ، اطليه .

١٤٧٤١ - سيليكة *

Scyllon (S).

Scyllide (F). Scyllon (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مدييات الاويل عثليات الخياشيم وفصيلة السيليات . انواعها المربعة قليلة اطالها معتم بجمار البلاد الحارة تعيش حل التوت البحرية || اجسامها عريضة ، حلانية ، مستطيلة ، مدبة الظهور الثنائية الاكثار ، رباعية الزوائد الجنسية ، مكررة الرؤوس الصغيرة ثنائية البولس المندة . عياشيتها انابيب دقيقة تطوق الزوائد .

١٤٧٤٢ - سيليكتس *

Stalis (S).

Stalis (F). Stalle (E).

جنس حشرات غاشلة او قرضابية من فصيلة السيلسيات ورتبة سادات الاجنسة . انواعها المربعة عديدة منتشرة في جميع الاقطار المظلة الحارة || اجسامها اطيالية ،



سيليكا



سيكاس افريقي



سيليكة

١٤٧٤٧ - سيليكة السنديان *
Calama confusalis (S). *Celama confusa* (F).
Calama confusalis (E).

حشرة من فصيلة الحريدات ورتبة حرشيات الاجنحة . موطنها سهل مجاص حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها خاضعة قوتها اوراق السنديان || جسمها صغير اللد يظل نحو ٨ م . بسطها نحو ٢١ م . رأسها معتدل الحجم . عينها كبرتان . زباناها حزينان يققان . مرشفها معتدل الطول . جوشنها المثلث اللون ، حشلي البنية والمواج . بطنها الى الخلفي الاصفر المطروق بالني || رواشن الذكر الى الصبهة الشهباء يعلوها في الزوج الامامي ذاكش وتزويق حشلية ويعلوها في الزوج الخلفي جده اسفلية كسنتية وشحة حشلية سمراء تلويح الحمار . رواشن الانثى الى الصبهة الشهباء يعلوها في الزوج الامامي بقعة قاعدية سمراء واخرى طرفية حشلية ، ويعلوها في الزوج الخلفي شحنة متناوية رمادية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى حزيران . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان مبعادها حل الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تظل نحو ١٨ م . جسمها وشي الشكل اريك اللون تملوه مجموعات من الحلب الجفوي متباعدة الصفوف تكتنف كامل السك باستثناء الشريية . رأسها شحم اسود . مدنها ورواجها الى القطعة البهراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي داخل صليجة زوقية الشكل .

١٤٧٤٨ - سيليكة سيليكة *
Calama centonialis (S). *Calama centonae* (F). *Celama centonialis* (E).

حشرة من فصيلة الحريدات ورتبة حرشيات الاجنحة . موطنها اسراج حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها خاضعة قوتها اوراق النباتات الحرجية المختلفة الاجناس والفصائل || جسمها صغير اللد يظل نحو ٧ م . بسطها نحو ١٩ م . رأسها معتدل الحجم . عينها كبرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . مرشفها معتدل الطول . جوشنها كتيث الحمل الاطحل اللقي المواج . بطنها حشلي اللون اسمر المواج || رواشن الذكر || رواشن الانثى الى الصبهة الشهباء يعلوها في الزوج الامامي عند الذكر زركمة حشلية وتبقى صناعي وبينة قاعدية سمراء ، ويعلوها في الزوج الامامي عند الانثى تقيج ابيض وزركمة حشلية وينضاج طرفيان اسمران || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع حزيران . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان مبعادها حل الصفحات السفلى من نصال الاوراق التيات المائل || السرفة تظل نحو ١٧ م . جسمها وشي الشكل ، اطحل اللون تملوه مجموعات من الحلب الجفوي . رأسها غليظ الحجم كسنتي اللون . مدنها ورواجها الى القطعة السمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي ضمن صليجة زوقية الشكل .

١٤٧٤٩ - سيلندريوم *
Cylindrium (F).

جنس فطور مجهرية من الترسبات وفضيلة البهليات . ابرامه قليلة العدد والواشي . جميعها ردية تركب الاوراق المتناثرة ، الحلقة ، المتراكمة على التربة .

مسطحة ، تظل من ١٠ الى ٢٢ م . بسطة اجنحتها تراوح من ٢٠ الى ٣٠ م . رؤوسها نائكة شبه مربعة . اجنحتها القمية مساحقة . حيزونها صغيرة ، مسطوية ، نائكة قربها الاستعمارية خطية ، مسطوية . انوابها سمراء اللون او سوداء . اجنحتها كبيرة ، لائقة ، جانبية الاستئصال ، خشائية ، شفافة او سمراء || يرقاتها مفرسة و مائية او سائلة .

١٤٧٤٩ - سيليديات *
Stalidea (S). *Stalidea* (F). *Stalidea* (E).

فصيلة حشرات من رتبة سادات الاجنحة . اجنحتها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة . رؤوسها شبه مربعة الشكل . حيزونها جانبية ، عادمة الزنار . قرونيس الاستعمارية خطية مسطوية . اجنحتها خشائية لائقة ، بعضها شفافة والبعض الآخر اسمر اللون او اكعب || يرقاتها مائية ، مفترسة . طرودها البري يستمر نحو ٢٠ شهرا . المتلاعاتها عشرة ، سبعة منها تجري في الماء والفلانة الاخيرة في التربة || اشهر اجناسها السلس .

١٤٧٤٤ - سيليفيديات *
Silphidae (F).

١٤٧٤٥ - سيليفيات *
Sylvinia

هو معدن البوتاس قبل تصنيه يرتكب من كلوريد البوتاس والصوديوم مع بعض الاملاح انصهها املاح المنيوم والكلسيوم || يستعمل كباد برتاني بنس اثنين يجرى من ١٨ الى ٢٢٪ من البوتاس الصنف ونحو ٥٠٪ من غثايل الاملاح .

١٤٧٤٦ - سيليكة بحريرة اللون *
Cilix glauca (S). *Cilix glauque* (F).
Cilix glauca (E).

حشرة من فصيلة الدبابيات ورتبة حرشيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها خاضعة قوتها اوراق الزرور والفلوخ البري ... || جسمها صغير قشبي يظل نحو ٧ م . بسطها نحو ٢١ م . رأسها معتدل الحجم . عينها كبرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . مرشفها معتدل الطول . جوشنها بحري اللون اسمر المواج . بطنها بحري اللون ، حشلي المواج || رواشها ، عند الشقين ، الى الخضار البحرية والاصهب للمواج تملوه في الزوج الامامي بقعة كسنتية وتقيظ اسمر ، وتعلو في الزوج الخلفي شحنة حشلية تنسج الحمار || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع وتمتد المكان مبعادها حل الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تظل نحو ١٨ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مائل التقشار ، فري التليل الجانية . نوبها الى الخضار الاصل يعلو خط تبسي اصفر وسمية خطوط متفرعة سمراء اللون . شوطها مطقة بالامر . سكنتها الشريية تنتهي بن قزينة للمادة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صليجة تحيكها السرفة بين شقوق السواد او تحت الشجور .



سليكة بحيرة اللون



سليكة السنديان



سليكة سيليكة

١٤٧٥٠ - **سيلوري** (F). **Silurian** (E).
نمت ترينيفي بطلق للحقبة الثانية من الأياح القديم .
يقال العصر السيلوري والأراضي السيلورية ، وهي
تتميز بأحجارها على الكثير من الأحماك المصقفة الرؤوس
أي على أول تقاربات .

١٤٧٥١ - **سيلوفان**
ملدن سيلويزي شفاف قابل للتلوين .

١٤٧٥٢ - **سيليكيات**
Sclerophane (F). **Sclerophane** (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مغطاة الأربيل
غلافات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعاصرة المعروفة
قليلة العدد ، أسطنتها بجوار البلاد الحارة || اجناسها
حريضة ، حلابة ، مستطيلة ، رباعية الزواك الجانبية
الشكل . رؤوسها صغيرة . ملابسها صلبة || أعراف
اجناسها السيلة والذئبة .

١٤٧٥٣ - **سيليكس ، صوان**
Silica (F). **Silica** (E).
جسم مركب من السيليوم والأكسجين وهو من أكثر
الاجسام ثمة وأهمها انتشاراً يوجد في الأرض اما على
سأله أو على شكل سيليكات .

١٤٧٥٤ - **سيلسيوم ، سيلكون**
فلزات ثلاثي التكافؤ (س-٣) ينصهر في ١٢٠٠
°سج. ويتحد مع الكبريت في ٦٠٠ °سج. ومع الأوزون
في ١٠٠٠ °سج. يستخرج من السيليس أو من
فلوسيليكات البوتاشيوم .

١٤٧٥٥ - **سيليكيات ، صوانات**
ملح يحصل من استزاج الحامض الصواني بأحدى التوليد
كالبوتاس والكلس . يقال سيليكات البوتاس وسيليكات
الكلس .

١٤٧٥٦ - **سيلينيك هلالية**
Selenia lunaria (F). **Selenia lunaria** (E).

حشرة من فصيلة الأرييات وربية حرشيات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الأوسط الى اربية . فراشها جارية
قوتها رقيق الزهار . مرشها غاصلة قوتها اوراق النباتات
البرية اعصها البروق || جسمها متوسط القد يطول نحو
١٤ م . مسطها نحو ٢٨ م . رأسها مستطيل الجرم . عيناها
كبيرتان . زلماتها مشطيان مزيجان من الذكر ، غيبان
عند الانثى . جيشها ويطنها كبقيا الخمل ، حشلا اللون ||
وراشها عند الفشتين ، الى الخلفي الاصهب للولج تملو
في الزوج الاسامي جنة وسطى سمراء وسط مقوس يمر
وبقمة حمراء وتصلو في الزوج الخلفي جنة سمراء || لها
جبلان في الخيل . تظهر قرائة الجبل الاول في نهان
وتظهر قرائة الجبل الثاني في تموز . تسرح في الليل .
تعاظم بعد ظهورها بنمو اربعة اسابيع وتتممكن لطفاً
تطفها مادة غريبة تنبت على الصفحات السفلى من نيمال
الاراك || البرقة تطول من ٢٨ الى ٣٦ م . جسمها
اسطوانى الشكل يبدو كأنه قلعة من قصب مائل القشار
تملأ ثلاثة أزواج من العمل المتعاقبة ، ثوبها الى الكسني
الاشفع . تمولاً شديدة السرة . رأسها أسود . وراجها

البنيّة لوسطى ماصة لما يسطرها الى التفتوس والشب عند
الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً
ينتضي فسن صلبة تحبها السرعة بين الارواك التي تجسمها
بجوط حزيرية .

١٤٧٥٧ - **سيمابيه**
Simaba (S). **Simaba** (F).
جس الجمار برية طيبة من فصيلة السمرويات . أنواعها
المعروفة قليلة العدد منها بعض مناطق أمريكا الحارة ||
انجارها ترتفع من ٦ الى ١٥ متر . اوراقها متعاقبة
مركبة ، وقرية التجميع ، خاصة أو رباعية أو تساعية
الورديات السنية اتصال || انجارها طرية الارتكاز ،
سالية التجميع ، شامرا حبوب لوزية .
اشهر انواعها الطلية الثلاثة التالية :

١٤٧٥٨ - **سيمابيه حد يدية**
Simaba ferruginea (S). **Simaba ferruginea**,
Cedron du Brésil, **Calunga** (F).
نوع من السياه . جفرتها تملو نحو عشرة أمتار . منها
البرازيل وأخصها مقاطعة بايا || تستعمل في معالجة
الحشيات وشفه الاسهال وصر الحفم .

١٤٧٥٩ - **سيمابيه صد ووية** ، **صد وون**
Simaba cedron, **Quassa cedron** (S).
Simaba cedron, **Cedron**, **Cedronelle** (F).
Cedron ura (E).
نوع من السياه . جفرتها تملو نحو عشرة أمتار . منها
البلاد الأمريكية الحارة والاستوائية || ثمارها شامسة
الاستعمال الطبي . يماجلون بها الكتب ولفغ الاناعي وبعض
الحشيات || مادتها القلابة تدعى سدوين (Cedrine)
مرة الملاك كالكتنا .

١٤٧٦٠ - **سيمابيه قلديفيا**
Simaba valdivia, **Picrotenes valdivia** (S).
Simaba de Valdivia (F).
نوع من السياه . جفرتها تملو نحو ثمانية أمتار . منها
البلاد الأمريكية الحارة والاستوائية || يستخرج من ثمارها
مادة شمالية شديدة البقع تدعى للفلين (Valdivine)
٢ ملغرام من هذه المادة تقضي على الاربث || تستعمل
طياً في معالجة الحشيات الشامدة . مسومق قشور ثمارها
مقوة فعال .

١٤٧٦١ - **سيمابيه**
Sémétiologie (F). **Sémétiologie** (E).
فرع من الطب يختص بدراس طرار وأعراض الأمراض
واسئلالاتها .

١٤٧٦٢ - **سيمينديس**
Cymindis (S). **Cymindis** (F). **Cymindis** (E).
جس حشرات قاصصة من فصيلة الليبات وربية غديات
الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار
البلاد المنتدلة الحارة والباردة || اجسامها هائلة ، مستدلة
الخطيط ، قطلي من ٨ الى ١٢ م . رؤوسها صغيرة .
عيناها صغيرة ، باردة . قوتها الاستيعادية خطية .
تأثيرها وتكونها وداصها قياسية . كوكسلها ضامرة .
يطنها مستطيلة . انماها لاشعة وبمضا شبه لاشع .
قوتها نشيطة . انواها متباينة الانوار الجبلية الزاهرة ||
الحشرة الجملانة قاصصة والبرقة ايضاً .



سيمية ملابة



سيه

ساقها وفروعها منتصبة ، عمدة ، زباد ، الحماة متفككة الرطب . اوراقها اهلجلية مستطيلة متفككة التصل . ازهارها رقيقة صفراء اللون || اعرف انواعها ما يتبع .

١٤٧٧٣ - سِيُونَان تَقَرِي *
Cephalaria tatarica (S).
Céphalaire de Tartarie (F).

نوع من السيوان للمسمر مهدد روية الشرقية . يطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . يقال انه ارفع عشبة منتصبة مرفوعة . ازهارها عديمة اللد ، صفراء اللون تجمعها رؤيات كبيرة ثلاثية او خاسية الشكل .

١٤٧٧٤ - سِيُونَان سُورِي * ، طَرْدَان
Cephalaria syriaca (S). Céphalaire de Syrie (F).

نوع من السيوان للمسمر . مهدد البلاد السورية . يكثر بين الزروع . يطول من ٨٠ الى ١٥٠ سم . || ازهارها حذو الشكل ورؤياته خاسية او سباعية التجميع . ازهارها صفر .

١٤٧٧٥ - سِيُونِس *
Sicyos (S).
Sicyos (F). Sicyos (E).

بجلة عمرة عارفة من فصيلة القرصيات . منبهاً بض المناطق الامريكية . ساقها تطلو نحو عشرة اثمار . حوافها ثلاثية او خاسية للشعب . اوراقها قلبية الشكل ، خاسية القصوص . ازهارها الى انفسار الاصفر . المتكبة منها عشوية التجميع ، المغلفة خسية ، مستطيلة الحافيل . ثمارها فضية تطلو نحو ١٠ سم . وقصر نحو ٧ سم . لونها الى انفسار البصري الاربيد المالح ويطول سطحها حصف ذوب قليل الصلابة . لؤلؤ مطبوخة .

١٤٧٧٦ - سِيُونَة ، مَيْع
Liquidité (F). Liquidity (E).

صفة المواد البائلة للمائة .

١٤٧٧٧ - سِيُون *
Clonus (S). Clone (F).

جنس حشرات من فصيلة السوسيات . انواعها عديدة جميعها صغيرة اللد تطلو من ٣ الى ٥ سم . انواعها مختلفة الانواع يكثر فيها الخطي الاسمر المالح . الحامدة مدجة وبزرقة وفيها الحامدة والمهددة || ريفاتها مخطئة تركب نباتات الفصيلة الحنازيرية فتضم الارواح وتقرضها .

١٤٧٧٨ - سِيُون المَرَّان *
Clonus fraxini (S).
Clone du frêne (F). Clonus fraxini (E).

حشرة غاشلة من فصيلة السوسيات روية معدبات الاجنحة . تألف البراري والقرائن . غشاشها وريفاتها تعيش على اوراق الزيتون والمران || جسمها صغير اللد يطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبا الى السمرة المتكسبة تملوها في طوارها طلوس وتزريق مختلفة . رأسها صغير الجرم ، مستطيل المنك المسطح القاصم التلقب . عيناها صغيرتان . زباناها مرفقتان صلبان . طوارها بيضي اللون . عيناها متباعدة التلقب . ارسافها رباعية الشكل الطاهرة || لها جيل واحد في الخط . تخرج الحشرة الجسالة من مكانها في اوائل نيسان . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة ، عند بلوغها الإدراك التام ، تطلو نحو ٥ سم . جسمها اهلجلي الشكل ، مدبب الرأس والطرف ، حنكي اللون الاصفر المالح ، اسمر الرأس والشرج .

١٤٧٧٣ - سِيَمَة *
Sima (F). Sima (E).

اسم اصطلاحي يطلق على الطلع المفتوح شبه المالح الموجود في وسط الكرة الارضية بين الطبقة السطحية المعروفة بالسيال وبين النواة المركزية . تقدر حرارة هذه الطبقة اي السمة بنحو ١٥٠٠ درجة ستيفراد . يابس حزام مشتل .

١٤٧٧٤ - سِيَمِيَة
Facht (F).

١٤٧٧٥ - سِيَمِيرِس
Salmitis

هو الكرز ويكثر فرد من فصيلة السوسيات .

١٤٧٧٦ - سِيَمَارَكِيَا *
Cintractia (S).

جنس فطور مجهرية طفيلية من فصيلة الراغويات تتميز بجهدا القمار البارز الانتشاب ، الاذي الفكل . انواعها قليلة العدد تصبب بعض الاساليات والسدمات فتصلها .

١٤٧٧٧ - سِيَمَنَام * ، دُوْدَة مَزْدَوَجَة ، دُوْدَة خَرَاء
Syngama

جنس ديدان سلكية طفيلية تعيش على جهاز تنفس بعض الطيور انفسها الجبل والطيروج || تمت بالفودة المزدوجة لان الذكر منها يلاصق الانثى ولا يفترق منها .

١٤٧٧٨ - سِيَمَكُونَة
Quinquina

هي لكنكتينا التي يستخرج منها الكينا ، اطليا .

١٤٧٧٩ - سِيَمُونِيَت *
Cénoceya (F).

اسم يطلق على جميع الكائنات الضويرة المركبة من حزام .

١٤٧٨٠ - سِيَمُونِيَس *
Cynomys (S).

Cynomys, Chien-rat, Chien des prairies, Marmotte des prairies, Ecureuil apparent (F).
Prairie dog (E). Präriehund (D).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة السنجابات . انواعها خمسة جميعها امريكية . اجسامها ربة تطلو من ٢٧ الى ٣٥ سم . اذانها من ١٠ الى ١٢ سم . رؤوسها فليقة . عيناها مستديرة . اذانها عريضة وقصيرة . جريزها قوية . اجسامها خالية ، انفسارها حادة . انواعها سوية اللون يكثر فيها الرمادي الاصعب || ساقها جلابة . تألف الحشاش حيث تتركز قرمها التي يراوح عدد اجسامها من ٥٠ الى ٣٠٠٠ سمرة قلنسوة الشكل قطرها نحو ١٢ سم . وطولها ٦٠ تبعد القوسية عن الاخرى من ٦ امتار . مداعلها وغاريها اتفاق مستقيمة عمقا نحو ٣٠ سم || بيتها الشتوي يدوم ما دام الصقيع والجليد . قبا الاعشاب والجلود والحبور والحبوب والفار والجرذان .

١٤٧٨١ - سِيَمَكَنَك
التراب الذي تغيره الريح عن الارض .

١٤٧٨٢ - سِيَوَان *
Cephalaria (S). Céphalaire (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الدياسيات .



سِيَمَان



سِيَمُونِس



سِيَوَان تَرِي



سِيَوَان سُورِي




سِيُونِس




سِيُون




سِيُون الزان



- 1 اعطيطود 2 مقربوط 3 صبيح 4 كثار مابل 5 كثار لورب 6 صبيح 7 فوشة 8 موزة 9 دوكيت 10 فوشة 11 حارون بحري 12 حارون
 رشق، فوشة 13 حارون سوش 14 بوليس 15 اشاعة 16 حبيبة 17 انة 18 دوس 19 قوط 20 لوليد 21 غلاية 22 كوكا 23 شحانة 24 شيلر -
 25 فودة 26 كركيز 27 كركيز صوبير 28 صوبير 29 غلاية 30 بديك 31 فاقون متوج 32 حبيبة 33 رويدا مستطيل 34 رويدا حلي 35 شك 36 بول متير -
 37 بول متير 38 بلر فوشة 39 صبيح فوشة 40 صبيح فوشة 41 صبيح فوشة 42 صبيح فوشة 43 صبيح فوشة 44 صبيح فوشة 45 صبيح فوشة 46 صبيح فوشة 47 صبيح فوشة -
 48 دالغ 49 جلاوب 50 صبيح 51 صبيح 52 صبيح 53 صبيح 54 صبيح 55 صبيح 56 صبيح 57 صبيح 58 صبيح 59 صبيح 60 صبيح 61 صبيح -
 62 صبيح 63 صبيح 64 صبيح 65 صبيح 66 صبيح 67 صبيح 68 صبيح 69 صبيح 70 صبيح 71 صبيح 72 صبيح -
 73 صبيح 74 صبيح 75 صبيح 76 صبيح 77 صبيح 78 صبيح 79 صبيح 80 صبيح 81 صبيح 82 صبيح 83 صبيح -




- ١ قباب - ٢ فرخ - ٣ التماسيح - ٤ كبدية مائلة - ٥ كبدية - ٦ طرخ - ٧ ميهاد - ٨ سمون - ٩ سمك - ١٠ جدانة - ١١ جناح - ١٢ وساج - ١٣ قد -
 بحري - ١٤ شطارة مائلة - ١٥ نعال - ١٦ ديك البحر - ١٧ دلاغ - ١٨ صلف الماء - ١٩ شكة البحر - ٢٠ قري - ٢١ قسمة - ٢٢ حنوك - ٢٣ أبو طوق -
 ٢٤ عبل - ٢٥ طوق القرن - ٢٦ طريوح حجري - ٢٧ زبر بحري - ٢٨ زبر أبو شوكة - ٢٩ زمبر - ٣٠ لع - ٣١ أم قوس - ٣٢ لينة - ٣٣ بوس المتوسكة - ٣٤ تيرور - أبو منقار -
 ٣٥ طراغور - ٣٦ تود - ٣٧ ميف البحر - أبو سيف - ٣٨ شمر - ٣٩ دهانة - ٤٠ اندلس




1. سمك السلمون - 2. سمك التونا - 3. سمك السلمون - 4. سمك السلمون - 5. سمك السلمون - 6. سمك السلمون - 7. سمك السلمون - 8. سمك السلمون - 9. سمك السلمون - 10. سمك السلمون - 11. سمك السلمون - 12. سمك السلمون - 13. سمك السلمون - 14. سمك السلمون - 15. سمك السلمون - 16. سمك السلمون - 17. سمك السلمون - 18. سمك السلمون - 19. سمك السلمون - 20. سمك السلمون - 21. سمك السلمون - 22. سمك السلمون - 23. سمك السلمون - 24. سمك السلمون - 25. سمك السلمون - 26. سمك السلمون - 27. سمك السلمون - 28. سمك السلمون - 29. سمك السلمون



1. شابر - 2. صقر قزويني - 3. قطاب ذهبي - 4. قطاب نيمسكية - 5. قطاب القليل - 6. بومة - 7. بومة - 8. قيقب - 9. بلنج - 10. ككتور ، نسر امريكي - 11. نسلج - 12. لودي - 13. نوبة - 14. المرونة - 15. حورية حارونية الكمان - 16. ككتور، حراء القنطرة - 17. ككتور، صمراء القنطرة - 18. ككتور، ليدبر - 19. ككتور، وديك - 20. قمرينة - 21. بوماء - 22. قطاب بوماء - 23. قطاب بوماء - 24. قطاب بوماء - 25. قطاب بوماء - 26. قطاب بوماء - 27. قطاب بوماء - 28. قطاب بوماء - 29. قطاب بوماء - 30. قطاب بوماء - 31. قطاب بوماء - 32. قطاب بوماء - 33. قطاب بوماء - 34. قطاب بوماء - 35. قطاب بوماء - 36. قطاب بوماء - 37. قطاب بوماء - 38. قطاب بوماء - 39. قطاب بوماء - 40. قطاب بوماء - 41. قطاب بوماء - 42. قطاب بوماء - 43. قطاب بوماء - 44. قطاب بوماء - 45. قطاب بوماء - 46. قطاب بوماء - 47. قطاب بوماء - 48. قطاب بوماء - 49. قطاب بوماء - 50. قطاب بوماء - 51. قطاب بوماء - 52. قطاب بوماء - 53. قطاب بوماء - 54. قطاب بوماء - 55. قطاب بوماء - 56. قطاب بوماء - 57. قطاب بوماء - 58. قطاب بوماء



- 1 غار القردوس الاسود - 2 رفاة سعادى - 3 طائر القردوس الاحمر - 4 طائر القردوس الكبير - 5 كيايه (الاسم المثلث) - 6 كلبه - 7 سكوده - 8 ربيع الفلوق الصغير - 9 ربيع الفلوق الاسود - 10 طائر النبال - 11 مران جهوري - 12 فراش غلوم كالكات - 13 فراش موز - 14 ريكاش - 15 ابو طير - 16 قترال - 17 زعفران - 18 ابو دوح - 19 نير شام القدس - 20 نير راج - 21 نير جوليا - 22 صليط احمر اللب - 23 صليط تانك - 24 صليط احمر القادر - 25 صليط جيل - 26 نور دوش اسبح - 27 طرود - 28 شره زرقاء الصعد - 29 قتره سكمتة - 30 طيكين - 31 مدلب فان - 32 مدلب صافى - 33 لاورديه زرقاء المالح - 34 ام حرة - 35 لديرية صاعدة - 36 صفر طويل اللب - 37 فلكي - 38 ام رمال - 39 نيرة جردان - 40 نيرة طنكة - 41 قزاق ابو لبة - 42 حليقت بونابر - 43 دريش دسك - 44 سكشور - 45 ابو رمال - 46 غريس احمر القرد - 47 طرفيس اردق - 48 حريس ابش القرد - 49 خريس زيردي - 50 لغريس بهي - 51 لغريس طاردي - 52 لغريس مجرب - 53 لغريس شوق - 54 لغريس عوك - 55 نوك - 56 طلوراد - 57 سول طويل القشار - 58 نيرة كليوب - 59 دمك



- 1 طيور - 2 اديس - 3 تارح فالح - 4 تارح ملح - 5 تارح المهرت - 6 تارح نقي - 7 تارح ابو - 8 تارح سمرف - 9 تارح اوزك - 10 حرييل - 11 تارح بودابو - 12 سيمه شمس - 13 سيمه مير - 14 تارح ازن - 15 حط - 16 كيت - 17 فرور لسي - 18 كولات - 19 حريال - 20 ديك بري - 21 ديك سافل - 22 ديك كوشسي - 23 ديك حيرورغ فرغت - 24 حيت داجنة - 25 حيت طما - 26 حرام زابل - 27 حرام حرك - 28 حرام طرك - 29 حرام كيتي - 30 حرام بشوق - 31 حرام روز - 32 حرام مارجش - 33 حرام ماني - 34 بيا امل - 35 اكن شوق - 36 اوزة - 37 تم ابيض - 38 تم اسود - 39 شيل - 40 ايشة - 41 بويط واط - 42 بويط ذرب اللب - 43 حلق - 44 زهم طرك - 45 زهم لاجام - 46 كتر - 47 فرور ميط - 48 فرور برتقال السمر - 49 فرور اكاب - 50 بنگال لجلل - 51 بنگال اسر - 52 برور





ش

لاحف . قوايتها مستطيلة ، دقيقة || ثوبها الى السمرة السوداء باستثناء قاعدة الرأس والقوائم فانها زنجارية اللون || تعيش من قصصها على سطح المياه الراكدة وعلى الضفاف حيث تنمو بين النبات وبذات الرضاقة التي تنظفها على سطح الماء .

١٤٧٨٣ - شاكيل

Aloes (S).
Aloes (E). *Allice shad (E).*
جنس اسماك كبيرة القدر من فصيلة السابونيات . انواعها قليلة العدد موطنها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اجسامها مفلطحة مستطيلة ، حنجر عليها شاكك الخرافش || اشهر انواعها الشايل البهلل والصابيرة .

١٤٧٨٤ - شاكيل مبدئي *

Aloes vulgaris (S).
Aloes communis (F). *Common silice shad (E).*
نوع من الشايل وهو سمكة كبيرة القدر طول من ٧٠ الى ١٠٠ سم . موطنها المتوسط والاطلسي . تمراً في الماء العذب وقد يتم ذلك في الربيع ثم تنبد الى البحر في اواخر الصيف || لحمها اللين اللحم . لكنها كثيرة الهلك .

١٤٧٨٥ - شاكين. *Stout and fat (E).*
صفة الحيوان السمين الكاثر .

١٤٧٨٦ - شاكين * ، **شُرْصُون ***

Imperméable à la lumière (F). *Light-tight (E).*
نعت تعريفي يطلق على كل مادة لا يتغلل منها النور .

١٤٧٨٧ - شاكير *

Arboricole (F).
Living in trees (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالاخجار او يعيش من الاجزاء وطبقها .

١٤٧٧٩ - شاكيرات الماء

Hydrometriscidae (S).
Hydrométriscidae (F). *Hydrometriscidae, Water striders (E).*
فصيلة حشرات من لصفيات الاجنحة . حشرات هلام طراول الاربيل تمش فوق الماء كأنها تفرسه || ابتناسها وانواعها عديدة اشهرها الجوريس وشابة الماء .

١٤٧٨٠ - شاكيرة الماء *

Hydrometra (S).
Hydromètre (F). *Water strider (E).*
جنس هلام من فصيلة شاكيرات الماء . انواعه المعروفة نحو ١٠ جميعها نحيلة الاجسام ، دقيقة الاربيل المستطيلة . تعيش من قصصها فوق المياه الراكدة . تنمو على سطح الماء بشفة || موطنها جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة .

١٤٧٨١ - شاكيرة الماء الرمضاء

Hydrometra cinerea (S). *Hydromètre gris (F).*
حشرة من فصيلة شاكيرات الماء . جسمها صغير مستطيل بطول من ١١ الى ١٤ مم . || رأسها دقيق ، مكور الطرف . غطائها نحيل . زباناها مستطيلان . عينها جانبيتان ، فاشرتان . كسولها شبه برنسي الشكل . ظهراتها ضيق وقصير . قوائمها مستطيلة . اوصافها ثلاثية البقل || ثوبها الى الوردية البهراء يمتد في الرأس وفي كل حرقفة ويغور || تعيش من قصصها على سطح الماء حيث تنمو بسرعة منتشرة .

١٤٧٨٢ - شاكيرة الماء التنقيصة

Hydrometra stagnorum (S).
**Hydromètre des étangs (F).
حشرة من فصيلة شاكيرات الماء . جسمها مستطيل الحجم بطول من ٩ الى ١٣ مم . رأسها دقيق مستطيل . غطائها قصير . زباناها مستطيلان . عينها جانبيتان كبيرتان . كسولها اسطواني الشكل ويطبقها ايضاً . ظهراتها ضيق**



فايرة الماء



شايل بهلل

١٤٨٠٤ - شاكري هو خائف القملقة ، اطلبه .

١٤٨٠٥ - شاكيب ، شاكيف Malgre, Sec (F).
Maugre, Dry (E).
المهزول من الحيوان شمرأ او خالفاً لمرشاً .

١٤٨٠٦ - شاش الشافي
هو البلس وهو الكاكج ، اطلبه .

١٤٨٠٧ - شاص ، مشوتّر Raide (F). Stiff (E).

١٤٨٠٨ - شاصير Faon (F). Fawn (E).
الشاصر والشصر : ولد الطيبة .

١٤٨٠٩ - شاطيب Anomoure (F).
لمت تعريفي يطلق عل كل ذنب يشد بشكله عن المألوف .

١٤٨١٠ - شاطيركة هي البطونقا الطيبة ، اطلبه .

١٤٨١١ - شاطط Anomal (F). Anomalous (E).
شاذ ، غالف لواميس الطيبة او تولامدا .

١٤٨١٢ - شاطي Bord, Rivage (F).
Edge, Shore (E).
هو شط البحر او النهر .

١٤٨١٣ - شاقب ، مشقّب Rameux (F).
Branching (E).
الشعر الكثير الفروع .

١٤٨١٤ - شاقث Sparsile (F). Sparsile (E).
الشاقث هو التيم المنظر في الفشاء . كل نجم لا يدخل
في جموعات الابرّاج او المجموعات الكوكبية يعتبر من
الشاقثات .

١٤٨١٥ - شاقم Asymétrique, Inégal (F).
Asymmetrical, Unequal (E).
صفة الشيء اللاتناسق الاجزاء . م. شواو وشياو . ج
شراغ وشنو .

١٤٨١٦ - شاف Curatif (F). Curative (E).
صفة العلاج الذي يقضي عل المرض فيسبب الشفاء .

١٤٨١٧ - شاق Ulcère (F). Ulcer (E).
هي القفرة او القرة الداملة .

١٤٨١٨ - شاقير هو الشفر ، اطلبه .

١٤٨١٩ - شاقع Bôlier (F). Ram (E).
الشافع من الشفان كالتيس من الحزى .

١٤٨٢٠ - شاقول ، مشقمر ، قادن
Fil à plomb (F). Plumb-line (E).
جهاز مركب من قلمة من النحاس او الحديد عمودية
للشكل ، معلقة بخط قوي ، يستعمله البناء لقياس من صفة
عمودية الجاه ما ينس .

١٤٨٢١ - شاكّة Acaena (S).
Acéna, Acéne (F). Burr, Rosy spined bur (E). Wier-
derhaken, Acline (D). Acaena (I).
جنس نباتات برية وزراعية تريبتين من فصيلة الورد يات .
انواعه قليلة جميعها صغيرة القد . بعضها وفروها شاكّة .

١٤٨٢٨ - شاكح Autotrophe (F).
Autotrophic (E).

شاح م. شاحية ج. شواح. تمت تعريفي يطلق عل جميع
النباتات التي تحصل مواد الغذاء من الطيبة فتصيرها وتطها
بواسطة الطاقة الشمسية .

١٤٨٢٩ - شاكبة ، شاكبة Déchaumouse (F).
Scrubble-plough (E).
عمرات الشب او الفلاح .

١٤٢٩٠ - شاحن
الشاحن من كلاب الصيد الذي يبعد الطريد ولا يصيد .
ج شواحن .

١٤٢٩١ - شاكبة ، كمشين Camion (F).
Dry (E).
سيارة مجهزة لنقل الاحمال .

١٤٢٩٢ - شادول Mimécluc (F). Mimetic (E).
لمت يصنّ تعريفي يدل عل نبات الذي ينسج شكلا
ولوا مع البيئة التي يعيش فيها .

١٤٢٩٣ - شادين Faon (F). Fawn (E).
ولد الغلبة .

١٤٢٩٤ - شادج Hématite (F). Hematite (E).
هو حجر الدم ، اطلبه .

١٤٢٩٥ - شادوف Chadouf (F). Well-sweep (E).
الشادوف او الدالية آلة بسيطة قديمة للمه والاسعمال ،
تولمها دلو وثقال . كانت ولا تزال تستخدم في رفع المياه
من مجاريها المنخفضة .

١٤٢٩٦ - شادي Carcophtèque de Sabe
هو هجرس ساء ، اطلبه .

١٤٢٩٧ - شاكّ Héteroclite (F). Heteroclit (E).
ما مخرج من قواعد المجانسة او من مألوف لونه .

١٤٢٩٨ - شاكّ ، شاكّ الموضع اللطيف الكثير الحجارة .

١٤٢٩٩ - شاكّ Désoepercaler (F). To uncup (E).
شار واشتار الحسل : استخرجه من القربة واجتناه فهو
مشور .

١٤٨٠٠ - شاكود ، لرون Ion
الشوارد والايونات هي لوانج التحليل وتكون بلوريات لوانج
التحليل الكيماوي الناتج عن مرور التيار الكهربائي في
الجسم الموصو . رابع لرون .

١٤٨٠١ - شاكودي Ionique (F). Ionic (E).

١٤٨٠٢ - شاكولات الاجنحة Phalpenaes (F).
رتبة شحات نالفة من طبقة مصبيات الجناح . فصائلها
ولبنسها كثيرة العدد . تتميز بروونها السوداء . يتألفها
مستلة القد ، اجنحتها مستطيلة ، تأكيدها مجهزة للنس .

١٤٨٠٣ - شاكولات الاسنان Acrodontes (F).
Acrodontes (E).

لمت تعريفي توصف به الظاه من فوات الاسنان الشارة
المتركة في الحالة الخارضية من الفك الاعل . يقابلها
قابسات الاسنان .



شارات الاجنحة

أوراقها مركبة . وريقاتها فضية تصل المسن الحلق .
أزهارها حلقة تتجمع صغيرة اللقد يندب لها الأصفر
والأحمر || أنزماردا صيني .

١٤٨٢٧ - شاكيس * Apogonius (F). Apogonius (E).

كل نبات يتكاثر بالبرعمة أو التعملة لأنه قد غاصت
التكاثر بالانصباب الطبيعي أي بتطعيم الأزهار يدعى
شاكس .

١٤٨٢٨ - شاكس * Flanc (F). Flank (E).

هي الإحل والخاصرة . ج شواكل .

١٤٨٢٩ - شال * Synodontis (S). Synodonta (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السلوريات أنماه نحو ١٥
جميعها من اسماك مياه المناطق الاستوائية والحارة . أشهر
أنواعه شال النيل ورازقون والسبي والقرقرور . جميعها
ماكولة ، غريها متوسطة الحسنة .

١٤٨٣٠ - شاليم * Saige (F). Ryo (E).

هو الشليم ، الحلبه .

١٤٨٣١ - شالوف * Cascade (F). Waterfall (E).

هو الشلال صخر حجه وارفع منحد .

١٤٨٣٢ - شامك * Odor (F). Smell (E).

اسمى حواس الجسم الحاسة لاسيا عنه الحيوان الذي يتعد
عليها في ذلك || حواس الشم هو الالف يلمسه بالاحل
مذلف بفشا غاطلي يلمس الاصابع التي تظل الاحساسات
الشمية الى المراكز الخاصة بها في المخ .

١٤٨٣٣ - شامكة * Membre (F). Limb (E).

الشامة : شامة آتابة . ج شوامت . ويقال لها الشاركة .

١٤٨٣٤ - شامك * Thérillon (F).

جنس حناكب من فصيلة التمازيات . أنواعه عديدة جميعها
متوسطة القد أو صغيرة . اجسامها شبه يضية الشكل ،
جوانها دقيقة مستطيلة . تحب نوسها حل النبات وفي
تجاريات المسحور والجندار والابنية المنجورة .

١٤٨٣٥ - شاميلات الكف * Totipalmes

بنية طيور من شكايات التتم فيها البجع والذئق وليمها .

١٤٨٣٦ - شان * Sutura du crâne (F). Sutura for the cranium (E).

هو درز التفتع وفريشيل الدرز الأكليل واسم ولأسم .

١٤٨٣٧ - شاكيبه * Fragata, Azagen (S). Fragate (F). Frigate-petrel (E).

جنس طير من كليات القدم وفصيلة البجيات . له نوام
مرفوفان : الشاكيبه المغايبة والشاكيبه الحذبة || اعطاهما
مجامع البلاد الحارة والاستوائية . تألف المصاحف المصرية
والصغور الشارة حل البحر || اجسامها مستطيلة .

تتميز في صلعو شفع الصغور وفي ألقاها العام تلو
العام والشم قرب الشمس . شكتها مؤلفة من يفتين لونها
البياض الاثير تملو ماجة غضراء أو حمراء وبض
التفتل الجوزية . القريش يستمر نحو اربعة اشابيع تقود
به الاثني دون الذكر الذي يكون لها كلفاء .

١٤٨٣٨ - شاكيبه علكيبه * Fragata marina, Azagen aquilus (S). Fragate-Algic, F. marine, Grando frégate (F).

نوع من الشاكيبه . طائر كبير اللقد ، مستطيل الجسم ،
طوله نحو ١٠٠ سم . وبسته نحو ٢٢٠ سم . اما وزنه
فلا يتجاوز ١٥٠٠ غرام || ثوبه اسود اللون ، اغضر
المواج . زووه ومقاده ال الحمره . حلقه عتة شديدة
السواد . رجلاه الى الجفوة || تبه الاسماك يمتلأها من
البسر ويغسلها من متلايد طيور الماء || اعطاه مجامع
افريقية الاستوائية والحارة أن حل المحيط الاطلسي أو حل
المحيط الهندي .

١٤٨٣٩ - شاكيبه هندية * Fragata minor, Azagen minor (S). Fragate indienne, Petite frégate (F).

نوع من الشاكيبه . طائر متوسط اللقد ، مستطيل الشكل ،
يطول نحو ٦٠ سم . ويبلغ بسته نحو ١٢٠ سم . وزنه
لا يتجاوز ٧٥٠ غراما || اعطاه تيم من مجامع جزر
الترابج الى الهند والبحر الاحمر || ثوبه الى السواد الارزق
المواج . مقدم عتقه الى البياض الاثير . حلقه عتة
سكتية اللون . مقاده شديدة السرة . رجلاه الى السرة
يطولها مواج بحري || ثوبه الاسماك يمتلأها كالشاكيبه
المغايبة ويدلن عتلا في صلعو الصغور واطاها .

١٤٨٤٠ - شاه اسيرم رصي * Queroulet (F).

اطب خزاس بحرية .

١٤٨٤١ - شاه بكار * Autour commun (F). Goshawk (E).

هو البازي ، اطابه .

١٤٨٤٢ - شاكيباتج * Armée conys (F).

هو البرايون ، اطابه .

١٤٨٤٣ - شاكيبكوط * Châtignier (F).

هو لكسكنا ، اطابها .

١٤٨٤٤ - شاكيبكوط الحيسان * Marron d'Inde (F). Horse-chestnut (E).

شجرة اللندلي الهندي ويقال لها أيضا قسطة الحسان
وقسطة مرة .

١٤٨٤٥ - شاعرج * Fumaria (S). Fumeterra (F). Ramping fumitory (E). Erdrauch, Rankenerdrauch (D). Fumozerno, Fuma- ria di Bor bianca (I).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة التفتجريات . أوراقه
مستطيلة ، متطابقة ، مركبة . نصلها كبير القفريش ،
ياحت الخضر البحري ، يفوح منه عتة حلو مادة طيارة
تقتل كل الحيوان تأخذ الالف وتدمع العين || أنزمار
لاقليمية تتجمع ، صغيرة اللقد ، لونها الى البياض
الاغبر يطولها مواج ورددي .



شال



شالو



شاكيبه



شاعرج

١٤٨٨٨ - شاكور* ، كُسر

Brayers anthelmintica, Hagenia abyssinica (S).
Couscousier, Couso, Kouso (F). Kuso, Tapeworm plant (E). Kesobum (D). Cuso (I).

عجوة برية طيبة من فصيلة الورديات منها بلاد الحبشة .
اوراقها مركبة متعاقبة ، ورقها سناينة النصل ، مجنحة الشكل .
أثمارها عشوية التجميع ، تاجية الارتكاز تستعمل في الطب وتقتل في عدة مستحضرات اعصها الادوية المعوية .

١٤٨٨٩ - شاكوي Aguardier (F).
هو السقاء الذي يوزع مياه اري على مستحقها .

١٤٨٩٠ - شاكع ، شفاع ، مشتوك Indivis (F).
Unidiv (E). هي الملكية الشاملة وهي حالة قانونية يوجد فيها من يملك حقاً مشتركاً مع غيره .

١٤٨٩١ - شاكك النجار Echincarpus (E).
من النباتات ما كانت تقود ثماره محفوفة بالغلب الشاكك .

١٤٨٩٢ - شاكك الجناح Uncipenne (F).
من الطير ما كان جناحه مجهز ببعض الريش الشاكك الاطراف .

١٤٨٩٣ - شاكك الدكب Echinaire (F).
نعت ترميني يطلق على كل حيوان أو دوية يملؤها في ذنبها حلب شاكك .

١٤٨٩٤ - شاكك القترام Echinpède (F).
نعت ترميني يطلق على كل دوية أو شجرة يملؤها في قوائمها مناعس حادة كالشوك أو حلب جامد شاكك .

١٤٨٩٥ - شاككات الرأس Acanthocéphales (F).
Acanthcephala (E). صف من الديدان الطفيلية رؤوسها واعطائها مسلحة بالشوك .

١٤٨٩٦ - شاككات الزعاف Acanthoptera (S).
Acanthoptères, Acanthoperygians (F). Acanthopterygien (E). رتبة من الاسماك الطفيلية .
صافاها واجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بحري وبعضها بري || اشهرها البوري والثن والقاروس والمريجان الخ .

١٤٨٩٧ - شاكك الدليل Niqueté (F).
Nicking (E). الدرس الذي تلمت طفل ذنبه الخافضة لتسوق .

١٤٨٩٨ - شاي Thea (S).
Théier (F). Tea plant (E). جنس نباتات برية وزراعية متناعمة من فصيلة الكامليات .
مهل الصين . انواعه ١٦ جميعها متعاقبة الاوراق المنقطة ، تصلفها شفرير القند ، مستطيل الشكل ، مسنن الحافة .
أثماره ابوية الارتكاز ، فردية أو ثلاثية التجميع ، لوناً يراوح بين الالبيص والاصفر .
عرها غانت الرائحة المسكية || اشهر انواعه الزراعية الشاي الصيني ، اطليه .

١٤٨٩٩ - شاعترج مخزني* ، بكلكة الملكة

Fumaria officinalis (S). Fumeterre officinale, Fiel de terre (F). Fumitory, Fumitarre (E). Echter Erdquich (D). Fumosterno officinale, Fiele di terra (I).

نبات عشبي حولي بري طلي من فصيلة الشاعترجيات .
اوراقه مرة العلم غزيرة اللادة القولية الثمالة ويبيض الخواص الضوية الثمانية .
فرها يمرر مع محواه من مواد طيارة تبيح الالف وتوسع العين .

١٤٨٩٢ - شاعترجيات Fumariaceae (S).
Fumariacées (F). Fumariaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها نباتات عشبية .
أثمارها متدغاة الارامات ، مزوجية النصل ، رباعية البلات ، ثنائية الاسدية الجانبية الارتكاز الثلاثية الانقسام || ثمارها جراء ثنائية الكرايل .
زودها آسية مزوية .

١٤٨٩٣ - شاكهد Témoin (F).
Witness (E). هو الذي يدل بالشهادة .
والشاهد قد يكون :

شاهد إثبات Témoin à charge (F).
Witness for the prosecution (E).
شاهد زور Témoin faux (F).
Falsely witness (E).
شاهد حل الشخصية Témoin certifié (F).
Certified witness (E).
شاهد غير مباشر Témoin indirect, Médias (F).
Mediate witness (E).
شاهد قابل العن Témoin reprochable (F).
Reproachable witness (E).
شاهد في Témoin à décharge (F).
Witness for the defence (E).

١٤٨٩٤ - شاكسفرم - هو الحق الصغير ، اطليه .

١٤٨٩٥ - شاك صيني - هو التابل ، اطليه .

١٤٨٩٦ - شاهين Falco peregrinus (S).
Falcon commun, F. pèlerin, F. voyageur (F). Peregrine falcon, Royal falcon, Shahn (E). طائر من الصقور فضيلة الصقريات .
مروقه حديدية منتشرة في معظم الاطوار الاسيوية والاوربية .
وهو كبير الحجم والشدق ، اسود الرأس ، طويل القوائم ، واسع العينين ، رجب الصدر الاخير للنشر ، قصير المتق الابيض ، نعل ، أزور ، جلبيشة البطنين ، قصير الساقين .
ذنبه اسود مستطيل تعلو بعض الزرقعة || وهو اريد من الصقر واييس مزاجاً ولاجل ذلك تكون حركته من القمل الى السفلى شديدة الانخفاض ||
جمه شوامين وشياطين . قال فيه عبد الله بن المبارك :

وقد يلتصق المرء حائطاً تحيره
وقد قصمت لك الحانوت بالدين
بين الاساطين حانوت بلا غلق
تتباين بالعين اموال للساكين
صيرت دينك شايحاً قصيد به
وليس يفلح احصاء للشواطين

١٤٨٩٧ - شاهين Alshahin
الشاهين نجم ثير من كوكبة الشهاب .



شاعترج مخزني



شاهين



شاي ، كسر



شاي المروج



شاي بسلطانية



شاي صيني



شَبَّ اللَّيْلِ

تزارحم من ٣ الى ٤ استر | اشهر اوراقها يبدأ بند
القرن بثلاث سنوات واجود الاوراق ما تنج من الاذنان
القنية || اشهر البلاد المنتجة لشاي : الصين ، واليابان
والهند واثنتا عشرة جزيرة الزنج وسرنديب .

١٤٨٦٦ - شاكينين (Théina (F).
للادة القاتولة الموجودة في ورق الشاي وهي يمشطها من
البين .

١٤٨٦٧ - شَبَّ (Alun (F, Alumi (E).
الشب او حجر الشب ، ملح معدني بلوري التركيب
ايضاً اللين حاصر الطم يتكون في الطبيعة من بعض
الكبريتات انحصاراً كبريتات الاوليوميد وكبريتاتسيوم .
يأوب في الماء ويصير في حرارة ٩٢° س || يستعمل
في عدة صناعات انحصاراً الصبغة القطنية والصوفية حيث
يثبت الالوان ويذكرها ، ويستعمل في ترويض المياه الملوحة
وفي سفل الجلود من الاصلح ... كما يستعمل في الطب .
وهو من القنواض التي توفى الزيت والروائح .

١٤٨٦٨ - شَبَّ اللَّيْلِ * ، نَوَّار اللَّيْلِ ، شَوَّاق ،
شَبَّ الظريف

Mirabilis(S), Nyctage, Belle-de-nuit(F), Four o'clock
plant (E), Wunderblum (D), Balis di notte, Mervaglia,
Gelsomino di notte (I).
جنس نباتات عميرة ابيدة من فصيلة الخسنيات . انواعه
قليلة بعضها بري وبعضها زينة . سويها فرما تملو من
٧٥ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كاملة متعاقبة طرية العرف .
ازهارها حذو كوكلي التجميع ، تاجي الازهار . انوارها
خامسة البتلات ، نجمة الشكل ، يضاء اللون ، حرة
الرائحة || اوراقها حيدة المنافع الصحية تستعمل استعمال
الشاي || اشهر انواعه ما يتبع .

١٤٨٦٩ - شَبَّ اللَّيْلِ الْإِنْرِي ، شَوَّاق الْإِنْرِي
Mirabilis dichotoma (S), Nyctage dichotome, Belle-
de-nuit dichotome (F).

نوع من شب الليل وهو حشبة عميرة تملو من ٩٠ الى
١٢٠ سم . ساقها خجلة . اوراقها لائقة ، يضية . انوارها
صغيرة اللد ، طرية العرف ، يضاء اللون او حراء .
انوارها يستمر من تموز الى تشرين .

١٤٨٧٠ - شَبَّ اللَّيْلِ الْجَلْبِي ، شَوَّاق جَلْبِي
Mirabilis jalapa (S), Nyctage faux-jalap, Belle-
de-nuit faux-jalap, Mervilla du Pérou, Herbe triste(F).

نوع من شب الليل وهو حشبة عميرة تملو من ٥٠ الى
١٠٠ سم . اوراقها يضية الشكل ، نصلها ازغب الصفعة
السفل ، ذلق الزام الامير . انوارها حادة العرف
تظل نحو ٣ سم . لونها زجاج من الازهر الى الاحمر
والاصفر والمزيج || انوارها يستمر من تموز الى تشرين .
جنودها تستعمل في غش الجلب .

١٤٨٧١ - شَبَّ اللَّيْلِ الْمُسْتَطِيلُ الْقَرْفَر ، شَوَّاق
مُسْتَطِيلُ الزَّهَر (Mirabilis longiflora(S).

Nyctage à longues fleurs, Belle-de-nuit à longues
fleurs, Belle-de-nuit odorante (F).
نوع من شب الليل وهو حشبة عميرة تملو من ٦٠ الى
١٢٠ سم . اوراقها زبد النسل دقيقة . انوارها مستطيلة
الانسيب ، خلية البشرة ، فولية العرف ، يضاء اللون ،
حراء القاعة الداخلية || انوارها يستمر من تموز الى
ايلول .

١٤٨٥٩ - شاي (Thé (F, Tea (E).
هو ورق جنبة الشاي يعني نجيع ويصف في الشمس .
ثم يلف ويحمص في مجاف خاصة . ثم يند للاستفاد
بند تحضيره ومزجه بلسب متفارة للقد بين شطفت
استاف الاوراق || عصبه العالي الحولي زبد ٥٠٠٠٠٠
طن || اما تركيبيه المتصني فهو :

ماء من ٨٥٠ الى ١٠٧٠ %
رمد من ٨٠ الى ٧٠ %
مواد ازوتية من ٢٣ الى ٢٥ %
مواد دهنية طرية من ٣٨ الى ٧٨ %
حطان من ١٥ الى ٢٥ %
شايون (بين) من ١٠ الى ٣٨ %
وبعض الحواض البضوية والاملاح المعدنية بلسب يراوح
مجموعها من ٣ الى ٧ %

١٤٨٩٠ - شاي العَرَب ، هو القات ، الحلبه .

١٤٨٦١ - شاي اللُّرُوج * ، قَسُوس
Ladum (S), Lédon, Romarin sauvage (F), Crystal-tea,
Marsh cistus, Marsh rosemary (E), Sumpporat, Wild-
der rosmarin (D), Ledone, Ramerino di palude (I).

جنس نباتات عميرة ابيدة من فصيلة الخسنيات . انواعه
قليلة بعضها بري وبعضها زينة . سويها فرما تملو من
٧٥ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كاملة متعاقبة طرية العرف .
انوارها حذو كوكلي التجميع ، تاجي الازهار . انوارها
خامسة البتلات ، نجمة الشكل ، يضاء اللون ، حرة
الرائحة || اوراقها حيدة المنافع الصحية تستعمل استعمال
الشاي || اشهر انواعه ما يتبع .

شاي المروج المنقني
Ladum palustre (S).
Lédon des marais (F).

شاي المروج المريض الورق
Ladum lasifolium (S).
Lédon à feuilles larges (F).

١٤٨٦٢ - شاي المكشيك ، هو الزنج ، الحلبه .

١٤٨٦٣ - شاي بَرَاظَوِي ، هو حشبة الشاي ، الحلبه .

١٤٨٦٤ - شاي بَسْلُطَانِيَّة * ، مَوْتَرْدَه أَرْجَوَانِيَّة
Monarda purpurea, M. didyma (S), Monarda pour-
prea, Thé d'Oswego, T. de Pensylvania (F), Oswego
tea, Mountain tea, (E), Oswego, Doppelblumen-
balsam (D), Monarda cremensis, M. scaberrata (I).

نوع من الموترد . وهو نبات حشبي معمر من فصيلة
الفلويات . ساقه كثيرة الازداد تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم .
اوراقه متعقة ، نصلها كامل الصفعة ، ساني اللد .
شواهي الحلقه ، ازغب البشرة ، طرية الرائحة . انوارها
حذو كوكلي التجميع ، مستطيلة اللد ، ارجوانية اللون ،
فواسه العرف || انوارها يستمر من حزيران الى تموز .
اوراقه حشبة ناعمة تستعمل الشاي .

١٤٨٦٥ - شاي صيني *
Thea chinensis, T. viridis (S), Théier de Chine(F).
Yea plant (E), Teosrauch (D), Té, Thé (I).

اشهر انواع الشاي واعمالها ازراعة واكثرها صروباً وايديها
انتاباً . وهو شجيرة عميرة تملو من ترين الى ستة اعمار .
متوسط طولها نحو ٣٥ سم . ترغب في الغصاف وفي الاربة
المروية القليلة الانساج . تحض رطوبة التربة المستحكة
ولا تتأثر بالبرد || تدرس كشتول في مسترها على ابعاد



شَبَّ النِّهَار

١٤٨٧٧ - شَبَّ النِّهَار * شَبَّاب مَكْنُكُ الْأَلْوَان

Convolvulus tricolor (S). Belle de jour, Lisaron tricolora (F). Three coloured bindweed (E). Dreifarbiges Windé, Kriachwinde, Winde (D). Bella di giorno, Emarocalle (I).

نبات عشبي حولي ترابي من فصيلة البلياتات. لوراته اعليجية الشكل ، تصلها خلي البشرة . أزهاره كبيرة القد ، زرقاء البوق بضاء الأنبوب ، صفراء القاطعة . تنتشر في النهار وتعلق في الليل || فروبه الأزينية عديدة جميعها زائفة الألوان || أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول .

١٤٨٧٣ - شَبَّاب حُر الطَّبْع ، أَلْبِه .

١٤٨٧٤ - شَبَّاب * *Coleophora, Espista* (S). *Coliophore, Espista* (F). *Cambesars* (E). *Fasciarmotten, Sechsmotten* (D).

جس فرائش من المغطيات . أزواحه عديدة أسطفاً الاثالي من المعتلة والباردة . جميعها غيلة الجسم صغيرة القد ، بطنها تراوحي من ١٦ إلى ٢٢ مم . أجسامها حتملة . رولتها الانامية إلى الصفرة تعلوها الزواكش المخططة الألوان . رولتها الخلفية إلى البياض الاخير بطنها يختلف مداه ولبه مع الانواع . اطراف رولتها عريش التدهيب تكثر فيه الألوان الغامقة كالاخر || رولتها تحمل قراباً لا يماسي الشكل والابن تلتصق بها كما تقفل الحلاتين . وهي عاصلة وإمارة تركيب النباتات البرية والاشجار للشرية تفتحم الازواك بالآثار .

١٤٨٧٥ - شَبَّابَة

النشابة : بالقرب سامة تولد . ويقل يقرب صفراء . فطول حة المقرب .



شَبَّابَة

١٤٨٧٦ - شَبَّابُوس

هي الشباروس ممكة من السرفوس ، أَلْبِه .

١٤٨٧٧ - شَبَّابُوس * شَبَّابُوس ، شَبَّابُوس ، شَبَّابُوس

Oreus antiquorum (S). *Oreus antiquus, Bugrana, Arrée-boud* (F). *Tall rest-harrow* (E). *Sollische Haschachel* (D). *Bulimacola, Arrée-boud* (I).

لوع من البق وهو جنية متوسطة القد حليلة الجلود المستطيلة . الاقنية الاستعداد . لوراته مركبة ، عاقلة الخمار . انواره متقوية التسبح جملة الشكل صفراء اللون يميلوا ترخيح وردي || يقال أنها من النباتات البلية نفع انوارها يفتح الصدر .

١٤٨٧٨ - شَبَّابُوس

Février (F). *February* (E). يعرف أيضاً بـشباب و فبراير . الشهر الثاني من السنة الشمسية مركزي بين كائون الثاني وأذار . وهو من استحداث الفريسي وكان معتم شهر الطهور وأخر شهر السنة . ثم أصبح في ربهه الحالي منذ القرن الخامس قبل الميلاد . عدد أيامه ثمانية وعطرون يوماً إلا في السنين الكبيسة فهو تسعة وعطرون || في الصباح منه تسقط الجمرة الاولى ثم يجري الماء في البعد . وفي الرابع حشر تسقط الجمرة الثانية وفي الحادي والعشرين تسقط الجمرة الثالثة . ومنى سقوط الجمرات ان الناس كانوا يتخلون في قديم الزمان اغنية ثلاثة في الشتاء يحيط بعضها بيطس وكان انحاء الاول ملى لولابهم الكبار كالحمل والابل والقر . والحاد الثاني لولابهم الصغار كالتمير وهم كانوا في الحاد الثالث . وكانوا يسلون جرات النار في كل غياه ويصطنون



شَبَّابُوس

الجمر للاصطلاح . فلما كان الصباح من شباط اجربوا دوابهم الكبار إلى الصحراء ويطولوا الصغار مكانها يوم سكتوا مكان الصغار فسمعت سقطت من الجمرات الثلاث جرة . فلذا مضى اسبوع آخر اجربوا البقم أيضاً إلى الصحراء وهم سكتوا مكانها فسقطت جرة اخرى . فلذا مضى اسبوع آخر اجربوا إلى الصحراء وتركوا اشمال النار لقلعة البرد ويطيب الهواء فسقطت الجمرة الثالثة || وفي السادس والعشرين من شباط اول ايام السجوز ويسام السجوز سمة : ثلاثة من شباط واربعة من آذار وهي لاخروج البرد والرياح .

لقومهم الزراعي . اعماله الزراعية عديدة . احصاها :

١ - في الزراعات العلة الموصية - توزيع الاسمدة الازوتية النيتراية على الزروع بمعدل ٢٠ كيلو لطن الواحد وذلك لتنشيط النمو الخضري الذي يقرر جودة السبال وفرة الانتاج . بلز التحول . الاعتناء بمشائل البقول والنبوغ وقايتها من تقلبات التبول الجوية من حيث الحشرات والاصام . المباشرة . عند اواخر الشهر ، بتوزيع الاسمدة الكيماوية للمركبة على الارثة لمدة لزراعة البقول والخضار .

٢ - في الاشجار الخشبية - متابعة غرس نصوب الاشجار المنتشرة على اختلاف انواعها . ومتابعة التشذيب والتقليم ثم قطع القمامة وسرقها بأكملها . متابعة نضج الاشجار بالزيوت البيض المخففة وبالواكسين القمالة .

٣ - في الحشويات - تهيئة وفسر مشائل التارنج والليمون الحلو . تنظيف سوق وروع الاشجار من البعاد الصلقة والبقايا اليابسة والكشف على جلود الاشجار المعرصة للحاروت ونفسها بمطلي سلفات النحاس والكلس .

٤ - في الزيتون - اتمام جميع الاعمال الزراعية التي تمرر القيام بها في الشهر الماضي انصبا للتيسيد والحرق والتقليم والتقليم .

٥ - في الكروية - حرق الكروية وتقليمها ثم نفضها بمحلول سلفات النحاس . متابعة الفرس ان في المشائل او في المستقر بعد مراعاة سيق التربة وفرونها الحكمية وتقديرها الاندماجي .

٦ - في اللوز - المباشرة بفرس نصوب اللوز في الارثة الخفيفة الثقيلة الانساج . تسيد الزراعات القائمة بالاسمدة الكيماوية المركبة والانتباه الى اضافة الكلس حيث تدور الحاجة .

٧ - في الاشجار الحديقية والحرجية - متابعة غرس الاشجار النانقة والسرور والكروية والاراكسيس الخ .

٨ - في الخضار والبقول - متابعة زرع البقول التي صار تمدادها في الشهر المنصرم بضاف البها القريب والكمون والقزح . تسيد زراعات الباذنجان لتفحص على استمرار النمو والاشجار . المباشرة بزراعة الخيار والكوسى والقزح في الموائع الدافئة .

٩ - في الزهور - حرق التربة وتمشيتها ونثر الاسمدة الكيماوية المركبة . تقليم الورود والمباشرة بفرس الزهور الصغيرة على اختلاف انواعها .

١٤٨٧٩ - شَبَّابَة

Carpiculture (F). *Carp-breeding* (E). الشبابة تربية الشبوط ، وقد تم ذلك في خدران فسيحة متوسطة الفود .

١٤٨٨٠ - شَبَّابُوس

Cordon & fixer (F). *Fassen-string* (E). حيط يشد البني . لاستقراره في مكانه .



شباب



شيث الصلوات



شيث



شيث بري



شيطان



شيع

١٤٨٩٠ - شَيْتَالِيَات * Geophilidae (S).

Geophilidae (F). Geophilidae (E).

فصيلة دويبات من الشيداعيات الشفويات الاسكاف. اجناسها وانواعها كثيرة العدد اشهرها الشيطان.

١٤٨٩١ - شَيْتَالِيَات * Demodicidae (S).

Demodicidae (F). Demodicidae (E).

فصيلة حشرات جلدية مجهرية من رتبة اقتراديات. لا ترى بالعين المجردة، اجناسها مستطيلة، ارجلها قصيرة. تعيش على غدد وبصيلات الشعر. تكاثر جميع الحيوانات الضخمية ولا تمتص من الانسان.

١٤٨٩٢ - شَيْتَاع * Buthus (S).

Scorpion jaune, Buthus (F). Yellow scorpion (E).

ج شيداع. جنس عقارب متوسطة القد او كبيرة، مسطحة، اللون، صفراء الخواص. تتميز بملامحها المزدوجة الانسان الداخلية. اصطناعها البلاد الحارة. تكثر في الارضية. مدمرها دجوي، راجع عقرب.

١٤٨٩٣ - شَيْتَاع اصفر * Scorpion jaune (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب اصفر، اظلم.

١٤٨٩٤ - شَيْتَاع حُمْطِي * Scorpion brun (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب حُمطي، اظلم.

١٤٨٩٥ - شَيْتَاعِيَات * Scorpionidae (S).

Scorpionidae (F). Scorpionidae (E).

فصيلة دويبات ولاد خيشية من رتبة العقربيات. اجناسها وانواعها عديدة. اصطناعها البلاد الحارة. جميعها دجوية تسمى في الابل وقسطنطين في القهار في غاف. تألفها بين الحجازة وتحتها.

١٤٨٩٦ - شَيْتَدُوع * Talitrus (S).

Talitrus (F). Talitrus (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات البليسا فضيلة الدخاشيات. انواعها المهرولة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الباردة والمعتدلة الحارة. تعيش على القشوط الرملية. جميعها قاصصة وتنفس في الرئتين بصره || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٧ سم. انواعها الى الشبهة القزقة يطولها موج مرجاني يتخلل الخشبي حته عند السكم || جميع انواعها مأكولة كالاربيان.

١٤٨٩٧ - شَيْتَدُور * Trifolium (F).

هو الثفل. وله جاء في لسان العرب: « ثبات شيبه بالرطبة الا انه اجل واعظم ورقة مغرب شيدور بالفارسية ».

١٤٨٩٨ - شَيْشِر * Empusa (F).

الشعر المساة القويعة بين طرفي الالام والخضر عند كامل نجها. متوصلها ٢٢ سم.

١٤٨٩٩ - شَيْشِرَيْش * Chameleon (F).

هو الجمل الصغرى لا يزال يبع له.

١٤٩٠٠ - شَيْشِرِي * Chelone (F).

شيع. هو الشبارق، اظلم.

١٤٩٠١ - شَيْشِرَكَة * Chiton (F).

انزهر سنبل قذفي الشكل مشير الانزاهر القراكية المتابعة.

١٤٨٩١ - شَيْبَان * Skimmia (S).

شباب نباتات برية ريفية من فصيلة البشيات. انواعها قليلة العدد جميعها جنات سريرية ترطب في المناطق المعتدلة المشربة نحو الحارة. سوقها متصصة قرياء. اوراقها عروسة معتقة شتاقية. نصلها جامد الصفحة الاطالية توشم الغدد البقيقة الشفافة. انزهرها حشوكلي الشكل طرفي الارتكاز. انزاهار صغرة القد، كثيفة التجميع، فواكه العرف المسحب. ثمارها عنية، كرزوية الحميم، حارة الين، مأكولة.

١٤٨٩٢ - شَيْبَانَك * Horobolus (F).

هو البرون، اظلم. وقد تكتب ايضاً شابانك.

١٤٨٩٣ - شَيْبَان * Taureau (vieux) (F).

الشيب والشيرب: المن من لثيران.

١٤٨٩٤ - شَيْبَان * Aneth (F).

هو الشيب، اظلم.

١٤٨٩٥ - شَيْبَان * Demodex (F).

جنس حشرات من الشيديات الجلدية المجهرية. انواعها عديدة تعيش على غدد الشعر وبصيلاته. تتطفل على جميع الحيوانات الضخمية وقد تصيب الانسان فتصيب سقوط الشعر وما لا يطلق من الحكاك.

١٤٨٩٦ - شَيْبَانُ الشَيْبِيلَات * Demodex folliculorum (S).

Demodex folliculorum (F). Demodex folliculorum (E).

نوع من الشيب المجهرية يركب الموائى اجسامها الاقار والافانم وركب الكلاب والسنانير ثفلت شعرا ويطولها ويوطع بها لشد الاذى. وعندما يصيب الانسان يتركز عادة في وجهه.

١٤٨٩٧ - شَيْبَان * Anethum graveolens (F).

Anethum graveolens (F). Anethum graveolens (E).

نبات عشبي مسمر من فصيلة الخيميات. قريب لشبه من الثمار وله يستعمل استعماله في التوابل. اوراقه شتاقية مركبة شطيلة. يستخرج منها ومن البذور زيت طيار له استعماله الطبي || تنقع اوراقه وتجعلون فيه المدة والامام ويعرفون بالغازات ويدعى الاصاب.

١٤٨٩٨ - شَيْبَانُ بَرِّي * Meum athamanticum (S).

Meum athamanticum (F). Meum athamanticum (E).

نبات عشبي بري طلي مسمر من فصيلة الخيميات. جلور وصاله اوراقه وبزوره قديم المدة وتبقى القلب وتعرف الغازات وتبقى الفواكه. يستخرج من جميع اجزائه زيت طيار نافع له استعماله الطبي.

١٤٨٩٩ - شَيْبَان * Geophila (S).

Geophila (F). Geophila (E).

جنس دويبات مغرقة من فصيلة الشيدانينات. انواعها عديدة اجسامها مبطلة بيقة مستطيلة مركبة من ضرات الخلفات. جراسها تد من ٤٢ الى ٧٣ زوجاً لكل حقة زوج. اصطناعها العالم. تألف الارضية الرملية. تعيش تحت البيل والصلاب. تسرح في الليل. فواكهها فسفورية مسية. انفاها مسية. قربها الخارطين والجدان. تعتبر من الدويبات الفاسدة لانها تنقسم الجزر والسياروت.

14916 - **شَبَن** - Engraissement (F). Fattening (E).
علف البواش لتسمينها. وهي عملية اقتصادية ترتكز
على قواعد تقنية وريقة الارتباط بالناسر الغذائية المختلفة
للمفاهيم التي تحموا الاكلات من الاعشاب الى الحبوب.

14917 - **شَبَنَم** & **كُزُور** - Casarius (S).
Casuar (F). Casowary (E).

جنس طير من الشبنيات قريب الشبه من النعام. انواعه
٦ جميعها كبيرة الجثة. كناية الرأس ، جالسة المتاد ،
قصيرة العنق ، زغبية الريش. عملية الاطوار الزاوية
الاولان. ذكورها واناثها تتصل بالثوب نفسه بين ميزاتها
ان الذكر يحضن البيض دون الانثى || اصطناع بلاد
الهند وبيراروا. يأنف الثبات الكثيفة وضفاف الأنهر
الدقة. قوته الحشرات والمظاء والضفادع.

14918 - **شَبَنِيَّات** - Casuaridae (S).
Casuaridae (F). Casuaridae (E).
فصيلة طيور من البرادي قريبة الشبه من النعام الا انها
اصغر قفاً واقل صفاً. تتميز بقناتها الكناكية،
بمناخها الجالسة ، بامتصاصها الصغيرة ورياحها وريشها
اللامع. جميعها شبيقة الخلق تقود وحقوق.

14919 - **شَبَنَة** - Cuivre jeune (F). Brass (E).
هو النحاس الاصفر.

14920 - **شَبَة المعدن ، معدنيدي ، فلزات** - Métalloïde (F). Metalloid (E).
اشياء المعادن مواد بسيطة تتميز بقلة اخصائيتها الحرارية
والكهروية ، كما تتكاثف مع الاكسجين الحارص
والاكتيدات الاكتملة.

14921 - **شَبَة الشفاح ، الشفاح حكمي** - Quasi-usufruit (F).
صيغة فقهية معناها الانتفاع بالممتلكات وعلى المستمع
الذي استهلكها او باعها فربما ان يرد امثاله وزناً وصفة
ومثلاً حين زوال الانتفاع.

14922 - **شَبَة حياكة ، حياكة حكمية** - Quasi-possession (F).
هي حيازة حق ارتفاق.

14923 - **شَبَة قَلَوِي** - Alcaloïde (F).
Alkaloid (E).

مادة عضوية ازوتية تستخرج غالباً من بعض النباتات
التامة لتناثبات القلوة. راجع قلويد.

14924 - **شَبَهَان** - Laiton (F). Brass, Latton (E).
هو النحاس الاصفر.

14925 - **شَبَهَان ، صَمُور** - Pallurus (S).
Pallure (F).

جنس اجمار وبشبات شاكدة من فصيلة الشبقيات.
انواعه عديدة تملو من مرتين الى ١٥ م. انها كيفة
مراكبة. اوراثها متصقة ، معقة ، بيضية النصل.
انزعاجها عنكولي التسجيع ، ابطي الانزكاك. انزعاجها
صغرة الله صفراء اللون. ثمارها قمية الشكل ، مرتفعة
الاطراف المحضة. يقال انها لا تملو من المنافع الطبية.
اشهر انواعه الشبان الشالك.

14926 - **شَبَرِي** - Amentiforme (F).
Amentiform (E).
ما كان شكله شكل الشبرية.

14927 - **شَبَرَم** - Euphorbe ptyssa (F).
هو الشرب من النباتات الجحالية المؤذية ، اطلبه.

14928 - **شَبَرَمَة** - Vague hémipère (F).
حشرة مؤذية من الجليات تنمى فلقوس ، اطلبه.

14929 - **شَبَرَة الطول** - Renouée des oiseaux (F).
هو البطاط ، اطلبه.

14930 - **شَبَرَط** - Persicaire indigotier (F).
هو البطاط النيل ، اطلبه.

14931 - **شَبَر** - Polydesmus (S).
Polydesmus (F). Polydesmus (E).

جنس دويبات من فصيلة الشبريات. انواعه المروقة
خمس اجسامها مبطلة مستطيلة مركبة من ٢٠ حلقة
مضروبة الفواصل. طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم.
تألف الخدائق والياقل. تميش تحت المبل مكررة كالحاتم.
قرباً المولد البتائية. تسرح في الليل تقضم الجزر ويأثر
البيل الرنصة.

14932 - **شَبَرِيَّات** - Polydesmidae (S).
Polydesmidae (F). Polydesmidae (E).

فصيلة دويبات من الشبقيات الشفويات الاربل ،
اجسامها وانواعها عديدة اشهرها الشبتر.

14933 - **شَبِي** - Nymphomania (F).
Nymphomania (E).

هو الانفعال والقلعة يمد الى مهبان الشفر واستمرار حالة
الوفاق في الانثى.

14934 - **شَبِي** - Turgescence
انتفاخ وتور في الوجة يصلها ويزيدها حبساً.

14935 - **شَبَكَة** - Filet (F). String (E).
هي المبرقة تصاد بها الاسماك.

14936 - **شَبَكَة رِي** - Canalisation, Réseau de canaux (F).
مجسمة الانية في كثرن الري في مزرعة او منطقة او بلاد.

14937 - **شَبَكِيَّات الاجنحة** - Raphidiopères (F). Raphidiopere (E).

رتبة حشرات نافذة من طبقة حصبيات الجناح. تشمل
فصيلة واحدة وبشبات صبيبة كالحشاه الرقيق ينفذ
متوسطة القدة ، وروثها نافذة ، بجناثها مستطيلة. وهي
من الحشرات النافذة للآفة في دورها البري والحشري.

14938 - **شَبَكِيَّة** - Rétine (F). Retina (E).

احدى طبقات العين الداخلية تأتي بعد القرنية والقرنية.
تتكون من وحدات صبيبة تبدو كالحشاه الرقيق ينفذ
سلح العين الباطني. مركزها وراء البصلة وهي تستقبل
الاشعة الضوئية فتنتقل عليها المزيقات التي تنقلها شبكة
الاصباب الى الشبكية البصرية بالمخ.

14939 - **شَبِل** - Lionceau adulte (F).
Adult young lion (E).

ولد الامة اذا ادرك السيج احبال وشبال.



شَبَرَم



شَبَر



شَبَن



شبهان شائك



شيرة سرطانية



شيرط



شيمة



شيط



شبكة

١٤٩٣٥ - شبهة - وشيلة الابنية

Segestria (S). Ségestrie. Araignée des caves (F).
Cellar spider (E). Kellerkrippe (D).

دورية من المنكبات الساعية القاصدة ثنائية الرايا مادية الشان من فصيلة الشيشيات || جسمها مشوط القذ يطول نحو ١٦ م. عند الذكر ونحو ٢٨ م. عند الانثى. صدرها مسطلي الشكل، اسمر اللون، بنسجي الملوح. عيناها زجاجيتان. شفها ظفان حليمان. فكها عجلان. جرابها شطية، كتيبة الحلب. بطنها بيضي الشكل، اسود اللون، بنسجي الملوح || تألف الكهوف والمغاور والاقبية والقنان والسكن الارضية. سرسها جديري. عذوها حكة قراية الشكل تسجها في الشقوق. قوتها الحشرات تسمى اليها بصره مدقة || لسبها ملحة مؤذية تسبب حى غليظة تستمر نحو ثلاثة ايام.

١٤٩٣٦ - شيط

Xanthium (S).
Xanthium, Lampourde (F).
جس نياتت عشية يرية حويل من فصيلة المراكيات انواعه || اوراقها متمانية، مدقة || مغرسة التصل للمنسج السفلى. ازهارها عذوكية التبيج، محورية الاذنكاز. منافسها الطبية عديدة تدخل في طب مستطورات وتراكيب لغير انواعها الحلي والسي.

١٤٩٣٧ - شيط حطلي، كور الصيد

Xanthium abyssinicum (S). Xanthium abyssin, Lampourde d'Abyssinie (F). Burdock, Cockle-bur (E). Spitzklette (D). Lappola (I).
نوع من الشيط. مهد بلاد الحيف. منافسها الطبية عديدة احصاها الامراض الجلدية.

١٤٩٣٨ - شيط سمي

Xanthium strumarium (S). Lampourde des écrouelles, Petite bardane (F). Lesser burdock, Burrweed (E). Echte Spitzklette (D). Lappe, Lappolone, Xanto. Bardana minore (I).
نوع من الشيط اللبلل مهد البلاد المعتلة الحرارة يكثر في الاماكن المتوسطة الرطوبة. يستعمل في معالجة داء الحنازير.

١٤٩٣٩ - شيط، صبر

Tuyas de pipe (F).
هو قصبة الفلين من اي مادة كانت.

١٤٩٤٠ - شبك

Amaryllis
هو الاناريلس، اعطب.

١٤٩٤١ - شبكة

Nassa (S).
Nassa (F).
جس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربل وفضلة الشيكيات. انواعها الماصرة المعروفة عديدة منتشرة في مظر بحار العالم. جميعها شطية تعيش حل الكشعاف والرمال المصورة بالاء || اصداها شبهة بالسلال الشبكبة المتصلة للصب. جميعها مغزلة الاغواق القدرية، متباينة المظهر الخارجي، منها المالسة والمخرزة واهدة والمخرزة || اجسامها كيرة. رؤوسها مسطحة، مسترسمة، ثنائية القياس المستطيلة المعينة القواعد. احطائها انبوية مستطيلة. ارجلها قارئة ثنائية الاذنيات الصغيرة الطرفية الاذنكاز.

١٤٩٣٦ - شبهان شائك، صغور شائك

Pallurus aculeatus, P. spina-Christi (S). Pallure épineux, Epine du Christ, Argolou, Porte-chapeau (F). Garland thorn, Christ's thorn, Jerusalem thorn (E). Södllicher Stechdorn, Christdorn (D). Palluro, Spina di Christo, Porto capello (I).
نوع من الشبان الكثير الشوك المركب المسطلي الاعف. جسنته تملو نحو ٣ امار. يستعمل في السياجات. سياجه لا يشم. يعيش في جميع الارضية الزراعية ولا يخشى الرطوبة.

١٤٩٣٧ - شبوب
هو من البقر والغنم والماعز ما تم نحو واكتست اسناته. ويقال له شبوب.

١٤٩٣٨ - شبوة

Chellifer (S).
Chellifère, Scorpion des livres (F). Chellifer (E).
جس مشرط ثلثة من العنارب الكاذبة تعيش في البيوت وفي شقوق الاخشاب اليابسة قوتها الحشرات الصغيرة اعصها التي تفرس الاوراق والنبات.

١٤٩٣٩ - شبوة سرطانية

Chellifer caneroides (S).
Chellifère canéroïde, Scorpion des livres (F). Book scorpion (E). Bücherskorpion (D).
نوع من الشبوة، دورية من فصيلة الكرنشيات ودية القربيات الكاذبة. موطنها جميع اصقاع البلاد الحارة والمعتلة الحارة من العالم الاقدم || جسمها صغير القذ يطول من ٤ الى ٦ م. قوتها الى السمرة الخفيفة. صدرها مزوئي. مقبها مسطليان شيتان عجلان كلقت كلقت المقارب. بطنها عادم اللذب. عيناها مركبتان صغرتان. جرابها دقيقة مسطلي || تألف الموالع المظلمة والبيوت الآلة والمخرزة. تعيش بين الاخشاب وفي شقوقها. قوتها الحشرات الصغيرة اعصها التي تفرس القباب والورق || تعتبر من الدويبات النافعة اللامؤذية.

١٤٩٤٠ - شبوط، سبوت، سبوت

Cyprinus (S).
Cyprinus carpio (S). Carpe (F). Carp (E).
جس اسماك مأكولة من فصيلة الشبوبات. انواعه عديدة مسطها من اسماك المياه العذبة. جسها كيرة القذ طولها يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. تتميز بفسخامة وسطها، ودة ذنبها وقصر رأسها ولين زانها ورواحها كنها الاصل. قوتها الاخشاب المائية. تعيش وتتكاثر في المساك البسيطة النور.

١٤٩٤١ - شبوبات

Cyprinidae (S).
Cyprinidae (F). Cyprinidae (E).
فصيلة الشبوبات من رتبة مفتوحات اللسان. تشمل عدة اجناس اشهرها الشبوط والبيس والمطوقة.

١٤٩٤٢ - شبقيات، شوقيات

Nyctaginaceae (S).
Nyctaginaceae (F). Nyctaginaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجنتها وانواعها عديدة اشهرها شب الليل والبوتفيلية والابروية.

١٤٩٤٣ - شبيدع

Scorpionnet (F).
Young scorpion (E).
صغير الشبوع والقرب.

١٤٩٤٤ - شبور

Jabiru
هو الكبير، اعطب.

Calypso ١٩٥٢ - شجاعة ، كليبتوسبوره *
جنس شجر مجهرية من فصيلة الشصيات . انزاهه قليلة
تتميز بدعماطها الحليمة اللون ، المستطيلة الوثيرة ، الشفوية
الانقسام ، الثنائية أو الرباعية الاضية || اما دعماطها
فتتميز وتكثر على الخلايا الدامية اغصانها خلايا الاوراق
والنواحي .

Calypso ١٩٥٣ - شجاعة الشصام *
Calypso gossypiflora, Aecidium colum-
nare (S). Rouille de l'airelle (F).

شجر مجهرية يتطفل على الثمام فيسلب الاوراق ويؤذي
النواحي . وهو من الفطور التي تقضي طورها الايدي
على الثوب وتتطفل بطورها النواحي على الثمام || ظهور
الخارجي اصفرار في الاوراق يقفه اصطالة في النواحي
ثم جفاف في السماء وسلاية في الايات تؤدي الى احتلال
الانزاه النشوي تتسقط الاوراق قبل زمن الاحمال وتبين
النواحي قبل اكمال دورتها الحولية || يكالغ باستعمال
مركبات النحاس .

Plant (F). Silp (E).
١٩٥٤ - شجاعة
هي كل نبت جديدة ستفاد الجلود يمكن نقلها وغرسها
في مستقرا . ج شتلي .

Hiémal, Nival (F).
١٩٥٥ - شتوي
Hiémal, Nival (E).
لست تعرني يطلق على كل نبات ينمو ويؤثر في الشتاء .

Plantule (F).
١٩٥٦ - شجاعة ، نيتية
Young slip (E).
كل شجة في زمن النشوء الاول قبل ان يجرى اتلاصها .

١٩٥٧ - شت
لث شجر مثل التخلع الصير . طيب الريح . مر العلم .
يدخل بوفرة وهو كوروك الخلاف . وله رمة مودة وسنة
صلوية فيها ثلاث حبات او اربع سوي مثل الشنيز يرماه
الحمام اذا انتثر . واحدة شة (السان) .

Abelle ouvrière (F).
١٩٥٨ - شت
Working bee (E).
هي النحلة العاملة . ج شحات .

١٩٥٩ - شجاعت
هي السادة ، اطليا .

Arboriculteur (F).
١٩٦٠ - شجارت
Arboriculteur (E).
ال عالم المشتل بالبحث عن احوال الشجر (ابن البطار) .

Dendrologie (F).
١٩٦١ - شجاعة *
Dendrology (E).
علم يبحث في هوية الاشجار وتصنيفها وتقسيمها .

Echle carinata (S).
١٩٦٢ - شجاعت
هو الورد ارض عظيمة ضمة الرأس دقيقة المتق رشاه
كدهاء اذا غشيت ولسان غلفها انفتحت . اصلاها
البلاد الحارة تكثر في اواسط افريقية وفي الصحراء العربية
وفي اليمن .

Hydra femella (F).
١٩٦٣ - شجاع اثني
Hydra (E).

الشجاع الاثني كوكبة نجوم جنوبية المخفج مركزها تحت
الفراب والباطية والمسداس ووقو بروج السرطان والاسد

Nassidae (S).
١٩٦٢ - شجيات *
Nassidae (F). Nassidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاصل .
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من مستحبات
الاراضي المائية والبعض الآخر منتشر في سطح بحار
العالم || جميعها واجبة تعيش على جيف الحيوانات البحرية ||
اصداها مشابهة الاشكال ، يكثر فيها الشكل القلبي
المستطيل الطرف اللرب . جميعها ملونة ، بعضها مائل
الصفحة والبعض الآخر مسطح او محز أو عضد ||
اصناف اجناسها واشهرها الشكية .

Hiver (F). Winter (E).
١٩٦٣ - شجاعة
احد اصول السنة الاربعة يبدأ عصا تكوين الشمس في
ذروة بعدها من الست وهو يوم ٢١ كانون الاول في
نصف الكرة الشمالي ويمتد الى ٢١ آذار || وهو يتبع:
١- بقلة سقوط الامطار باستثناء مناطق حوض البحر
المعتدل .
٢- بقلة الفتر لا سيما عند الاتهام من خط
الاستواء وعند الارتفاع من سطح البحر .
٣- بكثرة الثلج
واستباب الجليد في المناطق الشالية .
٤- يسكن الطبيعة
واعمال الاجلار الشفوية وبيات الحيوانات والحشرات
لمستكة وبهجرة الطيور القواطع الخ .

Hibernal
١٩٦٤ - شجاعي
لست تعرني يطلق على ما هو مختص بقسط الشتاء .

Défectuosité, Malformation (F).
١٩٦٤ - شجور
Defect, Malformation (E).
يقال ثمار لا شتر فيها اي لا حبيب فيها .

Entropion (F).
١٩٦٦ - شجور داخلي
Entropion (E).
عارض قوامه تغير حالة النسي واثقابه من الخارج الى
الداخل .

Cetace (S). Cétacé (F).
١٩٦٧ - شجرات
جنس نباتات سرخسية من فصيلة البساجيات . انزاهه
مدينة يكثر ويوجد في المراتب الرملية بين الصخور ومليا .
اشهر انزاهه الشراخ المخرني .

١٩٦٨ - شجرات كهنزي * ، حقيفة الذهب
Cetace officinarum (S). Cétacé officinal, Dru-
rade (F). Scale fern, Scaly spleenwort, Rusty-back
(E). Echter Volfarn (D). Cetace, Cetaceae, Erbe do-
rata (I).
نوع من الشراخ يعيش على الصخور والجدران . يستخرج
منه صباغ ذهبي اللون . يقال ان الثبات يكامله يقيد
السمال ويحل الصغر .

Palmure (F).
١٩٦٩ - شجورة
الشجرة وللشجرة والخطاب واحد . راجع خطاب .

Espace entre 2 doigts (F).
١٩٥٠ - شجورة
التفريعة بين الاصابعين .

Carence (F). Deficiency (E).
١٩٥١ - شجوع
الشجوع هو افتقار الجسم النباتي الى عنصر من عناصر الغذاء
الرئيسية او الثانوية .



شراخ مخزني



شجة الثمام

والبلداء || عدد نجيها ٦٠ والعرب تسمى القرب القلي مل
آخر المقت والقرد ولا تفترده من اشباهه . ولها ثمر آخر
من الرتبة الثانية يسمى « قلب الشجاع » .

١٤٩٦٤ - شجاع ذكر

Hydre melle (F).

Hydrus (E).

الشجاع الذكر كوكبة نجوم اقرب الى الجنوب من الشجاع
الانثى . مركزها بين الطلطان والشبكة والحرياء والطنن ||
عدد نجومها ٢٩ جميعها من المرتبة الرابعة ودونها .

Arbre (F). Tree (E).

١٤٩٦٥ - شجرة

تجمع كل الشجر والاشجار والشجرات . والشجر من النبات
ما قام على ساق وما سما بنفسه دق او جل . يتميز بجلوده
المتفتحة في باطن التربة بطولها ولوح خشية التركيب تستقر
عليها الاضغان والاشناد الترابية || يقال في تصغيرها
شجرة وشيرة . اما الشجر فثبت الشجر . والشجرة ارض
تثبت الشجر الكثير . وهذا المكان اجبر من هذا اي اكثر
شجرا ويقال واد شجير ولا يقال اجبر .

١٤٩٦٦ - شجرة إلهام

Gettiller commun (F).

في الارادة جنبه طيبة مسمرة .

Mamée (F).

١٤٩٦٧ - شجرة الألداء

في الجباس ، اطلبه .

Dorles (F).

١٤٩٦٨ - شجرة الأشقي

في اللوم ، اطلبه .

Clérodendro (F).

١٤٩٦٩ - شجرة البثوث

في البسخة ، اطلبه .

Stercillar (F).

١٤٩٧٠ - شجرة البركاز

في البرازية ، اطلبه .

Orme (F).

١٤٩٧١ - شجرة البق

في البرقما ، اطلبه .

Calodendron (F).

١٤٩٧٢ - شجرة البهاء

في الكالودندرون ، اطلبه .

١٤٩٧٣ - شجرة التوكيب* ، شجرة الزكبيق

Liroidendron tulipifera (S). Liroidendron, Tulipier

(F). Tulip tree, Lyr tree, Saddle tree (E). Echter

cupulbaum (D). Liroidendron, Tulipifero (I).

شجرة مردنية الشكل من فصيلة الفنتليات . مهدا امريك

الشالية . تمل من ٢٠ الى ٣٥ م . اولها ممتدة كبيرة

التصل الرباعي او السلسبي التضميس . ازهارها عريفة

قرائنة كبيرة القذبة تشبه التوليب ، ولها الى الصفار الاخضر .

خشبها لاص الرقة ، خفيف الوزن ، تبي اللون ، مرغوب

له || ازهارها ينتشر من اوائل حزيران الى اواخر تموز .

١٤٩٧٤ - شجرة التيس

في الهيرطاريقون اللتن ، اطلبه .

١٤٩٧٥ - شجرة التلج

في زهرة التيسك ، اطلبه .

١٤٩٧٦ - شجرة الجراد

في الرويدية السلية ، اطلبه .

١٤٩٧٧ - شجرة الجرج

في اللوس ، اطلبه .

١٤٩٧٨ - شجرة الجيال

في غافور الجبال ، اطلبه .

١٤٩٧٩ - شجرة الجين* في ارض حليا ، اطلبه .

١٤٩٨٠ - شجرة الحرير

في الصقلاب السوري ، اطلبه .

١٤٩٨١ - شجرة الحليث في الانجلان ، اطلبه .

١٤٩٨٢ - شجرة الحشاش*

Oxydendron arboreum, Andromeda arborea (S).

Oxydendron in arbre, Arbre à Foselle (F). Sorrel

tree, Sour-wood (E). Sauerampferbaum (D). Albero

ossalide (I).

شجرة سربية وزينية من فصيلة الخلجيات . مهدا

امريكة الشالية . تمل من ١٥ الى ٢٠ م . اولها

حاشية العلم ، عابطة ، متعاقبة . نصلها ايليبي

للشكل ، مسن الحلقة ، جميل الخضار اللامع . ازهارها

ملقي للتجمع ، تاجي الازكاز . ازهارها جلجلية ،

مستطيلة ، تحلة البشرة ، يضاء اللون || ثمرها واروفا

غضائية ، صلبها اسود .

١٤٩٨٣ - شجرة الحمص

في المشران الكبير ، اطلبه .

١٤٩٨٤ - شجرة الحنيكة في انيريا الشرقية ، اطلبه .

١٤٩٨٥ - شجرة الخبث في الجاكا ، اطلبه .

١٤٩٨٦ - شجرة الدكن في البلق السهل ، اطلبه .

١٤٩٨٧ - شجرة الرهبان في البسخة ، اطلبه .

١٤٩٨٨ - شجرة الريندة في باسة السن ، اطلبه .

١٤٩٨٩ - شجرة الزكبيق

Liroidendron

في شجرة التوليب ، اطلبه .

١٤٩٩٠ - شجرة الساعو في الساغية ، اطلبه .

١٤٩٩١ - شجرة الساء في الانطس ، اطلبه .

١٤٩٩٢ - شجرة السمين في شيراء الحاملين ، اطلبه .

١٤٩٩٣ - شجرة السيوك في الازك ، اطلبه .

١٤٩٩٤ - شجرة السوس في السوس ، اطلبه .

١٤٩٩٥ - شجرة الشحم*

Stillinga sebifera, Sapium sebiferum (S). Scillingie,

Arbre à suif (F). Chinese tallow tree, Vegetable tal-

low (E). Chinesischer Talgbaum (D). Albero del

sago, Sevo vegetale (I).

شجرة صناعية من فصيلة التريجات تكثر زراعتها في بعض

المناطق الشرقية والامريكية . يستخرج منها شحم نباتي

ماكول يحفظ بعض الزيت لانه لا يتأكسد بسرعة .

١٤٩٩٦ - شجرة الشمع في الشمية ، اطلبه .

١٤٩٩٧ - شجرة السابون في الرينة ، اطلبه .

١٤٩٩٨ - شجرة الصنغ الاناثو

في البكا ، اطلبه .

١٤٩٩٩ - شجرة القرب في القيق الحقل ، اطلبه .



شجرة التوليب



شجرة الحامص



شجرة الشم

Arbuste (F). Bush, Shrub (E). **شَجِيرَة** ١٥٠١٩
هي من النبات كل شجرة صغيرة لقد تملو الجنبه ولا تترك
الشجرة .

Braiment (F). **شَحَاج** ، شَحِيج ١٥٠٢٠
صوت البتل والحمار .
Bry of an ass (E).

Onagre (F). **شَحَاج** ١٥٠٢١
حار الوحش . اطلبه .

Etiage (F). **شَحَاج** ١٥٠٢٢
هو البروش ، اطلبه .

شَحَارِيَات ، شَحَرِيَات ١٥٠٢٣
فصيلة نباتية تعرف بالسحليات ، اطلها .

Déchaumage (F). **شَحَب** ، فُحَاح ١٥٠٢٤
Digging up the stubble (E).
في الحراثة السطحية التي تعقب الحصاد القاية منها تهرية
التربة واقتلاع الجذام وطمره .

شَحَر ١٥٠٢٥
الشجر والشمرة : الشط الصيق ويجري للماء في بطن الوادي .

Turdus (S). **شَحُرُور** ١٥٠٢٦
Merle (F). Black bird (E).

جنس طير من القواطع وخصية الشحور هو ، أنواعه
عديدة تتميز بأصواتها الخرجة التعريد ، بعضها المستديرة
وبأصواتها البقية المستطيلة التي تتكلم في الانفعال
على الأرض بسهولة كلية || فويتا الحشرات والتبدان
والآثار . تألف الحدائق والسيجات والأفلاك وأحراج الصنوبر
والسنديان . تكثر في الأشجار . ألتها تبيض من ٤ إلى
٦ بيضات تحضنها بمناولة الذكور نحو أسبوعين . أشهر
أنواعه ما يلي .

Turdus merula (S). **شَحُرُور أُسُود** * ١٥٠٢٧
Merle noir, M. vulgaire (F). Common black bird (E).
Amsel, Schwarzdrossel (D).

نوع من الشحور وهو طائر غريد له شتاه وصيفه
دون أن يتكلم من القواطع التي تجرب البلاد . طوله نحو
٢٦ سم . ذكره أسود القرب ، جروني المقار وسوايب
العين . أثناء فصية الظهر ، فيراء البطن الموش بالأسود
والأصعب . مقارنا أسمر || قوته الحشرات والديدان
والحززون والآثار . يألف الحدائق والنباتات . ينش عشه في
الأدغال القليلة الارتفاع .

Turdus aureus (S). **شَحُرُور مُدْهَب** ١٥٠٢٨
Merle doré (F). Gilded black bird (E).
نوع من الشحور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه إلى
الصفراء الذهبية تلبوه رشفة سوداء || يألف الأسراج
والنباتات الكثيفة . ينش عشه في سَم الأشجار .

شَحُرُور مَطُوق ١٥٠٢٩
Turdus torquatus (S). Merle à plastron (F). Ring-
ouzel (E).

نوع من الشحور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه إلى
البردة القصية الملوحة . زوده أبيض اللون || يألف
الحدائق وأحراج الصنوبر والسنديان . ينش عشه في الأشجار
القائمة القليلة الارتفاع .

١٥٠٠٠ - **شَجَرَة التَنَكِيل** هي قرادة الغويان ، اطلها .

١٥٠٠١ - **شَجَرَة التَنَكِيل الكَذِيب**
في التكنيس ، اطلبه .

١٥٠٠٢ - **شَجَرَة التَمَس**
في اسطرافليس نوريس ، اطلبه .

١٥٠٠٣ - **شَجَرَة الكَبْد** ، بُلْدَمُي
Boldoa fragrans, Peumus boldus (S). Boldo, Boldu (F).
Boldo, Wood tree (E). Chilensischer Boldobaum (D).
Boldo (I).

شجرة من فصيلة البنيات منها بلاد الشيلي . أورثها
مروية ، طرية البرف ، طية ، تستعمل في علاجات
الكبد ويستخرج منها مادة صالحة لتكفي بولدين (Boldine)
تستعمل كخشفة وقوية وبخاصة . ثمارها سكرية الطم
مأكولة وهي كالتزهر كذا يشكلا .

١٥٠٠٤ - **شَجَرَة الكَلَب**
في الألبس اللهي ، اطلبه .

١٥٠٠٥ - **شَجَرَة البَن**

Brosimum galeotodendron (S). Brosima, Galeo-
dendron utile, Arbre à lait, Piratiré (F). Cow tree,
Milk tree (E). Milchbaum, Kuhbaum (D). Palo di
vacca, Albero del latte (I).

شجرة من فصيلة القرصيات . منها أمريكية الاستوائية .
منبتها الأماكن الغامضة . تملو من ١٥ إلى ٢٠ م . أورثها
مسقة صناعية ، كبيرة التصل . أنزعها ثنائية للسكن ،
قلبية الصمغ ، ثمارها جراء جلدية القشور ، مأكولة
البروز . يستخرج من ساقها باخر صمارة ليلية تشبه
الكثاء شكلا وتركيبا ، توكال ملائجة ويصنع منها شيء
كالبن .

١٥٠٠٦ - **شَجَرَة الله** في الألبلس ، اطلبه .

١٥٠٠٧ - **شَجَرَة المسَاير** في فروتالا ، اطلها .

١٥٠٠٨ - **شَجَرَة المَطَاط** في المنيية ، اطلها .

١٥٠٠٩ - **شَجَرَة المَعِيد** في المنيكو ، اطلبه .

١٥٠١٠ - **شَجَرَة المَلَل** في الصوم ، اطلبه .

١٥٠١١ - **شَجَرَة المَيْحَة** (F). Liquidambar à styrax
في الشبر السماع الأمريكي ، اطلبه .

١٥٠١٢ - **شَجَرَة التَبَق** في السود ، اطلبه .

١٥٠١٣ - **شَجَرَة الوَلَك** في ايرتليون ، اطلبه .

١٥٠١٤ - **شَجَرَة غَبُور المَرُور** في البوياب .

١٥٠١٥ - **شَجَرَة لِسَان المَصْفُور**
في المزان ، اطلبه .

١٥٠١٦ - **شَجَرَة هَوَّه** في الأزدست ، اطلبه .

١٥٠١٧ - **شَجَرَة مَرَم** في قيصان نبات ، اطلبه .

١٥٠١٨ - **شَجَنَة** Ramification (F).
يجمل عروق الشجر من انغصان وفناد وإنفان وخرايب .



شحور اسود

لورقة تطول نحو ٥ سم. وترعرض ٨ سم. نصلها جيل الحصار الجرم. ثماره صغيرة القذ سوداء اللون || أنثراره يستمر من نيسان إلى أيار.

١٥٠٣٧ - شعشع قريش الورقي

Phillyrea latifolia (S). *Filaria à larges feuilles*, *Phillyrea à larges feuilles* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من ٦ إلى ٨ أمتار. لورقة قلبية الشكل نصلها مستعرض للناخلة، سنن الحافة، ثنائكة. ثماره عنية الشكل ولادة، مقبولة القبة، غمدة الطرف. لونها إلى السرة السوداء || أنثراره يستمر طوال شهر أيار.



شعشع

١٥٠٣٨ - شعشع متوسط الورقي

Phillyrea media (S). *Filaria intermédiaire*, *Phillyrea intermédiaire* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من ٤ إلى ٥ أمتار. لورقة اطليجية الشكل نصلها سنن الحافة عريضة نحو ٢ سم. ثماره عنية الشكل ولادة، جبروة اللؤلؤ || أنثراره يستمر من نيسان إلى أيار.

١٥٠٣٩ - شعشع صيكان

Phillyrea decora (S). *Filaria décoratif*, *Phillyrea décorative* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من متر إلى ثلاثة أمتار. لورقة تطول نحو ١٥ سم. وترعرض ٥ سم. نصلها جلدي التسج الباهت الحصار. ثماره يفسية الشكل. لونها إلى البشقي اللامع || أنثراره يستمر طوال شهر أيار.



شمس

١٥٠٤٠ - شحط

Fienta (F). *Dung* (E).

الشحط : ذرق الماء.

١٥٠٤١ - شيفطار

Cyclopterus (S). *Cycloptera* (F). *Cyclopterus* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشيفطاريات ثلاثيات الزعانف. أنواعه عديدة معظمها من اسماك بحار المناطق المعتدلة الحارة والصحرة نحو الباردة || اجسامها مستطبة الحجم، كروية الشكل، تطول من ٣٠ إلى ٩٠ سم. سوكها بحجمية وبشكلة. رؤوسها مستديرة، قصيرة الاضطام، رفيعة العين، صغيرة الاشدان || ألوانها تختلف مع الأنواع، تكثر فيها الازرق السواد. زعانفها معددة التسج. تحمل في مقدمها بحجمية طباطبة مستديرة مؤلفة من الزعنفتين الحويصيتين المتصقتين، تمكئها من التمسك بالأسل الصخور حيث تكمن راسدة قدم فرانسها || اعرف أنواعه وأشهرها الشيفطارة المتبلولة.

١٥٠٤٢ - شيفطارة متبلولة

Cyclopterus communis, *C. lumpus* (S).

Cyclopterus communis, *Lump*, *Lompe*, *Livre de mer* (F). *Lump-fish*, *Sea-owl*, *Cock-padd*, *Hall-padd* (E).

نوع من الشيفطار. سمكة بحرية بيضاء. اطرافها بعض انحاء البحر الابيض المتوسط والخليج الاطلسي || جسمها يفتحي الشكل، مستطال التسطيط، بطول نحو ٥٠ سم. ويميلون من الرأس إلى الذنب سبعة صفوف من الصل المتناوبة الاحجام. نوبها إلى الزرقا يعطونها تسج ازرقة يسر في التلوه وينير في الجانبين ويعصر في البطن || رأسها مستطال الحجم، مستعرض الشكل، قصير الخلف، صغير الشفق



شيفطارة متبلولة

١٥٠٣٠ - شعوريات

Turdidae (S). *Turdidae* (F). *Turdidae* (E).

فصيلة طيور من الجوارح المشروبات التأثير منها للشعور والسنه.

١٥٠٣١ - شعوريات في السليات، الحلبا.

١٥٠٣٢ - شعشعورة

Mantissa (S).

Mantissa (F). *Mantissa* (E).

جنس حشرات مقترنة من فصيلة الشعشعوريات وربة شارات الاجنحة. أنوعها العريضة نحو ٥٠ سنتيمتر في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || جسمها صغير نحيل مستطيل يفتحي بشكله شكل السرمية. رأسها صغير. عضها عريضة. منابعا بارزتان. زياناها دقيقان. كسلها فيه اثري مستطيل. اجنتها اربعة. جميعها شفافة كثيرة العروق والاصاب. جرائها ثلاثة ازواج منها زوج امامي مخصص للقبض أو القنص وهو كبير القد، ضليع القنوب للمشاري الحافة الداعلية || مكين الرسع السنن الحصار ولدي يتطوق حل مشاعر القنوب انصلاك اللقط || الاثني اكبر قدماً من الذكر. والبرقة مقترنة كالخشرة الجميلة. يقال ان الاثني تنجح المكن في مكاديب الناكب وانصها الحثوف.

اعرف أنواعها والاهرها :

Mantissa pagana (S).

Mantissa palena (F).

التي يكثر ويدها في معظم مناطق البوصلة الباني.

١٥٠٣٣ - شعشعوريات

Mantispidae (S). *Mantispidae* (F). *Mantispidae* (E).

فصيلة حشرات من صيبات الاجنحة وربة شارات الاجنحة. إجناسها وأنوعها عديدة اطرافها بعض الايام البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || تتميز باجسامها النحيلة المستطيلة وبجرائها الامامية الكبيرة المهيمة للقنص. اجنتها شفافة كثيرة العروق. الزوايا تختلف مع الاجناس والانواع || انثاها اكبر قدماً من ذكورها. بعض أنواعها يهرين نحو ٨٠٠٠ مكنة. مكئها اطليجي الشكل مذنب || أشهر اجناسها الشعشعورة

١٥٠٣٤ - شعشع، شعشع

والشمامة والشمامة والشمامة : شاة ذهب لونها كله. وقيل السنية. وقيل التي لاجل بها. وقيل التي لم ينز عليها قنص. ج أحاس وأحس وشعشع.

١٥٠٣٥ - شعشع

Phillyrea (S).

Filaria, *Alavert*, *Aourat*, *Phillyrea* (F). *Mock privet* (E). *Feinlilze Lorbeerlinde* (D). *Filaria* (I).

جنس شجيرات برية وربيونية من فصيلة القريصيات. قريبة القبة بالتم اوراثها ابيدة. صغيرة النصل، متقابلة. انهارها صغيرة، عوروية الارتفاع، ثنائية المسكن، رباعية النصل والرياحات، ثنائية السداة. ثمارها عنية صمينة لونها إلى البشقي الاسود || اجناسها شديدة الصلابة تستعمل في بعض الصناعات || أشهر أنواعها ما يلي.

١٥٠٣٦ - شعشع شبيث الورقي

Phillyrea angustifolia (S). *Filaria à feuilles étroites*, *Phillyrea à feuilles étroites* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من مترين إلى أربعة أمتار

طولاً نحو ٤ سم. تتميز بجسمها القوي الشكل، زعنفتها الشرجية الفارقة وبسيفها الرقيق الكبير .



شذرة

١٥٠٧٦ - شعير
الشعير من أصوات الليل . قال الاصمعي : الشعير من القم والشعير من الشعرين والكرير من الصادر .

١٥٠٧٧ - شعير
صفة التيء لتجهيم المدام الاتجام .

١٥٠٧٨ - شعيل
Diethermans (F).
Diethermic, Diethermanous (E).

نمت شرفني يطلق على كل مادة تغطى الحرارة دين أن تستمر منها .

١٥٠٧٩ - شدة ، قرون ، ريط
Atzel (F).
To put horses etc... (E).

ربط الدواب بالخرور .

١٥٠٨٠ - شذاحة الأزهر *

Salicis floricola, Stizica floricola (S).
Salicique floricole (F). Salicis floricola (E).

دورية من المتناكب الساعية القاذصة ثنائية الرواية سداسية الشاشن من فصيلة الشذاحيات || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٨ سم. الاثنى اكبر كذا من الذكر . صدورها اسود اللون ، احمر الحلب الكثيف . صناعها زعنجان ، شمسها صفيان عريان فكلاهما صفيانيان . جرائدها مسطحة . بطنها بيضي الشكل ، اسمر اللون ، ابيض الزعنجان والزناوين || تألف الخنافس ويجاري الماء حيث تكثر الاضرار . تسرح في النهار تسمى وراء قصها وكذا وقفاً . قوتها الحشرات اعصها التي تنسج في خوات المتناكبين تسمى لما قرب الاضرار || مكنتها بيض في القرة تحفر تحت الحجارة || تعتبر من المتناكب الملية .

١٥٠٨١ - شذاحة تسليق

Salicis formicarius (S). Salicique fourmi, Myrmarchae fourmi (F).

دورية من المتناكب الساعية القاذصة من فصيلة الشذاحيات، جسمها مستدلل القد يطول من ١٢ الى ١٨ سم. الذكر اصفر كذا من الاثنى . صدورها اسود اللون وباهي انفسه البيض . صناعها زعنجان ، شمسها صفيان . فكلاهما مقصان . جرائدها كبيرة كثيرة المتناكب الحلب . بطنها جوي اللون يطول جميع ابيض مقترض || تألف المروج والمراعي . تسرح في النهار . سمها قريب الشبه بصي اثنثة مما دعى الى وصفها به || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والحمام . صكبتها بيض في القرة تحفر تحت الحجارة || ملجئها الحيائي كلين سائر المتناكب . بيائها الشجري لا يتجاوز ١٨ اسبوعاً || تعتبر من المتناكب الثالثة .



شذرة



شذاحة الاضرار

١٥٠٨٢ - شذاحيات *

Salicidae (S).
Salicidae (S). Salicidae (E).
فصيلة متناكب من رتبة الزيزيات . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم انحاء العالم اعصها المظار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || جميعها مقترنة صغيرة القد زاعية الالوان البراقة تسرح في النهار وتحت اثة الشمس . تسمى وراء قصها وكذا وقفاً || أشهر انواعها الشذاحة .

١٥٠١٤ - شعاب هو الحليب ، اطبله .

١٥٠١٥ - شعابيد *

Chrysididae (S).
Chrysididae (F). Chrysididae (E).
فصيلة حشرات من شعابيات الاجنحة المصنوعة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، متصلة الجسم او صغيرة . انوعها زاعية الالوان الازمنة الموج . رؤوسها صغيرة . جلوسها غليظة . بطنها مركبة من اربع حلقات ورجلات ، حارها مسن الحافة . شوارها تتناسل ثلاثي الحلقات ، مدب الاثرة || انثها تتسلل على غلابا التسل والزناوير وقد تحتسكها في جمل الخناوير فيقتف من رقات قفوس الدجبة وتلق الشهه .

١٥٠١٦ - شعابكة * ، هي شعابكة

Tetracosus quadricornis (S).
Tétracore, Ancliole echilars (F).
حويان لويين جيت من الغطاء وحيد الجني والخرج ، موته الحنث || يتميز بصفر جسمه وبقروله الازمنة ، الثان صغيران يطولان العينين وثلاثان متوسلان يطولان الرأس .

١٥٠١٧ - شعابكة *

Diethermanidés (F).
Diethermancy (E).

الشعابكة عامة انفاذ الحرارة المشعة .

١٥٠١٨ - شعفت

Fagot (F). Faggot (E).
هو الجزال حلب دليق .

١٥٠١٩ - شعذب أزرق *

Sellben (S).
Selbe (F).
جنس حشرات من فصيلة الشعذاب . انوعها قليلة تشبه الزناوير . طولها يراوح من ١٨ الى ٢٨ سم. لونها الازرق الغفران الموج . يكثر ويوجد من ابار الى حموز .

١٥٠٢٠ - شعذب لاهيب *

Chrysis ignita (S).
Chrysis enflammé (F).
حشرة من الشعذاب صغيرة القد طولها نحو ١٢ سم. رأسها ويوسها الى الخضرة الزرقاء . بطنها ذهبي اللون يطول موج اعصر . يكثر ويوجد قرب مجاري الماء وفي جوار التسل والزناوير .

١٥٠٢١ - شعشر

Etanponner (F).
To stay, to shore (E).

سنة الاضخان المثرة لثلا تنكسر .

١٥٠٢٢ - شعشرم

Pristipoma (S). Pristipome (F).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرغيات . انواعها عديدة منتظمة من اسماك البحار الحارة || له لومان منمها المتوسط : التكروري والقرقور .

١٥٠٢٣ - شعشش

هي ثنات اليربع اي الحجارة الكلسية الرخيمة (ابن القطار).

١٥٠٢٤ - شعشعل

Filter (F). To filter (E).
نخل الشراب : صفة .

١٥٠٢٥ - شعشوزكة *

Caranx rhonchus (S).
Caranx ronfé (F).
نوع من الشش وهي سمكة مأكولة توجد في المتوسط يبلغ

الحِثَارِ الحَاخِصِي بِالْفَحْصِي أَوْ بِالْأَزْرَقِ || حُومِيَا مُتَوَسِّطَةٌ
الصَّنْفُ : مَأْكُولَةٌ .

Tirant (F). Tie (E).

١٥٠٨٣ - شَدَاد

خَشَبِيَّةٌ أَوْ مَرْزُوقَةٌ يَشَدُّ بِهَا الْبَنَاءُ .

١٥٠٩٢ - شَدَقِيلُ مَرْقُوشٌ *
Schedophilus punctatus (S). Schédophile tacheté (F).
Schedophilus punctatus (E).

نَوْعٌ مِنَ الشَّدَقِيلِ . مَكَّةٌ بِحَرِيَّةٍ يَبْرُوزُ . أَصْلَانِهَا بِحَارِ
الْبِلَادِ الْحَارَةِ أَخْضَتُهَا الْبَرَسُ الْأَخْضَرُ وَبَعْضُ مَنَاطِقِ الْبَرَسِ
الْأَبْيَضُ الْمُتَوَسِّطُ || جَسْمُهَا قَبِيضٌ الشَّكْلُ ، مَمْدُودٌ
التَّعْطِيطُ يَطُولُ مِنْ ١٥ إِلَى ٢٠ سَم. قُوْمَا إِلَى الطَّلْعَةِ
الْقَضِيَّةِ تَعْلُوهَا رَقَّةٌ زُرْقَاءُ تَمْتَدُّ إِلَى الزَّمْعَةِ الذَّقِيلَةِ . ظَهْرُهَا
أَعْيَنُ خَضَابِيٍّ مِنْ جَانِبَيْهَا وَبَطْنُهَا . زَعَاظُهَا الظُّهْرِيَّةُ
وَالشَّرَجِيَّةُ غَضَبِيَّةُ الْحِثَارِ الْحَاخِصِي بِالْأَزْرَقِ || رَأْسُهَا صَغِيرٌ
الْحِجْرُ ، خَدْرُونِي الشَّكْلُ ، قَصِيرُ الْخَطِّ . فِيهَا عُمْدَتَانِ
الْقَلْبُ الْمُتَمَدُّ الْإِنْفِرَاجُ . ذِكَا الْأُنثَى يَقْتَدِمُ الْإِنْفِلَ
بَعْضُ الْبَقِيَّةِ . عَيْنَاهَا كَبِيرَتَانِ ، مَمْدُورَتَانِ ، نَاشِرَتَانِ ||
مَرْسَحُهَا مَعَاذِبُ الْغُلَاقِ الْقَرِيْبَةِ الْفُورِ || لَحْمُهَا مُتَوَسِّطٌ
الصَّنْفُ : مَأْكُولٌ .

١٥٠٩٣ - شَدَن

شَدَنُ الطَّلِي وَجَمِيعُ وَلَدِ ذَوَاتِ الظَّلْفِ وَالْعُفْ : قَوِيٌّ
وَرَحِيحُهُ وَاسْتَفَى مِنْ أَمِهِ .

١٥٠٨٤ - شَدَقِيلَاتٌ *
Membracidae (S).
Membracidae (F). Treehoppers (E).
Buckelszirpen, Buckelszikaden (D).

فَصِيلَةُ حَشَرَاتٍ مِنْ فَصِيلَاتِ الْأَجْنَسَةِ الْمُتَجَانِسَةِ . اجْتَمَعَتْهَا
وَأَنْوَعُهَا الْمَعْرُوفَةُ مُتَوَسِّطَةُ الْبَدَنِ أَصْلَانِهَا مَنَاطِقُ الْبِلَادِ
الْإِسْتِوَائِيَّةِ وَالْحَارَةِ || أَجْسَامُهَا صَغِيرَةٌ ، يَكُنُّ لَهَا الشَّكْلُ
الْخُرْطُولِيُّ . رُؤُوسُهَا وَكُودُهَا مَسْتَوْرِبَةٌ . عَيْنُهَا نَاشِئَةٌ .
اجْتَمَعَتْهَا جُلُودِيَّةُ الْإِسْتِرْسَامِ ، لِاحِفَةٌ ، شَفَافَةٌ أَوْ صَفْرَاءُ
الْوَلَنُ || أَقْرَابُهَا وَاجْتَمَعَتْهَا مَنَاطِقُ الْمَوَاقِعِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا .

١٥٠٨٥ - شَدَانٌ *
Raphicurus (S).
Raphicure, Rhaiphicure (F).

جِنْسٌ حَيَوَانَاتٍ عَاشِيَةٍ بِحَرِيَّةٍ مِنَ الطَّلَاءِ . أَنْوَعُهَا الْمَعْرُوفَةُ
قَلِيلَةٌ الْبَدَنِ . أَصْلَانِهَا الْقَارَةُ الْأَفْرِيْقِيَّةُ أَخْضَتُهَا الْمَنَاطِقُ
الْجَنْبِيَّةُ || أَجْسَامُهَا مُتَوَسِّطَةُ الْقَدِّ ، عِيْقَاءُ . أَنْثَاهَا جَاءَ
الْقُرُوسُ ، ثَنَائِيَّةُ الْإِعْلَافِ . ذَكَوَرُهَا جَالَةُ الْقُرُونِ
الصَّغِيرَةِ الْقَضِيَّةِ . الْوَلَدُ إِلَى الصَّغِيرَةِ الْخَطِيَّةِ تَمِيقُ مَعَ
أَقْرَابِهَا مِنَ الطَّلِي وَتَقَرُّ عَنْ الْبَطْنِ .
أَعْرَفُ أَنْوَعُهَا :

شَدَانُ الرِّيفِ
Raphicure champêtre (F).
Scenbok (E).

شَدَانُ أَسْوَدُ الْأَذْنِ
Raphicure à oreilles noires (F).
Gryabok (E).

١٥٠٨٦ - شَدَخٌ * ، حِمَاذِيَّةٌ لِيْلَةٌ

Hydrotropisme (F). Hydrotropism (E).
مَنْسُجٌ بِسِيرِهِ . الْمَاءُ وَبِحَيْثُ عَدَاهُ . الْمَاءُ يَنْطَشُ شَرَاغُ الْبَنَاتِ
وَأَزْدِيَادُ حِمِّ الْحَلَايَا فَيَسْبِغُ أَجْسَادُهَا فِي النَّسْجِ الَّتِي تَجِبُ
وَقَعِيرًا فِي النَّسْجِ الْمَاكِسَةِ يَنْسُجُ مَعَ أَصْحَابِهَا شَدَخِي .

١٥٠٨٧ - شَدَخٌ هُوَ الْقَطِيفَةُ ، أَطْلَافُ .

١٥٠٨٨ - شَدَخٌ هِنْدِيٌّ

هُوَ الْقَطِيفَةُ الْخَضْرَاءُ ، أَطْلَافُ .

١٥٠٨٩ - شَدَقَّةٌ
Segment (F). Segment (E).
بِجِي السَّكَّةِ ، أَطْلَافُ .

١٥٠٩٠ - شَدَقِيٌّ
Entomozoaire (F).
Entomozoan (E).

نَمَتْ تَرْبِيَّتِي يَطْلُقُ عَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَجْسَامِ
الشَّدَقَةِ .

١٥٠٩١ - شَدَقِيلٌ *
Schedophilus (S).
Schédophile (F). Schedophilus (E).

جِنْسٌ اسْمَاكٌ بِحَرِيَّةٍ يَبْرُوزُ مِنْ فَصِيلَةِ الْإِسْتِمْرِيَّاتِ شَالِكَاتِ
الزَّمَانِ . أَنْوَعُهَا الْمَعْرُوفَةُ قَلِيلَةٌ الْبَدَنِ أَصْلَانِهَا بِحَارِ الْبِلَادِ
الْحَارَةِ وَبَعْضُ مَنَاطِقِ الْمُتَوَسِّطِ || أَجْسَامُهَا صَغِيرَةٌ الْقَدِّ ،
أَطْلِيلِيَّةُ الشَّكْلِ ، تَطُولُ مِنْ ١٢ إِلَى ٢٠ سَم. رُؤُوسُهَا
خَدْرِيَّةٌ ، قَصِيرَةُ الْإِعْلَافِ ، مَمْدُودَةُ الْإِسْتِرْسَامِ . عَيْنُهَا
كَبِيرَةٌ ، مَسْتَوْرِبَةٌ ، نَاشِئَةٌ || أَثْلُوبُهَا إِلَى الرِّيفَةِ أَوْ لَحْلُطَةِ
الْقَضِيَّةِ الْمَوَاجِ يَطْلُوها تَبْقِيحٌ عَمِيٌّ أَوْ رَقَّةٌ زُرْقَاءُ تَمْتَدُّ إِلَى
الزَّمْعَةِ الذَّقِيلَةِ الْبَارِقَةِ . ظَهْرُهَا أَعْيَنُ خَضَابِيٍّ مِنْ جَوَانِبِهَا
وَبَطْنُهَا . زَعَاظُهَا الظُّهْرِيَّةُ وَالشَّرَجِيَّةُ كَبِيرَةٌ الْقَدِّ غَضَبِيَّةٌ



شَدَانٌ

١٥٠٩٤ - شَدَنُ
Cervus (S).
Cérusne, Cerrusne (F). Cervus (E). Carun-
blume (D). Cervana (I).

جِنْسُ نَبَاتَاتٍ حَشِيَّةٍ بَرِيَّةٍ عَظَائِمُهَا مِنْ فَصِيلَةِ الْمَرْكَبَاتِ .
أَنْوَعُهَا قَلِيلَةٌ الْبَدَنِ مَنَبِيَّاتُ الْجَزِيرَةِ وَبَعْضُ الْمَنَاطِقِ الْمَصْرِيَّةِ
وَالْأَفْرِيْقِيَّةِ . سَوَاطِئُهَا وَفَرْوُهَا مُتَمَتِّعَةٌ مَتَوَرَّةٌ ، نَوْرَسًا
كَالْيَاسْمِينِ .

١٥٠٩٥ - شَدَقِيَّةٌ *
Scaevola (S).
Scévole (F). Scaevola (E).

جِنْسُ نَبَاتَاتٍ جَنْبِيَّةٍ مَعْمُورَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْوَلِيَّاتِ . مَعْدَهَا
إِسْتِرَائِيَّةٌ . سَوَاطِئُهَا مُتَمَتِّعَةٌ صَلْبَةٌ تَعْلُو مِنْ ٥٠ إِلَى ٧٠ سَم.
أَوْرَاقُهَا مُتَمَتِّعَةٌ مُنْتَفَعَةٌ . أَزْهَارُهَا يَبْضَاءُ الْقَلْبَ . كَوْرُسُهَا
وَتَوْرِيخَاتُهَا خَاسِيَّةُ الْفُلُقِ الْمَشْقُوقَةِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَنَبْذُو
كَأَنَّهَا شَدَقَاءُ || أَنْوَعُهَا الْمَعْرُوفَةُ الْقَلِيلَةُ الْبَدَنِ ، أَشْهُرُهَا
الْبَنَائِيَّةُ :

١٥٠٩٦ - شَدَقِيَّةٌ صَغِيرَةٌ الْوَرَقِ *

Scaevola attenuata (S).
Scévole à feuilles atténuées (F).

نَوْعٌ مِنَ الشَّدَقِيَّةِ . سَوَاطِئُهَا تَعْلُو مِنْ ٥٠ إِلَى ٧٠ سَم.
أَوْرَاقُهَا سَنَائِيَّةٌ تَطُولُ مِنْ ٥ إِلَى ٨ سَم. نَصَالُهَا مَسْنُونَةٌ
الْحِثَارُ . أَزْهَارُهَا يَبْضَاءُ الْقَلْبَ تَطُولُ نَحْوَ ٢ سَم. كَوْرُسُهَا
شَارِقَةٌ مَسْتَوْرِبَةٌ الْفُلُقُ || تَنْوِيرُهَا يَسْتَمِرُّ طَوَالَ شَهْرِ
سَبْتِيزَانِ .

١٥٠٩٧ - شَدَقِيَّةٌ عِطْرِيَّةٌ *

Scaevola suaveolens (S). Scévole odorante (F).

نَوْعٌ مِنَ الشَّدَقِيَّةِ . سَوَاطِئُهَا تَعْلُو نَحْوَ ٩٠ سَم. أَوْرَاقُهَا
أَطْلِيلِيَّةُ الشَّكْلِ تَطُولُ نَحْوَ ٨ سَم. نَصَالُهَا سَبِيحُ الصَّنْفَةِ ،
تَمْتَدُّ التَّسْتِينِ الْحَاخِصِي . أَزْهَارُهَا يَبْضَاءُ الْقَلْبَ ، طَوَافُ
نَحْوَ ٢ سَم. قَطْرُهَا نَحْوَ ٣ سَم. طَرِيَّةُ الرَّمْلِ الْمُتَمَتِّعِ ||
تَنْوِيرُهَا يَسْتَمِرُّ طَوَالَ شَهْرِ آبِ .



شَدَقِيلُ مَرْقُوشٍ



شليم



ذئابة لاسعة



ذئابة مبالغة



شراة ارامي



شريس

اورقها ابيدة ، متعاقبة ، معققة . تصلها اعليجي الشكل
مسن الحلقه . انزهارها ابيطة الاكثر ، قردية التجميع ،
طويلة الزناد ، رباعية او خماسية البتلات البيض . ثمارها
عنينة الشكل حراء اللون ، قطرها نحو ٧ سم .

١٥١٠٩ - **شروك** هو الللى السنة ، اطبا .

١٥١١٠ - **شروكة** Etinoelle (F). Spark (E).

ما يتطاير من النار . ج شرار وشرور .

١٥١١١ - **شريس** Dextrine
هو الكستين ، اطبا .

١٥١١٢ - **شراكة**

Rhizographie, Rhizologie (F). Rhizology (E).

الشرافة علم يبحث في تركيب جلود النبات وفي تحليلها
وظائفها .

١٥١١٣ - **شريس** Valliforme (F). Velliforme (E).

لمت تعريفي يطلق ، في علم التاريخ الطبي ، على ما
هو شكله كالذراع .

١٥١١٤ - **شراكة ، شراكة** Collectivité (F).

Collectivity (E).
صفة ما هو مشترك . يطلق على الجماعات والفتات .

١٥١١٥ - **شران**

حرام كالبيض تكثر قرب الماء ، تنشئ وجه الانسان
ولا تمس . الواحدة شرانة .

١٥١١٦ - **شرايف** سلخ الحية اذا قتله .

١٥١١٧ - **شربة**

Plinche basse (F).

Low between (E).
هي السبكة المنخفضة التي يتم فيها بناء الجبر . ج شرب
وشربات .

١٥١١٨ - **شربة**

Purge.
هي الدواء المسهل الذي يطلق البطن . اشهر الشربات
البطرية : سلفات الصوديوم وسلفات المنيوم وزيت الخروع .

١٥١١٩ - **شريس**

Cirrhobarbis (S).

Cirrhobarbis (F).
جنس اسماك بحرية من شالكات الزعانف وعضلة
القرويينات . انواعها المبرقة قليلة العدد اصطناعا بحار
الجنوب الافريقي . اجسامها مسطوية الشكل ، مسطحة
الظهر ، رؤوسها مخروطية ، صغيرة ، اذنانها العليا
والسفل مجزأة بولوس دقيقة . جوفها ناشرة . زعانفها
الظهرية قاطبة . الصدرية والحوضية صغيرة . التربيعة
مسطحة . الذيلية شبه مستقيمة . اقلها وردية اللون فنية
للوان . جوفها مأكولة ، معققة الصف .

١٥١٢٠ - **شريليل** Kleinia (S). Kleinia (F).

جنس نباتات عشبية او خشبية من فصيلة النرجس
انواعها عديدة منتشرة في معظم اسواق العالم . اوراقها لحية
النصل ، سنائية الشكل ، متعاقبة . ورياسها الزهرية
حادة اللبدينات والكميات يطلقها سف من القنابات .
يؤدورها مجزأة بقنابات خضراء . اعرف انواعها واشهرها
ما يتبع .

١٥٠٩٨ - **شديم** * ، **قرد الغروب**

Pithecius inuus (S). Magot (F).

قرد وسيد الجلس والنوع من فصيلة الرئيسات . موطنه
بلاد المغرب . جسمه قصوري الشكل بطول نحو ٧٠ سم .
ويرتفع من ٤٠ الى ٥٠ ، ثوبه الى البصرة الصفراء اللامع .
رأسه وعصره الى البصرة المابتة . بطنه الى البياض اللامع .
ذنبه جلدة . يعيش على الاشجار وبين الصخور . قوته
الاعشاب والجلود والثمار .

١٥٠٩٩ - **شداكة**

Glossina (S).

Glossina (F). Glossina (E).

جنس حشرات من فصيلة الذباب تنقل الى الحيوان الذي
تسكنه طائفة من الامراض الطفيلية الخبيثة المؤذية . انواعها
مديدة ، موطنها المناطق الاستوائية وجوارها .

١٥١٠٠ - **شداكة لاسعة** * ، **زيمب** ، **ذبابكة**

Glossina moritans (S).

Glossine mordante, Mouche tsé-tsé (F).

Tsetse (E).

اخذت انواع الشداكة واكثرها انتشاراً تسكن الانسان وتسبب
له مرض النوم وتلسخ الخيل والابل ويقرق قتلها .
موطنها مستعمرات افريقية الاستوائية والوسطى .

١٥١٠١ - **شداكم** Dard (F). Sting (E).

حقنة الغروب والذبور والتملة الخ .

١٥١٠٢ - **شداكم** ، **صبري** Smarts (F). Picarel (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة اللؤلؤيات ، اولاه حديد
اصطناعا بحار البلاد الحارة والمعتدلة . اجسامها اعليجية
الشكل . اعطائها مخروطية مسطحة الاطراف . فتحاتها
عامة التنتين . زعانفها الظهرية وسيدة مسطحة . زعانفها
الشرجية مازقة . اشهر انواعها الشداكة المبالغة ، اطبا .

١٥١٠٣ - **شداكمه صيدولة** * Smarts vulgaris (S).

Picarel commun, Jaret, Gerrat (F).

نوع من الشداكم وهي سمكة مبالغة في المتوسط . طولها
يروح من ٢٤ الى ٢٦ سم . ثوبها لفي اللون حتى
التجزيع والتشويح يسر ويمنع مع اقترابه من ليج الظهر .
سرعا يسير على شكل مروحة . لحمها معققة الصف .

١٥١٠٤ - **شداو** Paillettes d'or (F).

Grain of gold-dust (E).

الشداو : قطع من الذهب الطبيعي لا تزال على حالتها
البدائية . والذوا : اللؤلؤ الصغير . الواحدة شداو
ج شلوات وشلور .

١٥١٠٥ - **شداو** Anomalie (F). Anomaly (E).

هو الاضداد من السلك النظامي المأثوب .

١٥١٠٦ - **شرا** هو الاحتياج ، اطبا .

١٥١٠٧ - **شرايب** Strop (F). Syrup (E).

كل صير سكري العظم يستحب العرب .

١٥١٠٨ - **شراكة ارامي** Nemopanthos (S).

Némopanthos (F). Mountain holly (E). Berghulst (D).

Nemopanto (I).

جنس نباتات برية وثرثبية من فصيلة البهنيات . منها
امريكة الشالية . انواعها قليلة جميعها جنبات وشجيرات
تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠٠ سم . فروصها دقيقة مضلعة .

١٥١٢٧ - شُرَيْبِلُ فَارُوشِ Kleinia pandula (S).

Kleinia étalée (F).

نوع من الشُرَيْبِلِ الممر منه يمتد من الجزيرة العربية إلى المملكة الأردنية. ساقه خشبية عديمة الفروع. أوراقه اسطوانية النصل، بحرية اللون، طول نحو ٢ سم. رؤوسه الزهرية فردية، كبيرة القذ، أرجوانية اللون، يرتقاية الملاج || تنوره يستمر من ايلول إلى تشرين الاول.

١٥١٢٨ - شُرَيْبِلُ مُنْبَسِط Kleinia radicans (S).

Kleinia rampante (F).

نوع من الشُرَيْبِلِ الممر. ساقه خشبية ناعمة طول نحو ٣٠ سم. ويتبسط حل القربة. أوراقه وشعية الشكل صغيرة القذ. رؤوساته الزهرية فردية أو ثنائية التجميع قرصها أبيض اللون، قناباتها بتسجيسه || ساقه وأوراقه وأزهاره واقتنية العرف || تنوره غربي يستمر نحو ٣ أسابيع.

١٥١٢٩ - شُرَيْبِلُ شَجَيرِي Kleinia aculeata (S).

Kleinia aculea (F).

نوع من الشُرَيْبِلِ الممر. ساقه ليفية جلدة يطولها شراخ يرتفع نحو ٢٠ سم. ينتهي برؤوسه زهرية فردية كبيرة القذ بيضاء اللون. أوراقه متقاربة نصف حاشية. نصلها أخضر اللون، أحر النقص، عند الصفحة، يطول من ١٠ إلى ١٦ سم. ويعرض من ٣ إلى ٥ سم. || تنوره ديمي يستمر نحو ثلاثة أسابيع.

١٥١٣٠ - شُرَيْن ٤، سُرُو رَشِيْق، سُرُو لِفْصِي

Chamaecyparis (S). Cyprès argenté, faux-cyprès (F).

جنس الشجار حرجية ودينية من سبط السرايات وفصيلة الصنوبريات. النوع ٦ تدينز بيناتها المورقة البطة. أوراقها أهدنة، فلسية، متعاقبة، مقلوبة، مرسومة حل أربعة صديقت. بشره حراشفيها السلية نفية الملاج. أزهارها طرفية، وسيلة البلق والمسكن، والأكرية منها قنابية القاعد ملتحبا الاسدية الانثوية الجرب || نماجا اكرارز كروية الشكل، شعية الجراعات الخصلية الشكل اللغية التركيب || يزودها صغيرة القذ، شبه مستديرة، شقية الجنبع، حولية أو محولة البلوغ. صمغها مربابي بطي الانشاش.

١٥١٣١ - شُرَيْن صَوَاكِرَة، صَوَاكِرَة

Chamaecyparis platifera (S). Cyprès à pois.

Sawara (F).

نوع من الشُرَيْن وهو شجرة سربوية كبيرة القذ، مردية الشكل. موطنها اليابان، ترطب في الارية افريقية الرطبة. طول نحو ٤٠ م. لحاء ساقها الال الزرقة السمر. ينالها ناعمة، متدلية، مورقة. أزهارها الذكورية إلى البنفسجي العاين تملو شمة صفراء. أزهارها الانثوية إلى الربة الوردية الملاج || اكرارزيا صغيرة القذ سمره اللون، قلعها يراوح من ٦ إلى ٨ م.

١٥١٣٢ - شُرَيْن عَطَرٍ هو السدرال، اطلبه.

١٥١٣٣ - شُرَيْن فُومُوزَة، بَسِيْجِي

Chamaecyparis formosensis (S). Cyprès de Formose, Beni Ki (F).

نوع من الشُرَيْن وهو شجرة سربوية كبيرة القذ، مردية الشكل، سريعة النمو طول نحو ٦٠ م. موطنها جبال فوموز. لحاء ساقها الال الجراة المابقة، ينالها مورقة متعينة تجلس مع العمر || أزهارها الذكورية احب من

١٥١٢٦ - شُرَيْبِلُ الْجَزِيرَةِ Kleinia semperviva (S).

Kleinia sempervivum (F).

نوع من الشُرَيْبِلِ الممر اصطله الجزيرة العربية. ساقه خشبية سرسة متعينة غليظة الجنت طول نحو ٣٠ سم. أوراقه قصيرة الاعتناق بارزة المروق طول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣. رؤوساته الزهرية كبيرة القذ فردية أو ثنائية التجميع، حامية الارتكاز حراء اللون || تنوره صبي يعلم من أسبوع إلى اسبوعين.

١٥١٢٧ - شُرَيْبِلُ بَحْمِي Kleinia fulgens (S).

Kleinia étalée (F).

نوع من الشُرَيْبِلِ الحولي، ساقه خشبية متعينة عديمة الفروع طول نحو ٤٠ إلى ٤٥ سم. أوراقه مسوطة اعطليجية طول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٣. نصلها أخضر اللون أحر الملاج يحصل من حل جانبي صفحته ثلاثة اسنان مدنية. رؤوساته الزهرية حامية الارتكاز فردية أو ثنائية التجميع. كبيرة القذ، حراء اللون متعينة بالايض || تنوره شتوي يستمر نحو ٣ أسابيع.

١٥١٢٨ - شُرَيْبِلُ تَرِيَانِي Kleinia antiodora (S).

Kleinia antiodora (F).

نوع من الشُرَيْبِلِ الممر. ساقه خشبية فراء طول من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه اعطليجية الشكل، ناشرة المروق، غمدية الصلصة. رؤوساته الزهرية كثيرة العدد، بيض الاقراص، غير اقتنابات || يقال أن اوراقه وأزهاره يرتقية جربة || تنوره يستمر طوالم شهر تشرين الثاني.

١٥١٢٩ - شُرَيْبِلُ دَلْسِي الْوَرَق Kleinia nerifolia (S).

Kleinia à feuilles de laurier-rose (F).

نوع من الشُرَيْبِلِ الممر. ساقه عقدية خشبية غليظة الجلع طول نحو ٣ امار؛ فروعه كثيرة العدد انثوية الانتساب. أوراقه ذلالية الشكل بحرية اللون عابلة، نصلها سنان الصلصة يطول من ٩ إلى ١٢ سم. رؤوساته الزهرية حشوكية التجميع، متوسطة القذ، صفر الاقراص، غير اقتنابات || تنوره يستمر من تشرين الاول إلى الثاني.

١٥١٣٥ - شُرَيْبِلُ عَطَرٍ Kleinia odorata (S).

Kleinia odorata (F).

نوع من الشُرَيْبِلِ الممر منه الجزيرة العربية. ساقه عقدية خشبية طول من متر إلى ثلاثة امار. أوراقه سنانة النصل طول من ٦ إلى ٩ سم. صمغها ثلاثية المروق الناشرة. رؤوساته الزهرية حشوكية التجميع، صفر القذ، صفراء اللون، أزهاره واغشابه حطرية الرائحة به جلفها || تنوره يستمر طوالم شهر تشرين الثاني.

١٥١٣٦ - شُرَيْبِلُ عَمْسِي Kleinia omanensis (S).

Kleinia de l'Amamie (F).

نوع من الشُرَيْبِلِ الممر اصطله العربية الشرقية. ساقه خشبية بحرية اللون فرع طول نحو ٨٠ سم. فروصها انثوية الانتساب. اوراقه مسوطة الشكل، باحة الخضار، ثلاثة المروق الناشرة المابقة الملاج. نصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض نحو ٤. رؤوساته الزهرية طرفية الارتكاز ثنائية التجميع صفراء اللون || تنوره ديمي يستمر نحو الشهر.



١٥١٣٩ - شُرْبَاتَة حَمَلَا

Chouritka Menaspensis (S).
Chouritka de l'Himalaya (F).

طائر من الشرق. موطنه يمتد من جبال حملانا إلى الهند وإيران. يألف البراري والأحراج على السواء. قوته يمدّ ونفسها وقتل ويأبى. جسمه متوسط القد، يطول نحو ٢٥ سم. قوته إلى السواد الأخضر المالح. زوره ومثته إلى الوردية يطولها طوق أسود يمتد حتى الحشر والين. صدره إلى الوردية المشبعة بالأسود. جناحه لاسحان. قوامه إلى الوردية. ذنبه صغير، مقطوع الطرف. يمشي عث في الفصوص يتقيه بين الأشجار الكثيفة. الأني تحسن من ٨ إلى ١٢ بيضة. قرعها يستمر نحو ٣ أسابيع تقود به الأني دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء.

١٥١٤٠ - شُرْبَات

Engelure (F). Chilblain (E).
عارض يصيب الأشجار في مختلف فروعها من جراء الصقيع فيسبب للحاء وهيبس جفله. وهو في الحيوان تصعب الأطراف ويبقى أخضر.

١٥١٤١ - شُرْبَات

هو الجزء الأسفل من الاسماء ينتهي عند الاست حيث يخرج البراز.

١٥١٤٢ - شُرْبَاتِيَان ، شُرْبَاتِيَان

هو الشُرْبَات ، الحلبه .

١٥١٤٣ - شُرْبَاتِيَاكِيَات

هي الشُرْبَاتِيَاكِيَات سبط من الفصيلة الباذنجانية .

١٥١٤٤ - شُرْبَاتِيَاكِيَا

نبت تعرفني يطلق على كل ما له صلة بخرج الحيوان .

١٥١٤٥ - شُرْبَاتِيَاكِيَا

الشرج ، حسب التصريف القلبي الحديث ، هي أولاً الحفرة المروعة بدرب ثباته والطريق القبي. وهي بالتالي دخل وبه الشقوق ، كل مجموعة سمن في الفضاء . لذلك فهي مشابهة الاكحال والجحيم . أسفرها حصياً بقدر طولها بمئات اليوف الستين الضيقة .

١٥١٤٦ - شُرْبَاتِيَاكِيَا

ناب البعير .

١٥١٤٧ - شُرْبَاتِيَاكِيَا

جنبه حافية مشرة تدعى آلامية مأكولة ، الحلبه .

١٥١٤٨ - شُرْبَاتِيَاكِيَا

جنس طير من فصيلة الطيوريات ودية الاجاجيات . أنواعه المعروفة نحو ٦ أصنافها تمتد من الهند إلى جبال هيمالايا . تألف البراري والأحراج . قوتها الحبوب والبرور البرية وبعض الحشرات ويكثها وأغصانها الجانبد وقتل إلى أجسامها ربة ، تطول من ٣٤ إلى ٢٨ سم . رقبوها متوسطه الجرم . أعناقها قصيرة . مناقبها صغيرة . اجنحتها لاسحة . أذناها قصيرة ، مقطوعة الأطراف . أطولها متجانسة الألوان ، جميعها مغطاة الزور والصدور إلى ملونها الحياتي جامح إلا في زمن التكاثر والحضانة ألوانها تعد من عشرة أزواج إلى خمسين زواياً . أعرف أنواعها وأشهرها شُرْبَاتِيَاكِيَا حَمَلَا .

الانثوية لونها إلى الزرقة البنفسجية يطولها ملح أصفر يتخلله لونه من الوردي . أكرانها غروبية الشكل ، قطرها يراوح من ١٢ إلى ١٦ م .

١٥١٣٩ - شُرْبِين تَوْسُونِيَّة

Chamaecyparis lawsoniana, C. boursierii (S). Cypress de Lawson (F). Port Orford cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية ، كبيرة القد ، سريعة النمو ، موطنها أمريكا الشمالية تملو نحو ٦٠ م . لحاء ساقها إلى الوردية الحمر . بناتها موقفة لونها إلى الأخضر البحري الأسفل المالح . ازهارها الذكرية قرمزية اللون بنفسجية التوشيح . ازهارها الانثوية إلى الوردية الوردية المالح . أكرانها صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م . زواياها شامكة . يكثر استعمالها في صد الرياح .

١٥١٣٥ - شُرْبِين مَتَقِيَّة

Chamaecyparis thyoides, C. sphaeroides (S). Cypress faux-thuya (F). White cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية متوسطة القد ترطب في الأراضي المنخفضة . تملو نحو ٢٥ م . لحاء ساقها إلى الوردية السمر . بناتها متعصبة . أروانها دقيقة . ازهارها الذكرية بنفسجية اللون ، قرمزية التوشيح . ازهارها الانثوية لسنتية الاساس ، وردية المالح . أكرانها سداسية الجرامات ، قطرها نحو ٦ م .

١٥١٣٦ - شُرْبِين نَسْكَا ، نَسْكَا

Chamaecyparis nutsensis, C. nootkatensis (S). Cypress de Nootka, Nootka (F). Nootka sound cypress, Yellow cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية كبيرة القد ، اجابية الشكل ، موطنها أمريكا الشمالية . ترطب في المالح الربط ، تملو نحو ٤٠ م . لحاء ساقها إلى الجوز السمر . بناتها متدلية الأطراف ، شديدة الخضار الباهت ، عذمة المالح الغني . أكرانها رباعية أو سداسية الجرامات ، قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ م .

١٥١٣٧ - شُرْبِين هِينُوكِيَا

Chamaecyparis obtusa, C. breweriana (S). Cypress hinoki (F). Hinoki cypress (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية كبيرة القد ، مردلية الشكل . موطنها أواسط ويتوب اليابان . تملو نحو ٤٠ م . لحاء ساقها إلى الجوز السمر ، بناتها موقفة ، مزدوجة التصليف ، عذمة . ازهارها الذكرية بنفسجية اللون يطولها توشيح وردي وأصفر . ازهارها الانثوية إلى الوردية الخضراء تملوها شمسة وردية ومابة زرقاء . أكرانها غروبية الشكل ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م .

١٥١٣٨ - شُرْبَاتَة

Chouritka (S). Chouritka (E).

جنس طير من فصيلة الطيوريات ودية الاجاجيات . أنواعه المعروفة نحو ٦ أصنافها تمتد من الهند إلى جبال هيمالايا . تألف البراري والأحراج . قوتها الحبوب والبرور البرية وبعض الحشرات ويكثها وأغصانها الجانبد وقتل إلى أجسامها ربة ، تطول من ٣٤ إلى ٢٨ سم . رقبوها متوسطه الجرم . أعناقها قصيرة . مناقبها صغيرة . اجنحتها لاسحة . أذناها قصيرة ، مقطوعة الأطراف . أطولها متجانسة الألوان ، جميعها مغطاة الزور والصدور إلى ملونها الحياتي جامح إلا في زمن التكاثر والحضانة ألوانها تعد من عشرة أزواج إلى خمسين زواياً . أعرف أنواعها وأشهرها شُرْبَاتِيَاكِيَا حَمَلَا .



شُرْبَاتَة حَمَلَا

١٥١٥٧ - شِرْشُوحَاتُ مُسْتَحَبَّةٌ *

Saurus fasciatus (S). *Saure rayé*, Lambert (F).
Saurus fasciatus (E).

سمكة من الشروشوح ، أخطابها مخطط أقاليم البحر الأبيض المتوسط . جسمها وشقي الشكل يطول من ٢٥ إلى ٣٥ سم . قوتها إلى الريدة الغضبية يهبط عند الظهر ويبرز عند البطن . جانباها مستحان يتخلل خطوط قاعية زرقاء اللون . زعنفتها الذيلية مفصلة بالازرق || رأسها مخروطي الشكل ، كبير القمم ، واسع الشدة الرطب . أسنانها كثيرة العدد ، ثلاثية الصنوف في الفكين . صيادها صيرتوان ، مستديرتان ، ماصتان . زعنفتها لينة متشابكة الأشكال والأحجام . الظهيرة الأولى شرابية . الظهيرة الثانية جعدة . الصدرية صغيرة . الحوضية كبيرة || لحمها جيد الصنف لكنه كثير الحسك اللينق .

١٥١٥٨ - شِرْشُوحَاتُ *

Fillicinas (F).
Fillicinas (E).

شعبة من سمكيات الزهر الوعائية . فصائلها وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد ، معظمها من سمكيات الإزنة الناضرة . أعصابها الحلقية الدودية || أنثاهما متباينة التركيب المهيكل منها المشعية والبالغة والمفتوشية . جميعها مجهزة بزوائد وريقة تدعى مراميم .

١٥١٥٩ - شِرْشُوحَاتُ *

Epigastre (F) *Epigastrium* (E). *شِرْشُوحَاتُ*

١٥١٦٠ - شِرْشُوحَاتُ *
الجزء الأوسط العلوي من البطن يمتد من السرة إلى القفس .

١٥١٦١ - شِرْشُوحَاتُ *

Cherains (S). *Cheraine* (F). *شِرْشُوحَاتُ*

جنس سلاسل من فصيلة السحليات . أنواعه عديدة ، بعضها البلاد الحارة ، جميعها أرضية المسرح خاضعة . ذيلها شديد الاستعداد والصلابة لونه إلى السمر يعطو تدرج أصعب . طول أجسامها يراوح من ٢٠ إلى ٦٥ سم . بيئاتها الشجرية يقوم بحر أو الشجر .

١٥١٦٢ - شِرْشُوحَاتُ *

شِرْشُوحَاتُ هو الجذر ، أخطبه .

١٥١٦٣ - شِرْشُوحَاتُ *

يقال شرش ثقبات اذا ثبثت شرشه في التربة . راجع استعرق .

١٥١٦٤ - شِرْشُوحَاتُ *

شِرْشُوحَاتُ هو الجذر ، أخطبه .

١٥١٦٥ - شِرْشُوحَاتُ اللَّيْلِ ، يَسْمَيْنُ اللَّيْلِ

Castrum nocturnum (S). *Castrum nocturne*, Gafan de nuit, jassin de nuit (F). *Night scented castrum*, *Night jassin* (E). *Nachtsstrauch* (D). *Galante di notte* (I).

نوع من الشروشوحات يزهر للزينة ، يطول من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . أوراقه لعلبية عاقبة الخضار اللامع . أزهاره جميلة الشكل ، أرجوانية اللون ، عرقها دجوي يفرح في الليل ويضيئ في النهار || وهو من النباتات السبروتية للمسرة التي تعيش وتزدهن في جميع المواقع والأشربة .

١٥١٥٠ - شِرْشُوحَاتُ *

Castrinas (F).
سبط من فصيلة الباذنجانيات ، أشهر أجناسه الشروشوحات .

١٥١٥١ - شِرْشُوحَاتُ *

Apophyse (F). *Apophysis* (E). *شِرْشُوحَاتُ* هو عظم الفقار . ج شرانيم .

١٥١٥٢ - شِرْشُوحَاتُ *

Dasypocetidae (S). *Subongulés, Dasypocetidae* (F). *Subungulatus, Dasypocetidae* (E).

فصيلة حيوانات لبرية قاضية من مرتبة شبيهات الشورب ورتبة القوام . أجناسها وأنواعها عديدة أجسامها مغطاة بالاشكال والأحجام . أذنانها حريفة . أذنانها جداد أو لصلو . قوائمها متصلة أو ودية . فرائها غشة الورب والصوف || موطنها أمريكا الوسطى والجنوبية . جميعها درجة ثلثة سلة الأديان والترويض . قوتها المواد النباتية || أحرف أنواعها وأشهرها الإغوي والباكاس والمار والكاكاي والكرابي .

١٥١٥٤ - شِرْشُوحَاتُ *

Carcidophyllum (S). *Carcidophylla* (F).
جنس نباتات سبروتية معمرة من فصيلة الشرنقيات . أنواعه قليلة العدد بعضها الشرق . إنباره كبيرة القدر هرية الشكل تملو من ١٦ إلى ٣٠ م . سيقها خليقة . أوراقها مابة متعقبة متعاقبة . فصائلها قليلة الشكل ، مفردة الحمار ، بارزة اللرون ، متسارية الطول والعرض . صفحاتها العليا جيلة الحمار الزاهي ، صفحاتها السفلى خلية البثرة نيراء اللون . أعناقها بنفسجية . أزهارها عادمة الكأس والبيض . للأزهار منها عديدة الأسيدي . أما الاثنتي ثنائية أو رباعية أو سداسية الأسيدي ، مستطيلة الأقسام البارزة تصلح لتفريق وزرع في الحداثق .

١٥١٥٥ - شِرْشُوحَاتُ *

Carcidophyllaceae (S). *Carcidophyllaceae* (F). *Carcidophyllaceae* (E).
فصيلة نباتية من سمكيات القمالات أجناسها وأنواعها قليلة العدد ، جميعها أشجار متصلة القدر أو كبيرة معظمها بري وبشها حشائش .

١٥١٥٦ - شِرْشُوحَاتُ *

Saurus (S). *Saurus* (E).
جنس أسماك بحرية من فصيلة السمكيات ودية متفصات المثانة || أنواعها المرفوعة سمة معظمها من أسماك بحار البلاد الاستوائية والحارة || أجسامها وشعية الشكل ، مستطيلة . أثوابها مختلفة الألوان . السائد فيها الريدة الرصاصية الغضبية المالح ، تسمر وتبقى في الظهر وتبرز في البطن || تتميز بأشدها الكبيرة وبزعانفها الذيلية البارزة || لحمها جيد الصنف غير أنها كثيرة الحسك اللينق || أشهر أنواعها الثرموسة المستنبة .



شردوة مستنبة



شريس

الى . يضاف تحفظها بتأدية الذكور || أشهر ازواج
الشرور الفائع والجبلي والافريقي .

١٥١٦٧ - شُرُوطُ جَبَلِي
Pinson d'Ardennes, Pinson de montagne (F). Brambling, Mountain finch (E).
يرف بالزغاري ، اطلبه .

١٥١٦٨ - شُرُوطُ شَكْبَع *
Fringilla coelebs (S).
Pinsons communs (F). Chaffinch (E). Buchink (D).
نوع من الشرور طوله من ١٦ الى ١٧ سم . جميعه
سواد الريش . راسه وقنقه ويمتد الى الزرقه الزباديه المواجه
ظهور اسمر اللون تلوه مابجه زيتيه . زيمكاه الى الخضره .
مستطاه بلون ظهره يمتد فيها خطان عاجيين . صدره الى
الجلوه الغمرية ، يلك ينصرف الى الصبوه ويتهي بالابيض .
الاني اسمر قدام من الذاكر واهت ثوباً .

١٥١٦٩ - شُرُوطِيَّات
Fringillidae (S). Fringillidae (E).
نميلة طير من الجوائم المحرطيات المتاخرين . منها الشرور
والسحر والتمار والكتار .

١٥١٧٠ - شُرُوبِ
Sercalis (F).
هو الخلد ، اطله .

١٥١٧١ - شُرُوبِي شَقَوِي
Sercalis d'iver (F).
هو الخلد الشتوي من طيور الماء ، اطله .

١٥١٧٢ - شُرُوبِي صَبِيحِي
Sercalis d'été (F).
هو الخلد الصبي من طيور الماء ، اطله .

١٥١٧٣ - شُرُوبِ
هو الصديق ، اطله . ج حراس وحرصه .

١٥١٧٤ - شُرُوبِي
Impardable à la lumière (F).
هو ما كان لا ينفله النور . راجع شان .

١٥١٧٥ - شُرُوطِ
Clause
هو كل نص خاص يرتبط عملاً قانونياً .

١٥١٧٦ - شُرُوط ، شُرُوطِيَّة
Condition
هو تمليك انقضاء عقد قانوني على حدوث حدث في المستقبل
مشكوك في حدوثه . وقد يكون الشرط :

شُرُوطِ اسْتِطَالِي ، محتمل
Condition casuelle (F).
Casual C. (E).

شُرُوطِ ادَارِي
Condition processative (F).
Protector C. (E).

شُرُوطِ توقفي ، ملحق
Condition suspensive (F).
Suspensive C. (E).

شُرُوطِ فاسخ
Condition résolutoire (F).
Abrogating C. (E).

شُرُوطِ محظور ، غير جائز
Condition illcita (F).
Illicit C. (E).

شُرُوطِ غشقي
Condition défallite (F).
Falling C. (E).

شُرُوطِ مستحيل
Condition impossible (F).
Impossible C. (E).

شُرُوطِ رافض ، منافي للاخلاق
Condition immorale (F).
Immoral C. (E).

١٥١٧٧ - شُرُوطُ اسْتِثْنَاءِ الاختصاص

Clause attributive de juridiction (F). Attributive clause of jurisdiction (E).

شرط امتناعي يقتضي بطرح المنازعة التي قد تلتصق من العقد
على محكمة معينة .

١٥١٧٨ - شُرُوطُ الاختصاص ، مَعْطُوطَة

Compromis (F). Compromis, Mutual agreement (E).

المطالبة هي اتفاق يبرمه كتاباً من بياض يبرم نزاع ،
على ان يحكموا في فضله خصماً يتراضون عليه بقضى حكماً .
ويختار للمطالبة معلقاً من عقد التراضي وهو لا يصح الا
من له اهلية الاداء المطلقة .

١٥١٧٩ - شُرُوطُ الامر ، شُرُوطُ الاذن

Clause à ordre (F).

هو شرط يقتضي حتماً نص صيغة « لأمر وبأذن » وبذلك
يمكن تحويل الدين بالتظهير . اما صيغة التظهير فهي :
« اذنوا لاسم فلان ... »

١٥١٨٠ - شُرُوطُ التفضيل

Pacte de préférence (F). Preference clause (E).

اتفاق يلتزم المرء بمقتضاه اذا احتزم تحرير عقد معين
ان يفضل الموجود به بنفس الشروط التي يبرمها الغير .

١٥١٨١ - شُرُوطُ الضمان

Clause de garantie (F). Garantie clause (E).

شرط يلزم الكفيل او الضامن على دفع ثمن الشئ الذي
الباع اذا تأخر الشاري من ذلك .

١٥١٨٢ - شُرُوطُ الحراسة

Clause de sauvegarde (F). Safe-guard clause (E).

شرط يبي الى وهد الالتزامات المالية بعضها بعض
فيصح تنفيذ بعضها سلفاً على تنفيذ البعض الآخر .

١٥١٨٣ - شُرُوطُ تَهْدِيءِي

Clause comminatoire (F). Comminatory clause (E).

شرط خاص يدرج في عقد المتبرع يتم اقيام بعمل معين
ما ويمنع على اقتطاع مقدار معين ثباً اذا امتنع المتبرع
له من اقيام بالعمل المطلوب .

١٥١٨٤ - شُرُوطُ جزائي

Clause pénale, Pénalité (F). Penal clause, Penalty (E).

شرط يعلق المتعاقدون بمقتضاه على تقديم مبلغ جزائي
للمتبرع الذي يجب على المدين اذا لم ينفذ او اذا اضر
تنفيذ التزامه .

١٥١٨٥ - شُرُوطُ حصّة الاسد ، شُرُوطُ عَشْبَتِيَّةِي

راجع اشتراط حصّة الاسد .

١٥١٨٦ - شُرُوطُ رَفْعِ المسؤولية

Clause de non-responsabilité (F). No responsibility clause (E).

شرط يعلق المتعاقدون بمقتضاه على نفي المسؤولية عن المدين
اذا تأخر في تنفيذ التزامه . وهو من الشرور المحظورة
في عقد النقل .

١٥١٨٧ - شُرُوطُ غُلُقِ الرِّهْنِ

Pacte commissaire (F). Binding on pain of clause (E).

هو اتفاق في التمديد للمدة الطرفين ينص فيه على انه في
حالة عدم تنفيذ احد الطرفين الالتزام الذي انشده عليه
العقد فسخ العقد بقوى القانون دون ان ترفع بشأه دعوى



شرور فلان

١٥١٩٦ - شُرعية أنيكة، بيئرية أنيكة

Baeria gracilis (S). *Baeria graciosa* (F).
نوع من الشُرعية عشبها زينة حولية . ساقها فراء تملو .
١٥ سم إلى ٣٠ سم . أوراقها كاملة سنانية التصل .
روسياتها الزهرية عديدة للسينات أيضا إلى الاسفر
الجميل || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

١٥١٩٧ - شُرعية مدّعية، بيئرية مدّعية

Baeria chrysotoma (S). *Baeria dorae* (F).
نوع من الشُرعية عشبها زينة حولية . ساقها فراء
تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها كاملة سنانية التصل .
روسياتها الزهرية عديدة للسينات الكبيرة المستطيلة، أيضا
إلى الصغار اللهب || تنورها يستمر طوال فصل
الصيف .

١٥١٩٨ - شُرطين

الشُرطين منزل من منازل القمر الشامية ينزل القمر في
الليلة الأولى . ويقال لها قرنا الحبل والنطح . وها مترضان
من التلال إلى الجنوب . وإلى جانب التلال منها كوكب
صغير || وذيب الشُرطين يدعى الثفر .

١٥١٩٩ - شُرعاف ، شُرعان
Spathe
قناة ظلمة للتصل وما أشبه . وهو الكانور .

١٥٢٠٠ - شُرعطط
Phellandrium (S).
Phellandria (F).

جنس نباتات عشية برية معمرة من فصيلة الخبيات .
أنواعها قليلة البلد منها المناطق المتدلة، جميعها ترهب
في الموانئ البرية . أوراقها متعاقبة مركبة قريبة البنية من
الشوكران || أعرف أنواعها وأشهرها بالشُرطط المتقي .

١٥٢٠١ - شُرعطط متقي، شُرعالماء

Phellandrium aquaticum, *Enanthe phellandrium*
(S). *Phellandria aquatica*, *Fenouil d'eau* (F). *Water*
drop-wort, *Water hemlock* (E). *Wasser Pilsendal*,
Wasser Pflersat (D). *Falandrio*, *Finochio*
aquatico (I).

نوع من الشُرطط وهو نبات عشبي بري مصر يكثر في
المنطق والأراضي الرطبة . يعتبر من النباتات السامة التي
تؤذي للماشية || استنبط أضراره الملية بالماء فيله الربو
ويستخرج من بذوره مادة قوية جسمية لها استعمالها
الطبي .

١٥٢٠٢ - شُرعصف
Etèter (F). *To pollard* (E).
شُرصف القصب : قطع رأسه الثاني . والشُرصف : قطع
الرؤوس الثانية في النبات .

١٥٢٠٣ - شُرعية
Démagogie (F).
Demagogy (E).
الشُرعية حالة اجتياحية تسود فيها فوضى آراء الذين يدعون
مناصرة الجماعات أو الشعب .

١٥٢٠٤ - شُرعية
Démagogique (F).
Demagogic (E).

نست تسمي يطلق على كل ما من شأنه تحريض أهواء
الجماهير وشهواتها الانطاظية .

١٥٢٠٥ - شُرعية
Démagogisme (F).
Demagogism (E).

الشُرعية ملهب الذين يثرون بالشُرعية .

النفع . وهو أيضا اتفاق يبيع به أراضين للمزبن الحارث
الزمن ، الاستيلاء على الزمن في ساعة عدم فناء الدين عند
حلول أجله وهذا الشرط محظور قانونيا .

١٥١٨٨ - شُرط مألوف
Clause de style (F).
Style clause (E).

هو من الشروط التي كدرج في جميع العقود للتشابهة
بطبيعتها : مثال ذلك ما يرد في عقود الإيجار بأن المستاجر
قد ملأ الأرض المؤجرة مائة تنني دعوى الجهالة شرعا .

١٥١٨٩ - شُرط معدّل، شُرط مخالف

Clause derogatoire (F). *Derogatory clause* (E).
هو كل نص يدخل بمقتضا تعديل على الاتفاق المقيد
أو يصرح به عنه .

١٥١٩٠ - شُرط مكتسمة للتنازع له

Pacta de quota litis (F). *Quota litis clause* (E).
شرط يتخذ بين الخصم والمتنازع من أن التنازع التقاضي
تكون جزءا من كسبه وهو محظور في اللوائح المهنية .

١٥١٩١ - شُرعية
Shortia (S).
Shortia (F). *Shortia* (E).

جنس نباتات عشية ركوبة معمرة من فصيلة القرنيات
الفرارية معقودة التبريد على اسم العلامة وشُرطه . وكبها
مستطيلة . أوراقها جلدية اللتلاشب مستديرة الشكل أو
كلوية ، جلدية التصل . أزهارها ملونة خالصة البتلات
والاسدية الخسبة ، خالصة الاسدية المعقبة . أنواعها
المعروفة قليلة أشهرها التالية :

١٥١٩٢ - شُرعية كبيرة الزهر

Shortia grandiflora (S).
Shortia à grandes fleurs (F).

نوع من الشُرعية الزينية . مهدا بعض مناطق أمريكا
التيالية . أوراقها كبيرة القد ، شبه مستديرة الشكل ،
قلبية التاعدة ، مسنة الحارث . أزهارها بيضاء اللون ،
خالصة العرف . قطرها نحو ٣ سم . || تنورها يستمر من
أيار إلى حزيران .

١٥١٩٣ - شُرعية وحيدة الزهرة

Shortia uniflora (S). *Shortia uniflora* (F).

نوع من الشُرعية الزينية . مهدا اليابان . أوراقها كبيرة،
كلوية الشكل ، مسنة الحارث المفرحس . زهرتها وحيدة ،
وردية اللون ، خالصة العرف ، قطرها نحو ٥ سم . ||
تنورها يستمر نحو أربعة أسابيع ابتداء من أواخر نيسان .

١٥١٩٤ - شُرعية، بيئرية

Baeria (S). *Baeria* (F).
جنس نباتات برية وزينية من فصيلة المركبات . أنواعها
عديدة معظمها أمريكي المهد . ساقها فراء . أوراقها
متعاقبة . أزهارها وركبي التجميع ، قناباتها عديدة الفصل
فردية الصف . تخمها غبروية الشكل . بذورها مجنسة
مستطيلة قليلة العرض || أعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع .

١٥١٩٥ - شُرعية إكليلية، بيئرية إكليلية

Baeria coronaria (S). *Baeria coronaria* (F).

نوع من الشُرعية الزينية المحلية قليلة العرض المستحب .
ساقها زباد البشرة فراء تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها
مفرسة غليظة التشرح . روحياتها الزهرية كبيرة القد
عديدة للسينات المتوسطة الطول أيضا إلى الترقال . بذورها
مجنسة كبيرة الحسك || تنورها يستمر طوال فصل
الصيف .



شُرعية كبيرة الزهر



شُرطط متقي

١٥٢٢٧ - شَرَم قَلْبِي الْوَرَك

Carpinus cordata (S). Charme à feuilles en cœur (F). نوع من الشرم مهدد اليابان . شجرته سرقية تجود في جميع المواقف والأماكن . تملو من ١٢ إلى ١٨ م . أوراقها تقبل نحو ٨ سم . نصلها ينحني الشكل ، قلبية الشكل ، مدبب الطرف . غشبا جامد الرقعة ، شديد الصلابة ، شائع الاستعمال الصناعي .

١٥٢٢٨ - شَرَم كَرُولِيَّة

Carpinus americana (S). Charme de la Carolines (F). نوع من الشرم جبل الشكل . مهدد البلاد الأمريكية . يملو من ٦ إلى ١٠ أمتار . يتميز ببراعم الغلظة القصيرة . أوراقه تحمر في أواخر الصيف وتبقى على أحمرها حتى الإحلال الذي يتم في أواخر الخريف || يعتبر من الأنواع الجالبة التي لا تجود في أي موقع كان .

١٥٢٢٩ - شَرَم *Fendou* (F). Clef, Split (E). صفة ما كان مشقوق أو مفكوك أو مصعد .

١٥٢٣٠ - شَرَكَل ، عَصَكَة *Pampe* (F). Bâge (E). ورقة الحنطة والشعير وسطم النباتات الجنبية .

١٥٢٣١ - شَرَكْب ، شَبْرَم ، بِوَرَم وَنَح

Euphorbia pithyusa, *Tithymalus cutifolius* (S). *Euphorbia pithyusa* (F). Wild pesty spurge (E). Tanfeilmich (D). *Pitusa*, *Scabram* (I).

نوع من الثريبيون وهو نبات عشبي بري مسمر ينكسر في الأتربة الرملية الرطبة . لا شأن له في الزراعة إلا أنه من النباتات السامة الشديدة الضرر . كان يستعمل في الماضي البعيد كسول جارف . وقد جاء من ابن البطار قوله : « وقد قتل به الجبال الطوائف خلقت من الناس » . عشته فرحاً تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم . ساقه لينة انضغاطاً . أوراقه متقابلة ، سنائية الشكل ، نصلها يطول نحو ١٠ سم . وهو رديد الفلج ، عادم المرقق والشرايين ، لونه إلى الخضار الداكن . انزفاره سبيل التجميع تاجي الارتكاز ، إزهاره صغيرة لثقة زرقاء اللون || ساقه وورده ممتدة لثقة تستعمل في صناعة السلال .

١٥٢٣٢ - شَرَكِيَّات *Andraceae* (S). *Andraceae* (F). فصيلة من الطعالب تنتمي إلى رتبة السفانث .

١٥٢٣٣ - شَرَكِي *Falcinellus* (S). *Falcinelle* (F). *Falcinellus* (F).

جنس طير من طوائف الساق وفضيلة التنظليات . أنوعه المعروفة أربعة ، ثلاثة منها أمريكية الموطن وواحد مهدد العالم القديم || أجسامها كبيرة . أعتاقها وسوطها مستطيلة . مناقبها مقوية . أوتابها مختلفة الألوان السبعاء المواج || جميعها من القواطع . تألف الحياة الجماعية . مريباً عنه الرحيل لا يقل من ألف زوج . تسير سطوط متناوبة متتابة لا تتصرف إلا عند الميوط حيث تأخذ شكل الأقواس المتتالية || قوتها التهيدان والخبرات المائية والفكرات اعرفت أنوعه وأشهرها الشرقي البهي .

١٥٢٣٤ - شَرَكِي بَهِيمِي *Falcinellus igneus* (S). *Falcinelle éclatant* (F).

طائر من الشرقي أطلق عليه العالم ريفون ، ليا مضي ، اسم كروان إيطاليا (Courais d'Italie) . أعضانه تشمل بعض المنطق الاسيوية والشرقي الأوسط وباروية الجنوبية الشرقية

يصيد القوامس والصائير . يذئن في أصالي الأشجار البلسنة . أعتاقه تنبع أربع زفانت تحضنها وحلها .

١٥٢١٨ - شَرَقَرَق *Rollier* هو الشرناق ، الطبخ .

١٥٢١٩ - شَرَكَة *Société, Compagnie* (F). *Society, Company* (E).

مقد بين شخصين أو أكثر يتفقون به على أن يقدم كل منهم شيئاً للسل به واتساقاً بأرباحه .

١٥٢٢٠ - شَرَكَة اِلْتِقَابِيَّة *Tontine* شركة يؤلفها أشخاص متقاربين في السن عادة يقدمون فيها دوروس أموال ويشترطون توزيعها على الأحياء منهم بعد زمن معين .

١٥٢٢١ - شَرَكَة اَلْبَنَان *Fruitière* (F). *Fruiterer* (E). شركة أو جمعية تعاونية تجمع الحليب وتستهه .

١٥٢٢٢ - شَرَكَة مَخَامَة *Société en participation* (F). *Profit-sharing society* (E).

شركة تجارية مسترة وجوبا فعملها أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يقتسبا بنسبة معلومة ما تنتج بهن بعض الأعمال التجارية التي يقوم بها أحد أو بعض الشركاء أو ما يدور استغلال تجاري تمتد للأجل يقدم به الشركاء جميعاً بهمهم .

١٥٢٢٣ - شَرَم ، عَرَبِيَّيْن ، لَبْرَبَة

Carpinus (S). *Charme* (F). *Horn beach*, *Yoke elm*, *Hornbeam* (E). *Hagebuche*, *Hainbuche*, *Hornbaum* (D). *Carpine*, *Carpene* (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة البتوليات رطب في الأراضي الرطبة . اغشباها صلبة صلبة الكسر تستعمل في صناعات عديدة اغشبا الاثيار بها اشبه || سوطها متضبة . قفورها ملي . أوراقها نافضة ، متعالية ، متقنة . انزهارها وحيدة المسكن . شاربها الكبرية تأخر من حرارتها الاثوية أكثر من اسيرج || لشهر انواعه الخمسة التالية .

١٥٢٢٤ - شَرَم الشَّرَقِي *Carpinus orientalis* (S). *Charme d'Orient* (F).

نوع من الشرم مهدد الشرق الأوسط . شجرته صغيرة لثقة تملو من ٦ إلى ٧ أمتار . ساقها متراكبة الاضخان ، معزلة اللحاء . أوراقها صغيرة لثقة . نصلها قلبي الشكل ، مسن الحافة || غشبا شديد الصلابة ، حنلي اللون .

١٥٢٢٥ - شَرَم اَلْيَابَان *Carpinus japonica* (S). *Charme du Japon* (F).

نوع من الشرم مهدد اليابان . شجرته شبه هرمية الشكل تملو من ١٠ إلى ١٥ م . أوراقها تقبل نحو ١٢ سم . نصلها مستدير الشكل ، ذات الطرف متباعدة التسنين . متصع الصلابة || يعتبر من الأنواع الجادة التي تتطلب بعض المواقف الخاصة .

١٥٢٢٦ - شَرَم بَتُولِي ، شَرَم مَبْدُول *Carpinus betulus* (S). *Charme commun*, *Charnille* (F).

نوع من الشرم السبروتي الحربي الشكل ، يملو من ٦ إلى ١٨ م . أوراقه مجعدة التصل ، مسنة الحافة ، صفتها تقبل نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٥ عروقها متناوبة الالتشاب مدحدا يراوح من ٧ إلى ١٥ زويماً .



شَرَم



شَرَب



شَرَكِي بَهِيمِي

١٥٢٤١ - شَرَفَت * ، غُلُوطُون ، غُلُوطُون

Gulo luscus (S). Glouton, Goulu, Carcajou (F). Glouton, Wolverine (E).



شَرَفَت حمراء

حيوانٌ وسيد الجنس والنوع من السحليات اللوامح . جسمه مستطيل الشكل طويلاً الكامل يراوح من ١١٠ الى ١٣٠ سم . رأسه كبير لثته غروبي الشكل . اذناه مستديرتان . قوائمها قصيرة ، خالصة البرازيل الخلد . ذنبه جتل الصوف . بطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . فروه لينة ناعمة لونها الى الصبغة الخفيفة اللامعة الموحج . موطنه البلاد الشمالية الاسيوية والامريكية . انتاده تقع اربعة جيرة تربتها نحو الحبل .

١٥٢٤٢ - شَرَهَائِيَّات *

Acrasie (S).

Acrasidae (F). Acrasie (E).

فصيلة من القنطور الخاطئة . اجناسها وانواعها عديدة تعيش على بعض المواد القلبية اغصنها خيرة كبيرة الرطبة وبراز الحيوانات العاشية كبروت الدواب وضلع البقر || جهازها البشري منطوف بمادة حلالية يخلط فيها الشكل والحجم واللون مع اختلاف الاجناس .

١٥٢٤٣ - شَرَهَائِيَّات *

Melandrya (S).

Melandrye (F). Melandrya (E).

جنس حشرات من فصيلة الشرفيات ورتبة غديات الاجنحة انواعها المبرقة عشرة منتشرة في معظم سراج السويليات في العالم || اجسامها مستطيلة الشكل ، مستدلة القليط ، بطول من ١٠ الى ١٦ مم . وروصها صفيرة ، مستعرة ، قليلة التشويز . حيثها بارزة . كثرها مستدلة الجرم . ملاسها الفكية كبيرة . قرونها الاستشارية قلبية ، كلسها محبة مقلية . بطيها مستطيلة ، مدنية المؤصر . اتحادها ملتحف كامل كليل باستثناء الطرف للملح . قوائمها نشيطة . اواطها وسيدة اللون منها البانجاني والازرق الاسود المالح والجوزي والاسود الاصفر والعتاني || تألف الجذور النشرة من مختلف انواع السويليات . مسرعا دجوي . طرائها سريع الحركة . قوتها اوراق النبات والمواد النباتية المنطية . يرقاتها فائجة وعادية .

١٥٢٤٤ - شَرَهَائِيَّات *

Melandryidae (S).

Melandryidés (F). Melandryidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المبرقة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المستدلة الحرارة || اجسامها متقلبة الجرم ، يتكثر لها الشكل المستطيل . اطولها تراوح من ٤ الى ١٦ مم . وروصها صفيرة . حيثها بارزة . ملاسها الفكية كبيرة ، مدنية . قرونها الاستشارية غليظة او صولجانية او قلبية . وصلها ١٠ او ١١ . كلسها مستعرة . اتحادها لاحقة . قوائمها نشيطة . اسانها رابعية العقل في الزوج الخلفي ، خالسيها في الزوجين الاباسي والاسط . اواطها ملحية || جميعها غاشلة ودائمة تعيش على مختلف انواع النبات وعلى الاشعاب النشرة والقنطور وتحت اللحاء . يرقاتها غاشية او فائجة او شكاركة || اشهر اجناسها الشرعية والدراسة والسامة .

١٥٢٤٥ - شَرَهَائِيَّات *

Leptosperma (F).

جنس الجمار وينبتان من الشرفيات وفصيلة الاسيات . انولاه عديدة ، نحو ٣٠ . اولواتها صيرة متقلبة سطرية . ازفادها فردية تتسبح بحرية الاوتكار . غارها كمبورية كثيرة البزور النقيطة || اولواتها وانولاهما غليظة تستعمل في عدة علاجات مقوية .

وافريقية الشمالية || جسمه كبير لثته بطول نحو ٧٠ سم . لويه الى الصبغة الورداء السغماء اللوامح . رأسه عايق اللون . ظهوره وبتاحاه غصير الموحج . صدقه ويصنعه ويملته الى الصمرة الخطيئة . مقادفه وسطقة عنه الى الصمرة الكستية . رجلاه الى انخضار البحري المالح || تألف المنطق والاشعاب والاهوار وضلعان مجاري المياه القليلة الانسياب . قوتها البندان والغشرات المائية واللباطيح ولقشريات || يفتن الى الانجار والشجيرات اللامالية على ارتفاع متر او اقل من سطح الماء . عله مجموعة من البندان والقضبان والجذور والقش . انتاده تنقسم من ٢ الى ٤ يضبات لونها الى انخضار الازرق المادم القويش تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .

١٥٢٤٥ - شَرَفَت

Effaner, Effaumer (F).

To strip of leaves (E).

قطع رؤوس الصف .

١٥٢٤٦ - شَرَفَت

Effanage (F). Stripping (E).

انتطاع رؤوس صف الزرع عند افراط النمو وقد يتم ذلك قبل الاسباب .

١٥٢٤٧ - شَرَفَت

Cocon

في الصلابة ، الطلج . ج شرائق .

١٥٢٤٨ - شَرَفَت

هو الشرخ ، اطلية .

١٥٢٤٩ - شَرَهَائِيَّات *

Pyrochroa coccinea (S). Pyrochre rouge (F).

Pyrochroa coccinea (E).

حشرة وائمة غاشلة دائمة والنجمة من فصيلة الشرفيات ورتبة غديات الاجنحة . تألف الاجراج والبراري . غاشفها تعيش على بنبات الانجار وعلى اوراق النبات . يرقاتها في اول عهدا تعيش على المواد النباتية والغشوية ثم على ما تقتضيه من اساريع الحشرات الخاطئة || جسمها متوسط لثته بطول من ١٢ الى ١٥ مم . نوحها احمر الكفان اسود الرأس والبرامز . رأسها مستدير الجرم . قوتها شليماني . زباتانها مستطيلان ، مشطيان عند الذكر ، مشطاريان عند الانثى . حيثها بارزتان . ظهرها مستدير الطرف اللاحق ، كليل الحمل ، عادم التحزير || لها جيل واحد في الحبل . تظهر الحشرة الجملة في نيسان يبقى حتى تموز . تسرح في التبار . لسافه في ايار . تنجح الممكن ميحاديها تحت لاه الانجار وقشورها || البرقة عند بلوغها الكلال الميسوري تطول نحو ٣٤ مم . جسمها مستطيل الشكل مبطل الجرم ، اخير اللون ، مستطيل الرأس البني ، ضلع التاكثير الفكية ، سداسي الرواجب . السسر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في آخر سرداب دخلته البرقة .

١٥٢٥٠ - شَرَهَائِيَّات *

Pyrochroidae (S).

Pyrochroïdés (F). Pyrochroidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقائمة من رتبة غديات الاجنحة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف الخيوس والنباتات التريينية وازهار النباتات الطموعة والزراعية || جميعها صيرة لثته مبطة الاجسام المستعرة المؤصر . زباتانها مركبة من ١١ فصلة وفي مشطية الشكل عند الذكور ، منشارية الشكل عند الاناث . اسانها خالصة للعقل باستثناء الزوج الخلفي لانه رابعا || يرقاتها مبطة الجسم تعيش تحت غلاء الانجار وقشورها الصلغة صامية وراء يرقات الحشرات غاشية لقتضاء عليها || اشهر اجناسها الشرعية .



شَرَفَت



شَرَفَت



شَرَفَت

Senecio argenteus (S). شَرَوْنَةُ فِصْبِيَّة
Sénéceon argenté (F).
 نوع من الشروة وهي عشبة سريرية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها سمكة التصل المفصص والمسنن، خلية البشرة، فضية اللون. أزهارها الى الصفرة الباهتة. ازهارها يستمر من آب الى الجلول.

Senecio doria (S). شَرَوْنَةُ مَدْبِيَّة
Sénéceon Doria, Herbe dorée (F).
 نوع من الشروة وهي عشبة سريرية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. أوراقها اطيالية الشكل، لمبة التصل، بحرية اللون، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٠ أزهارها متوسطة القد، فاشرة البلق، لونها الى الصفار المذهب. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

Senecio flammeus (S). شَرَوْنَةُ نَارِيَّة
Sénéceon rouge-feu (F).
 نوع من الشروة وهي عشبة سريرية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها الجلمية مسطحة الملق، سنانية التصل للسنة المخلقة. أوراقها السفلى فضية الاضلاع، فضية الشكل، عادمة التسنين. ازهارها ناروية اللون، حراء للمرج، حلقية التجميع. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

Sénéclionides (F). شَرَوْنِيَّات
 سبط من فصيلة المركبات نباتاته عدة مئات مختلفة الاشكال والاحجام. اشهرها الشروة.

Truffe gâtée (F). شَرَفَاخ
Tainted truffle (F).
 الكساة الفاسدة التي قد استرخت (الفساد).

Cepola (S). Cépole (F). شَرَفَاط ٥٥
 جنس اسماك بحرية من فصيلة المنجيبات. ازراة المرفوعة قليلة، اسطاتها المتوسطة وبحار البلاد الحارة. اجسامها سوية الشكل حراء اللون. رؤوسها غليظة مقطوعة الاضطام. زعانفها الظهرية والبطنية تمتد من القراس الى القلب. زعنفتها الشرجية غريزية الشكل. لحمها جادي الصنف قل من يرغب فيه.

Cepolidae (S). شَرَفَاطِيَّات ٥
Cépolidés (F). Cepolidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من الطشيات شالكتات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك اساطم الثقات. اسطاتها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش بين المشريات وفي الاساطل. اجسامها سوية الشكل تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم. انوثها متباينة اللون. زعانفها الظهرية والشرجية قاطبة. رؤوسها فضية، غليظة. اذناؤها ردية. حيوتها كبيرة. لحمها كاسنة الصنف، لذي من يرغب فيها.

Arère (F). Artrey (E). شَرَاك

هو الحراء الذي يحمل الدم من القلب الى سائر اجزاء الجسم يقابله القوريد الذي يبعد الدم من اجزاء الجسم الى القلب. اما اتصال بالوريد فيتم بواسطة الاوعية الشعرية التي توصل نهاية الشريان بداية القوريد. تتقيم الشرايين في الجسم الحيواني الى اربعة اقسام رئيسية: اولى الشريان الاخر (الاورطي) الذي ينبع من البطن

Leptospermées شَرَهِيَّات، شَرَهِيَّة
 سبط من فصيلة الآسيات، اشهر انواعه الشري.

Miel (F). شَرُو
 هو السمل، اطلبه.

Mutation شَرُو
 هو الانتقاء، اي التبدل الجفائي في الانتقال الوراثي لصفة او لصفات نوع اور ضرب من الاحياء.

Senecio (S). شَرَوْنَةُ
Sénéceon (F). Groundsel (E). Grahskraut, Kreuzflusse (D). Senecio, Senecione (I).
 جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة المركبات. انواعه زهاء ١٣٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم. مسطها بري وبضها ترابي. منها الاضلاع والجنبات والشجيرات الملبانة الاشكال والالوان. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

Senecio elegans (S). شَرَوْنَةُ الْفَرِيْقِيَّة
Sénéceon d'Afrique, S. des Indes (F).
 نوع من الشروة وهي عشبة حولية ومعمرة تملو نحو ٢٠ الى ٦٠ سم. أوراقها سنانية التصل، زهاء البشرة. ازهارها وريدية او ليلية البتلات. اقوامها الى الصفرة، قنابها موشحة بالاصيد. ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

Senecio aurantiacus (S). Sénéceon orangé (F). شَرَوْنَةُ بَرُونَقَالِيَّة
 نوع من الشروة وهي عشبة ريفية معمرة تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها قليلة الحسل والزغب، فضية الحسل، لمبة المقعدة. ازهارها برنقالية اللون، عمراء القرمص، صغيرة الحلق. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

Senecio sagittifolius (S). شَرَوْنَةُ سَهْمِيَّة
Sénéceon à feuilles sagittales (F).
 نوع من الشروة وهي جنبة جادة معمرة تملو نحو ثلاثة اقطار. أوراقها سمية الشكل والسفل منها كبيرة فاشرة تطول نحو ١٠٠ سم. وتعرض ٤٥. ازهارها كبيرة القند، كثيرة العدد، حلقية التجميع، ثابته الاذتكاز. قنابها تينة اللون، لسناها حلقية. ازهارها يستمر طوال الخريف.

Senecio vulgaris (S). Sénéceon commun (F). Common groundsel (E). شَرَوْنَةُ شَالِكَة، بَابُونَج الطير
 نوع من الشروة وهي عشبة برية حولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. أوراقها سنانية التصل، شمرية الحافة، زهاء البشرة على مسطحها السفلي. ازهارها صفراء اللون، عابطة القرمص. يكثر ويوجد في الاراضي المزدرة. تأنفها الملائية لحسونة أوراقها وروائها. يتحولون لها طية تنظم الحسل وتقويه.

Senecio scandens (S). شَرَوْنَةُ عَوَكُوشَة
Sénéceon grimpant (F).

نوع من الشروة وهي جنبة سريرية عائرة معمرة تملو نحو ٥ اقطار. فروجها متراكبة نداء. أوراقها اطيالية مسطحة الزام الاخير، تصلها خلي البشرة على مسطحها رؤوسها الزهرية ثمانية التركيب، حلقية التجميع، ثابته الاذتكاز. ازهارها يستمر طوال الخريف.



شروة شاملة



شراط

Dessiccation totale (F). شُرَاكَزَة ١٥٢٧٥ -

Total desiccation (E). شُرَاثِي شُرَاثِي : كان يابساً جداً .

Encyrtus (S). ١٥٢٧٦ - شُرَاثِي ٥

Encyrtus (F). Encyrtus (E).

الواحدة شُرَاثِي . جنس حشرات نافعة من فصيلة الخنثريات .
انواعها متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المحمية
الحارة . جميعها تتطفل على الحشرات الضارة من الخنافس
والمنقبضات . اجسامها صغيرة ، اسطوانية الشكل ، تعلل
نحو ٢ م . اجنتها شفافة ، شفافة ، كبيرة عند الشقين .
ألوانها سوية الألوان القاتمة .

Schizogonia (S). ١٥٢٧٧ - شُرَاكَلَة ٥

Schizogony (E).

الشُرَاكَلَة ملوكة تكاثرية غامس تسلكه البويضات الاثنية
حيث ان البويضات لا تنجوا الى قد قد عددها يطوي عدد
الجيلات .

Encyrtidae (S). ١٥٢٧٨ - شُرَاكَلِيَّات ٥

Encyrtidae (F). Encyrtidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شفائيات الاجنحة القصيرة .
اجسامها وانواعها المرفوعة كثيرة العدد . جميعها نافعة
تتطفل على الحشرات المؤذية من ذوات الجناحين ومرششات
الاجنحة . اسطواناتها معظم اقطار العالم باستثناء المناطق
الباردة والاسوائية . حشرات صغيرة القدر قليل نحو
ملليمتر واحد . اجسامها وقرونها الاستشعارية متناهية
الاشكال . رؤوسها مستديرة . جوفها اكبر من بطونها .
مرفقاتها صغيرة مستديرة . انايبها مختلفة . وسيدة اللون ،
وتلب فيها المزاج الاسمح . اهور اجسامها القدار
واللون والبرق والشفرة .

Schizocodon (S). ١٥٢٧٩ - شُرَاكُلَة ٥

Schizocodon (F). Schizocodon (E).

نبات عشبي من مصر من فصيلة الخنثريات . منه الجبال
في المناطق المعتدلة الحارة . ساقه جذبة . اوراقه ابيدة
قرصية الانتساب ، شبه قلبية الشكل ، مستطيلة المالحق .
فصلها جلدية مسنة الحمار . لونها الى الخضار الاسمح
المزاج يطبق حاشى اخر . افران وردية اللون ، قطرها
نحو ٣ سم . ثمرته يستمر من آذار الى نيسان .

Flanc abrupt (F). Abrupt flank (E). شُرَاكُل ١٥٢٨٠ -

جنب البرادي الوبر الحادى .

Osselet (F). Knechte-bone (E). شُرَاكُل ١٥٢٨١ -

كل عظيمة من الحواف القوام كدى شُرَاكُل ج شُرَاكُل شُرَاكُل .

١٥٢٨٢ - شُرَاكُل ٥

الغصيب من الشجر قيل ان يصلح . ج شُرَاكُل .

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E). شُرَاكُل ١٥٢٨٣ -

اسم شامل يطلق على الصخور المنظمة التركيب التي
تنقسم الى صفائح . ج شلاس .

Olipthum (S). ١٥٢٨٤ - شُرَاكُل ٥

جنس شجور مجهرية من فصيلة السحريات . تكاثرها
لاشي ، تتميز بحلقها البوقية المستديرة . بونها كروي
الشكل يحمل حبة عيطة دقيقة . معظم ظهور



شُرَاكُل الما



شُرَاكُل



شُرَاكُل

الاسمر لطوق جلع الرية اليسرى ثم ينحدر نحو الصدر
حيث ينفرع وينقسم . ثانياً للشران السباتي وهو
يقسم الى قسمين : الظاهري الذي يطوي ظاهراً الرأس
والوجه وسطاً القدم ، والباطني الذي يطوي معظم باطن
الجسم . ثانياً شران الطرف العليا والسفلى وهي
الشران الايطي والمعدني والحرفي . رابعاً الشران
السطحية التي تسير تحت الجلد . اثنهما الكبير والمعدني .

١٥٢٦٣ - شُرَاكُل عَصَب (F). Nervure cardaire (F). Tertiary nerve (E).

هو في نصل الاوراق النباتية ، الحرفي النسي الذي ينفرع
من البرق .

١٥٢٦٤ - شُرَاكُل صَبَاكِي هو البراق ، اظله .

Savagene, Franc (F). ١٥٢٦٥ - شُرَاكُل

Wild stock, Ungrafted (E). البتة المحاصلة من برة ولم تطفم ، ج شُرَاكُل .

Radicals (F). ١٥٢٦٦ - شُرَاكُل

هو الجذر ، اظله .

١٥٢٦٧ - شُرَاكُل الما ٥

Sparganium ramosum, S. erectum (S). Sparganier
rigide, Rubanier, Ruben d'eau (F). Common burd-
reed, Knop sedge (E). Astiger Igaikolben (D). Biolo
Chlodo di Dio (I).

نوع من السافرة وهو عشب مائية ممررة من فصيلة البوطيات .
اوراقه متناحية ، حاضنة ، صلبة الشكل ، جامدة لتصل ،
سادة الاطراف . اوراقه ابطية وماعية ، كروية الشكل ،
متناحية . يوجد في مياه البلاد المعتدلة الحارة .

١٥٢٦٨ - شُرَاكُلِيَّات ، رِبَاكِيَّات

Taniidae (S). Taniidae (F). Taniidae (E).

لفصيلة ديد من المنقبضات اجسامها وانواعها حديثة تتطفل
على مختلف الحيران .

١٥٢٦٩ - شُرَاكُل عَصَبِي

هو البذ الخشبي ، اظله .

١٥٢٧٠ - شُرَاكُل هِي شَكَاة لثي ، اظله .

١٥٢٧١ - شُرَاكُل

Amocé (F). Associated (E). هو كل عضو في شركة او جماعة منتظمة .

١٥٢٧٢ - شُرَاكُل في الاثنيك

Cochligé (F). Cochligant (E).

هو من كان مريضاً بمعنى التفاهة او القانين ان يشترك
في دلع دين بالتفاهة مع غيره .

١٥٢٧٣ - شُرَاكُل ٥

Scaurella (S). Scaurella (F). Scaurella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مغطيات الاوتل
وفصيلة القبابيات . انواعها المرفوعة عديدة منتشرة في جميع
بحار العالم . اصنافها صغيرة ، بطيئة ، شفافة ،
مشرية الحمار القاعدي الحادى الرأس . اجسامها شفة
مستطيلة ، صلبة الرزيس ، مسامية الواس الهذبة .

١٥٢٧٤ - شُرَاكُل هو الكشوث الحري ، اظله .

١٥٢٩٣ - شَسَّة خَشْفَرَاك * ، نَقَّارُ أَخْضَر

Gecinua viridis (S). Gécine vert, Pic vert, Pivert (F). Green woodpecker (E).

طائر من الشَّن موطَّع فِجَح الأرباب يمتد من الهند الصينية إلى المرات أوروبية || جسمه بطول نحو ٣٣ سم. ثوبه جميل الألوان الزاكية، متناقل الأخضر والاحمر والأصفر والأسود والأبيض. رأسه احر اللون. ظهوره إلى الأخضر الاصفر الماروج. ائتنيكه اصفر. بطنه إلى الأخضر الفاتح الزاهي. عجمه إلى السوداء الامر وتتركز على خط احر يمتد من قاعدة المنار إلى اعلى المق. جناحه بجملته بالاسود والابيض والاصفر. منقاره حنطي اللون اسود الفيج || يألف الاسراج والمقايات والرياس القريبة من مجاري الماء. تقيح الحشرات واساريمها ويرقنها ويكسها يلقنها بسمرة البرق يمكنه عليها لسانه المنطع الاخاذ. يمتد منه في تجاويف الاشجار. اثناء تصنع من ٥ إلى ٨ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٥ إلى ١٨ يوما.

١٥٢٩٤ - شَسَّي * *Schistose* (E). ما كان منهد التركيب كالشس.

١٥٢٩٥ - شَسَّيْغَة * *Curvuleria* (S). جلس بطور مجهرية من الريديات وصلبة الطهيات. انواعها قليلة العدد جميعها ربة قليلة الاذى تعيش على الانحاء النباتية الدالية || اعراف انواعها شسفة انحروع *(Cur. humata)* التي تعيش على اللحاء البائرة نحو الياس في انحروع والنتا وبفس الحفصيات.

١٥٢٩٦ - شَسَّيْغِدَار * *Tamier* (F). هو الفلشرين ، اطليه . شَسَّكْدَقَب ١٥٢٩٧

قال داود الانطاكي: ولبت يميل الى صفرة واصلو الى الحشرة تته العلم فيه حدة بصرية واجوده المجلوب من دير النوبا. وهو ينفع من الاستقاء والجنين وضر التنفس ويحل البلم ويهد اليك ويهدل الريح .

١٥٢٩٨ - شَسَم * ، عَتِيَن الدِيك، عَصْبَة السُّوس *Abrus pectorius* (S). Abre à régisse, Liane à régisse, Arbre à chapelet, Pois d'Amérique (F). Bond tree, Wild liquorice, Rosary pea (E). Paternosterkraut (D). Falsa liquorizia, Liane regolizia d'America (I). نوع من الابروس وهو جنبة زراعية حارثة. جلورها صناعية تستعمل استعمال الكور. زهرها مستديرة الشكل وقشورها جامدة ، سلية ، جلورية اللون ، سوداء النطقة. تستعمل في صناعة النسجات والقلاية. لهاها دعي يهدل الاسم ويهم من استخرج منه مادة الابرين .

١٥٢٩٩ - شَسَّغَة * هي الانويج والبنينة .

١٥٣٠٠ - شَسَّ * *Elleuchus* (S). جلس حشرات من عذبات الاجنحة وصلبة السويث . انواعها المعروفة مشرة منتشرة في معظم اقطار البلاد المتمدنة الحاررة . منظومة دامن يعيش على المواد النباتية المنحلة وبعضها يعيش على ثبارك الحور والصفصاف || اجسامها صغيرة املحجية الشكل . كواكبا عديدة نائقة ازرقا . الاحادها لاسحة مخددة ، منها انواع ثنائية الفيج وغيرها رباعية . قرونها الاستشارية صلبة الشكل . قواكبا نشطة مستعدة القد . اقاربها تزارون من الشسفة الى السرة يطوا على صناعي . يقبها الى السرة القديمة .

حار يتصل على النباتات الزراعية . اشهرها واضرها شس التبوغ واللغوف واقل .

١٥٢٨٥ - شَسَّ التَّبَوُّغ * *Oplidium nicotianae* (S).

نوع من الشس يسبب سنج الشنيل الفنية ، مركب اليها الكاشفة وغلادها فيلوجا ويقضي عليها || يكاتج بتطير التربة قبل الجرد او يستعمل احد القواطين التنسية المنطقة عنه ظهور اليوم .

١٥٢٨٦ - شَسَّ المَلْفُوف * *Oplidium brassicae, Chytridium brassicae* (S).

نوع من الشس مركب سنج الملفوف وقد يكثر في الشاتل الربوية فيحطب سوق الشنيل عنه سطح الارية وبسبب يدها الجزئي تم انطاسها فوق بعضها ويرياها ويوتا . يكاتج يستعمل احد القواطين التنسية او غيرها من القواطين الحديثة التي يزداد عددها كل يوم .

١٥٢٨٧ - شَسَّ التَفَكُّل * *Oplidium trifolii* (S). نوع من الشس مركب التفل فيلوجا وبسبب يدها || يكاتج يستعمل احد القواطين التنسية وذلك بعد حش التفل عدة وبسيرة لا تتعدى ٢٤ ساعة .

١٥٢٨٨ - شَسَّيْغِي * حَتَكَرِيْغِي ، حَتَكَرِيْغِي *Marginal* (F). *Marginal* (E).

لست تعريفي يطلق على ما هو في الحار او ما جاءه من الماش .

١٥٢٨٩ - شَسَّيْغِيْغَة * *Marginalisme* (F). *Marginalism* (E).

الشسمة نظرية اقتصادية تقول بان تعهد كمية الشيء منوط بدمال الحاجة اليه .

١٥٢٩٠ - شَسَف * الشف : قيسر الذي يشق ويحف .

١٥٢٩١ - شَسَكْس * *Chesac* (S).

Chesac (F). *Chesac* (E). جلس حوالات بحرية من الرخويات معلبات الابريل وصلبة التيجنيات . انواعها الممارسة المعروفة قليلة البد اصلاها بعض مناطق المحيط الاطلسي || اصلاها صغيرة اللون ، مرفاة الشكل ، ملونة وبزخرفة . قواكبا بفسية مسطيلة ، مالة الارويسة العادة المنصين || اعراف انواعها شسكس مديرا *(G. maderensis)* الذي يكثر ويوجد على شواطئ جزيرة مديرا .

١٥٢٩٢ - شَسَن * *Gecinua* (S).

Gécine, Chloropic (F). جلس طير من فصيلة التقاريات يتسلق جلوع الاشجار وينتج قشورها وشكورها في طلب الحشرات واساريمها . انواعها المعروفة قليلة البد . راحته شس || اجسامها تطول من ٣٠ إلى ٣٣ سم. اقاربها متناقلة الالوان الجسيلة يتقلب فيها الاخضر . متابعها غرطية ، مسطيلة ، مخددة . اجسامها متوسطة الحجم والانتفراج . اذنانها رتاجية ابريش . ارباشها قصيرة . اصابعها قوية . غالبا مستعدة الاطراف المحبوبة الحادة || اشهر انواعها الشس الخضر .



شس التبوغ



شس الملفوف



شس التفل



شس غفرا



شس



شس

١٥٣٠٩ - شَعْبُ الْكِثَان * (S). *Melampora lini*

Rouille du lin (F).

فطر مجهرى يتطفل على جميع انواع ضرير الكتان من برية وزراعية فيطبع الأوراق ويظهر بالانتاج . يتطفل أولاً بشكله الايدي في اوائل الربيع حيث يركب نصل الأوراق على صفحته . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب لها الى الصفرة البرتقالية . ويعد اكثال طوره الايدي تملئ ذائفة في طورها الدماغي فطير البشرة من بورخ كليلاب لونه الى الجوزة الزاهية . يكلفه وقتاً أولاً باجتناب الموضع الرطبة . ثانياً باجتناب الارربة القوية الاندماج . ثالثاً باجتناب الاكثار من الاسمدة الفسفافية . رابعاً باستعمال البورد بمعدل ٥ كيلو الدم الواحد .

١٥٣١٠ - شَعْبُ الْمُفَاض * (S). *Melampora evonymi-capreae*

Rouille du fusain (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق وتواقي للمفاض فيرتبط بهنور الايدي الكثيفة التجميع التي تهر صفراء اللون على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى دمايل من الدمايل ، لها الى الجوزة تطبق انسجة الاوراق وتسبب يسلها .

١٥٣١١ - شَعْبِيَّات * (S). *Melamporaceae*

Mélamporacées (F). *Melamporacées* (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الفصليات تتميز بتكوين اعضائها انتشارية (النمائل) تحت البشرة او تحت القاعدة الاودية . ائديتها فارقة طليقة . ذائفتها صفيرة تهر منطفة ثم تنفلق من بويئات فردية كشوة كليفة التجميع . اجناسها عديدة ، اشهرها واعرفها من الوجهة الاقتصادية الفئة التالية : الشعب والشعاب والشعوب والزلفسة والسلاج والشفسة .

١٥٣١٢ - شَعْدَقِي الرَّيح * (F). *Rose des vents*

Compass-card (E).

هو الصنم المشرق به حالياً ليعان مصادر هبوب الرياح . يمثل ١٦ اتجاهاً منها اربعة زفوية وهي الشمال الى الجنوب

١٥٣٠١ - شَيْصٌ ، شَيْكَلَة * (F). *Hameçon*

Fish-hook (E).

خطاف او كلاب صير من فولاذ يثبت في خيط والخطف في صفا طوية . يستعمل لصيد السمك .

١٥٣٠٢ - شَعَاب * (S). *Melamporidium*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الشعيات يتميز بلذائفه الباردة التكات وبدماماته الخفيفة الجليل والشفة . ائديته تركب الاوراق على صفحتها السفلى . مظهره الخارجي بهنور صفيرة برتقالية اللون مبهمة بدون ترتيب الى ان تدخل في طورها الدماغي حيث تأخذ اللون الخليل ثم تنفلق الى انواعه قليلة اعرفها شعاب البتلا وشعاب الشرم .

١٥٣٠٣ - شَعَابُ الْبَتْلَا * (S). *Melamporidium betulinum*

Rouille des feuilles de bouleau (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق البتلا فيذبلها ويسبب سقوطها الباكر الى مظهره الخارجي ، في طوره الدماغي ، يقع فضلة مبهمة لونها الى الصفرة تهر على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى بهنور مكثفة من الخلائج الدماجية الخفيفة اللون الى اشراقه زهيدة لا تسبب المكاثرة .

١٥٣٠٤ - شَعَابُ الشَّرْم * (S). *Melamporidium carpini*

Rouille des feuilles de charme (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الشرم فيؤذيها الى مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب تركب النصل على صفحته السفلى . تهر صفراء اللون ثم تتعرف الى الخليل تطبق لسج الخلل وتسبب الاجبال الباكر . لا يستوجب المكاثرة .

١٥٣٠٥ - شَعْب * (F). *Sécherité des plantes*

Stearility of plants (E).

هو عدم اثمار النبات سببه عارض جومورى يمنع النبات من التثير او يتحول الاضرار الى اوراق من فوط السو .

١٥٣٠٦ - شَعْب * (S). *Melampora*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الشعيات يتميز بلذائفه المبهمة بتكات دوسية . دماياته مرامسة ، وشية الاركتاز لا وثيرة الى انواعه عديدة لا تقل عن ٢٠ لشهرها ما يتبع .

١٥٣٠٧ - شَعْبُ الْحَرَّة * (S). *Melampora rostrupii*

Caoma mercurialis (S). Rouille du peuplier (F).

فطر مجهرى يتطفل بشكله الايدي على الحور فيركب الاوراق والسوق . وهو على الاوراق يقع صنيرة عديدة مبهمة يلعب انتظام تكثر منه الحرات النصل وفي زامه الاشر فضلة وتسبب سقوط الاوراق وضعت الانجار .

١٥٣٠٨ - شَعْبُ الصَّنَوْبَر * (S). *Melampora pinitorqua*

Caoma pinitorquum (S). Rouille tordeuse des rameaux de pins (F).

فطر مجهرى يتطفل بشكله الايدي على غرايمى وتواقي الصنوبر كما يركب بشكله الدماغي اوراق الحور . مظهره الخارجي على تواقي الصنوبر يقع صفير يفضية الشكل طولا نحو ١٢ سم ومرفعا ١٠ يعلوها قصبات صنيرة تشولية تقرح اللحاء وتطرح بالبشرة قصب تحجين النامية ان لم تقصر عليها .



شعاب الشرم




شعاب الحور



شعاب الصنوبر



شعاب الكتان



مستقة، نصلها مالم البشرة شديد الخضار. تزوع لكرها المرفوعة للشكل، الشديدة الحرارة واللينة يمسف الغنيمات الزلينة انحصا الغنيماتين « ث » .

Partager en 2 parties égales (F). **شَطَر** ١٥٣٢٢
To share in equal division (E).

قسم الشيء الى جزئين متساويين .

١٥٣٢٣ - **شَطَطَل كَتِي** *

Sarcidornis melanotos (S).

Sarcidornis noiretre (F).

طائر من فصيلة البليات . اصالته تمتد من المرفقة الاستوائية الى برمانيه في الهند لا جسمه كبير القد مستطيل المتق يعمل في الصفحة العليا من متفاده لخصه لحمية جارية اللون . جناحاه كبيران لا طافان . ذنبه جمد . لونه متراكب الاضمر والبنيض والاسود . مؤخر عنقه وصدره وبطنه الى الياض الاخضر .

Excédent (F). Exceeding (E). **شَطَطَل** ١٥٣٢٤
هو ما زاد او بقي او فاض . يقال لا وكس ولا شطط اي لا نقصان ولا زيادة .

١٥٣٢٥ - **شَطَط السُلْطَة** ، **شَطَط السُلْطَة**

Excès de pouvoir (F). Excess power (E).

هو ان يتجاوز احد القضاة او المأمورين الاداريين حديد سلطه .

١٥٣٢٦ - **شَطَب** *

Discope
جنس اسماك بحرية من فصيلة الفريجات ورتبة شالكات الزمائف . انواعه عديدة جميعها كبيرة القد . جملة المنظر ، مأكلة ، ليليلة السم . طولا يراوح من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اشهرها من اسماك المحيط الهندي وبعضها يعيش في البحر الاحمر || من انواعه المشهورة البهار والشفل والشفل الوردي والشفل الاسمر والمبر .

Discope nigra ١٥٣٢٧ - **شَطَب اسمر**

سمكة من الشفل ، كبيرة القد طولها نحو ٩٠ سم . ثوبها الى الطحلة السوداء . مرتها يتعد من البحر الاحمر الى الخليج الفارسي والهند وسريلنك .

Discope sebae ١٥٣٢٨ - **شَطَب زَوْدِي**

سمكة من الشفل كبيرة القد طولها نحو ١٠٠ سم . لونها الى الوردية الذهب المالح يطولو تخطيط احمر قاطب عتد من القراس الى الفترج . لحمها اللين الطعم مرغوب فيه . تكثر في المياه المعتدلة والاسترالية .

Chaetomys (S). **شَطُوس** *

Chaetomys (F). Chaetomys (E).

حيوان لين قاتم ورصد الجلس والذئب من فصيلة الشجيات موطنة البرازيل . طوله نحو ٥٠ سم وذنبه ٢٥ . رأسه غليظ مفلطح . ذقنيه غطرم . خناتيه مرقطتان عيناه وأذناه صغير . جرابه معتدلة القد . اطافره قوية حادة . ذنبه كاسي القامة . حشيش الباني ، لا اخاذ . شعره حليبي حدي فخر يخطله شوك قصير كاللص ينفض عنه الدفاع من اللبس الى يافئ الغابات والاحراج والمراعي والحقل . يسرح في الليل . يتسلق الأشجار . قبه المواد النباتية على اختلافها .

والجنوب اي لقليلة والشرق اي السبا والغرب اي القبور . واربعة ثمانية وهي الشال الشرق اي الحيف والشال الغربي اي الجرياء والجنوب الشرق اي الازيب والجنوب الغربي اي الصاية . وثمانية ثالثة وهي الشال الشال الشرق اي هيت الشال ، والشرق الشرق الشال اي هيت السبا ، والشرق الشرق الجنوبي اي ازيب قصبا ، والجنوب الجنوبي الشرق اي ازيب الجنوب ، والجنوب الجنوب الغربي اي صابة الجنوب ، والغرب الجنوب اي صابة الغرب ، والغرب الشال اي جرياء الغرب ، والشال الشال الغربي اي جرياء الشال .

Petit de la gazelle (F). **شُوس** ١٥٣١٣
Young gazelle (E).

هو صغير الغزال وينسج جدية . ج اشجار وشواشر .

Mauvais laitère (F). **شُوس** ١٥٣١٤

Bad milk (E).

انثى البهائم القليلة الدر . ج شص وشصا .

Melampoirella ١٥٣١٥ - **شُصْب** *

جنس تطور مجهرية من فصيلة الشصيات . ينسج بدائنه البدية الشكات وبدعاماته الشفافة الجلي وانشاء . طوره الاندي يصل بمسقلان شارب || انواعه قليلة امرتها شصب التنوب .

١٥٣١٦ - **شُصْب التَّوْب** *

Melampoirella caryophyllacearum, Melampoirella cerastii, Acidium elatium (S). Rouille vasculaire du sapin. Balai de sorcière des rameaux de sapin (F).
فلر مجهرية يتصل على التنوب لؤلؤه ويؤده الى السكة (نكتة السامرة) . ظهوره الاخضرية بقدر صغيرة خطية انصبي والقرنبي لا لياسية الشكل والحجم تركيب النصل على صلحة السطيل بمؤازة النصل تنصب الاحادب والذوائب وشصب السكة الذي يشو الأشجار ويؤثر نجما . يكافح بالتصاع يسرق الاغداد المكونة .

١٥٣١٧ - **شَق** هو الشاطي . ج شطوط وشطان .

Tallo (F). Sucker (E). **شَقَة** ، **شَقَة** ١٥٣١٨

اشطاء ج شقوه واشطاءه هي فراخ الفروع . يقال شقا واشطا الفروع فهو مشطلي .

Tristocum (S). **شَقَس** ١٥٣١٩

Tristoc (F). Tristocum (E).

جنس نباتات عشبية ، برقة ، سولية من فصيلة الشجيات . انواعه المرفقة قليلة البلد منها جبال حوض البحر الابيض المتوسط || شكلها قريب للشبه من الخرفال . بعض انواعها شقي . صفها مستطيل ، باعث الخضار . ازهارها منفرج متعاهد السبيلات .

Radiation (F). **شَقَب** ١٥٣٢٠

عمر من جدول او تمليل .

Capiscum concinnum (S). **شَقَة** *

Piment à bouquet rouge (F). Cone pepper (E). Kleine Beisbatsra (D). Pape d'Ape, Pape rosso piccolo (I).

لوع من القليلة وهي بقلة عشبية سولية من الفصيلة الباذنجانية . تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها سمية



شصب التنوب



شَقَة



شَطَط كَتِي



شَطَط



شَطُوس

Toile d'araignée (F). Cobweb (E). **شُع** ١٥٢٤١ -

هو بيت الشبكيون الموشى بالنس.

Andouiller (F). Tine (E). **شُعَاب** ١٥٢٤٢ -

هو الاشعاب الخيطي الذي يحصل في قرون الايل والاريل واليسور. ومن هذه الشعاب يمكن تحييد عمر الحيوان.

Endroit boisé (F). **شُعَاوَر** ١٥٢٤٣ -

Wooded side (E).

الشعار: مكان ذو شجر. وهو الشجر اللطيف او ما كان من الشجر في اين وبلاد من الارض.

Rayon de lumière (F). **شُعَاع** ١٥٢٤٤ -

Ray of light (E).

ضوء الشمس المنسكب الذي تراه مستطراً كالخيل.

Barbes (F). **شُعَاع** ، **شُعَاع** ، **شُعَاع** ١٥٢٤٥ -

Beard, Bristles (E).

هو سنا السنين اذا ليس بها ذاك حل السبله || يقال اشع الزرع اذا اخرج شعاعه.

Actinomeris (S). Actinomère (F). **شُعَاع** ١٥٢٤٦ -

جس نباتات حشوية معمرة من فصيلة المركبات. اوراقه قليلة. اوراقها فتحة الشكل، السفلى منها متعاقبة واعلىها متعاقبة. ازهارها صفراء. ثمرتها كروي الشكل اسفوف. يزورها ملطسة مجنسة ثنائية المسك || اشهر انواعها الشعاع الخيطي وشعاع سكرودا.

Rayon Incident (F). **شُعَاع ساقط** ١٥٢٤٧ -

Incidental ray (E).

١٥٢٤٨ - **شُعَاع سكرودا**

Actinomeris squarrosa, A. alternifolia (S). Actinomère à feuilles alternes (F).

نوع من الشعاع وهو نبات حشوي معمّر يصلو من ١٢٠ الى ١٨٠ سم. اوراقه متعاقبة، مسطحة، مدببة، لائفة، جلدية النصل، مسنة الحافة. ازهاره رؤسية عديدة، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. || ازهاره مخزني.

١٥٢٤٩ - **شُعَاع طبي، حكيكيفة الشكري**

Actinomeris halimifolia (S). Actinomère-Soleil, Herbe au diabète (F). Diabète weed (E). Strahlkraut (D). Erbe du diabète (I).

نوع من الشعاع وهو نبات حشوي معمّر يصلو نحو المتر. اوراقه بيضية لينة لائفة، لها اذن زيب المسنة السفلى. ازهاره رؤسية قطرها من ٥ الى ٨ سم. فيها الى الصفار الشمسي || ازهاره يثمر من نحو الى الجول. يقال انه يلبس السكري.

١٥٢٥٠ - **شُعَاع مَ وَرَاة البنفسجي**

Rayon ultra-violet (F). Ultra-violet ray (E).

١٥٢٥١ - **شُعَاع مخزني**

Rayon cathodique (F). Cathodic ray (E).

١٥٢٥٢ - **شُعَاع**

Radiateur (F). Radiator (E).

جهاز كهربائي يزيد مساحة الاشعاع.

١٥٢٥٣ - **شُعَاعَة**

Actinostome (F).

Actinostomium (E).

الشعاعية تأثير الاشعاع ان ضيائي او ضوئي على نزع النبات.

١٥٢٣٠ - **شُعَتَن**

Diformisme (F). Deformism (E).

هو اليب التناسبي او الخلو من التناسق للمأثور والانسجام المقبول او المتفق.

١٥٢٣١ - **شُعَتِي**

Cespitose (F). Cespitose (E).

نمت تروست به النباتات الكثيرة الاشطاء اعصاب النباتات النجيلية.

١٥٢٣٢ - **شُعَتُوس**

Dissident (F). Dissident (E).

الشطرون من خالف او ناقض الغير.

١٥٢٣٣ - **شُعُوف**

Squalus (S).

Chevaine, Chevesne, Chevenne (F). Chub (E).

جنس اسماك نهريه من فصيلة الشبوطيات مفتوحات الفم. انواعه عديدة منتشرة في معظم بحيرات وانهر البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها وشمية الشكل. زعانفها الظهرية فردية، متوسطة الحجم تقابل الزعانف الخشبية المنقسمة الى شطرين || الوباء حياضه الالوان الخفلة تكثر فيها الزبدة والزرق البنفسجية. جوفها وبلعها فضة الون. زعانفها الى الصفار الاصفر المالح او الى الحمره السمراء اعرف انواعه واشهرها الشبوط الملهول وشبوطه سوي.

١٥٢٣٤ - **شُعُوفَة سَوِي**

Squalus souffia (S).

Chevaine souffie (F). Bull-head (E).

سمكة نهريه يعيش من الشبوط. اعطائها اوراقه والاهار الجراف السريعة التيار || جسمها صلب لثني يطول نحو ١٦ سم. ثوبها الى الزرقه البنفسجية. جانيها وبلعها الى الفضي. زعانفها الى الخضار الاصفر المالح || لجها كائن الصفه، قل من يرغب فيه.

١٥٢٣٥ - **شُعُوفَة مَبْدُودَة**

Squalus caphalus (S). Chevaine commun,

Munier (F). Miller's-thumb, Bull-head (E).

سمكة نهريه يعيش من الشبوط. اعطائها سطح انهز وبحيرات البلاد المعتدلة الحارة || جسمها كبير لثني طويلا نحو ٥٠ سم. ثوبها الى الزرقه الخضراء. ظهرها اصفر من بطنها. زعانفها الى الخضار الاصفر المالح || الاثن تسمى من نيسان الى ايار || لجها متوسط الصفه، ما كويل.

١٥٢٣٦ - **شُعُوبَة**

Allosome (F). Allosome (E).

اسم يطلق على كل ندية فردية كانت ام اكثر موجبة في جيلة الفلانة انما تختلف شكلا وقدما من الشعب العديدة. وقد يترى فيها التبايز الشقي.

١٥٢٣٧ - **شُعُوط**

Secfil (F).

نعت تعريفي يطلق على ما هو قابل الانقسام.

١٥٢٣٨ - **شُعُوف**

Biscourrage (F).

Castration by torsion (E).

فهم خصي الكباش بين حدين وشدها بقصب حتى تذبل.

١٥٢٣٩ - **شُعُوبَة**

Péroné (F). Fibula (E).

قصبه الساق السفرى.

١٥٢٤٠ - **شُعُوبَة**

Racorni (F). Herden (E).

الشطون من اشجر: ما لم يجد ربه صلب من غير ان تلعب نومه.



شطوطه مدبلة

الى السرة الخفيفة بالاسفر. تركب الأيل والاريل والحيور والفر.

١٥٣٧٧ - شُعْرَانِيَّة الْبَشُون

Ornithes metalica (S). *Ornithes du héron* (F).
نوع من الشعراء خفيفة الجثة ، قصيرتها ، طولها نحو ٤ سم. رأسها مستعرض الشكل ، هوائياتها كبيرة ، عظمها حلي الخاز. ثوبها الى الخلف اسفح الموج. تركب البشون والقيق.

١٥٣٧٨ - شُعْرَانِيَّة الْحَتَام

Pseudolynchia maura (S). *Mouche du pigeon* (F).
نوع من الشعراء جثتها مستعرضة مضمورة ، طولها من ٥ الى ٦ سم. ثوبها الى السرة الخفيفة ، هوائياتها كالحلقة. تركب الحام على اعطاف النواهل.

١٥٣٧٩ - شُعْرَانِيَّة الْخَطَف

Craetichina pallida (S). *Anaphe pale* (F).
نوع من الشعراء. طولها نحو ٦ سم. ثوبها حلي اللون ، اغبر الموج. جناحها مردنية الشكل ، صغيرة القد ، بطنها غليظ المؤخر فارق الطرف. تركب الخطف.

١٥٣٨٠ - شُعْرَانِيَّة الْخَيْل

Hippobosca equina (S). *Hippobosque du cheval* (F).
نوع من الشعراء جثتها خفيفة الشكل مضمورة ، طولها نحو ٧ الى ٨ سم. ثوبها الى الصهوة السراء. جناحها مستطيل شفاف. بطنها مستعرض الشكل مذهب الطرف. تركب الخيل والافشار والكلاب.

Stenapteryx hirundinis (S). *Mouche de l'hirondelle* (F).
نوع من الشعراء طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى السرة العابقة جناحها مستطيل ضيق. بطنها فارق الطرف ، تركب السنونو وقد تصيب الانسان فتله.

Ornithomyia avicularia (S). *Ornithomyia avculaire* (F).
نوع من الشعراء خفيفة الصدر ، نحيلة البطن ، طولها نحو ٦ سم. ثوبها الى الفريدة السراء. تركب الحيل على اختلاف فصائله وأنواعه من الكواسر الى الجواثم والمواجن.

Melophagus ovinus (S). *Mélophe du mouton* (F).
نوع من الشعراء العادة الاجنحة. طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى السرة الخفيفة النبراء الموج. رأسها صغير القد ، مقطوع الشكل ، غائر في الصدر ، عظمها دقيق مستطيل ، بطنها وسيد الفرجة المستديرة عديم التضيز. ثوبها زبد الجسم ، سادة الخالب. تركب الغنم فتفذيها.

Hippobosca capensis (S). *Hippobosque des chiens* (F).
نوع من الشعراء طولها نحو ٨ سم. ثوبها الى الطلعة الكبراء يصلوها موج اسفح. جثتها مستطيلة ، جناحها متوسطا الطول ، هوائياتها بلون المناب ، تركب الكلاب والذئاب والكلاب.

١٥٣٨١ - شُعْرَانِيَّة

عشب اعصر يقرب الى الثمرة (ابو حنبله).

١٥٣٨٢ - شُعْرَانِيَّة

هي الثبر ، اطليه.

Radiá (F). *Radiant, Radiata* (E). **شُعَاعِيَّة**
نمت تعريفي تصف به الازهار والحيوانات الدنيا الشاعية الشكل.

Radiare (F). *Radiate* (E). **شُعَاعِيَّة**
ما كان تنظيمه او ترتيبه او تجهيزه شعاعي الشكل.

Radiolaires (F). **شُعَاعِيَّات**
Radiolarian (E).
رقة كائنات حيوانية دنيا من الخفريات.

Radiós (F). **شُعَاعِيَّة**
Radiant, Radiata (E).
سبط من فصيلة المركبات منه الاسطر والاقصون البهار وحشيفة السمال.

Sección **شُعْبَة**
الثبة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الطائفة ويقل الطبقة.

شُعْبَة **شُعْبَة**
هو ابن آوى الخندي ، اطليه.

Plasmode (F). *Plasmodium* (E). **شُعْبَة**
ركبة في السج النباتية الحية يسببها تجميع بعض الفطور الدنيا.

Pelage (F). *Coat* (E). **شُعْر**
هو الثوب الذي يطلى به الحيوان الثديي وقد يكون من الثمر او الصوف او الور.

Poll (F). *Hair* (E). **شُعْر**
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شجرة وبني مركبة من جزين : ا. الجذر الملتصق في الجذع وهو الذي ينبت بالصلة تلتها غدة هضبة تفرز المادة الزيتية اللازمة وسم الشجرة الخازني الخيطي الشكل الخلف الطويل والحلقة واللون.

شُعْر الأَرْض هو كزبرة البئر ، اطليه.

شُعْر الأَرْتَب هو ذيل الارباب ، اطليه.

شُعْر البَيْت هو الصمصاف الرومي ، اطليه.

شُعْر الجَيْن هو كزبرة البئر ، اطليه.

شُعْر الخُوْط هو كزبرة البئر ، اطليه.

شُعْر الخُتْلُو هو التام الساني ، اطليه.

شُعْرَانِيَّة *Hippobosque* (F). *Hippobosca* (E).
جنس ذباب لاسع من فصيلة الشعراويات. انواعه عديدة بعضها صغيرة القد. قوتها الدم تنمسه من الثدييات والحليز وبذ ان تلهب الجلد بلذنها المولم.

شُعْرَانِيَّة الْإِيْثِل *Hippobosca camelina* (S). *Hippobosque du chameau* (F).
نوع من الشعراء السراء الذين طولها نحو ٦ سم. تركب الأيل فتفذيها وقد تسبب لها الجرب.

شُعْرَانِيَّة الْإِيْثِل *Lipoptena cervi* (S). *Lipoptène du cerf* (F).
نوع من الشعراء خفيفة الجثة طولها من ٤ الى ٦ سم. ثوبها



شعراء الأيل



شعراء الحام



شعراء الخيل



شعراء الطير



شعراء الغنم



شعراء الكلاب

١٥٣٨٢ - شَعْرَائِيَّات

هي التبريات فصيلة خشرات من ذوات الجناحين، اطبا.

١٥٣٨٣ - شَعْرَائِيَّات

Hippoboscidae (S). Hippoboscidae (F).
فصيلة خشرات ذبابة من رتبة ذوات الجناحين، اجنتها وانواعها زهاء ١٠٠ اجسامها صلبة. اجنتها، عند وجودها، مستطيلة. رؤوسها صغيرة مفلطحة. اعطالها ثاقبة ماصة. قرونها الامتصاصية اسطوانة الفاصلة، دقيقة، غائرة. صدورها غليظة. بطنها مبطنة. غطائها سادة. مكها ينقف في جيب الزكة تحته الاثر او بالاسرى تنصه يرقاق كاملة تخرج بعد وضعها بساعة ثم تنحول الى طاردي بعد بضعة ساعات || تنوش طليقة ما لا تحصى من دم الطير والثدييات.

١٥٣٨٤ - شَعْرُور

هو القريون الخزني، اطبا.

١٥٣٨٥ - شَعْرُورَة

ثمرة القفا الصغيرة القدة.

١٥٣٨٦ - شَعْرُورِي شَامِيَّة، شَعْرُورِي شَمِيَّة

Procyon (F). Procyon (E).
ثلاثة اسماء لنم نير من كوكبة الكلب الاصفر يمد من الارض نحو حشر سنوات غريبة. وهو من منازل القمر. راجع فضياء.

١٥٣٨٧ - شَعْرُورِي بِمَالِيَّة، شَعْرُورِي هَبْرَة

أَبْرَق

Canticule, Sirius (F). Canticule, Sirius (E).

الشعري البالية والشعري البور والأبرق ثلاثة اسماء لنم واحد من كوكبة الكلب الاكبر يعتبر الم نجم في الفناء || من اسماء البراقبين ان سهرق اقبل من ناحية اليمن واقلت الشعران، البالية والشامية، من ناحية الشام حتى انتهى السمر الى اخرة. فوقف كل من الفريقين على شاطئ الجرة وضغطها سهيل فاجلجاء على الزواج وصيرت اليه البالية منها قليل لما الشعري البور. ولم تسقط الشامية ان تير فوقف تكي وتقول السمر الحارة من حينها الفاضلين قليل لما الشعري البالية.

١٥٣٨٨ - شَعْرُورِي

Capillaire (F). Capillary (E).
نمت وصني وتسمى يلقب على ما له علاقة بالشعر ويل ما يشبه الشعر كالانابيب الشعرية والقرايين الشعرية الخ.

١٥٣٨٩ - شَعْرُورَة

Caryota urens (S). Caryota briliante (F).
نوع من نخل الكريه منه الهند والبنغال والكوشئين وجزر الزايج. ساقه متضعبة اسطوانية تملو نحو ٢٠ م. قطرها يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. سفلها ثنائي التركيب، مؤسسي الشكل، غليظ الكرب، يطول نحو ٤ اشر ويبرس من ٣ الى ٤ || تنامر ما كولة لكنها حريفة الثغور يستخرج منها حن الكريه || وقد يزرع للزئين وهو من النباتات البليقة النمو الجنبيلة الخشار السفتي.

١٥٣٩٠ - شَعْرُور

Cocotier commun (F).
هو الجوز الهندي. اطبا نارجيل معروف.

١٥٣٩١ - شَعْف

Ecorce de prosopie (F).
هو قشر الناف.

١٥٣٩٢ - شَعْفَة

Calson (F). Calson (E).
الشفة من كل شيء اعلاه ومن الكساء رأسها ومن الجبل رأسه. ج. شفت وشيف وشفات وشفات.

١٥٣٩٣ - شَعْفَة، نَعْفَة، قَطْرَة

Goutte (F).
قطرة الواحدة من المطر او من اي سائل كان. ج. شفت.

١٥٣٩٤ - شَعْل

يئس في ناحية الفرس او ذبه وقد يكون في الفذل.

١٥٣٩٥ - شَعْن

Fane (F). Hauler, Dead leaf (E).
ما تآثر من ورق الشب ويخطف النبات بعد ذبوله.

١٥٣٩٦ - شَعْبَر

هو ابن كوى الصحراء، اطبا.

١٥٣٩٧ - شَعُور مَكَة

Pois absorbants (F).
شور دقيقة في اطراف الجذرات تحس بالتحال الباعلي اللواد المنفنية اللابية في ماء القرة فتمتلها وتصيرها اتسغ البابل اي اللبخ الصاعد.

١٥٣٩٨ - شَعْبَات

Bronchies (F). Bronchia (E).
اضاء التنفس في الحشرات تقوم مقام الرقة في الحويان.

١٥٣٩٩ - شَعِير، شَعِيرُور

Hordeum (S). Orge (F). Barley (E). Gersta (D). Orzo (I).

جنس نباتات عشية حولية برية وزراعية من فصيلة النجيليات. ينبت من القمم النباتات الزراعية ورأسها انتشاراً نظراً لقدرته على احتياك الماخات المنطوقة فهو يزرع وينتج في البائرة القطبية الشمالية كما يزرع وينتج في بطن الصحراء || انواعه ١٢ منتشرة في جميع اصقاع العالم. منها نوع زراعي هو الشعير المعروف بأخر تركبي ينس الشعير الاخر وطرة انواع برية اخرىها ما ينس. شعير القفار

١٥٤٠٠ - شَعِير لَيْس

Egipso (F).
هو البورج، نبات عشبي بري من النجيليات.

١٥٤٠١ - شَعِير أَقْطَر

Hordeum jubatum (S).
Orge en crinière (F).

نوع من الشعير البري الحولي يزرع للزئين وهو كثير الانتشاء يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. ساقه مستطيلة متدلية تطول نحو ١١ سم. شامها كثيف التجميع، تحيل القدة، وردى اللون || اسبالة يادوم من حزيران الى تموز وأب.

١٥٤٠٢ - شَعِير الْكُتْبَان، أَيْمُوس الرمال

Elymus arenarius (S). Elyme des sables (F). Lyme grass, Mac-grass (E). Sandhargras, Serandhafer (D). Elymo delle sabbie (I).

نوع من الايبوس وهو نبات عشبي جشودي مصر من فصيلة النجيليات يعيش في الرمال القاحلة ويستعمل لاستقرارها وتثبيتها.

١٥٤٠٣ - شَعِير هَعْرُوف

Hordeum vulgare (S).
Orge commun (F). Common barley (E). Saatgersta, Gersta (D). Orzo comune (I).

النوع الزراعي من الشعير. وهو نبات حولي عائد



شعاع



شعر الكلبان



شعير معروف

1٥٤٠٦ - **شَعَكَار** (E). *Désérénce* (F). *Escheat* (E).
هي صفة الميراث التي لا يرث فيها أحد خذو آل بيت المال أو الحكومة .

1٥٤٠٧ - **شَعَلَاكَة** (E). *Silex* (F). *Silex*, *Flint* (E).
حجر من الكفر قسده يوك شرارة .

1٥٤٠٨ - **شَعْرُور** (F). *Cyrtandrus* (S). *Cyrtandra* (F).
جنس نباتات شحية وجبنيّة من فصيلة الشفروريات .
أنواع المروية نحو ٦٥ منظمها بري وبعضها زراعي .
زيتي ، مهدا المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية .

1٥٤٠٩ - **شَعْرُورِيَات** (S). *Cyrtandraceae* (S).
Cyrtandraceae (E). *Cyrtandraceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدة النعالة . اجناسها
وأولمها كثيرة البلد جميعها حسة اذوات . جميعها من
نباتات المناطق الحارة والاشترالية || أرواقها كاملة
منقطة لا تقايمة التريب ، ثمارها حبة حشكة .

1٥٤١٠ - **شَعَف** ، **شَعَلَاك** ، **شَعَلُور** ، **شَعَب**
غلاف القلب . *Pericardium* (E). *Péricard* (F).

1٥٤١١ - **شَعْنُوب** ، **شَعْنُوبِيَة** (F). *Pousse anticipée* (F).
هو الفصن الربط النضر الحول المر . ج شغاب
وشغاب .

1٥٤١٢ - **شَعَوَاك** (E). *Aigle* (F). *Eagle* (E).
هي العقاب سميت بذلك للضل منقارها الاعمل على الاسفل .

1٥٤١٣ - **شَعِيْرَة** (F). *Aiguille à enfiler* (F).
مير جهلي مستطيل ، مبسط النصل الحاد ، مدبب
الطرف ، يستعمل في شك اذوال التبع .

1٥٤١٤ - **شَعَاكَة المَحْطُوط** ٥
Chellinus mediterraneus (S).
Chellin de la Méditerranée (F).
Chellinus mediterraneus (E).

سكة بحرية بيوض من فصيلة الكيدسيات شاككات الزمانف .
اصطانتها منظم اقاليم البحر الابيض المتوسط || سرسها
المباح وبماضب النشاف . قشها النباتات البحرية والبدانف
والمداد الضوية || جسمها اعطليجي الشكل ، مستدل
التيطوط ، يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . حرافها كبيرة .
نورها الى الزرقة السراء وملوحا مولوج آخر يقب في الرأس
والظهر ويبر ويبيض في البطن . زانفها الى الاربعة البحرية
ملوحا بلنجع منترش آخر في الظهرية والشرجية والذيلية ||
رأسها مخروطي الشكل ، غليظ الشفة العليا المشطعة .
شغلها مستدل الانفراج . استانتها قاطعة مشطة الحدة .
صنيرتان ، مستديرتان ، ماصتان . زانفها الظهرية
والخوضية والشرجية تحوي بعض المناس الحادة . زانفها
الذيلية محدة الطرف || لها جبد الصف ، مرفوب فيه .

1٥٤١٥ - **شَعَاوِي** ٥
Dipus gerbois (S).
Gerbois gerbois (F).
نوع من البرابيع الافريقية . يقال لها شأن البرابيع وزفول
القبيل وهي اسمها وافضلها : يكون في اذنانها طول وصلها
بعض الحب . اجسامها ربة الجفة تطول نحو ٢٥ سم .
اما اذنانها فتطول نحو ٢٢ سم . اولها الى الصبهة
الربداء وملوحا مولوج اسمر .

القروب والاصرام ، شائع الزراعة ، مستدل الانتاج حيه
يحوى ٩٠ ٪ من النشا يستعمل في غذاء الانسان والحيوان
وفي صناعة الجعة (كبير) ويورها من المستامات الكسولة .
ينبت في جميع اقاليم الحفنة ويفرطها قدرة على مقاومة
الحر والبرد . يرغب في الاربة التي لا تقتصر الى الكلس
ودو في الاربة المتوسطة الاندماج ، السيقنة التور ،
أولر انتاجا واحسن صفا . وفي حالة امتداد التور
الزراعية يحد حطب الحفنة والبطاطا والشمندر والقمطن
وعطلف التفتايات . وين خصائصه انه لا يكثر من تحيل
النقل الا في فترتين من دورته الحياتية . الفترة الاول
تستمر من الاندماج الى الاسبال والفترة الثانية من الانزهار
الى النضج || ساقه جوفاء مستطيلة السلايات . اوراقه
صغيرة الشكل ، اذنية الهند . مستطيلة النصل . سلبته
متصلة القذ ، ثلاثية الصف والسيلايت . زهره ثلاثية
الاصمية . رباعية الصفات القصية الى جداليتين
وبشرتين || غروب كثيرة البلد تقسم الى ثلاثة اشكال :
- قسم الشعير السداسي الحب وهو الذي تقطع جميع
ازهاره فيكون صف سيلياته من ثلاث حبات يتقابل
صف مائل من ثلاث حبات .

- قسم الشعير الرباعي الحب وهو الذي تقطع فيه الزهرة
الوسطى فيكون صف سيلياته من سبتين يتقابل صف
مائل من حبتين .

- قسم الشعير الثنائي الحب وهو الذي تقطع وتضرب
فيه الزهرة الوسطى دون غيرها فيكون صف سيلياته من
حبة واحدة يتقابل صف مائل وسيد الحبة .
اشهر غروب واعما زراعة ما يتبع .

الشعير الاجرد ، شعير سموي *Hordeum coeleste* (S).
Orge céleste, *O. nue* (F).
سداسي الصف ، اجرد الحبة يرغب في الاربة الفتية
والاقالم الرطبة .

الشعير الاسود *Hordeum nigrum* (S). *Orge noire* (F).
رباعي الصف . كبير الحبة ، اسود الحسكة . يجد في
جميع الاربة المعتدلة الحسب . وهو من الانواع الوفرة
الانتاج .

الشعير الحسب ، شعيرة *Hordeum hexastichum* (S).
Orge hexagonale, *O. à six rangs* (F).
سداسي الصف ، حديد الاصرام جميعها وافة الانتاج
يرغب في الاربة الحسبة التي لا تقتصرها الرطوبة الزائدة .

الشعير المروحي *Hordeum macrotum* (S).
Orge en éventail (F).

رباعي الصف ، كبير الحبة ، منظم الانتاج في الاراضي
المروية يهد في الزراعات المحلية ، لكنه يرغب في الاربة
الحسبة الصيقة التور .

الشعير النحوي *Hordeum tetrastichum* (S).
Orge à quatre rangs (F).
رباعي الصف ، متوسط الحبة ، مستدل الانتاج يحد
في جميع الاربة المحلية ومنها الخفيفة والقليلة التور .

1٥٤١٤ - **شَعِيرَاك** ، **شَعِيرَاك** ٥
Amygd
خبرة منقلة تربد في الرضاب وفي النبات ولذا تدعى خيرة
الشعير التاش ، تذيب في الماء حين الحبوب وتستعمل في
تحويل النشا الى ملوز .

1٥٤١٥ - **شَعَاكَة** (E). *Asymétrie* (F). *Asymmetry* (E).
هو عدم التناظر أو التبادل .



شَفَارَة لَمَرْطُوط



شَفَاوِي

- ١٥٤١٦ - شَفَاف Hyalin (F). Hyaline (E).
ما كانت ظواهره كالتزجاج .
- ١٥٤١٧ - شَفَاف Coquette (F).
سمكة بحرية تدعى كيمدة ملونة ، اطلها .
- ١٥٤١٨ - شَفَان Vent froid (F). Cold wind (E).
الريح الباردة مهما كان مهجا .
- ١٥٤١٩ - شَكَاة Labium, Labre, Lèvre شَكَاة
الشفة من الحيوان والخرقة ؛ طبق له . وما شفتان مليا
وسفل تستران الفم وما فيه .
- ١٥٤٢٠ - شَكَاة Syngénésie (F). Syngenesia (E).
هي التتصام الاندية بواسطة المآبر .
- ١٥٤٢١ - شَكَدَع Ralesto
هو الشرفوف .
- ١٥٤٢٢ - شَكْر Lèvre de la vulve (F).
Lip of vulva (E).
سرف الفرج من ناحية الأنثوية وما شفران .
- ١٥٤٢٣ - شَفِيرِد Stacholins (S). Stacholine (F).
جلس شجيرات ونباتات مسممة من فصيلة المركبات .
انواعه المعروفة قليلة الابد منها بعض مناطق حوض
البحر الابيض المتوسط || سفلها متصبية ترتفع من ٦٠
الى ١٢٠ سم . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، مدببة ، سنانية
التصال الخليلية البذرة ، الفضية الصلصات الحفل .
انزهارها حثكولي التجميع . انزهارها صغيرة الله ، متباينة
الالوان منها البنفسجي الوردى المزج ومنها الازرقاني ||
انزهارها يستمر من ايار الى ايلول .
- ١٥٤٢٤ - شَفُورُوس أصغر Urtica lutea (S).
Sphéogoyne jeune (F).
عشبة تزيينية حولية ، من فصيلة المركبات . مهدها
افريقية الجنوبية || ساقها فرعاء تملو نحو ٦٠ سم .
اوراقها متعاقبة مفردة ولسنة . رؤوسها الزهرية الى
الصغار الكثيرة الزاهي . جلها ارجواني || انزهارها يستمر
من حزيران الى ايلول .
- ١٥٤٢٥ - شَفُورُوس أبيض Urtica pulehra (S).
Sphéogoyne élégante (F).
عشبة تزيينية حولية من فصيلة المركبات . ساقها فرعاء
تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقها متعاقبة مفردة شبيهة
بأوراق البانينج . انزهارها طرفي . انزهارها رؤسية .
رؤوسها برتقالية اللسان ، صفراء الطياب ، مطوقة
بالاسود || انزهارها يستمر من حزيران الى ايلول ايلول .
- ١٥٤٢٦ - شَفِيرِد Shepherdia (S).
Shépherdie (F).
جلس شجيرات حرجية وزيينية من فصيلة الخلائيات .
انواعه المعروفة اربعة . تملو من متر الى ستة أمتار .
اوراقها كاملة ، مدببة ، متعاقبة ، حابلة . انزهارها
سنبل او مخنوقية التجميع . انزهارها ثنائية المسكن ، صفراء
اللون . ثمارها كروية الشكل ، برتقالية اللون ، قشرها
من ٤ الى ٨ سم . || أشهر انواعها ما يلي .
- ١٥٤٢٧ - شَفِيرِد فضي Shepherdia argentea (S). Shépherdie argentea (F).
Silver shepherdia (E).
نوع من الشفريد ، شجيرة تملو نحو ٥ أمتار . اغصانها
شائكة . اوراقها فضية ، سنانية ، مستطيلة ، نصلها
حرجي البشرة النضبة على صفحتيه . ثمارها حلوة مأكولة .
تزرع كزيتون .
- ١٥٤٢٨ - شَفِيرِد كندة Shepherdia canadensis (S). Shépherdie du Canada (F).
نوع من الشفريد ، شجيرة تملو من متر الى ثلاثة أمتار .
اغصانها مرسة . اوراقها فضية الشكل . نصلها اخضر
الصفحة العليا ابيض السفل برتقالي حرجية خلية . ثمارها
تقبة . تزرع كزيتون .
- ١٥٤٢٩ - شَكَش Umbra
جلس اثمار نخرية تملو بالفلا ، اطلها .
- ١٥٤٣٠ - شَكَش Umbra (S). Ombrine (F).
جلس اثمار بحرية من فصيلة البهاريات . انواعه المعروفة
قليلة ، اقلها يتعد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر
فالتوسط فالبحر الاطلسي الجنوبي || أشهر انواعه
واعها الشغف البليل .
- ١٥٤٣١ - شَكَش صَبْدَل كَرْتَل Umbra cinerea (S). Ombrine commune (F).
نوع من الشغف وهو سمكة مأكولة كبيرة الله ، اطلها
الشكل ، ودية لكك الاسفل . مستطيلة الزعنفة الظهرية .
ظهورها اصفر اللون ، لزرق التمشيح . يميل الى الرودة
الفضية . ممرها على حدود المياه الاقليمية . يقترب من
المباحث والكشوطي في فصل الشتاء والربيع .
- ١٥٤٣٢ - شَكَشُوف هو الضمير . اطلها .
- ١٥٤٣٣ - شَفُع Pair (F). Even (E).
ازواج من العدد . شفه وتر .
- ١٥٤٣٤ - شَفَعَة Prémption (F). Preamption (E).
حق ينقله التآني في شراء مال معين . راجع حق الشفعة .
- ١٥٤٣٥ - شَفَعِيَة التَرْكِيب Paripennae (F).
Paripinnate (E).
نمت وصفي يطلق على الاوراق المركبة المتباعدة بوراتين
متقابلتين .
- ١٥٤٣٦ - شَكَل Crépuscule (F). Twilight (E).
هو الضوء الذي يشاهد بعد الغروب نتيجة لانكسار
ضوء الشمس على تحت الاقار على السحب او ذرات الغبار
المنتشرة في الجو . وقد تختلف فترة الشفق مع المكان فهنا
هي قصيرة جداً عند خط الاستواء اذ هنا تمتد بضع
ساعات عند القطبين .
- ١٥٤٣٧ - شَكَلِي ، شَكَلِي Crépuscule (F).
Crépuscule (E).
نعت يطلق على ما هو متعلق بالشفق كقولك الشفق الشفقي
ومشرقة شفقي المرتج اي انها ترتج في ذن الشفق .
- ١٥٤٣٨ - شَكَل ، شَفَكَة في اللقانة ، اطلها .



شفق بلبيل

Aclaste (F). Aclast (E). ١٥٤٤٦ - **شَقْرُف** *
نمت تعريفي يطلق على الاجسام التي تحفرها او تنفذ منها اشنة الثور دون ان تنكسر .
Labial ١٥٤٤٧ - **شَقْرِيَّ**
ما كان له صلة بالشفة .

Labiate (S). ١٥٤٤٨ - **شَقْرِيَّات**
Labiales (F). Labiatos (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها المعروفة زهاء ٢٦٠٠ تنتمي الى ١٤٠ جنساً تجسدها ستة اسباط . معظمها نباتات عشبية وبضها جنبات مفصلة السوق . اوراقها زياه ، كاملة ، متقابلة . جميعها عطري ومنظمها طلي .

Chilognathes (F). ١٥٤٤٩ - **شَقْرِيَّةُ الْأَحْشَاك**
رَبِيَّة دوبيات من كثريرات الارجل تشمل جنس فصائل .
جميعها اسطوانية الشكل ، مستطيلة . معظمها من الربويات القليلة الغمر العادة السم .

Chilopoda (S). ١٥٤٥٠ - **شَقْرِيَّةُ الْأَرْجُل**
Chilopodes (F). Hundred-legged worms, Centipedes (E). Hundertfüßler (D).
رَبِيَّة دوبيات من كثريرات الارجل تشمل اربع فصائل ، جميع دوبياتها من الحشرات السامة المؤذية وقد يبلغ طول بعض اجناسها نحو ٢٠ سم .

Scérigmate (F). Scerigmata (E). ١٥٤٥١ - **شَقْرِيَّة**
زائدة قرنية التركيب تلتف الطوار لحافته في بعض الحشرات .

١٥٤٥٢ - شَقْرِيَّةُ صَهْبَاء * ، **شَقْرِيَّة** * ، **شَقْرِيَّة** *
Omphalia flavida, Stilbella flavida (S). Mancha, Viruela (F).
فطر من الفاريفريات يتطفل في طوره الكندي على اوراق وقمار ولواحي البين فيليبيا لا يظهر على الاوراق بقع نسيجية لا تقياسية الشكل والحجم تسبب جفاف النصل وذبوله الباكر . وهو على الجار يقع مستديرة منخفضة مدببة الاطراف الاجر . ويكون على التوالي رروح مستطيلة تسبب جفاف النصل وانفلاته ويدها لا يكلف باقتناص وجمع وعرق الاضداد المصابة وينضج الاشجار بعد اصحابها بالسوائل التحامية .

١٥٤٥٣ - شَقْرِيَّ
مطر يتخلله خشف او ينمر مع الخشف .

Labelle (F). ١٥٤٥٤ - **شَقْرِيَّة** * ، **شَقْرِيَّة** *
Labellum (E).
هي البتلة العليا من توزيع السطحيات وافصاها . وهي ايضا الطرف القلوب في الاصداغ .

١٥٤٥٥ - شَقْرِيَّة *
Chavica (S). Chavique (F).
جنس نباتات طيبة من فصيلة الفلقليات . انواعها مدببة جميعها عارضة معمرة . اوراقها متعاقبة ، حاضنة ، سنائية الشكل تنصبه النصل . ازهارها قهوي التجميع ، ليد التركيب . ابني الاذنكاز . ثمارها حنية ، يبيض الشكل عطرية العرف لا يتكاثر بالتفصيل يرغب في الارربة القليلة الاندماج الربطة .

Section angulosa (F). ١٥٤٤٩ - **شَقْلَح**
Angulous section (E).
نمت تعريفي توصف به مقاطع سوق النباتات المفصلة . وقد شاع استاده الى السوق الريامية الاسرف .
١٥٤٥٠ - شَقْلَح
هو الكرتة ، اطلها .

Pousse nouvelle (F). ١٥٤٤١ - **شَقْلَح**
New growth (E).
هي الفصن الجديد الرطب قبل بلوغه الحول . ج شفن .

١٥٤٤٢ - شَقْلَحِيَّ *
Nicobar
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحماميات . جمه شفافين . وهو مربوع الجثة : قوي المنقار ، متدل الساق . مستطيل الجناح . قصير الذنب المستدير ، رطل الريش الكثيف ا طوله نحو ٣٨ سم . ثوبه الى الخضار الزاهي ولها ريل يدلو موج اسف . عنقه ملتصق ببعض الريش الطويل الذهبي اللون . اذنيكه ابيض . سقاره اسود . ميناه واقمتاه بلين العقيق لا يعيش على الارض كالحجل بل يرمي اسطافه جنبانه . طيرانه بطي وتقل . يسبح في الماء . قوته الجيوب . يدن عنه في العصور بين الاشجار او في الاذغال الكثيفة . انشاء تصع يعيشين تحضنها بجناوية الذكر نحو ١٧ بيوا .

١٥٤٤٣ - شَقْلَحِيَّ بَحْرِيَّ *
Raja (S).
Rale (F). Ray, Skate (E).

جنس اسماء بحرية غسرفية من مرتبة السفنجيات وفصيلة السفنجيات البحرية . انواعها المعروفة ٤٠ جميعها كبيرة لثة مفصلة للمربع المربع الزوايا الذي يشمل الرأس والصدر . اطرافها تراوح من ٦٥ الى ٢٢٠ سم اقلها تختلف باختلاف الانواع . مرتها العادي في قاع الماء تلتصق الرل بانتشار ما تنقرسه من القشريات والاسماك . وهي على سطح الماء سرية الحركة لتقتل بضعة الطير . لحياها مأكلة لكثبا لا تخلو من طعم خاص يشبه الاسماك ا اعراف وانواعها واشهرها ما يتبع .

Raja clavata (S). شَقْلَحِيَّ اَبُو مَهَاز
Rale bouclée (F). Thornback (E).

R. alba (S). Rale blanche (F). شَقْلَحِيَّ اَبِيض
R. oxyrinchus (S). شَقْلَحِيَّ السمن

Rale à bec pointu, Aîlène (F).
R. torpeda (S). شَقْلَحِيَّ رَصَاد

Rale torpille (F). Torpedo ray (E).
R. marginata (S). شَقْلَحِيَّ ساطع

Rale mirayes, Fumat (F). شَقْلَحِيَّ جيجوز ، فرش
R. chagrines (S).

Rale chagrinée, Flossade (F).
R. circularis (S). Rale ronde (F). شَقْلَحِيَّ مستدير

R. betis (S). Rale شامق ، كركك (F). شَقْلَحِيَّ معروف ، شَقْلَحِيَّ شامق ، كركك
commune, R. candrée, Collart (F). Common ray (E).

radista (S). Rale radée (F). شَقْلَحِيَّ رعرعة ، رعرعة

١٥٤٤٤ - شَقْلَحِيَّاتٌ بَحْرِيَّة
Rajidae (F).
Rajidae (E).

فصيلة اسماء من مرتبة السفنجيات ورَبِيَّة الاشلاق . تشمل السفنجين البحري والمودنه وغيرها .

١٥٤٤٥ - شَقْرُوف
Gelpe orientale (F).
الشقور الزبور الشرقي . ج شفافين .



شَقْلَحِيَّ



شَقْلَحِيَّ بَحْرِي



شَقْرِيَّة صَهْبَاء



شَقْلَح

flower (E). Gartsanemone, Krönenwindröschen (D). *Anemone coronaria*, *Anemone scapula* (I).
نوع من الشقار عديد الشروب والاصرام . يملو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوردته سداة اللين . ساقه فداء . لوراته قلبية التفريص . ازهاره كبيرة القدة ، مسطرة البتلات
نينا الابيض والاخر الازرق والبنفسجي والوردي والبنفسج .
ازهاره يدوم طوال الربيع .



شَقَاة

١٥٤٦٦ - شَقَار الجندل *Anemone pulsatilla* (S). *Anémone des ruisseaux* (F).
نوع من الشقار يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . جلده جني الشكل . اوردته لاسقة . ازهاره خاسية البتلات الزرقاء اللون ، الصفراء الاسدية ، منته صفاف الانهر والجداول .
ازهاره يدوم طوال شهر نيسان .



شَقَار اكليل

١٥٤٦٧ - شَقَار الغلب *Anemone nemorosa* (S). *Anémone des bois*, *Fleur du Vendredi-Saint*, *Sylvie* (F).
نوع من الشقار يملو نحو ٢٥ سم . ساقه مدادة . لوراته معتقة . ازهاره سداسية البتلات ، يضاء اللون او حمراء وبه شروب زرقاء اللون زاحية || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .



شَقَار الغلب

١٥٤٦٨ - شَقَار المصح
هو شقيق النيان الملهل ، اطله .

١٥٤٦٩ - شَقَار اليابان *Anemone japonica* (S). *Anémone du Japon* (F).
نوع من الشقار للكبس يملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . لوراته مركبة ، شقيقة القصوص المسنة الحافة . ازهاره مكسبة ، كبيرة القدة ، كثيرة البتلات التي يراوح حدها من ١٨ الى ٢٤ سم . نينا الالباس الثلجي او البياض الوردي للملج || ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

١٥٤٧٠ - شَقَار بترّي *Anemone sylvestris* (S). *Anémone sauvage*, *A. sylvestre* (F). *Snowdrop anemone* (E). *Grosses windröschen* (D). *Anemone silvestro* (I).
نوع من الشقار يرغب في الاتربة الكلسية وهو من نباتاتها الحولية . يملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . ساقه فردية منتصبة وسيدة الزمرة . اوردته معتقة . ازهاره كبيرة القدة ، يضاء اللون او وردية ، خلية البصرة ، زبده الكرابل التي تبدو ككثف القطن || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .



شَقَار اليابان

١٥٤٧١ - شَقَار كزيمي هورق *Anemone vitifolia* (S). *Anémone à feuilles de vigne* (F).
نوع من الشقار يملو من ٦٠ الى ٨٠ سم . ساقه فداء . لوراته قلبية الشكل ، خاسية التفريص ، نصلها مفاري الحافة ، خلي الصفصفا السفلي . ازهاره كبيرة القدة ، ثمانية البتلات البياض شكلًا ولونًا || ازهاره يدوم طوال شهر ايلول .



شَقَار بري

١٥٤٧٢ - شَقَار كوكبي *Anemone hortensis* (S). *Anémone des jardins*, *A. étolée*, *A. oeil de paon* (F). *Garden anemone*, *Star anemone* (E). *Sternwindröschen* (D). *Anemone stellata* (I).
نوع من الشقار عديد الشروب والاصرام . يملو من ٢٠ الى ٣٥ سم . اوردته ثلاثية او خاسية التفريص ، مسنة الحافة . ازهاره نجمية الشكل ، شقيقة البتلات انقارضة المختلفة الالوان السود الاسدية || ازهاره يستمر من ايار الى سوزان .

١٥٤٧٦ - شَفَوْت *Cheviot*
سلالة شقان مهددا البلاد البريطانية تتميز بنزارة صفها وبيضة صفته .

١٥٤٧٧ - شَقِي *Sexa* (F). *Sex* (E).
هو جلة الصفات الخلقية التي تكن للذكر او للانثى . وهو ايضا مجموعة الافراد من ذوات الاعضاء التناسلية المائلة .

١٥٤٨٨ - شَقَاة هو الكبير ، اطله .

١٥٤٨٩ - شَقَاة *Pigment*
كل مادة صبغية عضوية تلوّن اللصج . ج شقاقات وصبغات وطلائع وصبغاب .

١٥٤٩٠ - شَقَاة *Pteropus* (S). *Rousette* (F).
جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . انواده نحو ٦٠ جميعها ثائرة ، بقره ، كبيرة القدة ، مستطيلة القرطوسية اللافة المدية . ازهارها تختلف مع الانواع لكنها سوية الالوان وتطورها ابيض من اكناتها واعتاقها || اقليمها الهند وافريقية الشرقية وجزر المحيط الهادي حتى استراليا . اشهر انومها ما يتبع .

١٥٤٩١ - شَقَاة الهند *Pteropus medius* (S). *Rousette de l'Inde* (F).
نوع من الشقاقات ، طولها نحو ٢٣ سم . رأسها الى

الجزء . جسمها مثني اسير يطوى ملج . جفوي يخفي السرة او زكيا || موطنها فصح الارض بينه من الهند الى شرق العرب ومن الهند الى سرنكيب وبلقعه وانام . تعيش جماعات كبيرة يراوح حدها من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ . تألف اسراج الخمر وغابات الخيزران تملك بقضبانها ورافدها طول البهار . تسرح في طلب قوتها من القروب الى الشروق . قوتها البهار على اختلاف اجناسها وانومها ما دعا البرتقال .

١٥٤٩٢ - شَقَاة مأكولة *Pteropus edulis* (S). *Rousette comestible* (F).
شقاة كبيرة القدة طولها نحو ٤٥ سم . وبسطنها نحو ١٦٠ جلدها شقن للممس . قرطوسها اسفي الشكل . اذنها مستطيلة ذلقة . لونها الى الخشنى الاسمر ، حايق الظهر والراس ، زامر البق والصدر والابن || موطنها الهند وسومرا وبنار وبنلف . تعيش جماعات متفرقة يراوح حدها من ٥٠ الى ٢٠٠ . تألف الاسج القليلة . مسرها من الشقن الى الفجر . قوتها البهار ويبيض الحبوب . لا تقرب البرتقال . شها ما كوكب يفاعرون به .

١٥٤٩٣ - شَقَار
هو البهار ، مسكة طويلة السنام من الشطط .

١٥٤٩٤ - شَقَار ، شَقَارِي ، شَقَر ، اليمون

١٥٤٩٤ - شَقَار ، شَقَارِي ، شَقَر ، اليمون *Anémone* (F). *Anemone* (S).
جنس نباتات عشبية ، سبروتية ، معمرة من سبط الشفاريات وفصيلة الشفقيات . انواده عديدة مظهرها بري وبسطها زراعي زديني جميل الازهار المتعدة الالوان || اشهر انومها ما يتبع .

١٥٤٩٥ - شَقَار إكيليبي *Anemone coronaria* (S). *Anémone des fleuristes*, *A. à couronne* (F). *Crown anemone*, *Poppy wind-*

هامة ، متكونة التجميع ، مستطيلة المائل || يقال انه مروج الرتبة الجسدية لانه يثير المراكز المرتبطة المهمة بها . وهو مدر للثقل وقد يسقط الحمل في اولى عهده . ويقال ان كثرة استعماله تسبب ردة فعل ناكسة ، مظهرها وزن شامل يعطو حسي مضنك .

١٥٤٨٢ - شَكَل * شَوَلَك

Praslon (S), Praslon (F), Great hedge nettle (E), Klippenlippe (D), Prasinne, Praslon (I).

جنس نباتات جنية برية من فصيلة الشفويات . انواعه قليلة . سيقانها مرعاه . اوراقها متعاقلة ، متعقبة ، نصلها قلبي للشكل ، مسنن الحافة ، عطري الرائحة . ازهارها عطرية العرف ، تنجبه الاوتكاز . قالوا انها لا تنمو من للناضج الغلبة دون ان يحدها .

١٥٤٨٣ - شَكَاكِي الشَّحَان

هو الحيطان الاسويدي ، اطبه .

١٥٤٨٤ - شَكَب

وهو جنة كالكوب ، واحده شقية . وهو شجر له خضرة وورق . ينبت كالزمان وورقه كورق السدر وينتاته كالكوب وفيه ثوبى . (ابو حنيفة) .

١٥٤٨٥ - شَكَب

مهواة ما بين كل جبلين . يقل مدح في كهوف الجبال ويصوبها الشارقة على الاودية يورق فيه العلي . ج شقاب وشقوب .

١٥٤٨٦ - شَكَبَان *

Mégapode (F), Megapod, Mound-bird (E).

جنس طير من فصيلة الشقانيات . انواعه عديدة جميعها كبيرة الجثة طويلا من ٦٠ الى ٩٠ سم . وريثها واضاعتها صلهام مظهر . اجنتها مستديرة ضيقة . ارساغها وعضاها قوية . اقلها الى السرة السوية المتخلفة المراج || تأتف الاحراج القريبة من الشواطئ . تعيش ذكرا وانثى كالحمام . ارساها كثيرة البند . قوتها النار والحبوب والبهان والحشرات || انثاها لا تحسن البيض بل ترصفه في حفن خاص من الرمل والفض والورق تقيمه قرب الشاطئ على حديد مرمى الله . شكله كالقنصوة الكبيرة علو نحو ٤ اشارة وطوله من ٤٠ الى ٤٥ م . || والانثى تبني في موضعها من ١٢ الى ١٥ بيضة بين الواحدة والاخرى ١٣ او ١٤ بيضا || اما البيضاء فتتفت بدد وضعا باسبوسين من فرخ نشيط كاسي . فريش يدبر امر نفسه بدون عناء مستنفا من امه التي يجهلها .

١٥٤٨٧ - شَكَبَانِيَات

Megapodidae (S), Megapodidae (F), Megapodidae (E).

فصيلة طير من رتبة التيجانيات اجناسها اربعة . طيورها متوسطة القند او كبيرة . قوية النصار الاحسن . غالبا مستطيلة . اجنتها كبيرة متعقبة . اقلها الى الاكوان المايقة || اجنتها الشقبان والبطاب والبنق واليتنح . طيورها تتميز بدم حنينا البيض وبالخاصن التي تقيها .

١٥٤٨٨ - شَقَّ

Quartier (F), Quarter (E).

ربع الحيوان الدابوح .

١٥٤٨٩ - شَقَح

شَقَح المجوزة : استخرج ما فيها .

١٥٤٧٣ - شَقَار تَرْجَمِي * ، شَقَار صِيَالِي

Anemone narcissiflora (S), Anémone à fleur de narciss, A. en ombelle (F), Narcissus flowered anemone (E), Bergwindröschen, Narzissen-Anemone (D), Anemolo narciss (I).

نوع من الشقار يلو نحو ٤٠ سم . اوراقه ثلاثية او خماسية للتفرغ ، نصلها خلي البشرة حل مسخته . ازهاره صيوانية التجميع ، مستطيلة الامن ، يضاء اللون ، وردية الصفة الخارجية || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٥٤٧٤ - شَقَارِي

هو الشقار ، راجحه .

١٥٤٧٥ - شَقَارِي *

Psammodites schokari (S), Schokari (F), Schokari sand snake (E).

الاسم النوبي العلمي والفرنسي والاكتليني مأخوذ من العربي . حية يهوس من البراريات وفصيلة الحشويات خليات الاعاويد || جسمها مستطيل الجرم بطول نحو ٦٥ سم .

ثوبها الى الرتبة الحنطية يملوها اربعة عطوط يفيض جانبية ما يحيل مابنها تصرف بالنسبة الى النور من الشقرة الصافية الى الحنطية . مدها غير اسر . رأسها لوزي الشكل . عينها صديرتان فريتان . زاوية خلفها متوسطة الانتراج . عدد اسنانها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى من اصلها اربعة عتاف ثابتة غلظية الاوتكاز || تأتف اقبال والبراري . قوتها كل ما دب وتمكنت منه . تعيش من الثباين المؤدية .

١٥٤٧٦ - شَقَارِيَات

Anémones (F),

سبط من فصيلة الشفويات ، اشهر اجناته الشقار .

١٥٤٧٧ - شَقَارِين

Anémone (F), Anémone (E).

مادة جسمية صالحة ، يضاء اللون ، لا عرف لها ، تستخرج من اوراق الشقار . وهي قليلة الاويان في الماء والكمول والايان . ثلوث وتشتل في السوال القلوية فيتم صبا الحامض الشقاري .

١٥٤٧٨ - شَقَاكَاة

Partibilité (F), Partibility (E).

قابلية الانقسام .

١٥٤٧٩ - شَقَاك

Javert (F), Ulcer on pastern (E).

نخر في اللسع اللببية والندرسوية من الاجزاء السفلى في قوائم الخيل . والشقاق قد يكون :

Javert cutané (F), شقاق جلدي

Javert cartilagineux (F), شقاق غضروفي

Javert tendineux (F), شقاق وتري

١٥٤٨٠ - شَقَاك

Ranchage (F), Dressing (E).

الشقاق او الفتح هو حوث الارض سراحة متباعدة الاكلام .

١٥٤٨١ - شَقَاكَل * ، سِيَسَاكَلِين حِيَشَقَاكَل

جَزَرُ اللَّيْطِي، حَرْمُ اللَّيْلِ

Pastinaca schekakul (S), Sécacul (F), Rough parsnip, Sécacul (E), Schekakul (D), Pastinaca (I).

نوع من السياربون البري وهو نبات طبي عشبي مدمر غليظ الجذر . ساقه اسطوانية فروع تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . اوراقه مركبة ، متعاقبة ، لائحة الصلع . ازهاره



شَقَار رَجَمِي



شَقَارِي



شَقَال



شَقَاك



شَقَاك

١٥٩٠ - شُغ

شُغ وشُغ البسر : تلون . وقد بُني من يمه قبل ان يشُغ || وشُغ التلن : ازمى .

١٥٩١ - شُغَة

الشُغَة : طلبة الكلية قبل مسلك التخصيب من طليتها . قال الفراء : يقال لحياه الكلية طلبة وشُغَة ولذوات الحافر وطليّة .

١٥٩٢ - شُغَطِب

Bâlier à 4 cornes
الكيش الذي له اربعة قرون . ج شُغَطِب وشُغَطِب .

١٥٩٣ - شُغَة

Gomphocarpus (S).
Gomphocarpe, Faux cotonnier (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة السُغَلِيَّات . انواعها قليلة العدد جميعها نباتات متخسبة تنمو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروصها دقيقة زغبية للحاء . اوراقها متطابقة ، سنائية ، خشبة . نصلها اخضر اللون ، ماس البصرة على سطحها . ازهارها خضيرة تتجمع صوبها يمد من ٨ الى ١٢ زهرة لونها ابيض اللامي . وهي من النباتات الكبيرة الامالة والبن || ازهارها ينمو من حزيران الى ايلول .

١٥٩٤ - شُغْدُغ

Grenouille (pectus) (F).
Frog (small) (E).
ضفدع صغير .

١٥٩٥ - شُغْدُغِيَّات

Microhylidae (S).
Microhylidae (F). Microhylidae (E).
فصيلة سبوانات دراهم قازية من لة الحديديات ومرتبة العُشْرِيَّات ورتبة البُزْرَاتِيَّات أي عديمات الذنب || انواعها المعروفة كثيرة العدد لا تقل عن ٢٠٠ منتشرة في جنوبي شرقي آسيا وفي افريقية واسريكة الشمالية والجنوبية || جميعها من الضفادع الصغيرة القد . تتميز بمساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاخبطها ويحدد التنبؤات النطرية الجانبية في بقرة العنبر || رؤوسها صغيرة مستطبة الاضغان . نكوحها العليا مستنة . اصابع قوائمها الامامية طليقة اما الخلفية فلخياصة القيد الحظائي || جلدها متفانية الاشكال وتأتلف لانتظامية التسلل . اوتياها متباينة الالوان تكثر فيها البسرة الداكنة والخضار الاخضر والرزقة والرسنية || منظر انواعها يوشح على النباتات والاشجار القريبة من اللندنان والناثق ويجاري الله || اناثها ، باكرتها المساحة ، تُسَرِّي في الله الفصل . بلاعيطها مائدة الخلف القشري والاسنان الشفوية .

١٥٩٦ - شُغْدُغ

شُغْدُغ هو الحرياء ، اطليبا .

١٥٩٧ - شُغْدُون

Taphius (S). Taphien (F).
جنس غفائيش من عارة الاراسات . انواعها قليلة جميعها صغيرة القد . رؤوسها مسطرفة ، فراطيسها ذاقة . شغلها العليا مشرفة وجعجة || موطنها الهند الصينية . تنبت جهات قليلة العدد . تسرح في الليل . قوتها الحشرات على اختلافها . تألف الاشجار الحرجية لا تنحى الاطوار . واحده شغلة .

١٥٩٨ - شُغَر

شُغَر هو اللندار ، اطليبا .

١٥٩٩ - شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ

شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ
شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ
شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ

١٥٩٠ - شُغَرَقِيّ

شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ
شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ
شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ، شُغَرَقِيّ

من القوامع تجوب مناطق البلاد الحارة . وهي ديمة الجثة ، قوية المتأثر ، متدة الاجنحة الذلقة الاطراف . اذناها مركبة من ١٢ رفة متساوية . الرابها شراكية الالوان الزلجية || قوتها الحشرات والطفلة وفوروز والصفادع . تنش في تجريف الانجرار واقباب المسخور . اناثها تنم نحو ٥ يمشات تحضنها بتناول الذكور || اشهر انواعها ما يلي .

١٥٩٠ - شُغَرَقِيّ اَزْرَقِيّ ، شُغَرَقِيّ شائع

Coracias garrula (S). Rollier
vulgaire, Rollier bleu (F). Common roller (E).
نوع من الشُغَرَقِيّ ، موطنه الشرق الاوسط واروبة الشرقية والجنوبية وبلاد مصر . يحجب مناطق حوض البحر المتوسط مرة في العام . طوله نحو ٣٣ سم . قويه حركب الالوان المتناظرة الزنابية الجميلة . يظل فيها الاضفر والازرق . منظره اسود ، عيناه كستينان ، قاتمتا الى البصرة الحنطية اللامع .



شُغَرَقِيّ اَزْرَقِيّ

١٥٩١ - شُغَرَقِيّ بَنْغَالِيّ ، شُغَرَقِيّ الهند

Coracias benghalensis, C. Indicus (S). Rollier du Bengale (F). Indian roller (E).
نوع من الشُغَرَقِيّ ، موطنه الهند والشرق وجوب الجزيرة افريقية الشرقية والشرق الاوسط . طوله نحو ٣٠ سم . قويه متراكب الالوان الزنابية يظل فيها الازرق والبنيغسي والاصفر والاصفر اللامي . وهو قصير المنار والذنب . مستطيل الجناح . يألف القباب ويجاري الله . سره يد من ٣ الى ٥ ازواج .

١٥٩٢ - شُغَرَقِيّ حَبَشِيّ ، أُغْبِيل

Coracias abyssinicus (S). Rollier abyssin (F). Abyssinian roller (E).
نوع من الشُغَرَقِيّ ، موطنه الحبشة والسودان واين . طوله نحو ٢٧ سم . قويه متراكب الالوان مشح الزرة الزنابية . يتنيز برشتين مستطيلين تكتنفان جانبي الذنب .



شُغَرَقِيّ بَنْغَالِيّ

١٥٩٣ - شُغَرَقِيَّات

Coraciidae (S).
Coraciidae (F). Coraciidae (E).
فصيلة طير من الجُرَامِ تشمل عدة اجناس وانواع تتميز باجسامها الربية واوتياها المركبة الالوان الزنابية . مناثها جالسة ، قوية ، حجة البهرة ، اجنحتها واذناها مغطاة الطول ، ارسافها قصيرة || موطنها يشمل جميع البلاد الحارة والاسرارية . قوتها الحشرات على اختلافها والاسرارية وصغار الطيئيات || تنش اولكها في تجريف الانجرار ولذباب المسخور . اناثها تنم من ٤ الى ٥ يمشات تحضنها بتناول الذكور .

١٥٩٤ - شُغَرَقِيّ اسود ، شُغَرَقِيّ

Anthracoee, Carbon, Rouille noire (F). Anthracnoee, Smut, Stem rust (E).
اسم شامل الملقوق على بعض الامراض الفطرية من غثت الاجناس والانواع اخصها اللدحة والندار والذبول والسببة والنتينة واللصق واللصق والنتينة .

١٥٩٥ - شُغَرَقِيَّات

Urdinidae (F).
فصيلة فلور من اللدحات منظر اجناسها وانواعها ، بحسب الترتيب الحديث ، لا علاقه له بالاقتصاد الزراعي .

١٥٩٦ - شُغَرَقِيّ

All souvage (F).
هو القوم البري ، اطليبا .

1٥٥٢١ - شُقِيص Copropriétaire (F).
Joint-proprietor (E).
شريك في ملك العقار . يقال هو شُقِيص في العقار .

1٥٥٢٢ - شُقِيصَة Rose des vents (F).
في الفصنق ، اطلبه .

1٥٥٢٣ - شُقِيصِي أَجَر
هو الخشخاش للموت ، اطلبه .

1٥٥٢٤ - شُقِيصِي الْجَبَل
هو الحوذان الثني ، اطلبه .

1٥٥٢٥ - شُقِيصِي التَّحَنَان ، هَوَاكِيَة Pulsatilla (S).
Pulsatilla (F). Pulsatilla, Pasque-flower (E).

جنس نباتات عشبية مدمرة من سبط الشقاريات وعضيلة الشقاريات . انولاه قليلة البند جميعها جميلة المادة اللطيفة . سيروية ، تمش في جميع الموائل والأرتبة . جلورها حنايية خليقة . اوراقها جلورية الالتشاب . اشهر انولاه الثلاثة التالية .

1٥٥٢٦ - شُقِيصِي التَّحَنَان الْجَبَلِي Pulsatilla alpina (S). Pulsatilla alpine (F). Mountain
pulsatilla (E).

نوع من شقيق التمان ، يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . يكثر في الاربة الرليلة الجبلية ، ازهاره كبيرة القند ، يضاء اللون ، زرقاء الموالج حل صفحتها الخاربية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

1٥٥٢٧ - شُقِيصِي التَّحَنَان الرِّيْصِي * Pulsatilla vernalis, Anemone vernalis (S). Pulsatilla
pratensis (F).

لوع من شقيق التمان ، يملو من ٢٠ الى ٣٥ سم . مهد جبال البلاد المعتدلة . اوراقه ابيدة ، لاشقة ، قدية انفرس ، نصلها خلى البشرة . ازهاره متوسطة القند ، يضاء اللون حل صفحتها الداخلية ، ليلكية الصفحات الخاربية || ازهاره يستمر من نيسان الى تموز .

1٥٥٢٨ - شُقِيصِي التَّحَنَان المَبْلُول ، شُقَار المَبْلُج Pulsatilla vulgaris, Anemone pulsatilla (S). Pulsatilla
commune, Fleur de Pâques, Herbe au vent (F). Pasque flower, Pass flower, Blue money (E). Echte kuh-schelle, Küchenschnelle (D). Pulsatilla comune, Fiore di vento, Erba del vento (I).

نوع من شقيق التمان ، يملو من ١٥ الى ٣٠ سم . يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . اوراقه نافذة تدهو بعد الاقترار وتصل في اواخر الخريف . ازهاره كبيرة القند ، قمرزية اللون ، بنفسجية الموالج ، فضية الزغب || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

1٥٥٢٩ - شُقِيصِي النُورُوط
هو الحوذان الخريف ، اطلبه .

1٥٥٣٠ - شُقِيصِي حَكَلِي هو الحوذان الحقل ، اطلبه .

1٥٥٣١ - شُقِيصِي مَائِي هو الحوذان المائي ، اطلبه .

1٥٥٣٢ - شُقِيَّات Ranunculaceae (S).
Ranunculacées, Ranunculacées (F).
Ranunculaceae (E).

عضيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انولاه المروطة زهاء ١٢٠٠ ، اجناسها ٣٠ يجمعها صفة اسباط اشهرها

1٥٥٠٧ - شُقُرُقَى هو الشقراق ، اطلبه .

1٥٥٠٨ - شُقِيَّات هي ملاك البير وهي شيء كالبلنفة العظيمة المراكبة الجيوب يحترجه البير من فيه اذا حاج .

1٥٥٠٩ - شُقِيص Part, Portion (F).
Share, Allowance (E).
الشقس : التصيب والسم ولقطعة من الارض .

1٥٥١٠ - شُقِيَّات هو الاقتنا الحفية ، اطلبه .

1٥٥١١ - شُقِيَّات Pot, Vase (F).
هي الايصيص او المركان انه من غرت او فخار او غير ذلك يستعمل لزروع النباتات التزيينية البيتية .

1٥٥١٢ - شُقَل Pesée (F). Weighing (E).
الشقل الوزنة والوزن . يقال اشقل في هذا البندار اي تته .

1٥٥١٣ - شُقِيَّات ، اصابع هرْمِس ، حَكَلِي المَهْر Hermodactylus tuberosus, Iris tuberosa (S). Hermodactyle tubéreux (F). Finger of Hermes (E). Hermodactel (D). Hermodactillo, Iríde valluata (I).

نبات عشبي صفوي بري وزراعي من فصيلة السوسنيات . يكثر في الموائل الرطبة . صقله طية تستعمل استعمال السورديان ويستخرج منها سادة المربطين . ساقه خراشية مبرقة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . تكتبي زهرة وسيدة عطرية القراكية ، كبيرة القند ، لونها الى الصفار الحطلي يملو موالج بنفسجي . بتلاتها الخاربية اعلمجية لشكل مستديرة الطرف . بتلاتها الداخلية نسيقة النسل الدلق المنسوب ، ساقها جلولة ، خضراء اللون || ازهاره يدم من اذار الى نيسان .

1٥٥١٤ - شُقَمَكَة Papion chama (F).
هو القردوح الخزيري ، اطلبه .

1٥٥١٥ - شُقَن Herzer (F). To harrow (E).
شقن القرية : سلفها وبسطها .

1٥٥١٦ - شُقَوَاكس هو اللذن الاسباني ، اطلبه .

1٥٥١٧ - شُقِي Sexué (F). Sexuality (E).
كل ما هو ذات شق يمكنه من التماسك ان ذكراً او انثى .

1٥٥١٨ - شُقِيَّات ، جُنِيَّات Sexualité (F).
Sexuality (E).
مجسمة التماسك والفرق الجنسية الكلاسيكية الخاصة بالذكور والاناث .

1٥٥١٩ - شُقِيَّات Difforme (F). Deformed (E).
نمت وصني يطلق على الحيوان القبيح الشكل .

1٥٥٢٠ - شُقِيَّات Chromatophore (F).
Chromatophore (E).

الشقيقة خلية ملونة محيطيات من الشفاح عديدة الالوان ، انتشادها او انتشادها منوط بالحرفين . لللك يفيض الرغويات تمام الحق المحيطة فيه بمرسة فائقة لانها تحوي بعض هذه الخلايا .



شُقَل



شُقِي التمان الرِّيْصِي



شُقِي التمان المَبْلُول

Polymorphisme (F). ١٥٥٤١ - شُكَاكَة ٥

Polymorphism (E).

تعدد الأشكال في مادة واحدة ، أو تعدد أشكال مادة وحدة تركيبتها الجزيئي لا تتبدل .



شُكَاكَة

١٥٥٤٥ - شُكْبُ ، شُكْبُ ، شُكْبُ ، بِكْسَايْن

Bécassine (F). Snipe (E).

جنس طير من دجاج الارض . انواعه ستة جميعها من القواطع . تتميز بأجسامها الصغيرة القذ الحذاء الشكل . أثوابها إلى السرة الخفيفة المرطبة المرطبة . منقوشة مسطحة دقيقة . أروانها حبيطة الجهة الامامية ، سرية الخلفية . اصرت انواعها وأشهرها الشُكْبَةُ الصغيرة والكبيرة والميلولة ، الطليحة .



شُكْبُ الْبَحْر

Centricus (S).

Centricus, Bécasse de mer, Trompette (F). Trumpet-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات بحرية من فصيلة قنبرية . انواعه قليلة مرتها مياه البحر المتوسط . جميعها صغيرة القذ طولها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تتميز بشكلاها المستعربة وبأعطالها الانبوبية البقية الاطراف . أثوابها وردية اللون ، ظهورها ملحية اللون ، جوانبها صفمية ، بطونها فضية .

١٥٥٤٧ - شُكْبَةُ الْبَحْرِ الْمِجَنَّةِ

Centricus scolopax (S).

Centricus bécasse, Bécasse de mer, Trompette de mer (F). Bellows-fish, Trumpet-fish (E).

سمكة بحرية بيضاء من فصيلة شُكْبَاتِ الْبَحْرِ وردية شائكات الزمان . اصطلحها معظم الآباء البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك الغنق المتوسطة القنور . جسمها قريب الشبه بالشُكْبَةِ ١٢ جميعها برية مهدا حوض البحر المتوسط . اورتاها مستقرة ، اذنية الزناد المستطيل . نصلا ثلاثي القصيص ، ذات الطرف ، حاقب القصاص . اذوارها فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، خاصة البطولات ، لونها مختلف باختلاف الانواع ، لها الاخر وبشقاته ثم البنفسجي ثم الاصفر .



شُكْبَةُ صَغِيرَةٌ



شُكْبَةُ كَبِيرَةٌ

١٥٥٤٨ - شُكْبَةُ صَغِيرَةٌ ٥

Gallinago gallinula (S). Bécassine sordide, Focine bécassine, Bécot, Jaquet (F). Jack snipe (E).

طائر من الشُكْبِ طوله نحو ٣٢ سم . قوته إلى الصهبة الخفيفة يعلوها مزاج اسود وخطه يبيض . شتاته مناطق وفضاف بميرات وأهوار الجود الحارة . صفه يمتد من سريه إلى اذوبة الشالية .

١٥٥٤٩ - شُكْبَةُ كَبِيرَةٌ ٥

Gallinago major (S). Bécassine double, Grande bécassine (F). Great snipe, Solitary snipe (E).

طائر من الشُكْبِ طوله نحو ٣٢ سم . قوته إلى الصهبة الخفيفة يعلوها مزاج اسود وخطه يبيض . شتاته مناطق وفضاف بميرات وأهوار الجود الحارة . صفه يمتد من سريه إلى اذوبة الشالية .

١٥٥٥٠ - شُكْبَةُ بَدَوَلَةٌ ٥

Gallinago scolopacina (S). Bécassine ordinaire (F). Common snipe (E).

طائر من الشُكْبِ طوله نحو ٢٥ سم . قوته متواكب



شُكْبَةُ بَدَوَلَةٌ

الحذائيات والخريقات والشقاريات والملمويات . جميعها نباتات حفية أو شبه ليفية ، منتشرة في معظم امقاع العالم . منها نباتات جمالية وأخرى طبية وبعضها زراعي تربي .

١٥٥٣٣ - شُكْ ٥

Prise (F). Setting (E).

الشك هو مقدار سرعة تماسك جبلة الامت . فهو سريع اذا تماسك بين ١٥ و ٣٠ دقيقة . وهو متوسط اذا تماسك بين ٣٠ دقيقة وساعتين . وهو بطيء اذا تماسك بين ساعتين وسبع ساعات .

١٥٥٣٤ - شُكْ ٥

Enfilas, Enguirlander (F).

To string, To engarland (F).

نقب نصال التيج يضلونها وقد يتم ذلك بواسطة الشفرة التي تخترق الفصيص لتسهيل مرور الخيط .

١٥٥٣٥ - شُكَاكَةٌ ٥

Diététique (F).

Dietetics (E).

علم يبحث في قيمة المواد الغذائية والعامل الناتجة من سوء الاندفاع مع تحديد الاشكاد الثلاثة لكل مستهلك من حيوان أو نبات .

١٥٥٣٦ - شُكَار ٥

Lignivore (F).

Lignivorous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أو شجرة قوتها الشكر والخشب .

١٥٥٣٧ - شُكَاكَةٌ ٥

كل قسم من أرض المزرعة خصص لزراعة معينة . يقال

شُكَاكَةٌ لِعِ وَشُكَاكَةٌ لِقَوْلِهِ ... ج شُكَاكٌ .

١٥٥٣٨ - شُكَاكَةٌ ٥

Fagonia (S). Fagonie (F).

جنس نباتات حفية معمرة من فصيلة الباذليات . انواعها ١٢ جميعها برية مهدا حوض البحر المتوسط . اورتاها مستقرة ، اذنية الزناد المستطيل . نصلا ثلاثي القصيص ، ذات الطرف ، حاقب القصاص . اذوارها فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، خاصة البطولات ، لونها مختلف باختلاف الانواع ، لها الاخر وبشقاته ثم البنفسجي ثم الاصفر .

١٥٥٣٩ - شُكَاكَةٌ إِكْرِيغِيَّةٌ ، شُكَاكَةٌ عَرَبِيَّةٌ ، شُكْمَانٌ ، عَقْلُونُ الْغَزَالِ

Fagonia arabica, F. cretica (S). Fagonie de Crète, Trèfle épineux de Candie (F).

نوع من الشُكَاكَةِ منبها حوض البحر المتوسط . اذوارها قرزية اللون . قالوا انها طيبة دون ذكر منافها .

١٥٥٤٠ - شُكَاكَةٌ صِنْفِيَّةٌ ، شُرَيْفَةٌ ٥

Fagonia sinatica (S). Fagonie de Sinat (F).

نوع من الشُكَاكَةِ منبها حوض البحر المتوسط . اذوارها وردية اللون . يقال انها طيبة .

١٥٥٤١ - شُكَاكِي ٥

Onoporde, Onopordon (F).

هي الاسون من النباتات الطبية ، الطله .

١٥٥٤٢ - شُكَاك ٥

Enguirlanderage (F).

Enguirlander (E).

هي عملية شك اوراق التيج بنظام وترتيب .

١٥٥٤٣ - شُكَاك ٥

Aboc, Entrave (F).

Clog, Hobbie, Shackle (E).

وثاق تربط به يدا الفرس أو اسدي يدب بأسن ورجليه .

1٥٥٦٢ - شكوي، مُطالبَة Reclamation (F).

Claim (E).

هي مطالبة المره الاعتراف بحق مجيد له . او اقرار حقّه في حالة كان يجب ان تكون له .

Aubier (F).

Alburnum, Sap-Wood (E).

هو القسم من الهيكل الخشبي الكثيف بين اللحاء والخشب الصلب .

Polymorphe (F).

Polymorphic (E).

1٥٥٦٤ - شكيل ٥

متعدد الاشكال .

Mors (F). Bit (E).

1٥٥٦٥ - شكيمَة

حذيلة اللجام الموضوعة الفم .

1٥٥٦٦ - شكيتوس* ، شجرة اللفلل الكاذب

Schinus (S). Schine, Faux plover (F). Pepper tree.

Mastic tree (E). Mastixbaum (D). Aibero da pepe (I).

جس اشجار وشجيرات برية وتزيينية من فصيلة البطيانيات.

اوراقها متعاقبة ، مركبة ، وريشة . وريقاتها بيضيه

الشكل ، لصلها سميك الصفحه جميل الخضار الاسمر

المايق ، ازهارها عصفودية التجميع ، حراء اللون او بيضاء .

ثمارها غنية الشكل ، حمصية اللد تبدو حراء اللون ثم

تسمر || اوراقها وازهارها تتصل برائحة اللفلل . يستخرج

من اوراقها عطر شامع الاستعمال يدخل في عدة تركيب

وستحضرات || انواعه المعروفة اثنان .

1٥٥٦٧ - شكيتوس بُطيّني* القرقي

Schinus terebinthifolia (S). Faux plover du Brésil

(F). Brazilian pepper tree (E). Brasilianische Pfeffer-

baum (D). Pepe del Brasile (I).

نوع من الشكينوس شجيره تملو من ٣ الى ٤ امتار .

يزرع القزوين ويستحضر من اوراقه عطر اللفلل .

يستخرج من ساقه صمغ راتنجي يدخل في بعض المركبات .

ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

1٥٥٦٨ - شكيتوس ربييع Schinus molle (S).

Faux plover molle, Plover du Pérou (F). False

pepper, Weeping pepper tree (E). Mollebaum,

Amerikanische Pfefferbaum (D). Pepe del Peró,

Falso pepe, Mole (I).

نوع من الشكينوس ، شجيره تملو من ٧ الى ١٠ امتار .

ورديقاته وريه التجميع حدها يراوح من ١٥ الى ٢٧ .

لصلها ستاني الشكل سنن الحافة . ازهاره محورية الايتكانز

بيضاء اللون . ثمار حمصية الشكل والقد ، حراء اللون

تبقى عاتقة الى الشتاء || يستحضر من اوراقه عطر

الفلل ويستخرج من ساقه صمغ راتنجي مضه يسول

للمعدة || ازهاره يستمر من اواخر تموز الى اواخر آب .

1٥٥٦٩ - شيل Docynia (F).

هو اللوسيني شجرة مشرة ، اطليا .

1٥٥٧٠ - شلاب ٥ Leersia (S). Léersie (F).

جنس نباتات عشبية ، برية ، سولية ، مرغوبة من نضلة

التجليات . انواعها المعروفة ثمة متنبها بعض مناطق

البلاد الحارة من الشرق والغرب || سوقها شطاف فراء .

صفها خفيف مستطيل . ازهارها متبلي التجميع . سبيلاتا

متراسة . ازهارها خشوية .

النسبة والسرعة الحظية المرفقة بالايض ، يسر ويبقى في الظهور ، ينصرف الى الصبغة الشفراء في الصدر . عتقه ويصله الى البياض الاخير ، متقار مستطيل اسمر || اثناء تحلل الثوب عنه . يألف اللثاغ والمراعي والاراضي الرطبة . قوته للنبات والحشرات والرخويات . يدن اضمومه فوق القوس الناشف بين الاعشاب المتجمية . الاثني تيش من ٤ الى ٥ يعضات تحضها وحدا من ١٥ الى ١٧ يوما .

1٥٥٥١ - شكيات البحر Centricidae (S).

Centricidae (E).

فصيلة امكا بحرية من شكيات الزعانف . اجنلها

وانواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز عشرة || اعطتها

منظم بحار البلاد الحارة ويضف بحار البلاد المعتدة الحارة .

سرحها الاغواط والقفاف || تتميز باجسامها الربعة التي

تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . وباعظامها القروبية الاثيوبية

الالاف ، واذنلها ومجتمتها الظهيرة الصلبة ،

وبالمناسخ القوية الحادة التي تتقدم الزعانف الظهرية ،

وزعانفها الحوضية المتناسقة || الوأيا تراوح من الرودي

الى المرجاني الاسف ومن الفضي الى الذهبي || لشهر

اجنلها شكب البحر .

1٥٥٥٢ - شكيد Ration quotidienne (F).

Daily allowance (E).

ما يكتفي القادة يوما كاشا من الملف . حج اشكاد .

1٥٥٥٣ - شكيد الصيانة ، شكيد العيش

Ration d'entretien (F). Maintenance allowance (E).

الملف الذي يكتفي الحيوان يوميا للوش بلا عمل .

1٥٥٥٤ - شكيد العمل ، شكيد الانتاج

Ration de production (F). Production allowance (E).

الملف القسروي لحيوان العمل او الذي يمسّن او

يدر الحليب .

1٥٥٥٥ - شكيد النشوء Ration de croissance (F).

Growth allowance (E).

الملف الذي يكتفي الحيوان للنشوء والنشو .

1٥٥٥٦ - شكدي* Diéetique (F).

Dietetic (E).

نمت تعريفي يوصف به ملجن الحمية او طريقة التشكيد .

1٥٥٥٧ - شكيرة

الشكرة : اثناء الفرع من الحليب .

1٥٥٥٨ - شكع

شكع الزرع : كثر حبه فهو شاكع وشكع وشكوع .

1٥٥٥٩ - شكل

Forme (F). Form, Shape (E).

الهيئة الخارجية .


1٥٥٦٠ - شكمة ، بؤمة ، علكة Ration (F).

جزء من الشكة وهو الغضة الواحدة من الملف البوي

المتوجب لحيوان .

1٥٥٦١ - شكوة* ، محي ، صلبه Baratte (F).

Churn (E). وهاء تحض فيه الكأه لاستخراج الزبدة .



شكة



شكينوس



شَلَح



شَلَح



شَلَح

Chalote (F). Chalze (E).

١٥٥٨٧ - شَلَحْ

عقوب سرقة البضة .

Stillation, Egouttement (F).
Dripping (E).

١٥٥٨١ - شَلَحَلَة

التقط نقطة قطرة .

Prangos (S).

١٥٥٨٥ - شَلَطَة

Prangosier, Foin du Thibet (F). Prangos, Hay plant (E). Tibetanisches Heu (D) Prangos (I).
جنس نباتات عشبية برية مرعوية مسرة من فصيلة الخبيثيات . جلوسها عريضة ، سيقانها نجيلية قليلة القروص . اوراقها نازقة ، كبيرة القند وبيضة . ازهارها صفراء اللون صفيرة || انبساط المروحة قليلة اشهرها مايلي .

Prangos harmonis (S). شَلَطَة الحَرَمُون
Prangosier de l'Hermon (F).

نوع من الشلطة منبها جبل الشيخ والحرمون . اوراقها صفيرة القند ، غليظة النصل . تستلها اللقطة ويسمى عليها الحليب .

١٥٥٨٧ - شَلَطَة عَشْبِيَّة ، قَرُوش الضَّبْع
Prangos asperula (S). Prangosier épre (F).

نوع من الشلطة منبها الجبال اللبنانية السورية للمتلة الانقطاع . اوراقها كبيرة ، مسطحة ، صميكة الصلصة الخشنة . لونها ابيض الفخار البحري الباهت .

Graphium ١٥٥٨٨ - شَلَفَة * ، غَرَابِلُوم

جنس فطور مجهرية من عصارة المديانبات وفصيلة الكعبليات . انبساطه قليلة العدد ملونة الكريجات . منها القوية التي تنيش على بعض الاجنار الحرجية انصباها الفراغ ومنها الضعيفة التي تتركب الازهار الخفيفة كالتلحاح والاباص . اذا واقفها ونشلتها عوامل البيئة .

١٥٥٨٩ - شَلَقِي ، شَلَقِيَّات ، اَشَلَق
Sélaciens (F). Selachii (E).

رتبة اسماك غضروفية الزمانات . فصائلها وابانها كثيرة العدد جميعها متوسطة وكبيرة القند . اشهر اجناسها القروش والكوجج والشار والياض والرمادة ، الخ .

Œufs de lézard (F). شَلَكَة ، شَلَفَة
Eggs of the lizard (E).

بيض النمل واشبلها .

Anguille (F). Eel (E). ١٥٥٩١ - شَلَك

الشلك وسمك الشلك والزلز هو الانقليس ، اطله .

Paralyse (F). ١٥٥٩٢ - شَكَل ، قَالَج
Paralytic (E).

مرض يسبب التهاب اللسان او اللسان القوي فينجم عنه الشلل .

١٥٥٩٣ - شَكَل وَرْدِي ، مُسَكَّرْدِين
Muscardine

مرض خبيث منه لا علاج له يسبب دود القز سيبه قطر مجهرى من العنكبوتيات يدعى طلوة بلسانا Botrytis (Baniann) غيراته ذرية تغلفها الربيع وتسلل جسم العود عن طريق الاكل لتقتل على الدم بعد ان تحوله الى سواض ضوئية || مظهره الخارجي لمان في بشره الجلد يحميه اصفرار وردي ثم ارتقاه في الجسم زياد حتى الموت عند ذلك يتصلب الجسم ويسمر ثم تلوه ماجة صفراء اذا كان

١٥٥٧١ - شَلَح
نبات يعرف بحقيقة البركة ، اطلها .

١٥٥٧٢ - شَلَطَة *
Sphaerites (S). Sphaerites (E).

جنس حشرات من فصيلة الشلاطيات ورتبة خدييات الاجنسة . انواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في معظم اقاليم البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية اللون ، تطول من ٦ الى ٧ م . رؤوسها شبه مكورة . عيونها صفيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية صولجانية . تأشيرها وفكوكها غليظة . ملاسها كبيرة ، مسنة الحافة الداخلية . كواسها مستعرجة ، حادة الاطراف الجانبية والاسامية . الحادها لاسخة . قوائمها شديدة اللشط . اثارها سوية الاولان ، تكثر فيها الجوزة السوداء المزاج || تعيش على البراز والمواد العضوية المخضرة والمنسلة .

١٥٥٧٣ - شَلَطَرِيَّات
Sphaeritidae (S). Sphaeritidae (E).

فصيلة حشرات من خدييات الاجنسة . اجناسها وانواعها المرفوعة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها صفيرة ، شبه بيضية الشكل . تطول من ٥ الى ٩ م . رؤوسها مكورة . عيونها بارزة . تأشيرها وفكوكها الانشعارية صولجانية . مركبة من ١١ فصلة . كواسها مستعرجة ، حادة الاطراف . الحادها لاسخة . قوائمها نشطة . ابراعها خماسية المقل || تعيش على البراز والمواد العضوية والنباتية المتحللة || اشهر اجناسها الشلَط .

١٥٥٧٤ - شَكَل
Cataracta, Chute d'eau (F). Cataract, Waterfall (E).

منحد مائي يتعرض بحرى البحر .

١٥٥٧٥ - شَلَب
Paddy
حب ارز غير المشور وبى زمت حه جذاته فهو الرز . واسمته شَلَب .

١٥٥٧٦ - شَلَبَة *
Schilbe (S). Schilbè (F).

جنس اسماك ثورية مأكولة من مفتوحات اللسانة وفصيلة السلوريات . انبساطه صفينة جميعها من اسماك مياه البلاد الحارة والاستوائية . اجسامها صفيرة القند ، جلوسها ماصة . رؤوسها مستدقة . وشها قصير ، الوها الى الرتبة الكبرياء يملوا تنجوع اسيد || تصنيفها ياتي دون الوسط .

١٥٥٧٧ - شَلَبَة حَرَبِيَّة
Schilbe (S). Schilbè (F).

١٥٥٧٨ - شَلَبَجَم
Schilbe (S). Schilbè (F).

١٥٥٧٩ - شَلَبَجَم يَمَرِي
Schilbe (S). Schilbè (F).

١٥٥٨٠ - شَلَبَج
Sperme animal (F). Animal sperm (E).

هو افراز اللد التناسلية الذكرية عند الحيوان .
١٥٥٨١ - شَلَبَجِيَّة *
Spermatologie (F). Spermatology (E).

١٥٥٨٢ - شَلَر
Schiler
هو جلهم الحقنة ، اطله .

انواعها المعروفة قليلة أعطانها الشرق الأوسط . بعضها فراء .
أوراقها السفلى قشائرية التصل وألمليا صغيرة مفردة أو
مستتة . أزهارها صفراء اللون ، أرجوانية اللون . ثمارها
خمرية . يزورها فردية . أحرف أنواعها ما يلي .

- E. tyrazus (S). شلوة قشائرية ، أبو قرن
E. pterocarpus (S). شلوة جنية الثمر
E. strangulatus (S). شلوة مخنقة
E. arcustus (S). شلوة مقربة

١٥٥٩٩ - شَلَوَف
هي البرعمة النامية على الساق الأرضية في الحليون والعليق
وما كان على شكلها من النبات .

١٥٦٠٠ - شَلَوَق ، شَمُوم
رعي لاهية مضيئة منها أزهر الجنوب .

١٥٦٠١ - شَكُونَك
هي المواد القليلة الموجودة في نسيج الحيوانات الحية ،
راسدتها شلوة .

١٥٦٠٢ - شَم راجع شامة .

١٥٦٠٣ - شِمَاع ، شَمِيع
استمرار تقدم لنمو التنديمي في غطط أعضاء النبات .

١٥٦٠٤ - شَمَاذ هو الشاهد ، راجع .

١٥٦٠٥ - شَمَاذِيَّات
Therididae (S).
Thériddées (F). Therididae (E).

فصيلة عنكب من رتبة التريلاترات . اجناسها وأنواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة
الحارة . جميعها مفردة . منها الصغيرة الحجم والمتوسطة
والكبيرة . تتميز بطولها المتضخمة المرفوعة وبجوانها
المستقلة الأطراف || شعما دقيقة الحيك تتسببها على
النبات وبين الحياض وفي شقوق الصخور || أشهر
اجناسها الثياذ والنداسجة .

١٥٦٠٦ - شَمَار ، شَمَرَة ، شُومَار ، زَايَنَاج
Feniculum (S). Fenouli (F). Fenekel (D).
Finocchio (I).

جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من فصيلة الخيميات .
أنواعها عديدة . بعضها كثيرة الفروع خضراء اللون .
أوراقها مركبة شديدة الخضار الباق ، كثيفة الملمس
وأفند الطرية ، فواصة العرف الذي || أشهر أنواعها
الثير الحلو .

١٥٦٠٧ - شَمَار المَاء
Phellandria aquatique (F). هو الثرطوط المنقي ، اطبخ .

١٥٦٠٨ - شَمَار حَلَو
Feniculum officinale (S). Fenouli officinal, Aneth
doux (F). Common fennel (E). Echter Fenchel (D).
Finocchio officinale (I).

نوع من الشيار وهو من البقول المأكولة الأرواق .
خواصها الصحية والطبية جزيلة الفتح توجد في جذوره
وأوراقه . وهو منه معوي يعرف أنفازات ، يدر البول
ويكسب للتشنج . أدمان شره يثبه التند الجسية .

الحل^١ ، بقاء ، أو خلة يضاء كالنكس اذا كان الحل
ربما || القاية منه تنحصر بالتطهير بالفم واليد وبجرق
اليدان الرطبة فور أساها .

١٥٥٩٤ - شَكَم ، فَلَاش
Fish
ويش نور موقوت يستعمل للتصوير في الظلام .

١٥٥٩٥ - شِلُونُوس مَشْكُوس
Chlaenius spoliatus (S). Chlaenle spoliatur (F).
Chlaenius spoliatus (E).

حشرة راجحة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة غمديات
الاجنحة . تألف المواقع الرملية وصفات مجاري للماء .
خنافسها ويزقاتها تمش على المواد الصلبة وعلى ما تستطيع
اقتحام من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد يطول
من ١٤ إلى ١٦ م . ثوبا الى الخضار الجليل اللامع
يكتنه خط عايش اصفر يطوق الظهران . رأسها متوسط
الجم . زياتها عطيان مستطيلان . عيناها صغيرتان
ناثرتان . ظهراتها مستدير الطرف للالاف ، تسامي
الاعادية القندية القاطبة . ارساغها خالية العقل || الاث
اصفر قدا من الذكر واثق ثوبا منه واقتصر زياتا || لها
جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في مطلع
حزيران وتمشي حتى اوائل ايلول . تسرح في التبار وتبيت
في الليل || البرقة مردنية الشكل ، تطول عند تمام ادراكها
نحو ٢٤ م . جسمها اخير اللون ، اسر الرأس والشرج
والمدب || طرز الاكمال يشتر نحو ٣٥ يبا .

١٥٥٩٦ - شِلُونُوس مَذْهَب الرَأْس

Chlaenius chrysocephalus (S).
Chlaenle à tête dorée (F).
Chlaenius chrysocephalus (E).

حشرة راجحة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة غمديات
الاجنحة . تألف يساقين السواحل . ثوبا المواد الصلبة
وما تستطيع اقتحام من الحشرات الدنيا || جسمها صغير
القد يطول من ٧ الى ١٠ م . ثوبا ثنائي اللون ، رأسها
وكولها الى الحرة التناسل للغة المالح ، فعدا الى
الزقة السمر الخضراء المالح . زياتها عطيان دقيقان .
عيناها صغيرتان بارزتان . ظهراتها مستدير الطرف للالاف
تسامي الاعادية القندية القاطبة المتوازية الاهداد . ارساغها
خالية العقل || الاث اصفر قدا من الذكر واثق ثوبا
منه واقتصر زياتا || لها جيل واحد في الحول . تظهر
الحشرة الجملانة في اواخر آذار وتمشي حتى اواخر حزيران .
تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام ادراكها
تطول نحو ١٣ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اسر
الرأس والشرج ، اخير المدب .

١٥٥٩٧ - شِلُونُوس
Anisochilus (S).
Anisochèle, Anisochile (F). Anisochilus (E).

جنس نباتات طيبة برية حولية ومعمرة من فصيلة الشقيقيات .
أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطانها الهند || الحولية منها
عشبية اما المعمرة فخشبية متسببة . أوراقها معتقة .
متقابلة ، ثلاثية . فصلاها يضيء الشكل ، خبازا الخضار .
أزهارها سبيل التجميع ، اسطواني الشكل ، طري الارتفاع
انواعها صغيرة حمراء اللون || حصر أوراقها وزياتها
شائع الاستعمال في معالجة النزلة الصدرية عند الأولاد .

١٥٥٩٨ - شِلُونَا
Enarthrocarpus (S).
Enarthrocarpe (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات .



شلوس غلى



شلوس مذهب الرأس



شلبس



شمار حلو

١٥٦٠٩ - شِمَاط

Pygargues (F). Osprey (E).

جنس طير من العقبان وفصيلة البعريات. انواعه عديدة اشهرها الشيمطة الشائعة وشيمطة الانهر والرخاء والسهوج . تتميز ببارسائها الكاسية حتى نصفها الاعلى . منسلها من القواطع ، تأتلف الشطوط البحرية وشقائق الانهار والبيمرات . قوتها الاكمام والطيور المائية والبرمائيات الصغيرة.

١٥٦١٠ - شِمَاطَة

Chaetostroma

جنس فطر مجهرية من عارة الطحالبات وفصيلة الكنكيات . يلبثته مجية الشكل ، حلبي السطح ، لها دقن كثيف اسمر اللون . جبره الكنيدي متقشرة متراصة ، كئنه طرية الارنكار بيضيه او مرمونية الشكل . انواعه قليلة جميعها روية تركب المواد العضوية المنحلة .

١٥٦١١ - شِمَال ، شِمَال

Vent du Nord (F). North-wind (E).

هي الحواء : الريح التي تهب من قبل البحر بين مطلع الشمس وبنات نضج ويقل من مطلع الشمس الى سقط الترس . ويكون اسما وصفة يقال حيث الشمال وريح شمال .

١٥٦١٢ - شِمَالِي

Septentrional (F). Northern (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو من الشمال او مركز الشمال .

١٥٦١٣ - شِمَالِي

Boréal (F). Boreal (E).

نعت وصفي يطلق على ما هو خاص بالشمال القطبي .

١٥٦١٤ - شِمَام

Cucumis melo (S).

Melon commun (F). Melon, Musk-melon (E). Melone (D). Melone, Popone (I).

ويسمى ايضا البطيخ الاصفر . نبات حليبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات . ضروبه واصرامه عديدة . ساقه اسطوانية مدادة زهاب البثرة خضرة الخلس . اولوه زنادية مختلفة الاشكال منها المستديرة والكلوية والمفصصة . نصلها مزهر الصفقة الخضرة ، ياهت الخضار البحري . ازهاره وحيدة المسكن ، الذكري تظهر قبل الانثوية بهشة ايام . ثماره مختلفة الاشكال والاحجام منها المستديرة والبيضة والاحليلجية والكبيرة والصغيرة ، قشورها ناعمة الخلس ، صفراء اللون ، فضلة . لهاها سبك السيق ، جانبه المكسر ، اصفر اللون ، سكري اللحم ، ذي العرن . يزده مستطيلة الشكل ، تبينة اللون ، كثيرة العدد || يحد في جميع الاثرية الفنية بالمواد العضوية والناصر المدنية بطور ان لا تكون شديدة الانحاج . يزرع على مسافات تراوح ابعادها من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . تترصف ساقه الرئيسية (الام) على وحين . وتترصف سلاله الثانويات على ثلاث اوراق ثم تترصف سيقه الثانية على خمس اوراق . كما وتعيشيه ضروريان ، اما الاكارار من ربه فضر .

١٥٦١٥ - شِمَام اخضر ، شِمَام كَنْتَلُو

Cucumis melo cantalupensis (S). Cantalupo, Melon galeux (F). Cantaloupe melon (E). Cantalupo, Beulen-melons, Rippen-Melons (D). Cantalupo, Melone cantalupo (I).

نوع من الثيام الزراعي المأكول ، اسرامه عديدة مختلفة الاحجام والاشكال تلب فيها الاستدارة . قشوره فضلة مبرقة بجمرة اللون حطية التاليل . لهاها سبك السيق ، لذية اللحم ، مسطحة الحلاوة ، ذي العرن ، لونه الى الخضار الامثل || مصلته زراعية لا تختلط من معاملة الثيام .

١٥٦١٦ - شِمَام عَجَمِي

Cucumis melo dudaim (S). Concombre dudaim (F). Apple cucumber, Queen Anne's melon (E). Apfel-melone (D). Cocomero melo (I).

نوع من الثيام الزراعي الرئيسي ، ثماره خضبة اللون ، مسطرة الله ، حبيبها حبيب البرتقالة وهي نواحة الرائحة الذكية . قشورها ملدة البثرة ، عادمة التفصيص ، لهاها قليل البسكة كثير الاليات القروية || يزرع للزين .

١٥٦١٧ - شِمَام مصري

Cucumis odoratissimus (S). Melon égyptien (F). Sweet melon (E). Agyptische melone (D). Popone, Poponcino d'Egitto (I).

نوع من الثيام الاصفر المستطيل الشكل ، مهد البلاد المصرية وقد اشهر بكنهته ولذة طعمه وقوة رائحته الذكية المستحبة || يزرع ويصل كثير من الثيام وهو اجد صنفًا في الاثرية غير القروية .

١٥٦١٨ - شِمَاطِي

Chimpanzé (F).

هو الجملة : جنس قرود كبيرة الله من فصيلة اشباه الانسان ، راسع بامة .

١٥٦١٩ - شِمَاطِيَا

نوع من الحبوب القوية الفاعلة . راسع خر شيمانيا .

١٥٦٢٠ - شِمَاطِي

Michelia champaca (S). Michélie champac, Champac, Sompac (F). Champaca, Champ wood (E). Schampakbaum (D). Champacs (I).

نوع من الخشاليه من فصيلة المنيوليات . وهو شجرة يرة طيبة مهدا الهند الصينية ، تحوي بعض الاصول المرة والطرية ، تدخل في عدة تركيبات وقويات مغذية ويستخرج منها عطر الشمين المشهور .

١٥٦٢١ - شِمَاط

راسع شلخ .

١٥٦٢٢ - شِمَد

الشدة : رفع اللب فهو شامد في شامد .

١٥٦٢٣ - شِمَدَكَة

شجرة تقرر وتقرر الى الكثرة ترتفع عليها .

١٥٦٢٤ - شِمَر الجَمَل

Tordyle suave (F).

هو الشرهب الجمل ، اطليه .

١٥٦٢٥ - شِمَر اخضر

Peucedane (F).

هو بنور الاكراد ، اطليه .

١٥٦٢٦ - شِمَر الكَلْب

هو الجابنيق البتن ، اطليه .

١٥٦٢٧ - شِمَرَاخ

Hampe (F).

Stem, Flower-stalk (E).

عضو باقي قروسي الانتساب متصّب الجالوس يحمل الازهار وقد يتوب من الساق في بعض النبات .

١٥٦٢٨ - شِمْرَاحِي

Scapigère (F).

Scapigerous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ساقه كالشمرانج او الزناد .

١٥٦٢٩ - شِمْرَاحِي الزَّهَر

Scapiflore (F).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره شمراعية الارنكار .



شام



شام اخضر



شام حبيبي



شام مصري



شبن

١٥٩٣٠ - شِمْرَاقِيَّةُ الشَّكْلِ Scaptiform (F).
Scaptiform (E).

تمت تعريفه يطلق على كل ساق نباتية شكلها كالشمر أو الزناد.

١٥٩٣١ - شِمْرَاقِيَّةٌ هِيَ الشَّيْبَارُ ، اطلب .

١٥٩٣٢ - شِمْرَاقِيَّةٌ بِحَرِيَّةٍ * Crithme (S).
Crithme, Fenouil marin, Perce-pierre, Passerelle (F). Samphire, Sea fennel, Peter's cross (F). Seebasilkraut, Meerfenchel (D). Erba corda, Finocchio marino, Baciola (I).

نبات حشيشي، يري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة النجميات ينبت على ضفوف الشواطئ البحرية. أوراقه سنائية لحية شبيهة بالنصل البحري الذي تغلظ وتتمتع بكثير المحاللات.

١٥٩٣٣ - شِمْرَاقِيَّةٌ هَرَّةٌ * ، اطلب تسمية هَرَّةٌ

Thlaspi arvense (S). Thlaspi des champs, Herbe aux écus, Térapic amer, Monnoyerba, Tabouret (F). Mithridate mustard, Penny-cress, Wild-cress, Feldpfefferkraut (D). Thlaspi, Erba sterna, Mile flore (I).

نوع من الاندلسية من فصيلة الصليبيات، وهي من النباتات المشيئة البرية التي تكثر في البرور وتوجد في الحقول المزروعة. أوراقها لحية النصل الكامل. أزهارها عطرية النجم، تاجية الارتكاز، ودية اللون. يقال أنها لا تغلظ من بعض المناطق الحلية.

١٥٩٣٤ - شِمْرَاقِيَّةٌ

Metrosideros (S).
Metrosideros (F).
جنس نباتات جنينية برية معمرة من فصيلة الأسيات. أزهارها المرفقة مدببة، مهدبا عند من لحد إلى جزر الزواج || سطحا مستقيمة، فراء. أوراقها متناوبة، مستطبة، بيضية النصل الصغيرة الجامدة. أزهارها لائقياسية النجم، محورية أو أبولية الانتصاب، طويلة الأصناف، خاسية البتلات الصفراء، مستطبة الاسدية، مستطبة العروق.

١٥٩٣٥ - شِمْرَاقِيَّةٌ

Hymenocarpus circinatus (S). Hymenocarpa (F).
Hymenocarpus, Circular Medick (E).

نبات حشيشي، يري، حولي، وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرقيات الفراشية. منته بعض اصناف سواحل البحر الابيض المتوسط اغصانها الممتدة من انطاكية الى غزة || ساقها فراء زباد تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. أوراقها خلية النصل، السفلى كاملة، سفلية الشكل، قرصية النجم، اما العليا فمركبة، وقرية، خاسية الورديقات أو قاسية. الورديقة الانتهائية دائما اكبر من رفيقاتها || أزهارها أبولية الارتكاز، مستطبة المالحق، صفراء اللون || تنويعها يستمر من آذار الى ايار.

١٥٩٣٦ - شِمْرَاقِيَّةٌ طَرُوقِيَّةٌ

Tornalia (S).
Tornalia (F).

جنس نباتات سريعة مدادة معمرة من فصيلة التلقاسيات. انواعها المرفقة ١٢، سقيا اسطوانية متناوبة السلايات القصيرة، الممتدة، الجارية المقعد. أوراقها مستطبة الزناد، كبيرة النصل الفارز المزروع والتصنيف والانتاج التشرم. ثمادها اكرار عفران اللون، وغروية الشكل، مستطبة، ترتكز على مالحق أبولية الانتصاب غليظة.



شوة بحرية



شوة مَرَّة



شروس لديد



شمر



شروق بنيس

١٥٩٣٧ - شِمْرَاقِيَّةٌ لَدِيدٌ * ، طَرُوقِيَّةٌ لَدِيدَةٌ
Tornalia delicata (S). Tornalia délicieuse (F).

نوع من الشمر الساطع الانتاج الزراعي المركزي. سلق مدادة تطلو من ٦ الى ٨ امتار. أوراقه شبه قلبية الشكل عميقة التفرغ والتشريح، مستطبة الزناد. نصلها مائل لنبشرة، جامد التشريح، شديد الخضار. ثمادها اكرار غروية طويلا نحو ٢٠ سم. وقطرها ٤ سم. ثمرها عفران اللون ثم تنحرف مع الادراك الى الاصغر فالاصفر. وهي سكرية المذاق للنبذة الطعم فواحة العروق الطري المستحب.

١٥٩٣٨ - شِمْرَاقِيَّةٌ
Marsdenia (S).
Marsdenia (F).

جنبة معمرة جاحدة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها متعصبة فراء. أوراقها معتقة، متناوبة، بيضية الشكل، مقنطرة القاعدة، ذلقة الزواج الاخير. نصلها جبل الخضار اللامع. أزهارها خضية النجم، عطرية اللون، عطرية العروق الفواح المستحب || أزهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٥٩٣٩ - شِمْرَاقِيَّةٌ الْكَنْدُورُ

Marsdenia condurango, Gonolobus condurango (S).
Marsdenia du condor, Gonoloba du condor (F).

نوع من الشمرافس. جنبة معمرة طيبة من فصيلة السقليات. منتهيا بعض مناطق أمريكا الجنوبية المتاخمة لحظ الاستواء. يتكرر وجودها في البرور وجبال الكونديليار على ارتفاع يراوح من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ م. من سطح البحر || ساقها سريعة مدادة ومتسلقة تطلو عروق اربعة امتار. أوراقها متناوبة، معتقة، قصيرة الانحاف. نصلها اطليجية الشكل، مدببة الاطراف. أزهارها نوردي النجم، ابلي الارتكاز. أزهارها صفراء، معتقة، خاسية البتلات، ودية اللون، مستطبة العروق الفواح || تستخرج من لحاء جلودها مواد مقوية مرفة للمذاق تسمى كنغوريت وكنغورينج تستعمل في معالجة الملل السرطانية.

١٥٩٤٠ - شِمْرَاقِيَّةٌ *

Drymoxa (S).
Drymoxa (F), Drymoxa (E).

جنس طير من الجوارم سفيات الخاطر ينتمي الى فصيلة الدججيات. انواعها المرفقة نحو ٧٠ اصنافا تمتد من افريقية الشرقية الى الجزيرة العربية والشرق الاوسط واروبة الجنوبية. جميعها صغيرة القد، مستطبة الشكل، قريبة القش بالمثل. اثنائها ثنائية اللون. ظهورها الى الكهبة أو الربعة القزينة المولج. يطونها الى الصفرة أو البياض التي || مستطبة من الطيور المحرقة الضاربة. تكثر في الانجار القريبة وبين الصخور النافقة. مشاهدا قدسية الشكل، معتقة الرباط. اثنائها تقع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها نحو ١٥ يوما بمناوبة الذكور.

١٥٩٤١ - شِمْرَاقِيَّةٌ بَكِيْسٌ *
Thyaira bacis (S).
Thyaira bacis, la Batis (F). Thyaira bacis (E).

حشرة من فصيلة الشمرقيات ودية سفريات الانجسة. ساقها الاقدام المتعددة الحمرارة من الماء القديم. فراشها جارية قتها رقيق الانظار. سرقها خاضعة تموش على اوراق الموج والتسرين || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ م. يستلها نحو ٣٨ م. رأسها معتدل الجرم. عينها

١٥٦٥٠ - شَمِيشُ رَوَّاحٍ *

Troglodytes riparius (S). *Troglodytes rufus* (F).
Troglodytes riparius (E).

حشرة نائلة قانصة من فصيلة الدفريات رتبة عذبات الاجنحة. تألف شلاف مجري الماء. قوتها المواد الضوية والبيدات. جسمها صغير القدر طول من ٥ الى ٦ م. ثوبها اسود يستند الطول والجوانب واخرها قانها جوية. رأسها صغير الحجم قصير الخط. زباناها غطيان. عيناها كيرتان جاسطان. فمها صغير القدر لا يلس أكثر من حسي البطن. ابراسها خمسة السفل || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملدة في نيسان وتمشي حتى آب. تسرح في التمار. تناف بعد ظهورها بنصر دورهاها الى السرة || طور الاكمال الذي ينصر نحو ١٥ يومًا ينقضي بين وقتين تصبها السرعة وتربطها بجيوب حرورية.



شميش رَوَّاح

١٥٦٤٢ - شُرُوبِيَّات *

Thyrididae, *Cymatophoridae* (S).
Thyrididae, *Cymatophoridae* (F). *Thyrididae*,
Cymatophoridae (E).

فصيلة حشرات فراشية من حشرشات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٥٠ من حشرات الاثام المعتدلة الحرارة المنتشرة نحو البادية || اجسامها رشيعة متوسطة القد او صغيرة. رؤوسها صغيرة. عيونها زرقية جرداء. قرنها الاستشعارية خيطية او مشطية. ملاسها صغيرة مرطبة الاطراف. مراهضها مستطيلة. بطونها كثيفة الخلد والظب. حلقاتها جانبية الاوتكان تقع عند قاعدة البطن. ورائنها الامامية أطول من الخلفية وأقل امتدادة منها وأكثر بقبجها وزركمة. جرائنها وباجية المناس. مكثها مذكور. اسارها عريضة. خادراتها تلتصق بنصال الاوراق التي تجمعها الي بعضها البيض يتحول سريرة || اشهر اجناسها الشروق والروش والقيل والهرسين.

١٥٦٥١ - شَمِيط

Coupage (F). *Diluting* (E).

خلط بعض الحبوب ببشها لغرض ما.

١٥٦٥٢ - شَمِيعُ عَسْكَيْ عَسُو

Cire (F). *Beeswax* (E).

هو موم السمل مادة شمعية يفرزها النحل لبناء غاريبه.

١٥٦٥٣ - شَمِيعَةُ دَانَ ، مَالِكَة

Candellabre (F). *Candle* (E).

شكل من اشكال التخليل خاص بالانجار المسند.

١٥٦٥٤ - شَمِيعَةُ كَيْ

هي الخراب ، اطليه.

١٥٦٥٥ - شَمِيعَات

Myricaceae (S). *Myricaceae* (F). *Myricaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. انواعها نحو ٣٠ ، جميعها ينسب واحد. نباتاتها اثمار ومجبريات فراء. السوق. اوراقها صغيرة القد ، جامدة التصل ؛ تفرز مادة شمعية تستخرج بقل الاوراق في الماء.

١٥٦٥٦ - شَمِيعَةُ ، شَجَرَةُ الفَسَح

Myrica (S). *Myrica*, *Cistrea*, *Arbre à la cire* (F). *Bayberry*, *Candle berry myrica* (E). *Wachsgel*, *Wachmyrta* (D). *Mirica*, *Albero della cera* (I).

جنس الانجار ومجبريات من فصيلة الشمقيات. انواعها المعروفة ٣٠ ، جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة. اوراقها ابيدة ، متناحية ، مستطيلة الشكل ، صغيرة القد. تصلها جامدة الفسح ، كثيف المسام الشمعية. انوارها سنبلي التجميع ، متراكب السيفليات. انوارها صغيرة القد خضراء اللون. ثمارها نوبية لحية رسيعة السمية. انجارها سريعة للنمو ترطب في الاراضي الرطبة وتستعمل في اصلاح مناطق المنافع || اشهر انواعها الشمعية الثالثة والسيفية والمطر والقلبية والورق.

١٥٦٥٧ - شَمِيعَةُ

هي لبدة اللبن ، اطلبا.

١٥٦٥٨ - شَمِيعَةُ الحُمُفِيَّات

هي لبدة الحُمُفِيَّات الصيفية ، اطلبا.

١٥٦٤٣ - شَمْس

Soleil (F). *Sun* (E).

الشمس جرم سماوي تدور الارض في فلكه حل بمد ١٧١٢١٠٠٠٠ كيلومتر. والشمس التي تعتبر مصدر الحياة على الارض بما تبته من حرارة وضوء هي جسم ناري يقدر قطره بنصر ١٦٠٠٠٠٠٠ كيلومتر وتقدر حرارته الباطنية بنصر اربعين مليون درجة وحرارته السطحية بنصر سبعة الاف درجة || ويتخذ بعض الفلكيين ان مصدر هذه الحرارة التواجب الكافحة هو الطاقة الحرارية الناشئة من تحلل جزئيات المناس التي تتكون منها والتي تعرف بالكهارب || اما مدة دورة الشمس حول محورها من الغرب الى الشرق فتتم في ٢٥ يومًا.

١٥٦٤٤ - شَمِيسَات

رتبة كانتات حيوانية مجهرية من الجليات.

١٥٦٤٥ - شَمِيسَات

هو اليقس ، اطلبا.

١٥٦٤٦ - شَمِيسَات

هو اليقس الدائم الخفيرة ، اطلبا.

١٥٦٤٧ - شَمِيش

هو اليقس الدائم الخفيرة ، اطلبا.

١٥٦٤٨ - شَمِيش

هو اليقس الدائم الخفيرة ، اطلبا.

١٥٦٥٩ - شَمِيَّة شَامَّة *

Myrica communis (S). *Cirier commun*, *Myrica commun* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية تملو نحو ٤ أمتار. ثمارها نورية صغيرة القند ، بأذنانة اللون ، شمية القشاد ، أرواقها عارية تستعمل في صناعة الحبر الأسود. أما ثمارها فيستعمل كالشحم ويدخل في صناعة الصابون. يقال أن جلودها لا تغلظ من المنافع الطبية .



شمية شامة

١٥٦٦٠ - شَمِيَّة صِينِيَّة *

Myrica edulis (S). *Myrica comestible*, *Cirier comestible* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية تملو نحو ٤ أمتار. مهدا البلاد الصينية ، ترطب في الموائع المشتعلة الرطوية. ثمارها مأكولة مشبعة الطعم ، صفراء اللون أو صفراوات.



شمية صينية

١٥٦٦١ - شَمِيَّة عَطْرِيَّة

Myrica gale (S). *Galé*, *Piment royal*, *P. aquatique*, *Myrica bétard* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية كبيرة القند تملو نحو عشرة أمتار. أرواقها صارية تستعمل في غسيل الثياب ولغظ الأثمة من حيث بعض الحشرات كالعث .



شمار

١٥٦٦٢ - شَمِيَّة قَلْبِيَّة الْوَرَقِي

Myrica cordifolia (S). *Myrica à feuilles en coeur* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة مشطبة القند تملو نحو ٨ أمتار. أرواقها قلبية الشكل ، يستخلص منها شحم أحمر اللون يستعمل كالشحم المادي ويدخل في صناعة الصابون.

١٥٦٦٣ - شَمِيَّة

Biophytaxia (F). *Biophytaxy* (F).

الشحم بيولوجيا مجموع وسائل المقاومة الممكنة أن يجهزها الجسم لصدفها ماثلة ونشاطه .



شمار بري

١٥٦٦٤ - شَمِيل

ما ينبت في الغنجل بعد قطفه . ج شاليل . وإثاليهي طوق النخل البالية .

١٥٦٦٥ - شَمَالِيَّة

Palaeactica (F). *Palaeactica* (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالمنطقة الشمالية من العالم القديم ، أي من آسيا وأوروبا .

١٥٦٦٦ - شَمِيدَر ، شَوَكْدَر ، بَسْجَر ، صَوَطَلَة

Beta vulgaris rapa, *B. rapa* (S). *Betterave* (F). *Bent-root* (E). *Echter Mangold*, *Rübe* (D). *Barbabetola* (I).

نبات عشبي زراعي محول من فصيلة السرميات . خضروبه وأصفره كثيرة العدد تقسم إلى ثلاث فئات . فئة الخضروب البقية التي تستعمل للأكل والخلالات وفئة الخضروب السكرية التي تستعمل لاستخراج السكر وإكثا وفئة الخضروب الملحية التي تستعمل لذاد الماشية || جلودها خضرة لياينة غلظتة الأشكال والأحجام ، ساقه ليفية فروع تملو نحو ١٠٠ سم . أرواقها الجلدية قرصية الانتساب كبيرة النصل ، غليظة الصلح المسراء ، متعجبة للتسج ، مائة البشرة ، عابطة الخضار . أنوارها غشوية خاصة التركيب ثمارها حبوب مقرقة ، جافة ، شاذكة ، تغلف بعض البزور الصغيرة القند ، الكلولية الشكل ، المسراء اللون . والثلوث رطب في الأثرية المتوسطة الانتساج والرطوبة الصفة اللورد وهو ينشئ الأثرية الجسدية والصلابية للتعجبة وكل تربة جافة عادمة الاحتفاظ بالرطوبة . يزرع عادة في أول النورة الزراعية مها كان قوامها



شموطة



شميلة

أن ثالثة أو ثالثة أو رباعية . وهو في الزراعات الكبيرة ينجر مباشرة في التربة على خطوط متساوية الإبعاد . أما في الزراعات البستانية فينجر في شتاتل خاصة ثم ينقل إلى مستقره عندما يبلغ ارتفاع شتله (بوارشه) نحو ١٥ سم . أما معاملته الخاصة في الفترة الثامنة بين الفرس وبني الحصيل فمهادها حرق وتعشيب وري .

١٥٦٦٧ - شَمِيدَر بَرِي ، شَوَكْدَر بَرِي

Beta silvestris (S). *Betterave sauvage* (F). *Wild beet* (E). *Wildier mangold* (D). *Bietola selvatica* (I).

هو الشميدر البري الذي ينكر في المناطق والأراضي الرطبة . وهو من النباتات الحولية ، جلودها صغيرة دقيقة تكاد تكون متفرقة . أرواقه القرصية خضرة النصل المستطيل . ساقه منتسبة قليلة الفروع تملو من ٤٠ إلى ٧٠ سم .

١٥٦٦٨ - شَمِيدَاد

Laminor (F). *Flattening-mill*, *Rolling-mill* (E).

الشهادة آلة لتصفيح المعدن وتقليده .

١٥٦٦٩ - شَمِيدَكَة

Laminage (F). *Laminating*, *Flattening* (E).

الشهادة تطريق المعدن لتصفيحه أو تحديده .

١٥٦٧٠ - شَمُولَا ، قَدَر ، قَادَر

Rupicapra tragus (S). *Chamois* (F). *Chamois* (E).

حيوان من الغنم الضاربة ، وسيد الجنس والفرع شبيه بالبعز والأروية يتميز بقرنيه المجولين الأسفلين . أذناه متضبتان . عتقه مستطيل . جرمه خضرة قوية ، ذنبه شديد القصر . أذناه ثالثة الخلف . ثوبه يتغير مع فصول السنة والسن إلا بطة الثائم البياض || موطنه جبال أوروبا وآسية الصغرى . يألف الأماكن الباردة ، يعيش على جلود التاج . أذناه تقع جنباً واحداً رفصه ٣ أشهر وتحفنه حولاً كاملاً .

١٥٦٧١ - شَمُور

Diamant (F). *Diamond* (E).

هو الماس ، اطبه .

١٥٦٧٢ - شَمُول

Mûre (F). *Mulberry* (E).

هو ثمرة الثوت وما شاكلها من الثمار كاشليك ... أما ثمرة العليق وأتباعه فتسمى مصمة .

١٥٦٧٣ - شَمِيدَكَة ، شَمِيدَلَة أُسُوبِيَّة ، الْوَلِيل

Allophylus, *Schmidella* (S).

Allophylus, *Schmidella* (F). *Allophylus* (E).

جنس نباتات شجرية معمرة من فصيلة السابنديات . أنواعها المعروفة خمسة أصنافها البلاد الحارة من العالمين القديم والجديد . جميعها أشجار صغيرة الحجم ، مظلة الشكل . أرواقها متضاربة مركبة ثالثة أو روفقات . وريقاتها فضية النصل المسن الحافة . أنوارها أبلي الانتساج ، سبلي التسجيج . ثمارها كروية الشكل والقند ، مستعينة الطعم ، سكرية المذاق || أشهر أنواعها الزراعية الثلاثة التالية :

١٥٦٧٤ - شَمِيدَلَة أُسُوبِيَّة ، الْوَلِيل

Allophylus cobbe, *Schmidella serrata* (S).

مهدا البلاد الآسيوية الحارة . ثمارها برتقالية اللون ، مأكولة .

Allophylus, *Schmidella* (F).



شبة البحر



شيفة شائعة



شن شمال الأنسي



شتوت أسود الرأس

على غصاف الاجر والبحيرات. يشن وكه الذي يبلغ قطره نحو ٢٠٠ سم. على القرية وصل المسخور وفي ثم الاشجار البسقة. انتاد تبش من الرتين الى الثلاث رفقات تحفبها وسدا نحو ٥ اسايح.

١٥٦٨٦ - شن^٥ Chen (S). Chen (F).
جنس طير من كليات القمم فضيلة الوريات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها المناطق القطبية تجوما كل عام وقد تقرب من المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة لكنها لا تقم فيها اكثر من اسبوعين ثم تفلو || اجسامها كبيرة لثقة ارساها اطول من ارساخ قورق العبادي. مناقبها بيضاء الاطراف المحددة هرا. اثوابها سوية اللون الابيض تلموه بعض الزخارف التي تختلف باختلاف الاطوار || تدفن في اعاصيص تحطرها بين مسخور الجبال. الانثى تضع في ١٠ الى ١٢ بيضة تحفبها بمنجولة للذكر نحو ٣٠ يوما. اشهر انواعه شن شمال الانسي.

١٥٦٨٣ - شن الشمال الانسي^٥، ورقة

الذهبيك^٥ Chen hyperboreus (S).
Chen hyperboreus, Oie des neiges (F).
Snow goose (E).

نوع من الشن فضيلة الوريات. اصغله مسط مناطق القطب الشمالي، ملجته الحيواني جامعي || جسمه كبير لثقة، ابيض الثوب، اسود اطراف القوائم، انهب الجبهة، احمر الاذن العلوي من المنقاد، ابيض السطح، ازرقة اللطخ اي الطرف. احمر الجفون. كسني الخدقة. اصفر الرقبة والقدم.

١٥٦٨٤ - شنل^٥ Bartsvalle, Perdrix bartsvalle
هو الجبل الرصي، الجلبه.

١٥٦٨٥ - شنش^٥، موكليدي

Naturaliste (F). Naturalist (E).
الشنش العالم بالطبيعات او التاريخ الطبيعي او علم المولايه.

١٥٦٨٦ - شنكالة^٥ Polymérisation (F).
Polymerization (E).
هي انقسام او استراج ذرات متشعة في مركب تتجج عنه خواص طبيعية وكياوية مختلفة.

١٥٦٨٧ - شنكالة^٥ Fleurs (F). Tears (E).
البنغ الذي يقطر من الشجرة عند حرز ساقها او تقليم اعضائها وقطبها. ويهي ايضا للحداد.

١٥٦٨٨ - شنكالة^٥
والرانة الامليسية ليس لها نوى وانما هي ماء في قشر على خلفة الحب من غير حجم^٥. (السان).

١٥٦٨٩ - شنكيد^٥ Fleurs de colchique (F).
Flowers of colchicum (E).
هو زهر السورتيان

١٥٦٩٠ - شتوت أسود الرأس^٥ Amphimallus ater (S).
Amphimallus ater (E).

حشرة غاصلة صغيرة المسرح من فصيلة الجمليات رقيقة مشملات الاجنحة. موطنها مسط اتاليك البلاد المعتدلة

١٥٦٩٥ - شميدكة افريقية^٥، افويل
الافريقي^٥

Allophylus zeylanicus, Schmidella africana (S).
يهدها افريقية الشرقية وسردبيل ولهند. ثمارها ارضوانية اللون مستحبة اللحم.

١٥٦٩٦ - شميدكة مأكولة^٥، افويل
مأكولة^٥

Allophylus edulis, Schmidella edulis (S).
يهدها البرازيل. ثمارها حراء اللون لينة اللحم.

١٥٦٩٧ - شميسكة^٥، ميكروميريا

Micromeria (S). Micromérie (F). Micromeria (E).
Barcaurel (D). Micromeria (I).
جنس نباتات عشبية برية وريدينية من فصيلة الشفويات اوراقها صغيرة لثقة متعاقبة. ازهارها معتدلة التجميع، ابلي الاركاناز. ازهارها صغيرة الحجم، قصيرة المالحيل، دقيقة الامن. فيها الابيض والاخر والازرق والمزلق. اشهر انواعه التريدينية ما يلي.

١٥٦٩٨ - شميسكة الوعر^٥

Micromeria rupestris (S). Micromérie rupestris (F).
نوع من الشميسكة المصرة تلمو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقها قرمها صغيرة، اوراقها بيضيه التصل المقرص المتعاقبة تلمو نحو ٨ سم. ازهارها الى الابيض المزلق بالازرق. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز وهي من كليات التي ترضب في الاراضي البويرة تعيش بين الحجازة والصخور وفي جميع الاماكن المعرضة للشمس.

١٥٦٩٩ - شميسكة كروانية^٥

Micromeria croatica (S). Micromérie de Croatie (F).
نوع من الشميسكة المصرة تلمو نحو ٢٠ سم. ساقها قرمها زبد. اوراقها قليلة الشكل، لائحة البتق، تلمو نحو ١٠ سم. ازهارها حراء اللون او وردية، مستطيلة الامن العتيقة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٥٦٩٠ - شميسكة الازهر^٥

Pygargus leucorhynchus (S). Pygargue leucorhynchus (F).
Sea eagle (E).
طائر من الشياط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات. موطنه الشرق يجوبه من تركيا الى الصين ومن الهند الى سيبيريا، طوله نحو المتر. الانثى اكبر حجما من الذكر. ثوبه الى السدرة البيضاء، رأسه وذنبه الى الابيض المالح، بطنه متشش الريش بالابيض || يابث غصاف الاجر والبحيرات. يشن عنه في ثم الاشجار البسقة.

١٥٦٩١ - شميسكة شائعة^٥، عقاب الشن^٥
Haliastur albicilla (S). Pygargue vulgaire, P. à queue blanche (F). White tailed eagle (E).

طائر من الشياط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات. طوله نحو المتر. ثوبه يختلف مع البسر يرتكز على السدرة. بطنه متشش بالابيض ونسبة الابيض في الريش تزداد حولا بعد كل تحير. رأسه وبقعه الى السدرة الباردة، ذنبه ابيض، منقاره وعظامه سفر || موطنه فسح الاجراء محب البلاد الاسيوية والاروية والافريقية الشمالية والاسريكية. يابث المسخور البحرية والاصراج القائمة

مهددا روي حوض البحر المتوسط . توجد في الاراضي المخصبة . جذورها خضائية يستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال البيولوجي والصناعي .

١٥٦٩٧ - شينجار مَثَلَتُ الاُكُرُون

Onosma albo-roseum (S). *Orcanetta tricolore* (F).
نوع من الشينجار التريزي الممر . يطو نحو ٢٠ سم .
اوراقه اعليجية الشكل ، نصلها مغطى القاعده اخضر اللون .
ازهاره كبيرة لثقة تطول نحو ٥ سم . تبدو يضاء اللون .
ثم تتحول الى الاحمر القوي وتتغير حل الازرق .
انفران يستمر من ايار الى حزيران .

١٥٦٩٨ - شينجار لَحْمِي

Onosma stellulatum (S). *Orcanetta étoilée* (F).
نوع من الشينجار التريزي الممر . ساقه فراءه تطو نحو ٢٠ سم .
اوراقه اعليجية ، مستطيلة ، ملتفة اختار .
نصلها الى اخضر البشري الباهت تملو بقع من الزغب
كالطب نجمة الشكل . ازهاره الى الصفرة الكبريتية عليها
موج اخضر || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

١٥٦٩٩ - شينجار هَرَمِي

Onosma pyramidale (S). *Orcanetta pyramidale* (F).
نوع من الشينجار التريزي الممر . هرمي الشكل ، فصي
اللون ، يطو من ٥٠ الى ٦٠ سم . ساقه فراءه زباد اللحماء .
اوراقه الجذعية سنائية التصل تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم .
وتعرض نحو ٢٥ سم . ازهاره خلية البشرة تبدو ارجوانية
اللون ثم تتحول الى اليلك || ازهاره يستمر شهراً واحداً
يتمتع به في اوائل تشرين الاول .

١٥٧٠٠ - شينجار كُتْمِي

Lithospermum (S). *Grémil* (F).
جلس نباتات عشبية برية وريضية مصرنة من فصيلة
الحسبيات . انوله ٣٠ سمها اشباب فراءه السوق .
اوراقها متعاقبة صغيرة لثقة ، شبيكة التصل . ازهارها
مقفودة التجميع ، محورية وطريقة الارتكاز ، مختلفة
الالوان . بزودها صلبة ، فراءه اللون ، لامة كاللؤلؤ .
اشهر انوله ما يتبع .

١٥٧٠١ - شينجار اَبْيَض

Lithospermum canescens (S). *Grémil blanchâtre* (F).
نوع من الشينجار التريزي . ساقه فراءه زباد اللحماء .
تطو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوراقه لائقة خفيفة مستطيلة .
ازهاره الى الصغار التي . ثماره بيض || ازهاره يستمر
من نيسان الى حزيران .

١٥٧٠٢ - شينجار اَحْمَرُ حَمَمَة

Lithospermum arvense (S). *Grémil des champs*, *Lithosperme* (F). *Corn-gromwell*, *Bizard alkant* (E).
Ackersteinsame, *Korngift* (D). *Lithospermo*, *L. del campi*, *Strigolo selvatico* (I).
نوع من الشينجار البري يطو نحو ٥٠ سم . اوراقه
لائقة خفيفة ومستطيلة . ازهاره حمراء اللون . بزود طيبة .
جلوره خضائية ، صباغها احمر اللون .

١٥٧٠٣ - شينجار مخزني * حَبَّ التَلْب ، كَأْسَرُ الحَجَر ، حَالُوم

Lithospermum officinale (S). *Grémil officinal*, *Herbe aux paries* (F). *Common gromwell*, *Pear Plant* (E).
Echter steinsame, *Perlenkraut* (D). *Lithospermo officinale*, *Erbe della parie* (I).
نوع من الشينجار البري يطو من ٢٠ الى ٥٠ سم .
اوراقه خفيفة التصل المزهر الصفحة . ازهاره ودية اللون ،
خلية البشرة . بزود لؤلؤية طيبة قدر اليل .

الخامرة من الشرق الاوسط واروية . تألت الحشاب والاراضي
المحلاة التي يطفي عليها عنصر الجس . خنافسها تميش
حل اوراق الاعشاب . يرقاتها تقسم جلور التجليات
وبيعها من النباتات العشبية || جسمها متوسط القد ، يطو
من ١٢ الى ١٤ سم . ثوبها ثنائي اللون اسود الرأس والكتول
واطين ، بني الظهر والجوان . رأسها صغير الجرم ،
زبانها مرقية التركيب ، شاربها الفضل ، وبقا الاطراف .
كسولها خلي الصفحة . اسافها خلسة العقل ، صفة
الحالب || الاثني اميز قدماً من الذكر واهت ثوباً منه
واضح بقاءً واطول سراً || لها جيل واحد في اليل .
تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اوائل
آب . تسرح في النهار وتبيت في اليل || البرقة عند تمام
نموا قرية الشبه بالقومعة البيضاء . جسمها مقوس الشكل ،
مستطيل الرأس البشري ، مستصن الطرف ، ابيض اللون ،
اقير الموج ، صلح الكنك ، احمر الروابج المهدبة
الاطراف || طور الاكمال يستمر نحو ثمانية اسابيع .

١٥٦٩١ - شَنْجَرَة ، شَنْجَرَة

Palmure (F). *Web-footed* (E).
هي الخياط مادة جلدية او غروفيية تجمع ما بين
اصابع الطير وبشره من الحيوان . ج شتار .

١٥٦٩٢ - شينجار

Oncosma (S). *Orcanetta*, *Orcanète* (F). *Orcanet* (E). *Orcanetto* (D). *Organetta* (I).
جلس نباتات برية وريضية من فصيلة الحسبيات . انوله
نحو ٣٠ سم . ساقه فراءه مهدية اللحماء . اوراقها متعاقبة
نصلها خلية البشرة او نجمة الزغب . ازهارها خلية
الترويات مختلفة الالوان فيها الالبض والاحمر والودي
والازرق . اشهر انوله المرفوعة ما يلي .

١٥٦٩٣ - شينجار اَلْمَنِي

Oncosma bourgeai (S). *Orcanetta d'Arménie* (F).
نوع من الشينجار التريزي السروتي . منه اوبونية يطو
نحو ٣٠ سم . ساقه فراءه . اوراقه سنائية الشكل نصلها
مغطى القاعده ذات الطرف . ازهاره مدلاية يضاء اللون .
ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

١٥٦٩٤ - شينجار البَرَّ

Alliaria tinctoria (F).
هو الكتان الصبائي ، اطليه .

١٥٦٩٥ - شينجار حَرْمَرِي

Oncosma sericeum (S). *Orcanetta soyeuse* (F).
نوع من الشينجار البري الممر . ساقه مسطحة تطو نحو
٣٠ سم . اوراقه اعليجية الشكل ، زباد لتصل . ازهاره
حضاب اللون ، خلية البشرة في جميع اصنافها || موطنه
حضاب وجبال الشرق الاوسط ، يمتد من الاناضول الى
جبال ايران || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٥٦٩٦ - شينجار صَبَاغِيَّة * اَلْمَوْزَة صَبَاغِيَّة ، يَطْلَعُ الصَّبَاغِيْن ، حَبَّ العَنْزَل ، كَحْمَلَة

Oncosma achioides, *O. tinctoria* (S). *Orcanetta*
viperine, *O. tinctoriale*, *O. de Provence* (F). *Dyer's*
bugloss, *Dyer's orcanet* (E). *Färberechenszunge* (D).
Organetta tinctoria (I).
نوع من الشينجار البري والزراعي الممر . جلوره ليفية
مغشوة لها الى الجلوية . ساقه فراءه تطو نحو ٤٠ سم .
اوراقه مسطرة ، لسة ، مغطوة القاعده . ازهاره حمرة
ابنية وتأتي الارتكاز يعلب فيها الاصفر الالبض الموج .



شينجار صباغي



شينجار حرمري

١٥٧١٢ - شُتْدَك جَبَلَر

Eryngium giganteum (S). Panicaut géant, Grand chardon (F).

نوع من الشنتاب، يصل نحو ٢٠٠ سم. ساقه حمراء منتشية. أوراقه منفصلة وبغرضة. نصلها جامد الملمس، متبادع التسنين، قوي الشوك. أزهار كبيرة القبة، ورؤسها قليلة التجميع، ولونها إلى الأزرق الزاهية || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٥٧١٣ - شُتْدَك جَمْسِي، شَوْكَة زَرْكاه

Eryngium amethystinum (S). Panicaut améthyste (F). نوع من الشنتاب، يصل نحو ١٠٠ سم. أوراقه خامة التفريش، جامدة التصلب البحري اللون، حادة متبادع التسنين مستطيلة الشوك. أزهار ويبلغ أوراقه إلى الأزقة الجلسية || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٥٧١٤ - شُتْدَك عَجَبي

Eryngium eburneum (S). Panicaut ivoir (F). نوع من الشنتاب، يصل من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه تطلو نحو ١٠٠ سم. صفيحة البتلة خلية لينة، طافية اللون. أزهاره صغيرة الرؤوسات، كثيرة العدد، بيضاء اللون || أزهاره يستمر طويلاً الصيف.

١٥٧١٥ - شُتْدَك مُنْبَسَط الزُوك

Eryngium planum (S). Panicaut à feuilles planes (F). نوع من الشنتاب، يصل من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه يشبه الشكل جامدة التصلب المنبسط الصلبة يطلو نحو ١٥ سم. ويمرض نحو ٧ حباته لثاني التسنين، استانه صغيرة المذهب الشالك. - أزهاره إلى الأزقة الزاهية. - أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٥٧١٦ - شُتْدَك مَتَقَمِي، شُتْدَك مَائِي

Eryngium aquaticum (S). Panicaut aquatique (F). نوع من الشنتاب، يربط في الملتاق والمواقع الرطبة. يصل من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه شرفالية مستطيلة القاعدة والطرف تطلو نحو ٧٥ سم. وترس نحو ٣. نصلها جامد المسفة، عايق الخضر البحري، شالك الحمار المذهب. أزهاره بيضاء اللون يملوها ملبج أخضر || أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول.

١٥٧١٧ - شُتْدُلْ

Locustella (S). Locustelle (F). جنس طير من فصيلة اللخليات. ألوانه المروقة ثمانية موطنا القرق الاقد وأروبه. أجسامها صغيرة القبة. متاقها غرضية الشكل. اجنتها واذناتها متوسطة الطول. تألت المرامي واللتاق وضفاف الأجار. قوتها الحوام واليزود البرية. تنش في الاذغال وفي الانجار للندوة. انثاها تقص من ٤ إلى ٥ فيضات تحضنها بتناوب الكور: أعرف ألوانه ولونها الشدال الامر.

١٥٧١٨ - شُتْدُلْ أَمْر * *Locustella naevia* (S).

Locustella tachteta (F). Grasshopper warbler (E). نوع من الشدال. طوله نحو ١٤ سم. قوته متناوب الاألوان. رأسه وظهوره وبتناوبه وذنبه إلى الطحة الخطية الزيتية الملبج تملوها رشفة سوداء. زود وصدوره إلى الصغار المخلع. يلمه ولذنيكه إلى الصغار الباهت الاخير الملبج || تألت ضفاف الانهار والحدائق والجائث والمراج. يثن عشه في الاذغال. انثا تقص أربع فيضات تحضنها بتناوبه الذكر من ١٤ إلى ١٥ يومًا.

١٥٧٠٤ - شُجَيْرَا مُسَطَّح

Lithospermum prostratum, L. diffusum (S). Grémil couché (F).

نوع من الشجيرات الزيتية البروتية المعمر. يصل من ١٠ إلى ٥٠ سم. ساقه خشوية، مسطحة، صمجة. أوراقه ضيقة، نصلها يمرض من ٢ إلى ٤ سم. أزهاره خلية المنفصلة المخاربية، لونها إلى الأزقة البنفسجية. - أزهاره يستمر من ايار إلى تموز.

١٥٧٠٥ - شُجَيْرَا مَلُون

Lithospermum purpureo-coeruleum (S). Grémil pourpre et bleu, Thé d'Europe, T. des bois (F).

نوع من الشجيرات الزيتية البروتية المعمر. يصل من ٣٠ إلى ٩٠ سم. أوراقه ضيقة التصل تطلو من ٤ إلى ٨ سم. وترس من ١٠ إلى ١٥ سم. أزهاره تبدو قرمزية اللون ثم تتحول إلى البانجوني المايق. - أوراقه تستعمل استعمال الشاي وهي مودة للبليل || يثن في جميع الأريه وقد يجيد في المواقف المعتدلة بالتعرض الشمس || أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران.

١٥٧٠٦ - شُتْعُوب

فقرة ظهر البير. Vertèbre dorsal du dromadaire.

١٥٧٠٧ - شُتْدَك *

Eryngium (S). Panicaut. *Eryng. Eryngion*, Chardon Roland (F). *Eryngo* (E). *Mannstreu* (D). *Eringo*, *Cardo stellaris*, *Socera* (I). جنس نباتات عشية شائكة معمرة من فصيلة الخيليات. ألوانها كثيرة العدد. موطنا غرام منتشية. - أوراقها مفرقة شائكة شديدة الخضر. - أزهارها رؤسية التجميع عطفة الاألوان فيها الأزرق والايضا والاخضر || أعرف ألوانه وأشهرها ما على.

١٥٧٠٨ - شُتْدَك إَكْرِي، Panicaut de Crète (F).

هو القرمصة، اطلها.

١٥٧٠٩ - شُتْدَك أَلْبِي، *Eryngium alpinum* (S).

Panicaut des Alpes (F). نوع من الشنتاب، يصل من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه قليلة الشكل تطلو نحو ٢٥ سم. وترس ٢٠ سم. نصلها عايق الخضر، أزرق الملبج، اشراك حصار دقيقة متبادعة. - أزهاره قليلة العدد زرقاء اللون || أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول.

١٥٧١٠ - شُتْدَك أُنْشَاسِي الزُوك

Eryngium bromeliadifolium (S). Panicaut à feuilles de broméliacées (F).

نوع من الشنتاب، يصل من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقه غليظة ريمية الانتشاب. - أوراقه انشاسية الشكل ولونين تطلو نحو ٥٠ سم. - أزهاره إلى البياض الاخير يملوها ملبج أخضر || أزهاره يدم طول شهر تموز.

١٥٧١١ - شُتْدَك يَمَحْوي، غِيَّة العَمْر

Eryngium maritimum (S). *Panicaut maritime* (F). نوع من الشنتاب، يمش على الشرايط البحرية، يصل من ٤٠ إلى ٦٠ سم. - أوراقه منقطة، عريضة التفريش، جامدة التصلب المنش الشالك. - لونه إلى الخضر البحري الأزرق الملبج || أزهاره إلى الأزقة البانجونية الباهت. - أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول.



شداب



شدال امر

انفادها مزيلة ، محببة ، خلية الباء ، يطولها بعض الحشف الثالث . أوراقها سنانية الشكل ، نصلها مسنة الحنار ، خلية البشرة . أزهارها وردية اللون متقلبة بالاصفر || تنويره يستمر من حزيران إلى آب .

١٥٧٧٧ - شسنتوم كشافى الزرك

Chaenostoma linifolium (S).

Chénostome à feuilles de lin (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها قرنية للشبه بأوراق الكتان . أزهارها جرسية الشكل ، بيضاء اللون أو صفراء || تنويره يستمر من الصيف إلى الخريف .

١٥٧٧٨ - شسنتوم كثير الزهر

Chaenostoma polyanthum (S).

Chénostome multiflora (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو نحو ٣٠ سم . أوراقها مساوية الشكل . نصلها جبراء الصفحات العليا ، خلية الباطل . أزهارها متفردية التجميع . عناقيلها تطلو من ١٥ إلى ٢٠ سم . أزهارها إلى البيضاء الوردي الموالج || تنويره يستمر من حزيران إلى أيلول .

١٥٧٧٩ - شسروخ

Passerina (S).

Passerine (F). Sparrow-wort (E). Spatzenzunge (D).

Passerina (I).

جنس نباتات جنبية معمرة برية ودرتينية من فصيلة المازروبيات . أنواعه قليلة منها افريقية الجنوبية ، حيثما تشبه الخننج . أوراقها صغيرة متقلبة . أزهارها سنبلية التجميع ، تاجي الايكازار . أزهارها صغيرة القذ . جيلة الشكل مختلفة الألوان ، يلبق فيها الازرق .

١٥٧٨٠ - ششلية

Chinchilla

جنس حيوانات كبدية قاضية من فصيلة الششليات . موطنها الاربعين وكشيل وليفية والبيرو || اجسامها متوسطة القذ يراوح طولها من ٢٥ إلى ٣٥ سم . وأذناها من ١٢ إلى ١٥ سم . وذيها غروبية الشكل . سبالها ميمرة الحلب الاسح . حينما مكحلة مستطيلة . أذناها كبيرة وحريفة . جرائها الانامية قصيرة خلية الاصابع . اما الخلفية فسطلية ودرباعية الاصابع . برائها قوية حادة . فرونها قصيرة الور شديدة التنبؤ فاخرة الصنف . التواها إلى الصهبة اللؤلؤية يطولها مولج فضي تبق مع اقترابها من شبح الظفر وزهو وتميل إلى البيضاء عند البطن . قوتها الاغشاب والجذور والطحالب . انثاها تحمل ٨ اطبا . وتضع من ٤ إلى ٦ ادراس على ثلاث مرات في السنة || وهي نوان :

ششلية مصقة *Ch. lanigera* (S). *Ch. lanigère* (F).

ششلية قصيرة الذنب *Ch. brevicauda* (S).

Ch. brevicauda (F).

١٥٧٨١ - ششليات

Chinchillidae (S).

Chinchillidés (F). *Chinchillidae* (E).

فصيلة حيوانات لينة قاضية من مرتبة ششليات الشوزب ودية القواضم . اجسامها لثالة وأذناها خسة . جميعها قرنية الشيه من الالاب بفرائها الناعمة الحمرية وبأذناها المستطيلة الجلفة || موطنها امريكا الجنوبية . تعيش جماعات كبيرة البند ، اقلها المناطق المرتفعة اجسرتها رداء عديدة الانفاق والتعايز المتشعبة تخلفها

Nérine (F). *Nerine* (E).

جنس نباتات حشبية حذوية من فصيلة الترسبات . أنواعه عديدة ، أزهارها شوية مستطيلة . أزهارها بجلة الشكل سيوانية التجميع تركّز على شراخ مستط . أشهر أنواعه ما يلي .

Nérine undulata (S).

Nérine ondulée (F).

نوع من الشس ، أوراقه دقيقة تطلو نحو ٤٠ سم . وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم . نصلها إلى الحنار الزواقي . أزهارها لا تقياسية الشكل ، يطلها مكبرة عمدة . أسفها واقلها شجة . لونها إلى الوردي الزاقي . قذ من ٨ إلى ١٢ زهرة يحسها شراخ يملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أزهارها غريبي .

Nérine humilis (S).

Nérine humble (F).

نوع من الشس . أوراقه تنأخر من أزهار وهي شوية التسل التثالي الانقسام ، الحليل الحنار الزواقي . طولها يراوح من ٢٠ إلى ٣٠ سم . وعرضه نحو ١٠ سم . صيوانه الزهري يقد من ١٠ إلى ٢٠ زهرة يحسها شراخ يملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . لونها إلى الحمرية القروية يطولها مولج احمر || أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين الأول .

Nérine podica (S).

Nérine podique (F).

نوع من الشس . أوراقه تسبق أزهار وهي خلية الشكل نصلها حاني الحنار يطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو ٦ سم . صيوانه الزهري يقد من ٤ إلى ٦ أزهار يحسها شراخ يملو نحو ٣٠ سم . لونها إلى البيضاء الناصع يملو تخبط مستطيل احمر || أزهارها يستمر طوال شهر تشرين .

١٥٧٨٢ - شس منجن الزرك

Nérine curvifolia (S). *Nérine à feuilles arquées* (F).

نوع من الشس . أوراقه مستطيلة محبة لتصل البحري اللون . أزهارها ارجوانية قذ من ٨ إلى ١٢ || أوان أزهارها يختلف باختلاف زين غرسه . يعرض في المراكب ويحيو في جبع الارثية الخوازة الفنية بالمواد المنصبة .

Nérine flexuosa (S).

Nérine flexueuse (F).

نوع من الشس . أوراقه تظهر مع أزهار وهي شوية لتصل تطلو نحو ٣٠ سم . وتعرض من ١٠ إلى ٢٠ سم . عروبه واصرامه عديدة ، صيوانها الزهري يقد من ١٠ إلى ٢٠ زهرة ارجوانية أو قرنزية أو موشية يحسها شراخ يملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . || أزهارها يستمر من أيلول إلى تشرين .

١٥٧٨٣ - شسنتوم

Chaenostoma (S).

Chénostome (F). *Chaenostoma* (E).

جنس نباتات حشبية وعشوية معمرة من فصيلة المازروبيات . منها بعض مناطق افريقية الحارة والمعتدلة الحرارة . سقها تملو من ٢٥ إلى ٥٠ سم . أوراقها متقلبة ، مسنة الحنار . أزهارها ملونة ، خامية القلق المساوية || أنواعها المروقة قليلة البند ، أشهرها التالية :

١٥٧٨٤ - شسنتوم جي

Chaenostoma hispidum (S).

Chénostome hispide (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم .



شسروخ



ششلية

والاحجام . جميعها مستطيلة الفوهات القلبية الشكل ||
أعرف اجناسها واشهرها الشك وهو من الاصناف المقدسة
عند بعض جامعات الهند .

على اعماق تراوح بين ٥٠ و ١٠٠ سم . || قوتها الاغصان
والجلود . اما اجناسها الثلاثة فهي الشنيلة والنيديوم
واللفسوم .

١٥٧١٢ - شَنَكِيْس * ٥ ، طَلُوسُ التَّيْتِ

Polypetecron chiniqui (S). Chiniqui, Peon du Tibet (F).

طائر وحيد الجنس ولقرون من فصيلة الطيريات . موطنه
التبت . قريب الشبه بالطالوس والفرنج لكنه اصغر حجماً
واقل روعة وجمالاً . لونه مراكب الالوان المزركشة
الزلفية . ذيله غليظ التيشم .

Ratel de l'Inde (F).

هو الراتل ابر كيم . حيوان راسي ينشأ قريب القبي
بالزوب . يتخذ لنفسه نفقاً في الارض يخرج منه ، في
طلب القوت ، بعد الغروب ويودع اليه في الصباح الباكر .

Bruyère (F). Heath (E).

١٥٧٣٣ - شَنْطَقْ

هو الخلع ، اطلبه .

١٥٧٣٤ - شَنْغُوب ، شَنْطُوف

ما بني على اساق من الفصن بعد قلعه .

١٥٧٣٥ - شَنْطُ الدَلِكْ

هي دلوبيه شنف الدليك ، فجرة حرجية غشبا اخر
اللون فاسر الصف ، اطلبه .

١٥٧٣٦ - شَنْغُبْ هو الشك ، اطلبه .

١٥٧٣٧ - شَنْكَار ، شَنْكُور هو السفر ، اطلبه .

Hydrobatas asiaticus (S).

Cincle de Pallas (F). Asiatic water-ouzel (E).

طائر من بداج الماء وفصيلة التفتليات ، يعيش قرب
المياه العذبة يسبح ويلبوس ويمسك الحشرات والارام .

١٥٧٣٩ - شَنْكْ * ٥

Turbinele (S). *Turbinele*, Schanck (F). Shanck (E).

جلس اصناف حلزونية كثيرة القصد من الرغويات
المعديات . انولمه كثيرة البعد تعيش في مجار الاقاليم
الحارة . اشهرها الشك الهندي المعروف بصفت الحنوس
المقدس .

١٥٧٤٠ - شَنْكُور * ٥

Triblidium (S). *Triblide* (F). *Triblidium* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الاريل
اماميات الخياشيم وفصيلة القصبليات . انواعها المعروفة
عديدة منتشرة في معظم مجار البلاد المعتدلة الحرارة واغصانها
المحيط الهادي . تعيش على حضور المالح والمثلوثات ||
اصنافها وحيدة المساريع ، معدية السطح ، نادرة اللون ،
متباينة الاشكال يكثر فيها التفرقن الحثاري ووحيدة
الاصولج . اغصانها الداعلية لؤلؤية . قشائرها الخاوي
كلني للمادة || اجسامها رحيبة الاربدة التي يراوح قطرها
من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ، ثنائية القواسم الخروطية
الشكل ، المعززة بقواعد الخارجية . غصانها اريم
مجموعات متعاقبة تطلق الجسم ومجموعة خاصة مستطيلة
الشكل مركزها قرب الرأس ومن يمينه || جميع انواعها
ماكولة مرغوب لها .

١٥٧٤١ - شَنْكِيَات * ٥

Turbinelellidae (S). *Turbinelellidae* (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات معديات الاريل
اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد
منتشرة في بعض مجار المناطق الاستوائية ومنها الهند ||
اصنافها عتيفة الشكل ابر ريمية ، متغلوة الباك



شك



شك



شك



شك



شك

١٥٧٤٣ - شَنْم * ٥

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشنيتات . انولمه قليلة
العدد جميعها من اسماك البحر الابيض المتوسط . اجناسها
مستطيلة اللد ، اسطوانية الشكل ، متباعدة الزعانف الظهرية
المفرقة للشنار . تعيش في غث واسال البحر . دفعها
تجوي كلف الحيات .

١٥٧٤٤ - شَنْمُول * ٥

جنس سميات مشرة من فصيلة الروديات . انولمه قليلة
العدد فيها السرعة والفاكلة . سطحها قصيرة الجلاع . اوراثها
بسطة متعاقبة ، قصيرة السق . ثلويها كروية تشبه
الفريجل . لهايا جامد الكسر سطر العلم || اشهر
انولمه الزرقاء ما يلي .

١٥٧٤٥ - شَنْمُول الصيني * ٥ ، سَكْرَجَل الصيني

Chaenomeles sinensis (S). *Chaenomele de China*, *Cognassier du Chine* (F).

نوع من الشنول مجرته تملو من ٤ الى ٥ م . ساقها
سرة . اوراثها اطليعية الشكل ، قليلة القائمة تطول
من ٥ الى ٩ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ سم . ثلويها ازغب
الصفحة السفلى ، مثلثي الحافة . انولمها فردية ، كبيرة
القد ، وردية اللون ، فلية البرق . ثمارها كروية ،
قطرها نحو ١١ سم . لهايا متوسط الصلابة طاهر الفصوص ،
حازر العلم .

١٥٧٤٦ - شَنْمُول الياباني * ٥ ، سَكْرَجَل الياباني

Chaenomeles japonica (S). *Chaenomele du Japon*, *Cognassier du Japon* (F).

نوع من الشنول مجرته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم .
ساقه واغصانه شاككة . اوراثه سنائية الشكل تطول من
٧ الى ١١ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . ثلويها مثلثي
الحافة ، غلي البشرة على الصفحة السفلى . ازغاره لوزية ،
ثلثية التجميع ، خوصة القد ، لونها الى الازرقاني || ثمارها
كروية ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى
الغصا الاصفر . لهايا جامد الكسر ، متوسط الصلابة ،
طاهر الفصوص وسائر العلم .

١٥٧٤٧ - شَنْمِيَات

Polypetecridae (S). *Polypetecridae* (F).

فصيلة اسماك من اللوامات كليات الزعانف . اجناسها
وانواعها عديدة جميعها من اسماك المياه العذبة تعيش في
الث والاسال .

١٥٧٤٨ - شَنْوُس ، قَنْوُس

Lutodetra salmonus (S). *Chanos salmon* (F).

سمكة بحرية من فصوات الحثانث فضيلة الشنيتات
اعطانها البحر الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشي

١٥٧٥٧ - شَهَادَةُ التَّسْجِيلِ

Certificat de transcription (F). Certificate of transcription (E).

شهادة القيد التي يمررها أمين المكتب العقاري موضحاً فيها تاريخ تسجيل المند ورقه البيع.

١٥٧٥٨ - شَهَادَةُ التَّكْرِيمِ

Certificat de décharge (F). Unloading certificate (E).

هي الشهادة التي تمنح لآليات وصول البضائع وتفرغها.

Parère (F). Opinion (E). - شَهَادَةُ الْعَادَةِ

شهادة تدفعها الذرة التجارية لآليات عادة تجارية معينة.

١٥٧٦٠ - شَهَادَةُ الْعَمَلِ

Certificat de travail (F). Labour certificate (E).

هي الشهادة التي يبرز للمال أن مطالب باصطافها له حين انقطاع العمل عنه. فلا يثبت فيها إلا نوع العمل الذي كان يقوم به وتاريخ دخوله وانفصاله.

١٥٧٦١ - شَهَادَةُ الْكَفَافَةِ

Brevet de capacité (F). Capacity brevet (E).

راجع برأه.

١٥٧٦٢ - شَهَادَةُ الْمَصْدَرِ

Certificat d'origine (F). Certificate of origin (E).

شهادة يمررها المصدر وتثبت السلطة منحها تفيد عن منشأ البضاعة موضوع الشهادة.

Script - شَهَادَةُ رَحِيدِ

تحرر بقلمه المسافر والشركات إلى أحد الدائنين أو أحد عدة التستاد الذي لم يقبض كل الفوائد أو رأس المال المسدد والمستحق له وبهذه الشهادة يقدم مستندة ليقبض باقي المستحق له.

١٥٧٦٤ - شَهَادَةُ عَقْدَانِيَّةِ

Certificat hypothécaire (F). Mortgage certificate (E).

هي التي يمررها أمين المكتب العقاري ليثبت وجود أو عدم وجود دين أو حق عيني آخر على مقرر معين.

١٥٧٦٥ - شَهَادَةُ قَيْدِ

Certificat d'inscription (F). Certificate of inscription (E).

شهادة تثبت فيها السلطة المختصة كل ما سجل على الصيغة العقارية.

١٥٧٦٦ - شَهَادَةُ مَحَوِّ الرَّهْنِ

Certificat de radiation (F). Irradiation certificate (E).

هي الشهادة المفروضة للدلالة على محو قيد الرهن كله أو بيشه.

١٥٧٦٧ - شَهَابَانِ

Orang-Outan هو السلالة، الجليما.

١٥٧٦٨ - شَهَبَانِ * Clivia (S). Clivia (F). Caffe illy.

Natal illy (E). Riesenblatt (D). Clivia (I).

جنس نباتات عشبية مسمرة أليفة بجمهورية لا بصلية من فصيلة التريسيات. أنواعه المعروفة قليلة. أوراقها متعاقبة قديمة، مستطيلة، ثنائية التصفيف تصلها عروق الخشخار اللامع. أزهارها كبيرة القند حواء اللون أو برتقالية و صيوانية الإزهار يحبسها شراخ قزوين مستطيل. ثمارها كرزوية الشكل قزوينية اللون. أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

الشكل. يطلع نحو ٣٦ سم. رأسها صغير الحجم. عيناها كيرتان، ماصتان. خطمها صغير الشق. فكها عادم الأسنان. زعنفتها الظهرية شراعية الشكل تقابل الحظية. زعنفتها البالية قريبان متقابلان كالكلاية. قريبا إلى الرعدة النفسية يقيم في الرأس والظهر. لونها جيد الصفء مرفوف فيه.

١٥٧٤٩ - شَيْطِمْ Polymère (F). Polymer (E).

متعدد الأجزاء، يتضمن جلة اصول. اصطلاح يطلق على كل مركب كيميائي تكمل ظهوره على الشظاة.

١٥٧٥٠ - شَيْطِمْ Culleron (F). Winglet (E).

صفحة قرنية صغيرة اللدة، نصف دائرية الشكل، توجد عند قاعدة الرزان في الحشرات من ذوات الجناحين.

١٥٧٥١ - شَيْطِمْ Sphaceloma (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات. أنواعه المؤدية قليلة تركب الأوراق والنباتات والجوار تنطليها. من بمرطوب التي تنشأ خضونة في الطبقة الاممية ثم ترقى حتى البشرة فتصدها وتثرتها. جرابه الكندي قصير اللدة، يسيل التركيب. كئالده يفسية الشكل شفاقة. أعرف أنواعه وأشهرها شئمة الوردة.

١٥٧٥٢ - شَيْطِمْ الْوَرْدِ

Sphaceloma rosarum (S). Anthracnose du rosier (F). فطر مجهرية يصيب الوردي في أوراقه وقضبانها. مظهره الخارجي، على الأوراق، بقع مستديرة أو مستطيلة تركب التصل لبيد لونها إلى القفرة ثم ينصرف إلى الجفوة يطول مولج رصاصي، يقضي على التسج للنباتات فيلذليها ويثها. وهو على القضبان لطف قزنية مستديرة قفرا نحو ٢ سم. تسلب اللحاء وتكون فيها حتى الشكر. يكافح باستعمال المركبات المركزة على الكبريت والنحاس.

١٥٧٥٣ - شَيْطِمْ Chenailum (S).

Chenailum (F). Chenium (E).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة البسلافيات وربة حمديات الاجتماعية. أنواعه المعروفة سبعة أصنافها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة. أجسامها صغيرة، تطول نحو ٢ سم. رؤوسها صغيرة، شبه مزوانية الشكل. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية صولجانية. كثرةها وتكونها قياسية. ملابسها مستطيلة، كزاسلها خفيفة. بطونها مستعرضة مدلفطة، إحمادها عذدة، قصيرة، تلتصق نصف البطن. قوائمها نحيفة. الأليها وحيدة اللون يكثر فيها الجفوي والاسود اللصبي. سرعها دجوي. تعيش في الجشاة وفي قري النسل. قوتها ما تستطيع تنصه أو ما يتطر لها من مواد عضوية.

١٥٧٥٤ - شَهْ

لته: طائر يشبه الشاهين بأعلى الحام (الأسان).

١٥٧٥٥ - شَهَادَةُ Attestation

راجع اشهاد.

١٥٧٥٦ - شَهَادَةُ Certificat (F). Certificate (E).

جارة اقرار يمررها أحد الأفراد أو المؤسسات يثبت فيها أمراً معلوماً عنه.



شئمة الوردة



شيطم



شهبان

١٥٧٨٦ - شوكوب عتطر هو القزم البري ، الحلب .

١٥٧٨٣ - شوكس * Pavetta (S). Pavetta.

Baconia (F). Pavetta (E). Pavetta (D). Pavetta (I).

جلس نباتات جيتية مسرة من فصيلة القيويات . اوراقها مطوية متعاقبة . نصلها جامد الصلصة ، لام البشرة الزلغالية الخضر . ازهارها عتقودية التجميع ، ابيض وتساوي الايكاز . اثمارها زرقاء البلات والاصدية ، مسطوية الياس ، يشاء اللون او غصراء ، فواصة القرون الطري || اشهر انماه الثولس المحتدي الذي الرافضة الطرية . يزرع لزوين وهو من النباتات ليلية اوراقه مدرة قليل .



شهرمان

١٥٧٨٤ - شوكسيات Erubidae (F).

سبط من القيويات آجناسه تقارب للثة واوراه زعاء الف .

١٥٧٨٥ - شواطيب Anomours (F).

الشواطيب مرتبة دويات من القشريات عشائيات الارابل . كتنيز يتكوص بعض اعضاء اجسامها من الحافة المثل الى حالة ادق .



شواس

١٥٧٨٦ - شوكالة ٥ ، فوكس Phlox (S). Phlox (F).

Phlox (E). Flammenblume (D). Phlox, Flamma (I).

جلس نباتات عشبية حولية او مسرة من فصيلة القيسيات انزلها مدية مطعما ترابي . اوراقها ككلى . ازهارها طرية الايكاز ، متكوكية التجمع او طرية || اشهر انولاه ما يلي .



شواطة مسرة

١٥٧٨٧ - شوكالة بيشية الزرقى ٥ Phlox ovata (S). Phlox à feuilles ovales (F).

نوع من الشواطة وهي عشبية زرقية مسرة تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها بيضية الشكل . ازهارها زردية اللون متصبة البلات مسعرة الفصل || ازهارها يمتد من حزيران الى آب وهو متكوكي التجمع ، يمتد الزوائد القليلة .

١٥٧٨٨ - شوكالة درومند ٥ Phlox Drummondii (S). Phlox de Drummond (F).

نوع من الشواطة وهي عشبية سبردية زرقية حولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساهيا متصبة فراء زرقية السماء . اوراقها لائقة متعاقبة . نصلها قلبى الشكل ، خلى الصلصة السفلى . ازهارها تختلف باختلاف القربوب منها العادية والكنيسة بينها الحمر والبيضاء والوردية والاريجانية والصفراء . الحضية المزاج || ازهارها يمتد طوال الصيف واخره .

١٥٧٨٩ - شوكالة مسرة ٥ Phlox glaberrima (S). Phlox glabra (F).

نوع من الشواطة وهي عشبية سبردية زرقية مسرة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها سنائية ذلقة تطول نحو ١٢ سم . نصلها خلى البشرة . ازهارها زرقاء اللون او وردية ، نصلها شيقة وبيضية || ازهارها متكوكية التجمع قليل الكثرة ، يمتد من حزيران الى آب .



شواطة متكوكية

١٥٧٩٠ - شوكالة عكوكية ٥ Phlox paniculata (S). Phlox paniculé (F).

نوع حديد القربوب والاصرام جميعها مسرة زرقية تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها كبيرة ، متعاقبة ، سنائية

Grise, Erinose

وسم يصيب بعض النباتات سببه حشرة تسمى اريوزو ، راجع اريوزو .

١٥٧٧٠ - شهيد ، شهيد Rayon de miel (F).

هو السمل لا يزال في تخاروب اقراصه . Honeycomb (E).

١٥٧٧١ - شهيد الخج ، قننير Chênevis (F).

هو بذر القنب . Hemp-seed (E).

١٥٧٧٢ - شهيرة التجمر Achalandage (F).

هي اشجار سمة التجمر بين الحرفاء والزرايين . Custom (E).

١٥٧٧٣ - شهيرمان * Tadorna (S).

Tadorna (F). Shaldrake (E).

جلس طير من فصيلة البليات ، اوزاه قليلة العدد جميعا من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق . اجسامها ريشية القوام . اثوابا متراكبة الالوان الجميلة العابقة . رؤوسها سيد او خضر . غاطها قصيرة ، مبطلة ، جهورية اللون || تألت الحشرات والشرط البحرية عند مصبات الانهر . قوتها الاغشاب المائية والقشريات وبعض الاسماك الصغيرة || تنن اناصمها في الاجمار والابرة المهجورة . اثابا تنع من ١٢ الى ١٥ بيضة تحضنها بمناورة الذكور نحو اناصم .

١٥٧٧٤ - شهيرة الطين Pica, Picage (F).

زيفان في اللوق يقيد بعض الحيرانات كالدج كاتيل والبقر والغنم الى اكل التراب والوسول والجلود والريش وما اشبه . سببه المقدر نقص في الجسم وانتقاره الى بعض الموائد البذائية الكافرة .

١٥٧٧٥ - شيقى Inspiration (F). Inhaling (E).

حركة من حركتي التنفس قولها ادخال الهواء الى الرئتين . وقد يحدث ذلك بالساع تجويف الصدر من اهل الى اسفل ومن افواه الى الامام لتتمدد الرئتان وتغلتظ بالهواء حتى يصل الى الحويصلات الرئوية فتخلط منه الاكسجين وتنتقل من ثاني اكسيد الكربون .

١٥٧٧٦ - شوكا ، شوى Périrâne (F).

خلاف الشف اي مصلح الجسمة . Pericranium (E).

١٥٧٧٧ - شوكان ٥ Intempéries (F).

Indemancy (E).

عختلف العوامل الجوية غير المألوفة او غير العادية .

١٥٧٧٨ - شوار Entraineur (F). Trainer (E).

من تعامل ترويض خيل السباق .

١٥٧٧٩ - شوارك أنثوي Organe femelle (F).

Female organ (E).

هي الاعضاء التناسلية الانثوية في الحشرة .

١٥٧٨٠ - شوارك ذكري Organe mâle (F).

Male organ (E).

هي الاعضاء التناسلية الذكرية في الحشرة .

١٥٧٨١ - شواوب الطع هو الجلبان اللاناق ، الحلب .

١٥٧٩٦ - شَوَاعِيَّات ٥

Eresidae (S).
Eresidae (F). *Eresidae* (E).
 فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اصطلحوا بالباد الحارة والمعتلة الحارة من المالحين القديم والجديد || اجناسها متباينة فقد ذكروها اصفر من انثائها بما لا يقل عن ثلاثة اجناس || بعضها رباعية الرايا والمشتان تتميز بخلو بطونها من الصفائح البيضاء التي تشغل المشائر || الواجس مخضلة الاوان والزراكتي . تعيش تحت الحجارة وعلى الادغال والجنات البرية . عكادب الاجناس الارضية ابيض اشعث تحضره في التربة تحت الحجارة وتبطنها بفلاف من التماس انبوي الشكل . عكادب الاجناس الشجيرة صليبية الشكل . تسجها بين قصبان النبات || اشهر اجناسها الشواع .

١٥٧٩٧ - شَوَاقِي
 هو شب الليل ، نبات حشوي زينة صمر ، اطلبه .

١٥٧٩٨ - شَوَاقِيَّات
 هي الشيات لفصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .

١٥٧٩٩ - شَوَاقِي
 طائر من الدخائل ، اطلب دحلة شواله .

١٥٨٠٠ - شَوَان
 غرانر (F). *Grainier* (F). *Seedsman* (E).
 خزان القلة وياتها .

١٥٨٠١ - شَوَت ٥
 شجرة بيرة وزيتينة من القرنيات المتدمات . مهدا افرغية الجنوبية . ساقها بطينة النمو فراء . فروعها صلبة الايات والخشب . اوراقها مركبة وريشة وتيرة التجميع . وريقاتها بيضية الشكل . بحضة التصل الجليل الخصار اللامع . ازهارها ضمية حرار اللون تنشب في الفروع القديمة التي يقوى عمرها الجلي . ثمارها متاهل مبطلة متوسطة الطول كستية اللون . يزورها احادية الصف ، كلوية الشكل سماء اللون .

١٥٨٠٢ - شَوُوح
 هو الشوب الاناضولي ، اطلبه .

١٥٨٠٣ - شَوْحَة
 هي الرخصة ، اطلبه .

١٥٨٠٤ - شَوْحَط
 الشوط ، شجر تنمذ منه القسي وقيل نوع من النبع وقيل هما والشراب واحد ويختلف الاسم بحسب كرم منابها فا كان في قلة الجبل فنبع وفي سفحه فشرايين وفي الخضيف فشوط . واسمته شوشة (اللسان) .

١٥٨٠٥ - شَوْحَلَة فَرْقَاء اللَّذَب ٥

Cerura furcula, *Harpypia furcula* (S).
Harpypia fourchue, *Petite queue fourchue* (F).
Cerura furcula (E).
 حشرة من فصيلة الشوطيات ورتبة حشرشيات الاجنسة . موطنها سطر الاصفاة المختلة الحارة من العالم القديم . فراشتها جارسة قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الخور والصفاصاف || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ سم . بطنها نحو ٣٥ سم . رأسها معتدل الجسم . عينها كبرتان . زياتها شفايان من الاثني ، مشطيان مزدوجان من الذكر . جوشها الى الردة تتوسط بقعة

الشكل ، مزينة الصل . ازهارها حديدة الاوان مستطيلة القليل المدية الاطراف || ازهارها حشولي التجميع كبير القد يستمر من آب الى ايلول .

١٥٧٩١ - شَوَاقِي لَيْفِيَّة ٥

Phlox amana (S).
Phlox gracieux (F).
 نوع من الشواطة وهي بجلة سبروتية زينة صمرة تملو نحو ٤٠ سم . اوراقها امليبية تطلو من ٢ الى ٦ سم . السفل منها مقنطرة اما البليا بظلك . ازهارها وردية او بيضاء اللان . فصلها مهدية تغلفها الشكل || ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

١٥٧٩٢ - شَوَاقِي مَدَاكَة ٥

Phlox reptans (S).
Phlox rampant (F).
 نوع من الشواطة وهي عشية زركوية مدادة صمرة . اوراقها امليبية مقنطرة الطرف . ازهارها حرار اللون او وردية او بنفسجية . بتلاتها بيضية الشكل . فصلها خروطية مدية الاطراف || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٥٧٩٣ - شَوَاقِي مَرْفُحِيَّة ٥

Phlox pilosa (S).
Phlox polli (F).
 نوع من الشواطة وهي بجلة سبروتية زينة صمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها وريوحها مزينة . اوراقها ضمية التصل تطلو من ٣ الى ٨ سم . وقوس من ٣ الى ٨ سم . ازهارها بيضاء اللون او حرار او وردية . بتلاتها خلية البشرة ديقة . فصلها غرزوية الشكل || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٥٧٩٤ - شَوَاقِي مَطْمَحَة ٥

Phlox maculata (S).
Phlox macul (F).
 نوع من الشواطة وهي عشية سبروتية زينة صمرة تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم . اوراقها متعاقبة سنائية الشكل . فصلها ماس الصفحة المبطلة يختلف للمجات المنصر . ازهارها حطرية للزلفه لونها الى الحمرة او البياض . ازهارها قنوي التجميع . يستمر من تموز الى آب .

١٥٧٩٥ - شَوَاعَة سَوْدَاكَة ٥

Ereus niger, *Er. cinnabarinus* (S).
Ereus noire (F). *Ereus niger* (E).
 دودية من العناكب السابعة القانصة رباعية الرايا والمشتان من فصيلة الشواقيات || جسمها يتنيز بفرقة القد الكبير بين الذكر والانثى . الذكر يطول نحو ١٠ سم . شبه الى الصبية الحمرار ويلوحا بتجميع ابيض واسود . الانثى تطلو نحو ٢٧ سم . قوتها الى الولاد الباقي يطول على الحبل وتهديب في الاطراف ويملو صفحة بطنها كشة رباعية اطقات سفراء اللون || صدراها كبير القد ، مقنطوم الطرف . عينها زويتان . شوقها صغيران ذريان . فكها جميعا الاطراف ، كليلها الحلب . جرمها قوية . بطنها بيضي الشكل ، مبطط الجرم || تألف البراري . سرهما جبوي . قوتها الحشرات والباب والحوام . عكديتها يش اسطواني الشكل ، محودي الازنكار ، بعيد القور تحضره في التربة تحت الحجارة || يياتها الشقوي يستمر نحو اربعة اشهر . تعيش نحو ثلاث سنوات . ملجتها الحياتي لا يتحضره من ملجن غيرها من العناكب || تعتبر من العويات النافعة اللازوقية .



شَوَاعَة سَوَاد



شَوَت



شَوْحَلَة فَرْقَاء اللَّذَب

منقطة خاسية الاعية للتبابة الثنائية أو الثلاثية السام
للحسية || أشهر أنوعها واضرها شول الورد وشول
القرمبواز .

١٥٨١٠ - شَوَّحِلُ القَرَمْبِوَزِ ٥

Phragmidium rubri-ideal, Uredo rubi-ideal, Caecomyces (S). Rouille du framboisier (F).



شَوَّحِلُ

فطر مجهرى يتطفل على الأوراق فنباتها ويصيب سفوفها
البكر || مظهره الخارجي بنور قرحية لا يباين الشكل
تركب الأوراق على سفوفها العليا . تبدو صفراء اللون
ثم تتحرف نحو البرتقالي فتسبب جفاف التسبيج وذبول
الأوراق وسقوطها البكر || افترارها زينة لا تستريب
المكافئة وإن كان لا بد منها فامتثال اخضر النحاس على
دفء أو دفتين كان لقفاه عليه .

١٥٨١١ - شَوَّحِلُ الْوَرْدِ ٥

Phragmidium subcorticium (S). Rouille de rosier (F).



شول القرمبواز

فطر مجهرى يتطفل على سطح الورود المزروعة . مظهره
الخارجي يقع سفوية لا يباين الشكل لكنها إلى السفرة
البرتقالية، تركب الأوراق على سفوفها العليا يخالها
على السفحات السفلى بنور سم مبيطة بدون انتظام تكثر
قرب الفروع || وقد يصيب مالحق الانتار وكورسها
ليسقطها ويروح على اللبس ينقلها اللون || يكلف
بأخضر النحاس أو بالاكسكلورور .

١٥٨١٢ - شَوَّحِلُكَ ، مِمْسِكَةُ ٥

Mimodesmia (F). Mimidesmia (F). Mimidesmia (F).

خاصة كاتمة في بعض الحيوانات وأخضرات تمكنا من
التشابه بالأشياء التي تحيط بها .

١٥٨١٣ - شَوَّحِلُ ٥

هو اجتناء السمل أو السمل المشور أي المشفر من
القوسية .



شول الورد

١٥٨١٤ - شَوَّحِلُ ٥ هو غلظت اللباب ، أطول .

Ruche (F). Bee-hive (E). رُحَّة (F). رُحَّة (E).
في مأوى النحل كالكيلة والغدير ، الخ .

١٥٨١٦ - شَوَّحِلُ ٥

Cystopteris (S). Cystopteris (F). Cystopteris (E).

جنس نباتات عشبية ، برية ، معمرة من الراسم .
أنواعها المعمرة منتشرة في معظم أقطار العالم القديم
والجديد || أوراقها مركبة قطون من ٢٥ إلى ٤٥ سم .
ورديتها شبه الطليجية النصل . راجعها حرفة البشرة .
زكاتها عريانة يطبقها حار كثيف لزوب ، تبي اللون .



شوري

١٥٨١٧ - شَوَّحِلُ ٥

Avicennia officinalis (S). *Paldeuvier* (F). *White mangrove* (E). *Salsbaum* (D). *Avicennia* (I).

شجيرة سرجية معمرة من فصيلة ربي الحام مهدا البلاد
الاستوائية . قشورها سامة طيبة يقال أنها تنقي للمنة .
لورائها وأزهارها مياحية .

١٥٨١٨ - شَوَّحِلُ ٥ ، قَلْبَةُ ٥

Morphology interna (F). *Internal morphology* (E).
درس هيئة الاجسام الحية وتركيبها في الحيوان والنبات .

جوزية . بقلها جزوي اللون ، ارب الثلاثي السكنية ||
رواشها عند التشتين إلى البياض المائي تلوذ في التزج
الامائي زخارف جوزية وجرار || لها جيلان في الخول .
تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل
الثاني في تموز . نروح في الليل . تماثل بعد ظهورها
بنحو اربعة أسابيع وتضع المكن مياحها على السفحات
السفل من نصال الأوراق || السرة قطون من ٢٨ إلى
٣٠ م . جسمها مالحق انتشار ، اكبه اللون ، مغلف
الرأس ، مستطيل البطن ، مستطيل المذخر الذي يتسبي
بقرنين منتهيين أسودين || طور الاكمال الذي يستمر
نحو ١٤ يوما ينقضي ضمن صلبة منتهية التسبيج تمكها
السرة بين شقوق ماء الحور والصنفات .

١٥٨١٦ - شَوَّحِيَّات ٥

Ceruridae, Notodontidae (S). *Ceruridae, Notodontidae* (F). *Ceruridae, Pro-*
ninentia (E). *Zahnpinner* (D).

فصيلة حشرات فراشية من حرشيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة نحو ٢٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع
العالم || تسرح في الليل . طيراتها طويل الشوط . اجسامها
متوسطة القد . رؤوسها مستطيلة الجرم . عيونها كبيرة .
قرونها الاستشعارية شديدة مزودة عن الذكور ، غليظة
أو مشطية عند الاناث . ملاسها صغيرة ونحيلة . مراشفها
خامسة كلها تجازو الجذمة . بطونها كيفية الحمل والزلف .
سكها الشرجية مغطاة بألمر من الحلب المستطيل . حلقها
تقع على جانبي الجش . رؤوسها كبيرة ، جلدية
الاستمرار عند الرأسة ، الامامية منها مزعزعة ، الخلفية
وحيدة اللون . جرابها تامة النمو . ظاهرها الخلفية ثنائية
المناسخ أو رباعيتها || أسارها عريانة أو مبيطة الحلب
القصير . اجسامها بيانية الاحجام والاشكال المستعرة .
سكها الشرجية لتفني بقرون صلبة || غادتها طيبة
أو ملحقة بالغذاء منتهية التسبيج || أشهر اجناسها الفوسل
والسمريرة والمضيط والفاليرا والفريجة والديكراتور .

١٥٨١٧ - شَوَّحِلُ ٥

Aeschynanthus (S). *Aeschynanthus* (F).
جنس نباتات مدادة من فصيلة الفلورويات . مهدا
البلاد الحارة . سورها نخيلة ، ملتوية ، مدادة وحانية .
أوراقها لحية متعاقبة . أزهارها فردي التجميع ، محوري
أو حامي الانكاز . أزهارها كبيرة القند ، مستطيلة ،
ثنائية اللون ، زاهية الحمرة .

١٥٨١٨ - شَوَّحِلُ ٥

Physospermum (S). *Physospermum* (F). *Physospermum* (E).
جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الحيات .
أنواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من ثوبت الشرق الاولي
واروبة || سورها رقيقة قليلة الفروع . أوراقها متعاقبة
مركبة ، صلبة الورديات الدقيقة . أزهارها سيولان
التجميع ، حامي الانكاز . أزهارها صغيرة يشاء اللون .
تنويرها صلي .

١٥٨١٩ - شَوَّحِلُ ٥

جنس فطور مجهرية من فصيلة السحابيات . أولوه نحو
٥٠ تتطفل على نباتات الفصيلة الوردية || يتسبب بلبانها
الغازية التي تركب لبلي النبات وأغبر البار || نكاته
صغية الشكل مستطيلة الانكاز يطوحها دملة مفردة

١٥٨٧٦ - شَوْكَة مَذْهَبَة ٥ Lonchaea surra (S).

Lonchaea dorée (F).

نوع من الشَّوْب ، طولها من ٢ الى ٣ م. رأسها واربعها سود ، جسمها زبرجدي اللون ، ملعب المراج . رقاتها تمش على الثَّار الناضجة الساقطة من أي نوع كانت .

١٥٨٧٧ - شَوْكِيَّات ٥ Loncheidae (S).

Loncheidae (F). Loncheidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القند ، طولها يراوح من ٢ الى ٦ م. أثوابها غنقلقة الألوان ينقلب فيها الأزرق والاعصر . معظمها من الحشرات الثنائية الخلفية . رقاتها تمش على المواد الصقوية في الثَّار الناضجة وفي التزبل ويحت خلاء الاجساد .

١٥٨٧٨ - شَوْكَة ٥ Entéromorpha (S).

Entéromorphe (F).

جنس نباتات بحرية من الحفريات الخضر . أنواعها المعروفة نحو عشرة . اصطناعها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جميعها اسطوانية او دوسية القواعد . قصيرة الكلاب . عويطة او قذبة الازواك المستطيلة ، ثلثولية المراج .

١٥٨٧٩ - شَوْكَة ٥ Anome (F).

في المال ، اطله .

١٥٨٨٠ - شَوْصَر هو الشمر ، اطله .

١٥٨٨١ - شَوُوط Course (F). Rîde (E).

هو الجري مرة الى الثانية .

١٥٨٨٢ - شَوْطَس ٥ Anomia (S).

Anomie (F). Anomia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المحار . أنواعها المعروفة عديدة معظمها من عصجرات الطبقة الجيرية السفلى . اما الانواع المعاصرة لثائرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصطناعها لانظمة الشكل ، يغلب فيها الاهليسي . مصارعها لامتبوية ، دائمة الانفراج ، قليلة التفاعل ، شبه شفاة ، ثلثولية الدائل . وبصارعها السفلية اي اليسارية متقوية قرب الرباط وينتفخ هذو طبقته تمتد الفضلات التي تمكن الحيوان من الالتصاق بالاجسام الخارجية || لحومها مأكولة جيدة المصفت ، مرفوف فيها .

١٥٨٨٣ - شَوْع Ben olifère

هو شجر البان واسمته شوة ويقال لشوة لشمر حسب البان وزيتو دهن البان وطير ملش .

١٥٨٨٤ - شَوْف Sarcloir (F). Hoe (E).

الشوف : الحجر تسوى به الارض المحروقة (القاموس) .

١٥٨٨٥ - شَوْفَان

هو الحرفال ، اطله . وهو بري وسفلي وزراعي وعريان .

١٥٨٨٦ - شَوْكَال هو الشقال ، اطله .

١٥٨٨٧ - شَوْكَة Choucas

في شراب الزرع ، اطله .

١٥٨٨٩ - شَوَرَزْ مُزْغَب ٥

Cryptophagus pilosus (S). Cryptophage poilu (F). Cryptophagus pilosus (E).

حشرة دائمة وأنجم من فصيلة الشفوذيات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف الاجنية والفاغور والمساكن الارضية . غنقلها ويزقاتها تعيش تحت القش والجشاة على المواد الصقوية والنباتية المنحلة || جسمها صغير القند بطول نحو ٣ م. ثوبها الى الصخرة الشفراء المالح . مرناعها كيرتان . زياتها صولانيان . رأسها مستطيل الجرم . ظهرها مستدير الطرف اللامع ، كيتف الحمل والزرع . ارسافها خماسية المعقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الخريف وتمش حتى اوائل الشتاء . تسرح في الليل . تمتع الممكن مصادياً وتلقيه بين القش والصل || البرقة عند بلوغها الادراك التام تقول نحو ٤ م. جسمها اسطواني الشكل سداسي الرؤوب ، تنه القرن ، لصر الرأس ينتهي ، في مؤخر شرجها ، بكتلاتين قريبتا الشبه بكتلاتي البهك .

١٥٨٩٠ - شَوَرَزِيَّات ٥ Cryptophagidae (S).

Cryptophagidae (F). Cryptophagidae (E).

فصيلة حشرات غنقلية ودائمة من رتبة شفوذيات الجنتح || اجناسها وأنواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف المواقع الرطبة والاماكن الظليلة والاكبية والفاغور والكهوف . قوتها المواد الغنقلية والذاتة || جميعها صغيرة القند قلما يتجاوز طولها ٤ م . اجسامها خلية القشور . مسعرفة الرؤوس ، مستطيلة التزيان الصوبانية الاطراف المركبة من ١١ فصلة || احمادها لاحة . جرامزها نفضة . ارسافها خماسية المعقل || أشهر اجناسها الشفوذ والاتيواريه .

١٥٨٩١ - شَوَرَزْ ٥ Gaberi, Gaberit (F).

Mould, Full-sized model (E).

غنط الشيء بمقابله التسمية الصحيحة .

١٥٨٩٢ - شَوْش ٥ Zanchus (S). Zanco (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعها عديدة جميعها صغيرة القند ، مسطرة الشكل ، مغلطحة الجسم ، لامة الازواك . تكثر في بحار البلاد الحارة . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

١٥٨٩٣ - شَوْشِيَّة ٥ Lonchaea (S). Lonchaea (F).

الشوشية ج. شوب: جنس حشرات صغيرة القند من فصيلة الشفوذيات . أنواعها عديدة جميعها ثنائية الخلفية تمش على مختلف المواد الصقوية الحيوانية والنباتية || أشهر أنواعها الثلاثة التالية .

١٥٨٩٤ - شَوْشِيَّة الْيَكَّة ٥ Lonchaea chorea (S). Lonchaea sociale (F).

نوع من الشَّوْب . طولها من ٣ الى ٤ م. رأسها سفلي ، ارجلها سود ، جسمها ازرق لاص . رقاتها تمش تحت سلف طاء الانجار .

١٥٨٩٥ - شَوْشِيَّة عَصْفَرَكَة ٥ Lonchaea aristella (S). Lonchaea verte (F).

نوع من الشَّوْب . طولها نحو ٤ م. ثوبها الى الخضار الباقين يطو ملج اسود . رقاتها تركب ثمار التين فضليا .



شورز مغب



شوش



شوشية الية



شوشية خضراء



شوش

١٥٨٣٨ - شَوْكَة خَرِيفَة ٥

Ceanomyia pamphilus, *Chortobius pamphilus* (S), *Procris* (F), *Procris* (E).

حشرة من فصيلة الحافيات ورتبة حرشيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقيا الشمالية. قوتها جارية قوتها رقيق الانزعاج. سرتها تمشي على صفت النجيليات || جسمها صغير القه يعلو نحو ١١ م. يسجلها نحو ٢٨ م. رأسها صغير الحجم. صمغها كثرة. زياتها صمغيات. مرشها ثنائي اللون. وراثتها || حث الثقلين || الى الصمغ الصغار يطوقها حمار يمر ويملأ في الزوج الامامي بقعة عديدة السرة، خمار الاطراف، طرية الارتكاز || لها جيلان في الحقل. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز. تعاقل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتتمتع الممكن لطعم مريرة الشكل على نصال صفت النجيليات || السرة تطول نحو ٢٥ م. ثوبا الى الخضار الاغبر الزين المالح يملأ خط ثبيبي ويطان جانبان وعشرة اطراف جميعا كسنة اللون. قشاقها مائل البشرة رأسها واطول الذي يليه الى الجفوة. مدتها وورائها الى السرة || طول الاكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو خمسة اسابيع يستمر في الجبل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا.

١٥٨٣٩ - شَوْكَة، شَهْدَاءَة *Chardon* (F), *Thistle* (E). اسم شابل يطلق على عدة نباتات مختلفة من فصيلة المركبات وغيرها يحسبها شبه في شكل الاوراق وسا يطولها من ابر دقيقة حادة.

١٥٨٤٠ - شَوْكَة أَجْرَعِ عَرِيفَة، اطليه.

١٥٨٤١ - شَوْكَة الْجَمَال * *Cardus dipacus* (S), *Cardus*, *Chardon* (F), *Thistle* (E), *Distal* (D), *Cardo degli usini* (I).

نبات حشبي بري من فصيلة المركبات يكثر في الحقول المزروعة وحول الطرقات. ساقه مسطحة تطول من ٤٥ الى ٨٠ سم. اوراقه كبيرة القه مفردة التصل للتمتع الصفحة الشاك الحلق. ازهاره تاجية الارتكاز لونها الى الليموني العاقل || يستمر من النباتات البرية الخضراء غامضة بالزرع. اما الايل ظنهم يهوه.

١٥٨٤٢ - شَوْكَة الْجَمَال *Chardon* (F), *Thistle* (E), *Distal* (D), *Cardo degli usini* (I).

١٥٨٤٣ - شَوْكَة الْحَلِيب * *Galeatide* (S), *Galeatide*, *Chardon laitueux* (F), *Milk pea*, *Milk thistle* (E), *Milchdistel* (D), *Galeatide*, *Scarlino* (I).

نبات حشبي بري شاك من فصيلة المركبات. ساقه اسطوانية تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. صمغاتها لينة يضاء اللون. يقال انها طيبة تقية الصدر. اوراقه كبيرة الله مفردة، متجمعة. صمغها اعصر الصفحة الجيرة للزجاج يملأها تيجع ابيض، حمارها متراكب المتعرج، شاك الحلق || ازهاره تاجية، بتسجية اللون، يملأها شبه من الاخر والازهر.

١٥٨٤٤ - شَوْكَة الدُرُج *Chardon* (F), *Thistle* (E), *Distal* (D), *Cardo degli usini* (I).

١٥٨٤٥ - شَوْكَة الدُرُج *Chardon* (F), *Thistle* (E), *Distal* (D), *Cardo degli usini* (I).

١٥٨٤٦ - شَوْكَة الصَّب *Chardon* (F), *Thistle* (E), *Distal* (D), *Cardo degli usini* (I).

١٥٨٤٧ - شَوْكَة الْعَلَك *Chardon* (F), *Thistle* (E), *Distal* (D), *Cardo degli usini* (I).

١٥٨٤٨ - شَوْكَة الْقَتَم *Chardon* (F), *Thistle* (E), *Distal* (D), *Cardo degli usini* (I).

١٥٨٤٩ - شَوْكَة النَّار * *Pyraechtha coccinea* (S).



شَوْكَة الْجَمَال

Bulson ardent *Acariata*, *Pyraechtha*, *Arbre de Moise* (F), *Fire thorn*, *Firebush* (E), *Echter Farnedorn* (D), *Kovo ardente*, *Spina ardente* (I). شجرة شاككة فراء من فصيلة الورديات. تطول من سترين الى خمسة امتار. فروعها كثيفة الشوك الحاد. اوراقها مسطحة اذنية. ازهارها حلقية التجميع، يضاء اللون، ثمارها صنية الشكل، ابروائية اللون، لخافة السيوق الرقيق.

١٥٨٥٠ - شَوْكَة الْيَهُود *Chardon* (F), *Thistle* (E), *Distal* (D), *Cardo degli usini* (I).

١٥٨٥١ - شَوْكَة عَكْرَتَاكِي *Chardon* (F), *Thistle* (E), *Distal* (D), *Cardo degli usini* (I).

١٥٨٥٢ - شَوْكَة فَرِيَس * *Cardus pycnophthalmus* (S), *Chardon à têtes piquantes* (F), *Slender thistle* (E), *Slender distal* (D), *Cardo del camp* (I).

نبات حشبي بري من فصيلة المركبات ينبت في الميالح الرطبة وحول جوانب الطرقات. ساقه تطول نحو ٦٠ سم. اوراقه مسطحة كثيرة التفريغ والتتفرع والشوك. اكاره الزهرية شاككة الحرافة المتراصة. ازهاره بتسجية اللون يملأها تيجع ابيض.

١٥٨٥٣ - شَوْكَة فَرِيَس * *Cardus argentatus* (S), *Chardon argenté* (F), *Silvered thistle* (E), *Silver distal* (D), *Cardo argenteo* (I).

نبات حشبي بري من فصيلة المركبات يتميز بكثافة خل اوراقه وسق الذي يملأها بجلياب اغير اللون، فسي المالح. ساقه تطول نحو ٨٠ سم. اوراقه مسطحة، متجمعة التفريغ، متراكبة التجميع والتعرج، كثيرة الشوك. ازهاره بتسجية التاجية، زرق الجسم، ييض الاطراف.

١٥٨٥٤ - شَوْكَة مَسْكِي *Cardus nutans* (S), *Chardon penché* (F), *Musk thistle* (E), *Nickdistel* (D), *Cardo rosso* (I).

نبات حشبي بري من فصيلة المركبات ساقه فراء، تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقه الجليبية سانية التصل الشديدة التجميع. اوراقه القرعية صغيرة الله، لا قياسية التفريغ، كثيرة الشوك. اكاره الزهرية اثنية الاضواء وبصها مسدل || ساقه وازهاره ويملأها سكية العرف.

١٥٨٥٥ - شَوْكَارِي * *Gruceus* (S), *Choucart* (F).

جنس طير من الجوارم نباتات للتاتير وفصيلة التفريغ. انواعه المعروفة نحو ٢٠ سلطانها فصية الانباء، تمتد من الهند الى جزر الزايج واستراليا. تألف الطياريات والازواج وتتسلق الاشجار تحفة. قوتها الاساريج والهدان ويض القار المتينة || اجسامها متحطة الله تطول من ٢٢ الى ٢٨ سم. اجنتها رتاجية، مسطحة، لاخفة. اذناها معتدلة الطول مستقيمة الاطراف. مناقيقها ضليعة مسنة الحامض العليا. قوتها معتدلة الجبل. اصابعها تشية. غذائها كبيرة حادة الاطراف. اولها متعاطلة الاولان



شَوْكَة الْحَلِيب



شَوْكَة النَّار



شَوْكَة فَرِيَس

ساقه قوية فراءه رقيق نحو ١٠٠ سم. بشرتها منشقة برقة ارجوانية جوية لا تياقصة الانتظام. اوراقه مركبة تشبه اوراق البقدونس، نصلها شديد الخضار المابق نسيجه زهرير اللادة الجسالية الفعالة. ازهاره صغيرة القد، يفضا اللون. ثماره كروية صغيرة || منته المناطق المعتدلة الحرارة يقرب في الاراضي البور المتوسطة الرطوبة. يكتر قرب السباحيات وجوانب الانية. وهو في البلاد الكثيرة الاشعاع الشمسي اغزر مادة وادى فاعلية. وهو من النباتات الطبية الجزلة التي تستخرج من حصارته مادة الشوكرين التي تدخل في عدة تركيبات ومستحضرات ناعمة || كان شائع الاستعمال في الصور الفائرة لتسميم الناس وقد أمر سقراط بشرب نقيته فانت.

١٥٨٦٦ - شوكران سام* ، شوكران مشين، قاتل البقر

Cicuta virosa (S). Cicutaire, Cigu virose, C. des marais (F). Cow-bane, Water hemlock (E). Echter wasserschierling, Wütherik (D). Cicuta, Finocchio acquatico, Cicutarla (I).

ليات عشبي بري طلي جبالى من فصيلة الحميات. يكتر في المنطق وحل ضفاف مجاري الماء. جلوده لينة غليظة. ساقه فراءه تملو نحو ٦٠ سم. اوراقه مركبة، متعاقبة، ورية التجميع. ورقها لينة، حادة العنقة. نصلها عايق الخضار اللامع، مسن الحافة. ازهاره صغيرة القد. تلية اللون، خضره الموج. رائحة ازهاره واوراقه منته. حصارته زهرية للمادة الجسالية الفعالة المسية، تستعمل في الطب استعمال الشوكران.

١٥٨٦٧ - شوكران صغير* ، شوكران البستاني، بقدر ولس كاذب

Aethusa cynapium (S). Aethusa, Petite ciguë, Ciguë des jardins, Ache des chiens, Faux-perill (F). Asse's parsley, Fool's parsley, Lesser hemlock (E). Hundsgleisse, Hundes Petersilie (D). Piccola cicuta, Przemolno bastardo (I).

عشبة برية جبالية طلية من فصيلة الحميات تكثر في الاراضي المزدرة المتوسطة الرطوبة، ساقها تملو نحو ٥٠ سم. فروصها اقية الانتشاب. اوراقها تشبه البقدونس. حصارتها جبالية مينة.

١٥٨٦٨ - شوكروت، ورق الملفوف الحفوظ المالح.

١٥٨٦٩ - شوكرين، Cicutina, Concline (F). Cicutin, Conclin (E). مادة جبالية فعالة تستخرج من حصاره الشوكران والشوكران المتن والصغير.

١٥٨٧٠ - شوكل، هو البويع. واحدته شوكله وثمرته شمول.

١٥٨٧١ - شوكي، Sétacé (F). Setaceous, Bristly (E). شكل من الزباني قلمه فواصل اسطوانية مستطيلة متتامة تستعمل تقديماً مع ايصاحها عن السكية ورأس الحشرة.

١٥٨٧٢ - شوكرات، Echinoderma (S). Echinodermes (F). Echinoderma (E). الشوكيات قسم من الحيوانات البحرية. رقبها وفصالها وانجاسها وانواعها عدة آلاف تبسها حبة سفوف ||

يكتر فيها الاسود والاشهب || اعرف انواعه واشهرها شوكراني الهند.

١٥٨٥٦ - شوكراري الهند*

Gracula indicus (S). Choucarí des Indes (F). نوع من الشوكاري. موطنه الهند. يألف القباب والاحراج قوة الاسراع والهدان يتنقب الاجمار في طليها ان لم يجدها سارسة || جسمه متوسط القد، يطول نحو ٢٨ سم. ثوبه الملوي متراكب الاسود والاشهب. عيناه مظلوان بالاسود القاسم زووه وصدره ويطله الى الفرة. منقاده اسود. قائمتا واصابه الى السرة المابقة. جناحه وتاجي و ذلق، لاحت. ذنبه معتدل الطول خفي الطرف المستدير || يدلن حشه في الاجمار الدامية. الاتي تخضن بتناوبة الاكر من ثلاث الى خمس يفيضات مرة واحدة في الحول.

١٥٨٥٧ - شوكران، هو الشكامة، اطلها.

١٥٨٥٨ - شوكة، Epine (F). Spine, Thorn (E).

عضو خشبي صلب الجسم حاد الطرف يحصل من تحول ورقة او برمة او زينة او اذلة. والشوكه تكون دائمة الاتصال بنشب لينة.

١٥٨٥٩ - شوكة السباحين، اطلها.

١٥٨٦٠ - شوكة حادة،

في الضرور الشاك، اطلها.

١٥٨٦١ - شوكة زرقاء، Panicut amethystea (F).

في الشفاب الجسبي، اطلها.

١٥٨٦٢ - شوكة صفراء* ، سكوليمس، قرنون

Scolymus (S). Scolyme, Epina (F). Spotted golden thistle (E). Labgoldkorn (D). Scardiacione, Spina gialla (I).

ليات عشبي بري وزهري من فصيلة المركبات. ساقه مضطعة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القد، كثيرة التفريض والتمسج، قليلة الشوك، نائكة الازرة الطرفية الصفراء اللون || اكوازه الزهرية كوية القاعد، ازهاره بنسجية الانتشاب زرق الازام الثاني وكالث، ليلية الزام الاخير || يزوح جلوده المأكولة السكرية الطعم.

١٥٨٦٣ - شوكة قبطية، في البسط العربي، اطلها.

١٥٨٦٤ - شوكة مباركة*

Cnicus benedictus (S). Chardon béni (F). Blessed thistle (E). Benedikten ditzel (D). Cardo benedictus (I).

ليات عشبي بري حولي من فصيلة المركبات. ساقه مضطعة فراءه تملو نحو ٦٠ سم. اوراقه الجلمية كبيرة القد منته، نصلها ثنائي التفريض و اخضر اللون، اصفر الموج، ابيض البروق، غليظ الشوك الطرفية. اوراقه القرنية لاطنة، مستطيلة، مفرشة، مسنة الحافة، شاككة. اكوازه الزهرية صغيرة القد مستطيلة. ازهاره صفراء اللون، طيبة، تستعمل كقوية ومبرقة وداملة الجرح ومبيدة للاكل.

١٥٨٦٥ - شوكران* ، طحجاء، يسيس

Conium maculatum (S). Ciguë, C. tachette, Grande ciguë (F). Hemlock, Poison hemlock, Herb benet (E). Echter schierling (D). Cicuta, Erba grande (I). ليات عشبي بري طلي جبالى حول من فصيلة الحميات.



شوكاري الهند



شوكة صفراء



شوكة مباركة



شوكران



شوكران سام



شوكران صغير

حل الشامي* باتجاه الجنوب || له ثومان اعرافها الفوش الاليش.

١٥٨٨٣ - شونيس أبيض*
Chionis alba (S).
Chionis blanc, Pigeon antarctique (F).
نوع من الفوش طوله نحو ٣٦ سم. ثوبه الى الابيض الناصع. مثقاده اخضر الجسم اسود الطرف. حبه الى الزرقه يحويها لطار اخر. رسله اسود فقد. جويي اللون، سردي الجلد. شتره اسبابه ضيقة مستطيلة.



شولط

١٥٨٨٤ - شونسيات*
Chionidae (S).
Chionides (F). Chionidae (E).
فصيلة طير وسيمة الجلس من رتبة طير الساق. اوزانها المروقة قليلة العدد. اشكلها تجمع بين اشكال الزنراق والنورس والفلق. تتميز باجسامها الربية وبمنايقها الملطقة بباد مضمض من القناعة الى طرف المنطق. موطنها العالم. تكثر في البلاد الاسريكية. تألت التطوط الصخرية. قوتها الحشرات والقشريات والاصنامك.



شونس ابيض

١٥٨٨٥ - شونيز، شيشيل*
Nigella (S). Nigella (F).
جنس نباتات شبيهة سولية برية وزراعية من فصيلة الفقيقيات. ازهاره ٢٠. معها البلاد المعتدلة الحرارة اوراقها مركبة غبيطة، ازهارها فردية، تاجية، غمطلة اللون. ثمارها جراء صغيرة اسطوانية الشكل، زورها دقيقة مستطيلة مواء اللون || اشهر اوله ما يتبع.

١٥٨٨٦ - شونيز إسباني*
Nigella hispanica (S).
Nigella d'Espagne (F).
نوع من الشونيز الزراعي المحلي في شرويه واصرامه عديدة قطو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اوزانها كبيرة اللد، حاملة القباب، حديدية اللون، يعلب لها الازرقاني والازرق والبيكي والمليكي واللشع || ازهاره يستمر من سزيان الى تموز.

١٥٨٨٧ - شونيز الحقل*
Nigella arvensis (S).
Nigella des champs (F).
نوع من الشونيز البري المحلي يكثر في الاراضي الكلسية وهو من نباتاتها الطويلة. يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهاره متوسطة اللد، زرقاء اللون. كما به غرطوية الشكل غمطية الطرف || ازهاره بريي.

١٥٨٨٨ - شونيز دمشقي*
Nigella damascena (S). Nigella de Damas (F).
نوع من الشونيز الزراعي المحلي في شرويه واصرامه عديدة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهارها متوسطة الحجم، زرقاء اللون ابيض، قنابها حديد الاسم المستطيلة الضيقة للمركبة || ازهاره يستمر من سزيان الى تموز.

١٥٨٨٩ - شونيز زراعي*
Nigella arvensis (S).
Nigella cutiviva, N. romana, Cumini noir (F).
Common fennel flower, Black cumini (E). Echter Schwarzkümmel (D). Nigella, Cuminiella (I).

نوع من الشونيز وهو نبات شبي حولي زراعي يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ساقه فراء. اوراقه مركبة. ازهاره كبيرة اللد، زرقاء اللون. ثمار جراء مستطيلة عديدة البذور || يزهره تسمى حبة البركة والحب السودة وهي صغيرة اللد، مستطيلة الشكل، سيدة اللون يستخرج منها زيت طهي يفيد الازلة الصدرية ويسكن السعال السيبي. وحب البركة يستعمل كالتوابل والبهارات وهو مقو مرموق ينه الحضم ويهدى اللباب واليولي.



شونيز زراعي

ينبتا شامية. جوارها الحضي وجوارها النوري مستقلان. حيكها الانسي كلي التركيب مجزء، غالبا، بانوك مفصيلة متحركة. قنوب دروعها تسبح بمرور الؤاس التي تستعملها اما للانتقال او للتثبت. اوزانها مجزءة باذوات صلبة تحكها من الفضع. اسامها ثنائية التلافيث || اما صوفها الخمسة فهي: زنايق البحر، للتجويبات، الكروانيات، الاقويادات، قنانيات البحر.

١٥٨٧٣ - شوكية
الشوكية منزل من منزل القمر اليابانية. وهما كوكبان نيران متقاربان يكادان يمسان ذنب القرب. ويقال لما حدة القرب || رقيب الشوكية يدعى الحقة.

١٥٨٧٤ - شوكية
Dard du scorpion (F).
Sting of the scorpion (E).
هي حدة القرب.

١٥٨٧٥ - شوكية بيشهه
هي السنج، اطليه.

١٥٨٧٦ - شولط*
Macrorhamphus
Macranowski (S). Macrorhamphus Taczanowski (F).
طائر من طوال الساق الضارب وفصيلة الزنراقيات. اصنائه الشرق الاقصى. يآلت المناطق الباردة في الصيف والدفئة في الشتاء. ملجئه الحياتي جاحي. جماعته في الزين المادي لا تتجاوز ١٠ ازواج وتتجاوز الخمسة الاف عند الرحيل. قوته الحشرات وبيوتها واليدان ودميل المتفادع ... || اصنائه الحشرات وبيوتها واليدان ودميل المتفادع ... || جسمه متوسط اللد، يعلو نحو ٣٥ سم. رأسه صغير الجرم. مثقاده مستطيل جالس. جناحاه لثقان لاسخان. ذنبه قصير مقطر الطرف. ثوبه متراكب اللون، وأسه وزوره ورياقه وجناحاه الى الكهية السوداء، صفه ويطنه الى القشرة المنشفة بالريدة. جناحاه مرقان بالنيعة. يدن حشه بين اعصاب وأسل المناطق الرطبة غير المنصورة بالماء. الاثنى تحسن وسطا اربع بياضات بينا الذكر يعلو لها اللد.

١٥٨٧٧ - شولم
هو الثيلم، اطليه.

١٥٨٧٨ - شومكار
هو الشكار، اطليه.

١٥٨٧٩ - شومغ
Cephalanthus (S).
Cépalanthère (F).

جنس نباتات جفمورية برية معمرة من فصيلة السحليات. ازهاره المروقة قليلة العدد || يربط منها في لبنان الشوخ الحامي (الرق (C. caudifolia). ينبت من ارتفاع ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ م. من سطح البحر. اوراقه منبالة الاتصال مستطيلة كغلام. ازهاره يضاء اللون، شرفاتها ملطقة بالاصفر.

١٥٨٨٠ - شوكية
هي الانبار، اطليه.

١٥٨٨١ - شوكندر
هو الشندر، اطليه.

١٥٨٨٢ - شونيس*
Chionis
جنس طير من فصيلة الشونيات. موطنه شامي* ابلاد الباردة. وهو قريب الشبه بالهام يتميز ببناتة مثقاه المثلث المحرطي الشكل، باصطاة اسبابه وضيق شترتها وبذنب المقنطر المربع الشكل || قوته الاغصان والحشرات ويض الفلق والطروح. انتاه ثمن في انصوص تقيره

جروى الأول. عيناها زيمتان. شيفاشا شيطان، عيناها العقاف الذرية. فكاهما مستطيلان. جرانوما سمره الأول، كثيفة الحلب يملأها يضيء الشكل، أحر الأول تملوه خمسة خطوط يضيء متفرعة يقطبا خط مستقيم أبيض || تألف الإساكن القريبة من المساكن الزرقية، عكدها قرب يطلو من ٣٥ إلى ٤٠ سم. تقسمه تحت الحجابة وبهنا. سرسها جدوي. قوتها الحشرات الصغيرة || بيتها الشتوي لا يتجاوز ١٨ أسبوعا. تعيش نحو ثلاث سنوات || والآن تمتع المكان في فضاء مئين الحيك تلتد وتحمله لاصفاً شباتها حتى التفت. ثم تحسن الصغار عل ظور يملأها نحو أربعة أسابيع || تتغير من الدويات المتعددة اللازموية.

١٥٨٩٨ - شيباحيات (S). Dysderidae (F). Dysderidae (E).

فصيلة عاكب من رتبة الارتبالات. أجناسها وأزواؤها المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جميعها مقترنة، متوسطة القد أو صغيرة. تتميز بما يعلوها من رسوم متناسقة الأشكال. ويرتكز حوضها الزيمية الست التي لا تشرق حل حافة الجبهة بل تتأخر عنها بعض الشيء. شيفاشها قوية و نشيطة، مستطيلة العقاف. ألوانها متباينة الألوان يكثر لها الأحمر والأصفر || سرسها جدوي. تخصي || النهار حسن مكادب قرابية الشكل، متينة الحلب، و سمره الأول || أشهر أجناسها الشياحة والشبيصة.

١٥٨٩٩ - شيبك (F). Schema (F).

١٥٩٠٠ - شيلكة ساهية (S). Sciera huntia (S). Sciera messagere (F).

حشرة لاؤفوية من فصيلة الشياريات. جسمها صغير القد يطلو من ٦ إلى ٧ سم. رأسها مكور، مستقل. عيناها متلاصقتان عند الذكر، متفارتان عند الانثى. زباناها عيطيان. قوتها مستطيلة، قصيرة، طنانها مجهزة بمناسخ ذرية. ورشاشها مستطيلان. ثوبها إلى الخطي المايق الأطلح المايح || الانثى أكبر قد من الذكر، تمتع المكان في الجلالة فينقش من يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة.

١٥٩٠١ - شيلريات (S). Sciaridae (F). Sciaridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. أجناسها وأزواؤها المعروفة عديدة منتشرة في سطر إسحاق البلاد المعتدلة الحرارة. تعيش على رقيق الأتار || أجناسها صغيرة، نحيلة، مستطيلة الشكل. رؤوسها مكورة، مستقلة. أعضائها صغيرة. حوضها زيمية، متقاربة عند الذكور، متباعدة عند الاناث. قوتها الاستشارية عيطية تتألف من ١٦ فصلة. قوتها مستطيلة، نحيلة. طنانها مجهزة بمناسخ ذرية || يرقاتها انبوية الشكل، صغيرة القد، سوداء اللون، تعيش على المواد النباتية المنحلة.

١٥٩٠٢ - شيباحة (F). Diagometrie (F). Diagometry (E).

الشياحة علم يبحث في لإصالية المواد المختلفة.

١٥٩٠٣ - شيلك (F). Diagometry (E).

هي الأسوخ، أطلبه.

١٥٩٠٤ - شيبب (F). Diagometry (E).

هو وشق الناقع، أطلبه.

١٥٨٩٠ - شوبيل (S). Dipteronia sinensis (S). Dipterone de Chine (F).

شوبيل هو الاسم الصيني. ثمرة شبه مظلة الشكل من فصيلة التفقيبات. منبتها الصين. ساقها مائلة السماء منبسة الإصمان والأفان، تملو نحو ستة أمار. أوراقها عابلة، متعابلة، مركبة، وقرية التجميع عند ١١ إلى ١٥ وريقة. نصالحا ستانية الشكل، لانظامية التسنين الحاربي، تطلو من ٧ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٢ إلى ٤ سم. أنزراعها شوكلي التجميع، طرفي الارتكاز، متصبب. أنزراعها صغيرة القد، غفرها الأول، خاسية الترتيب || ثمارها جناسية يضيء الشكل، ثنائية الكرايل، رسيحة البزرة، تطلو نحو ٢٥ سم.

١٥٨٩١ - شوبكر (F). Tetanus (F).

هو التكرار مرض خبيث.

١٥٨٩٢ - شوبب (F). Porc-épic à queue blanche (F).

هو الشحم الأبيض للذب، أطلبه.

١٥٨٩٣ - شوبكة (F). Agénésie (F). Agénésie (E).

الشرية انحراف عضوي شاذ سبه عجز في الطاقة المبدة.

١٥٨٩٤ - شوبكي (F). Shobki (F).

هو الحسون، أطلبه.

١٥٨٩٥ - شوبلاد (F). Shoblad (F).

شوبلاد، بروتجكليف، بكتجكليف، حبتي الزاوي.

Artemisia vulgaris (S). Arnolise commune, Herbe de St. Jean, M. à cant goëts (F). Mother wort, Mugwort (E). Echar Belfus, Mugwurz (D). Artemisia vulgaris, Erba di S. Giovanni, Amarelia (I). نوع من الشج يكثر في الإساكن المقفرة وجل جوانب المساكن الحلبية. ساقه عشوية، غضة، جزوية السماء تملو من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقها ضئيلة، نصالحا أخضر الصفحة العليا المبرزة الزغب، أخضر السفلى الحلبية البزرة. أنزراعها عشوية التجميع، حربي الشكل. أنزراعها صرية، مرة الطعم، طيبة مضادة للشنج والصرع والرقص السنجي.

١٥٨٩٦ - شيباحة (S). Dysdera (S). Dysdera (F). Dysdera (E).

جنس عاكب ثنائية بطانة تعيش في المراتج الظلمة وفي الأبيات وتحت الحجابة || أنوعها المعروفة نحو ٤ أطلها البلاد المعتدلة الحرارة والحرارة || أجناسها صغيرة القد تطلو من ٨ إلى ١٥ سم. جرانوما مستطيلة، حقيقة الأطراش. ألوانها إلى الحمرة الخطية للمايح يعلوها خط قلاب أبيض وأربعة خطوط متفرعة يضاء الأول || سرسها جدوي. ترك مكدها في طلب التفت من حلول الظلام. وهي لا تفت من حشرة تستعمل لها سبيلا من النمل إلى غديات الجليح.

١٥٨٩٧ - شيباحة حرك (S). Dysdera erythrina (S). Dysdera erythrina (F).

نوع من العاكب الساحية الثنائية ثنائية الروايا سداسية المفاصل تنتمي إلى فصيلة الشياحيات || جسمها متوسط القد يطلو نحو ١٢ سم. عند الذكر ونحو ١٨ سم. عند الانثى. صدراها مزواني الشكل، حمرين الصفحة العليا،



شوبلا



شيكسة حبراء

Décembre (F).

١٥٩٠٥ - شَبَان

هو شهر كانون الاول .

١٥٩٠٦ - شَبَكَة هي قن الشبح ، اكلية .

١٥٩٠٧ - شَبَكَة الصَّجُور هي سزار الصخر ، اكلية .

١٥٩٠٨ - شَبِث Scutigera (S). Scutigères (F). House centipedes (E). Spinnenasseln (D).

جنس دويبات من الشبذاعيات الزحافات . اناوله المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . جميعها مفترسة ، دجوية المسرى ، تدخل المنازل اغصها الارضية تقضي على الكثير من الحشرات المنيعة وغير المنيعة ومنها الذباب على اختلاف اجناسه .

١٥٩٠٩ - شَبِث حَبْكُوتِي *

Scutigera araneoides, S. Coleoptera (S). Scutigère arandide (F).

دويبة مفترسة من الشبث وصيغة الشبذاعيات شفوية الاكليل . تألف المراتب الربلية واللاقية والكهوف . تسرح في الليل وتدخل المنازل الارضية وتقضي على الكثير من الحشرات اغصها المنيعة ودميات الجناح والذباب || جسمها سحكي التركيب ، مبط ، مستطيل ، كثير الجرامز الدقيقة التي يبلغ عددها ١٥ زوجاً . الذكر اصغر من الانثى ، بطول نحو ١٦ م . والانثى ٢٤ م . راسها صغير . شفهاذا لافان . عندها مركبتان ، ثلاثية الزوايا . زهاذاا نحيلان . التزوج الاخير من جرمهاا بالمل الطويل الذي يفوق طول الجسم || تنجر من القويبات الشائعة .

١٥٩١٠ - شَبَكَة Particularité (F). Particularity (E).

هو كل لون يختلف اللون الفاصل ان في الخلل او في الابقار . فائقة والتسجيل والتعظيم من الشبات .

١٥٩١١ - شَبَكَة البَيجَان Ecison (zooc.) (F).

Beutcheon (E).

حلافة في البئر الحلو يتنقل في اواسط او اعالي مظهر الفسح وتلتقي عند طائر الفرج او في محيط . يستغل منها ، بالنسبة الى شكلها وسحبها وانفراجها ، من قابلية اللد في البقرة .

١٥٩١٢ - شَبِثين ، شَوْحَة Chitine (F). Chitin (E).

هي المادة القشرية التي يتكون منها جلده الحشرات والجمادات وهي باسطة شديدة المقاومة لاحتياها على بعض المواد الجبرية .

١٥٩١٣ - شَبِث Gymnogramma (S).

Gymnogramme (F). Gymnogramme (E).

جنس نباتات خشبانية ، برية ، معمرة ، من فصيلة البسياسيات . الانواع المعروفة نحو ٣٠ منها بعض اصقاع البلاد الحارة من المال القديم || اوراقها كبيرة ، مركبة ، وتزدهج الجميع ، جميلة انفسار الزوايا . مزاجها عطية . زكاتهاا شبه ملحونة باصباح النصال || منها انواع قديمة تنزرع في المراكن .

١٥٩١٤ - شَبِث ، لَوْحَتِيَا Artemisia (S).

Armoise (F). Wormwood (E). Salfuss (D).

Artemisia (I).

جنس نباتات عشبية خشبية برية وزراعية من فصيلة

للركبات الانبوبية الزهر . اناوله عاتقة منتشرة في معظم اصقاع العالم منها البرية والعلبية والسناعية والتربنية . فروصها نجلة عشبية . اوراقها صمالية زياء للصل . اناولاها دقيقة ، ورسية ، يبلب فيها اللون الاصفر المشع بالاصفر || اعرف اناوله واشهرها الانسين والقيصوم وقشور الاء والبيرتان ، جميعها من النباتات العلبية التي تقطع البذم وتخرج البذبان وتنبع البزاق والمص . يقال ان تقيع اناولاها واوراقها يقيه ليل السكري . وادهاا مع اي دهن كان يرلى داء القلب والغاز . سريق اوراقها في المنازل يطردا ويطردها الحشرات والحولم . مادتها الدماله تسمى ستينين .

١٥٩١٥ - شَبِث اَبْيَس الزَّهَر

Artemisia lactiflora (S). Armoise à fleurs blanches (F).

نوع من الشبح وهو جينة معمرة برية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها وروصها ملو للدهاء ، سحر اللين . اوراقها سنانية التصل ، خالية الصفة الملاء عريضة الزاوية . اناولاها ملقنة تجمرها النصل . قنايتهاا وسراقهاا ييض اكلها || اناولاها يستمر طول الحريف .

١٥٩١٦ - شَبِث اُرْصِي Artemisia pontica (S).

Armoise pontique, A. du Pont, Petite absinthe (F). Roman wormwood (E). Römischer Beifuss (D). Asenzio pontico, Piccolo asenzio (I).

نوع من الشبح وهو نجلة معمرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها وروصها زياء للدهاء ، قلبية الشكل . اوراقها لائمة الخفسار ، ثلاثية الانقسام ، شديدة البرق . اناولاها عشبية ، مستعقة ، عطلية || اناولاها يستمر من آب الى تشرين .

١٥٩١٧ - شَبِث اُسْمَر Artemisia atrata (S).

Armoise brune (F).

نوع من الشبح وهو نبات بري زوايا مصر يرضع في المواقع الجبلية . بطول نحو ٢٠ سم . اوراقها ثلاثية الانقسام ، غفراء اللون ، حادة البرق . اناولاها عشبية الجميع ، وروسهاا الزهرية كروية الشكل ، عطلية ، قنايتهاا زياء البشرة سحر الحنار || اناولاها يستمر من نموز الى آب .

١٥٩١٨ - شَبِث البَهر * Ascophyllum nodosum (S).

Ascophyllum noueux (F).

نوع من البهريس . اصلها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || كلاله صغيرة . ساقه مبطلة فزاه . اوراقه عطية . مرحةه شبه رضية الشكل . لونه الى الاسمر .

١٥٩١٩ - شَبِث اليهودية * ، شَبِثان ، حَبْثان

Artemisia judaica (S).

Armoise de Judée, Absinthe de Judée, Samen-coetra (F). Judan wormwood (E). Wermut aus Judäa (D). Seme zanto (I).

نوع من الشبح وهو نجلة برية طيبة معمرة تملو نحو ١٢٠ سم . معها البلاد الفلسطينية . اوراقها وناولاها تتصل بصفات سائر انواع الشبح الا انها خيرة المادة القعالة . يستخرج منها اصل الستينين .

١٥٩٢٠ - شَبِث حَوِي Artemisia annua (S).

Armoise annuelle (F).

نوع من الشبح وهو نبات حولي لولج البرق الطري



شَبِث حَبْكُوتِي



شَبِث اُرْصِي



شَبِث اليهودية



شجيرة نسي

يملون من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه خلية النصل، مستعرضة التثنية. ثباته شائعة، حروفها خضراء اللون || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

١٥٩٢١ - شجيرة عرساني، قيصوم طبي

Artemisia santonicum (S). *Armoise santonique* (F). Holy wormwood (E). Helligger Balsam (D). Santonico (I).

نوع من الشجيرة وهو بحجم بركة طرية ممتدة طولها من ٤٠ إلى ٨٠ سم. ساقها بزرورها زاهي اللون. أوراقها مفصصة الصلصة، تملأها خلية البصرة عاكس الخضار، قوي المرق. ازهارها مبشرة، كثيفة التجميع، فواكه الفلدا. أوراقها وازهارها طرية وتستخدم منها مادة المستنق.

١٥٩٢٢ - شجيرة رومي، هو الابلست، اطليه.

١٥٩٢٣ - شجيرة سبروني

Artemisia frigida (S). *Armoise rustique* (F).

نوع من الشجيرة وهو بحجم صخرة ممتدة طولها من ٥٠ سم. ساقها بزرورها مبشرة اللون. كثيفة الزغب التي اللون. أوراقها وسيدة القورس، لثائية التثنية، خلية النصل، عاكسة المرق || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

١٥٩٢٤ - شجيرة ليفي، هيبيركان ابيض

Artemisia argentea (S). *Armoise argentea* (F). Silvery wormwood (E). Silber Wermut (D). Assenzio argenteo (I).

نوع من الشجيرة وهو بحجم صخرة ممتدة طولها من ١٠٠ إلى ١٧٠ سم. ساقها بزرورها كثيفة الزغب الكففي اللون. ازهارها متدلية عاكسة المرق، ثباتها مبشرة البصرة، زغبها ابيض اللون، نسي المواجه || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٥٩٢٥ - شجيرة كالكوري

Artemisia camphorata (S). *Armoise camphrée* (F).

نوع من الشجيرة وهو نبات مسمر فروع المرق الكالكوري يملون من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه متفكة النصل، خلية الصلصة الحولية البصرة. ازهارها متفوية التجميع، رطبة. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

١٥٩٢٦ - شجيرة مكاسني

Artemisia scoparia (S). *Armoise à balais* (F).

نوع من الشجيرة وهو نبات محلي يملون من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها بزرورها مفلحة اللون، مسمر الزغب. أوراقه ملهه البصرة. ثباتها ازهاره جزوية اللون، شائعة الخمار اللامع || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين.

١٥٩٢٧ - شجيرة حبان

Armoise de Judée (F).

هو شجيرة البوصية، اطليه.

١٥٩٢٨ - شجيرة البصر، شجيرة اليهود، أبو مريكة

Lepocoeyx monachus (S).

Lepocoeyx, *Phoque moine*, *Moine* (F). *Leptocoeyx*, *Monk-seal* (E).

حيوان بحري لبيون من زعميات الاقدام فضيلة التثنية. مرقه البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود. ملجته الحيواني جماعي، جاماعة قليلة البدن. قوته الاسماك والقشريات والرخويات || جسمه معتدل الطول عنه الذكر من ٢٤٠ إلى ٢٦٠ سم. رأسه متوسط الحجم يتميز بكثافة سباله. ذيله ساقه الشكل. ثوبه الملوي الى.



شجيرة البحر

السرة المفلحة يملوها مواج اسود. يملون الى البياض المائي. ايطلة مرقشتان بالاسمر الاسود || الاثني اسفر قفا من الذكر. طولها يراوح من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم. تمنع جروا واحدا ترشحه نحو ستة اشهر ويبقى معها من ٢٠ الى ٢٢ شهرا.

١٥٩٢٩ - شجيرة الربيع، هو الاريدارون، اطليه.

١٥٩٣٠ - شجيرة، هو النيرج، اطليه.

١٥٩٣١ - شجيرة

Antilope thibétaine (F).

الشعير حيوان لبيون جبري يدعى طبي التثنية، اطليه.

١٥٩٣٢ - شجيرة، جنيسة

Genista (S).

Genêt (F). *Genista* (E).

جنس نباتات جينية وجمالية معمرة من فصيلة القرنيات القرابية. انواعها المرفوعة قليلة المدد اصطناعيا بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || ساقها فروع. فروعها متباينة الاشكال ونسبها الشاك. أوراقها بسيطة او ثنائية التجميع، صغيرة النصل الجامدة. ازهارها متفوية التجميع او فردية اجلي الانكاز. ازهارها صفراء اللون.

اشهر انواعها :

شجيرة افرية

G. caesia (S).

شجيرة لبنانية

G. libanotica (S).

شجيرة لينة

G. lydia (S).

شجيرة فوكية

G. schantzioides (S).

١٥٩٣٣ - شجيرة كوكس

Schizocopa

جنس نباتات عشبية صغرية من فصيلة التكتيات. انواعها قليلة، منها البلاد الحارة، تزرع للزينة. ازهارها كبيرة اللد بحجم المنظر خلفه الالوان الزاهية.

١٥٩٣٤ - شجيرة زينة

Schizoneila

جنس فلور مجهرية من فصيلة الراهرديات تتميز بطولها القياسي الشكل ثم يعضها الكيفي القسي التجميع وبهريقاتها الشمية الثنائية التركيب || يصيب السدييات حل اعتلاط انواعها.

١٥٩٣٥ - شجيرة، هو المرمر، اطليه.

١٥٩٣٦ - شجيرة، متهمة، شس

Schista (F).

Schist, *Slaty rock* (E).

خضار صخر صليبي التركيب اصابه غشط شديد في اعماق الارض. يرجع منه الى ما قبل الاراضي الطباشيرية في الحقبة الكانونية.

١٥٩٣٧ - شجيرة، شيلس

Chélidre (F). *Chelicer* (E).

شيلسا الحشرة او الكونية حيا كلابيا مقصفا الشفوي.

١٥٩٣٨ - شجيرة شيلس

Chélicérates (F).

Cheliceræ (E).

فئة من المفصليات حيواناتها عاكسة الزباني تستعمل منها بزيج من الشيلس. يعضها غشوي التثنية كما في صف المرصليات، والبيض الآخر لبيون او قسي التثنية كما في صف المتكبيات.

الرقابة تركت على اجتناب رطوبة التربة وكثافة الاشجار .
ثم استعمال الاملح الموزونة التركيب والصيغة واجتناب
نقص الادوية في الاوقات الحارة .



شيش

Marginella (S). شيشع ١٥٩٤٥
Marginelle (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الايل
وضيلة الشيشيات. انواعها المروفة نحو ٣٠٠ وبها
من متصبرات الاسحاب لثائية والباقي منتشر في معظم
بحار البلاد الحارة . بعض انواعها يعيش على رمال الشواطئ
المسورة والبعض الآخر على حشائش الجبلان || اصنافها
مائلة متباينة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل
البصري ثم الخدوني . فماتها مستطيلة ، غشقة .
اريفاتها اليسرى ملتوية الى الداخل اما اليمنى فالى الخارج ||
اجسامها كبيرة . رؤوسها واضحة ، ثنائية الالوان للمحيرة
اعطامها صغيرة . اذنيها فضفاضة . ارجلها ماعدة المغاط .
اشهر انواعها الشيش السرديني (Marginella sarda) الذي
يشبه السردين شكلًا وحجمًا والذي يكثر وجوده في البحر
الابيض المتوسط .

Marginellidae (S). شيشيات ١٥٩٤٦
Marginellidae (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الايل .
اجناسها وانواعها المروفة عديدة ، بعضها من متصبرات
الاسحاب لثائية والبعض الآخر مناصر منتشرة في معظم
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اعراف اجناسها
واشهرها الشيشع .



شيشع

١٥٩٤٧ - شيشرج هو الصاب ، اطبخ .

١٥٩٤٨ - شيشس الزفرين

Gonepteryx rhamni (S).
Gonepteryx citron (F).

حشرة من فصيلة الكرنشيات وريقة برششات الاجنحة .
اصطلاحها صباب وجبال الشرق الاذل وارودية والريكية
التشالية . غراشها واضحة فتمتد على الازهار . مرتباتها
على براعم التفتيات وتوليبها || جسمها بطول نحو ١٩ م .
سقطها نحو ٥٦ م . رأسها معتدل الحجم . احمر اللون .
ميناها كيرقان . زباناها صولجانان يشبهان كثيف الخمل
احمر اللون . بطنها اريد اللون عند الذكر ، الخمله عند
الانثى . ووشانها الاماميان الى الصغار البصريين عند الذكر
والى الخمار الباهت الازرق المزاج عند الانثى . وتلونها
نقطة برتقالية في كل ريشة وبض نقط حاشية فمسية
اللون . الزوج الخلفي بلون الانثى وتلونه عند الششين
نقطة برتقالية كبيرة واربع نقط صغيرة فمسية اللون ،
حاشية || لها جيل واحد في الحول . الانثى تضع المكن
زويبا زويبا على زيمات الزفرين والبقع والعتاب || السورة
اسطوانية الشكل تطول نحو ٣٦ م . فورها الى الحاملة
الخضراء يملؤها غطان جانبيين اسفرايين وتسعة خطوط
كستنية يحدها اطراف اسود . رأسها اسود ملها ورواجها
الى الحاملة الداكنة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥
يوما ويتقشر ضمن غشاء ضوحي اللدة ويطلع غيط
سريري تغشده الحفصة .



شيشس زفرين

١٥٩٣٩ - شيشس ٥
Romulea (S).
Romulea (F). Romulea (E).

جنس نباتات دليسية من فصيلة السونيات . منبتها
ساحل حوض البحر الابيض المتوسط . انواعها المروفة
سنة . سوقها غمراخية ، قرصية الانتشاب ، لايامية الارواح
منها الوحيدة وبها الفصية . اوراقها متماثلة شقيقة اتصال
المستطيلة . ازهارها فردية ، طرفية الازنكار . الوانها تختلف
من نوع الى نوع ، منها البنفسجي والوردي والاصفر
والبلكي والمزلق .

١٥٩٤٠ - شيشيان ٥
Fourmi mite (F). Ant male (F).

هو ذكر النمل .
Lanchoptera (S). شيشير ١٥٩٤١
Lanchoptera (F). Lanchoptera (E).

جنس حشرات من فصيلة الشيشيرات وريقة ذوات
الجانحين . انواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق
البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول
من ٢ الى ٥ م . رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . حينها كبيرة ،
ناشرة ، غايقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ،
ثلاثية الفصل ، تنهي بنسيلة دقيقة . اعطامها فمسية .
ملابسها وحدة العلة . كولسها وبطنها مساوية العرض .
روافئها فيه شفاقة . قرونها مبرقة الحلب الشالك .
الولها ملونة || تألف اللباب وشفاف مجاري الماء .
جسمها واضحة ، قوتها رسيق الازهار وطلمها . يرقاتها تعيش
على المواد النباتية الجزئية الاصلول في الجلالة وفي كل
مكان آخر .

١٥٩٤٢ - شيشيرات ٥
Lanchopteridae (S). Lanchopteridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
المروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اصقاع العالم ||
تألف الحراج واللباب وبها يعيش قرب مجاري الماء ||
اجسامها صغيرة ، هيفاء ، تطول من ٢ الى ٥ م . رؤوسها
كبيرة . حينها غايقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية
قصيرة ، ثلاثية الفصل . اعطامها فمسية تنحدر في
التجويف اللثكي . شفاهها السفلى لافة . تآكلها ضامرة .
روافئها شبه متباينة الشكل . قرونها نفيطة ، مبرقة الحلب ||
يرقاتها مبطلة تعيش في المواقع الرطبة على المواد النباتية
الجولية الاصلول || اشهر اجناسها الشيشير .

١٥٩٤٣ - شيشط ٥
Brûture (F). Scald (E).

استراق النبات من الصقيع . يقال شيط الصقيع النبات .

١٥٩٤٤ - شيط البشركة ، شيط البشرك
Rousissement de l'épiderme, Rousissement des
fruits (F).

الشيط تشويه عاظم يحل بمخلبا الامة فيفقد عليها ويجب
استبدالها بمادة فلفلية . اسبابها عديدة احصاها :
١ - العوامل الجوية اللاذاتية كالبرد والرطوبة وتنفخ
الحارة التي تغيب البقعة وتستر نحو ٤ اسابيع .
٢ - الاختلال في توازن اللدلاء .

٣ - الحش الخائن من استعمال بعض الادوية الكاوية .
٤ - الازماد الباكرك اذا امتدى القابل قبل الازراق او
ركب الازراق والثار في آن واحد .

١٥٩٥٨ - شَيْطَسٌ * ، اَبُو حَرْشِكَة

Muraena (S). Murène (F). Moray (E).
جنس اسماك بحرية مفترسة نهمة من فصيلة الشقيبات .
انواعها عديدة بعضها من اسماك بحار المناطق الحارة يكثر
وبعضها في بحر القارم والمتوسط . تتميز بجملها العنود
الحراشف . شكلها يشبه الانكليس طولها يراوح من ٨٠
الى ٣٠٠ سم . تألف المياه الاقليمية واغوار الأنهر .

١٥٩٥٩ - شَيْكَة

Chenaloex (S). Chenaloex, Ole-renard (F).
جنس طير من فصيلة الوزيات . انواعه قليلة العدد بعضها
رشيقة القروم ، مسطيلة العنق والرسع ، كبيرة الجناح
الذئب ، قصيرة الذنب ، قوية الدائرة الحادة . غاطسها
ضخيمة متصلة الطول . ألتكها امليا شابة . اثارها
متراكبة الالوان المختلفة من الياض الى الاسود يملوها
تجميع وتضليل وتبييض || موطنها فصح الازجاء يمتد من
الهند الى افريقية الشرقية واوروبية . تألف السميرات
والانهر والمناقع . تكئن في الاجهار القنات على مقربة من
الماء . انثاه تبيض من ٦ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدها
نحو ٤ اسابيع || اشهر انواعها شيقة النيل ورشيقة الهند .

١٥٩٦٠ - شَيْكَة النيل * ، اَوْرَة مِصْرِيَة

Chenaloex sgyptica (S). Chenaloex d'Egypte,
Oie du Nil, Oie d'Egypte (F). Egyptian goose (E).
نوع من الشيقة موطنها شاطئ النيل والبيحيات . تتميز
بامتدادها ونفورها وشراسة اخلاقها .

١٥٩٦١ - شَيْكَة الهند

Chenaloex melanonotus (S). Chenaloex des
Indes (F). Indian goose (E).
نوع من الشيقة موطنها الهند والبراق . تتميز بكبر جثها
وبزها نوحها .

١٥٩٦٢ - شَيْكِيَّات ، مِرْشِيَّات

Muraenidae (S). Muraenidae, Muraenidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة مفتحات المثانة الجلكيات . اجناسها
عديدة اشهرها الشيق والانتقليس .

١٥٩٦٣ - شَيْكَة

Spicara (S).
جنس طيور بحيرية من الشقيبات وفصيلة البقريات .
جرايه الكنديي جالس القنادة ، منتصب القروم ، لا
قنابي الشكل . كالتها سمعية التجميع || انواعها
قليلة العدد والاذى لا تستوجب عناية خاصة .

١٥٩٦٤ - شَيْكُو

Chicot (F).
فجيرة حرجية من المتصينات تدعى طميلة ، اطلها .

١٥٩٦٥ - شَيْكُوِيَّة

Chyle (S).
مادة مائلة بياض اللون تحضنها الغاشية الغاطية المعوية
انثاء الحفم صفورها وتقلها بواسطة البروق الشيلوية الى
جداري البثرة السوية .

١٥٩٦٦ - شَيْكَل ، كِيلِيْس

١٥٩٦٦ - شَيْكَل ، كِيلِيْس
مادة مائلة بياض اللون تحضنها الغاشية الغاطية المعوية
انثاء الحفم صفورها وتقلها بواسطة البروق الشيلوية الى
جداري البثرة السوية .

١٥٩٦٧ - شَيْكَل ، فِرِيْز ، فَرَاكُولَة ، تَوْتُ الْأَرْضِ

Fragaria (S). Fraisier (F). Strawberry (E).
جنس نباتات عشبية رندية زساقه مسرة من فصيلة
الورديات . انواعها سمة اما غروبها واسرارها لكثيرة

١٥٩٦٩ - شَيْطَسٌ كَلِيْبَاتَرَه

Gonepteryx Cleopatra (S).
Gonepteryx Cleopatra, Citron de Provence (F).
حشرة من فصيلة الكرنبيات ورتبة حرشغيات الاجنحة .
موطنها بعض ضباب جبال حوض البس الايض المتوسط ||
فراشها واثقة قوتها وسبق الازهار . سرقتها غاضلة تثير
على زعمات موطنها من النقيات || جسمها يطول نحو
٢٠ سم . جثها نحو ٨ سم . رأسها ابرواني اللون . جثها
كثيران . زياتها صولطانيان . جثها جوي الحلقة
الصدرية الاول ، اربعة الثانية والثالثة . يعطها الحبل اللون ،
اشجع المروج عند الذكر ، اسمر عند الانثى || روشها
الاسمان ، عند الذكر ، الى الصفار الجويي يتوصله
بقعة ابروانية اختار ، جزوية المركز . وما عند الانثى
الى الخضار الباهت يتوصله نقطة جزوية صغيرة . روشها
الغليظ ينس اللون تملوها لطيفة برتقالية كبيرة عند
الذكر ، صغيرة ومرتبة عند الانثى || لها جيل واحد في
الحول . الانثى تضع المكن زوجا زوجا على لويي التين
والعنب || السرعة تقبل نحو ٢٦ سم . جسمها اسطواني .
نوحها الى الخضار الاس يملوها غطان جانبيان احمران
وخض ثجي جزوي اللون ، اسود اختار ، وقسة اطواق
سود يتوصلها تقطع اسفر . رأسها اسود . منجها ورواجها
الى السرة .

١٥٩٧٠ - شَيْطَلَة

Flambéant (F). Bueking (E).
منشع طبيعي قوله ان الاجسام المسطلة تكأثر بالاضط
فيتشو فورثها الجانيي .

١٥٩٧١ - شَيْطَلَم

هو الشحم الملبول ، اطلها .

١٥٩٧٢ - شَيْع

Lionceau (F). Young lion (E).
ولد الاسد قيل ان يكون شيا .

١٥٩٧٣ - شَيْعَة

فجيرة لها نور اصفر من اليامين احمر طيب تعلق به
التياب . والتحل تجمرها ويطيح عليها صلبها (السان) .

١٥٩٧٤ - شَيْعَاب

Impermeable à l'air (F). Air-tight (E).
لمت ترمي يطلق على كل مادة لا يغلها الهواء .

١٥٩٧٥ - شَيْف

هو الشوك المبريد في مؤخر صلب النخل .

١٥٩٧٦ - شَيْفَرَة

Carinaria (S). Carinaire (F).
جنس حيوانات بحيرية من الرغويات مملات الازيل
وفصيلة السرانبات . انواعها المرفوعة شمائية متشرة في جميع
بحار البلاد الحارة والمعدة الحارة || اسنانها صغيرة ،
وسيلة المصارع ، دقيقة ، شفافة ، غزولية الشكل ،
محلزة الاطراف ، تجمع في داخلها للقلب والاشعاء ||
اجسامها مسطلة ، حلالية ، شفافة ، تتنهي بزواله
جناحية الشكل . رؤوسها عظمية ، مستعفة ، مقنوية ،
ثلاثية الحواس والعيون || اعرف انواعها واشهرها شيفرة
المتوسط (Carinaria mediterranea) .

١٥٩٧٧ - شَيْقِي

Crin (F). Coarse hair (E).
هو السيب شرذوب الدابة .



شيفر



شيق



شيقة النيل



شيك بري

تتم بطريقتين إما باليد أو بالرواكب. فاليد يكون في مشاتل خاصة توافتت فيها جميع أسباب الانتاش والتمو بسرعة ثم تنقل الشتول إلى مستقراها || أما الرواكب فتفصل من أماتها وتقرن في مستقراها ومنهم من نقلها إلى محضن تقيم فيه من ٤ إلى ٥ أسابيع قبل أن يفرتها في مستقراها || زراعة الشيكل تستمر مدة سنوات متتالية لكنه يستمر بجديدها كل سنتين لأن كثرة رواكبه تستنزف التربة من جميع عناصرها الغذائية.

١٥٩٧٢ - شَيْكِيَّات
Potentillae (F).
سبط من فصيلة الورديات ويصير أيضاً غاروليات.

١٥٩٧٣ - شَيْكَم * ، سَلْت * ، شَوْتَم
Secale cereale (S). Seigle (F). Common rye (E). Roggen, Sastroggen (D). Ségale, Segale (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة الشبليات. غرضه وأصنامه عديدة تصنيفها يرتكز على مدى طولها النباتية وبجمل ملامستها إلى مختلف أنواع الآرية وزينة البذر. ساقه دقيقة، جلده، مستطيلة السلاسل. صفة شين النجيل، بأمت الخضر، أحر اللويح. سليلته مستطيلة الشكل سيلاته ثلاثية الصف، عقيدة الزهرة الوسطى، سفوية المصيفات العليا. شبه قريب لفيه من البر إلا أنه اقل وأطول وتطو شحة مطلة اللون، غصراء اللوح. يزروع للحد من حل حبه المأكول. دلفه أحر اللون، يميز العلم والعرف. يستعمل في معطر المعونات. شبه صناعي شائع الاستهلاك || وهو من النباتات التي تنمو وتجود في أقطر الآرية الربلية والربلية الصليبية والربلية الجبلية. وين غصائمه الميزة أنه يلفد بؤة الآليات بسرعة فيصير الحولية جميعها صالحة للأكلات وبعثما تصبح محولة ينتج منها نحو ٩٠ ٪ إذا كاتل من محاصيل ثلاث سنوات غلت فلا ينتج منها أكثر من ٢٠ ٪.

١٥٩٧٤ - شَيْكَم الرِّب
Arrhenatherum avenaceum (S). Arrhenathère, Faux seigle (F). Faux oat grass, French rye grass (E). Knolliges Franzosengras (D). Seggins cannasola (I).
نبات عشبي بري حولي من الحورليات وصيلته الشبليات يتميز بأزهاره الشكلول الرمل. يكثر بين الزروع ويملأها ويوجد في الأرض البرد || كثرته في الحقل ضرر لانه يهيب الآرية. يكافح باستهلاك بعض الفواطيخ القليلة التي تقضي عليه وتنتف التربة من بذار.

١٥٩٧٥ - شَيْكِلُو
Chilo
جنس حشرات من فصيلة التاريات. أنواعه عديدة جميعها صغرة القد، رملاتها نهمة تموش على بجلود سروق بعض النباتات انحصا المتقية والمالية || أشهر أنواعه وأغرها شيلو القصب.

١٥٩٧٦ - شَيْكِلُو القَصَب * ، دَوْدَة القَصَب
الصغيركة، حَقَار الرِّب الشرقي

Chilo simplex, C. phragmitellus (S). Chilo des roseaux (F).

قرافة من فصيلة التاريات، صغرة القد، أسطوانية الجسم. اجنتها مهدبة الأطراف. طول الأني ١٢ مم. والذكر ١٥، رأسها وبطنها ويتناحلا الامساكين إلى الصغرة القلقة، بطنها ويتناحلا الحقلان إلى الأيمن الفضي || اجملها الحولية بين الخمسة والسبعة. تقع الأني نحو ٤٠٠ مكتة تحتمها على نصل الأوراق بشكل



شيك بري



شيك



شيلو القصب

الحد. اولها مركبة ثلاثية وبضها خاصي، وريفاتها يضيئة أو اهليلجية الشكل، مهدبة الزوايا الأخير. نصلها كثير العروق، عشن للملس، منشأرات الحافة، عايق الخضر. انزاعها ملائقة خامسة البتلات عديدة الاسدية، غمارها شموية، قلبي، يضيئة أو غندرية الشكل، مأكولة للآفة العلم، ذكية العرف || أنواعه السبعة المعروفة هي.

الشيك البري F. silvestris (S). Fraiser des bois (F).
الشيك الشيلي F. chilensis (S). Fraiser de Chili (F).
الشيك الفرجسي F. virginiana (S).
Fraiser de Virginie (F).
الشيك الكبير الزهر F. grandiflora (S).
Fraiser ananas (F).

الشيك الكروي F. collina (S). Fraiser étoilé (F).
الشيك المايول F. vesca (S). Fraiser commun (F).
الشيك النسك F. elatior (S). Fraiser capron (F).
أما أنواعه المشهورة فهي ما يتبع.

١٥٩٦٨ - شَيْكَل بري
Fragaria silvestris (S).
Fraiser des bois (F). Wood strawberry (E). Wilde erdbeere (D). Fragola salvatica (I).
نوع من الشيك البري مهد جميع البلاد المنتجة الحوراة يكثر في المواقع الظليلة من الغابات والنياض. ثماره صغرة أقد أرجوانية اللون، مردلية الشكل مأكولة تتميز بكنهه خاصة مستحبة.

١٥٩٦٩ - شَيْكَل فِرْجِيَّيْ
Fragaria virginiana (S). Fraiser de Virginie, F. du Canada, F. scarlete (F). Wild strawberry (E). Scharlach-erdbeere (D). Fragola della Virginia (I).
نوع من الشيكال الأمريكي المه، أوله ثلاثية، نصلها ملس البذرة، خللي العروق على الصلصة السطح. ثماره متوسطة الحجم، كروية الشكل، أرجوانية اللون. غرضه وأصنامه الموهجة الزراعية عديدة جميعها مأكولة الثمار اللذيذة العلم.

١٥٩٧٠ - شَيْكَل كبير الزهر
Fragaria grandiflora (S). Fraiser ananas, F. de la Caroline (F). Pine-apple strawberry (E). Ananas-erdbeere, Grosse Erdbeere (D). Fragola ananaso (I).
نوع من الشيك كبير الثمار قليلاً استخدم في تجهين معظم الأنواع الاخرى فصغرت منه غروب وأصنام عديدة عمت زراعتها جميع البلاد || يتيز بكمز ثماره الغالية الشكل الجمادة اللباب المتسحب العلم. لها إلى الوردي تملو شحة صفراء زاهية اللوح.

١٥٩٧١ - شَيْكَل مِدْول * ، شَيْكَل معروف
Fragaria vesca (S). Fraiser commun (F). Common strawberry (E). Erdbeere, Wald-erdbeere (D). Fragola commune, Frevola (I).

هو النوع الزراعي المفضل، غرضه وأصنامه التي تحورت بالتجهين مع الأنواع الاخرى كثيرة للحد ويستمر ازديادها عاماً بده عام. أولاته ثلاثية مستطيلة الزناد. نصلها عشن للملس جميل الخضر. انزاعه عديدة، طوية المالحق. ثماره متوسطة أقد اركبية، لا قياسية الشكل يثلب فيها الرمي. لها إلى الحمرة زهر وعتيق وتكد مشتبها مع مختلف الغروب والأصنام || يعيش في جميع الاقاليم المعتدلة لكنه يرض في الآرية القليلة الانتساج الثنية بالمواد المضوية والناصر الغذائية المدنية || زراعته

من اللبالية الى السرة الخلفية يطبقها حصار اسود. رأسها غروي الشكل، ذلق الخط. شفها متوسط الانتراج. فكها متعادلان. اسناتها متراصة وسيدة الصف في الفكين. زعنفا مستديرتان، ولشزتان. زعنفا الظهرية لثنتان. زعنفتها الذيلية فاقية || لها وديك، ابيض اللون، مستحب اللحم.

١٥٩٨١ - شيم طرخوري * طرخورة

Trachurus trachurus (S). Saarel, Chinchard (F).
Scad, Horse-mackerel (E).

سمكة بحرية يمرض من الشببات الاسقرليات شالكات الزمانف. اصطلها جيم بحار البلاد المظلة الحارة من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي والمحيط الهادي من جسمها اعليجي الشكل بطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. ثوبها الى الربعة اقزواء يضمر ويسمر عند الظهر ويدبر عند البطن. رأسها غروي الشكل مستد الحبر. فكها الاسفل يتقدم الاسفل. تتميز باستطاعة زعنفاها الظهرية والشرجية. زعنفتها الذيلية فاقية. حرافض عظمها الجاني جانبية الشكل تملأها مناس متفقة تتجسم وتكبر مع الاقتراب من اللب || لها متوسط الصف، مأكول.

١٥٩٨٢ - شيم قراب * قراب

Caranx korab (S). *Caranx korab* (F).
Caranx korab (E).

سمكة بحرية يمرض من اللحم. اصطلها جيم القالم البحر الاحمر ويض مناطق البحر الابيض المتوسط. تتميز من اسماك الثقات واليم || جسمها اعليجي الشكل، مستطيط، بطول من ٥٠ الى ٥٥ سم. ثوبها الى الشبه النضية المالح. ظهرها الى الزرق. زعنفاها الصدرية والخصية الى الشفحة. الظهرية الى الخشار البحري، الشرجية شفافة يطوقها حصار اصفر. الفلقة العليا من الذيلية الى الزرقه الخضره الموج، الشفلة السفلى الى الصغار الباهت || لها في ظهرها زعنفتان. زعنفتها الذيلية فاقية || لها جيد الصف، مغروب فيه.

١٥٩٨٣ - شيمييات

Carangidae (S). *Carangidae* (F).
Carangidae (E).

عارة اسماك من الاسقرليات الشالكات الزمانف.

١٥٩٨٤ - شيميية *

Caractérologia (F). *Characterology* (E).

الشيحة قسم من السيكلوجية يبحث في الطباع الخلقية.

١٥٩٨٥ - شيشير

هو الشيشير، الحلبه.

١٥٩٨٦ - شيم

Hystrix (S). *Porc-épic* (F). *Porcupine* (E).

جلس سوارات لينة قاسمة من فصيلة الشببات انواعه سة. جميعها غليظة الاجسام المشفحة الصمورة. رؤوسها مكرنة. مقاصها مشقولة. خناياها مسترسفة. حيدنها وأذناها صنية. اعناتها قصيرة. جرانها مستدلة القذ قريه. اخلافها مقوسة حادة. اذانها جدد بارزة. لها كيف التجميع قصير القذ يصله شوكة كاسلال طين الطويل والغلف يملو الجسم من قذ الرأس الى طرف الذنب || احرف انواعه الشيم الملبول والشيم الابيض الذنب. قال فيه الجاسط : « من شأنه انه يمدد قائما واذا رأى ما يكره انقضى وانقض فيخرج منه شوكة كاسلال يرحم من اصابه ».

كل مستطيلة. الكلة تشمل من ٢٤ الى ٢٦ مكة تقف بهد منها بنسة او سبة ايام نسية الى حويل الطقس من رقات صغيرة نسة كشلى الى الوراوق وتضهر السوق ويبلغ كامل نمجا البرقي بنسو ثلاثة اسابيع ثم تتحول الى عذارى منها الى حشرات كاملة. طورها القذري يدوم في الربيع والصف من ٤ الى ٦ ايام || اما البرقة الكالسة فطولا نحو ٢٠ م. لونها الى الجلوة الخلفية يطوقها حة خطوط ارجوانية مستطيلة تتكشف للظهر والجانبين || موائلها عديدة اهمها قصب السكر والارز والقدو الصغار والبيضاء والذئب والتبيل || اهمها شديدة القبح لانها تحفر السوق وتضي على النواي.

١٥٩٧٧ - شيميكة *

Chilina (S). *Chilina* (F). *Chilina* (E).

جلس سوارات مائة من الرغوات مبدات الاربيل وفضيلة الشببات. انواعه المعروفة قليلة العدد اصطلها اثير وزيانج ارميكة الجنوبية. تفتي التباينات للالقة || اصطلها نصف كروية للشكل، قصيرة الوب، كبيرة القوة المستطيلة. اجسامها مستطيلة. رؤوسها قليلة العرض مبطلة. لواسها مزوانية الشكل. اربطها وحيدة، مسترسفة، عادية السطاط.

١٥٩٧٩ - شيم اوبه *

Caranx glaucus (S). *Caranx glaucus* (F). *Glaucous scad* (E).

سمكة بحرية يمرض من فصيلة الشببات وربة شالكات الزمانف. اصطلها يض القالم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي... تتميز من الاسماك البنية || جسمها اعليجي الشكل، مستطيط، بطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. ثوبها الى الربعة يطوقها موج اقزق يتخلله الاخضر البحري يمتد في الظهر ويدبر في البطن ويملو جميع فصي منه قامة الزنفة الظهرية الثانية والزنفة الشرجية. رأسها غروي الشكل، ذلق الخط. شفها واسع الانتراج. فكها متعادلان. اسناتها صغيرة وحيدة الصف في الفكين. زعنفا مستديرتان، مستديرتان. زعنفاها الظهرية اثنتان. زعنفتها الذيلية فاقية || لها وديك، ابيض اللون، مستحب اللحم.

١٥٩٨٠ - شيم صتمين * صتمين

Caranx zameun (S). *Caranx zameun* (F). *Caranx zameun* (E).

سمكة بحرية من اللحم. اصطلها جيم القالم البحر الاحمر ويض مناطق البحر الابيض المتوسط. تتميز من اسماك الثقات واليم || لمنجها الحياتي جلعي يمد الادراك || جسمها اعليجي الشكل بطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. ثوبها الى الشبه النضية الماحدة اللبس. زعنفاها الصدرية والخصية عبره اللون. زعنفتها الشرجية والفلة السفلى من الذيلية الى الصغار الخفي الموج. زعنفاها الظهرية والفلة العليا



شيم



شيم اوبه



شيم صتمين



شيم طرخوري



شيم قراب

ورقة للقرص . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باجسامها البنية المتقرصة . رؤوسها غليظة . مقامها مشوية . اذنانها قصيرة او طويلة اخاذة . جرائزها متساوية الطول رباعية او خمسية الاضلاع . انظرها قوية ذرية . جلودها حسية التركيب يطولها حلب دقيق وشوك كالشال متباين القلط والطول || جلودها المناطق الحارة من المائلين القديم والجديد . وهي بطيئة الحركة تسرح في الليل قريبا مختلف المواد النباتية والظاوع والافاعي .

تقسم هذه الفصيلة الى فئتين :

— فئة الشياحم الشاجرة المتسلقة وهي تشمل ثلاثة اجناس الاروين والكتنوس والشطوس .

— فئة الشياحم الأرضية وهي مؤلفة من جسيمن الشبح والاطرور .



شبح مدبل

١٥٩٩١ - شبهات الفؤرب ٥

Hysticomorpha (F). مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القوارض تشمل اربع فصائل الشبهات والافانبات والفنشيالات والكرديليات .

١٥٩٩٢ - شيوط ٥

Cheyota (F). هو الشوكوم نبات زراعي من القرعيات ، اطليه .

١٥٩٩٣ - شيوخ ، شوكية شائعة

Indivision (Jov.) (F). Joint-possession (E).

ساعة قانونية يوجد فيها من يملك حقاً مشتركاً مع غيره في مال او مقام لم يقسم بين مالكيه ويكون كل مشترك شريكاً بقدر نصيبه في كل جزء من اجزاء المال المشترك على الشيوخ ويكون نصيبه معنوياً محصاً بغير عه بالارقام كالنصف والربع والثلث في حين يبقى المال الذي ينصب عليه هذا الحق شاملاً .

Chionodons (F).

١٥٩٩٤ - شينودكة

هي الثورث ، اطليه .

١٥٩٨٧ - شبهات أبيض الذئب ، شوشب ومدك
Hystrix leucura (S). *Porc-épic à queue blanche* (F). نوع من الشبح كبير الجثة غليظا بطيء الحركة ، طوله يراوح من ٧٥ الى ٨٥ سم . وذنبه من ٧ الى ١٥ سم . ثوبه الى الصبغة البيضاء . عليه ابلان اللون وشوكه كلك . ذنبه ابيض الحلب والشوك || موطنه الهند وباران والمراة حتى ضفاف بحر قزوين . يأنف المناطق القرية من العراق . جسمه ردة فسيحة مستطبة يطرحها على حق ٧٥ سم . يادى لها في النهار . يسرح في الليل . قوته الجلود والمسلق والاضباب || اثناء تضع من ٢ الى ٤ ادراس تخلف باصرة كاسية .

١٥٩٨٨ - شبهات بحري

Hérion de mer (F). *Porcupine fish, Sea hedgehog* (E). هو قنفذة البحر من الفئيات ، اطليه .

١٥٩٨٩ - شبهات ميدون ، شيقم ، دكك ،

Hystrix cristata (S).

Hystrix cristata (F). *Porc-épic commun, Porc-épic à crête* (F).

لوع من الشبح غليظ الجثة الزينة الصمورة . بطيء الحركة . طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم . وذنبه ١٦ . شوك فقرته ومنقعه دقيق مستطيل منطوف اقزام الاخير . طوله نحو ٣٣ سم . شوك ظهره كثيف التجميع مستطيل الشكل غليظ القذ ذريب الاطراف يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . يلفسه الحيوان لتفادع عن النفس فيتعاد ويؤدي حيث يفرز || موطنه فسيح الارياب يعم كامل موطن البحر المتوسط || يأنف الاحراج والمغالب والاماكن البعيدة عن العمران . جسمه ردة فسيحة يطرحها في التربة على حق ٦٥ او ٧٥ سم . مدغها وخرجها لفق واحد طوله نحو ٥ امتار || يسرح في الليل . قوته الاضباب والجلود وجميع انواع الشوك والضميد وبعض الحشرات والديدان والورع والظاوع والافاعي || اثناء تضع من درسين الى ٤ ادراس تخلف باصرة كاسية .

Hystrixidae (S).

١٥٩٩٠ - شبهات

Hystrixidae (F). *Hystrixidae* (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاسمة من مرتبة شبهات الفؤرب



ص

١٥٩٩٩ - صابونيات ، قروسيات

Clupeidae (S), Clupeidae (S), Clupeidae (S).
فصيلة اسماك حديدية الاجناس والانواع، متفردة القد وقدر الاسراب. اشهر اجناسها الصابونية والشابل والسردين والزلكة الخ.

١٦٠٠٠ - صابون
Sevon (F), Soap (E).
مادة صناعية تستعمل للتنظيف تتكون من تفاعل بعض المواد النعنية مع بعض المواد القلوية .

١٦٠٠١ - صابونيات
Sapindacées (F).
هي فصيلة السينديات ، اطلبها .

١٦٠٠٢ - صابونية
Saponaria (S).
Saponaire (F), Saponaria (E).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنفليات، انواعها نحو ٢٠ جميعها منقطة . اوراقها كاملة متفابلة . ازهارها نورية التجميع . تاجية الارتكاز ، زاهية الالوان التي تختلف باختلاف الانواع || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

١٦٠٠٣ - صابونية دابكية

Saponaria glutinosa (S), Saponaire visqueuse (F).
نوع من الصابونية وهي عشبة سريرية محولة تملو من ٢٥ الى ٥٠ سم . ساقها فراء مزغبنة . اوراقها كبيرة القد ، تفصلها ثلاثي او خماسي المروق ، ازغب البشرة ، دابك المسام . ازهارها حربي الشكل . ازهارها قرمزية اللون ، صغيرة البتلات الجزلة .

١٦٠٠٤ - صابونية زينة

Saponaria ocimoides (S), Saponaire faux-basilic (F).
نوع من الصابونية وهي عشبة سريرية معمرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . ساقها فراء . اوراقها منقطة ، اعطليجية ،

١٥٩٩٥ - صادة
Délivre (F), After-birth (E).
ما يخرج من رحم انثى الحيوان من القلبي بعد الوضع . يقال القلت البقرة صانتها .

١٥٩٩٦ - صابة ، ميسكيا

Hippomane manchinella (S), Mancanillier, Arbre poison, A. de mort (F), Manchinel tree (E), Mancinellanbaum (D), Mancanilla, Mancinella, Noce venenoso (I).
شجرة من فصيلة السيميديات تملو من ٥ الى ٧ أمتار ، شكلها على هيئة الجوز . ساقها سرية صهوية . اوراقها مدعقة ، متعاقبة ، قلبية ، مستطيلة . تفصلها شديدة الحصار ، متباعد المصحة ، سميكة التجميع . والانتوية فردية . ثمارها كالتفاح الصغير شكلها وحسبها وهي مأكولة ، لذيلة الطعم . والشجيرة تفرز شائنة اي عصارة لينة حريفة ، كاوية ، سامة . ومنهم من قال ان كل من نام في ظلها كان نصيبه الموت . ج صاب .



صابة



صابونية

١٥٩٩٧ - صابونية
Aloose finta (S).
Aloose, Feinte (F), Shad (E).

سمكة من الصابونيات كبيرة القد ، تملو نحو ١٠٠ سم . تكثر في المتوسط وعلى شواطئ الاطلسي . تتصل الاغوار وتصدد الانهار في زمن السرم ثم تعود الى البحر في اواخر الصيف || لديها لذية الطعم غير انه كثير الحسك .

١٥٩٩٨ - صابونية النيل
Clupea nilotica (S).
Aloose du Nil (F), Nile Shad (E).

سمكة بحرية نهرية من الشابلات الصابونيات، موطنها المتوسط . يكثر بجيها في النيل من آذار الى تموز وهي كثيرة القد ، كثيرة الحسك ، مأكولة .



صابونية ربحانية

Echales (F). Vine-prop (E). ١٦٠١٤ - صابون - صابون
الصابون ما يمرض عليه الكرم.

Empaqueuse (F). ١٦٠١٥ - صابون
جهاز آلي يسر تلقائياً ما جعل بمثابة من الإثبات.

Shenc ١٦٠١٦ - صابون
ملك يصرف ليه قسم من البذار الكهربائي فينبف.

Pladitza, Pladize ١٦٠١٧ - صابون - صابون
تربة جنية سبيلها نية اللؤلؤ قدردا يراوح من حيم
زرة التردك الى الحصة.

Fusée (F). Spindletul (E). ١٦٠١٨ - صابون
سهم شديد الانشجار رش به يفس السحب فيحول بلدا
الى ماء يسقط حل الارض مطراً بدلاً من البرد.

Couture (F). ١٦٠١٩ - صابون
سقوط لزرع بعد التايير والانشاب، راجع - تحشف.

١٦٠٢٠ - صابون
هو الانشاس، اطبه.

١٦٠٢١ - صابون
هو انشاس الخشخ هو انشاس الخشخ، اطبه.

١٦٠٢٢ - صابون
هو الانشاس الاسابي، اطبه.

Ascendant (F). ١٦٠٢٣ - صابون
هو الانشاس، صابون.

Stalagmite ١٦٠٢٤ - صابون
صابون، صابون، رولاب كلية متجمعة لفة تقطر
ارض الفلور وبتوانا.

Foudre (F). ١٦٠٢٥ - صابون
Lightning, Thunderbolt (E).
افراخ كهربائي جوي بين محابة مكهربة والارض او
بين محابطين. واصافقة يصحبها برق ووجه.

١٦٠٢٦ - صابون
صاف الكرم: بدت نولابه بعد التمرام.

Chair, Limpide (F). ١٦٠٢٧ - صابون
Thin, Limpid, Clear (E).
ما كان لا دس فيه.

١٦٠٢٨ - صابون
الصافر: كل ما لا يصيد من الطير. والتمس يصفر.
وفي الثقل: اجبين من صافر واصفر من ليل.

Couleuvre-chapelet (F). ١٦٠٢٩ - صابون
الصافرة اسم ثلث لصبان المرقط، اطبه.

Evéement (F). ١٦٠٣٠ - صابون
راجع حادث.

Saphine (F). Saphens (E). ١٦٠٣١ - صابون
ويدعى السافن وقروريد الصافن. هو الوريد الذي يلين
نقل الدم الى اطراف الجسم الفضل.

Net (F). Clean, Clear (E). ١٦٠٣٢ - صابون
هو ما يبقى بعد حذر الكلفة.

مقلوبة التامة، نصلها دابق السام، اذهب البثرة.
انمارها يفسد اللين او ودية، كلها متراكب المرافف
الحطية || انمارها يستمر من تموز الى آب.

١٦٠٠٥ - صابونية شرقية
Saponaria orientalis (S). Saponaria orientale (F).
لوع من الصابونية وهي شبة سوية سرولية تملو ١٥ سم.
ساقها زيار. اوراقها معتقة سنية الله، اعليجية الشكل.
نصلها مائل للبشرة وجيد المرق. انمارها ودية اللين
او حراء، كلها اسطوانية الشكل، خلية البشرة || انمارها
يستم من ايار الى تموز.

١٦٠١٦ - صابونية صفرام
Saponaria lutea (S). Saponaria jaune (F).
لوع من الصابونية وهي شبة ممرة تراب في الاربة
المجسية وهي من نباتات الطوية. تملو نحو ١٠ سم.
ساقها حامدة الفروع، قليلة الازراق المتباعدة. نورها
الزهرية حمية الاككار. كأس الزهرة زيفاء البشرة،
بنتها صفراء اللين منشفة بالاسود || انمارها يستمر
من تموز الى آب.

١٦٠٠٧ - صابونية قزمية
Saponaria pumila (S). Saponaria nana (F).
لوع من الصابونية وهي شبة برية جبلية ممرة. ساقها
جندة ودية الزهرة تملو نحو ٥ سم. اوراقها خيفة لتصل
للتسطيل المائل. زهرتها ودية لبيات. كلها خلية
البشرة، حراء اللين.

١٦٠٠٨ - صابونية قزمية *، هرق الحلاوة
Saponaria officinalis (S). Saponaria officinale, Savon-
nière, Herbe à foulon (F). Soapwort, Hedge pink,
Fuller's herb (E). Ecthas saifankrust (D). Saponaria
officinalis, Saponella, Conditi (I).

لوع من الصابونية وهو نبات حشوي طوي وصناعي ممر.
ساقه ليفية مدادة تملو نحو ٨٠ سم. اوراقه كبيرة الله
تملو نحو ١٥ سم. وترعى ٥ سم. انمارها عطرية كبيرة،
حراء اللين او ودية. انمارها يستمر من حزيران الى
ابلول || جلوره وسقه واراقه وازهاره طيبة تدخل في
تركيب جنة مستحضرات تجميل الجلد وادوية اللعاضل
ويقال انها تنفع السلس || سقه صناعية تستعمل في
تطهير الثياب وهي زعي في الماء كالصابون.

١٦٠٠٩ - صابونين
Sapoline (F). Saponin (E).
مادة صابونية تستخرج من هرق الحلاوة وغيره. تستعمل
في التفتيل.

١٦٠١٠ - صابينة
Vent du Sud-Ouest (F). South-West wind (E).
هي الريح الجنوبية الغربية، دبح مها بين الجنوب
والغرب وجهتها بين الشرق والغرب.

١٦٠١١ - صابون الريح
Bris-e-vent (F). Wind-screen (E).
صف او عدة صلب من الاشجار اللينة الكثيفة الاثان
تزرع لصد الريح وقاية المزروعات من حبوب اللذي
النار.

١٦٠١٢ - صابون
Effluent (F). Effluent (E).

١٦٠١٣ - صابون
Proletrian (F). Proletrian (E).
الصابون المعدل نمت ترميفي يعلق على كل شخص لا
يستطيع الانزلاق الا يشعله.



صابونية مخزنية

١٦٠٤٦ - صَبَّارٌ بَيْضِيّ *Opuntia ovata* (S).

Raquette ovoïde (F).
يزرع للزينة ، غليه يملو نحو ١٢ سم. ساقه ملسية
اللون البني الشكل المبط. سداثر رافعة ، مضربة ،
صفراء اللون ، حاتها مستقلة مفصلة || ازهارها جزئية ،
جيلة ، كبيرة ، قطرها نحو ٦ سم.

١٦٠٤٧ - صَبَّارٌ صَرَح *Opuntia inermis* (S).

Raquette sans épines (F).
يزرع للزينة ولأشجار المأكولة . مهد بلاد الاقليل ولزورنيا
غليه يملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ألوانه احليجية الشكل ،
بحرية اللون تطلو نحو ٢٠ سم. سداثر قليلة ميمرة سمراء
اللون ، مدامة الشكل || ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو
٧ سم. لونها ال الصفرة الباهية . ثماره يرتقالية الشكل
متصلة الحجم ، سكرية اللب ، حوله الزور المراساة .

١٦٠٤٨ - صَبَّارٌ سَتَنِيّ *Opuntia stanleyi* (S).

Raquette de Stanley (F).
يزرع للزينة ، غليه يملو نحو ٣٥ سم. ساقه مفصلة.
الوانه صفية الشكل تطلو نحو ١٠ سم. سداثر رافعة
خضدة يضاء اللون . حاتها كيفية التجميع مشربة السرة
تطلو من ٤ الى ٦ سم || ازهارها كبريتية الصفار ، زاهية
اللون ، قطرها نحو ٥ سم.

١٦٠٤٩ - صَبَّارٌ قَنْطَرِيّ * ، كاكوس شوكي *Echinocactus* (S).

Echinocactus (S). *Echinocactus* (F). *Spine cactus* (E).
Igelkaktus (D). *Echinocacto* (I).
جنس نباتات زينة شاككة ميمرة من فصيلة الصباريات.
ألوانه عديدة مهدا البلاد الامريكية الراسي . ساقها
حسية واسعة القطعة ، يرتقالية الشكل بخدة الجسم ،
مغطية الرأس والعقب . سداثرها كثيرة العدد ، مستقلة
الايام ، حطالية اللون ، تركل على فوج الاعمادية .
حاتها ، قوية صلبة ، منسقة ، متشابكة || ازهارها
حادية ، كبيرة القد ، بحرية اللون تطلو يفس السداثر
الراكن لأنها تحض البرد .

١٦٠٥٠ - صَبَّارٌ مَعْرُوفٌ * ، صَبَّارٌ ، تِين شوكي *Opuntia vulgaris* (S).

Raquette commune, *Figuler de Barbarie* (F). *Barbery fig* (E). *Gewöhnlicher Felsenkaktus* (D). *Fico di Barberia* (I).
لبات سبروتي شائع الاستعمال يزود التسبيح ولأشجار
المأكولة . غليه كيفية التجميع يملو نحو ٢٠٠ سم.
ألوانه كبيرة القد ، بحرية اللون . سداثر حطالية شاككة ،
حاتها غليظة سادة || ازهارها كبيرة القد ، زاهية الصفار
الجليل . ثماره مأكولة ، يفضية الشكل مغطوية الرأس
والعقب . قشورها ال الخضار الاصفر تملو عند الادراك
مشفة حواء . وهي مستقلة السداثر الشاككة . شوكها
كثيف التجميع شديد أصلاية والفة . لبها سكري الطعم
مرصوف الزور ، يقال انه لا يخلو من يفس المناسبر
الندانية المفيدة وثنها الحامض التسريفي الجزيل النفع .
يميش في جميع الارربة من البردية القاحلة الى الحسية
الندجية . يتكاثر بفرس ألوانه او بجزء منها .

١٦٠٥١ - صَبَّارٌ مَعْرُوفٌ *Opuntia tunicata* (S).

Raquette à tunique (F).
يزرع للزينة . غليه يملو نحو ٣٠ سم. ساقه وقرصه
اسطوانية ، مراساة ، قليلة التبطيط ، تطلو نحو ٥ سم.
الوانه صفرة القد ، بحرية اللون . سداثر حطالية ميمرة ،
حاتها قوية تيلة اللون تطلو نحو ٤ سم . || ازهارها ال
الخضار الاصفر الزلامي الماوج .

١٦٠٣٣ - صَبَّارِي الحِسَاب *Décompte* (F).

Deduction, Allowance (E).
هو تين رصية الحساب المطلوب .

١٦٠٣٤ - صَبَّارٌ *Epierrour* (F). *Clempur* (E).

الساثور هو المند آلة تقطع الحجارة من الارض ويجمعها .

١٦٠٣٥ - صَبَّارُوكَة *Fosse cérébelleuse* (F).

Cerebellar fossa (E).
الصانورة : بلمان التصف لتشرق على الدماغ .

١٦٠٣٦ - صَبَّارٌ *صال*

الصال : الحار الوحي الحاد الصوت ، ج. صالة .

١٦٠٣٧ - صَبَّارٌ ، لَقِي *Gommeux* (F).

Gummosus (E).
ما كان معني المادة او ما كانت تملو مادة صفية .

١٦٠٣٨ - صَبَّارٌ ، صَبَّارٌ *Sec, Desséché* (F).

Dry, Withered (E).

١٦٠٣٩ - صَبَّارُوكَة *هو الشبان*

لبات شاكك من التنباتات ، اطبه .

١٦٠٤٠ - صَبَّارُوكَة *هو الشبان*

لبات شاكك من التنباتات ، اطبه .

١٦٠٤١ - صَبَّارٌ *Vent de l'Est* (F). *Easterly wind* (E).

هي الريح الشرقية ميمر من مطلع اقربا الى بسات نش .

يقابلها المديور .

١٦٠٤٢ - صَبَّارٌ *هو التمر الحسي*

اطبه .

١٦٠٤٣ - صَبَّارٌ *Opuntia* (S). *Raquette, Oponos* (F).

جنس نباتات حسية من فصيلة الصباريات . ازهاره عديدة
مظنها بري وبسها زرامي وزني . يميز بسكه
وفره المركبة من عدة ألوان متباينة وتنسقة ، يفضية
الشكل ، صمكة التصل ، بحرية اللون تطلو يفس السداثر
الشاككة الانطالية الاكثر . هذه الالوان تظهر وتند
مبطلة ، مدامة الصلابة ، فزيرة المادة الكروية ثم تتصلب
وتشده لالها مع كر الزين تصد وتندرف نحو الشكل
الاسطواني || ازهارها كبيرة القد ، زاهية الالوان المختلفة .
ثماره متباينة الاحجام ، شاككة القشور ، لدة اللب ، كيفية
البور الهلينة الشكل ، الصغيرة القد ، الشديدة الصلابة
والسرة || احرف ألوانه واشهرها ما يبع .

١٦٠٤٤ - صَبَّارٌ الصَّبْرُوك *هو القرصية*

اطلها .

١٦٠٤٥ - صَبَّارٌ المِنْد * ، صَبَّارٌ حِنْدِيّ ، تِين *Opuntia ficus indica* (S).

Opuntia ficus indica (S).

Raquette des indes, Figuler d'Inde, Nojral (F). *Indian fig, Prickly-pear* (E). *Indischer Felsenkaktus* (D).

Fico d'India, Fichidindia, Pero pungente (I).
نبات سبروتي شائع الاستعمال . مأكول الثمار . غليه يملو

من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم. ألوانه الحولية يفضية الشكل

تطلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتندرف من ٢٠ الى ٢٥ ،

نصلها بحري الخضار يسلك نحو ٤ سم. سداثر ميمرة

يبدون انتظام ، شوكها خيل مستقد || ازهارها كبيرة القد ،

صفراء اللون . ثماره كتال الصير الا انها اقل استدارة

وشوكا . لبها سكري الطعم مستحب للملق ، زوروا

كيفية التجميع ، سمراء اللون || زواحه شائمة الاستعمال .

ألوانه الحولية مطنية تأكلها الابل والبقار ويربين عليها

نوع من الكوكشيل قريزي الخضاب .



صبار المند



صبار قنطري



صبار معروف

صغير القند ، جبل الازهار المتتابعة الثلاث المرجانية اللون . لا ينشئ سوى كثرة الازوت والرطوبة المستحكة .

١٦٠٦٦ - صَبَّارَيْنِ هو الفشاخ الحزني ، اطلبه .

١٦٠٦٧ - صَبَّارَيْنِ * Saprinus (S). Saprina (F).
جلس حشرات مقفرة من فصيلة الصبريات . انزاعه للمرة نحو ٣٠٠ جميعا صغيرة القند بنسبة الشكل طويلا يراوح من ٣ الى ٧ م . انزاعها مختلفة الالوان منها الاسود المنقط بالابخر ومنها الازرق الاخضر اللؤلؤ ومنها الاخضر الالس الاسفل اللؤلؤ || ريقاتها وانجحة وقائمة .

١٦٠٦٨ - صَبَّامَةٌ

نبات قريب القند من البام ، ابيض الثمر ، يألف الرمال وتألفه الطلح .

١٦٠٦٩ - صَبَّارِج * Sepiolo (S).
Sépiola (F). Sépiola (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الاربيل ثنائيات الخياشيم ، عشاريات الجرامز بقصبة الصبريات . انزاعه المعروفة قليلة العدد اصطلحها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها فيه اسطوانية لشكل مستديرة الاطراف . زمامها غليظة مستديرة . جرامزها حافسة ، عادية الهامج ، منها ثمانية متساوية الطول ولثنتان مستطيلتان || اشهر انزاعه الصبور المبلول (Sopiola vulgaris) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . لحمه مأكلي جيد الصنف .

١٦٠٧٠ - صَبَّارِجِيَّات * Sapididae (S).
Sapididae (F). Sapididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الاربيل ، ثنائيات الخياشيم ، عشاريات الجرامز || اجسامها صغيرة القند جرابية الشكل او اسطوانية . اجناسها المعروفة اربعة اشهرها الصبور الذي يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اما الاجناس الاخرى فاصطلحها بحار المناطق الشمالية .

١٦٠٧١ - صَبَّارِجَة Barilius (S).
جلس امسك ثورية من الشبايط . انزاعها المعروفة ٧ جميعا من امسك المناطق الحارة وفي منطقة القند او صغيرة . اشهرها صورة الازدن المعروفة بالاشرى وصبره النيل وصبره القرات .

١٦٠٧٢ - صَبَّابٌ ، تَجَجٌ ، تَجَرٌ Dabit (F).
Gaueing (E).

كبة الماء المنقعة التي تلصق من حجر وبيع بوقعة وتقطط وفيها في ثائرة او دقيقة او ساحة .

١٦٠٧٣ - صَبَّابِج هو الحجار ، اطلبه .

١٦٠٧٤ - صَبَّابٌ ، صَبَّابٌ Curneim
نوع من الثورم الكثيفة التجميع المايقة للترابكة المستديرة الاطراف المتوسطة الارتفاع القزيرة الطول .

١٦٠٧٥ - صَبَّابٌ هو الصبار المروث ، اطلبه .

١٦٠٧٦ - صَبَّابَةٌ Figue de Barbario (F).
Barbary fig (E).

ثمرة الصبير المأكولة .

١٦٠٧٧ - صَبَّابَةٌ Pétrographie (F).
هي علم الصخور .

١٦٠٥٢ - صَبَّارٌ وَرَقِيّ هو القليلوكاكتوس ، اطلبه .

١٦٠٥٣ - صَبَّارَةٌ

اسم شائع الاستعمال يطلق على الصبار والالوة والقملة .

١٦٠٥٤ - صَبَّارِيَّات Cactaceae (S).
Cactaceae (F). Cactaceae (E).

ومنهم من قال شوكرات . فصيلة نباتية من ذوات الثقلتين مستقلة العائلات منخفضة اللبش || اجناسها ١٣ تشمل زهاء ٢٠٠٠ نوع ، مهددا البلاد الحارة ، معظمها امريكي الكنت .

١٦٠٥٥ - صَبَّارِج Colorant (F). Colouring (E).
كل مادة ملونة تستعمل في التصفيف .

١٦٠٥٦ - صَبَّابٌ Nutation (F). Nutation (E).
المنصب ، فلكيا ، اتقابل المصروط في قطب الارض .

دورته الكاملة في المدار الشمسي تستغرق نحو ١٨ سنة و٧ اشهر || والصَّبَّاب ، نباتيا ، الانحراف الظاهر الذي يطرأ على اوراق بعض النباتات او ازهارها في اوقات معينة من التبار او في ظروف خاصة من الاشعاع .

١٦٠٥٧ - صَبَّابٌ Proclivité (F). Slope, incline (E).
الصَّبَّاب حالة التي المنتشر او المائل الى الامام .

١٦٠٥٨ - صَبَّابٌ Troupes de 20 à 40 bêtes (F).
قطع من القاء والرمل ما بين العشرين الى الاربعين .

١٦٠٥٩ - صَبَّارٌ هو الآلة ، اطلبه .

١٦٠٦٠ - صَبَّارٌ Diète (F). Diet (E).
هو احتساب البهيبة بلا خلف بعض الوقت في سبيل صحته .

والصبر هو الجهد ، اطلبه .

١٦٠٦١ - صَبَّارٌ لَفْشِي ، لَفْشِي ، مَلْجَح Givre (F). Hour-front, Rime (E).

طبقة غليظة من الجليد تتكون في عمس الاجسام الصلبة بتجمد قطرات ماء الصقيع .

١٦٠٦٢ - صَبَّارَةٌ Sabéra (F).
هو الجلمد الغضط ، اطلبه .

١٦٠٦٣ - صَبَّارَةٌ ، كَاكْتُوس Cactus (S). Cactus, Cactier (F). Cactus, Torch thistle (E). Kaktus (D). Cacto (I).

جلس نباتات لحمية برية ونبوتية من فصيلة الصباريات . انزاعه عديدة مهددا البلاد الحارة . معظمها صغير القند ، شائك النصل || تزرع في المراكب والمصارى . مجموعاتها نفيسة غالية الثمن يقوم بها بعض الهواة .

١٦٠٦٤ - صَبَّارَةٌ الْقَرْمِزِ * Cactus coccinellifera (S). Cactus à cochenille (F).
Cochineal bearing opuntia (E). Nopal (D). Cacto de cochenille, Nopal del giardino (I).

نوع من الصبيرة الزراعية الصناعية منتبها البلاد الحارة . زرعونها ويربون عليها دودة القزير الصبغية .

١٦٠٦٥ - صَبَّارَةٌ الرَّمْجَان * Epiphyllum truncatum (S). Epiphyll (F). Christmas cactus, Wintercactus (E). Blatzkaktus (D). Epifilio (I).

نوع من الصبيرة وهو نبات تزئيني ، مركبي ، مصرى ،



صبرة القزير



صبرة المرجان



صبرين



صَبَّابٌ

Surface de la terre (F).

١٦٠٧٣ - صحيف

هو الأديم ، الظله .

١٦٠٧٨ - صنع هو سار الجرح ، الظله .

Roche dure (F). Tough rock (E). صَحْمَة

الصخرة والصخينة هي الصخرة الصلبة .

Sueur (F). Sweat (E). سَعَر

هو عرق الجسم وفي التنفيس عرق الخيل ويلد حياما .

Santé (F). Health (E). سَهْة

حالة الجسم السليم من المرض .

Validité (F). Validity (E). صَحْة العَقْد

هي إن لا يكون شروبا يسبب من اسباب البطلان .

Désert (F). Desert, Waste (E). سَحْرَاء

سهول ترابية الاطراف شاسعة المدى تتميز بجفاف مناخها وبالندام الحية النباتية والحيوانية فيها الا في بعض الواحات والاديار حيث تنضج وتسيل بعض البهون .

Désertique (F). سَحْرَوِيَّ

Pertaining to (E).

لمت تعريفى يطلق كل ما هو يخص بالصحراء كقولك بيوت صحراوية ومناطق صحراوية .

١٦٠٨٥ - صَحْب ، صَحْبَة ، صَحْبَة المتاع

Sphagnum (S). Sphagne (F). Bog moss, Gold beech Tarfmoos (D). Sphagno, Muschio di palude (I).

جنس طحالب من فصيلة الصمليات تعيش في المناطق والمياه الرطبة الصافية . انواعه قليلة العدد . سطحها غنية تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . فروجها دقيقة متباعدة رطبة متفائلة الانتعاش تكسوها اوراق حرشلية مدهية مرصعة .

١٦٠٨٦ - صَحْبِيَّات ، صَحْبِيَّات

Sphagnaceae (S). Sphagnaceae (F). Sphagnaceae (E). فصيلة نباتية من الطحالب اجناسها والوانها قليلة العدد جميعها اشباب ممررة متجمعة تكثر في القرب وتعد باعضائها المنسلعة .

١٦٠٨٧ - صَحْمَاء

الصماء بقلة (السان) .

Jaune terne (F). صَحْمَة

١٦٠٨٨ - صَحْمِيَّات

Leptotrichaceae (S). Leptotrichaceae (F). Leptotrichaceae (E).

فصيلة من البكتريات تتميز بكتلها الاسطوانى المستطيل . خلاياها مغلقة ، وسية الانحاء ، عمودية الانقسام . اجناسها وانواعها عديدة لكن علاقتها بالاقتصاد الزراعي لا تتجاوز بعض الاضرار النباتية .

Sole - صَحْن

هي الصفيحة القرنية الباطنية السفلى من الحافر عند الخيل والبقال والحير .

Cavité coxale (F). صَحْن الحَرْكَة

Coxal cavity (E). هو موضع اتصال الحركفة بالخرق .

١٦٠٩٢ - صَحْنَة ، صَحْنَة ، صَحْنَة

Tympan (F). Tympanum, Ear-drum (E).

تجويف الاذن حيث نصب وبتر النشاء الغتان المعروف بالنشاء الطبل .



صحب



صحيفة



صَحْن اُروِيَّ

Placuna (S).

١٦٠٩٤ - صَحْفَة

Placuna (F). Placuna (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صليسيات الخياشيم ونصيلة المحاريات . انواعها المأمرة الممرقة خمسة ، اصلها تمتد من شابلو الخلق العربي الى الهند فالصين || لصدافها كبيرة لانظامية الشكل ، لاقسيات المضارع ، مساربها ثلاثة الاضلاع ، ورقية الاصداف الشبه شفافة ، نغولية النشاء الداخلي || اصفاها شائعة الاستعمال الصناعي .

Feuillet foncier (F). صَحْفَة عَقَارِيَّة

Landed leaf (E). شهادة يحررها امين المكتب العقاري موثق بها كل ما له علاقة بقطر معين كالساحة والحديد والمشتلات والارتفاع والاهين والاربن .

Lamelles, Lamellaire (F). صَحْفِيَّ

Lamellar, Scaly (E). شكل من الزباني ينتمي بفاصل صمغية رقيقة مسطحة .

Bombycilla (S). صَحْفَاد

Jaseur (F). Waxwing (E).

جنس طير من فصيلة الصغاديات ورقية الجوانم غرطيات المنقار . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها متوسطة القد ، ريمية الجسم . مثالها قصيرة غرطية الشكل ، مستنة الاذنك العليا ، عانة السيل . اجنسها ذلقة . اذانها متوسطة الطول ، مقلوبة . اصباها قوية . رؤوسها متوجة طررس من القريش التام المتسرل الى الوراء || افهر انواعه الصغاد الاروبي والاسيوي والامريكي .

١٦٠٩٨ - صَحْفَاد اُروِيَّ

Bombycilla garrula (S). Jaseur d'Europe, J. de Bohême (F). European Waxwing (E).

نوع من الصغاد . موطنه يشمل جميع مناطق اوروبا الممتدة الحارة وبض مناطق الشرق الاطل || جسمه ريع القامة يطول نحو ٢٧ سم . ثوبه الى الريدة الصبانية تتركب عنه الظهر والجيشن وقشر عند البطن . ذوره وجهته الى السرة السوداء . جناحه اسود اللون يجمع بالابيض والاصفر والاحمر . ذنبه اسود اللون ، اصفر الطرف المنطوم || وهو من الصغاد التي تهجر البلاد في طلب الرقة والمصيف والشتى . يالفت الفنايات والكروم . قوته الاشرار على اعتلات وانواعها وصالها واثيرها الهامة ونها الحب || يدن حقه في الاشجار الداسية على ارتفاع قليل لا يتجاوز عشرة اقدام من سطح الارض . الاثنى قطع من ٦ الى ٧ يمشات تحسبها بنوبة الذكر نحو ١٤ يوما .

Bombycillidae (S). صَحْفَادِيَّات

Bombycillidae (F). Bombycillidae (E).

فصيلة طير من الجوانم غرطيات المنقار . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . موطنها يمتد من البلاد الاسيوية الى الاوروبية والامريكية || تتميز باجسامها الربعة وبطريها المتسرلة الى الوراء وينتاجها غرطية المستنة الاذنك العليا || افهر اجناسها الصغاد .

١٦١٠٠ - صَفَاةٌ

Lithogénésie (F).

Lithogenesis (E).

هو شقان أقرع من القطور المهرية الشترانية التي
تركب الزروع.

الصفاة علم يبحث في العال وللوجبات التي هيئت على
تكوين الصخور.

١٦١١١ - صَفَاةٌ

Chant des oiseaux, Gazouillement (F). Chirping,
Warbling, Tittering (E).

صوت الطائر. صبح الطائر: صبح وفرد وتفرق.

١٦١٠١ - صَفَاةٌ : الصوت : صوت الماء والصدر.

Roche (F). Rock (E).

١٦١٠٢ - صَفَاةٌ : كتلة خضراء وسيدة اللؤل من الحجر. والصخر في العرف
البادي يطلق على كل مادة صلبة تدخل في تكوين التلالف
الأرضية. أما في العرف الجيولوجي أي الحسلي الذي لا
يتميز الصلابة شرطاً لازماً ، فالصخر يطلق على الرو
والحجر الجيري والزلزل والصلصالي || وقد تقسم الصخور
حسبياً ونسبة إلى تكوينها الطبيعي إلى ثلاثة أقسام :
(١) الصخور النارية وهي الأصلية أو المتبلورة التي
تكونت من مواد معدنية مصهورة تصلبت بالبرودة كالصخر
(البرلت).

(٢) الصخور الرسوبية وهي الثانوية التي نتجت من تراكم
وتماسك فائت وذرات الصخور الأصلية مع مختلف المواد
الحيوانية والنباتية كالحجارة الجسية.

(٣) الصخور المتحولة وهي التي كانت في أول أسرها
أما نارية أو رسوبية ثم تحولت بتأثير عوامل طبيعية خاصة
إلى حالة بيرة جديدة كالرنام.

١٦١٠٣ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Rocher (F).

Steep, Crag (E).

كتلة من الصخر. ج صخر وصخور وصفاة وصفوات.

Pétraux (F).

Stonellike, Petrosal (E).

لنت تعريفي يطلق على ما هو من الصخور أو يشبهها.

١٦١٠٥ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Empetraceae (S).

Empetraceae (F). Empetraceae (E).

نصلية نباتية من ذوات الملقنتين، أجناسها ثلاثة وأقوامها
خمس. لباقتها جنات وأشباب مصرة. تثبت بين الصخور
وفي الأماكن القاحلة.

١٦١٠٦ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ ، صَفَاةٌ ، صَفَاةٌ

Empetrum nigrum (S). Empetra, Camarine, Cam-
rigne (F). Crowberry, Black-berried heath (E).
Echte krahenebeere, Ranchebeere (D). Empetro,
Erica bacclifera nera (I).

بيلة بيرة طيبة مصرة وسيدة الجلس والنرج من نصلية
الصخريات ، منها جبال البلاد المظلة المنرفة نحو
البرد . ماثيا منسبة تلوح نحو ٣٠ سم. أوراقها أبيضه ،
غنية ، صغيرة القد ، ضيقة الفصل || ازدهلوا حرار
اللون . ثمارها مأكولة لوردة الشكل ، عابقة السوداء ،
حازمة القلم ، مضادة لداء الحفر ، قدر البيل وتضع
في علاج بعض الحيات.

Brûler (poêle) (F).

Roche-mères (F).

Basie-rocks (E).

١٦١٠٨ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Rouille (F). Ruz (E).

١٦١٠٩ - صَفَاةٌ : مادة ميكروية القرات جزوية اللون حمراء المالح تتكون
على سطح الحديد من حمراء تعرضه لطرية الهواء حيث
يصد الأكسجين ولله مع الحديد.



صَفَاةٌ

١٦١١٢ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Bee-fins (F). Warblers (E).
وتسمى الطيور الصفاة. طيور مفيدة من الجائهم وفضيلة
الغنليات.

١٦١١٣ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Lusciniole à moustaches (F).

طائر من الجوازج يلقى لهذكة ، الحلبا.

١٦١١٤ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Tokai

هو الزنقة ، الحلبا. ج صفاة.

١٦١١٥ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Prolétariat (F). Proletarianism (E).

حالة الذين لا يستعملون الأثرال إلا بواسطة علمهم.

١٦١١٦ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

شجرة ثمرتها أشد حرة من العنب . (اللسان).

١٦١١٧ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ ، صَفَاةٌ

Poitrine, Thorax (F). Chest, Thorax (E).

جزء من الهيكل العظمي يحضن القلب والرئتان يقع بين
المتن وعضل الصدر. وهو تقص عظمي غربي الشكل
يتكون من عدة خلوع بقية متحدة الأطراف.

١٦١١٨ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

الصدر نجم ثير من كوكبة الدجاجة.

١٦١١٩ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Céphalothorax (F).

Cephalothorax (E).

الصداس إتمام الصدر بالرأس في جزو واحد كما هي الحال
عند بعض العنبريات كالمتاكب.

١٦١٢٠ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Pectoral

لنت رسي يطلق على كل ما له صلة بصدر الحيوان.

١٦١٢١ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Faïlle (F). Faute (E).

١٦١٢٢ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Tempe (F). Temple (E).

ما هو من الرأس ما بين العين والاذن وهما صفاة.

١٦١٢٣ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Coquillage, Mollusque testacé (F). Shell-fish, Testa-
ceous mollusc (E).

حيوانات في البحر من القشريات الحشرية. ج أصداف
وأصداف.

١٦١٢٤ - صَفَاةٌ : صَفَاةٌ

Conque, Coquille (F).

Conch, Shell (E).

ج صفاة. خطاء ضوي ثلاثي اليلقات صلب للمادة
يلطف أجسام بعض الرغويات. داتة مركبة من كرويات
الكليوم ، أما طبقات الثلاث تصرف بالتحاريرية المزرقرة



صَفَاةٌ

الجزر فيضمه ويؤذي || مظهره الخارجي بنور صغيرة مستديرة متناهية مَرَامَة حلالية التجميع تقريبا اللون ثم تنصرف نحو الجلود تركب السوق والأوراق والمنايق القزمية || يكالغ بتطهير التربة ويحيد القبار وبانتساب تكرار الزراعة في الحقن نفسه .

١٦١٣٥ - صَدَنِيَّة الجِرَانِيوم

Uromyces geranii (S). Rouille du géranium (F).
نظر مجهرى يصيب أوراق الجِرَانِيوم فيضها . مظهره الخارجي يقع صغيرة قليلة الاستدارة والكثافة تركب الأوراق، لونها ال الفقرة الباقية ويلجوا حواج آخر يشو الأوراق بتفجير بشره نصلها ثم يقودها ال القليل . يكالغ بانتزاع الشغل الموصلة وتطهير التربة بالكلس والكبريت بمعدل ١ الى ٢ .

١٦١٣٦ - صَدَنِيَّة الرُّمَاحِ

Uromyces rumicis (S). Rouille des rumex (F).
نظر مجهرى يصيب أوراق الرُّمَاحِ فيضها ويجعلها غير صالحة للاستعمال || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة لثوب حلالية اللون ثم تنصرف نحو الكسنتالي تركب لثوب الأوراق حل صفحتها || اضراره قائمة على مدى انتشاره لان الأوراق الموصلة لا قيمة لها || يكالغ حين ظهوره بسائل بورديو الحلبي ١ % .

١٦١٣٧ - صَدَنِيَّة الحِمَصِ

Uromyces pisi, Aecidium euphorbiae (S). Rouille du pois (F).
نظر مجهرى يصيب الحمص والبرسيم || مظهره الخارجي يقع الحمص يقع صغيرة كثيفة التجميع تركب النصل على صفته النصل . تبدو صفراء اللون ثم تنصرف نحو المحلطي فالاحمر ويفرغ منها اذ ذلك رائحة كريهة يمتصها الفجار البشرة ظليل النسيج والكلس يسقط الأوراق . وهو حل القزبيين يقع صغيرة ميمرة بدون انتظام تركب الاثنتان تقسب لها الارامم والشفلة مع قشر الأوراق وصاكة النصل . وهو حل الأوراق اوضح شكلا واكثر توشيحاً . يركب النصل على صفحته وقد يفضل العليا . يفرغ منه عند كمال دوره الحياتية ، اي عند تفجير الجيوب الباقية ، رائحة حلوية مستحبة لا تنصل الحمص وان حصرت فسمت والفطيل الى كرية || يكالغ بالكلس القوية وبسدسها مع الاكثر من عصر الازوت .

١٦١٣٨ - صَدَنِيَّة الدَّكْشِيل

Uromyces dactylidis (S). Rouille du dactyle (F).
نظر مجهرى يصيب جميع انواع وضروب الدكشيل فيلوي الأوراق ويميتها || مظهره الخارجي بنور صغيرة مستديرة لونها الى المفرة ميمرة بدون انتظام او مرسوفة يتناقص وتناسق . نصل ثوب الأوراق تقسب بياها بعد احملا غصبي . يكالغ بالقتلح النباتات الموصلة وتطهير التربة قبل اعادة بلوها او غرسها .

١٦١٣٩ - صَدَنِيَّة الشَّوْكَر

Uromyces betae, Aecidium betae (S). Rouille de la betterave (F).
نظر مجهرى فنج الشبوع يركب أوراق الشوكر فيلويها . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة تحمل بالاوراق النصل وتنتشر حل صفته النصل السفل ميمرة بدون انتظام . لونها الى الجلود || اضراره قليلة لانها محصورة بتفجير وبذيل الأوراق السفل التي تضاعف نشاطها الحيوي .

والنصل الاساسية ثم الداخلية الصدفية البراقة المساء . والصفحات حل لويين : الصفحات ذات المصراعين كما في الحار وي فيضية الشكل ، مربوية المصراع ، رباطها شفروري التكون ، يلفض حوضاً مملأ يضي القليل وظيفته اقترار المادة الصدفية || والنوع الثاني يشمل الصفحات الحلزونية التي تتميز بظلماتها واعادها المتنازعة المربعة بتطوط واعادها النور .

١٦١٣٥ - صَدَنِيَّ

Ostracod (F). *Oysterous* (E).
نمت تعريف يطلق على ما هو صدفى التركيب او الشكل .

١٦١٣٦ - صَدَنِيَّ الجِلْد

Ostracoderme (F).
نمت تعريف يطلق على كل حيوان جلده صدفى المادة .

١٦١٣٧ - صَدَنِيَّات

Ostracodes
رتبة من القشريات الحشرات الصف .

١٦١٣٨ - صَدَنِيَّات الجِلْد

Ostracodermes (F).
فئة من الاسماك المتحجرة ظهرت في الحقبة السيلورية وانقرضت في الحقبة الكربونية .

١٦١٣٩ - صَدُونِيَّة

Impénétrabilité (F).
مجم قابلة للتدخل .

١٦١٤٠ - صَدُونُ ، شَدُونُ ، كَتَم

Crevasse (F). *Chape* (E).
مواضع وشواطئ تحصل في جلد اسراخ الغراب والبر وني حلاء سوق النبات تقسب تصداعها وتشققها .

١٦١٤١ - صَدَنِيَّة

Uromyces
جنس تطور مجهرية من فصيلة السحابيات يتميز بدهاناته الوحيدة الحالية || انواعه عديدة تركب النباتات المختلفة المائلة الى القزليات والقزليات والشمليات والسرقيات والقزليات والبسبابيات والشمليات .

١٦١٤٢ - صَدَنِيَّة الإِسْكِيل

Uromyces scillarum (S). Rouille des scilles (F).
نظر مجهرى يصيب بعض نباتات الفصيلة القزمية اصحاب الاشقل والمحلل || مظهره الخارجي طلع قدية لا قياسية الشكل والحجم ، تلو الأوراق والانسلاط الخارجية . تبدو حلوية ثم تنصرف نحو الجلود وتضي بالمره عند انفجار بشره النسيج || يكالغ بتطهير التربة بالكبريت والكلس او القرموط بعد التلاح وصرق النباتات الموصلة .

١٦١٤٣ - صَدَنِيَّة الثُّوم

Uromyces ambiguus (S). Rouille de l'ail (F).
نظر مجهرى يصيب الثوم بلوراته وزياده الزمري . مظهره الخارجي يقع صغيرة لا قياسية الشكل والحجم ، تركب الأوراق تلوها بعد ان تقضي على الخصب فيصبح النصل حاد اللون || وهو حل الزناد يقع قزمية كسفائية يحيطها اطار ، تقلس غصبي ، لونه كالتين . يستحسن اجتناب تكرار الزراعة في ذات المكان الموهر .

١٦١٤٤ - صَدَنِيَّة الحَمْر

Uromyces lincolns, U. scirpi (S). Rouille de la carotte (F).
نظر مجهرى يصيب بعض نباتات الفصيلة الحامية اصحابها



صدنية الاشقل



صدنية الثوم



صدنية الجزر



صدنية الجيرانيم



صدنية الحماض



صدنية الحمص



صدنية الشوكر



صدئكة الفول

١٦١٤ - صدئكة الموز * *Uromyces musae* (S).
Rouille du bananier (F).
نظر مجهري يصيب الموز في أفراته || مظهره الخارجي
يظهر حمية الشكل والحجم، تركيب النسل حل صفته
السفل. تبدو حمية اللون ثم تتحول نحو الجوزة السوداء.
أضراره زرة لا تستجيب للمكافحة.

١٦١٤٦ - صدئكة التفاح

Uromyces trifolii, *Aecidium trifolii-repentis* (S).
Rouille des trèfles (F).
نظر مجهري يركب جميع أنواع التفل الرطبي والبري.
مظهره الخارجي يقع حمية قليلة مميزة على صفته النسل
العليا. تبدو صفراء اللون ثم تتحول نحو البني الكستالي.
وهو يصيب لا يستجيب للمكافحة لانه يسلط النبات على
التمور وازدياد المحصول الورقي ولكنه يذو نسبة الكروتين
نحو ٢٠٪ مما يؤدي الى انخفاض حيق القيتامين ٥٠٪.



صدئكة القرنفل

١٦١٤٧ - صدئكة
الصدى كوكب مرصفي سيار اكتشفه وفريون * عام
١٨٦٠.



صدئكة القرنيز

١٦١٤٨ - صدئكة
هو الصوت الناتج من انعكاس صوت أصلي على سطح
عاكس.



صدئكة الفرياء

١٦١٤٩ - صدئكة
جاء في تحديدها : سمكة طويلة سوداء (السان).

١٦١٥٠ - صدئكة * أم السهره أم قوتق
Athens noctua, *Cariss noctua* (S). *Charvêche*, *Charvêche communis* (F). *Little owl* (E).

طائر من البويات وممرات العنايات. روج الحجة صليها.
طول نحو ٢٣ سم. منزه قوي الانعقاد. حاد البعرة.
سقطه وذنيه صغيرة مستديرة. أرساغه كاسية || غشاه
مدنية حادة، لونه الى الريفه المنشد بالارد || موك
فسح الاربعه يسم جميع البلاد المنشد الحارة. يالغ
الاجراع وينش في منوع الانجار الصبانية وفي الغراب
والاقلاد. اثناء قطع نحو ه يضايت تحسبها ١٦
الى ١٨ يبي || وهو من الراس يلمس كوك من
الغرب الى القبر، يصيد الجرد والذباب والجملان
والجراد.



صدئكة الموز

١٦١٥١ - صدئكة
هو قيق الفروح والجيف الباردة الى الاعلول المصوي.



صدئكة النفل

١٦١٥٢ - صدئكة
حليب وضع فريد نكهة البولية وهي القشرة الرقيقة حل
ويجبه.

١٦١٥٣ - صدئكة * قيق
Gailf (F).
Frost-delf (E).
نمت حال توصف به الانشاء القلوية أو القابلة للانصاع
والقلع من تأثير فعل الصقيع فيها.



صدئكة

١٦١٥٤ - صدئكة *
Pissurella (F). *Pissurella* (E).
جنس حيوانات بحرية من الغرويات مديات الاصيل
امليات الشمام الحبيطة وصبلة الصدبيات. أنواعها

يكتفح بقطع وطير الارواق الصابة وباجنجاب اخل
لبلار من الامهات الموصية.

١٦١٤٠ - صدئكة الفستق
وم فطري يحترق الفستق (اطلب ايرويس).

١٦١٤١ - صدئكة الفول

Uromyces fabae, *Aecidium album* (S). Rouille de
la fève (F).
نظر مجهري يصيب عدة نباتات من الفصيلة القرنية،
انحصها الفول ونها البقية والجلبان والبقلة والكزسة.
مظهره الخارجي يقع صفرة مستديرة مميزة حل صفته
النسل تبدو صفراء اللون ثم تتحول نحو الشفرة
السراء، وقد يصيب السرق والمالين نبات الفول.
يكتفح عند ظهوره اما باستعمال سائل يورود الحليل ١٪
أو غيره من الفوطير الفعالة اللاكوية.

١٦١٤٢ - صدئكة القرنفل

Uromyces caryophyllinus (S). Rouille de l'aillet (F).
نظر مجهري يصيب القرنفل في جميع فصائل البتة ليلب
الاوراق ويظهر التمو ويؤدي الانزهار والازهار.
مظهره الخارجي يقع صفرة بضية الشكل بنية اللون
تركب نسل الاوراق حل صفاتها العليا تقسب لتجبر
بشرة النسيج وتقرنل العورة النضية ان لم تحل دين انجازها
وبيرها الطيبي.
يكافح اولاً : باجنجاب ريش الماء حل الاوراق لان الماء
يكن نشاط اللطع ويهيب انتشار اليرص.
ثانياً : بانتزاع يسرق الاوراق اللابطة والياينة مس
القول اللارية.
ثالثاً : ينسح النباتات للصابة بسائل يورود الحليل
١٪ أو يسلط بمسحات البزاس أو غيره من املاح النحاس.

١٦١٤٣ - صدئكة الكرتينيات

Uromyces anethidis (S). Rouille des légumi-
neuses (F).
نظر مجهري يصيب بعض النباتات القرنية سبا القرنية
والكرس والفسحة والخنفوق والحلبة والفلوس والامروس.
مظهره الخارجي يقع مستديرة صغيرة تركب نسل الاوراق
حل صفاتها العليا تبدو مميزة بين انتظام || لونيا
الى الشبهه ثم ينصرف تدريجياً نحو الكستالي || أضراره
زديدة. يكثر ويبدو في بلاد حوض البحر المتوسط وفي
اروبة الشرقية والغربية.

١٦١٤٤ - صدئكة البوسياء

Uromyces appendicatus, *U. phaseoli*, *Aecidium*
phaseoli (S). Rouille du haricot (F).
نظر مجهري يصيب معظم انواع وضروب البوسياء.
مظهره الخارجي يقع لا نياية الشكل والحجم تطور نسل
الاوراق فتوحها برقشة لا متجانسة الكثافة تبدو تلبية
اللون ثم حمية لسراء، تؤدي الاوراق تقسب بظاهها
وصغرطها الباكر || وهو حل القرون يقع قرنية نط
نبا الاسادة تقدي حل الانسبة الليلية دين ان نصل
الى الحب || يربطاته بضية لشكل طويلا يراوح من
٢٢ الى ٢٥ م. يرضها من ٢٠ الى ٢٣ م. || يكتفح
باستعمال اركسيكلوربر النحاس تقدياً حل النبات يمد
العصر صفحا تحف وطاة اشمه الشمس.

١٦١٦٥ - صِرَاكِي *
Orographique (F).
Orographical (E).
نبت ترفني يطلق على ما له علاقة بالصراة أي وصف الجبال.

١٦١٦٦ - صِرَاو
Achète (F).
اسم يطلق على جمع الحشرات الصراصة اخصها الجديد والزيز.

١٦١٦٧ - صِرَاو اللَّيْلِ هو الجديد، المطبخ.

١٦١٦٨ - صِرَاوَكَة
Circaetus (S).
Circaète (F). Serpent eagle (E).
جنس طير من عائلة السقاوت وفصيلة الصقريات .
أنواعه ١٢ ، موطنها جميع المناطق المعتدلة من العالم القديم .
اجسامها رفيقة متوسطة القتل من ٥٥ الى ٧٠ سم .
ويصلها تراوح من ١٢٠ الى ١٨٠ سم . ورونها كبيرة ،
اعتناقها قصيرة ، مناسرها قوية البهرة الليرة الحادة .
ارسلها سرحة ، غالبا دقيقة الاطراف الحادة || اثوابها
كدراء اللون يملوها توشم لطيف حاقق ، صدرها وبطنها
الفتح وانفي من ظهورها وسوقها || تألف الجبال
والاخراج ويجاري الماء والادخال والبروج والنباتي . قوتها
الزسلمات من العطاء الى الانثافي والصفادح والاسماك
والصافير والحشرات || كتن اوكارها الى الانجار
والادخال . انثا تضع من رطبتين الى ثلاث رفقات
تحضنها بمناوبة الاكور نحو ٤ اسابيع || اشهر انواعه
صرارة المتوسط .

١٦١٦٩ - صِرَاوَة الْمُتَوَسِّط * ، أَبُو صَوِي
Circaetus gallicus (S). Circaète Jean-le-Blanc (F).
Short-toed eagle (E).
نوع من الصراة كبيرة الجثة طولها نحو ٧٠ سم . ويصلها
١٨٠ سم . ثوبها الى الربة السماء تعلوها بقعة مائلة .
زورها وبطنها وبخوابها الى البياض الاخر يملو تهبج
اسمر . منسرها الى الزرقعة السوداء . حينها الى الصفرة
اللامعة . رسلها واصابعها تلبية اللون ، غالبا سود .
ويحي من الطيور القواطع تجوب البلاد رنحوم فوق الماء .
تألف الجبال والاحراج والمناقع ويجاري الماء والسهول
والشواطئ || قوتها الانثافي والظاء والصفادح والاسماك
والصافير .

١٦١٧٠ - صِرَاكِيه *
Sauropodes (F).
Sauropoda (E).
الصراعية رتيبة من الزحافات المنقرضة ، الناصير ،
جميع اجناسها وانواعها جبانة ، وبهاية القوائم ، عايشة ||
ظهورها يمد الى الخفية التراسمية . وقد بلغت ارجح انتشارها
في الحقبة الجورية . وانتقرت في الطباقيرية || اشهرها
المرصد الجبلي (Atlantosaurius) الذي كان طول
جسمه لا يقل من ٤٠ مترًا ، ثم الصرود الصخري الرأس
(Brontosaurus) الذي كان طوله من ٢٠ الى ٢٢ مترًا .

١٦١٧١ - صِرَاكَم ، صِرَاكَم
Cueillea (F).
Gathering (E).
هو جنس الثمر في اوان أدراكه .

١٦١٧٢ - صِرَاكَن ، حَكَاكَة
Serranus (S).
Serran (F). Serranus (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرايات ذرية شاككات

المعرفة قليلة العدد . اصطلحوا على تسميتها بحار العالم تعيش على
حضور المهادج || اصطلحوا تسمية الشكل مصنوعة القمة .
وصدورها التي تسمح بمرور الماء اللازم للتنفس ، تسمح
ايضا بخروج البراز . اجسامها مستطيلة الشكل . ورونها
مقطوعة القمم . حينها تتركز عند قواعد القوائم الخروطية ||
عيالها مشطية في القسم العلوي . اوريثها ضففاة
تنتد خارج الاصداق . انبساطها وسيفة مستعرة وميمكة .

١٦١٥٥ - صِدْبِيَّات *
Fissurellidae (S).
Fissurellidés (F). Fissurellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الاربع
امامات الخياشيم الجحفية . اجناسها وانواعها المعرفة
عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية والثالثة
والبيض الآخر من صلح بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة ||
اصداقها وحيدة المصارع يومية الشوئن او مستعرة ،
معتلة الاسفداب ، مصنوعة القطن ، يكثر في صدورها
الشكل المسطلي || اشهر اجناسها العاصرة الصلمية
والحبيونة .

١٦١٥٦ - صِرَّ
Empaquetage (F). Packing (E).
جمع الشيء وشدته وتقليبه .

١٦١٥٧ - صِرَّ
Tichodroma (S). Tichodrome (F).
جنس طير من فصيلة المتقلات . انواعه قليلة تتميز
باعتدال المنظر وبهذه ، بذلاقة الجوانح ، بقصر الارباع
وبخفلة صغر الخالب الحادة . اثوابه عديدة تحفظ مع
الانواع وضل البسة . تألف المناطق الصخرية الجبلية .
ينثر من الانهار . قوته الحشرات والتمك . يئن حقه
في صرلح المنخور . اناله تحضن وحدها من ٥ الى ٧
بيضات نحو اسبوعين وذلك في شهر ايار . احرف انواعه
واشهرها صر المنخور .

١٦١٥٨ - صِرَّ الصُّخُور *
Tichodroma muraria (S). Tichodroma de muralles,
Echelette (F).
نوع من الصر . ثوبه متراكب الالوان المنقطة المنقطة
الجبلية . طولها نحو ١٧ سم . ويصلها ٣٠ || تألف الجبال
الصخرية الجرداء . يكثر في صرود لبنان مشاء الادوية
السبية والمغالب الصخرية .

١٦١٥٩ - صِرَابِي
الزعر ينثر في الخريف يمه اول مطر .

١٦١٦٠ - صُرَاوُج
Pur (F). Nez (E).
الحاصل من كل دس او فوش . يقال فخر صرلح وزيت
ذيتن صرلح .

١٦١٦١ - صُرَاوُج
الصرلح طائر يؤكل (صحت المحيط).

١٦١٦٢ - صُرَاوُجِيه
هي الدجاجة تجسبل لحظ الحمر .

١٦١٦٣ - صُرَاوُك
صاحب بارود ندي ليس فيه ماء .

١٦١٦٤ - صِرَاكَاكَة
Orographie (F).
Orography (E).
علم يبحث في وصف الجبال وتجليتها .



صلبة



صر المنخور



صرارة المتوسط

١٦١٧٨ - صُرَّاب ، صُرَّاب (F).
Lak callé (F).
اللبن الرائب إذا اشعلت حوته .
Curdled milk (E).

١٦١٧٩ - صُرَّاب (F).
Gomme d'acacia, G. rouge (F).
صمغ القزط والطلع والحمرط بني حر كآبها سبالك
تكرس بالمجبرة .

١٦١٨٠ - صُرَّابَة هي الثنواء ، انطبا .



صُرَّان كَاتِب

١٦١٨١ - صُرَّابِيَّة
Sorbina
مادة غلاية لا طعم لها تراقق السكر لكنها عادمة للقودور
التسليط . وهي توجد في معظم بلاد المأكولة وسينها تراوح
من ٥ الى ١٢٠ غرام في الكيلو .

١٦١٨٢ - صُرَّابِيَّة
Serjanie (S).

Serjanie (F). Serjanie (E).
جنس جلبات سرية عارضة من فصيلة السابنديات ، أنواعها
المعروفة نحو ١٠٠ مظهرها من لبوت أمريكة الاشترالية
والبيض الآخر ينبت في جزر المحيط الهادي ويشمل الهند
سطها سرية . أوراقها متعاقبة ، مركبة ثلاثية التجميع .
نصلا مسنة الحراشي ، غارة الفلر والبرق . أنزاعها
أبيض اللون الكزكاز ، عضوي التجميع . ثمرها جناحية ،
ثلاثية التركيب .

١٦١٨٣ - صُرَّابِيَّة
Bryum (S).

Bryon (F). Bryum (E).
جنس طحالب ممررة من فصيلة الصرغيبات . أنواعها
المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم . تعيش
على الصخور وفي التربة . أكيامها البورية حقة لشكل
طرية الارتكاز .



صُرَّابِيَّة

١٦١٨٤ - صُرَّابِيَّة
Bryncos (S).

Bryncos (F). Bryncos (E).
فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السبديات .

١٦١٨٥ - صُرَّة ، صُرَّة
Cold (grand) (F).

Cold (excore) (E).
هو البرد الشديد .

١٦١٨٦ - صُرَّة ، صُرَّة
Eplar (F). To oer (E).

صرد التسع والشمس . طلع سناما .

١٦١٨٧ - صُرَّة ، صُرَّة
Lanuis (S).

Pie-grèche, Piegracher (F). Shrike (E).

ج صردان . جنس طير من الطيور وفصيلة الصرديات .
أنواعه ١٨ ، موطنها بلاد الشام القديم . جميعها يقام
الشب . فضة الرأس . منقوشها خفيفة مسنة الخاطم
المزودة . سواقلها متصلة الطول مجلعة . أذنابها زائجة
الريش . أرسافها جسيمة الجلد . غلاية عادة . لا ترى
الأ في سفة أو فجرة وهي شرسة الطباع ، ثقلة ، شديدة
التنوير . قوتها الحشرات والديدان والافاعي والسماتير .
تتغذى في الأشجار الغناء . ألتها تنبع من ٤ الى ٧ بيضات
تحضنها وسعها نحو أسبوعين .



صُرَّة أُرْدِيَّة

١٦١٨٨ - صُرَّة أُرْدِيَّة ، صُرَّة الجَلَايَة
Lanuis excubitor (S). Pie-grèche gris (grande),
Bolsaltière (F). Great grey shrike (E).

نوع من الصرد الأبد الشائع . يتر من الطيور الفسارة .
طوله يراوح من ٢٣ الى ٢٤ سم . نوبه الى البرقة الضللا .

الزنايف . أنواعه المعروفة نحو ١٢٠ مظهرها من املاك
بحار المناطق الحارة - اجسامها اعليجية الشكل ، متصلة
القد أو صغيرة . ألوانها مختلفة الألوان يكثر فيها الاصفر
الاجر الملح يملو تجليج متفرق لاقاسي الانتظام والالوان
سدها مبراشة الشكل : زانفها الظهيرة شاذكة في الجزء
الامامي ، سرسة في الجزء الخلفي || بعضها يبر اغوار
الانهار ويبر في المياه العذبة || طوبها بين المتوسطة
الصنف والجمدة || أشهر أنواعه الصران الكاتب والصران
المجج .

١٦١٧٢ - صُرَّان جَبَّار
Serrus géant (F).

سمكة بحرية بيوض تدعى لقس جبار ، انطبا .

١٦١٧٤ - صُرَّان كَاتِب ، صُرَّان صُرَّابِيَّة
Serranus scriba (S). Serran écriture, Serran
scribe (F). Serranus scriba (E).

نوع من الصران . سمكة بحرية بيوض . اصطناعها
واضوح واغوار البحر الابيض المتوسط || جسمها
اعليجي الشكل ، مستدل التيطيط ، يطول من ٢٥ الى
٣٠ سم . نوبها متراكب الألوان يركز على الاصفر
الحظي . رأسها وظهورها مجلجان بالاسمر . جانبها مشعان
بالازرق والكتني . زانفها مضربة بالاجر . رأسها يرمي
الشكل قصير الخط . شفقها قليل الرطبة . عيناها صغيرتان ||
زانفها متباعدة الأشكال . الظهيرة مسطبة ، شاذكة
النصف الاول ، سرسة النصف الثاني . الشرجية تقابل
الشم السرح من الظهيرة . البلية مقوسة الطرف المنحوب ||
طوبها متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٧٥ - صُرَّان صُبَّج ، صُرَّان صُبَّج
Serranus hepatus (S). Serran maculé (F).

Serranus hepatus (E).

سمكة بحرية بيوض من الصران . اصطناعها واضوح وظلجان
البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير القد ، اعليجي
الشكل ، مستدل التيطيط يطول من ١٨ الى ٢٢ سم . نوبها
يرتكز على الاصفر الاخر الحظي المواج . رأسها وظهورها
مضجان بالكتني المايق . جانبها مجلجان وبغلمان بالاجر
والازرق . زانفها مضربة وبنيبة منتظمة . رأسها غمريلي
الشكل ، ذلي الخط . شفقها قليل الرطبة . عيناها كبرتان ||
زانفها متباعدة الأشكال كما في الصران الكاتب || طوبها
متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٧٦ - صُرَّابِيَّة
Serranidae (S).

Serranidae (F). Serranidae (E).

فصيلة املاك بحرية من رتبة شاذكات الزنايف . اجسامها
وانواعها المعروفة نحو ٥٥٠ جميعها من املاك بحار المناطق
الحارة والمعتدلة الحرارة . تتميز بحيدة الصبح وبقلة اصباحها
من المجامد والمجلجان والاضواح || اجسامها اعليجية
الشكل ، لأقياسها الطول الذي يراوح من ١٥ الى ٣٠٠ سم .
حراشفها مبراشة عشة متساكة الاطراف ، زانفها
الموضعية مداسية الاضعة المرتفعة بالمتنقاء شامع واحد جامد
شالك . اسنانها الفكوية والحكيمة منتظمة الصفوف المتباعدة
اثير اجناسها الصران واللاتياس واققس والقياب .

١٦١٧٧ - صُرَّابِيَّة المختلط اذا اصفر .

١٦١٩٧ - صَرَر

الصرر: الزرع نصبت موه وأكملت مثابه دون حبه .
الواحدة صررة .

Coq (F). Cock (E).

١٦١٩٨ - صَرَصَر

هو الديك ، اطلبه .

Scymnus iltchii (S).

١٦١٩٩ - صَرَصَرَكَن

Liche, Gatta (F).
سمكة بحرية وسيدة الجنس والنوع من السمكيات ، تلوذ نحو ثلاثة أمتار . جنبها اسطوانية الشكل ، دقيقة المخز ، كبيرة الزمطية الفرجية . ثوبها الى السمرة الزرقاء المولج يملؤها تجلج اسود . جلجها عادم الفلوس شائع الاستعمال الصناعي . لحمها مأكول .

Cri du milan (F).

١٦٢٠٠ - صَرَصَرَكَة

Cry of the kite (E).

صوت البازي .

١٦٢٠١ - صَرَصُور

حشرة مملوكة تعرف ببلت وردان ، اطلبها . منها الأمريكية والجرمانية والشرقية .

Epilepsy (F). Epilepsy (E).

١٦٢٠٢ - صَرَع

جلسة عينية في الجهاز العصبي تصيب الحبل . تعرف من حصول البيرورة والسقوط على الارض والتشنج في الحبل .

Chrysobothris affinis (S). * صَرَعَاكَة (S).

Chrysobothris complice (F). Chrysobothris affinis (E).

حشرة خاضعة ناعمة من فصيلة الزنبقيات ودية غمديات الاجنحة . تألف الاجراج والنبات والحدائق . خنافسها تعيش على اوراق الاشجار . يرقاتها مرقطة تمش على الاغصان الحمراء تقسودب السماء ولها كسب الشكير . جسمها متوسط القد ، بطول من ١٢ الى ١٦ سم . ثوبها الى السمرة الكستانية يملؤها مزلج اسفع . غمداء ثلاثيا النقر ، خضره اللون عند الذكر ، صفراء اللون عند الانثى . رأسها مستد الجرم . عينها كبيرتان ، ناشزتان . زباناها عيطان ، لمشايها التركيب . فطونها شبه جلوني الشكل ، ذلق المخز ، مقطوم الطرف . غمداء متتابعات التحيز الخفيف . ارباعها خاضعة العقل . الانثى اميز قدًا من الذكر وأكد ثوبًا من والقصر زباناً . جلجها نثالي الحبل . تظهر الحشرة الجبلادة في اوائل ايار وتعيش حتى اوائل آب . تروح في التبار ويبيت في الليل الى الريقة بطقية التوت تطلعي عند الادراك اتمام نحو ٣٠ م . جسمها مستطال المقدم والرأس ، مستدق المخز . ثوبها الى الطلعة .

Aglo, Change (F). صَرَفَ , صَرَفَ , صَرَفَ (F).

Aglo, Premium, Exchange (E).
لقرق بين سر التقد الاسمي وسره المظني .

١٦٢٠٥ - صَرَقَة

الصرقه منزل من منازل القمر الشامية يتزله في الليلة الثانية حشرة . وهو نجم واحد نير ثلقاء . الزبرية غمط بكواكب صفار طمس . وميت صرقه لانصراف الحر والبرد بطولهما . ويند العرب من يسمي الصرقه قلب الاسد . رقيب الصرقه قرق الدلو المقدم .

ظهور هايق المزلج الاسمر . يطله الى البياض الاخير . سقطاه الى السمرة الحامكة المخبية بالابيض الناصع . ذنبه اسود الوسط ، ابيض القاعدة والطرف . . متقاره وسقطاه سود . يألف الرياض والاسراج القريبة من المروج والمراعي .

١٦١٩٩ - صُرَدُ الْجَنْبِ *

Lanius meridionalis (S). Pie-grèche méridionale (F).
نوع من الصرد ، موطنه افريقية الشمالية وشمالى المتوسط . طوله نحو ٢٥ سم . ظهره احملا اللون . سقطاه الى السمرة . ذنبه ابيض الاطراف ، اسمر الوسط . صدره ويطه الى البياض الوردي المزلج . عيناه مكشفتان بالاسود . يألف الغابات والخضاب والمساح والشرائط الصخرية .

١٦١٩٠ - صُرَدُ الْمُتَوَسِّطِ * دَقَنَاشْ شَكَمِي

Lanius senator, L. rufus (S). Pie-grèche rousse (F). Woodchat shrike (E).

نوع من الصرد الجبال يحرب معظم مناطق العالم القديم . طوله نحو ١٩ سم . ثوبه ابيض اللون تكثر فيه الصبغة . يألف الادلغال والحدائق والمروج . قوته الظاه والفرزغ والضفادع ويختلف الحشرات . يبنى في الجنبات الغناء القليلة الارتفاع من الثرة .

١٦١٩١ - صُرَدُ الْغُرَقِ * نُهَسْ

Lanius collurio (S). Pie-grèche écorcheuse, Pie-grèche grise (F). Red-backed shrike, Butcher bird (E).

نوع من الصرد الجبال يحرب أكثر مناطق العالم القديم . طوله نحو ١٧ سم . ثوبه اسمر اللون يبق حتى الظهر ويبيض عند الزور والصدر . خضره الى السمرة القائمة . سقطاه الى السمرة السطواء الخشطة المزلج . ذنبه ابيض الاطراف . يألف الاسراج ويجاري الماء والحدائق والمراعي . وهو شرس الطبع ، ضيق الخلق . قوته الحشرات على اختلافها والديدان والصافير .

١٦١٩٢ - صُرَدُ وَرْدِي * دَقَنَاشْ

Lanius minor (S). Pie-grèche à poitrine rose, Pie-grèche d'Italie (F). Lesser grey shrike (E).

نوع من الصرد الايه . موطنه يمتد من بلاد فارس الى اطراف اوروبا الجنوبية . طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه الى الصبغة السطواء . رأسه اسود اللون . صدره وردي اللون . سقطاه الى الصبغة الخشطة المابقة . يألف الادلغال ويجاري الماء ، قوته الحشرات والديدان .

Terre meuble (F). صُرَدَاك

الصرداد والصرداد والسرادة هي الثرة الية .

١٦١٩٤ - صُرَفَاح , صُرَفَاحَة

Terre délaissée (F). Abandoned ground (E).
الارض الزراعية المهمله المتروكة لا تبت لها .

١٦١٩٥ - صُرَفَاحِي *

Edaphique (F). Edaphic (E).
المسرب الى الصرصح ، اي الثرة ، باختياره ماسك من حوامل البيئة .

١٦١٩٦ - صُرَدِيَّات

Lanidae (S). Lanidae (F). Lanidae (E).

فصيلة طيور من الجوائم المشروبات المتناثر . اجنسها وانواعها عديدة تتميز بمناظرها القليلة ، القوة الجباله ، المسنة الخامل الجباله ، اجنسها متوسطة القد . ثوبها ما تقتضيه من حشرات وديدان وصافير .



صُرَدُ الْجَنْبِ



صُرَدُ الْمُتَوَسِّطِ



صُرَدُ امْرِ



صُرَدُ وَرْدِي



صُرَصِرَان



صُرَعَاة

روشتها الخلفيان سيقان بالازرق ويغضبان والبرتقال .
الانثى سمراء اللون ، روشتها الانثى يحمل بقعة غروية
الشكل ضحلة اللون . روشتها الخلفي يحمل من نقطتين الى
ثلاث نقط صفراء . ريشته تيش على ورق الزعرور
والخوخ البري .



صرمون ابيض

١٦٧١٤ - صرمون السنديان * Strymon ilicis (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم .
الذكر اصفر نقا من الانثى ثوبه الى السرة الكستنائية المولج .
روشتها مسنجة بالابيض والاخر . الانثى سوية الثوب
الاصفر المائل يحمل في طرف كل ريش من روشتها
الخلفيتين نقطة صفراء اللون . ريشته تيش على ورق
السنديان .



صرمون الخوخ

١٦٧١٥ - صرمون السط * Strymon scacis (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٧ سم .
الذكر
حطلي الثوب المحلل الروشن . روشتها زرق الانتقاص
يلوحظ تسليح متفرس ابيض وتيقن طرفي اصعب . الانثى
سمراء اللون كستنية المولج . ريشته تظهر من نسان الى
ابدا تيش على اوراق السط .



صرمون الزعرور

١٦٧١٦ - صرمون * Saururus (S).

Saururus (S). Saururus (F). Lizard's tail, Swamp
lily (E). Molchschwanz (D). Saururus (I).
جنس نباتات عشبية جملوية مدادة معمرة من فصيلة
الصرويات . انولها حليمة جيمها متغيرة سبرية .
سوقها تحيلة حليمة تمل من ٢٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها
مستطبة ، متعاقبة ، نصلها قلبي الشكل ، متواجف الصفة ،
خلى البشرة . ازهارها غشوية ، سلبية التجميع . ازهارها
يستر من آب الى تشرين .



صرمون السنديان

١٦٧١٧ - صرمون مسددة * Strymon tacheé (F).

جنس حشرات فراشية من فصيلة اللقيطات . انولها عديدة
متشعبة في منظرها اطار العالم . ذكورها واناثها غشقة
الالوان . منظرها كروي الشكل ، ريشها صلبة القذ
منخفضة الرؤس ، مديبة الاطراف . تيش على النباتات
الشجرية . ازهارها ما يلي .



صرمون السط

١٦٧١٨ - صرمونيات * Strymon albium (S).

Strymonia (F). Strymonia (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مدابة القتالات . نباتاتها
عشبية معمرة . ازهارها غشوية . ثمارها جرد غشقة
الاشكال .



صرمون

١٦٧١٩ - صرمون * Strymonia (F).

صرمون هو الصرم ، راجع .
١٦٧٢٠ - صرمون ، صرمون ، حقيق ، كرم ، اصيل
Pur-zang (F). Thoroughbred (E).
نعت يطلق على كل حيوان اعلى من ملاة صائبة لتسب
متشعبة .

١٦٧٢١ - صرمون * Strymonia (F).

هو الجليد ، اطية .

١٦٧٢٢ - صرمون * Strymonia (F).

هو الحصاد ، اطية .

١٦٧٢٣ - صرمون * Strymonia (F).

الحاشش المجتمع من التخل في الربال .

١٦٧٢٤ - صرمون الجدي ، سلطان الجبل * Strymonia (F).

جنس نباتات معمرة برية وتربانية من فصيلة الهاليات .

١٦٧٢٥ - صرمون * Strymonia (F).

Strymonia (F). Strymonia (E).
الصرم ج . اصرام هي افراد من صرم واحد تميزت بصفات
مينة خاصة مثلها صرم الساتركن ريشه ر .

١٦٧٢٦ - صرمون * Strymonia (F).

جنس نباتات عشبية عسقلية معمرة من فصيلة اللقيطات .
منها بعض مناطق البلاد الحارة المعتدة من الهند والافغان
الى خط العرب . اصقالها كبيرة الجرم تطول نحو ١٥ سم .
وتعرض نحو ١٥ سم . ازهارها يستيق الاوراق وله رائحة
كرية . شرافها يطول من ٢٥ الى ٤٠ سم . وهو ضيق
التصل ، لونه الى الحمرة البضحية المولج . ثمارها اغص
غشبية غروية الشكل . اوراقها مستطيلة الممايق المغص
التي تطول نحو ٥٠ سم . نصلها قلبي الشكل تطول نحو
٢٥ سم . وتعرض نحو ١٥ سم . . تزرع لثريين لكنها
تقتضى الموقع البادية . اعرف انواعها وانولها التالية :

١٦٧٢٨ - صرمون صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت .
صقالها مأكولة لكنها تحوي بعض المواد الحشوية التي
تلعب بالنفس .

١٦٧٢٩ - صرمون مسددة * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٣٠ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٣١ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٣٢ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٣٣ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٣٤ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٣٥ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٣٦ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٣٧ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٣٨ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٣٩ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٤٠ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٤١ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

١٦٧٤٢ - صرمون * Strymonia venosum (S).

Strymonia venosum (S).
نبات سبروني شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي
حدائق المناطق الحارة .

الآخر يملو توشيح اصفر. ثمارها صغيرة القدر حمر اللون. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران // صارة ثمارها مرة الطعم مسهلة تدخل في عدة مستحضرات طبية موعة .

١٦٣٣١ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي الزَّرْقَاءُ القُصْمِيَّة

Loncera corulea (S). Chèvrefeuille à fruits bleus (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها مثلية فراء .
فروعها زباد اللحاء ، يبيض الملاك . ازهارها قوامية الانتشاب . توجعها عذوب الانبوب الاكروش . لونها الى البياض الاصفر تملو حلة ذمية . اوراقها بيضية ، مطوية القاعده ، زباد اللحاء ، رقيقة الشكل ، ثمارها حصية القدر لونها الى الزرقاء المايقة // ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٦٣٣٢ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي الشَّالِكَةِ ، يَاسْمِين

Loncera caprifolium (S). **عَرَالِي**
Chèvrefeuille des jardins, C. commun (F).
جنية معمرة عارشة تملو نحو ٥ امتار . ساقها فراء .
فروعها عارمة الملاك . اوراقها عارمة بيضية الشكل ، مقوية القاعده . نصلها مائل البشرة ، اخضر الصنفه العليا ، يجرى السفل . ازهارها كبيرة القدر فواحة العرف العسري . لونها ارجواني الخارج اصفر الداخل // ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٣٣٣ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي الشَّالِكَةِ

Loncera spinosa (S). Chèvrefeuille épineux (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها مثلية فراء .
فروعها نخلية متدلية ، مكاهها ابيض اللون . اوراقها خلية مسطوية مسنة القاعده . ازهارها قوامية الانتشاب ، انبوبية التويج ، ضيقة القنابات الطويلة ، ودية اللون ، ثمارها الى الحمر الزرقاء المولج يطوها طيلم الحمر . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٣٣٤ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي الشَّرْقِيَّة

Loncera orientalis (S). Chèvrefeuille d'Orient (F).
جنية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها منتصبه فراء . فروعها مثلية يبيض الملاك . اوراقها صغيرة القدر ، نصلها اخضر البشرة في صنفهها . ازهارها ودية اللون يطوها توشح بنفسجي . ثمارها الى البسرة السوداء اللامعة // ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٦٣٣٥ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي القُصْمِيَّة

Loncera myrsillus (S). Chèvrefeuille-myrtilla (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتصبه . مكاهها فروعها ابيض اللون . اوراقها اهليجية صغيرة القدر . نصلها عاق الحصار خلي الصنفه السفل . ازهارها قوامية الانتشاب ، انبوبية التويج ، جرسية الاطراف ، ضيقة القنابات المستطيلة . لونها الى البياض النقي . ثمارها مزدوجة ، لاصقة ، ثنائية الحدر ، حمر اللون // ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٣٣٦ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي القُصْمِيَّة

Loncera pileata (S). Chèvrefeuille à cupule (F).
جنية معمرة صغيرة القدر تملو نحو ٦٠ سم. ساقها منتصبه . ثمارها زباد اللحاء . اوراقها ابيدة بقضية الشكل . ازهارها صغيرة الحجم ، قمية القاعده يضاء اللون . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

انواعها نحو ١٥٠ تميل بعمد نظاميتها . ساقها منتصبه او عارشة . اوراقها متقاربة الارتكاز ، ابيدة او عارمة النصل . ازهارها لا تقاسية الاحصام ، رقيقة الشكل ، حطرية الرائحة // اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٦٣٣٥ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي الأبيدة

Loncera sempervirens (S). Chèvrefeuille toujours vert, C. de Virginie (F).
جنية معمرة عارشة تملو ٥ الى ٥ امتار . ساقها منتصبه . فروعها عارمة الملاك . اوراقها بيضية الشكل . نصلها خلي البشرة يجرى اللون . ازهارها مملية التجميع تاجية الارتكاز حطرية الرائحة ، لونها الى الازرقاء الاصفر المولج // ازهارها يستمر طوال الربيع والخريف .

١٦٣٣٦ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي الشَّيْبَةِ

Loncera thibetica (S). Chèvrefeuille du Thibet (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها منتصبه فراء .
ملاك فروعها ابيض اللون . اوراقها صغيرة القدر ، نصلها اخضر الصنفه العليا ، احمل السفل الكثيفة الزغب . ازهارها قوامية الانتشاب ، انبوبية التويج ، حطرية الرائحة ، ليكية اللون // ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٣٣٧ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي القُرْتَرِيَّة

Loncera tartarica (S). Chèvrefeuille de Tartarie, Chamécristier, Caméristier (F).
جنية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها واصرارها الزغبية عديمة ، ساقها فراء . فروعها الفتية حمر الملاك اما الحولية فيزدها . اوراقها صغيرة القدر ، قلبية الشكل مقوية القاعده . نصلها حاد السفل ، اخضر اللون . ازهارها تختلف مع القسرب لونها الابيض والودي والاجر ، كلونها خالصة التركيب . ثمارها صفر او حر ، كروية الشكل ، مسطوية الاذن . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٦٣٣٨ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي الشَّيْبَةِ

Loncera alpigena (S). Chèvrefeuille alpestre (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها فراء ، فروعها فارقة يبيض الملاك . اوراقها كبيرة القدر اهليجية النصل المهدب . ازهارها جوية اللون توجعها مزدوجة القصور . ثمارها الى الحمر القرمزية // ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٦٣٣٩ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي الحُرْجِيَّة

Loncera periclymenum (S). Chèvrefeuille des bois (F).
جنية معمرة عارشة تملو نحو ٥ امتار . ساقها فراء . فروعها عارمة الملاك . اوراقها بيضية الشكل ، ثقلة الزباد الاخضر ، نصلها مائل الصنفه العليا اخضره ، خلي السفل المصطاد . ازهارها فواحة العرف اللقي ، لونها الى الصفرة الجسلة يطوها مولج ارجواني // ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٦٣٤٠ - صُرَيْمَةُ الْجَدِي الشَّيْبَةِ

Loncera xylosteum (S). Chèvrefeuille des haies, C. des buissons (F).
جنية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها منتصبه فراء . فروعها جيت ، اقناتها حمر الملاك . اوراقها بيضية مقوية القاعده خلية النصل . ازهارها الى البياض



صُرَيْمَةُ الْجَدِي الحُرْجِيَّة

- نحر ٢ سم. أزهاره وردية اللون. حثولية التجميع.
يستخرج من أوراقه وزهره دهن السحر الشائع الاستعمال.
١٦٢٤٤ - **صَعْقَر البَر** هو للعج، اطبله.
١٦٢٤٥ - **صَعْقَر الجَبَل** هو ندغ الجبل، اطبله.
١٦٢٤٦ - **صَعْقَر الغُر** هو الطغريون الكوربي، اطبله.
١٦٢٤٧ - **صَعْقَر بَرِي** هو ستر البر، اطبله.



صعر أزغب

١٦٢٤٨ - **صَعْقَر البَرَكِي** *، **فُودَنَج**

Organum vulgare (S). *Organ commun*, *Marjolaine bête*, *Fausse marjolaine* (F). *Wild marjoram*, *Organy* (E). *Echtst. Dost*, *Wilder Marjoran* (D). *Origeno*, *Regano* (I).
نبات عشبي طلي يري معمر من فصيلة الشفويات. ساقه قوامها خشوية تلون من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه منقطة، متقابلة، بيضية الشكل؛ لصلها خلي البشرة، مبشر الجيوب المطرية. أزهاره وردية اللون، حر التفتاب. حثولها الزهري عسيبي الشكل || يستخرج من أوراقه حطر الصعر.



صعر البركاي

١٦٢٤٩ - **صَعْدَكَة** *Tige dressée* (F). *Erect stem* (E).
هي كل ساق تمكثها أليافها التماسية من الالتصاب دين وسط أو تقنيف.

١٦٢٥٠ - **صُورُوكَة**، **عَكِرُوكَة**، **فُصْمُوكَة**

Boule de scarabée (F). *Ball of beetle* (E).
الصمرورة أو البفرة أو القمصوقة حشرية من ذيل وطن تصطنعها بعض أئاث الخنافس، أخصها الجبل لَرَوُء المكن في داخلها.



صَعْق

١٦٢٥١ - **صَعْق** * *Ictinia* (S). *Ictinia* (F).
جنس طير من حارة الحدأ وفصيلة السقرات. أنوامه قليلة جميعها من القواطع الكبيرة الجفة. ألونها إلى السمية الرصاصية يعلوها موانج لَزَرَق. رؤوسها زائفة. سواقلها وإفانها عابقة. حيرتها حر اللون، سود الأطار والاداب. متاسرها إلى السواد الأزرق، أرساغها جلوية || قوتها الظلمة وللأوبيات والحشرات على اختلافها. تثن في الأشجار الباسقة. أئاثا تقص من رفعتين إلى ثلاث رفعات تحضنها بمنابرة ذكورها نحو لريمة أساييم.

١٦٢٥٢ - **صَعْفَع** *Rotor*
نعت قريبي يطلق على القسم المتحرك الدوار من الحركات الألية.

١٦٢٥٣ - **صَعْف** * *Oxylophus glandarius* (S). *Oxylophus-Gel* (F).
طائر من حارة البوقليات وفصيلة القيقويات. أحواله نسمة الأرباء تشغل الشرق الأوسط وأجزيرة العربية وإفريقية الشرقية والأشالية || وهو من القشور التي تعجب البلاد في طلب الرزق. جسده متوسط القد، يطلي نحو ٤٠ سم. ثوبه متباين الألوان. رأسه إلى الوردية. جيشته وزوده وعلاطا عقه إلى السمية الصفراء. ينط إلى البياض. ظهره إلى الوردية الحطية الموانج. ريش قوامه وسنكاه وإياهه وذنبه إلى السرة الحطية باستثناء الأطراف البيض. مقاده أحر القاطدة، أسد الملاط. أفتاده إلى السرة



صعف

١٦٢٣٧ - **صِرْمَة الجَدِي النِيلِيَّة**

Lonchra syringantha (S). *Chèvrefeuille-fils* (F).
جنية معمرة تملو نحو ١٢٠ سم. ساقها منقسمة فروع. مكك فروعها أبيض اللون. أوراقها أبلحية سنية القد. نصلها مائل البشرة جبل الخصار. أزهارها تولية الانتداب. الأنبوية التويج، خيشة التفتاب، حطرية الرأسة ووردية اللون. ثمارها حمية القد، حراء اللون، ثلاثية الحفور || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

١٦٢٣٨ - **صِرْمَة الجَدِي اليابانية**

Lonchra japonica (S). *Chèvrefeuille du Japon* (F).
جنية معمرة عارضة تملو نحو عشرة أمتار. ساقها منقسمة فروعها متباعدة، عادمة المكك. أوراقها أبلية، بيضية الشكل، مدبة الزام الأخير. نصلها خلي الصنفعة السفلى. أزهارها تولية التجميع، كبيرة القد، حرية الرأسة. لونها إلى البياض الموشج بالأحمر || أزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين.

١٦٢٣٩ - **صَعْب**

Quels (S). *Quells*, *Dioch*, *Travailleur* (F).
جنس طير من فصيلة التوطيات. أنوامه المرة ثلاثة موطنها إفريقية الشرقية من شواطئ بحر القلزم إلى ما وراء الحيفشة. أجهنها سنية الخيم طولها يراوح من ١٢ إلى ١٥ سم. ألونها قليلة الاختلاف من بعضها يكثر فيها الأحمر المائي، رؤوسها وأعضائها وأجنحتها سود. حنار قوامها وأباهرها سقر. متقاربا سود أو حر. أرساغها إلى السرة الحطية || قوتها الحبوب ولزور والوفام. تثن في الأدهال. حطها حيوكة التفتاب، كروية الشكل، مغلفة للمخل. أئاثا تقص من ٧ إلى ٧ فيضات تحضنها بمنابرة الكور نحو أسويين. ج صماب.

١٦٢٤٠ - **صَعْبَر**، **صَعْبَر**

Berchemia (S). *Berchemia* (F).
جنس نباتات معمرة من فصيلة البقيات. أنوامه قليلة. سفيها عارضة تلون من ٤ إلى ٣٠ م. أوراقها حاملة بيضية الشكل، مغلفة القاعدة. نصلها حديد البروق، بحري اللون. أزهارها صغيرة القد، غصراء اللون، حثولية التجميع، ثمارها زيتونية الشكل ولقد واللون، تسد عند الأدراك. أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

١٦٢٤١ - **صَعْقَر**

Frai (F). *Spawning* (E).
سره السمك قبل أن يخرج من الأنظام وهو الذي يحضر فيصبح من المأكال المفردة التنية المعروسة بالطرخ والخياري || أنوامه عديدة تحضف باختلاف مصادر وحجم السره ولونه وطريقة تحضيره.

١٦٢٤٢ - **صَعْقَر** هو السحر، اطبله.١٦٢٤٣ - **صَعْقَر أَزْغَب** *، **زَيْعَر**

Origanum hirtum (S). *Origan hirtus*, *Marjolaine hirtus* (F). *Hairy Marjoram* (E). *Kretischer Dostan* (D). *Origan di Creta* (I).
نبات عشبي يري سطري معمر من فصيلة الشفويات. يكثر في الأراضي الجبلية المخساة. ساقه فروع تملو نحو ٤٠ سم. فروعها دقيقة، خشوية، منقسمة، زيبية اللام. أوراقه منقطة، متقابلة، بيضية الشكل، نصلها خلي البشرة. كنيف الجيوب المطرية، مسن الحافة، يطلي



صحل



صعلول ازغب



صعلول اهيف



صعوه حواء الراش



صعوه قنبرية



صعوه مجذعة

الخضره || قوله الحشرات والاسرار . انشاء كائن القوق
لا تخشى البيض بل تقسمه في عشائ غيرها من الطير
اعصا عشائ الزناج . ج صمكف .

١٦٢٥٤ - صمكف
Fral (F). Spawning (E).
الصمكف سره السلك ويدعى صمكف ، اطلبه .

١٦٢٥٥ - صمكفيات
Chytridiaceae
فصيلة ظهور مجهرية من مرتبة السريتات ورتبة البشيات .
اجناسها وانواعها عديدة . اشهرها من الوجهة الاقتصادية
الزراعية : الفس والوزم والرمحة .

١٦٢٥٦ - صمكة
الصمكة : غفلة فيها عوج واصول منها يجردها .

١٦٢٥٧ - صمكل *
Galeria marginata (S).
Galerina marginée (F).

نظر كامن الصنف لاما كويل من فصيلة الفاريقيات .
اصطاك اقلع الصنوبريات حيث يهش بمجموعات حل
القصور والاعشاب النخرة . جمجماته لاقنسية العدد الذي
يراوح من ٦ الى ٢٠ يوه الى البياض الاخير . ساقه
ممتدة الطول ثنية الين ، طويلا الى الحطلة . اوسمته
شبه صيرانية الشكل غمدة الحافية . قطرها نحو ٤ سم .
لونها الى السمرة يعلوها موج اسفر . اطرافه ممتدة
الكثافة بنية الين . وانحته عند اليس قريبة الشبه من وانحة
التيق .

١٦٢٥٨ - صمكلون ازغب *
Clytus pilosus (S). Clytus polli (F).
Clytus pilosus (E).

حشرة خاضعة غاشبة من فصيلة القزنيبات ورتبة مفدمات
الاجنسة . تألف الجنان وكروم التين . غشائها تمشي
على افران الاشجار . يرقاتها تسردب الجلود اليابسة ||
جسمها متوسط الطول من ١٢ الى ١٦ سم . ثوبها الى
الصفار الزيتي الاخضر المواج يعلوه في الظهران ست نقط
سود . رأسها مجتل الجرم . صينها صميرتان بارزتان .
زبانها صغيان ، ديقان . فكاهما ذربان . ظهرانها
عرياش الشكل لا يعلف السكة الشرسية . عندها كيتاف
الحمل والازغب . اسياها رباعية المقل الظاهرة || الاثنى

اكبر قدأ من الذكر واطول سرأ منه واقصر زبأنا ||
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل
حزيران ويقتي حتى اواسط ايلول . تسرح في النهار وتبيت
في الليل || البرقة عند ادراكها الكوال الجسودي تطول
نحو ٢٢ سم . جسمها حيدى التركيب قليل القفوس ،
حامد الرواجب ، حطلي ، الين ، اخبر الموج ، اسد
الرأس ، ميمر الحلب اللتيق .

١٦٢٥٩ - صمكلون اهيف *
Clytus arcusatus (S). Clytus étroit (F).
Clytus arcusatus (E).

حشرة خاضعة غاشبة من فصيلة القزنيبات ورتبة مفدمات
الاجنسة . تألف اسراج الصنوبر والتنوب والشرين .
غشائها تعيش على : ازالع الشفويات والصيرليات . يرقاتها
تسردب الجلود والاعصان اليابسة || جسمها متوسط القد
اهيف الشكل يعلوه من ١٢ الى ١٦ سم . ثوبها الى السمرة
السودا يعلوها في كويلها اربع بقع صفر ويعلوها في

ظهرانها اريمة تزاويق متقابلة صفراء الين . رأسها كبير
الجرم . صينها كبيرتان صافتان . زبانها صغيان
ديقان || ظهرانها فارقة للمخزر لا يعلف السكة الشرسية .
عندها متناجبا التحزير الخفيف . اسياها رباعية المقل
الظاهرة || الاثنى اكبر عدأ من الذكر واطول سرأ منه
واقصر زبأنا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة
الجملانة في اواخر ايار ويقتي حتى اواخر آب . تسرح في
النهار وتبيت في الليل || البرقة عند بلوغها الادراك الجسودي
تطول من ٢٥ الى ٢٤ سم . جسمها حيدى التركيب ، حامد
الرواجب ، اصفر الين ، اسر الرأس والشرج ، ميمر
الحلب القصير النقيق || طور الاكمال الذي يستمر من
٤٠ الى ٤٥ يوما ينتهي في آخر نفق تحفره البرقة قرب
سلك الحول او الفنس الذي تقم فيه .

١٦٢٦٠ - صمكف

هو الصمير نبات عارش من التنبقات ، اطلبه .

١٦٢٦١ - صمكة ، صمكة
Regulus (S).
Roiteale (F). Wren. Kinglet (E).

ج صمو . جنس طير من فصيلة البشليات . انواعه ٦
جميعها من العصافير الصغيرة اللد . رؤوسها مطوقة .
مناظرها دقيقة مستقيمة . اوتواها متناوبة الالوان يعلب
فيها الاملل والاعضر الزيتوني . اجنسها متوسطة القد .
اذنانها مقعرة الريش قصيرة || قوتها الحشرات والطرار .
تألف الادخال والاصراج والسجاجات . تدن في الاشجار
الكثاء . اناثها تبيض مرتين في العام . المرة الاولى في ايار
والثانية في تموز . حضنها يستمر نحو اسبوعين تقوم به
الانثى دون الذكر .

١٦٢٦٢ - صمكة الخطب
هي الاطلان ، اطلبه .

١٦٢٦٣ - صمكة حقره الرأس *
Regulus ignicapillus (S).
Roiteale à tête rouge (F). Fire cree. Fire
crested wren (E).

نوع من الصمكة تألف الادخال والسجاجات والمدايق .
طولها نحو ١١ سم . رأسها الى الحمرة الصنائية . محسراها
الى الصفرة . ثوبها الى الوردية زهو في الصدر والجن ،
يقل في الظهر ويعلوه موج اخضر زيتي في الجناسين .

١٦٢٦٤ - صمكة قنبرية *
Regulus cristatus, R. regulus (S). Roiteale huppé (F).

نوع من الصمكة تألف الصنوبر والاصار . طولها نحو
١٠ سم . رأسها يرتقالي الريش المستطيل . اسود الطوق ،
اصفر الحسرين ، ظهرها الى الخضار الزيتوني . جناحها
الى السمرة البقلاء . صفرها وبطها الى الوردية المملدة .
تدن في الصنوبر والتنوب .

١٦٢٦٥ - صمكة مجذعة *
Regulus aticapillus (S). Roiteale triple bandeau (F).

نوع من الصمكة طولها نحو ٩ سم . رأسها امير الين اسود
الطوق . محسراها بجذعان بلاييض . سائر ثوبها كالصمكة
القنبرية . تأم الجبل في اوائل ايار فتقيم حتى ايلول
ثم ترسل الى الشواطئ هربا من البرد .

١٦٢٦٦ - صمكلون

Acrocephale (F).
Acrocephalic, Acrocephalous (E).

الصمكلون من كان رأسه ضيق القمة .



صُرُور

Emberiza citrinella (S).
Bruant jaune, Verdrière (F). Yellow hammer (E).
صفرور من الشراشير . طول نحو ١٧ سم. لونه الى
الصفرة الخضراء المائل . رأسه رمق وصدره وبطنه صفر .
ظهره وبنتاه وذنبه الى الصفرة الصفانية يطولها توشيح
خطي . ابطاء موشية بالمخوري . عيناه عسلتان ، متفاد
ازرق . ريشاه الى الصفرة الزرقية . الاذن اصفر تقاد
واقل تزويقاً من الذكر . قوته الحشرات والديدان والحبوب
الغريبة . يأنث الادخال والكرور والحلقن والسيجات .
يشن عته في الارض او على ارتفاع قليل منها في الادغال
الكثيفة . اثناء تحضن من الزرين الى الثلاث مرات
في العام تحضنها تراوح من ٤ الى ٥ يبيضات .

1١٢٧٦ - صَفَّ
Casse (F). Cass (E).
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة .
راجع تصنيف .

1١٢٧٧ - صَفَاة
في الصفرة ، اطلمها .

1١٢٧٨ - صَفَاخ
Polyhedra (F). Polyhedral (E).
جزم صلب متعدد الصلحات او الوجوه .

1١٢٧٩ - صَفَاكِيَّة ، صَفَاكِيَّة ، صَفَاكِيَّة ، صَفَاكِيَّة
Orieolus (S). Oriole (F). Oriole (E).
جلس طير . من البشريات القردوسيات . انواها ٢٤ جميعها



صَفَج

من التواطع ، موطنها العالم . اجسامها رشيقة متصلة لحد
طولها يراوح من ٢٢ الى ٢٧ سم . مناقيرها قوية مستطيلة .
اجنحتها ذلقة . اذناها مغطاة الطول فضفاضة . ارسلها
جسدية الجذ قوية . انورها الى الصفرة اللحية الجسدية .
ازنادها واجنحتها واذنابها سود . عيونها الى الحمرة الزاهية .
منافذها بجوئية . ارسلها وصافية . قوتها الحشرات
والفرا . تلتن في الاجنحة القريبة ، اناتها تقص من ٤
الى ٥ يبيضات تحضنها وسعها .

1١٢٨٠ - صَفَاة
Cotination (F).
ترتيب سبي الشكل موصد الاطراف او طليها يحصل
عصا تكون الطلش في طور الميوزة .

1١٢٨١ - صَفَاكِي
Epicrine (F). Epicranium (E).
شفاه المهيمة وهو في الحشرات الجبنت .

1١٢٨٢ - صَفَاكِي
Pélochéie (F).
فخانة الجله .

1١٢٨٣ - صَفَاة
Tire (F). Tide, Qualification (E).
هي الاساس القانوني الحق كقولك مقد صفة تبرع .

1١٢٨٤ - صَفَاة
Qualité (F). Quality, Capacity (E).
هي الميزة التي تحو بلار الى التدخل في مقد قانوني
او قضية ما وذلك بصفته وارثاً او وصياً . الخ .

1١٢٨٥ - صَفَاة
Caractère (F). Character (E).
الصفة جمعاً اوصاف وصفات هي الميزة الجسورية
الخاصة .

1١٢٨٦ - صَفَاة غَالِيَّة ، صَفَاة مَتَكَوَّلَة

Caractère dominant (F). Dominant character (E).
هي في الدافعة الصفة التوزيية التي لا يمكن طسها
تظهر دائماً .

1١٢٦٧ - صُورَة
Acrocephale (F).
Acrocephaly (E).

تشويه خلقي يحصل للرأس فيبدو شيق القمة . الصولة
لا تخم حشف القوى المقلية .

1١٢٦٨ - صَعِيد
النصيد هو وجه الارض العالية وقيل هو المرتفع من الارض .

1١٢٦٩ - صَعْب
Lentes (F). Nits (E).
الصعب : يرض القلة ونحوها . الواسدة صعبة .

1١٢٧٠ - صُعْبَاكِيَّات
Sphaerocarpidae (F).
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويجات تتميز بكتلتها
المجتمعة المصورة عن بؤفة مغلقة (بكتينية) . فصائلها
اربع وهي الدلايمات والصفنيات والمسانيات والمذكيات .

1١٢٧١ - صُعْبِيَّة
Sphaeropsis
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفنيات . انواها عديدة
نحو ٢٠٠ منها ردية ومنها طفيلية . بكتيناتها محصورة للشد
سطحية الالتفاز . فصائلها خبية او متصلة . جملها خطي
عابق يطوي من ثائي دقيق . شغرائها خدية . بونغائها
بيضية حشلية او مبيها اللون .

1١٢٧٢ - صُعْبِيَّات
Sphaerioidaceae (S).
Sphaerioidaceae (F).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الصفيانيات ورتبة
الزويجات تتميز بكتيناتها الضفسم ، الحصور المت
التي السمة ، السيمك الجليل ، العابق اللون . بونغاتها لا
قياسية التركيب والشكل والتجميع . فهي صيغة الخلية
او ثنائيتها ، ورتبة او شبيهة الاضية ، خيلية او قدية
الشكل ، فردية او ردية التجميع ، مستطيلة او مترومة
الزوية المثلثة . اعرف اجسامها الاقتصادية للزوية نحو
٣٢ ، ثوردها بالتسلل الاجيدي كما جاءت في الموصة .
اسمونه ، اسكوشيتا ، اسنبة ، اسنبة ، اكرالية ،
بلنوس ، تريكيريتوريه ، درلوسه ، دكراليه ،
دنوروفيه ، دويورال ، ديلويت ، ديلوسبور ،
رديوسور ، زقار ، ستروريه ، صبة ، سفورليه ،
ستارديه ، ميتوسبوريت ، دويديه ، صبة ، فيه ،
فويوسيس ، كرساله ، كريفوتير يوم ، لزيوسور ،
لصف ، ملق ، مكروفيه ، هتسرتوله ، هتسورليه .

1١٢٧٣ - صُورُور
Petilum (S).
Petilum (F). Petillum (E).

جنس حشرات من فصيلة الصفروريات ورتبة غفديات
الاجنحة . انواها المعروفة قليلة العدد اسطائها البلاد المطلة
الحاررة من العالم القديم . اجسامها شديدة الصغر ،
بيضية الشكل ، قليل نحو ١ سم . رؤوسها مستعرضة .
عيونها صغيرة ، ماحة . كأكبرها وكوكها وبلاسلها قياسية .
قرونها الاستفادارية مستطيلة ، صرطانية الشكل . كولسلها
حميدة ، مستعرضة . رواشها مهدية . الحامدا لاحة .
قواها خشية . انواها وصيدة اقرون منها الاثنت والاسهب
والاسر . تعيش في الجفلة والبردي النباتي . قوتها بوزغ
الغفديات .

1١٢٧٤ - صُورُورِيَّات
Ptilidae (S).
فصيلة حشرات من غفديات الاجنحة تسمى أيضاً
اصفرليات ، اطلمها .



صَفَاة

١٦٣٠٢ - صفة الشعير السورية
Brant de Syrie (F).
طائر من الشرائير يسمى درسة بدهاء ، اطلها .

١٦٣٠٣ - صفة الشعير سوداء الرأس
Embrézie à capuchon (F).
طائر من الدرس يسمى درسة سوداء الرأس ، اطلها .

١٦٣٠٤ - صفة
Aubère, Obère (F).
With a white and chestnut coat (E).
من الثوب اثليل وهو اختلاط شعرات بيض بأخرى ضاربة الى حرة .

١٦٣٠٥ - صفة ، سكوي
Crox pratensis (S).
Crox des prés, Râle des genêts, R. terrestre, Rol des Caillies (F).
Corncrake, Landrail (E).

نوع من الطوط وهو طائر من القرايط يشبه الباني وياتي معها في زين واحد . طول نحو ٢٥ سم . ثوبه الى الصبغة السمر تملها رقة حنطية عابطة . ظهوره اغير المواجه المايق . صدره وبطنه الى البطة البيضاء ، جناحاه موشحان بالاحمر الصافي . منقاره جهوري العظيم العلوي ثني السفلي || فيه الحشرات والديدان والحبوب . يطن في التربة بين الاشجار . انشاء تقع نحو ٧ بيضات تحضنها وسدحا لثلاثة اسابيع || يقال انه جبان يفرح من الصوة وفي الليل « اجين من صفره » وقد قال الشاعر :
« تراه كالليل لدى امته »
وفي الرضى اجين من صفره

١٦٣٠٦ - صفة
لصفري نبات ينبت في اوائل الخريف (السان) .

١٦٣٠٧ - صفة
Chalcididae (S).
Chalcididae (F). Chalcid Wasps (E).
Zehrwaspes, Erzwaspes (D).
فصيلة حشرات من رتبة خشايات الاجنحة المنصورة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها نائمة تتطفل على خيفات الحشرات الفارة اخصها ذوات الجناسين وحشرقيات الاجنحة .

١٦٣٠٨ - صفة الخرشيات
Chalcis stipes (S). Chalcide (F).
حشرة من الصفريات ، طولها نحو ٨ سم . جسمها اسود اللون ، ارجلها حر . غصنها البهري الشكل مستطيل . رقاتها تتطفل على جميع انواع الخرشيات .

١٦٣٠٩ - صفة الدود
Brachymeria foveolata (S). Brachymère (F).
ششرة صغيرة من الصفريات ، طولها نحو ٤ سم . ثوبها الى السودة . زياتها وقواتها الى الصفرة . رقاتها تتطفل على غنط ديدان حشرقيات الاجنحة .

١٦٣١٠ - صفة المتوسط
Phaenoglyphis conica (S). Phaenoglyphis (F).
ششرة من الصفريات ، طولها نحو ٨ سم . رأسها وصدرها وبطنها اسود ، بقها احمر . قوائمها الامامية سود . ارجلها الخلفية حر . رزها غليظ مستطيل . رقاتها تتطفل على عدة حشرات اخصها ذات الجناسين .

١٦٢٨٧ - صفة متعينة
Caractère récessif
Recessive character (E).
هي الصفة المنفرة المضمرة الممكن ان تود الى الظهور .

١٦٢٨٨ - صفة ، سقيفة
Hangar (F).
Outhouse, Shed (E).
بناء زراعي مكشوف الجوانب او بمعناها تحفظ فيه الآلات الزراعية والفلوات فيها من الشمس والمطر .

١٦٢٨٩ - صفة
هو الحصف من حيوانات البحر ، اطله .

١٦٢٩٠ - صفة
Testaci (F). Testaceous (E).
لنت تعريفى توصف به الالفة الكلية المادة التي تلصق الاصداق البحرية .

١٦٢٩١ - صفة
Zéro (F). Zero, Naughe (E).
علامة عديدة تغير من اتمام القيمة . والصفراء عند وجوده عن زين عدد دل على شربه بشرة .

١٦٢٩٢ - صفة ، أسكريد ، أسكارس
Ascaride, Ascaris (F).
جنس ديدان طفيلية من رتبة السلكيات . انواعه عديدة جميعها من الديدان الخيطية المعوية الكؤذية . يقضى عليها باستعمال بعض المسهلات النباتية اخصها البسترن .

١٦٢٩٣ - صفة الخيل
Ascaris megalocephala (S). Ascaride mégalocephale, A. du cheval (F). Thread-worm horse (E).
نوع من الصفر يصيب الخيل والحيبر والبال . يعيش في السطح وقد يصيب ارجامجا يسبح الحيوان .

١٦٢٩٤ - صفة الكلاب
Ascaris mystax (S).
Ascaride mystax, A. du chien (F). Thread-worm dog (E).
يصيب الكلاب والسنائير يعيش في المني البتقيق .

١٦٢٩٥ - صفة
« الصفراء من نبات السهل والربل وقد تنبت بالجله » .
قال ابو حنيفة : « الصفراء نبت من المشب تسقط على الارض وكان ورقها ورق الخس » فاكلها الابل اكلًا شديداً . (السان)

١٦٢٩٦ - صفة
Bile
حصارة تقرظها الكبد تتميز بلونها الاصفر الماكن ولينة مارتيا . وهي ثلوية المتفاعل تحوي بعض الاصلاح الضورية والمعدنية والمواد الملونة || وظائفها الجسدية عديدة اهمها : تثبيط عمل البنكرياس وسحب حركات الامعاء الميكانيكية وترتيب المواد للمضوية الى ان يتم انشائها مع وقاتها من الاغبار والمغن .

١٦٢٩٧ - صفة العروق
هي الكستورزا ، اطلها .

١٦٢٩٨ - صفة العروق
هي الكستورزا ، اطلها .

١٦٢٩٩ - صفة
هو الزفران ، اطله .

١٦٣٠٠ - صفة
هي الصفارة ، اطلها .

١٦٣٠١ - صفة الشعير
Verdère (F).
طائر من الشرائير يسمى صفتج ، اطله .



صفرة الخيل



صفرة



صفرة الخرشيات



صفرة الدود



صفرة المتوسط



صَفَافَات ابيض



صَفَافَات ارجواني



صَفَافَات ابرد



صَفَافَات البلاتين



صَفَافَات الماعز



صَفَافَات ماعز

الاطراف . اسديتها ثنائية . ثمارها زاهد اقشور مستدة الاذن الشديدة القصر || يعيش على الماء . زواحه منتشرة في جميع الاصقاع . قصباتها لينة ساعية شائعة الانتحال .

١٦٣١٧ - صَفَافَات الماعز *
Salix caprea (S).
Sauce des chèvres, Bourzade (F).
Goat willow, Sallow (E). Sahweide (D). Salice caprea, Capraecio (I).

شجرة سرورية متوسطة القند ، ثمارها نحو عشرة اذنان . قصباتها واثنائها حديدية اللحاء . اوراقها مسطحة ، بيضيه ، صغيرة القند طول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ . نصلها خشن الملمس ، ازرق الصفرة السفل . حراشف شياؤها سواد . اسديتها ثنائية || يعيش في جميع الارضية والمواقع الرطبة . اغشاهها صناعية . لحاء سويها تسلمع دباغة .

١٦٣١٨ - صَفَافَات قَبِيْق القَلَم

Salix acutifolia (S). Sauce à feuilles étroites (F).
شجرة متوسطة القند ، تملو من ١٠ الى ١٥ م . فروصها تحلة متمسكة خلية اللحاء . اوراقها ضيقة ، نصلها يطول نحو ١٢ سم . وتعرض نحو ٢ . حراشف شياؤها لاسفة خلية . اسديتها اذناها ثنائية التجميع || يعيش في الوديان ، يزرع في الكتبان لتثبيت رمالها المتحركة .

١٦٣١٩ - صَفَافَات قاصير *

Salix magnifica (S).
Sauce magnifica (F).
جنبة سرورية جميلة الشكل ، ثمارها نحو ٢٥٠ م . قصباتها ارجوانية اللحاء . اوراقها بيضيه طول من ٢٠ الى ٢٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ١٥ م . نصلها جامد النسيج ، يحمل الخضار الزاهي . شياؤها الذكورية طول نحو ١٥ سم . والانثوية ٢٥ ، حراشفها جزئية اللون ، اسديتها ضفعية || يزرع القزوين جيد في جميع الارضية والمواقع للرطوبة الرطبة .

١٦٣٢٠ - صَفَافَات قَرَم

Salix herbacea (S).
Sauce nain, S. argentea (F). Dwarf willow, Arctic willow (E). Krautweide (D). Saliceo nano (I).
نبطة جبلية ترطب في المواقع الرطبة الباردة . تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . فروصها وقصباتها زاهد اللحاء . اوراقها صغيرة القند طول نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٢ . حراشف شياؤها خلية فضية . اسديتها ثنائية .

١٦٣٢١ - صَفَافَات قَصِير

Salix fragilis (S).
Sauce fragile (F).
شجرة فراءه ، تملو من ١٥ الى ١٥ م . فروصها متدلية ، حادة الحبل الازرق ، سرية القسم . اوراقها سانية ، مبطنة ، طول نحو ١٦ سم . حراشف شياؤها صفر . اسديتها اذناها ثنائية التجميع ، مرطبة الاثلام || يزرع اغشاهها وقصباتها الصناعية ، يرغب في المواقع المستمرة الرطبة .

١٦٣٢٢ - صَفَافَات قَلْبِي الْوَرَق

Salix cordata (S). Sauce à feuilles en coeur (F).
شجرة فراءه منتصبه الاثلام ، تملو من ٢٥ الى ٤٠ م . فروصها سانية ، ثنائية الشكل ، نصلها مائل البشرة ذات اذنان الاخير للشاري الحافة . حراشف شياؤها خلية . اسديتها اذناها ثنائية التجميع مرطبة الاثلام || يزرع القزوين يرغب في المواقع الرطبة والارضية السميكة الغور .

١٦٣١١ - صَفَافَات سَوَحَر

Salix (S).
Sauce, Osier (F). Willow (E). Weide (D). Salice, Saliceo, Salicio (I).
جنس اشجار وشجيرات حسرية ورتبية من فصيلة المصنعات . اذناها نحو ١٢٠ منتشرة في جميع الاصقاع . اوراقها مائلة مسطحة متعاقبة تطبق فيها الاسطالة ، نصلها ازرق الصفرة السفل . اذناها ثنائية المسكن ، شريفة ، وسيدة الشق || جميع اناها ترطب في الاراضي الرطبة . اغشاهها خفيفة لينة سهلة التصنيع لا تتفكك . لحاء سويها تسلمع الدباغة . قصباتها تتمسك في صناعة البلال . اشهر اناها ما يتبع .

١٦٣١٢ - صَفَافَات اَبْيَض * ، اِسْبِيْدَاك

Salix alba (S). Sauce blanc, Osier blanc (F). White willow, Swallow tailed willow (E). Silberweide (D). Saliceo blanco, Salicastro (I).
شجرة كبيرة القند ، ثمارها زاهد ٢٥ م . فروصها متوسطة الانبساط ، قصباتها واثنائها منتصبه ، لونها الى الحماض الازرق يعطونها زهاب ابيض . اوراقها سانية الشكل ، مديفة الطول طول نحو ١٢ سم . وتعرض ٢ . نصلها منشاري الحافة ، حلي البشرة التي تبدو فراءه اللون . حراشف شياؤها صفر . اسديتها ثنائية || زواحه شائعة ، يرغب في المواقع الرطبة اغشاهها طرية وصناعية . لحاء سويها وفرومه دباغة .

١٦٣١٣ - صَفَافَات اَرْجَوَانِي *

Salix purpurea (S). Sauce pourpre, Osier rouge (F).
شجرة صغيرة القند ، تملو من مترين الى خمسة اذنان . فروصها جزئية اللحاء . اوراقها سانية طول نحو ١١ سم . وتعرض ١٥ م . نصلها مائل الصفرة قليلا ازرق السفل ، مسن حافة الزايم الاخير . حراشف شياؤها قلنية ازرق . اسديتها اذناها فردية ، مآبرها ارجوانية || يزرع القزوين .

١٦٣١٤ - صَفَافَات اَرْمُود *

Salix cinerea (S).
Sauce cendré, S. gris (F).
شجرة صغيرة القند ، سرورية ، جميلة الشكل . تملو من ٨ الى ٦ اذنان . شجيراتها اجوف التبخيد السويدي . اوراقها طول من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ . نصلها خلية الصفرة ، مديبة للمقصة المنسقة . حراشف شياؤها قلنية ازرق الالاميد اللون || يكثر في الاثلام المختلة قرب مجاري الماء .

١٦٣١٥ - صَفَافَات اَسْوَد

Salix nigra (S).
Sauce noir (F).
شجرة كبيرة القند دائمة تملو من ٢٥ الى ٣٥ م . اوراقها مسطحة ، اهليجية ، ضيقة ، طول من ٨ الى ١٥ سم . وتعرض من ١٥ الى ١٦ م . نصلها مائل البشرة ، حلي العروق ، حلق الخضار القاتم . حراشف شياؤها سود . اسديتها ورتبة التجميع ثلاثية او خلية او ساعية . اقلها مرط . ثمارها طليسة اقشور ، مستحيلة الاذن . يرغب في المواقع الرطبة وفي الارضية السميكة الغور .

١٦٣١٦ - صَفَافَات السَكَكِين *

Salix viminalis (S). Sauce viminal, Osier vert, S. des vanniers (F). Basket willow, Osier willow (E). Kobweide (D). Saliceo vetice, Vincio, Srops (I).
شجرة متوسطة القند ، تملو من ٤ الى ١٥ اذنان . ساقها فراءه ، عديدة القصبان اللينة المختلة . اوراقها سانية ضيقة ، نصلها يطول نحو ١٢ سم . وتعرض ١٢ م . صفته السفل فضية الخمل . حراشف شياؤها سود

١٦٣٣١ - صَفَافُ طَوِيلُ الذَّكَبِ *

Orthotomus longicauda (S). Orthotome à longue queue, Fauvette couturrière (F).

طائر من الصفصاف. أصدانه تمتد من مايليزيه الى الهند وإيران وإفريقيا. ثوبه جميل الألوان الزائفة. ظهوره الى الخضر الزيفي "الاصفر". عنقه يمتدحه ويهبط الى الياض الاخضر المغمض بالاصفر. عزازان ذنبه مستطيلان || قوته الحشرات والحفنة والديدان والتسلق. يألف الحدائق والقباض والمتاع وشغاف بجاري الماء || الاثنى قطع من ه الى ه يضايت تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوما.

١٦٣٣٢ - صَفَافُ * ، سَيْسَك

Saccotomus (S). Saccotome (F).

جنس حيوانات قاضية جامة من القاربات. أنواعه ٤ موطنها البلاد الافريقية. جميعها ربة الحقة ، صغيرة القند. الثوبان الى السرة تسودع اقترابها من الظهر والرأس وتبيض عند البطن. قوتهاها قصيرة. اطفاها ذرية. روموها غرووية. اذناها كبيرة مستديرة. اذناها دقيقة. قصيرة. كاسية || قوتها الجذور وجميع المواد الصبوية والحشرات. تألف الادغال الكثيفة وصفاف الانهار والمروج المرتفعة والاراضي للمساكن. مجارها انفاق مستطيلة تتخللها رداء قسيمة.

Manoqua (F).

Hand, Plug (E).

الضمة من اوراق التبغ المجافة المروضة، مبسطة كانت او غير مبسطة.

Lethrinus (S).

Léthrin (F). Lethrinus (E).

جنس سمك بحرية من ثلاثيات الزعانف وبسليسة الاسبوريات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض بحار البلاد الحارة || اعرف انواعه واشهرها الصفند المأكول وصفند الاطلسي.

١٦٣٣٥ - صَفَافُ مَأْكُولُ *

Lethrinus esculentus (S). Léthrin mangeable (F). Esculent lethrinus (E).

نوع من الصفند، سمكة بحرية بيضاء. اصدانه تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي || جسمه اعطليجي الشكل، قصور المقعر، مستدل التسطيط، يطول من ١٦ الى ١٨ سم. رأسه كبير الجرم، غروطي الشكل. شفه مستطيل الانفرج. صيناه مقاربتيان ناشرتان. زعنفته الظهرية مستطيلة، ثلاثية القسم الامامي. اما الشرسية ثلاثية المناسخ الغريبة. والذيلية فاقرة. ثوبه الى الخضار الغنيض المواج. رأسه اصفر. زعانفه حر. وتعلو بقية جروية في اواسط الايمل من الجانبين || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه.

١٦٣٣٦ - صَفَافُ ، تَصْفِيقُ ، صَفَافُ

Décantage, Décantation, Soutirage (F). Decantation Drawing off (E).

نقل اخضر وسائر السوائل من آنية الى اخرى لفصلها من رواسبها.

Marché (F). Market (E).

١٦٣٣٧ - صَفَافُ

إتفاق يشهد على تسليم بضاعة.

١٦٣٣٨ - صَفَافُ مُسْتَحْ ، صَفَافُ رُومِي ،

شَجَرُ الْبَتِّ ، أَمُ الشُّعُورِ

Salix babylonica (S). Saule pleureur, S. de Babylone (F). Weeping willow, Mourning willow (E). Trauer weide, Babylonische Weide (D). Salix pangsanta, Salice di Babilonia (I).

شجرة تسمى الكبر ، تملو نحو عشرة اشجار فرومها منسقة. قضبانها وانفانها دقيقة متعالية. اوراقها سنانة ، ضيقة ، قصيرة المتق ، تصلها يطول نحو ١٧ سم. ويعرض ٢٥ سم. وهو مائل الصفقة العليا ازغب البقل وزنيه اطول اللين. حراشيفها شاربقة حنطية. اسديتها ثنائية. زراعه شائعة ، يرغب في الواضع الكثيرة الماء ، قضبانها صناعية ، خشبها متوسط البينة.

١٦٣٣٩ - صَفَافُ نَهْرِي

Salix fluviatilis (S).

Saule fluviat (F).

شجرة سرورية ، تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. فرومها منفرجة الزوايا. قضبانها شبه منسقة. اوراقها ضيقة تطول من ٦ الى ١٠ سم. ويعرض من ٥ الى ١٠ سم. تصلها مشاري الحانقة ، خلي البشرة على صفحتيه. حراشيف شاربقة وريدة اللين. اسديتها ثنائية. اقلامها خلية ، ثمارها زقية القشور || يعيش على مجاري الماء وفي اخصبها وبين الصخور.

١٦٣٤٥ - صَفَافُ يَابَانِي

Salix elegantissima (S). Saule pleureur du Japon, S. elegant (F).

شجرة متوسطة القند ، تملو نحو عشرة اشجار. اخصبها انفية الانتساب. قضبانها وانفانها متعالية ، زباه اللحم. اوراقها ضيقة تطول نحو ١٥ سم. وتعرض ٢ سم. تصلها بارز البروق المهدبة. حراشيف شاربقة مستطيلة ، وريدة اللين. اسديتها ثنائية. ثمارها خلية القشور ، قصيرة الامن. يزود القرنين ، يرغب في الارربة الرطبة المتوسطة الانتماع.

١٦٣٤٦ - صَفَافَاتُ ، صَالِيَاتُ

Salicaceae (S). Salicées (F).

اسم املاح الحامض الصفصافي أي الخلتني.

١٦٣٤٧ - صَفَافِيَّاتُ

Salicaceae (S). Salicées (F). صفصافية

صفصافية نباتية من ذوات القفلتين حاملة الثمارات تشمل الصفصاف والجرور.

١٦٣٤٨ - صَفَافِيَّةٌ

Salix (F).

في الاية نبات من اقلبيات ، اطليا.

١٦٣٤٩ - صَفَافِيَّانُ ، صَالِيَّانُ

Salix (F).

غلوكوزيده يستخلص من كشور واوراق الصفصاف والجرور وهو مقو نافع ويستعمل في معالجة داء المفاصل.

١٦٣٣٠ - صَفَافُ *

Orthotomus (S).

Orthotome (F). Orthotomus (E).

جنس طير من فصيلة السليقيات وريبة الجواثم. انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور البلاد الاسيرية || تتميز بظواهرها الزائفة ويظهره صنع اصدانها الجارية الشكل المولفة من روتيني جسمها وتبعكها يحيط من القطن او النيل التام تحسه وتقتله قبل الاستمال بمقارها الذي يقوم مقام المفرك والابرة واليد || اعرف انواعه واشهرها الصفصاف الطويل الذنب.



صفصاف مستح



صفصاف طويل الذنب



صفصافية



صفصاف مأكول

١٦٣٤٨ - صَفِيَّعِيَّاتُ الْقُرُونِ

Lamellifrons (F). Lamellifrons (E).

لمت تقريباً يطلق على الخنافس القليلة لفصيلة الجليات ذلك لأن قرونها الاستفصارية الورقية تشكل فتحة وتطرق كصفحات الكتاب .

١٦٣٤٩ - صَفِيَّعِيَّاتُ الْمَتَافِرِ

Lamellirostris (F). صَفِيَّعِيَّاتُ الْمَتَافِرِ
رَبِيَّة طير من كليات السقدم تتميز بمنقدها المبطلة الصفيحية الشكل ، من فصائلها الطيسات والوزيات وللتحاميات ، الخ .

Glattement (F).

١٦٣٥٠ - صَفِير

صوت السر .

١٦٣٥١ - صَفِير

هو الثمن جنبة من الفطيات ، اطلة .



صفيرة

Sopora (S).

١٦٣٥٢ - صَفِيرَاك

Sophora (F). Sophora (E). Sophora (D). Sofora (I).
جنس نباتات معمرة برية وزراعية تربيتية من فصيلة الاتريبات للفراسية . أنواعها عديدة منها الأشجار والعميرات والجنابات والأشباب . أوراقها مركبة ريشية . أزهارها متفرقة تتجمع بكثر لها اللون الاسفر ، بني متفرقة تجبرها لتتحلل || أشهر أنواعها ما يتبع .

١٦٣٥٣ - صَفِيرَاكُ الْكُنْكَسِكِ

Sophora secundiflora (S). Sophora du Mexique (F).
شجرة متوسطة الحجم ، تملو نحو ١١ م . ساقها سرسة . أوراقها أبيض . وريقاتها تد من ٧ الى ٩ ، لصلها مائل للبرقة . حبل الخصار ، حنابقها الزهرية ابطية وصانية الاتريكات . أزهارها بتجمية اللون ، فواحة العرف . أزهارها يستمر طوال الصيف .

١٦٣٥٤ - صَفِيرَاكُ الْيَابَانِ

Sophora japonica (S). Sophora du Japon (F). Japanese pagoda tree, Sophora japonica (E). Japonische Sophora (D). Sofora del Giappone (I).

شجرة سروقية كبيرة القد ، تملو من ١٥ الى ٢٠ م . فروعها المشهورة أبيض . ساقها سرسة . أوراقها عابطة تملو نحو ٢٥ م . وهي مؤلفة من نحو ١٥ ورقة لصلها باحت الخصار . حنابقها الزهرية محبوبة الاتريكات . حنابقها حربية الشكل تملو من ٢٠ الى ٢٥ م . أزهارها خافتة العرف للمستحب لونها الى الصفرة البيضاء المزعج . ثمارها قرنية يستخرج منها خضاب اسفر قليل كبير الشأن يستعمل في صباغ ثياب ملك الشمس || اعتاشها صناعية ناعمة الرقعة جيدة الصنف || أزهارها يستمر من تموز الى آب .

١٦٣٥٥ - صَفِيرَاكُ امْرِيكِيَّة

Sophora affinis (S). Sophora d'Amérique (F).
شجرة تملو نحو ٢٥ م . ساقها سرسة . أوراقها عابطة كبيرة مركبة من نحو ١٧ ورقة لصلها مائل للبرقة . حبل الخصار . حنابقها الزهرية ابطية الاتريكات . أزهارها الى البياض المزعج بالوردي || أزهارها يستمر طوال الصيف .

١٦٣٥٦ - صَفِيرَاكُ يَتِيَّةُ الْوَرَقِ

Sophora viciifolia (S). Sophora à feuilles de vesce (F).
جنبة سروقية معمرة ، تملو من ٢ الى ٣ م . ساقها شاذكة . أوراقها عابطة صغيرة . وريقاتها مستطلة يراوح



صفراء اليابان

١٦٣٣٨ - صَفَن

Guépier (F). Wasp's nest (E).

مادة الزناير . بيت تتصه الزناير ونحوا لها ولقراها .

١٦٣٣٩ - صَفَن

Bourse, Scrotum (F). Scrotum (E).

الجراب الجدي الذي يغلظ الخصيتان للظامرتان عند الحيوان .

١٦٣٤٠ - صَفْرُوكَة ، زُؤِيَّة

Zonitis immaculata (S). Zonitis immaculé (F).

Zonitis immaculata (E).

حشرة طيبة واثمة غامضة وانجبة من فصيلة اللويديات ورؤية معدلات الاجنحة . موطنها الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا . غشائها تميش على بيلات الازهار وفطيات النبات وهي تفرز منه لسها مادة صفراء اللون كروية الرائحة ونحوي في شوارها وني جهازها التناسلي مادة ناعمة تهيج بشرة الجلد وتثير البلاء . يرقاتها مفرقة || جسمها متوسط القد يملو من ١٢ الى ١٥ م . قوامها الى الصفار الكاظم ، رأسها وبراميزها سود . صنادها كيرتان وارتان . زباناها عظيمات مستطيلات . ظواهرها سائي الاطراف القليلة اللاحقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتميش حتى اواخر تموز . تسرح في التبار . تساهل في حزيرون وتتمتع المكان في كل مكان يكون له الغطاء || البوقة عند بلوغها الادراك اتام تطول نحو ٢٢ م . جسمها شبه امطواني الشكل ، عابهي الصفرة الداكنة ، اسفل الحواشي الترحية ، افر الملب ، سداسي الترواج ، بني الرأس . قليل الملب المجر على الجالين || طور الكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يوما وينتهي في التربة .

١٦٣٤١ - صَفِي

لمت يطلق على كل حيوان اعلى صريح السلالة الصافية المتشعبة . رابع صريح .

١٦٣٤٢ - صَفِيحَة

هي التصل ، اطلة .

١٦٣٤٣ - صَفِيَّعِيَّاتُ

Ma كان كالصفحية شكلا .

١٦٣٤٤ - صَفِيَّعِيَّاتُ الْأَحْثَاكِ

Mysticetes (F).

مرئية حيوانات بحرية لبونة . راجع ريشيات الاحثاك .

١٦٣٤٥ - صَفِيَّعِيَّاتُ الْأَرْجُلِ

Pélicypodes (F).

صف حيوانات من الرخويات يعرف أيضاً بصفيقيات الخياشيم وبلوات للمصرين .

١٦٣٤٦ - صَفِيَّعِيَّاتُ الْجُلُودِ

Plecodermes (F). Plecodermata (E).

مرئية من الاسماك المتحجرة ظهرت في اواخر الحقبة السيلورية وانقرضت في الكربونية . تميزت ببياكلها الففرفرية المادة الملوقة بمصالح عظمية التركيب .

١٦٣٤٧ - صَفِيَّعِيَّاتُ الْخَيْطَانِ

Lamellibranchs (F). Lamellibranchiata (E).

صف حيوانات من الرخويات يسمونها ابساً ذوات المصرين أو الصمدتين (Bivalves) .

مستوية القوام، سرية الطيران، حادة المزاج وقوية الشجاعة. تمرلها : الصقر وصقر الصيم وصقر المروج وصقر الهند والحُرّ والسوق والشاهين والفرق || اما كنيته فأبو شجاع وأبو الاصم وأبو الحمراء وأبو عمرو وأبو عمران وأبو حوان .

١٦٣٦٩ - صَفَرَاءُ ، أَجْدَاك ، جَدَاك ، قُطَامِي
Falco sacer (S). Faucon sacre, Sacre (F).

طائر من الكولاس تنسب إليه عارة الصقور وفضيلة الصقريات . وهو أبيض الجفّة ، حسن الشكل ، مجدل العين ، طويل السنن والذنب ، عاري الساقين ، حاد الخالب . منسره قصير القد ، أعف الجبهة ، منس الخطين . وهو أهدأ من البازي وأقنع منه وأبرد مزاجاً وأشد أقداماً وأكثر إلفة || موطنه البلاد المعتدلة الحارة من آسيا وأروبة الشرقية || يأوى الإسراج والثبات الكثيفة والجبال الجرداء على السواء . قوته الطير من المسفوق والبط . ينش وكته في صدوح الصنوبر النائية أو في أعالي الأشجار العالية . أثناء تصع من ٣ إلى ٤ فترات تحسبها وحدها نحو أربعة أسابيع .

١٦٣٧٠ - صَفَرَاءُ الْأَرْتَبِ هو العقاب السعاء ، اطليها .

١٦٣٧١ - صَفَرَاءُ الْبَطِّ هو السوق ، اطليها .

١٦٣٧٢ - صَفَرَاءُ الْجَرَادِ هو الموقس ، طائر من الصقريات ، اطليها .

١٦٣٧٣ - صَفَرَاءُ الصَّيْمِ *
Falco orientalis (S). Faucon de Barbarie, Tartaret (F).

نوع من الصقر . أصله تحت من العراق إلى التبت . وهو أصغر قدّاً من الشاهين والأجدل لكنه أشرس خلفاً وأبليس مزاجاً وأشد بطلاً .

١٦٣٧٤ - صَفَرَاءُ الْفَرَكَالِ هو الشرق ، اطليها .

١٦٣٧٥ - صَفَرَاءُ الْفَيْرَانِ هو مرزّة الدجاج ، اطليها .

١٦٣٧٦ - صَفَرَاءُ الْمُرُوجِ
Falco mexicanus (S). Faucon des prairies (F).

نوع من الصقر . أصله البلاد الأمريكية بكثير في المكسيك . يألف المناطق البدائية بعيداً من الشواطئ قوته الصافير والقزائم والحشرات .

١٦٣٧٧ - صَفَرَاءُ الْهِنْدِ *
Falco calidus (S). Faucon des Indes (F).

نوع من الصقر ، متوسط القد ، جميل التوشيم الزاهي ، سريع الحركة والانفصاف . موطنه الهند وهو من طيورها الأبدية .

١٦٣٧٨ - صَفَرَاءُ يَزْ هو البازي ، اطليها .

١٦٣٧٩ - صَفَرَاءُ جَرَمَاحِ هو السقاوة ، اطليها .

١٦٣٨٠ - صَفَرَاءُ حَوَامِ هو السقاوة الشائبة ، اطليها .

١٦٣٨١ - صَفَرَاءُ كَبِ هو الجروية ، اطليها .

١٦٣٨٢ - صَفَرَاءُ *
Cycchraque (S). Cycchraque (F).

جنس حشرات واشمة من مخفيات الاجنحة وفضيلة

معددا من ١١ إلى ١٥ . أصلها مالى البشرى ، بحري الصفة السفل . عتاقها الزهرية وملة تقم من ٦ إلى ١٢ . زهرة لونها الى الأبيض الموشع بالازرق || ازهارها يستمر طول شهر حزيران .

١٦٣٨٧ - صَفَرَاءُ مُدَهِّجَةٍ

Sophora chrysophylla (S). Sophora doré (F).

جنية تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . ساقها قليلة الشوك . أوراقها مستطيلة ، وريقاتها غيبية التصل ، خلية البشرة ، معددا يراوح بين ١٧ و ٢١ . عتاقها الزهرية لينة . ازهارها الى الصفرة اللحية النواجية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٣٨٨ - صَفَرَاءُ الصَفْعِ هو الزرع المذرك .

١٦٣٨٩ - صَفَرَاءُ الْجَلْدِ
Pachydermes (F). Pachydermatous (E).

١٦٣٩٠ - صَفَرَاءُ
Méricarpe (F). Mericarpe (E). كل غشاء من اخبية الثمرة النافذة التي لا تنفلق من زورها .

١٦٣٩١ - صَفَرَاءُ هي الإبل نوع من العمر ، اطليها .

١٦٣٩٢ - صَفَرَاءُ
Scithare (F). صكة بحرية تسمى سطار . اطليها .

١٦٣٩٣ - صَفَرَاءُ *
Egrisé, Egrisée (F). Bort, Diamond-powder (E).

الصقال مسحوقة لأم من اللاس يستعمل في صقل الحجارة الكريمة وبها اللام .

١٦٣٩٤ - صَفَرَاءُ
Cri des oiseaux (F). Cry of the birds (E).

١٦٣٩٥ - صَفَرَاءُ *
Cicadula (S). Cicadula (F). جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الوزيديات . أنواعها عديدة . أصلها العالم . مرتها الصفات والبراة وعظم النباتات المنفعية والمائية . أجسامها اعطليجية الشكل تطول من ٣ الى ٦ سم . أنثاها مختلفة الألوان عادة الزرقة منها الاصفر والأخضر والحظلي والبناني ، الخ .

١٦٣٩٦ - صَفَرَاءُ
Sacré (F). Sugared (E).

١٦٣٩٧ - صَفَرَاءُ
Substance sucrée (F). Sugary substance (E). ج سطار . كل مادة سكرية .

١٦٣٩٨ - صَفَرَاءُ
Faucon (F). Falcon, Hawk (E).

الصقر يجمع مقور وصقار وصقارة والأش مقرة . والصقر بالرف البدوي كل طائر يصيد ما خلا العقاب والسنر . فالصقر يشمل البازي والشاهين والفرق والحُرّ والباشق والبيشق والسقاوة والزرزق واليزيد... والصقور عند البزادة تفتان : الصقور والبزاة . فالصقور سود العين معددة الرؤوس طول الاجنحة قصار الارجل . والبزاة صفراء العين مدورة الرؤوس قصار الاجنحة طول الارجل || اما الصقر بالرف البدوي البلي فهو جنس طير من عمارة الصقور وفضيلة الصقريات . أنواعه ثمانية منتشرة في جميع اقطار العالم جميعها حسنة الشكل والمعتاد ،



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ

١٦٣٨٧ - صَفَلَاب سُورِي *، سِتْكُرُوْءَا، حَشْرَكَة

الحوري

Asclepias syriaca, *A. cornuti* (S). *Asclépiade* de Syrie, *A. à ouate* (F). Silk cotton, Wild cotton (E). *Echte Soelenpflanze* (D). *Asclepiade di Siria*, *Falso cotone* (I).

جَنَّة تَعْلُو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اورثتها مستطيلة او رشيبة التجميع. نصلها احليجي الشكل بطول من ١٠ الى ٢٢ سم. ويغرس من ٥ الى ١٢. ازهارها الى العفرة الخضر الزاهية يعطوا مزيج احر. ثمارها كمار احليجية لشكل، مدرة البشرة، فسقية اللون، تلبها حورية ابيض. يزورها صغيرة مستطيلة مفلطحة سوداء اللون.

١٦٣٨٨ - صَفَلَاب عُسْكُوِي *، حَشْفِيَّة ذَاكَة

الجنجب

Asclepias tuberosa (S). *Asclepias tuberosa* (F). Butterfly weed, Tuber root (E). *Echtes mudarplanze* (D). *Asclepiade tuberosa* (I).

بجلة عمرة تَعْلُو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اورتها عسكوية. ساقها زبداء لامعة المصانة البنية. اورثتها لائفة، احليجية، مسطلة. ازهارها حامية، توجها برتقالية، يلبتها صفر. ازهارها يشتر من تمر الى ايليل. يستخرج من ساقها مادة جيرية فعالة تشمل في الطب. ويقال ان اورثتها وازهارها تعيد المصاب بذهاب الجنب.

١٦٣٨٩ - صَفَلَاب كُفْرُوِي

Asclepiade officinale

هو الخلقة من النباتات الطبية، اعطيا.

١٦٣٩٠ - صَفَلَاب مَدَقْسِي *، زَهْرَة الدَّم

Asclepias curassavica (S). *Asclépiade de Curaçao*, *Aplica sauvage*, *Herba à sang* (F). Blood flower, Wild ipocacunha (E). *Bestard ipocacunha* (D). *Ipecacuna de Antille* (I).

بجلة عمرة تَعْلُو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اورثها سنائية النصل تَعْلُو من ٥ الى ١٠ سم. ويغرس من ٢ الى ٤. ازهارها صوانية التجميع، هامة الازركار، وردية اللون او حراء. ازهارها يشتر من زهران الى ثرين.

١٦٣٩١ - صَفَلَابِيَّات

Asclepiadaceae (S). *Asclepiadaceae* (F). *Asclepiadaceae* (E).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل الصقلاب والبلغ والعشر والشقفة والشراشيف واليديد الخ.

١٦٣٩٢ - صَفَلَاب * Cyclops

Cyclops (F). *Cyclops* (E).

جنس ذويات مائية من القشريات الدنيا مجليات الارجل نصيلة الصقلويات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق ودعان البلاد الباردة والمعتدلة الحارة. اجسامها سكية التركيب تَعْلُو من ٤ الى ٧ سم. وزوجها ملتصقة بالخلقة الصدرية الاولى. حوريتها متعاطسة فيقتل الفاخر اليها حياء واحدة. يلبتها جرابية الشكل. قوائمها ثنائية للمفاد باستثناء الزوجين الاول والسابع. الاولان تراوح من الثيرة الكيفية الى اللقطة والمعلقة البحرية للمزج.

١٦٣٩٣ - صَفَلَابِيَّات Cyclopidae

Cyclopidae (F). *Cyclopidae* (E).

نصيلة ذويات مائية من القشريات الدنيا مجليات الارجل.

الذويات. انواعها المعروفة ستة اصنافها البلاد الباردة. تألف الجراح. قوتها الزهراء اولاً ثم التطور. اجسامها صنية القد، شبه ييشية الشكل، زبداء القشور دبسية الزباني. اولها سوية الالوان الزاهية يعطوا في كولها زوج او زوجان من النقط السود.

١٦٣٨٩ - صَفَرِيَّات Falconidae

Falconidae (F). *Falconidae* (E).

فصيلة طير من قسم الصقور تنتمي الى فئة كواسر النبار وردية الجوارح. تقبل ٦ عمارات وزها ٢٠٠ جنس ونوع. تتميز باجسامها الربية المسنونة التجانس الشكل. رؤوسها متوسطة الحجم كاسية الريش. حوريتها نائفة، شهلة، مخيمرة داخل اورثاتها الباردة الحليج. امتها قصيرة. ساقها كبيرة وارة. مناسرها قصيرة تتميز بمخاطها اللوية المسنة الاطراف. جهادها شديدة الانسلاف، حادة المهاجن. ارضها متوسطة الطول تغلب فيها السرولة ومنا حارية. غالبا ذرية قوية متغذية. انثاها في معظم الاجناس اكبر قدماً من ذكورها. تقتصر السيد وتنتقل حرك بمخالبها. تعيش ازواجا او افراد لا يجمعها سوى فطرة الانضمام الى الرصيل في الانواع القليلة. وهي تشمل، بدون ريب، اجسر الطيور وانها خلفا واقولها سكية واصليها حوداً. اما عماراتها الست فهي: العيقان والهداء والصقور والبراز والسفالات والمزيات.

١٦٣٨٤ - صَفَرِيَّات Scatopae

Scatopae (F). *Scatopae* (E).

جنس حشرات من فصيلة الصقلويات وردية ذوات الجنان. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم القار العالم. اجسامها صغيرة تَعْلُو من ٢ الى ٥ سم. وزوجها صنية مزوانية الشكل. حوريتها فارقة منه الشقين. مرافها قصيرة. ملابسها ريشة الغلة. قرونها الاستشعارية نحلة وقصيرة. كولها احليجية يعطوا خل قصير. يلبها مستقيمة الظهر، مستقلة الطرف المستطير. رؤفها كبيرة، قسطانية التخصيب. قوائمها مستطيلة، عادمة الحلب والمناس. ملجسها الحياي كرمجي. تألف الاماكن الرية. يكثر وجودها على الاحشاب والازهار. اسارها نائلة او داسة.

١٦٣٨٥ - صَفَلَابِيَّات Scatopidae

Scatopidae (F). *Scatopidae* (E).

فصيلة حشرات من رية ذوات الجنان. اجسامها وازواجا المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. جميعها داسة او نائلة. تألف الذنات والجراح والهداق والمزاق اربعة الى ثمانية. تَعْلُو من ١ الى ٩ سم. رؤوسها مفلطحة. حوريتها كلبية الشكل. مرافها وملاسها قصيرة. قرونها الاستشعارية نحلة قصيرة. كولها احليجية. يلبها شبه مدنية الشكل. رؤفها قسطانية التخصيب. قوائمها مستطيلة. يرقاتها داسة او نائلة. اشهر اجناسها الصقلويات.

١٦٣٨٦ - صَفَلَاب Asclepias

Asclepias (S). *Asclépiade* (F).

جنس نباتات برية وريزية من نصيلة الصقلويات. انواعها عديدة. جميعها جنات ومجلات واحشاب متعاطلة الاوراق الكاملة. ازهارها طبقية التجميع اطية او هامة الازركار. يزورها مفلقة زغب نام اليقة قصيرها شبه الحرير. اشهر انواعها ما يتبع.



صقلاب سُورِي



صقلاب عسكوي



صقلاب مدسي



صقلاب

Detrictocole, Detritophaga (F). • صككام • ١٦٤٠١
Detritophagous (E).

صفة الحشرة التي تعيش على التفاتيات العضوية من أي مصدر كانت .

Naja (S). • كوبرا • ١٦٤٠٢
Naja, Cobra (F). Cobra (E).

جنس حيات خبيثة من أفاعيل الأفاعيد . أنواعه المعروفة عشرة ، سمة منها أفريقية المهد وثلاثة آسيوية ، أولها إلى القشة يطولها تحطيط اسمر ويقلع أصفر . أجسامها عادية الشكل طولها يختلف مع النوع وهو يراوح ما بين ٨٠ و ٤٥٠ سم . تتميز بأحلقها المخططة المستمرة التي تنتفخ عند النفث || جميعها سامة لدغتها يمتد لا تنفع لها الرقبة لأنها سريعة الطب والتشفي || أشهر أنواعها ما يتبع .

١٦٤٠٣ - صيل أسود العنق • رَحْمَة
Naja nigricollis (S). Naja à cou noir (F).

نوع من الصل يكثر في بعض مناطق أفريقية الشرقية اغصها أبيضاً والصلوات . ثوبه إلى القشة المخططة بالأصفر والاسمر . عنقه أسود ، رأسه أخضر اسمر . لسته ميتة .

١٦٤٠٤ - صيل الصحراء • ١٦٤٠٤
Naja du désert (F).

نوع من الصل موطنه الصحراء الكبرى وأفريقية الاستوائية . ثوبه إلى الصبغة المخططة بتجلمج أصفر . لسته قتالة .

١٦٤٠٥ - صيل النوبة • ١٦٤٠٥
Naja flava (S).

نوع من الصل يكثر في النوبة والسودان ثوبه إلى الصبغة النابية يطولها تجلمج اسمر . لسته ميتة .

١٦٤٠٦ - صيل مصري • ١٦٤٠٦
Naja, Aspic d'Egypte, Serpent à collier (F). Egyptian cobra, E. asp. (E).

نوع من الصل يكثر في البلاد المصرية . لسته ميتة . وقد اجمع المحققين على أن هذا النوع من الصل هو الحية التي كان يقسمها قدام المصريين وهو الحية التي اختارها كليوباترة القضاة على سحابها .

١٦٤٠٧ - صيل هندي • ١٦٤٠٧
Naja tripudians (S). Naja à lunettes, Serpent à lunettes, Cobra indien (F). Indian cobra (E).

نوع من الصل يكثر في الهند . لسته قتالة . يقال أن عدد ضحاياه الممتدة السنوية . مع الصل الحثي ، لا يقل عن ٢٥٠٠٠ لسته ممتلئ من الأعداء والرأس .

١٦٤٠٨ - صيل هندي ، صيل الغاب ، صيل فارسي • ١٦٤٠٨
Naja bungarus, N. hannah, N. morgani (S). Naja de Perse (F). Persian cobra (E).

نوع من الصل موطنه يمتد من الهند إلى بلاد فارس . يألف المناطق الحارة الرطبة . يطول نحو ٤٥٠ سم . قوته الانامي والقتال والفساد . ثوبه إلى القشة المنقطة بالاسمر يطولها بعض التفرخ الصغير . سمه شديد القاتلية سريعها . لسته تقضي على الثور بطرف ثلاث دقائق .

١٦٤٠٩ - صلاكة • ١٦٤٠٩
Dureté (F). Hardness (E).

خاصية مقاومة الصخر للشدش .

اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في مياه البلاد الباردة والمعتدلة الحارة || اجناسها شديدة الصغر ، سمية التركيب . الزوج الانامي من قوائم الذكور ، عند جميع الأنواع ، يمشي للثوزن ، أخذاً || أمرف اجناسها وأشهرها المقلوب .

١٦٣٩٤ - مقلوب • ١٦٣٩٤
Cincloides (S). Cincloide (F).

جنس طير من الجواثم ريشات المنائر وصبغة الطيوريات . أنواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار أمريكا الجنوبية || اجسامها ريشية تطول من ٢٠ إلى ٢٤ سم . مناقبها مستطيلة دقيقة . ألقابها مستديرة الاطراف . أولها صباينة الاوان ، جميعها مكحلة العين ، شبه مقلوبة الاعتقال ، مرقوشة الصلور || قوتها الحشرات والبهائم والقتل .

١٦٣٩٥ - صكور • ١٦٣٩٥
Falconiens, Faucons (F). Falconis (E).

عارة طير من فصيلة الصقريات تشمل سبعة اجناس : الصقر والسفر والكنيع والساوق والزلزير والكمم واليومي . أما أنواعها فكثيرة العدد جميعها ريشة الجبهة المتصلة للذئ . ألقابها قصيرة . سواقلها كبيرة مستطيلة ذلقة . مناسرها قوية سلة الخاطم ، ياربها شديدة الانتفاخ . ارباغها متوسطة الطول . غالبها عارة ذرية . مهدا الماء تجوبه أو تلد في بعض اصنافه . حي من اضل طير الصقريات . طير بسرعة فائقة تحلق في الأجواء الرقيقة وتقتص كالمهم . تصيد مع الصباح ومنه القروب . قوتها الطير والطيوريات وصائر الحيوانات التي تستكن منها .

١٦٣٩٦ - صكولين • ١٦٣٩٦
Secouline (S). Secouline (F).

جنس دويبات بحرية من الصقريات الدنيا جندويبات الغرور || أنواعها المعروفة قليلة العدد تستغل على السرطان وغيره من الصقريات .

١٦٣٩٧ - صكي • ١٦٣٩٧
Masua (F). Club (E).

لست صيني يطلق على ما كان شكله كالصق .

١٦٣٩٨ - صكج • ١٦٣٩٨
Froidure (F). Coldness (E).

هو البرد البسي الذي يبيه خاصة صرد الحمار .

١٦٣٩٩ - صككة • ١٦٣٩٩
Parscaryum (S). Parscaryum (F).

جنس نباتات عشبية معمرة زيا من فصيلة الحمصيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد اصنافها تمتد من الشرق الأوسط إلى الهند || سواها كيفية الخمل والريز تطول من ٣٠ إلى ٧٠ سم . أولها الجذرية قليلة الشكل ، سنانية الاطراف . أولها الجلمية يبيضه الشرن . ازهارها متباين الاشكال منه المتقوي والشكولي . ازهارها عديدة الاوان يكثر فيها الاحمر والأزرق || أمرف أنواعها وأشهرها الصفيقة المستنوية المنقضية الاثمار الزرقاء اللون والصفيقة الكشميرية الشكلية الاثمار الابرجالية || تنوعها صيني يستمر من حزيران إلى تموز .

١٦٤٠٠ - صكيل • ١٦٤٠٠
Liophyle (F).

نمت تعريفه يطلق على كل نبات أولفه مالة اتصال .



مقلوب



صل مصري



صل هندي



صَلَصِل



صَلَب



صَلَابِيَّة بَحْرِيَّة



صَلَابِيَّة مَرُودِيَّة



صَلَابِيَّة



صَلَابِيَّة الحَبَّة

١٦٤١٨ - صَلَابِيَّة مَرُودِيَّة * صَلَابِيَّة مَرُودِيَّة، حَبَّة صَلَابِيَّة الحَبَّة

Cruciella stylosa (S). Cruciella à long style, C. stylosa, Croisette (F). Kreuzwort (E). Kreuzkraut (D). Barbatella, Picimbrasa (I).

حبة مسرة تمشي بين الصخور وتعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقيها فرعاء خالية. أوراقها خضراء متجمعة، سنائية الشكل. سنبها طويلة من ٨ أوراق متصالية. أزهارها وريدية اللون. ثوبها الرائحة || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.

١٦٤١٩ - صَلَابِيَّة

Scléroscia (F). Sclerotic (E).

هي نباتات الصخر.

١٦٤٢٠ - صَلَابِيَّة، حَبَّة، حَبَّة، حَبَّة

Rapport, Relation (F). Connexion, Product, Relation (E).

تتمثل نسب وتنتج البيان للمرض.

١٦٤٢١ - صَلَابِيَّة *، بَلَابِيَّة، شَرَابِيَّة

Cocoon (F). Cocoon (E).

فساد واق يحرق البدن حراري للمادة لتجلب بعض الأسرار ككودات القتر ليأتها وتحولها إلى غذاء.

١٦٤٢٢ - صَلَابِيَّة

Corbicula (S). Corbicula (F). Corbicula (E).

جنس حيوانات مائية من الرضيات صليحات الخياشيم والأرجل بين فصيلة البيرينيات. أنواعها المعروفة نحو ١٠٠ بعضها نهري وبعض الآخر بأف الأنهار في جميع مناطق البلاد الحارة || أصلها مشتق من البحر أو صليحة، شبه قذبة الشكل، مقعرة القعر، مبيضة اللون، مشابة بالأخضر أو البني. مظهرها ثنائية طبقة معتلة اللون. تنشط منقوعة في الأسماك.

١٦٤٢٣ - صَلَابِيَّة، طَلَب، طَلَب

Argile (F). Clay (E).

الصصلال العفوف، صخر طيني مركب من صليكات الألويسيوم، حبيباته دقيقة متجانسة، يتميز بشدة لزوجه عند التبلل وبهشكته وصلابة ذراته. وهو إذا كثرت نسبة في التراب صيره متحجراً صلباً || يوجد في الطبيعة عموماً باكسيد الحديد وأكسيد التنتزيم وغيرها || يستخدم في صناعة الآواني الخزفية. منه الصصلال الترابي الخالي من المواد القلوية والجيرية يستعمل في تجسين الآجران الكهري لانه يتحمل الكثير من درجات الحرارة العالية.

١٦٤٢٤ - صَلَابِيَّة أَيْسِيَّة

Calamin نوع من الصصلال يتميز بيباض لونه وبقلة المواد القلوية التي يحويها وهو دقيق الذرات القلوية المتراكمة. يستخدم في صناعة الآنية الخزفية.

١٦٤٢٥ - صَلَابِيَّة

Argileux (F). Argillaceous (E).

من التراب ما سوى القذبة الكليكية من الصصلال.

١٦٤٢٦ - صَلَابِيَّة الحَبَّة

Phalacrocorax abyssinica (S). Colombar d'Abyssinie (F).

طائر من الصصلال وفصيلة الحبابيات. أشباه تنمي صليحة. طولها نحو ٣٣ سم. ظهرها أخضر زهري، بطنها أصفر، رأسه وفتحة صدره إلى الخلف الرمادي، جناحاه إلى السواد الأصفر اللامع. أنثىها بعد الانتجاب وإزام الأول والثاني، فهي الثالث والرابع || موطنه الجبلية

Colombar (F).

جنس طير من الحبابيات. أنواعه أربعة تتميز بأجناسها الزرقاء وبشكل طيراتها. أنثىها تحفلة الألوان الزرقاء، يكثر فيها الأخضر الأسف المبرج || أشهر أنواعه صصلال الحبيبة، أطله.

Eau trouble (F).

Amande (F). Kernal (E).

هو لب التوت واللوزة.

Sphaerium (F).

Sphaerium (E).

جنس حيوانات مائية سرولية من الرضيات صليحات الخياشيم والأرجل ومن فصيلة البيرينيات. أنواعها المعروفة نحو ٩٠ أصنافاً أهر وبجيرات وأحواض المناطق الحارة والمعتدة الحارة || أصنافها مبيضة الأشكال والاشكال يكثر فيها الإلهيليقي الثاني. القذبة. جميعها مسطوية المستطير. مظهرها ثنائية، طبقة، صليحة أو معتلة اللون || تمشي منقوعة في الأسماك. لها حبة كاتبة الصلص.

Chapcia (S).

Chapcia (F). Chapcia (E).

جنس طير من الجوارث منيات المتأخرات وفصيلة الكروكيات أنواعها المعروفة ثلاثة مظهرها بعض مناطق الهند وفرونت || مسرورها الغابات. مظهرها الحياتي زهري. قوتها الحشرات والديدان || أجناسها طول من ٣٠ إلى ٣٢ سم. أنثىها إلى السواد الخفيف النقيض المبرج أو إلى السواد الغريب بالأخضر. ولونها عامدة المتأخر || تمشي منقوعة في الأسماك. مظهرها ثنائية طبقة معتلة اللون. تنشط منقوعة في الأسماك. مظهرها ثنائية طبقة معتلة اللون. تنشط منقوعة في الأسماك. مظهرها ثنائية طبقة معتلة اللون. تنشط منقوعة في الأسماك.

Sempe (F).

صليحة بحرية للمشي بقله خضراء، أطله.

١٦٤١٩ - صَلَابِيَّة، صَلَابِيَّة، صَلَابِيَّة، حَبَّة

Cruciella (S). Cruciella (F). Cruciella (E).

جنس نباتات خشبية ليفية بريقة من فصيلة الفوفيات. أنواعها المعروفة ٣٦ منها حوض البحر المتوسط وأربعة الغريبة. أوراقها خضراء متصالية. أزهارها حلقية التجميع، توضعها خضراء الفصوص، وأصنافها تشبه التوت || يقال إن بعض أنواعها منقوعة صليحة جليحة، تليق الأسماء وتلتقط الحشم || أعرف أنواعها ما يلي.

١٦٤١٧ - صَلَابِيَّة بَحْرِيَّة *، صَلَابِيَّة بَحْرِيَّة

Cruciella maritima (S). Cruciella maritima (F). Sesside crosswort (E). Färberwurz, Seeröte (D).

حبة مسرة تكثر بين الصخور قرب الشواطئ البحرية. ساقيها فرعاء متضبة، فروجها أغنية الانتجاب، خلية السواد. أوراقها خضراء متصالية، سنائية الشكل، معتدلة اللون، مظهرها ثنائية طبقة معتلة اللون. تنشط منقوعة في الأسماك. مظهرها ثنائية طبقة معتلة اللون. تنشط منقوعة في الأسماك. مظهرها ثنائية طبقة معتلة اللون. تنشط منقوعة في الأسماك.

بعدة البحر يقال انها تبصر البهوضة على بعد مئة متر .
قوتها اللذباب والبعوض والحوام والنمل المنج ومظم الحشرات
الصفيرة || تقيم وكثافتها في اقواب الصخور الطليقة .
ركيزتها الرقيق الذي تفرزه يلفصق بالصخر ويجمد بسرعة .
وكثافتها فيه حلالية الشكل . اثنائها تقع من يمشين الى
ثلاث يضايف تحضنها نحو اسبوعين || اعرف انواعه
واشهرها الصلجان البلبل .

١٦٤٣٤ - صَلْبِيَّان صَبْدُول

Colocalia nidifica (S). Salangane commune (F).
Common salangane (E).

طائر من الصلجان . موطنه جزر الزانج وبعض مناطق
آسية الجنوبية . يألف الحوارق والحادس الثانية || جسمه
صغير القد اعين القوام ، يطول نحو ١٣ سم . يسطه
نحو ٣٠ سم . توجه الى الطلعة يسر في الرأس والظهر
وعين في الصدر والبطن والزنكي . جناحه وذيله رقة زائفة
الى السحرة السوداء . ذيله فارق الطرف . عيناه كبيرتان .
سفلة عينه سوداء اللون . سباله مستدلة الكثافة والطول .
متناره شديد القصر ، مستعرض الشفق ، اعقب الهرة
كما في الطيور الجارحة . رصه قصيرة ، عارية ، عمراء
الون || طيرانه فائق السرعة . قوته الحشرات الصفيرة
والذباب والبعوض والحوام || يقيم وكته في اقواب الصخور
الطليقة . وكته حلالي الشكل والتقدير يشبه بالريق
المزوج بالطحاب البحرية والنفوس والافنة . الاثنى
تقع من يمشين الى ثلاث يضايف تحضنها رسعا نحو
١٤ يوما بينما الذكر يلين لها الغذاء || وفي الصين ويجزو
الزنانج يتأقنن على اكل وكثات الصلجان ، مطبوخة
او مسلوقة ، لانها شاقلة لا مؤذية .

١٦٤٣٥ - صَلْبِيَّان

Pack (F). Pack (E).
الصلوب كلفة ضخمة من الجلبه العالم المتراكم المالح الحاتم
قرب القطب الشمالي .

١٦٤٣٦ - صَلْبُور

هو السلور ، اطلبه .

١٦٤٣٧ - صَلْبِيَّان الْبَحْر

هو كوكب البحر ، اطلبه .

١٦٤٣٨ - صَلْبِيَّان الْجُثُوب ، نَعَم

la Croix du Sud (F). the Southern Cross (E).
صلب الجنوب ونعم اسمان لكوكبة نجوم واسعة مركزها
الجنوب فيها اربعة نجوم مزدوجة وضادة ونجم مثلث من
المرتبة الثانية يسمى « ثير نعم » .

١٦٤٣٩ - صَلْبِيَّان الشَّال

Croix du Nord (F). Northern Cross (E).
صلب الشمال مجموعة من ستة نجم تلاصق كوكبة الدجاجة .

١٦٤٤٠ - صَلْبِيَّانَة

الصلبية مثيلة جامدة في هيكل الحشرات .

١٦٤٤١ - صَلْبِيَّان

Crucial, Cruciforme (F).
Cross-shaped, Crucial, Cruciform (E).
حل شكل صليب .

وسائر افريقية الشرقية والوسطى . يعيش اسراباً صغيرة
برايح عددها من ٢٠ الى ٣٠ . يألف النابت والاحراج .
قوته القار والحروب . يذئن عنه في تجاويف الاجمار .

١٦٤٤٢ - صَلْبَاة

Cirrocaulis (S).
Cirrocaulis (F). Cirrocaulis (E).
حيوان بحري مفترون وحيد الجنس والنوع من الرضويات
وفصيلة الصلحاحيات . اصطناع بحار البلاد الباردة اصنها
بحار الشمال || جسمه بيضي الشكل . زصافته ضيقة
مستوية الاطراف . رأسه مستعظم الجرم يحمل ثمانية
جرامز عظمية ، متساوية الطول ، مجوزة نصف واحد من
الحامس . جرامزه واسطحتها عند انتفاها تشكل قمماً كبيراً
قاعته القم .




صلفاة

١٦٤٤٨ - صَلْبَاة

Cirrocaulis (S).
Cirrocaulis (F). Cirrocaulis (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات ورأسها الاربيل
مزدويبات الخشوم . ثمانية الجرامز || لها جنس واحد
معروف حتى الآن يسمى صلفاة .

١٦٤٤٩ - صَلْبُور

Glycymeris (S).
Glycymeris (F). Glycymeris (E).
جنس حيوانات بحرية من الرضويات صفحيات الخياشيم
وفصيلة الصلغويات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد
منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها
كبيرة مستطيلة المنحاط ، عتية الاصماف المخشعة من
الطين . اصمافها فيه بيضبة الشكل ، مستوية التحزيز
الخفيف || تعيش منفعة في الرمال قرب الشطوط ||
لحمها مأكولة .



صلبور

١٦٤٥٠ - صَلْبُورِيَّات

Glycymeridae (S).
Glycymeridae (F). Glycymeridae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات صفحيات الخياشيم
اجتمتها وانواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة
في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || تتميز بقشورها
المستطيلة وباصمافها الصلبة المتفربة من الطرين || اعرف
اجتمتها واشهرها الصلغوم والصلكيك .

١٦٤٥١ - صَلْبِيَّان

هو الخلف من النباتات العلية ، اطلها .

١٦٤٥٢ - صَلْبِيَّان

هو الاقليل ، اطله .

١٦٤٥٣ - صَلْبِيَّان

Colocalia (S).
Salangane (F). Salangane (E).
جنس طير من فصيلة الباميات . انواعه المعروفة قليلة
العدد جميعها من طيور الصين والهند وجزر الزانج . تألف
المواضع الرقيقة الكثيرة الامات والصدور || اجسامها
صغيرة القد ، وشيقة القوام هيفاء . اجتمتها ذلقة غارقة
الطول ، اطول قواعدها الثانية . اذنانها فارقة الطرف ،
عشارية القرائ . عيشها كبيرة . سبالها مستدلة الكثافة
والطول . متنارها بالغة القصر ، مستعرضة الاشفاق التي
تحمل في وسطها . تحت رباط اللسان ، جيماً وصيماً
يحتوي كية من الحشرات والحوام . اصمافها قصيرة ،
عارية ، عمراء اللون . اصمافها لضيقة . غالبها متفربة ،
مقبضة ، حادة الاطراف || طيرانها فائق السرعة . وتضمن



صلبان بلبل

١٦٤٥٠ - صليبيات * Alepocephalus (S).

Alépocephale (F). Alepocephalus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصليبيات. انواعها المروقة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها لينة تعيش في الاعماق التي يراوح غورها من ٦٠٠ الى ٣٥٠٠ م. تحت سطح الماء. اجسامها مستطيلة مضيئة. تتميز ببروسها الرماطة الباردة الخرافش. اشهر انواعها صليبة المتوسط (Alepocephalus rostratus).



صليبة

١٦٤٥١ - صليبيات * Alepocephalidus (F).

Alépocephalidés (F). Alepocephalidés (E).

فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات الخياشيم. اجناسها المروقة خسة اما انواعها فضيلة. جميعها لينة تعيش في الاعماق البعيدة للبحر ولا تقترب من الشاطئ الا في زمن الترسد. جميع اجناسها مستطيلة الاجسام مستطيلة الرؤوس الباردة الخرافش.

١٦٤٥٢ - صليبيات * Cyanocorax chrysops (F).

Cyanocorax à capuchon, Cynurus à capuchon (F). Cyanocorax chrysops (E).

طائر من فصيلة الثريان. اصابته معظم مناطق امريكا الجنوبية. يألف الغابات والاسراج المبعثرة الاشجار. قوته الحشرات والفراخ والبروز. اجسامه مستطال الله بطول نحو ٤٠ سم. وله سم القطن والفرور الى السواد المايل يمتد من تحت حمار العين الازرق. ظهره ورجلاه وذنبه الى الزرقة الجميلة المبلقة بالابيض. حشوته وبطنه وانيته الى البياض الناصع. يدق عنده في الاشجار الرقيقة. الاثنى تحسن من ٣ الى ٤ بيضات بينا الذكر ولين لها الفناء.



صليبة

١٦٤٥٣ - صليبيات * Ceryle (F).

هو الزراف الفاتح، اطبا.

١٦٤٥٤ - صليبيات * Lathridium (F).

Lathridie (F). Lathridius (E).

جنس حشرات من فصيلة الصليبيات وبقية عمديات الاجنحة. انواعها المروقة نحو ١٥٠ اصنافا تنبت من اشرف الاقصى الى اطراف اوروبا. اجسامها صغيرة، قاطبة من ٣ الى ٣ م. رجليها غروبية الشكل. حبيبات صغيرة، ناعسة. قوتها الاستشارية قليلة. تأثيرها نظامية. ملاسها مستطيلة. كولسلها وبطنها والحادا فضلة. امحادها لاسخة. فسيحة القدم والفرور. اثنائها متباينة الالوان والماجات. جميعها دامت تعيش في الجفافة والبردي النباتي وعلى الطحالب والفطور وتحت القشور والحاء.

١٦٤٥٥ - صليبيات * Lathridiidae (S).

Lathridiidae (F). Lathridiidae (E).

فصيلة حشرات من عمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المروقة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم. اجسامها شديدة الصغر طولها من ٢ الى ٣ م. رجليها غروبية الشكل. حبيبات بارزة. تأثيرها نظامية. ملاسها مستطيلة. قوتها الاستشارية بالغة الطول. مهدبة. حركتها من ١١ فضلة. كولسلها فضلة. امحادها لاسخة. قوتها لينة. ارسافها ثلاثية الشكل. جميعها دامت تعيش في الجفافة والبردي النباتي والطحالب والفطور. اشهر اجناسها الصليبة والفرور.



صليبة

١٦٤٥٦ - صليبيات * Cruciferae (S).

Crucifères (F). Cruciferae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفصائل. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. معظمها عشبي. اورثها متعاقبة. ازهارها نظامية رباعية الفصل والبتلات المتصالية. اصدانها سداسية، مغلفها ثنائية الكبريل، ثمارها غروبية. زهورها دقيقة زينة المادة. وهي تشبه الكثير من النباتات البتلية المشهورة بخواصها المضادة للحرق كالفلور والجرول والفلج والرشاد والقررة والجرجير.

١٦٤٥٧ - صليبيات

هي الصليبية، نبات من الفصائل، اطبا.

١٦٤٥٨ - صليبيات * Soliya (S).

Soliya (F). Soliya (E).

جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الخياشيم. مهدبا بعض مناطق اسراليا. سوقها فناء ترتفع من متر الى ثلاثة امتار. اورثها ابيدة، متعاقبة، كاملة. ستانية الاتصال الجلامدة. ازهارها عشوية التجميع، حلاج. ازهارها صغيرة القدة، مستطيلة الحادق النسيجة. لها نومان ممروران الصلبة الحاذقة والصلبة الصغيرة الزهر.

١٦٤٥٩ - صليبيات صغيرة الزهر

Soliya parviflora (S). Soliya à petites fleurs (F).

نوع من الصليبة. ساقها ترتفع من متر الى ثلاثة امتار. اورثها متعاقبة، صغيرة الاتصال، جملة الحصار الاسع الحلاج. ازهارها شبيهة الصفر. ثنية اللون. تنويرها صيفي.

١٦٤٦٠ - صليبيات * Soliya heterophylla (S).

Soliya heterophylla (F).

نوع من الصليبة. ساقها ترتفع نحو ٢٠٠ سم. اورثها جملة الحصار الاسع الحلاج، ناصلا حاذقة طولها من ٣ الى ٧ سم. ورمض من ٥ الى ١٥ م. ازهارها مستطيلة الحادق، صغيرة القدة، ينفاء اللون. تنويرها صيفي يستمر طوال شهر تموز.

١٦٤٦١ - صليبيات، صوبجكة * Argent pur (F).

Naked silver (E).

الفضة الصلابة الخالصة.

١٦٤٦٢ - صليبيات * Cardilia (S).

Cardille (F). Cardilia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرنوبيات صليبيات الخياشيم وفصيلة الصليبيات، انواعها للماصرة المروقة قليلة العدد اصنافا متباينة البحر الاحمر والهند الهندي. اصدانها شبه لينة الشكل مهدبة، ملوكة اللون المكورة. تعيش لاصفة بالصخور القليلة السمق. لفتها كليف المائدة قليلها.

١٦٤٦٣ - صليبيات * Cardillidae (S).

Cardillidae (F). Cardillidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرنوبيات صليبيات الخياشيم وانواعها للماصرة المروقة قليلة العدد جميعها جنس واحد. اصدانها شبه قبية الشكل، مكورة اللون اللينة. اجسامها صغيرة وطعامها كالك. صمغياتها كثيرة في الاراضي المائية.

1٦٤٦٧ - صَمْعَر * Mesodesma (S).

Mésodesme (F). Mesodesma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وصفيحة الصمريات. أنواعها المعاصرة المروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة مقبسة للثأب. أصدافها عديمة الشوئن أو بيضية. تعيش لاسقة بالصخور القريبة من السطوط.

1٦٤٦٨ - صَمْعَرِيَّات * Mesodesmatidae (S).

Mésodesmatidés (F). Mesodesmatidae (E).

صفيحة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم أجسامها المعاصرة المروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد ، بيضية الشوئن أو عديمة. تتميز بقصر شفافها وبصغر أرجلها الشديدة التطيل || أشهر أجناسها الصمعر.

1٦٤٦٩ - صَمْعُور * Haplocerus (S).

Haplocère montanus, Oréanus montanus (S). Haplocère montagnard, Oréanus montagnard (F). Oréanus of Kennedy (E).

حيوان لبنى فلب مجتر وحيد الجنس والنوع من ذوات الأضلاع ، عجوزات القرن. موطنه الجبال الريفية النائية وبعض الأضلاع النائية ومنها ألسكا || جسمه صغير القد وبضعه بطول نحو ٨٥ سم. ويرتفع نحو ٥٥ سم. قرنيه بطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. رأسه مع العينين والأذنين والقرنين كراس الطير. جسمه كبش الماعز. أذناه مستقيمة الأطراف. حياته وقرباه إلى الأسود الحالك. شعره مستطيل يغطي كامل الجسم. لونه الأبيض الناصع. فرع الإنثى ثلاثي الخلف. يحملها يقوم نحو ستة أشهر تضع عنه ثمانية بطورا واحداً || أجله قليل البدن إلى في فصل الشتاء الذي يستمر من تشرين الثاني إلى أواخر آذار.

1٦٤٧٠ - صَمِغ * Gomme (F). Gum (E).

مادة لزجة دافئة عديمة الطعم والرائحة تفرزها بعض النباتات إما طبييا أو بتأثير حالة مرضية. لذلك فالصمغ مادة الاشكال ، خلطة التركيب وهي تقسم عادة إلى قسمين : قسم الصمغ القابلة للذوبان في الماء. وقسم الصمغ التي تنحصر الماء. أشهرها الصمغ العربي الذي يستخرج من السط وهو شائع الاستعمال ويدخل في معظم المستحضرات الطبية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي.

1٦٤٧١ - صَمِغ الدَّهْنَاب

هو الصمغ الآخر. اطلبه.

1٦٤٧٢ - صَمَل * Durclir (F). To harden (E).

عمل لشجر : لم يجد رأيا ففعل.

1٦٤٧٣ - صَمَل ، أَبُو الْهَوَكِ Sphinx (F).

Hawk-moth (E).

جنس حشرات من فصيلة الموليات ، أنواعه نحو ٦٠ منتشرة في جميع الأضلاع المالمة. معظمها من الفراشات الصغيرة المتوسطة الحجم أو الكبيرة. أجسامها مرفوعة الشكل. وذاتها كبيرة مزعزعة. قرونها الاستشعارية قلادة. برقاتها كبيرة القد ، مرطبة الجسم. عاداتها عادية || أشهر أنواعه الاقتصادية التي تركب النبات ما يتبع.

1٦٤٧٤ - صَمَل الحَذَائِقِ * Sphinx ocellata (S).

Sphinx demi-paon (F).

فراشة كبيرة القد خيلطة الجسم ، تطول نحو ٤ سم. قرونها

1٦٤٥٦ - صَيَاخ الأَذْن Conduit auditif (F).

Cavity of the ear (E).

قناة الأذن التي تشكل صلة الوصل بين القسم الخارجي والداخلي.

1٦٤٥٧ - صَيَاخَة Hélicotropleme (F).

Helicetropism (E).

أثر اتجاه الضوء في انحناء النمو النباتي. لذلك فهو يسمى إجابيا عندما يكون النمو باتجاه الضوء وسلبيا عندما يكون في الحالة العاكسة.

1٦٤٥٨ - صَيَاخَة ، صَيَاخَة مَبْدُولَة Picarel commun, Gerret (F).

سمكة بحرية تسمى شائعة مبدولة ، اطبا.

1٦٤٥٩ - صَيَام Soupepe (F). Valve (E).

1٦٤٦٠ - صَيَان Allos (F). Pan (E).

رأى من القرب صلب الهيكله نشطت صلاته بعض المواد الطرية أو أكسيدات البوليبيروم أو كربونات الكلسيوم أو ميروكسيدات الحديد.

1٦٤٦١ - صَمَك Sous-espèce (F). Sub-especies (E).

تأني الصمة في تصنيف الأسماء بين النوع والفرع وقد تشمل عدة غريب كان أن النوع يشمل بعض الصم.

1٦٤٦٢ - صَمْرَاح * Lutraria (S).

Lutnaire (F). Lutraria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وصفيحة للصمريات. أنواعها المعاصرة المروفة نحو ٣٠ معظمها من صلب البحر الأبيض المتوسط || أصدافها أحليجية الشوئن ، متساوية الصاريح لاشعورية الأضلاع ، غضة الصفة البيضاء الموضحة بالأخضر والآخر || تعيش منفردة في الرمال المعصورة بالأم. يكثر وجودها قرب مصبات الأنهر.

1٦٤٦٣ - صَمْرَان Penase (S). Pénée (F).

جنس نباتات جنينية برية من فصيلة الصمريات. أنواعها قليلة ، منها البلاد الحارة جميعها شائعة يستخرج من جذع طينا صلبة صلبة طرية تستعمل في العلاجات الخارجية أصحها الجروح. ويقال أنها تشد الجلد وتزيل نجسها.

1٦٤٦٤ - صَمْرَالِيَّات Peneceae (S).

Pénéciées (F). Peneceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة الضمالات مرتفعة المبيض. أشهر أجناسها الصمران.

1٦٤٦٥ - صَمْرُوحى

سمكة بحرية تسمى شائعة ، اطبا.

1٦٤٦٦ - صَمْعَاء Actus (S). Aote (F).

جنس نباتات برية معمرة من صلب البلاديات وصفيحة للقرنيات البشراية. أنواعها قليلة جميعها جنات قرصه شائعة قليلة الأوراق الملحقبة الشكل الصغيرة القد. أثمارها علقية تأدية صفراء اللون ، ويقال لها ثنية الجروح وتقتني حل معلها.



صم



صمور



صم الحذائق

اسود. سيجفها وريدة المراج يطولها حصار بني ينيهي
عند الرأس. رواشها موشجة وبجعة || رقبها مستطيلة
الشكل سمراء اللون تظهر في تموز ويثبي حتى ايلول.
تركب اذئاب جميع الصنوبريات.



صمل الحور

١٦٤٨١ - صَمَلُ الْهَرَبَرِيَّةِ هو صمل البزنج، الجلبه.



صمل الكرام

١٦٤٨٢ - صَمَلُ الْكَرَمَةِ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَغْبَرِ
Pergesa elpor, Chero-campa celery (S). Sphinx de la vigne (F). White-head sphinx (E).

فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣٢ سم. جسمها مردي
الشكل، ثوبها الى الصبغة الصائبة السطام المراج.
رواشها موشجة بالاسمر والوردي الليلي، توطيشها قلبي
مفرغ. رواشها الاماميان مهلهل بالمراغ نقي || رقبها
مستطيلة الشكل، شديدة الخضار تحمل حل جانيي رتبها
الطنية بقما سود يعطها اطار اصفر. تظهر في تموز ويثبي
حتى ايلول. تركب اوراق الكرمة تفنيزها.



صمل الكرام

١٦٤٨٣ - صَمَلُ الْكَرَمَةِ الْمُحَطَّطِ، دَلِيلَكَة

Dalephila livornica (S). Déléphila de la vigne (F).
فراشة مجالة طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الصبغة السمر،
ونقط بطنها اربعة خطوط متوازية سيد وبض. رواشها
موشجة مختلف الالوان يكثر فيها الاسمر || رقبها كبيرة
القد خضراء اللون. تبيج ظهرها احر الخط يكتنفه من
حل جانيي خضار اصفران يتخللها بقع سود نظامية تدنو
جميع التراجيات. تظهر في اواخر حزيران ويثبي حتى
اواخر آب. تركب اوراق الكرمة تصطبها وقد تدمر الكرمة
من اوراقها اذا كثر جمعها.



صمل الكرام

١٦٤٨٤ - صَمَلُ الْبَلَابِ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَلْفَح

Sphinx convolvuli, Hiera convolvuli, Protoparce convolvuli (S). Sphinx du liaron (F).
فراشة مجالة تجوب البلاد. طولها نحو ٤ سم. ثوبها الغالب
وبادي اللون. رقبها غطلة وبجعة بالاسود، ملتقى تجديدها
يكون رقم ٨ || تركب اوراق الالباب والبطاطا وغيرها.



صمل البلاب

١٦٤٨٥ - صَمَلُ النَّحْلِ، جَالِيرِيَا

Galleria (S). Gallérie (F).
جنس ششرات من سرشنيات الاجنحة فضيلة الناريات.
انواعه عديدة بعضها يتهدى حل خلايا النحل فيدخلها
ويضع كتفه احيا استطاع فيحلف من رقات دقيقة خمر
سراذيبها وانفاقها في النخاريب تصلف الرصع وتبريق
الصل || اشهر انواعه الموزية اثنان: صمل النحل الصغير
وصمل النحل الكبير.



صمل النحلة

١٦٤٨٦ - صَمَلُ النَّحْلِ الْكَبِيرِ، لَكْرِيَا الشَّمْعِ

Galleria alvearia, G. grisella, Melliphora grisella (S). Alveicole, Taïgne de la cire (F).

فراشة من فصيلة الناريات صغيرة القد، كثيفة الحراشف
طويلة الفراش، وبادية التوب تتقسم نحات وتلايا
النحل حيث تحت مكنها حل النخاريب فيحلف من رقات
نهمة تفكك بالشمع وتغشي حل الرصع والسمل.



صمل النحلة الكبير

١٦٤٨٧ - صَمَلُ النَّحْلِ الْكَبِيرِ، لَكْرِيَا الشَّمْعِ

Galleria corollae, G. mellonella (S). Gallérie de la cire, Fausse-taigne (F).

فراشة من فصيلة الناريات كبيرة القد، كثيفة الحراشف



صمل البلاب

الى الصبغة الصائبة يطولها تجليج، اريد اللون. جنتانها
محتطية. رواشها الاماميان مزخرفان وموشحان. رواشها
الحلاليان موشحان بالحمرة وتقلو كل واحد منها بقعة
بيضية الشكل، سمراء اللون، يمشاه الحار الداعخل، سوداء
الحضار الخلابي المستعرض || رقبها خضراء اللون،
سوداء المتجديج تظهر في اواخر حزيران ويثبي حتى ايلول
تشرن في الاول. تركب اوراق جميع الانجار للشمرة، وقد
شوهت حل الصفصاف والحور.

١٦٤٨٥ - صَمَلُ الْحَوَرِ، أَبُو الْهَوَكِ الْمَوْشَح

Amorpha populi (S). Sphinx du peuplier (F).
فراشة متوسطة القد، طولها نحو ٣ سم. ثوبها الى الطحلة
القدراء. رواشها موشجة ومزخرفة بالاسمر والخطي والوردي
والابيض || رقبها غبراء اللون، خضراء المراج، تظهر
في اواخر حزيران ويثبي حتى ايلول. تركب اوراق
الحور والصفصاف والبتولا.

١٦٤٨٦ - صَمَلُ الْهَوَكِ الْبُزْجِ، أَبُو الْهَوَكِ الْمُبْجَج

Daphnis nerii (S). Sphinx du laurier-rose (F).
فراشة مجالة تجوب البلاد. كبيرة القد، مودقة الشكل
طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى السمر الصائبة المراج يطولها
تجيج ونوشج ومزخرفة وتزيين وتجليج جملة الاشكال
والالوان يغلب فيها الاصفر || رقبها كبيرة القد خضراء
اللون سمراء الظهر والمالب تظهر في اواخر تموز ويثبي حتى
ايلول تشرين الاول. تركب اوراق اللؤل.

١٦٤٨٧ - صَمَلُ الْهَوَكِ الْبُزْجِ، أَبُو الْهَوَكِ الْمُبْجَج

Himas ciliata (S). Sphinx du lilail (F).
فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم. ثوبها الى الصبغة
الاحتطية. رواشها مبهمة ومزخرفة بالاصفر والاسمر.
رقبها صغيرة القد سمراء اللون مجلعة بالاسود. تظهر في
تموز ويثبي الى ايلول. تركب اوراق الزرنيخ والديدار.

١٦٤٨٨ - صَمَلُ الْمَسْمَمِ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَسْمَر

Acherontia atropos (S). Sphinx tête de mort (F). Death's head moth (E). Tockenkopf (D).

فراشة كبيرة القد طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى الصبغة
البنية يطولها تجليج متبرقي. سيجفها سمراء اللون يتوسطها
فيه هيكل تملو بجعة. رواشها غطلة وبجعة ومزخرفة
يشي الالوان || رقبها في الطوارى الاول تكون خضراء
اللون ثم تتحمر نحو الزرق. تميز بطنها اسودين يركبان
الرأس من جانبيه. طولها عند اكتمال نموها يبلغ ١٥
خادتها تطول نحو ٥ سم. لونها الى الغني المايك || الخشرة
الكاملة تقضم المناسل الضعيفة تقضم النخاريب وتلتق
الصل. اما البرقة فتركب اوراق السم والزرنيخ والبطاطا
ومعظم نباتات الفصيلة الباذنجانية. تظهر ملدة في تموز
ويثبي حتى تشرين الاول.

١٦٤٨٩ - صَمَلُ الْمَشْدِيدِ، مارُمْبَا

Marumba quercus (S). Sphinx du chêne (F).
فراشة كبيرة القد طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الاصفر
التيهي. رواشها موشجة بالاسمر والوردي || رقبها مستطيلة
الشكل محتطية اللون. تظهر في تموز ويثبي حتى ايلول.
تركب اوراق السنديان حل اختلاف انوعه.

١٦٤٩٠ - صَمَلُ الصَّنَوْبَرِ، أَبُو الْهَوَكِ الْمُرْشِي

Hylocius pinastri (S). Sphinx du pin (F).
فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم. جسمها صفالي اللون
يسمره تجليج كشي ويغلبه خط حثلي يتوسطه سلك



صنل النسل الكبير



صنل الياسم



صمليقة



صُنْبَة



صَمِيْلَة

اللبية ، مستطيلة الرواشن المزرکشة . ثوبها بني اللون تملو رشفة سمراء . تقسم قتران التملو وتقع مكنها على التخلارب فينتف من رفات حاجية دقيقة لا تلتث ان تكبر فيفسر لونها ويبلغ طولها نحو ٣ سم . وهي تعيش كامل حياتها العذرية على شمع التخلارب تنفضي عليه .

١٦٤٨٨ - صنل الياسم* ، أبو الحول المجذع

Sphinx ligustri (S). *Sphinx du croûble* (F).

فراشة كبيرة القند طولها نحو ٤ سم . ثوبها الى الوردي يتبرعه تجمع اسود ويغطي خط حطلي يملو سلك اسود . حجبها حطلية اللون تملوها جناة سمراء يحرقها حمار اسود . رواشها مزرقة ومجلمة || رقلها كبيرة القند غليظة ، ثوبها الى الصفرة الخضراء يتبرعها تجلمع ايض ونقط حر || تظهر في ايار ويقي حتى اواخر حزيران . تركب اوراق الياسم والليلك والازدرخت .

١٦٤٨٩ - صنل البتخوع ، صنل القريبيون ، أبو الحول المخطط

Calerio euphorbiae, *Dallephila euphorbiae* (S). *Sphinx de l'euphorbe* (F).

فراشة متوسطة القند طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى الوردية السمراء . رواشها بجلة التخطيط والفتيح والخنازير البيض والخضر || رقلها سوداء اللون ، يضاء النشة النليقة ، صفراء النقط الوردية ، حراء الخط البني القاطب ، صفراء الخط البني الجانيبي ، سوداء الملمب . تظهر في تموز ويقي حتى ايلول ، تركب اوراق البتخوع .

١٦٤٩٠ - صنل خيرون

Sphinx empressae (F).

فراشة من حرقشات الاجنحة لدى ابو الحول المصلي ، اطلبها .

١٦٤٩١ - صملاخ هو الاز* ، اطلبه .

Amphideuma (S). *Amphideuma* (F). *Amphideuma* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صمليات التخلارب وصليقة المختبريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في سطر بحار العالم . اصنافها شبه مستديرة الشكل ، قليلة الاصداد ، ثنائية المصادر ، وصيدة لورثالية الاستان الصغيرة . تعيش لاصقة بصخور المجامع المغمورة بالماء . لغتها قليل المادة والكتافة .

١٦٤٩٣ - صمليات ، هوكليات

Sphingidae (S). *Sphingidae* (F). *Sphingidae*, *Sphinx moths*, *Hawk moths* (E). *Schwärmer* (D).

فصيلة حشرات من حرقشات الاجنحة المخططات لزيان . اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ معظمها من القراشات اللدوية للمرح . اشتهر اجناسها الصنل .

١٦٤٩٤ - صمكيل

Myocetidae nobile (S). *Myocetidae remarquable* (F).

نبات حشبي معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحمحميات . ساقه متعصبة زياء تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه لحمية كبيرة شبه قلبية الشكل تطلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . نصلها بجلة الخضر الزاهر . ازهاره متفويدي الجميع للمكاثف . ازهاره صغيرة الحجم ، زقاء اللون ، عادمة العرف || تنويره ديمبي .

١٦٤٩٥ - صنوع

Bulbille (F). *Bulbil*, *Bulbic* (E).

اسم تعريفي يطلق على الزئمة الحوالية المحرشفة الصلبة التي تظهر غالباً في ابط الورقة والتي يفصلها عن النبات الام ويبرزها في التربة تنمو وتنتج .

١٦٤٩٦ - صنوكة شهبانه

Elaemocha grisea (S). *Punalea grisea* (F).

حشرة من فصيلة القاسياتيات . جسمها صغير القند ، مفطع ، مجني اللون ، بطول نحو ٨ سم . ثوبها الى الصفار البني تملوها شحمة ارجوانية ويثير اسمر ما يجلمه اشهب المواج . رأسها غروطي . خطها متدل الطول . صينها صغيرتان . زباناها مستطيلتان . كويلها قوي اللون . حجبها مدببة الطرف . ظفرانها اغبر اللون . قترانها شفاف . بطنها الى الشبهة يملو في حماره تجلمع اسود || مرملها اوراق الاشجار الحرجية واقرعها باستثناء السنوبريات || راقمها كريمة .

١٦٤٩٧ - صميدكة

Somidia (F). *Somidia* (E).

تعريف عام يطلق على كل جسم مادي مركزه ضمن الخلية يتأثر بمجال الجين السببي .

١٦٤٩٨ - صمبل

Scarleux (F). *Scarious* (E).

نعت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل ما هو رقيق ، جليفي وشبه شفاف او مدقش .

١٦٤٩٩ - صميلة

Amphilius (S). *Amphilius* (F). *Amphilius* (E).

سمكة بحرية بيوض من شالكات الزعانف وصليقة الزقريات . موطنها عند من البحر الاحمر الى المحيط الهندي لغادها || جسمها مستطيل الشكل ، قليل المرض ، بطول نحو ١٦ سم . ثوبها الى الخضار البحري تملوها مابة فضية . رأسها صغير الحجم . مستطيل الخط الاسفي الشكل . زينتها الظهريّة ذيلية الاركاناز . مستطيلة الخط المنس الطرفي . الحاد من ميزاتها انها تنفس بطنها ، الانبوبي الطرف . كتل الحوام الحامضة فوق سطح الماء لتقع فيه فتفترسها || عندها متوسط الصنل مأكلي .

١٦٥٠٠ - صميلة

Thyrta (S). *Thyrta* (F). *Thyrta* (E).

حشرة من فصيلة الصمليات رذية حرقشات الاجنحة . اصلها تشمل بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . تألف الموات التي تكثر فيها الملمويات || جسمها صغير القند ، شبه اسطواني الشكل . يستط نحو ١٦ سم . رأسها مكور . صينها صغيرتان . زباناها مشطيان . خطها متدل القند . ملامسها مستطيلة . اجنحتها مبيضة ومجلمة . بطونها متكافئة الصفات . ظنايبها الخلفية رباعية المناسخ || سرقتها كثيرة ، لاهة ، تعيش على وزن النصال وقد تحيل النصال الى لغانات شبيهة بالابواق .

١٦٥٠١ - صمليات

Thyrididae (S). *Thyrididae* (F). *Thyrididae* (E).

فصيلة حشرات من رذية حرقشات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٩٠٠ منتشرة باكثريتها في المناطق الاستوائية من المابين القديم والجديد || اجسامها صغيرة ، صليقة ، شبه اسطوانية الشكل . يستط نحو ١٥

١٦٥٠٧ - صِيَّامَة النَّبْتِ* ، نَسْنَة النَّبْتِ ، مِيلِيو النَّبْتِ ، عَفْلَوَة زَرْكَام

Peronospora tabacina (S). Mildiou du tabac (F). Blue-mold (E).

وصم فطري سريع الانتشار يركب النبت نيفضي عليه وقد يصيب جميع التبرع البرية والأزدينية والأفلية || صبه فطر مجهرى من الصماء بوله كروي الشكل، ظهر بأوحظ نظر ٢٧ و٤٦ م. تنقله الرياح على أبعاد شامة فينكاد حيث يستطع النبت وسيت تلامحه البيئة || مظهره الخارجى على النبت يقع خلية لينة لا نظلية تشبعت نملو بشرق الساق وصممة النسل الصغرى فغير مراح لينا من الاعصر الى الاخير فالوردي فالصاني فالبنفسجى . وهو يسلط التسع والخلايا ويسبب ذبوا ويلها || نشاله يندرج الى البيئة الرطبة المتفردة الخمراتين القصوى والدينا . وهو اذا أصاب التبرع في الماشات صلب الأوراق وأما الشبيلات . وإذا أصاب الشبيل للبروسة في الخلل شرة أوراقها وأذلهما وحال دون النمو الطبيعي وقد يفضي عليه نيا اذا استمر كامل الأوراق .

يكافح وقتا على الشكل التالي :

- ١ - بتغير مركز الماشات التي ظهر فيها الصاء او بتغير تربة الاكواد ان حراريا او كيميايا .
- ٢ - بتغير زور النبت يسلط سلفات التماس للركر ١٠ ٪ قبل استعمالها بمدة وبيرة .
- ٣ - باحتجاب البذار الكثيف وذلك باستعمال جرام واحد من البذر لكل متر مربع من الاكواد المشتل .
- ٤ - باحتجاب الزرعة في الاماكن الرطبة او الظليلة .
- ٥ - بتخليط كثافة الزرعة اي عدد الشبيل والمتر المربع .
- ٦ - باستعمال الفواطير القليلة التي تمنع انتشار الرمم او تحلل دون انتشاره . نفس منها بالاكتر الماء والزيان والبوليرام على اختلاف اشكاله والانتاجات .
- ٧ - بطف شبيلات الاكواد المصابة عند نشي الرمم .
- ٨ - بثلث جميع الشبيل ان سليه او صابها فور الانتباه من قطات الأوراق .

١٦٥٠٨ - صِيَّامَة الخَشْفَشاش ، مِيلِيو الخَشْفَشاش

Peronospora arborescens, Botrytis arborescens (S). Mildiou des papayevées (F).

وصم فطري يصيب الخشخاش في جميع اصفاه المواتية وفي جميع اطوار نموه من الايدى والحب الى الانزراع والاعمار || يركب الأوراق فوشوها به ان يصعبها ثم يتوكم اخضرها الى المصمة باقتطاعا حركات الشغل الحلية ، الطعلا ، اللون ، البنفسجى المراج || وهو على السووق يقع مستطيلة لا قياسية الحجم تنقر البشرة به ان تفشي بمرساته الحلية البرادية اللين || يكافح باستعمال احد مركبات البوليرام او غيره من الفواطير القامة .

١٦٥٠٩ - صِيَّامَة الشَّوْكَدَر* ، مِيلِيو الشَّوْكَدَر

Peronospora schachtii (S). Mildiou de la betterave (F). Downy mildew of beet (E). Falscher Mehltau der Rübe (D).

وصم يصيب مشر الشوكتدر وولرته لفتية فيمنها عن متابعه نموا او يميل دونه فيبدو الأوراق للمصابة مشيرة . لقد ، مشوحة الشكل ، بنفسجية اللون ، مرمية السط . صبه فطر مجهرى من الصماء مظهره الخارجى يقع لا قياسية

الى ٢٠ م. رؤوسها شبه مكورة . حوزها صغرة . قرونها الاستشعارية غطية ، ملاسها مستطيلة . اعطالها كبيرة . بطونها متراكبة السطح الفلين . مرزاتها مستطيلة . اجنتها مششرة الخضر ، عادمة التهديب . أثولها منزرة || اساروها كتيبة ، غاشلة ، تموش ضمن لفافات من الورق بوقية الشكل || اشهر اجنتها الصيلة .

١٦٥٠٩ - صِيَّامَة* ، مِيلِيو الشَّوْكَدَر

Adenostoma (F).

جنس نباتات جنية ممره من فصيلة الورديات . انولها المهرقة قليلة العدد . سورها فرام . أوراقها ضمية التجميع ، شديدة الصغر ، صغرية الشكل . ازهارها عتقوي . ازهارها مستطيلة الكلوس ، خاسية الشبيلات ، خافتة العرف المستحب ، يضاء اللون او صفراء .

١٦٥٠٩ - صِيَّامَة

Peronospora (S).

جنس فطور مجهرية من عارة الورديات وفصيلة الصناليات . انولها عديدة تتميز بنحوتها البروقية للفتية المستتابة الانفصال . اطرافها شضية ، ثنائية ، لا متشعبة . متجيبها عند المراتش المنشبة . تكاثرها غطوي بوغي . اشهر انواعها واضرها ما يلي .

١٦٥٠٩ - صِيَّامَة الإسْبَنْجَة* ، مِيلِيو الإسْبَنْجَة

Peronospora spinacea, P. effusa (S). Mildiou de l'épaulard (F).

وصم فطري يصيب اوراق الاسبانج فطحا وقد يهب صمها || صبه فطر مجهرى من الصماء مظهره الخارجى يقع لا قياسية الشكل ، منها المستديرة والبنيصة . ظهرها رزاح بين ١٠ و ٢٠ م. تركب النسل في ولة او عمده مرقة فيبدو على الصفحة العليا يتجيب مرتفع عادم اللون يقابله على الصفحة السفلى تجيب على البشرة ، احمل اللون ، بنفسجي المراج || يكافح باستعمال احد الفواطير القامة اعصها مركبات البوليرام || ومن الصبح طرق الوقاية اجتناب الكثافة . والرطوبة .

١٦٥٠٩ - صِيَّامَة البَرِيْلَة ، صِيَّامَة الحَبَابَة

Peronospora viciae (S). (S). Mildiou des pois (F). Downy mildew of peas (E). Falscher mehltau der erbsen (D).

وصم فطري يصيب اوراق النباتات القرنية اعصها الحباب والبريلا والبقية واللؤلؤ والخصم || صبه فطر مجهرى من الصماء . مظهره الخارجى يقع خلية مملوءة اللون ثم تحلل الى السرة تحلل الأوراق وتنبس يلها . يكافح باستعمال مركبات البوليرام والزياناب .

١٦٥٠٩ - صِيَّامَة البَصَل

Peronospora schieldeni, P. destructor (S). Mildiou de l'oignon (F). Blight of onions (E). Falscher mehltau der zwiebel (D).

وصم فطري يصيب البصل في اوراقه الفتية وفي شراجه الزهرية فطحا || مظهره الخارجى يقع بنفسجية الشكل لا قياسية الحجم ، صفراء اللون ، خلية الحار البنفسجى المراج ، تركب الأوراق قصب ذبوا الباكر وتركب الشرايح فترها زمنها من ايصال التسع الى الزمار فتصل من يكافح باستعمال المركبات الحولية المفعلة او مركبات البوليرام والزياناب .



صياء الشوكتدر

١٦٥١٨ - صِنَاجَة ، مَاصُوث ، مَعْمُود Elephas primigenius (S), Mammoth (F), Mammoth (E).

نوع من القيلة البائدة التي عاشت الإنسان في احيائه القديمة المألوفة الى ما قبل التاريخ . وجدا بعض جثثها واقعة على قراعتها مغطاة من حيث الزين في شائع سيرية وغيرها من بلاد الشرق .

١٦٥١٩ - صِنَاج ٥ Sélon (F).

الصنَّاج صنفه داخلية مبرجة عنه بعض الرغويات كالخيار . وهو جسم بيض الشكل المستطيل ، عذب الصلابة الملمة ، ابيض اللون ، يتكون من مواد عضوية مزوية بكميات الكلس . وهو شديد الخفة اي قليل الوزن النسبي لانه كثير الفجوات التي يجمع فيها الازوت والحمض الكربوني .

١٦٥٢٠ - صِنَار Pistane d'Orient (F).

هو اللب الشرقى ، الملبه .

١٦٥٢١ - صِنَارَة

هي الشمس ، تستعمل لصيد السك .

١٦٥٢٢ - صِنَاعَات زُرَاعِيَّة

Industries agricoles (F), Agricultural industry (E).

الصناعات التي تصالغ المواد الاولية الزراعية بوسائل ميكانيكية كصناعة السكر والكحول والطور والزيوت .

١٦٥٢٣ - صِنَاعَة ، كَيْش ، رَقْلَة Fascine (F), Faggot (E).

اغصاب واطصان ردا شبه توضع في وجه الماء لتحصيل قس منه الى مجرى آخر .

١٦٥٢٤ - صِنَاعَة التَحْمِير Zymotechnie (F), Zymotechnics (E).

١٦٥٢٥ - صِنَاعَة التَحْمُر Vinification

علم صنع الخمر وسطها وتجويها .

١٦٥٢٦ - صِنَاعَة السِيَال Vannerie (F), Basket-making (E).

تشمل كل ما يصنع بقشبات الصلصات والخيزان والاسل وغيرها من سلال وينساف ، الخ .

١٦٥٢٧ - صِنَاكَة Totalité (F), Totality (E).

١٦٥٢٨ - صِنَبَار مَبْدُول ٥

Crioccephalus rusticus (S), Crioccephalus rusticus (F), Crioccephalus rusticus (E).

حشرة خاشبة من فصيلة القرنيبات ورتبة مفدمات الاجنحة . اعطائها معظم مناطق الصنوبر || انثا اكبر قدما من ذكرها طول من ١٨ الى ٢٥ مم . اما ذكرها فتطول من ١٢ الى ١٧ مم . ثوبا الى السرة المغطاة الجفراء المولج . سرسها دجوي يتغير من الغروب الى الشرق || تقطر في اوائل حزيران ويقتصر حتى اواسط تموز . تمنع مكها في شرق لحاء الاجبار القائمة والمقطوعة فينتفخ فيراق دقيقة صغيرة تتكسر وتكسر بسرعة وتدمر اللحاء والتشكير الى ان يحل زين الاكمال حيث تتحول الى حوريات ونها الى حشرات جلجلة تهمج السرايب في

الشكل لونها الى البسطة ثم ينحرف ويستقر على السرة . يكافح باستمال الفوطير المركزة على النحاس .

١٦٥١٠ - صِنَاء الصَلِيبِيَّات ٥

Peronospora brassicae, P. parasitica (S), Mildew des crucifères (F), Downy mildew of crucifers (E), Falscher Mehltau der Kreuzblüter (D).

وصم فطري يصيب سوق وبروع ولورق وزاد نباتات النضبة الصليبية اعضها اللث والكرب والمفلون . سبه فطر مجهرى من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية غبراء اللون || تتحرف الى السرة تشوه الفروع والاوراق والازهار || يكافح كثيره من الصناء باستمال مركبات النحاس .

١٦٥١١ - صِنَاء القَنَب

Peronospora cannabina (S).

وصم يصيب اوراق القنب سبه فطر مجهرى من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية صفراء اللون ثم غطية تصطب ليج الاوراق وتصب يباسها .

١٦٥١٢ - صِنَاء التَفَل

Peronospora triflorum (S), Mildew des trèfles et luzernes (F), Downy mildew of alfalfa and clover (E), Falscher Mehltau der Luzerne (D).

وصم يصيب اوراق التفل والقصه والبطس . سبه فطر مجهرى من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية لا تباية الشكل والرتب لونها الى البسطة ويلها مولج بنفسجي تركب فصل الاوراق وتصب يباسها || يستحسن حتى الثباتات الهامة منه ظهور المرض وان مصادر الخس لسبب جوي فلا مانع من استمال الفوطير التنمسية شرط الانتاج من الخس قبل مرور ١٥ يوما على المكافسة .

١٦٥١٣ - صِنَاء الزُود ٥ ، مَبْدُول الزُود

Peronospora sparsa (S), Mildew du rosier (F).

وصم فطري يمتري الورد في اصفاه المولية اعضها الارواق لونها وقد يشوها دون ان يضي عليها بكاملها . سبه فطر مجهرى من الصناء . مظهره الخارجي يقع صغيرة القد ، مزوانية الشكل ، جزوية اللون ، بنسجية الملاج ، تركب حنار الورد واسناتها ولها الانداد الفنية ومالقي الازهار فتفسدها وتصلها || يكافح باستمال الفوطير التنمسية او غيرها من الفوطير المركبة الحديثة .

١٦٥١٤ - صِنَاكِيَّات Peronosporaceae (S).

Péronosporacées (F), Peronosporacées (E).

فصيلة الفطور الصائفة من مرتبة الثشبات ورتبة البشبات || تشمل ثلاث عمارات : الحشبات والنباتات والبرصيات ، اما اجناسها وانواعها فثلاثة منها التسة والخصيف والصناء والصيل واللمدة والنباغ .

١٦٥١٥ - صِنَاب ٥ Cardamina (S), Cardamina (F).

جس نباتات عشبية رية من فصيلة الصليبيات . انواعها نحو ٦٠ منها الحولية والخلولة والسرة . اوراقها مركبة متعاقبة حريفة الملاق . اقاربها بيض او ودية .

١٦٥١٦ - صِنَاب المَاء Cardamine des prés (F).

هو حرف الخقل ، الملبه .

١٦٥١٧ - صِنَاب يَمْرِي هو حرف السوط ، الملبه .



صناء الصليبيات



صناء الورد



صناب



صنار مبدول

١٦٥٢٥ - صَنْجِيَّةٌ * أَفْشُونٌ ، ذَاتُ الْأَجْرَاسِ ذَاتُ الصَّلَاحِلِ ، كِرَوَال

Crotalus (S). *Crotale*, *Serpent à sonnettes* (F). *Rattlesnake* (E).



صنط

جنس حيات غيضة من فصيلة الصنطييات لها في أذنانها ما يشبه الحراشف تحدث ما تتحرك أو تلتصق التلي. صنفًا كصوت الصنج || يكثر وجودها في البلاد الأمريكية. يقضون عليها في الأماكن المربوبة بترية الخنازير لأن الخنزير يقتل منها ويقتلها ولا تستطيع إليه سبيدًا لأن سمومها لا تفسد في جلده.

١٦٥٣٦ - صَنْطَابٌ ، صَنْخِرٌ
هو الجمل الصخم اللتين : (F). *Chameau gros et gras*

١٦٥٣٧ - صَنْخَةٌ ، طَرْشِيلِيَا *
Transchella (S).

جنس ظفور مجهرية قرية الشبه من الصندية. تتميز بهيئتها البوي التي الشكل الفيلق الانتشاب والفيلق اللثة. سماها الساسية عديدة استوائية الإرتكاز. ذنبها كثيرة التمامات الزوية التجميع. دعائمها مؤلفة من خيلتين لا متجانستين الشكل استوائية الشكل والعليا كروية. أعينها منفصلة || أنواعه الاقتصادية قليلة أشهرها صنخة الخوخ.

١٦٥٣٨ - صَنْخَةٌ الْخَوْخُ *
Transchella pruni-spinosa, *Puccinia pruni-spinosa*, *Accidium punctatum* (S). *Rouille du prunier* (F).

ظفر مجهرى يتطفل على معظم اللوزيات أصعبها الخوخ والنشس والدراق والوزر يلعب الأوراق ويضغف الأشجار ويغذيها || مظهره الخارجي بخور صغيرة جوية اللون لا تباينة التجميع تركيب النصل حل صفحت أسفل بين المروق والفصل فظفر البشرة به أن تصطب التسج. ثانيا يكتفح ألا يجمع وقرق جميع الأوراق به مغولها. ثانيا ينضج الأشجار التي كان ظهر حل أوراقها الجسم يأسد القوالب القمالة الشديدة الانحماص والالتصاق تؤا به الأوراق.

١٦٥٣٩ - صَنْدَرَةٌ *
Luctopercia sandra (S). *Sandra* (F).

سمكة بحرية من القرصييات شالكت الزعانف. أظفارها قسمة الأجزاء تشغل معظم أشر البلاد المعتدلة الحارة للتحركة نحو الباردة || طولهاراوح من ١٠ إلى ١٠٠ سم. ثوبها إلى الخضار الزهري يميلوا من جانبها توضع أسير زباد أسمرًا مع اقترابه من شبح الظهر || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه.

١٦٥٤٠ - صَنْدَلٌ
مجهرية من محيط التبغ الجاف يراوح عدد مشاكيكها ما بين ٣ و ٥ ح. صندل.

١٦٥٤١ - صَنْدَلٌ هو أرقية الصنوبر ، الطلها.

١٦٥٤٢ - صَنْدَلٌ
Santalum (S). *Santal* (F). *Sandalwood* (E).

جنس نباتات صمغية برية وزراعية صناعية من فصيلة السندليات. أنواعه ثمانية منهاها الشرق الأقصى جميعها نباتات وأشجار صغيرة القد ، أوراقها معقة متضاربة. لونها زاهي عتقوي التجميع ، أبيض وتناهي الإرتكاز. أزهارها خشوية. ثمارها نوية. بذورها سود. تزود أعشابها للصغار اللون ، اللطافة الصنف. أعشابها

طلب الحرية والكم وتفيد سبها الأولى مع حلول شهر حزيران || أضرارها شديدة الفيلق لأنها تصطب الأشجار القائمة وقد تسبب يباسها.

١٦٥٢٩ - صَنْطَابٌ *
Ceanobita (S). *Ceanobita* (F). *Ceanobita* (E).

جنس دوبييات بحرية من الفشرييات عشاريات الأبريل طويلات الذيل وفضيلة الباغوريات. أنواعه المرفوعة قليلة العدد منتشرة قرب شواطئ البلاد الاستوائية والشمرة نحوها || أجسامها مستطيلة الشكل ، صدرها قصير المتك. تتميز بانقباضها في الإصداق المجهورة ولا تقفي سوى بطونها عند الانتقال || أشهر أنواعها الصنطاب الأخضر (C. rugosa) الذي يكثر وجوده قرب شطوط المحيط الهندي والبحر الأحمر.

١٦٥٣٠ - صَنْبُوبٌ *
Pila (S). *Pelle* (F). *Pila* (E).

جنس حشرات من فصيلة الصنوبييات ورتبة ذوات الجناسين. أنواعه المعروفة عديدة أظفارها معظم أظفار العالم || أجسامها متوسطة الحجم تطول من ٨ إلى ١٠ م. رؤوسها شبه مكورة ، مستقلة. حيوتها صغيرة ، فارقة عند الشقين. قرونها الاستثمارية صغيرة ، تحمله. ملابسها صغيرة. أعضائها متوسطة الحجم. كواسلها مستطيلة ، ثنائية التحديق ، مبعثرة الحب. بطونها اهليلجية. رواشها كبيرة. قوائمها نشيطة. أظفارها عديدة ، جميعها وسيلة اللون || الجمللة واضحة تألف المروج والنباتات. البرقة نعمة تخرج الجلود والسوق فتقضي الثبات الذي تركه.

١٦٥٣١ - صَنْبُوبِيَّاتٌ *
Pallidus (S). *Pallidus* (F). *Pallidus* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناسين. أجسامها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم. تألف المروج والنباتات ، تغرب في المروج أرضية || أجسامها مهاد تطول من ٦ إلى ١٢ م. رؤوسها مكورة ، مستقلة. عيونها فارقة عند الشقين. قرونها الاستثمارية غيطة متفارة الطول. ملابسها صغيرة أو ضامرة. كواسلها مستطيلة. بطونها اهليلجية. رواشها كبيرة. قوائمها نشيطة. أظفارها باهتة || الحشرة الجملدة تمشي على سطح الأزهار ورحيقها. البرقة تعيش في جذور النباتات المختلفة ونسها الجزر والقت والمالفون || أشهر أجناسها الصنبوب.

١٦٥٣٢ - صَنْبُورٌ
التنخله دقت من أسفلها وانجدر كرها يقل حلها. والتنخله تخرج من أصل التنخله الاخرى من غير أن تفسد.

١٦٥٣٣ - صَنْبُورٌ ، صَنْكِيَّةٌ
Robinet (F). *Cock*, *Tap* (E).

جهاز يسمح لسوائل الحفوضة ، من ماء وغيره ، بالمرور أو بالخروج عند الطلب.

١٦٥٣٤ - صَنْجِيَّاتٌ ، أَلْفُونِيَّاتٌ *
Crotalidae (S). *Crotalidae*, *Rattlesnakes* (E).

فصيلة حيات سامة من انوبييات الأعداد. أجناسها وأنواعها عديدة جميعها غيطة سامة تتميز برؤوسها اللطيفة واحداثها الدقيقة ويوجد نقرة واضحة جلدية بين الانف والعين.



صنجية



صنخة الخوخ



صندر

١٦٥٥٠ - صَنْدَلٌ
Caranx saurus (F).
سمكة بحرية تسمى شيم صندون، اطليها .

١٦٥٥١ - صَنْعُ الْمَلَك، مَلَكَج
Malage (F).
Malting (E).
علية تحويل الشير وغيره من الحبوب الى ملت اي حبوب
ناشئة (لبانة) .

١٦٥٥٢ - صَنْف
Qualité (F). Quality (E).
خاصة الشيء القيمة .

١٦٥٥٣ - صَنْمَكَة
Hampes de la plume (F).
Staff of the feather (E).
قصة الريش استقلت او غلظت .

١٦٥٥٤ - صَنْمَج
Critère, Critérium (F).
Criterion (E).
هو طابع الحقيقة الحاسم الذي يمكن من التقدير والفصل .
ج. صناع .

١٦٥٥٥ - صَنْوِير
Pinus (S). Pin (F). Pine-tree (E).
جلس الجمار حرجية وصناعية من فصيلة الصنوبريات .
انواعها عديدة . بعضها متخسبة . تشوبها سلفة . اخصها
منقرجة . غراصها ضيقة الاوراق . اوراقها ابيدة عديمة
مختلفة التجميع . ثمارها اقراص ريمية الشكل او مريضة .
جميعها من الاشجار المقيمة الدائمة الاثمار ويستخرج
من بعضها مادة راتنجية لها استعمالها الصناعي المشهور .
أصفر ورائح انواعها المزروعة ما يقع .

١٦٥٥٦ - صَنْوِيرٌ أَيْضٌ
Pin blanc (F).
هو صنوبر ويوت ، اطليها .

١٦٥٥٧ - صَنْوِيرٌ أَحْمَرُ
Pinus resinosa (S).
Pin rouge (F). Red-pine (E).
شجرة مبرقية مهدا أمريكية الثابتة . خشبها احمر اللون
غزير للمادة الراتنجية . تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اخصها
فاخرة . غراصها جارية حادة المثل . يتألفها خيطة
قصيرة حراء اللون . اعداها شائعة ، ثنائية التجميع . نصلها
عيني الشكل بطول من ١٢ الى ١٦ سم . ويرعى نحو
١ م . وهو مسنن الحافة حائض الخضار . اوراقها إبروية ،
صغيرة ، طولها نحو ٥ سم . وقطر قاعدتها ٣ سم . جريها
صاحبة الشويز لونها الى البقرة الزرقاء المراج . يعيش
ويوجد في جميع المناطق المعتدلة والاربية السميكة البور .

١٦٥٥٨ - صَنْوِيرٌ أَرْمَنْدِي
Pinus armandi (S).
Pin Armand (F). Armand-pine (E).
شجرة مبرقية تزيينية سريعة النمو مهدا الشرق الاقصى
تكثر في الصين واليابان تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اخصها
التي الاوراق . غراصها ويتألفها حادة المادة الشمعية
الزرقاء . راصها يضيئة ، صغيرة ، ذلقة ومديبة . اعداها
ورقية . خالصة التجميع . نصلها جامد الصفة المنطق .
السطح مرقى الشكل يمس في حدود الزلازم الاول . اوراقها
غروية طولها يراوح بين ١٥ و ٢٠ سم . ويرىها من
٨ الى ٨ سم . لونها الى الخضرة التناسلية الازرق . جريها
مثلثة الزوايا . منبسطة القشرة الدائرة الحمار . يعيش
في جميع اقاليم الصنوبر دون ان يتأثر كثيراً بنوع التربة .

ناعمة الرقعة ، شديدة الصلابة ، حطرية اللون لا تقربها
حشرة ولا يفسدنا الزمن .

١٦٥٤٣ - صَنْدَلٌ أَيْضٌ *
Santalum album (S).
Santal blanc (F). White sandalwood (E). Weisser
sandelbaum (D). Sandalo bianco (I).
نوع من الصندل الزراعي المشهور بأخشابه الصناعية
الفاخرة وببساطه الطبي الشائع الاستعمال . يربى في
الفلج الهائلة ذات الارربة الخصبة . يتكاثر بالبذور
ويؤخذ في مستنقعات الجبال الى المئات لانه لا يقوى
على التل في شجرته تملو من ٦ الى ٨ اثمار . خشبها
غزير المادة السطرية يحرق نحو ٥ ٪ .

١٦٥٤٤ - صَنْدَلٌ مَرْجَانِي *
Adenanthera (S). Adénanthere, Bois de corail,
Crête de paon (F). Red sandalwood tree, Coral
tree (E). Korallenbaum, Phänakamm (D).
Pavonica, Sami di corallo (I).
شجرة حرجية طيبة صناعية وزينة من فصيلة القرنيات
الفرانزية . مهدا البلاد الاستوائية . طول نحو ١٢ م .
ساقها سرحة ، اوراقها متعاقبة مركبة ريشية . ازهارها
سليقة التجميع ، مرقى الشكل ، ابيض الاوراق . ازهارها
عشرية صغيرة الحجم ، حشوية الكأس والبراعم ، ضيقة
الامدية الوردية . ثمارها اقرون ليلية ضيقة مستطيلة محببة .
يزورها يضيئة الشكل شفافة الصلابة تستعمل في صناعة
اللبسات . اخشابها مرجانية اللون صناعية . جلودها
طرية مثقبة .

١٦٥٤٥ - صَنْدَلَان
Pterocarpus santal (F).
هو الثور الصندل ، اطليها .

١٦٥٤٦ - صَنْدَلِيَّاتُ
Santalaceae (S).
Santalacées (F). Santalaceae (E).
فصيلة ثنائية من ذوات الفلقتين عديدة القائلات . اجناسها
واثلاثها عديدة التجميع الى ثلاثة اسباط . نباتاتها احباب
ورقيات وبخيرات سطحية ويضى طولياً برغم اقلية وعمل
وتليفات الخشبية .

١٦٥٤٧ - صَنْدَلُوقُ الْاَدْمَجَرُ
Caisse de prévoyance (F). Foresight chest (E).
منشأة خاصة في بعض المصارف والفرقات تنظم لاجل
تحسين حالة المستفيدين والمال بالتصاع نسبة مئوية من
اجورهم وادخلها لم يضاف اليها مطلقاً من رب العمل
او اصحاب الشركة . واشهر ثروتها ان لا تكتف الى
اصحابها الا منته مقادير العمل .

١٦٥٤٨ - صَنْدَلُوقُ السَّوْفِيرِ
Caisse d'épargne (F).
Savings-bank (E).
نظام تنبه بعض الحكومات والمصارف قوائم التشجيع
على التوفير وحمل الناس على الاقتصاد . فكل من يربى
في الادخار يطلب دفراً يحرقه باسمه فيخرج بمقتضاه مبلغاً
لا يقل من كمية محدودة من شاة ذلك . ويحسب له ربح
على ودائمه . وله ان يسحب ما يربى في محبه على ان لا
يتجاوز مبلغاً معيناً في يوم واحد .

١٦٥٤٩ - صَنْدَلُوقُ الرِّزْمِ ، هَنْدَلُ
Caisse de manipulation (F). Manipulation chest (E).
صندوق ميكانيكي الجوانب لا قعر له ترزم فيه بذات التبع
معد تقنياتها سفيلاً متباينة مراكبة الى ان تبلغ الارتفاع
المطلوب .



صندل ابيض



صندل مرجاني

١٦٥٦٤ - صَوْنَرُ بُنْج Pin de Bungo (F).

هو الصنوبر الصيني، أصله .

١٦٥٦٥ - صَوْنَرُ جَرْدِي

Pinus montana (S). Pin à crochet, P. mugo, P. de montagne (F). Swiss mountain pine (E). Krummkiefer, Mugokiefer (D). Pino mugo, P. alpino (I). شجرة سروية تملو من ١٥ م. - ٢٥ م. أغصانها غريبة. قنبا غروبية الشكل، أهدابها شفافة ثنائية التجميع. تلتصق إلى الأغصان المائتة. أكرافها مسطلة مائدة. تتناقص. جرهاتها جزئية اللون، بارزة القشرة المنقطة السن || يعيش في جميع الأثرية الجبلية وبين الصخور، يتصلل البرد المستمر ولا يتغذى.



صنوبر اسود

١٦٥٦٦ - صَوْنَرُ حَلْبِي Pinus halepensis (S).

Pin d'Alep, P. de Jerusalem (F). Aleppo pine tree, Jerusalem pine (E). Aleppokiefer, Aleppofichte (D). Pino d'Aleppo, P. di Gerusalemme (I).

شجرة سروية تملو من ١٥ م. - ٢٥ م. أغصانها منفردة. غراحيها سطحة اللون. يتناقلها دقيقة. براعمها شفافة الشكل. أهدابها شفافة، ثنائية التجميع، تلتصق غربي الشكل زاهر الأغصان يطول نحو ٨ م. ويبرس من ١ م. - ٢ م. أكرافها مربعة طولها نحو ١٢ سم. وقطر قاعدتها ٤ سم. جرهاتها شارة القشرة المنبسطة لونها إلى البازرة السهام اللؤلؤ || يألف الأثرية الجبلية ومجيد فيها تمامًا.



صنوبر بحري

١٦٥٦٧ - صَوْنَرُ حَمَلَا Pinus excelsa (S).

Pin pleureur de l'Himalaya (F). شجرة جادة صنعية وزينية سرية النمو تملو من ٣٠ م. - ٥٠ م. أغصانها أفقية فائقة. يتناقلها غليظة الأطراف المتدلية. براعمها شفافة، مغطوة، مائدة الزائج والمادة اللصية. أهدابها وريّة، خلبية التجميع. تلتصق جاهد الصفة الخيطية للشدة الاغصان. أكرافها غروبية طولها يراوح من ١٥ م. - ٢٥ م. ويبرس من ٧ م. - ٤ م. لونها إلى السمرة الخيطية السهام اللؤلؤ. القشرة المستديرة البارزة || يربب في الآثام والمواقع الرطبة.



صنوبر بري

١٦٥٦٨ - صَوْنَرُ كَمْبَرُو Pinus cembra (S).

Pin cembra, Ahvier, Arolla, Auvier (F). شجرة سروية تملو من ٨ م. - ٢٥ م. ساقها متعينة متناوبة الاوصاج. أغصانها خضراء. غراحيها وبناتقها غليظة، كثيفة الزغب المسطحة. براعمها شفافة الشكل مدببة الأطراف. أهدابها وريّة، خلبية التجميع، تلتصق جاهد الصفة يطول نحو ٧ م. لونها إلى الحمرة الزرقاء. أكرافها غروبية، مغطوة للقاعدة. طولها نحو ١٥ سم. وقطر قاعدتها ٦ سم. جرهاتها لؤلؤ القشرة القديمة، لونها إلى السمرة البنفسجية.



صنوبر جردى

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ صِينِي، صَوْنَرُ بُنْج Pinus bungeana (S). Pin de Bungo (F).

شجرة كبيرة أقدم منها الصين. ساقها متعينة تملو من ٢٥ م. - ٣٥ م. قنبا أجاسية الشكل. تشويها سلفة مسطلة الصفائح. أغصانها أفقية الجلبوس. أهدابها وريّة، ثلاثية التجميع، تلتصق جاهد السنج، وباعت الأغصان، يطول نحو ٩ م. أكرافها صغيرة اللد، شفافة الشكل، تطول نحو ٦ م. جرهاتها بارزة القشرة الغددة، لونها إلى الخيطي الاسمر اللؤلؤ || يزود لأغصانها الجيدة الصنف لكنه يمتد من الأنواع الجالسة التي لا يجيد إلا في مواقع خاصة ضمن إقليم معين.



صنوبر حلبي

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ اسود*، صَوْنَرُ لِسِيُو Pinus laricio (S). Pin noir, P. laricio, P. de Corse, P. d'Austrice (F). Corsican pine, Austrian pine, Larch pine (E). Schwarzkiefer, Koralschicht (D). Pino laricio, P. di Corsica (I).

شجرة خضراء دائمة. ساقها تملو من ٣٥ م. - ٥٠ م. قنبا مريية الشكل. أغصانها منفردة فائقة. غراحيها وبناتقها غليظة الجسد خضراء اللون. براعمها بيضيه مدببة الأطراف. مراهقها كثيفة متراكمة ذرية. أهدابها شفافة. ثنائية التجميع. تلتصق جاهد الصفة، مسن الحلق، بحري اللون. أكرافها غروبية تطول نحو ٧ م. ويبرس نحو ٣ م. جرهاتها بارزة نازقة، قنبا متصالية التفتيد لونها إلى الخيطي الاسمر يطول مروج اصفر || يربب في الملقح الرطبة يبر من الانجبار السريعة النمو.

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ البَحْرُو Pinus taeda (S).

Pin à l'ancres (F). شجرة سروية خضراء تملو من ٣٥ م. - ٥٠ م. أغصانها منفردة فائقة. غراحيها وبناتقها كثيفة التجميع سطحة اللون. براعمها غروبية، جزئية المراهق المنزوية. أهدابها وريّة، ثلاثية التجميع، تلتصق جاهد الصفة بحري اللون يطول نحو ٢٥ سم. ويبرس ٢ م. أكرافها غروبية الشكل تطول نحو ١٥ سم. ويبرس ٤ سم. لونها إلى السمرة السهام اللؤلؤ. جرهاتها مدببة القشرة النازقة الخيطية المتشددة || يمتد من الانجبار السريعة النمو التي تجيد في جميع المواقع والأثرية المتصلة الرطوبة. غلبه ليزر المادة الزائجة البخورية العرف.

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ الْكَبْشَان Pinastre (F).

هو الصنوبر البحري، أصله.

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ بَحْرِي، صَوْنَرُ الْكَبْشَان Pinus pinaster (S). Pin maritime, P. de Bordeaux, Pinastro (F). Swamp pine, Sea-side pine, Cluster-pine, Pinaster (E). Starnkiefer, Seckiefer, Bordeauxkiefer (D). Pino maritimo, P. pinastro, P. di Bardo, Pinastro (I).

شجرة سروية كبيرة خضراء. ساقها تملو من ٣٥ م. - ٤٠ م. تشويها صلبة مسطلة التفتيد لونها إلى الحمرة البنفسجية. أغصانها غليظة متصلة الانفرج. غراحيها جزئية اللون. براعمها غروبية الشكل كثيفة الحوافف المتراكمة. أهدابها شفافة، ثنائية التجميع، تلتصق جاهد السنج، داكن الأغصان، يطول نحو ٣٥ سم. أكرافها مربعة الشكل متدلية تطول نحو ٢٥ سم. لونها إلى البازرة المائقة اللامعة. جرهاتها بارزة، قبة الشكل عددة القشرة || يعيش في جميع الأثرية. إقليمه للمناطق الساحلية أصحها الأماكن الرطبة حيث لا يصلح غيره.

١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ بَرْي، بَرْي Pinus sylvestris (S). Pin sylvestre, Pinasso, Pin de Norvège, P. d'Ecosse (F). Scotch pine, Birk apple (E). Nordische Kiefer (D). Pino sylvestre, P. silvestico, P. comune (I).

شجرة سروية تملو من ٣٥ م. - ٤٥ م. أغصانها قليلة الانفرج. غراحيها شفافة متعينة. يتناقلها غروبية الشكل مراهقها مدببة. أهدابها شفافة ثنائية التجميع، تلتصق إلى الأغصان الأزرق. أكرافها مربعة طولها نحو ٨ م. وقطر قاعدتها ٢ م. جرهاتها فائقة الخطر. يزويها دقيقة بمنجسة || ترطب في الأثرية الرملية.

الحراشف والعلف. اهدابها وريّة، ثلاثيّة الى خماسيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة الخيطيّة، لونها الى الزرقة البحرية. اكرانها غروبيّة، طولها نحو ٨ سم. وعرضها ٥ سم. لونها الى الصفرة المائلة للآدميّة. بذورها لوزيّة الشكل مأكولة الالباب. البويجا يبيغ الشكل يطول نحو ١٠ سم. ويعرض من ٧ الى ٨ سم. وهو مستحب العلم غرير المادة الصنيعة.

١٦٥٧٦ - صَوْبَرٌ مُصْفَرٌ *
Pinus pinea (S).
Pin pignon, P. pinier, P. parasol, P. bon, P. d'Italie (F). *Italian stone pine* (E). *Steinkiefer, Italienischekiefer* (D). *Pino pinea, P. da pinocchi, P. gentile, Pignolo* (I).

شجرة سبروتية تكثر زراعتها في لبنان وفي مختلف تهايم وهضاب المتوسط من فلسطين الى ايطاليا والاندلس. ساقها جالسة مستقيمة تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم. قشورها مقلعة، سلسة، ممرّسة الطبقات. اغصانها غليظة فارشة. قنبها مظلمة الشكل. غراحيها سحطية اللون، صفراء المولج. بناتها مستقيمة. راعمها اسطوانية. حراشيفها جامدة الكوب ناشرة. اهدابها شفعية، ثنائيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة، عاتق الحصار، يطول من ١٢ الى ٢٥ سم. ويعرض نحو ٢ سم. اكرانها بيضية الشكل مقلمية القاعدية، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم. وعرض قطرها من ٦ الى ٨ سم. جرهاتها شاذلة ناشرة، لونها الى الخروقة الصنافية السفماء المولج || يعيش ويمجد في جميع الارربة الا انه بطيء النمو. بذور ثماره مأكولة وتستخدم في الطعام والحلويات.

١٦٥٧٧ - صَوْبَرٌ مَنَقِيحِي
Pinus palustris (S). *Pin palustris* (F). *Pich-pin* (E).
شجرة كبيرة اللد تملو من ٣٥ الى ٤٥ سم. ساقها جالسة مستقيمة كالشعنة. اغصانها صخرية اقلية الايزكان، غراحيها وبناتها كثيرة العدد مراكية. راعمها بيضية الشكل، قطنية الحراشف اللينة. اهدابها وريّة، ثلاثيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة يطول من ٢٥ الى ٤٥ سم. ويعرض نحو ٢ سم. اكرانها غروبيّة تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ويعرض من ٥ الى ٨ سم. جرهاتها سحطية اللون يطولها مولج آخر || يرغب في الموالع الرطبة العميقة الغور. احشائها لينة، جيدة الصنف، شاملة الاستعمال المنزلي والصناعي.

١٦٥٧٨ - صَوْبَرٌ مَتَيّ
Pinus lambertiana (S). *Pin à sucre* (F).
شجرة سبروتية جبابرة بطيئة للنمو تملو من ٥٥ الى ١٠٠ سم. مهيمة البلاد الاسريكية. ترطب في الاقاليم الرطبة والارربة العميقة الثور. غصنها ثقيل الوزن، اصفر اللون. احمر القليل. اغصانها خضرة فارشة. راعمها خدرية الشكل، مراكية الحراشف الجلورية اللون. اهدابها وريّة، خماسيّة التجميع، نصلها شديد الانغصار، جامد الصفحة للظلة الزوايا، يطول نحو ١٥ سم. ويعرض ٢ سم. اكرانها غروبيّة كبيرة اللد طولها يراوح من ٣٥ الى ٥٥ سم. وعرضها من ٨ الى ١٢ سم || وهو يتبين بما تلوّزه بناتقه وراعه من مادة سكرية تخبه المنبت.

١٦٥٧٩ - صَوْبَرٌ وَيَمُوتُ *
Pinus strobus (S). *Pin weymouth, P. blanc, P. du Lord* (F). *White pine, Weymouth pine* (E). *Weymouthskiefer, Gemeine Weimutskiefer* (D). *Pino di weymouth, Pino bianco* (I).

شجرة كبيرة الحجم تملو من ٣٥ الى ٥٥ سم. اغصانها

١٦٥٨٠ - صَوْبَرٌ كَثِيفُ الزَّهْوِ، صَوْبَرٌ يَابَانِي
Pinus densiflora (S). *Pin densiflora* (F).
شجرة سبروتية مهددة اليابان تملو من ٣٥ الى ٤٥ سم. شكلها شكل الصنوبر المحلي. اغصانها مغنفة. غراحيها حطراء اللون. بناتها غليظة. راعمها غلورية مغنفة الحراشف. اهدابها شفعية، ثنائيّة التجميع، نصلها الى الحصار الارزق يطول من ٨ الى ١٢ سم. ويعرض نحو ١ سم. ايزوايا كثيفة مراكية. اكرانها ريمية صخرية اللد، جرهاتها منبسطة متوسطة التفرش لونها الى الحمرية السطراء المولج || يعيش في جميع الارربة والموالع المعتدلة وهو في الاقاليم الرطبة لسرع نموًا ولقل مادة وانتجية.

١٦٥٨١ - صَوْبَرٌ كَثِيفٌ
Pinus bruta (S). *Pin de Calabre* (F). *Calabrian cluster pine* (E). *Kalabrischskiefer* (D). *Pino calabrese* (I).

شجرة سبروتية تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم. اغصانها مغنفة. غراحيها سطراء اللون. بناتها غليظة. راعمها غلورية. اهدابها شفعية، ثنائيّة التجميع، نصلها غصلي الشكل، باعد الحصار، يطول من ١٤ الى ٢٥ سم. ويعرض من ٢ الى ٣ سم. اكرانها ريمية، طولها نحو ٨ سم. وقطر قاعدتها ٥ سم. جرهاتها عددة القترّة القليلة التفرش. لونها الى السمرّة الصنافية السفماء المولج || يعيش في جميع الارربة والموالع المعتدلة.

١٦٥٨٢ - صَوْبَرٌ كَنْتَلِيَّةٌ
Pinus canariensis (S). *Pin des Canaries* (F).

شجرة كبيرة اللد تملو من ٣٥ الى ٤٥ سم. ساقها فرواه. فرجها خضرة صخرية اللد. غراحيها نمجة. بناتها وراحمها مسنة الحراشف الجالسة الاطراف. اهدابها وريّة، ثلاثيّة التجميع، نصلها يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. ويعرض نحو ١ سم. اكرانها غروبيّة مسطوية، لونها الى الخروقة الآدميّة، متوسط طولها نحو ١٨ سم. وعرضها ٥ سم. جرهاتها مميّة القترّة البارزة المهددة || يصير من الانواع الازيدية المعتدلة للنمو.

١٦٥٨٣ - صَوْبَرٌ كَوْرِيَّةٌ
Pinus korstenis (S). *Pin de Cordé* (F).

شجرة دائمة تملو من ٣٥ الى ٤٥ سم. اغصانها خضرة كبيرة. غراحيها وبناتها غليظة فضية اللون. راعمها غلورية، قطنية الحراشف. اهدابها وريّة، خماسيّة التجميع، نصلها مغنق الصفحة، مسن الحافة، يطول نحو ١٢ سم. اكرانها غروبيّة غليظة، طولها يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. وعرضها من ٥ الى ٧ سم. جرهاتها مظلة الزوايا، ناشرة القترّة، لونها الى السمرّة الصفراء || يصير من الانماجر السبروتية الازيدية السريعة النمو التي تجرد في جميع الاقاليم والموالع المعتدلة الرطوية.

١٦٥٨٤ - صَوْبَرٌ لَرِيصِيّ
Pin Laricio (F).
هو الصنوبر الاسود، اقلية.

١٦٥٨٥ - صَوْبَرٌ لَوْرِيّ
Pinus edulis (S). *Pin à amandes* (F).

شجرة سبروتية زراعية متوسطة الحجم مهددة بلاد المكسيك وجولوا. تملو من ٣ الى ٦ امتار. قنبها هريمة الشكل. اغصانها متوسطة الانفرج. غراحيها وبناتها غليظة الاطراف. راعمها غلورية، سحطية اللون، غبراه



صنوبر مشر



صنوبر ويوت

١٦٥٩٢ - صَوْنَدِي
الصودي : النخل الطوال وقد تكون بمنى التي لا تثرب .

١٦٥٩٤ - صَوْنُور
Troupeau de gros bétail (F). Drove of cattle (E).
هو قطع البقر والجواميس .

١٦٥٩٥ - صَوْنُور
هو الصفور الذي يجب اذا دعي .

١٦٥٩٦ - صَوْنَان ، ظِرَّ
Silex, Silica (F).
Silica (E).
هو السيليس .

١٦٥٩٧ - صَوْنَانَّة
هي السيليكاة ، المطبا .

١٦٥٩٨ - صَوْنَانِي
Granitique (F). Granitic (E).
ما كان تركيبه من الصوان .

١٦٥٩٩ - صَوْنَاي ، زَوَّو
Maraca (S).
Marica, Marique, Casard siffleur (F). Widgeon (E).
جنس طير من البطيات انزله ثلاثة واحد اسوي وثلاث
امريكيان . جميعها كبيرة الجثة ، حادة الزنبرك ، تنسج
بمنقارها المفلطحة التي لا يبدل طرفها على الرأس . مناقشها
صغيرة متبادلة ، اجنحتها منطوية عند زائفة ، تقضم ،
الاصابع كالزوائد ويحبب غفر الحلق والامساك كما يفعل
البط || اما انزلها الثلاثة فهي :

M. americana (S).
صَوْنَاي امريكية

Marque americaine (F).

M. penelope (S).
صَوْنَاي الشرق

Marque penélope (F).

M. sibistris (S).
صَوْنَاي بجلان

Marque de Magellan (F).

نفس منها بالتحلية الصوي الشرقي .

١٦٦٠٠ - صَوْنَاي الشرق *
Marque penélope (S).
Marque penélope, Vingeon (F). Widgeon (E).

طائر من الصوي ربح الجثة طوله نحو ٥٥ سم . ثوبه
مزاكب الالوان ، جيل الزواوي والقرمكة . له الابيض
والاصفر والاشير والصناني والرمادي والاسمر والاسود .
هناك مستطيان . متقارب الى القربة الحمراء . سلاله بامدنتان .
وهو من القواطع يحرب الشرق والغرب ، يألف البعيريات
ويجاري البحر . قوت الاغصان وسطف اللوبيات المائية .
يشن مشه في العشب حل شفة الماء . انتاء تبيض وتجنن
من ٨ الى ١٠ بيضات . يألف السجين اذا اخذ صغيراً
لكه يتطلب الكثير من الماء وما يتبع الماء من القشريات
والخشرات || سره متفاوت القدر يد من ٢٠ الى ٨٠
واكثر .

١٦٦٠١ - صَوْنَب
Point de direction (F).

Point of the direction (E).
نقطة الاتجاه .

١٦٦٠٢ - صَوْنَب

الصوب : زُرول المطر . صاب المطر صوباً وانصاب :

انصب وطل وانهر .

١٦٦٠٣ - صَوْنَبَة

Tin de graines (F).
Heap of seeds (E).
الكومة من الحبوب حل اختلاطها .

١٦٦٠٤ - صَوْنَت

Vox (F). Voce (E).

الصوت هو حركة اهتزازية تحدث من اضطراب الاجسام

للمادية كالقوافل فيوصل اثرها الى الاذن || ويطلق الصوت

على الاحساس السمي نفسه || ولكي يكون الصوت

خضة فاشرة . نراهيها وينالها غليظة ، قلنية التذب .
راعها يضيء الشكل مدنية الاطراف . سرانها تنية
العين يضاء الخار الكفيف التذب . احداها وربة ، خلية
التصنج ، تسلفا ثلاثي الزوايا ، جهاد الصفة ، بحري
الون . اكرانها مدنية الشكل تطول نحو ٢٠ سم . وتعرض
في سم . جرهاتها منخفضة الحافة ، منبسطة القبة المتساوية
الصفة . لها الى السرة الخفية || يرغب في الازرة
القلية والمواقع المعتدلة الرطبة وهو فيها سريع التو .

١٦٥٨٠ - صَوْنَر يَابَانِي

Pin densiflora (F).
هو الصنوبر الكفيف الزهر ، اطليه .

١٦٥٨١ - صَوْنَرِيَّة ، صَوْنَرِيَّة ، كَرَز

Côna, Pomme de pin (F). Pine-cone, Fir-cone, Fir-nut (E).

شكل من اشكال اثمار . وهي ايضا ثمرة الصنوبر والارز
والتنوب وغيرها من اشجار فصيلة الصنوبريات . تحليتها
العلمية : محور وصفت عليه قنابات ليفية جامدة تنسج
جهرات تحمل كل منها غشاء وزرئين مجتمين .

١٦٥٨٢ - صَوْنَرِيَّات ، عَشَرَوِيَّات

Conifera (S). Conifères (F). Coniferae (E).

فصيلة نباتية من باديات الزهر هريانة الزهور تشل
ثلاثة اسباط : التنويرات والسروريات والطقوسيات .
اجناسها وانزلها كثيرة العدد معظمها اشجار راتنجية صناعية
شائعة الاستعمال .

١٦٥٨٣ - صِهَاء

Sources d'eau (F). Springs (E).

الصهاء : منابع الماء .

١٦٥٨٤ - صِهَانَكَة

Magma (F). Magma (E).

الصهارة وتسمى بها كل مادة يذوب فيها مادة كالتحاج
المصهور او كالمطبخ الذي يغلف به البركان عند ثورانه .

١٦٥٨٥ - صِهَارَكَة

Moëlle (F). Marrow, Mechin (E).

هي النخاع الشرقي وهي المكاء .

١٦٥٨٦ - صِهَبَاء

Vin blanc (F).
Colourless wine (E).

الخمر البيضاء .

١٦٥٨٧ - صِهَبِيَّة

Enologie (F). Enology (E).

علم صناعة الخمر يشمل كل ما يتعلق بصنعها وتحليتها
وسقظها الخ .

١٦٥٨٨ - صِهَبَرِيَّج

Citerne (F). Cistern (E).

وعاء يحكم البد كثير الاستيعاب يستعمل لنقل السوائل .

١٦٥٨٩ - صِهَبِيل

Hennissement (F). Neighing (E).

صوت الخيل عاة .

١٦٥٩٠ - صَوَّ

هي الجباري الصغيرة ، اطليا .

١٦٥٩١ - صَوَكِيَّة

Rationalisme (F).

Rationalism (E).

الصوابية مذهب فلسفي لاهوتي يعتبر العقل محور السلطة
وبرسمها المريد فينفي الوحي والتسلسل أي العرف التقليدي .

١٦٥٩٢ - صَوَّاح

Pollen

غبار الى الصفرة سكون من جذرات الطلع ينشأ في المنبر

اي في الجزء الاقل من السداة وذلك في باديات الزهر .



صَوْنَاي الشرق

صوت الظلم	المرار	مسموحاً يجب ان لا تقل ذبذباته في الثانية عن ٣٠ اهتزازة
صوت الضج	المشعر	ولا تزيد من ٣٠٠٠ اما سرعه في الهواء فمطلبا ٣٣٠
صوت المفق	القممقة	متراً بالثانية وفي تناثر يشبه وبالموسط الذي ينتقل فيه.
صوت التمايل	الشدقة	اما سرعه في الماء فتبلغ ١٤٣٥ متراً واصوت اسماء
صوت الذئب	المواء	كثيرة عند الحيوان والعلير ، ذلك لان الاصوات تختلف
صوت الثور عند اللع	المنغمة	مع اختلاف مساحدها وقد وضعنا في الجدول التالي ،
صوت الابل	القليل	الذي نودده ايجدياً ، كل ما تيسر من هذه الاسماء :
صوت الحية من لها	الصحيح	صوت المزي
صوت الجندب	الفصيص	صوت البيط
صوت الخنزير	القياح	صوت القليلة
صوت الفحل من الابل	القنينة	صوت ثقب الخيل عند حفرها
صوت الفحل من الابل	القرقرة	صوت المكاء
صوت الضبع الاتي	القشاح	صوت المصفور
صوت القطا	المنطقلة	صوت القم
صوت المقاب	القممقة	صوت القشان
صوت البعر	القلغ	صوت البقرة
صوت الذب	القهاق	صوت الحام
صوت الدجاج	الحقنقة	صوت الحيقان
صوت الدجاجة	القواء	صوت الدواب عند طلبها الملق
صوت الابل	الكت	صوت الحرة في تماسها
صوت الجارو والسرکه	الكسكة	صوت الخيل من بطونها
صوت الابل	الكش	صوت الخيل عند طلبها الملق
صوت الحية من جلدها	الكشيش	صوت البقر
صوت الفأرة	الكعيس	صوت القطة المرفوع
صوت الفراخ المجهود	الكيد	صوت ذوات الخلف
صوت القفق	الققلقة	صوت البيط والاوز
صوت الحر	المواء	صوت الغراب
صوت الكلب	التياح	صوت الفحل من الابل
صوت التيس	التيب	صوت الببو
صوت الظبي	الزيب	صوت القرد
صوت الغراب (بالين)	التيب	صوت المصفور
صوت الغراب (بالخير)	التنيق	صوت النمامة
صوت الدجاجة	التننقة	صوت الاحد
صوت الضفدع	التنيل	صوت القمري
صوت الاسود	التبوت	صوت البغل
صوت الحير	التبوق	صوت البغل
صوت القليل والبروم	التشم	صوت الكيش والتيس
صوت الخلد	المخددة	صوت الحمار
صوت الابل	المخدر	صوت الصرد
صوت الحام	المخيل	صوت البراة
صوت القشان	المرفرة	صوت الجراد
صوت الكلب عند الاستنكار	المزير	صوت النسر
صوت الورشان	الوت	صوت الديك
صوت صغار المصائير	الوصيح	صياح الطائر
صوت الذئب وابن آوى	الوصوعة	صوت الخيل
صوت الصرد	الوق	صوت النبل
صوت الخيل من بطونها	الوقيب	صوت الديك غامة والعلير حامة
صوت الابل	اليجار	صوت الثعلب

١٦٦٥ - صوتان ٥

Helminthosporium, Ophiobolus (S). Helminthosporiose (F).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات . يتميز باصان ضخمة ، متفصمة ، ظاهرة الملق ويبرغ وبيري الخلية ، غطلي الشكل ، متوازي الترتيب . نجمه تكات مسطوية || انواعه المعروفة اربعة تحديدها ما يلي .

صوت نفس الخيل عند حفرها
صوت القرد
صوت الكلب عند الجرح
صوت الازير
صوت القوق
صوت التيس عند الهياج

الصنج
الصنك
الصفا
الصناب
الصراع
الغلاب



صوجان اتيمح



صوجان الارز



صوجان الحب



صوجان الزروع



صوجه



صوصي

أقلبيها ألقح من ألقاح القاصوليا لأنها ائتم منها حل احتال
الحرق والرقة || نيلر مادة في ايار بمثل ه او ه كيلو
لدم الوالد الذي رايح مدلل ائتاليه العادي ٢٠٠
٢٠٠ كيلو من الحب ويح ٢٠٠٠ كيلو من الكلاء
الاغضر || اما المواد الغذائية التي تتركب منها الصوصه
هي ، بالنسبة الى الحطة والقمح ، ما يلي :

النوع	مواد ازرقية	مواد حنينة	مواد هيدروكربونية
صوجه	١٧,٥٠٠ %	١٧,٥٠٠ %	٩,٥٠٠ %
حنطة	١٢,٥٠٠ %	٥,٥٠٠ %	٦١,٥٠٠ %
قمح بقر	٢٢,٥٠٠ %	٢,٥٠٠ %	-

ومن الاطباء من ينصح باستعمال دقيقها عوضاً من
الحنطة وذلك لمن كان مصاباً بداء السكري || ويستخرج
من صوجانا مادة حنينة غذائية شائعة الاستعمال ، اما كميات
فيليب الحليب ، وزيد فيه نسبة الفيتيد || اما علفها فتخرج
في جميع المواني (رابع جدول المواد الغذائية).

١٦٦١١ - *Deschê (F). Dried (E).*
صوجح وقصوع البقل ، ثم يسه ، يتقال صوصه الربع .
أليسه ، وتصروح من البرد . ييس .

١٦٦١٢ - *Barraldé (S). Barraldé (F).* صَوْصَم
الوحدة صوصة || جلس الحجار وحبيرات برية وزواحية
ازرقية من فصيلة القرماصات . انماوه المبرقة عديدة منبتها
للمناطق الحارة والاسناتوية من القارتين الاسيوية والافريقية ||
سوها فرماه . اثنائها متعاقبة . اوراثها متعاقبة ، مضقة ،
متالية اتصال الجامدة . ازهارها عشوية ، فسيمة التجميع ،
محورية الارتكاز . ثمارها كروية ، مكللة باسنان
التجميع || اوراثها حفصة اللدائق ، طيبة ، تستعمل في
معالجة الجذام والتهاب غطائية الفم .

١٦٦١٣ - *Soude (F). Soda, Kali (E).* صَوْوَا
الصودا كايوتا مركب من الصوديوم والاكسجين اما
تجاريها فهي مركب من كربينات الصوديوم المتعادل .

١٦٦١٤ - *Sodium* صَوْوُورِوم
فلز ابيض نفسي المالح ، شديد اللبوة ، اسدي ، يتكاثف .
وزنه (ص-ص) ٢٣ ، وزنه الذروي ٢٣ ، ثقله النوعي ٩,٦٩٠ .
يتسهر في ٩٦ بسخ || وهو سريع الصدأ في الهواء
الطلق ولا يبرده سفرداً بل الطيبة بل متحدة بمتناس
اخرى يذلل معها مختلف المركبات ، اهمها : كلوريد
الصوديوم او ملح الطعام ، ونيترات الصوديوم او ملح
البارود ، وكربينات الصوديوم او التطرون ، وبيكربونات
الصوديوم . ويكره نباتات الصوديوم او سلفات الصودا .

١٦٦١٥ - *Palmarie (F). Palm-grove (E).* صَوَّوْر
الصور هو الخس من النخل في اي تربة كان .

١٦٦١٦ - *Pictif (F). Feigned (E).* صَوَّوْرِي
نمت تعري يطلق حل كل حقه ليس له ويبد قانوني حل
الرمح من مظهره وشكله كالحب الصودي شت .

١٦٦١٧ - *Poussin (F). Chick (E).* صَوْصِي ، قُوب ، كَتَكُوت
صغير البجج من يوم نلقه من البيضة الى حين تزويجه .

١٦٦١٨ - *صَوْصَلَة* هي الانراس ، اخلية .

١٦٦٠٦ - صُوجَانُ أَتَمَح *

Ophiobolus harporichus (S). Pictin (F).
نطر مجري يسيب بعض التبيليات انحصا الحطة .
مظهره الخارجي يقع من تركب البقل من عتقا ومصاداً
نفضتها بعد ان تثل فيها الحركة التفسية || اغضرار
تختلف باختلاف نشاطه وما يرفقه من عوامل مشجبة او
قائمة . وان رده الرياح في الارض قبل ادخال الحب نفس
ونوى .

١٦٦٠٧ - صُوجَانُ الْأَرْز *

Helminthosporium oryzae, Ophiobolus myribeanus (S). Helminthosporioses du riz, Bursons (F). Stripe disease of barley (E).
نطر مجري يركب الارز فيطيه || مظهره الخارجي
يقع سفرة فسيمة التي تمتد وتتشر وتم كامل تصل
الشرانق تقسب اسمرار واصفرار وذبوله . يحد يابله
صعفات الحب يشفا بنكات سود تطلب القلب وتحمده .
يكافح مظهر البذار باحتجاب الموانع المبروة .

١٦٦٠٨ - صُوجَانُ الْحَبِ *

Helminthosporium sativum, H. sorokinianum, Ophiobolus sativus (S). Helminthosporioses des grains (F). Spot blotch of barley (E).
نطر مجري يسيب الحنطة والاشير والشم وبس
التبيليات البرية ومنها التيل || مظهره الخارجي يقع
لاقياسية الحبيب تركب تصل الصف . اما الفطر فيراث
سبة البذار من يوم ائتاليه وتكون جلدوريا حي
اسبالها وعجبها حيث يصب الحب ليد مرقة وعرضا .
اغضرار محمودة لانه لا يتنثر الا بطروف خاصة من
الحرارة والرطوبة .

١٦٦٠٩ - صُوجَانُ الزُّرُوع *

Ophiobolus graminis, O. caricoti, Sphaeria caricoti, Rhaphidophora graminis (S). Pictin des céréales (F). Take-all of wheat (E). Schwarzbeinigkeit (D).
نطر مجري يسيب الزروع انحصا الحنطة فيؤذيها وقد
يمنعها من ادخال الحب || مظهره الخارجي يقع حنطة
هاقة تركب سلاحيات القصب من الباطن والخارج لثقل
التبادل التفسية وتسبب اصفرار الصف وذبوله تلبه الجلود
والسوق || اغضرار جسيمة لانه يحلل دون ادخال الحب
تفيدو السنايل يفضاه التي ذافرة .

١٦٦١٠ - صُوجَة ، صَوْوَة *

Glycine hispida, G. soja, Soja hispida (S). Soja, Soya, Haricot soja (F). Soja bean, Soya bean (E). Soja, Sojabohne (D). Soja, Sola, Fava soja (I).
نبات عشبي زراعي صناعي وكلائي من فصيلة البقوليات
الفرغاية . مهد الشرق الاقي وقد تمت زراسته منذ
اصقاع العالم نظراً لفرائده الاقتصادية ولاارتفاع نسبة ما
يصويه حبه من المواد الازرقية والعدنية || اسمها الصيني
« تيو » والياباني « دندو » وفي حبة حنطة فرعاء تملر
نحو ١٥٠ سم . فروجها حنطة متعاقبة . اوراثها مركبة
طويلة الزناد ، ثلاثية الوريقات السناية اللدقة . ازهارها
عشوية التجميع ، محورية الارتكاز . ازهارها بتسجية
اللون او سفراء . ثمارها قرون صغيرة التسد ، قليلة
التجميع ، حلية القشور ، تغلف من حبتين الى خمس حبات .
اصرارها المشهورة نحو ١٦ تخلف بالوان حبا وما تحويه
من مواد حنينة وصلاحتها للاطعام والرتبة لذلك فهي
تجود في جميع الارتر به النسبة والتوصلة الحبيب والاندماج .

١٦٦٦٦ - صَوْتِيَّات حَلْقِيَّات * ، حَافِرِيَّة حَلْقِيَّة

Ungulus annosa, Fomes annosus, Polyporus annosus, Trametes radiciperda (S). Polypore annelé, Maladie du rond des pins (F).

ظفر من السميات مركب التنوب والعنبر والياض والرعر والابل والبتولا والصنوبر || يصيب الجذور فيقتضي على جوداتها ويبيتها ويصيب السخ فيقتضي على الماء والشكيز دون ان يمتدح الحطب لان الراتنج يحول دون انتشاره . يبدو على الجذوة والشكيز اطارات حلقة متتابة باندجانية اللون تنحرف الى السرة عندما يبدأ حيف المشج بعمله الانجلاي في الاجزاء والمواد القليلة || اما القطر فلا يعلو سطح القرية وهو صغير القدر حافري الشكل ، قطر قاعدته براوح بين ٣ و ١٠ سم . ثوبه الى الصلابة الحظيفة . لبايه اخير اللون ، لبني التركيب او غليبي || يوفاته بيفسها قيسها ٤x٦ ميكرون .

١٦٦٦٧ - صَوْتِيَّات حَلْقِيَّة حَلْقِيَّة ، حَلْقِيَّة حَلْقِيَّة

Semblable (F). صَوْتِيَّات حَلْقِيَّة (E).

Phylum (F). Phylum (E).

كل صوتية تسلسلية ، حسيانية او نباتية ، تقتصل على انواع متعددة من يفسها البيض تقضى صوته .

١٦٦٦٨ - صَوْتِيَّات حَلْقِيَّة حَلْقِيَّة

Laine (F). Wool (E).

الصوت بالعرف العام مجسمة من الشعر تؤلف الصفات الذي ينطلي اجسام بعض الحيوانات المتحركة كالنمل والملمز والابل الخ || اما شرة الصوت تتكون من ثلاثة اجزاء :

١٦٦٦٩ - صَوْتِيَّات حَلْقِيَّة حَلْقِيَّة ، حَلْقِيَّة حَلْقِيَّة

Ungulus fomentaria, Polyporus fomentaria (S). Amadouvier (F).

ظفر من السميات مركب الزان والبتولا والقرنوب والحور والخروج والستدان . رقة شديدة صلابة على الثوب والقطع . وهو من اكبر فطور السميات والمظلمة . شكله شكل سافر الحصان . خطوط قطر قاعدته نحو ٢٠ سم . وقد يبلغ في طريف خاصة ٤٠ و ٥٠ سم . بينا براوح ارتفاع قبة بين ١٠ و ٢٠ سم . || ثوبه في اول حيله لونه ابيض نبي الملاج ثم ينحرف الى الخفي وينتهي باخوري . لبايه غليبي ندي ، لونه الى الصلبة الحظيفة . بويافته متسلسلة مقبولة الاطراف قيسها ١٤x٥ ميكرون || يمتدح الجملوح ويدخل الى ثلوثها من جروحها اليابسة بعد ان يطب لشكيز والحطب الذي يلفقه بالثوب والعرى الى مكبات حاكما حاكما الطبقة الحظيفة المتناثرة || مشابه اغبر اللون يكتنف المكبات ويسبب انحلال موداه الحظيفة .

١٦٦٧٠ - صَوْتِيَّات أَشْفَح حَلْقِيَّة ، حَلْقِيَّة حَلْقِيَّة

Phellinus pomaceus, Polyporus fulvus (S). Phellinus (F).

ظفر من السميات مركب التفاحيات والوزيات في سورها واحصائها . يدخل من جروح التشليل التي اعمل ملازها بالمستيك ويرد حتى القلب فيسبب انحلال المواد القليلة والحظيفة || وهو حافري الشكل صغير القدر حبه من ٣ الى ٦ سم . سطحه خلي الملسس قرني اللون . لبايه صلب المقطع غليبي التركيب ، اسمر اللون || يكتنف بانتراخ المقطر وبتطير الجرح وظلاله بالمستيك بعد تنظيحه من المشج والحطب المتطويع .

١٦٦٧١ - صَوْتِيَّات السندليان ، حَلْقِيَّة حَلْقِيَّة

Phellinus dryadans (S).

ظفر من السميات مركبه جلوج السندليان وقد يصيب الكنتنا || يظهر الخارجي قبة مستوية ، غسدة ، فاشرة الحافة ، قطر قاعدتها براوح من ١٠ الى ٢٠ سم . علاها الحاربي الملوي رقيق القشرة الرضوة ، لونه الى البياض الاغبر ، برشح يفسف انقسط الحظيفة اللون || لبايه حنطلي عايق ، جامد المقطع الغليبي . بوفاته شفاقة او تنيبة اللون ، مدنية الشكل ، طويلا نحو ٩ ميكرون وقطر قاعدتها ٣ ميكرون || وهو من الفطور السرية النمو يظهر في اواخر تموز . مشابه يسبب المغن الحظي بعد ان يحرب الياض ويطبها .



صوتان



صوتان اشقح



صوتان حلقى



صوتان كاذب

١٦٦٧٢ - صَوْتِيَّات كاذب * ، حَلْقِيَّة حَلْقِيَّة

Phellinus igniarius (S). إسكاه

Faux-amadouvier, Apoplexie, Escra (F).

ظفر من السميات موكه البلاد المعتدلة الحرارة والباردة . مركب حدة نباتات حربية انحصا الاسفندان ، البتولا ، الجوز ، الحور ، الدوار ، الشمر ، الصفصاف ، الفاسول ، الفيزاء ، القزولس ، الخث ... ومركب من النباتات الزراعية الطماح والقرين والكزبة || مشابه اغبر اللون يدخل من الجروح اليابسة فيطب في الاشجار الحرجية طبقاتها الحظيفة حتى القلب ويصطب الشكيز في الجوز والستدان . وقد يدوم حصة سنوات لانه يطب والانتشار . ويكون الحطب الموصوم شديد السرة او زاهي الصفرة عدم الحظيرة سريع الانتعاش || وهو في الكزبة رسم ونمى القابلة لانه يفسف على الحظيفة بسرعة بعد ان يطب الماء واليابات الساك والجهاز الرمالي الذي يؤمن نقل النسج وتبادلده || يكتنف باقتلاع الاجفان الموصومة وينضخ الكزبة بعد قلعها باسبور بعض المطويات السائلة المركزة على مادة القزوين || اما القطر فتوسط القدر ، قبي الشكل ، قطر قاعدته براوح بين ١٠ و ٢٠ سم . لصاديه قليلة سمكية ، عمودية ، صهبا اللون او قزينة ، زبد السطح خيرا المل || لبايه حنطلي اللون جامد المقطع الناعم . وهو من الفطور التي تضر من ٥٠ الى ٦٠ سنة .

١٦٦٧٣ - صَوْتِيَّات حَلْقِيَّة حَلْقِيَّة

Coniopherygidae (S).

Coniopherygidae (F). Coniopherygidae (E).

فصيلة حشرات * من رتبة شرافات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة . تألف النباتات . حشرات الاجلانة تعيش على تنسج الاشجار . يرقاتها مبرقة تعيش خاصة على الارق والحظيات || اجسامها صغيرة قطرها من ٢ الى ٥ سم . بسطتها تراوح من ٥ الى ١٠ سم . تشاها مغلول بمادة طيسلية كالنقيق . وهي مجهزة بعدد خاصة مبرقة في جميع احاء الجسم ، تفرز مادة شمعية واقية . قرنها الاستشعارية مهدية عند الاجلانة والبرقة . عينا صديرة . اجنسها لانتساوية اللقد بين الزوج الانثوي والحظي || يرقاتها صغيرة ، مدنية الشكل ، حليلة التكاثر ، مقترنة || اشهر اجنسها الصوق والسدال .

خلفية الصفحة. أضرارها طرفي، فربي التجميع، تحرك
ضمة من الأوراق المستعرضة.



صوبل الشام

١٦٦٣٧ - صَوَمَرَةُ * Acharia (S), Acharie (F).

الصورة ج صوبر. نبات لبني عاشر مدبر من فصيلة
الصوبريات يكثر في التايغاس وصل سفات مجاري الماء.
يزرع القرنين. جنين بكثرة فروه الحقيقية الصبيغة،
بقلة أوراكه للمثمرة، يندم جبال أنظاره وبغرابة ثماره
وزروره الجذيرة المستحقة الشكل.

١٦٦٣٨ - صَوَمَرَةُ الْبَقُول * Misella oleracea,

Mamestra oleracea, Pollis oleracea (S).
Misella potagère, Noctuelle potagère (F).
Bright-line brown-eye (E).



صولة

حشرة مؤذية من الفصيلات حرشفيات الاجنحة. موطنها
يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اريوية. فراشاتها جارية
قوتها مشتر الاضرار. سرقتها تموش على اوراق الصليبيات
البرية والزرعاه وصل البقول. جسمها متوسط طوله
نحو ١٥ م. بسطها نحو ٢٨ م. رأسها معتدل الحجم
عجوزي اللون. صحنها كيرتان زباناها عظيمان.
حيثما الى الجذوة. يمتد الى الخلفي الاسمر يملو خط
لنجي من النقطة السود. ورشاتها الاماميان الى الجذوة
الاصفر، ويملوها تسنين طرفي بني اللون. ورشاتها
الحظيات الى الكتلة. اهدائها الى القطعة النصفية. لها
جهاز في الخلف. تظهر فراشة الجبل الاول في حزيران
وتظهر فراشة الجبل الثاني في ايلول. تسرح في الليل.
تقاتل بدم ظهورها بنسوخة ايام وتفتح المكن لسطحاً
على الصفحات السفلى من اتصال النبات كمالاً في السرعة
تطوي نحو ٣٥ م. جسمها مائل للفسار. ثوربا الى
الخضار الاسمر يملو خط لنجي طاقب عجوزي اللون يحده
من العينين واليسار خطان احمران واربع نقط سود في كل
سكة. ويملو ايضاً خطان جانبيين اسفران. رأسها الى
الجذوة. منها الى الشبهة السمر المولج. رواجها سود.
طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة.



صوبلية



صورة

١٦٦٣٩ - صَوَمَرَةُ الْقَرْفَل * Misella compta (S).

Misella parée, Noctuelle
des dianthées (F). Misella compta (E).

حشرة من الفصيلات حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض
الاقام حوض البحر الابيض المتوسط. فراشاتها واسعة قوتها
رقيق الاضرار. سرقتها نامة تلثم اوراق القرنفليات
وتتقرب الكماير وتلتهم البزور قبل التفتح. جسمها
متوسط طوله نحو ١٤ م. بسطها نحو ٣١ م. رأسها
عجوزي الشكل اسهب اللون. صحنها كيرتان. زباناها
عظيمان. حيثما وربتها الى الصخرة السوداء المولج
ورشاتها الاماميان الى الصخرة السمر يملو تجميع احمر
وتتبع ابيض وزرقة صفية وتنتيد اسود. ورشاتها
الحظيات الى الصخرة السمر الصبيغة اللون. اهدائها الى
القطعة النصفية. لها جيل واحد في الخلف. تظهر الفراشة
في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تقاتل بدم
ظهورها بنسوخة اسابع وتفتح المكن لسطحاً على الصفحات
السفلى من اتصال الاوراق. في السرعة تطوي نحو ٣٠ م.
جسمها اسطواني الشكل. مشقة التفشار. ثوربا الى
القطعة الخضراء يصر في الظهور ويتر في الجانبيين. رأسها
عجوزي اللون. منها الى الربكة. رواجها سود. طول



صورة البقول



صورة القرفل

Sperme des équidés (F).

Sperm of the equidae (E).

هو افراز اللبد التناسلي للذكورية عند الوباب من خيل
وجير.

١٦٦٤٠ - صَوَمَرَةُ * Corynespora.

جنس فلور مجهرية من الريديات وفصيلة الطعيات.
جره الكيفية سمره اللون، اسطوانية الشكل، غليظة
للمفاصل القدية، فردية او ضعية التجميع. كتانه
سبيعية الترتيب، تحيلة الفواصل الشفافة. انواره قليلة
المدد، اعرفها صوبل الشام.

١٦٦٤١ - صَوَمَرَةُ الشَّام * Corynespora melonis (S).

فلور مجهرية يتطفل على اوراق الشام والقرع والخيار
والكمون. مظهرها الخارجي يقع لاقصية الشكل والحجم،
لونها الى السمر المظلم، اطرافها حالي حاقب اللون، تركب
نصل الاوراق فسيب ذيوا ويملوها. يكالغ عند
ظهوره باستعمال المركبات النصلية المركزة ١ %.

١٦٦٤٢ - صَوَلَةُ * Aeschynomene.

Aeschynomene (S), Aeschynomene, Sola, Nelitte (F).
Sola, Bastard sensitive plant, Pitt-hat plant (E).
Schampfianze, Sinnpflanze (D). Planta modesta
bastarda (I).

جنس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القرنفليات الفراضية.
انواعه المعروفة سبعة مهاد البلاد الحارة تكثر في الصين
والهند. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها مختلفة الالوان
الزاهية تتميز بكثرة اسديتها التي يبلغ عددها عشرة. وهو
نوعان.

الصولة الصينية Aes. paludosa (S).

Aeschynomene de Chine (F).

ساقها مستطيلة، ليفية، لينة، تستعمل في صناعة الورق
الفاسخ المعروف بورق الرز.

الصولة الهندية Aes. cannabica (S).

Aeschynomene de l'Inde (F).

جنية ليفية مستطيلة السال اللينة. اوراقها فزلية متينة
تستعمل في عدة صناعات منزلية وغيرها.

١٦٦٤٣ - صَوَلُج Argent pur (F).

Pura silver (E).

١٦٦٤٤ - صَوَلُجِيَّاتُ Calviforme (F).

Calviforme (E). صَوَلُجِيَّاتُ

شكل من الزباني يشبه السويجان.

١٦٦٤٥ - صَوَلُجِيَّاتُ الْفَرْوِي Rhopaloceros (F).

Rhopaloceros (E).

مرتبة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. فصائلها
عديدة تتميز بقرنها الاستشعارية الصوانية الشكل.
خادراتها حارية لا يملوها في نباتها، فيه. مكها يربل
الشكل، فربي الوضع، لا نظامي الترتيب.

١٦٦٤٦ - صَوَلُجِيَّاتُ Leucadendron argentum (S).

Leucadendron argenté, Arbre d'argent (F).

جفيرة زينة سبروتية من فصيلة النضيات. ساقها
متنصبة فراه. اوراقها تطوي من ١٠ الى ١٦ م. وتوش
من ١٢ الى ١٦ م. نصلها جامد النسيج، خلي البشرة
القصية اللون. ازهارها انبوية، ضيقة، رباعية التفشر،

المرشدة الممرسة حُبَا بَرِيَّةٍ مَوْطِنُهَا الْبُلْبُلُ وَالْإِدْغَالُ الْبَرِّيَّةُ
وَسَبَا زُرَاعِيَّةٌ زُرِّيَّةٌ . اَشْهَرُهَا السُّورُ .

١٦٦٤٣ - صَوْمُكَة Solenanthus (S). Solananche (F).
الصَّوْمُكَة حُورٌ . ثَبَاتٌ عَشْبِيٌّ يَحْمِلُ مِنْ فُصَيْلَةٍ اَحْمَسِيَّاتٍ .
اَنْوَاعُهُ قَلِيلَةٌ مَوْطِنُهَا جِبَالُ الشَّرْقِ الْاَوْسَطِ . سَوْحَا زَبَا
الْقَهْمَاءِ عَامَّةُ الْفَرْعِ ، تَعْلُو مِنْ ٧٠ الى ١٥٠ م . اَوْرَاقُهَا
مُسْتَقَّةٌ ، اَحْلِييَّةٌ ، ذَلَقَةُ الزَّوْمِ الْاَخِيَرِ . نَاصِلُهَا خَلِي الْبَشَرَةِ
اَثِيرُ الْوَيْنِ . اَنْزَعَارُهَا عَقَرِيٌّ تَجَسِّمٌ ، اَيْطِي الْاَرْكَازُ .
اَنْزَعَارُهَا اَبْرِيَّةٌ الشَّكْلُ تَبْدُو حُرَّاءُ الْوَيْنِ ثُمَّ تَحْتَرِفُ اِلَى
الْاَرْبُوجِيَّةِ الْاَزْرَقِ || اَنْزَعَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ نَيْسَانَ اِلَى
حَزْرِيَانَ .

١٦٦٤٤ - صَوْتَعِيَّاتٌ Protoblastoptères (F).
Protoblastoptera (E).
رَبِيَّةٌ حَشْرَاتٌ مُنْفَرِجَةٌ مِنْ طَبَقَةِ الْوَرْدَانِيَّاتِ . اَسَاقِيهَا
تَعْمِدُ اِلَى اَلْحَقِيْقَتَيْنِ الْكَرْبَوِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ مِنْ الْاَبَاجِ الْاَوَّلِ ||
الْاِسْمُ الْعَلَمِيُّ يَرِثُ اِلَيْهَا مِنْ اَسْلَافِ الْوَرْدَانِيَّاتِ .
تُرَبِّئُهَا الْوَرْدِيُّ وَاحِدٌ اَمَّا مُقَدِّمُ حُوشَتِهَا فَلَا يَسْلَفُ الرُّؤْسُ
وَكَانَتْ تَعْمِدُ عَلَى الْاَشْجَارِ عِلَاقًا لِنَيَّاتِ وَرْدَانَ الدَّالَّةِ .

١٦٦٤٥ - صَوِيَّةٌ هي الصَّوِيَّةُ ، اَطْلَبُ .

١٦٦٤٦ - صِيْصَكَة Ergot (F). Spur (E).
عَلَبُ الْبَيْدِ فِي سَاقِهِ .

١٦٦٤٧ - صِيْصَاءُ ، صُكْرَاطُ ، صِيْصَارُكُ Coutard (F).
هُوَ كُلُّ ثَبَاتٍ مُعْرِضٍ قَصَاصًا اَيَّ لِسْقُوطِ الزَّهْرِ اَوْ
لَا تَمْلَاسُ الْفَرْعُ بِدَلْفِهِ .

١٦٦٤٨ - صِيَادُ السَّمَكِ Cérýle (F).
هُوَ الْفَرَفَرُ ، اَطْلَبُ .

١٦٦٤٩ - صِيَادَةُ الْوَرْدِ Hippodamia (S).
Hippodamie (F).
جَلَسَ حَشْرَاتٌ عَمِلِيَّةٌ مِنْ فُصَيْلَةِ الْاَعَاسِيَّةِ وَرَبِيَّةٌ مَبْدُودَاتُ
الْاَجْنَسَةِ .
١٦٦٥٠ - صِيْكُوُ الْقَطِيعِ مِنَ الْبَقَرِ .

١٦٦٥١ - صِيَاكَة Formulation (F).
Formulation (E).
الصِّيَاكَةُ وَضْعُ الصَّيْفَةِ وَتَوْضِيحُهَا .
١٦٦٥٢ - صِيَاكَة Entretien (F). Keeping (E).
هُوَ جَعْلُ الْاَعْمَالِ الْمُتَوَجَّهَةِ لِلْحِفَافِ عَلَى الشَّيْءِ سَلِيْبًا مِنْ
الْمُشْرَاطِ .

١٦٦٥٣ - صِيْخُوْرُ Roc (F). Rock (E).
الصَّخْرَةُ الْعَمَلِيَّةُ الثَّابِتَةُ فِي مَكَانِهَا .

١٦٦٥٤ - صِيْدٌ ، اَصْطِيَاكٌ ، قَصِيْدٌ ، اِنْتِصَاصٌ Chasse (F). Hunting (E).
هُوَ اِتِّخَاصُ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانِ . وَمِلْكُ الصَّائِدِ قَصَصُهُ
بِالْاِسْتِيْلَاءِ .

١٦٦٥٥ - صِيْدٌ Glibier (F). Game (E).
الصَّيْدُ هُوَ كُلُّ مَا صِيدَ مِنْ حَيَوَانٍ يَنْتَعِ بِقُوَّتِهِ اَوْ جَنَانِهِ .

الْاَكْمَالُ يَسْتَمِرُّ نَحْوَ ثَلَاثَةِ اَسَابِيحٍ وَيَنْقَضِي شَمْنُ جَلْبَابٍ
مِنْ الْبَلْبَلِ تَلَفُّفُهُ السَّرْعَةُ يَدُ اَنْ تَعْمِدُ فِي التُّرْبَةِ عَلَى عَرَقِ
٤ اَوْ ٥ م .

١٦٦٥٠ - صَوْمُكَةُ الْهَنْتَبَاءِ Misella dysodes (S). Misella dysodes, Noctuelle
des chlores (F). Misella dysodes (E).
حَشْرَةٌ مَسْتَهْجَةٌ الرَّابِعَةُ مِنْ فُصَيْلَةِ الْفَسْفِيَّاتِ وَرَبِيَّةٌ حَرْشِيَّاتٍ
الْاَجْنَسَةِ . مَوْطِنُهَا يَشْمَلُ مَطَرُ اَتَالِمْ حَوْضُ الْبَحْرِ الْاَبْيَضِ
الْمُتَوَسِّطِ . فَرَاثَتُهَا وَاشْمَةٌ نَحْوُ اَشْرَاقِ الْاَزْهَارِ . سَرْقَتُهَا تَعْمِدُ
عَلَى اَوْرَاقِ وَزَيْتَانِ الْمَرْكَبَاتِ وَاصْخَصَا الْهَنْتَبَاءِ || جَسْمُهَا
مُتَوَسِّطٌ لَقَدْ يَطُولُ نَحْوَ ١٤ م . بِسَطُهَا نَحْوَ ٣١ م . رَأْسُهَا
غُرْبِيٌّ الشَّكْلُ . عَيْنَاهَا كَبِيرَتَانِ . زَبَانُهَا خَطِيئَانِ .
سَرْقَتُهَا مُتَعَدِّلَةٌ اَلْجَرْمُ وَالْقُلُوبُ . جُوشَتُهَا وَيَعْلُو اِلَى الرَّبْدَةِ
السَّوْدَاءِ الْمَوَاجِ || رُوشَتُهَا الْاَسْمَانِ اِلَى الرَّبْدَةِ الْخُفِيَّةِ
الْمَوَاجِ يَطْلُوها تَبْقِيْعُ اَمْرٍ تَخْفَلُهُ نَقَطُ سِيَرٍ . رُوشَتُهَا
الْخُلْفَانِ اِلَى الرَّبْدَةِ الْخُفِيَّةِ تَسْرِعُ قَرِيبَ الْاَطْرَافِ ||
لَهَا جَبَلٌ وَاحِدٌ فِي الْخَلْفِ . تَطْهَرُ الْفَرَاثَةُ فِي اَيَّامٍ وَيَقْبِيْ حَتَّى
تَعْمِدُ . تَسْرِعُ فِي الْبَلِّ . تَمَاطُلُ بِهَذِهِ ظُهُورُهَا بِنَحْوِ سِتَّةِ
اَسَابِيحٍ وَتَعْمِدُ الْمَكْنُ لَعْمًا عَلَى الصَّفَحَاتِ السُّفْلَى مِنْ نَاصِلِ
الْاَرَاكِ || السَّرْعَةُ تَطُولُ نَحْوَ ٣٠ م . جَسْمُهَا اَسْطَوَالِيٌّ
الشَّكْلُ ، مَشْعُودُ الْقَفَارِ . ثَوْبُهَا اِلَى اَلْمُطَلَةِ السَّوْدَاءِ يَطْلُوها
خَطٌ لَبِيْهِ قَلْبُ سِدْرِ الْوَيْنِ ، اَبْيَضُ الْخَطَرِ مِنَ الْبَيْضِ
وَالْاَبَرِ . جَانِبَاهَا مُتَعَدِّلَتَانِ بِالْاَسْوَدِ وَالْاَصْفَرِ . رَأْسُهَا اُخْرُ .
مَدْبِهَا اِلَى الرَّبْدَةِ . وَرَاجِبُهَا اِلَى السَّرْعَةِ || طُورُ الْاَكْمَالِ
الَّذِي يَسْتَمِرُّ نَحْوَ ثَلَاثَةِ اَسَابِيحٍ يَنْقَضِي فِي الْكَثَرَةِ شَمْنُ
جَلْبَابٍ مِنَ الْبَلْبَلِ .

١٦٦٤١ - صَوْمُكَةُ رَحَاكَة Misella paragrana (S). Misella paragrana (F).
Misella paragrana (E).
حَشْرَةٌ مِنَ الْفَسْفِيَّاتِ حَرْشِيَّاتٍ الْاَجْنَسَةِ . مَوْطِنُهَا يَجَاجِدُ
وَتَبَامُ حَوْضُ الْبَحْرِ الْاَبْيَضِ الْمُتَوَسِّطِ . فَرَاثَتُهَا وَاشْمَةٌ قَوِيَّةٌ
نَحْوُ الْاَزْهَارِ كَثِيْرٌ خَاصَّةً الْاَرْمَالُ مِنْ بَقْعَةٍ اِلَى بَقْعَةٍ .
سَرْقَتُهَا تَعْمِدُ عَلَى اَوْرَاقِ السَّرِقِ وَالْحَرَضِ وَالْقَطَفِ وَالْاَشْنَانِ
وَالرَّيْثِ || جَسْمُهَا مُتَوَسِّطٌ لَقَدْ يَطُولُ نَحْوَ ٣٥ م . رَأْسُهَا
مُسْتَدَلٌّ اَلْجَرْمُ ، اَرْدَبُ الْوَيْنِ . عَيْنَاهَا كَبِيرَتَانِ . زَبَانُهَا
عَطِيَّانِ . جُوشَتُهَا وَيَعْلُو اِلَى الرَّبْدَةِ الْخُفِيَّةِ الْمَوَاجِ ||
رُوشَتُهَا الْاَسْمَانِ اِلَى الرَّبْدَةِ الْخُفِيَّةِ تَطْلُوها رَقْعَةً وَزَوْقَةً
تَارُوحُ مِنَ الْفَتَقَةِ اِلَى الصَّهْبَةِ وَالشَّهْبَةِ . رُوشَتُهَا الْخُلْفَانِ
اِلَى الرَّبْدَةِ الْخُفِيَّةِ الْمَوَاجِ تَطْلُوها جِدَّةٌ مُنْفَرِجَةٌ تَسْتَقْبِلُ الْخَطَرِ
الْمَخَاطِبِ || لَهَا جَبَلَانِ فِي الْخَلْفِ . تَطْهَرُ فَرَاثَةُ الْجَبَلِ الْاَوَّلِ
فِي اَيَّامٍ وَتَطْهَرُ فَرَاثَةُ الْجَبَلِ الثَّانِي فِي اَبِّ . تَسْرِعُ فِي الْبَلِّ .
تَمَاطُلُ بِهَذِهِ ظُهُورُهَا بِنَحْوِ حَشْرَةِ اَيَّامٍ وَتَعْمِدُ الْمَكْنُ لَعْمًا
عَلَى الصَّفَحَاتِ السُّفْلَى مِنْ نَاصِلِ اَوْرَاقِ ثَبَاتٍ الْمَاطِلِ ||
السَّرْعَةُ تَطُولُ نَحْوَ ٣١ م . جَسْمُهَا شَبَّ اَسْطَوَالِيٍّ الشَّكْلُ ،
مَالِي الْقَفَارِ ، عَادِمُ الْمَلَبِ وَالْقَطَفِ الْسَوْدِ . ثَوْبُهَا اِلَى
الْخَضَرِ الْزَاقِيٍّ تَطْلُوها ثَلَاثَةُ خُطُوْفٍ قَاطِبَةٍ جَوْرِيَّةٍ . رَأْسُهَا
اِلَى الْحَمْرَةِ الْمَرْجَانِيَّةِ . مَدْبِهَا وَرَاجِبُهَا اِلَى السَّرْعَةِ السَّوْدَاءِ ||
طُورُ الْاَكْمَالِ الَّذِي يَسْتَمِرُّ نَحْوَ ١٥ يَوْمًا يَنْقَضِي فِي الْكَثَرَةِ
شَمْنُ جَلْبَابٍ مِنَ الْبَلْبَلِ .

١٦٦٤٢ - صَوْمُكِيَّاتٌ Achariaca (S).
Achariaca (F). Achariaca (E).
فُصَيْلَةٌ نَبَاتِيَّةٌ مِنْ ذَوَاتِ الْفَلَتَقَتَيْنِ عَمِدَةُ الْعَمَالَاتِ . اَنْوَاغُهَا
كَثِيْرَةٌ مَسْطُوحَةٌ اَلْفَرِيْقُ الْمَحْتِ . جَمِيْعُهَا مِنَ النَّبَاتَاتِ الْيَقِيَّةِ



صورة الهنباة



صورة رصاة

١٦٦٥٦ - صَيْدُ السَّمَكِ (Fishing) (F).
هو البحث عن السمك وإخذه بمختلف الوسائل . وتكون ملكية السمك للمصاد لصياده بحق الاستيلاء .



صيداء

١٦٦٦٦ - صَيْدُ الدَّخْمِ *
Sarcophaga carnaria (S). Mouches à daniens, M. de la viande (F).



صيدان أبيض الرأس

ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٧ و ٢٠ م. ثوبها أغرض اللون يعلو غسوط متصالية تشكل مبريات تشبه رقعة الشطرنج . يكثر وجودها من أيار إلى تشرين الثاني . تسرح في كل مكان . مكنتها يفتن في جراحها القبيح فضحه رقات صغيرة دقيقة على اللحم والجيف والافتقار .

Tumle

١٦٦٦٧ - صَيْدُ كَالِي

هو التسمية ، أطلقها . أما صيدنازي فن وضع القترين إلى كتور لين الملوغ .



صيدان أزرق

١٦٦٦٨ - صَيْدُ كَيْتَات ، لَقَاعِيَّات

Calliphoridae (S). Calliphoridae (F).
فصيلة شرشات ذبابية من رتبة ذوات الجنانحين . اجنتها وانزاعها نحو ٥٠٠ مم منها صغير أفتح وبطنها متوسط وكثير . أنثىها تخطفه يلبس ثياب الرصاصي . أرجلها زياء . ذكورها كالأنثى لا تفرق بينها سوى علة البك الملونة الظاهرة في مؤخر الحلقة الطرفية عند الذكور . قوتها مثل الأعداد والفرزات ، والعظام ، وأكثر المواد العضوية والبراز || يرقاتها هواكة وأجحة وبنا خاضعة وثالثة وبطنها لاصح يركب الحيوان ليخذه .



صيدان الجراد

Cynagétique (F).

Hunting art (E).

١٦٦٦٩ - صَيْدُ عِي *
ما له علاقة بفن الصيد .

١٦٦٧٠ - صَيْدُورُ

اسم شامل يطلق على البلم المنسج ويل بعض صفار السمك كالشعير والملت والرشا الخ .



صيدان العم

Bercail (F). Fold (E).

١٦٦٧١ - صَيْدُورُ

السيرة والسيارة . خاتمة البقر والتم والمز .

Inoceramus (S).

Inoceramus (F). Inoceramus (E).

١٦٦٧٢ - صَيْدُورُ *
جلس حيوانات من الرضويات صغيريات الخيلج حادمت اللصاب وفضيلة الاطريات . أنواعه للمرة مدينة . جميعا من مستحبات الاراضي الطليجية || اصداها شبه غروبية الشكل بالغة التشديد الطولي .



صيدان العم

١٦٦٧٣ - صَيْصُ

هو الساية ، أطلقها .

١٦٦٧٤ - صَيْصَاء

حب البليغ والمنظل والقيام وما أشبه الذي ليس في جوفه لب .



صيد

١٦٦٧٥ - صَيْدُورُ لَيْلٍ *

Selousia inuleta (S). Selousia inuleta (F).
طار من الجوارح منيات المتغير يستعمل في فصيلة اللذبابيات . يألف الغابات وصفات مجاري الماء . لجبهه الحياتي جامعي . جامعاته قليلة العدد . قوته للذباب والرمال والديدان || جسمه صغير أفتح بطول نحو ١٦ م . متقار غرزي الشكل ، صغير الحجم . سباله كثيف قصير . جناحاه ذلقان . ذنبه مستطيل الشكل ، مقنطرم الحرف . ثوبه البدي إلى الخضار الالامس الاسفلع اللوج . زوره وصدنه ويطع إلى



صيدور ليل

١٦٦٥٧ - صَيْدُ الدَّخْمِ *

Callionymus (S).
Callionyme, Chiqueux, Dragonnet (F).
جلس اسماك بحرية من شائكات الزنائف . أنولها مدينة منها واحد يقيم في البس الايض المتوسط . وهو صغير أفتح ، مستطيل الشكل ، كبير الرأس ، مزيتوب الثوب ، متيان الزنائف الخفيفة والمدمجة بمختلف الالوان .

١٦٦٥٨ - صَيْدُورُ

هي الارض الحمراء التربة الغليظة الحجارة المستوية السطح

١٦٦٥٩ - صَيْدُورُ

Hibou (mâle) (F). Owl (male) (E).
ذكر البومة .

١٦٦٦٠ - صَيْدُورُ

Pharmacopée (F). Pharmacopoeia (E).
بحث تركيب الادوية وطرق استخدامها للمعالجة .

١٦٦٦١ - صَيْدُورُ ، زَيْتَان

Sarcophaga (S). Sarcophaga (F).
جلس ذباب يبيض وولد لاصح من فصيلة الصيدينات . أنواعه عديدة . جميعها وأجحة وثالثة يكثر وجودها في الصيف . أشهر أنواعها وأجحة الاربعة التالية .

١٦٦٦٢ - صَيْدُورُ أَيْضُورُ

Chrysomya albiceps (S). Mouches à tête blanche (F).
ذبابة من الصيدين طولها يراوح من ٥ إلى ٧ م . لونها إلى الأزرق . رأسها أبيض . زياتها سوداوان . يرقاتها غيرة اللون ، زياء الجسم تدبش على الجيف .

١٦٦٦٣ - صَيْدُورُ أَحْمَرُ

Pollania rudis (S). Pollénie rude (F).
حشرة ذبابية من ذوات الجنانحين وفضيلة الصيدينات . جسمها متوسط أفتح بطول من ٨ إلى ١٠ م . عليها متكاثف عشش . طيراتها منيف الحركة سريعة . رأسها كبير الحجم . غسوطها ذرب . زياتها صغيران . حباتها كبرتاتان ، صفراء اريد اللون ، حشلي اللوج . بطنها إلى القردة . أسود الزركشة . ريشها كبرتات ، شفافة ، يملؤها شفح حشلي . قوتها إلى السمرة || يكثر وجودها من نيسان إلى تشرين الثاني . ترب في المواقف الممرضة لآفة الشمس || قوتها مثل الأعداد والفرزات أنثابتة وقد تقتحم المنازل الغريبة في طلب القوت || يرقاتها وأجحة وكثقل مل اغترافين تقتضي عليها .

١٦٦٦٤ - صَيْدُورُ أَرْزَقُ *

Calliphora erythrocephala (S). Mouches bleues (F).
ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٨ و ١٢ م . ثوبها إلى الزرقعة اللامعة . يكثر وجودها من نيسان إلى تشرين الاول . مسرجها كل مكان مشمس . لا تدخل المساكن الا لتتبع مكنا على اللحم والجيف والخضار والبقول اللذابة . يرقتها دقيقة غيرة اللون ، سمره الرأس ، مبرية الحلب .

١٦٦٦٥ - صَيْدُورُ الْجِرَادِ *

Stomoxys calcitrans (S). Mouches des sauterelles (F).
ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٥ و ٧ م . ثوبها مجذع ومغط بالاسود والاخير . يكثر وجودها من سزيران



صيف



صيف



صيف



صيف الخيل

١٦٦٨٢ - صيف
Rostellaria (S).
Rostellaria (F). **Rostellaria (E).**
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الارجل
 وفصيلة الدلائيات . انواعه المماصرة المروعة عديدة منتشرة
 في بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر والبحر
 الابيض المتوسط || اصداؤها مردنية الشكل ، متباينة
 اللد ، طول من ١٢ سم . جميعها محزنة حتى
 الاضباب . فمها مستطيلة ، دقيقة الاطراف المزانية ،
 مقوسة الجوانح || اجسامها محزنة ، مستطيلة الرؤوس
 المنتهية باضمار مغلوقة . لولاسها ثنائية ، مغلوقة ، ممدودة .
 ارجلها مشطورة الى لفتين ، الخلفية مجهزة بسقاط قشري
 المادة ظلي الشكل .

١٦٦٨٣ - صيف
Dériction (F).
Dériction, Wearing away (E).
 الصيغة الانقراض بالاحتكاك او المنك .

١٦٦٨٤ - صيف
Dérictique (F).
Dérictal (E).
 نعت تعريفي يطلق على جميع التكاوين الروسية المتأخرة .
 عن تفتت الصخور ميكانيكياً .

١٦٦٨٥ - صيف
Sclerostomum (S).
Sciérostoma (F). **Sclerostoma (E).**
 جنس دود من السلديات . انواعه عديدة جميعها طفيلية .
 بعضها يتطفل على الدواجن اعصاب الخيل .

١٦٦٨٦ - صيف الخيل
Sclerostomum equinum (S). **Sciérostome du cheval, Strongie armé (F).**
 نوع من الصيول يعيش طفيلياً في مساريق وابواب الخيل
 ليشيها بما يسبب من مفس مؤلم .

١٦٦٨٧ - صيف
 الصيب : شدة الحر . يوم صيب وصعب : شديد الحر .

١٦٦٨٨ - صيف
Déserticole (F).
Deserticole (E).
 نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يألف
 الصحراء .

١٦٦٨٩ - صيف
Lisse (F). **Smooth (E).**
 الصيوج هو الاملس المعاد من النبات .

١٦٦٩٠ - صيف
 صيف الخيلات هي فصيلة الخبيبات ، اطبا .

البياض الناصع || يلدن حبه في الانجار القريبة . الاث
 تحسن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

١٦٦٩١ - صيف
Formule (F). **Formula (E).**
 تعبير مجازي او رقمي يدل على كميات المواد التي يتألف
 منها تركيب معين ما مع نسبة عناصره وعدد وسائطه
 الغذائية .

١٦٦٩٢ - صيف
Ené (F). **Sumerer (E).**
 احد اصول السنة العربية مدته ثلاثة اشهر تبدأ في نصف
 الكرة الشمالي في ٢١ حزيران وتنتهي في ٢٠ ايلول . وهو
 يتميز بشفة حرارته وبطول نهاره وذلك لانه يبدأ عندما
 تكون الشمس في الست عمودية على مدار السرطان .

١٦٦٩٣ - صيف
Poussière suspendue dans l'air (F).
 الصوف والصيغة : الغبار الجائل في الهواء .

١٦٦٩٤ - صيف
Loxia (S).
Loxia, Bec-croisé (F). **Crossbill (E).**
 جنس صافير من فصيلة الشرشوريات . انواعه سبعة جميعها
 من صافير المناطق المتفلة . طولها يراوح بين ١٤ و
 ٢٠ سم . انوفها عديدة الالوان فيها الجزوي والاصفر
 والاسمر والاسود والرمادي والابيض والمنش . متقترجا
 غليظة ، قوية ، متصالبة . اذناها غائرة || يألف
 الاحراج اعصاب اراج الصنوبر والتوب والسرو . قوته
 سحب الصنوبر ويختطف البزور البرية والفراخية وبعض
 الحشرات والحلم || يلدن في الانجار الكثيفة . اناته
 تحسن وسعها || بيضات على مرتين في السنة يبدأ ذكرها
 قرون الغذاء وفرد .

١٦٦٩٥ - صيف
Codex
 المبرزة الرسمية التي تيمت في الادوية ودرجاتها وطرق
 تحقيقها .

١٦٦٩٦ - صيف
Smerinchus (S). **Smerinthe (F).**
 جنس حشرات من فصيلة الحريات انواعه اربعة او خمسة
 جميعها دجوية تسرح في الليل . اجسامها متوسطة اللد
 طولها يراوح بين ٣ و ٤ سم . القواها الى القبرة الخلفية .
 حجلاتها مبقية بالاسود . رواشها كبيرة ، مزركفة
 وبوذية . قرونها الاستشارية تقليدية الشكل || رقاتها
 مرطاة الجسم يكثر فيها اللون الاخضر القاتم . وهي غاشلة
 قلمها اوراق بعض الاشجار اعصاب الستيان والرزق .



ض

مرة من ٤ إلى ٦ يبيضات تحملها بمناوبة الذكر نحو ١٧ يوماً :

Entropie (F).
Entropy (E).

١٦٦٩٣ - **ضابطة التغير**

طريقة تسمح بتحديد انعطاط جهد القوة الحرارية .

Police sanitaire vétérinaire (F).
Entropie (E).

١٦٦٩٤ - **ضابطة بيطرية**

جام القوانين والانظمة المرجعية الاجراء المأذنة الى مقاومة انتشار الامراض السارية والمعدية في المواجن .

Embouchure, Delta (F).

١٦٦٩٥ - **ضابطة**

هي دلتا النهر ونحوه او مصبه .

Carnassier (F). Felina animal (E).

١٦٦٩٦ - **ضمار**

الحوان المفترس . م ضارية . ج ضوار .

Erratique (F). Erratic (E).

١٦٦٩٧ - **ضارب**

تمت تعريفه يطلق على كل طائر ليس بأبنة او قاطع بل يجوب البلاد من منطقة الى اخرى في طلب الرزق . ج ضوارب .

Multipliant (F). Multiplying (E).

١٦٦٩٨ - **ضارب**

١٦٦٩٩ - **ضارب** * (F). Procrustes (S). Procruste (F). جنس غشائس مفيدة من فصيلة البروطانيات ورتبة مفدمات الاجنحة . انواعها عديدة جميعها كبيرة الجثة طولها يراوح بين ٣٠ و ٤٠ م . اثنائها الى السواد النحسي . تخرج في الليل وتفتس الكثير من الحشرات والحوام الضارة .

١٦٧٠٠ - **ضباب**

ضباب البسات : يكثر بالقبض والقبض اول الحج .

Agelais (S).

١٦٦٩١ - **ضابطان**

Troupais (F). Bobolink (E).

جنس طير من فصيلة الكاروبينيات . انواعه المعروفة اربعة . جميعها من قواطع القارة الامريكية تحضي فصل الشتاء والبرد في الاقاليم الحارة من امريكا الوسطى والجنوبية وفصل الصيف في امريكا الشمالية . نطقها الحياطي جامي . اسرارها وافر البند || اجسامها متوسطة القد طولها من ٢٤ الى ٢٩ سم . مناقبها مخروطية ، مستطلة الاطراف . اجنحتها مستطيلة . اذناها مستديرة الاطراف . اسافلها معتلة الارتقاع . اثنائها سوداء اللون او كستنية . اكشافها ، اي لوحات اجنحتها ، صفراء اللون او حمراء . اثنائها اصفر قدماً من ذكورها وابهت اثنائها مناً || تألف الاجسام والمستنقعات ويجاري الماء . قوتها الحشرات والحبوب والبلودور . تقسم حقول الحنطة والارز والنقم .. فتقع بها اشد الانثى || اعرف انواعه واشهرها ضابطان آخر الشريط .

١٦٦٩٢ - **ضابطان آخر الشريط**

Agelais phoeniceus (S).

Troupais à épaulettes rouges (F).

طائر من الضابطان القواطع يجوب امريكا الوسطى والشمالية في طلب الحصيد والمضي . يأنف الاجسام ويجاري الماء والمستنقعات . سريره وافر البند || جسمه معتدل القد بطول نحو ٢٥ سم . ذوب الذكر الى السواد الاحمر الاسف . لوحات منكبها الى الحمرة الازرقوانية . حلقة حبه كستنية الكون . مناقبه وساقاه الى السواد الازرق المروج . الانثى اصغر قدماً من الذكر ، قطن نحو ٢٢ سم . ذوبها الى الكهبة تعلوها في صدرها وبنها رقعة سوداء || اخلافه مرسة ، فرحة ، آتسة . قوته الحشرات والحبوب || يثن عشه في الاشجار النارية على الماء . عشه قدسي الشكل رفيع الجانب . الاثني تحضن مرتين في الحول وتضع في كل



ضابطان احمر الشريط



ضارية

١٦٧١٣ - ضَبَاب (F). Oxypetalum (S).

جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الصقلابيات. أنواعها ثلثة، سوقها مستقيمة. أوراقها متعاقبة، ممتعة، أحليجية النصل، قلبية القاعدة. أزهارها مستطيلة الأنبوب القارضة. الوحدة ضبابية || أشهر أنواعه الأترينية ما يلي.

١٦٧١٤ - ضَبَابِ أَرْزَقِي

Oxypetalum coruleum (S). *Oxypétale bleu* (F). نوع من الضباب وهي حشبة حولية تطلع من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها ليفية فراء. أوراقها زباه النصل حل صفحية. أزهارها تبدو زرقاء اللون ثم يتغير إلى أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

١٦٧١٥ - ضَبَابِ كَثِيرِ الزَّهَرِ

Oxypetalum solanoides, *Tweedia floribunda* (S). *Oxypétale fusco-solanum* (F). نوع من الضباب وهي حشبة ممرية تطلع نحو ١٨٠ سم. ساقها غشوية فراء. أوراقها زباه النصل حل صفحية. أزهارها زرقاء اللون يعلوها بتيج وردية || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

١٦٧١٦ - ضَبَابِ

الضباب مجموعة كواكب كثيرة العدد أسفل من نبات نش.

١٦٧١٧ - ضَبَابِ ٥ * *Nivenia* (S).

Nivénie (F). *Nivenia* (E). جنس نباتات حشبية تربيتية من فصيلة السوسنيات. مهيذا بعض مناطق أفريقية الجنوبية. جلودها دزينة. سوقها مبطلة، مستقيمة، قليلة الفروع ترتفع نحو ٦٠ سم. أوراقها سانية مشيرة النصل. أزهارها حلقي التجميع. أزهارها إلى الزرة الساجية. ثنائياتها بينة اللون || أنواعه المعروفة اثنتان للآثار، بينها سوى شكل الأزهار وعدد الأجزاء ولونها || تنموه يستمر من الربيع إلى الخريف.

١٦٧١٨ - ضَبَابِ *Spadice* (F). *Spadix* (E).

الطلمة قبل أن تفتح من القريض.

١٦٧١٩ - ضَبَابِ ، لَيْحِم *Cri du hibou* (F).

صوت الجوز. *Cry of the owl* (E).

١٦٧٢٠ - ضَبَابِ *Candre brune* (F).

هو الزباد الأسمر اللون. *Brown sahes* (E).

١٦٧٢١ - ضَبَابِ ، ضَبَابِ هو حشرة جوز بوا.

١٦٧٢٢ - ضَبَابِ * *Dendromecon* (S).

Dandromécone (F). *Dendromecon* (E). حشبة ممرية من فصيلة الفصليخيات. ساقها فراء. تطلع نحو ٢٥٠ سم. أوراقها أحليجية النصل، بحرية الخضار، ثلاثية القروعة، تطلع من ١٢ إلى ١٥ سم. أزهارها صفراء اللون، تطلعها يراوح من ٣ إلى ٧ سم. || تزدها قترين. تنموها يستمر من أواخر آذار إلى أواخر حزيران.

١٦٧٢٣ - ضَبَابِ ٥ * *Galacantha* (S).

Galacantha (F). *Galacantha* (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات مشاريات الأرجل طوال الأبد وفضيلة الضماحيات. أنواعه المعروفة خمسة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||

١٦٧٠١ - ضَبَابِ

الضباب من الخيل الذي لا يعطي ما عنه من الجري إلا بالعرب.

١٦٧٠٢ - ضَبَابِ * ، ضَبَابِ بَرِّي ، ضَبَابِ الْبَرِّ

Zizyphus lotus, *Rhamnus lotus* (S). *Jubiter sauvage*, *J. des lotophages*, *Lotus des aschiers* (F). *Lotus tree*, *L. Jubube*, *Wild jubube* (E). *Lotzebaum* (D). *Giugliolo salvatico*, *Logo dei lotofagi* (I). حشرة حشرية ثلاثية من فصيلة النبتات. كانوا يقسموها في الزمان الثمار ويمزون إلى ثمارها حدة فضايل نفاسية وصحية. ثمارها صلبة القد، غشائية الشكل واللون، للذلة العظم. ثمنها يقد السدر ويقويه.

١٦٧٠٣ - ضَبَابِ * *Connectif* (F). *Connective* (E).

نمت تمرني يعلق على بعض السنج الحيوانية المنسدة المنسدة.

١٦٧٠٤ - ضَبَابِ * *Ovis aries* (S).

Mouton, *Ovin* (F). *Sheep*, *Ovis* (E). جنس حيوانات داجية مجترمة من فصيلة الفصليات ثرى القصابة والصوت والخلب. الولاد ضبان للذكر وضبانة للإناث. والذكر القمل يعطي كيشاً والناث نمجة وشاة. أنواعه معروفة كثيرة المند لا مجال للأكرام وتخليتها في هذه الموصلة.

١٦٧٠٥ - ضَبَابِ أَلْبَانِ * *Ovis aries stantopyga* (S).

Mouton à queue grasse (F). ضبان ذو آية وهو من السلالات المعروفة في الشرق الأوسط وأواس آسيا.

١٦٧٠٦ - ضَبَابِ ٦ * *Ovinis* (F). *Ovinis* (E).

القضاياات أو القضاياة احد قسمي فصيلة الفصليات.

١٦٧٠٧ - ضَبَابِ ٧ * *Imperméable à l'air* (F).

هو ما كان لا يتغلغل الهواء. راجع شيف.

١٦٧٠٨ - ضَبَابِ * *Uromastix*, *Uromastix*

حيوان من الزحافات يشبه الورل. موطنه البلاد الحارة يكثر في الجزيرة. يطلع نحو ٤٠ سم. وهو فيج الحية والشكل، صغير الرأس، قصير العنق، مستطيل الذنب الأخرى المقعر المقلد. لونه إلى الصبغة وهي فيرة مشربة سواداً. وأذنين أصفر صلب. يلفظ يعض في الزمل فيقتصر بعد وضعه بارهين يرباً || قوته الجنداب والدا والقشب. والعرب يرمسون على صيده وأكله. كنهه أبو حل. انشاء كشي فية وجهه ضباب وأشب وضبان.

١٦٧٠٩ - ضَبَابِ *Brouillard*, *Brume* (F).

Fog, *Haze* (E).

غبار ماء كالذي سريع الانتشار يتكاثف قرب سطح الأرض فيضها ويصحب البردية. أسبابه عديدة أرسبها: مرور دياح دافئة رطبة فوق سطح بارد أو اختلاط دياح حارة رطبة بغيرها أبرد منها.

١٦٧١٠ - ضَبَابِ ١٠ * هي السقايات، الحطب.

١٦٧١١ - ضَبَابِ *Griffe de lion* (F).

Claw of lion (E).

القشب والقشب والقشب والضبابت : بران الأسد.

١٦٧١٢ - ضَبَابِ *Glatpement du canard* (F).

Yelping of the fox (E). هو حوله الضباب.



ضال



ضان



ضان ألبان



ضب



ضباك



ضبر



ضباب

كثرة الازوت وقلة النيتروجين . ثانياً كثرة الرطوبة الجوية والحاررة . ثالثاً الظل . الخ.

١٦٧٤٧ - ضُبُوبَة * Patersonia (S).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السوسيات . مهدا استراليا . سيقانها جذمية قصيرة . اوراقها خفيفة النصال الجامدة . شواذها ملساء . أزهارها سبيل التجميع . أزهارها ملونة بقلوب كبيرة زرقاء اللون تتألف من أنبوب دقيق وثلاث بتلات خارجية كبيرة الحجم غافرة وثلاث بتلات داخلية دقيقة صغيرة متصبية || تزود الأزوين ضمن الليوت وفي الحقائق . ترضب في التربة المعتدلة الانمناج الزائرة الخصب || أنواعها المعروفة قليلة العدد أشهرها التالية :

١٦٧٤٨ - ضُبُوبَة نَاعِمَة * Patersonia sericea (S). Patersonia soyeuse (F).

نوع من الضبوبة . شواذها يرتفع نحو ٣٠ سم . اوراقها مزغبة الخلفات تطول من ١٢ إلى ٢٠ سم . وتعرض نحو ٥ م . أزهارها الى الزرقاء البنفسجية المواج . قناباتها الزهرية مستطيلة الزغب القاتم || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٦٧٤٩ - ضُبُوبَة هَزِيلَة * Patersonia fragilis (S). Patersonia fragile (F).

نوع من الضبوبة . شواذها يرتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٥ م . أزهارها الى الزرقاء الجميلة . قناباتها الزهرية مرطاة . بتلاتها الخارجية اهلالية الشكل تطول نحو ١٠ م . بتلاتها الداخلية تطول نحو ٣ م . || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

١٦٧٥٠ - ضُبُوبَة * Malaptera (S).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الارجل وفصيلة الكنثيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اصداؤها صلبة القذ وشعيرة مخزنة . فروعها معتدلة الانفرج وباربعة الفلق الانفسارية التي تبدو كاربيل الارز شككاً وحظائياً .

١٦٧٥١ - فيج Insolation, Luminosité (F).

Sun-stroke, Luminosity (E).
الضج غيرة الشمس على الارض وهو يعنى الظل .

١٦٧٥٢ - ضُبُوبَة * Rhagonyque (F).

حشرة من القراحات تكسى رقيق ، اظلمها .

١٦٧٥٣ - ضُبُوبَة Cri du singe (F).

Cry of the ape (E).
صوت القرد .

١٦٧٥٤ - فيحل Eclage (F).

Low-water mark, Lowest water level (E).
هو البروض ، المستوى الأدنى لياه بحر أو نبع . وهو المياه القليلة المسك بها كان مصفوها .

اسود . ظهراتها الى الطحلة الرمادية . ورضها عشائي ، قسطنطين
الذين عند الانتشار . بطنها ويدها الى السمرة || تألف
الحراج والمواقع التي يكثر فيها الشيطان .

١٦٧٣٨ - ضُبُوبَة

الانثى الضيقة الاحليل ، الصعبة الوضع من البقر والتم
والماز .

١٦٧٣٩ - ضُبُوبَة كَرِيْفِيَّة * Laccocle cretica (S).

Laccocle de Crète (F).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . منته
جزيرة اكريت وبيال لبنان من ارتفاع ١٠٠٠ الى
١٨٠٠ متر من سطح البحر || ساقه متصبية فراءه ،
اوراقه مركبة ، وريشية ، السفلى مستطيلة اما العليا
قصيرة . أزهارها صولاني التجميع ، تاجي . الانثى
أزهارها صغيرة تيفية اللون . ثمارها بيضية الشكل ، حسكة
القشار ، ثنائية الفلق || تنويرها ربيعي .

١٦٧٤٠ - ضُبُوبَة * Unileites (S).

Unileites (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مضطربة الارجل
وفصيلة الكنثيات || انواعها المعروفة عديدة . جميعها من
متحجرات الطبقة الارضية الاولى .

١٦٧٤١ - ضُبُوبَة * Brachyculeus (S).

Brachyculeus, Brachycule (F).
جنس حشرات من فصيلة الضبوبات ، انواعها المعروفة
اربعة جميعها صلبة القذ بنية اللون الجاهج والموش بالاسمر
والاخير . وراقها خفيفة اللون ، مراءه المواج || تركيب
مع رفاقها معظم التبيليات البرية انحصا التجميل والتنجير
والأرنا ختمت صارة الارواق وتلويها .

١٦٧٤٢ - ضُبُوبَة مُعَرَّجَة * Brachyculeus triangularis (S).

Brachyculeus triangulaire (F).
حشرة غاشلة من فصيلة الضبوبات . جسمها صلب القذ
يطول نحو ٨ م . رأسها مستعرض الفلق ، محرم ، بني
اللون . خطها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها
قشبات ، اسفان . كسلها بني اللون ، اسود الطوق .
سجلتها صلبة سوداء . ظهراتها لاصف . اورد اللون .
بطنها الى السمرة السوداء . فروعها سود الانفساخ والارزاع ،
بنية الفلتايب || تألف البراري حيث تكثر نباتات فصيلة
المركبات انحصا الضفهاء .

١٦٧٤٣ - ضُبُوبَة Ivoire (F). Ivory (E).

هو الماج ، اظلمه .

١٦٧٤٤ - ضُبُوبَة فيج

الضباج : صمغ يركل . وكل جيرة يسم بها الطير وقيل
السباع .

١٦٧٤٥ - ضُبُوبَة

و نبات كالفستاييس الا انه اعطى مربع الضباج يصغر
ماؤه في القرن الرابع فيليب || (السان) .

١٦٧٤٦ - ضُبُوبَة شَمَل Verse (F).

Beat down (E).
عارض يصوب الزرع فيسقط على الارض . اسبابه
عديدة اهمها عدم ازنان المتنامر التلقائية في التربة انحصا



نسيث



فستج



ضبوبة هزيلة

Contributions (F).

Tax or rate (E).

في الاموال التي يجب على كل مكلف دفعها مساهمة
ليسام في النفقات العامة . وقد تكون ضريبة وقارية .

Contributions indirectes (F).

Indirect taxes or
excise (E).

في الضرائب غير المقررة التي تدفع بمناسبة على معين .

Contributions directes (F).

Direct or assessed taxes (E).

في المالدات الثابتة اي الضرائب المتصفة بصفة الاستقرار .

Multiplication

ضرب

ضرب عدد في غيره .

Variétés (F).

Variety (E).

الضرب ج ضروب هي افراد حيوانية او نباتية من نوع
واحد تتميز بصفات خاصة فيزيولوجية وشكلية مثالا
ضرب الفلح الساركون .

ضرب

هو الصرد ، اطلبه .

ضربة دم ، مكتكة ، حنطة

Apoplexie, Coup de sang (F).

اسم شام يطلق على غثط الاعراض التي تسبب عدم
الادراك القهالي . وضربة الدم قد تكون اما زف او وضع
او انكساب دموي في النسبة للمغ او غيره .

ضربة فحس في الرن ، اطلبه .

Mamelle (F).

Breast (E).

الفسرة في اصل الثدي وهي ايضا الفسرة كله .

Dommage (F).

Damage (E).

هو الاذى المادي والادبي الذي يقع على النفس او على
المال .

فريس ، فليج

Molain, Mâcholine (F).

Molar, Grinder (E).

اسم اقسام الانسان الثلاثة وهي القواطع والانياب والافراس
وتعرف الافراس بالانواج لانها تنجد الطعام قبل ارساله
الى المعدة . اما مدحها فيختلف مع فصيلة الحيوان ويجه .
وهي في اول عهدنا تدعى لينة ثم تزول لتصل لمحلها الثانية
التي تتميز بسطورها المتعددة .

فريس العجوز

هو المسك ، اطلبه .

Nyctaribia (S).

ضربة

Nyctaribia (F).

جنس حشرات راشنة من فصيلة الضربيات ودية ذوات
الجناسين . انواعها المعروفة ١٦ منتشرة في مناطق البلاد
الاستوائية والحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ،
مبطلة تقط نحو ٣ م . وروسها صغيرة ، مزوانية الشكل ،
قليلة التشويز . عيونها شديدة الصغر اعطائها ثقلية ،
ماسكة . وهي عذبة الجناح والزران . قوائمها نيشية .
اجسامها وقوائمها مجهزة ببص الحلب ، الحثبان الطول ||
تصلط على الطلويط والخنائيف .

Lepturus (S).

ضربة

جنس نباتات عشبية برية ، معروية ، حولية او مسرة
من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في
جميع المناطق الحارة من المائلين القدم والجديد || جميعها
شدية ، صغيرة ، متكاثفة النصف ترتعها للماشية فيجود
درما وتسن عليها .

Orthogoriscus (S).

ضربة

Orthogoriscus, Môle, Molide (F).

Sun-fish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السمكيات . اصنامها مياه
بحار المناطق الحارة . انواعها المعروفة ثلاثة جميعها غريبة
الشكل تبدو كأنها مقطوعة المؤخر . اجسامها غليظة
مبطلة تقط من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . زعانفها القشرية
والبطنية مسطحة لتلاصق الشرجية القصيرة المقوسة .
انثياها الى الصبهة للصلاد . بطونها فضية ، زعانفها حمراء
لونها مأكولة عادية وينهم من اعتبرها دون المادي .

Mollusca,

Orthogoriscidae (S).

Molluscs, Orthogoriscidae (F).

Mollusca, Orthogoriscidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من حريانات الانسان ودية ملحويات
الذك . اجسامها ثلاثة . اصنامها مياه بحار المناطق الحارة .
جميعها غليظة الشكل ، خض ، مبطلة ، مقطوعة المؤخر .
اشهر اجسامها الضمة .

Photopériodisme (F).

ضربة

Photoperiodism (E).

تأثير الضياء والاحتام في شراع النبات ونمو افعال النبات
من استطالة الساق او اليل .

Macrocephale (F).

ضربة الرأس

Macrocephalous (E).

ذو رأس اكبر واظم من المعتاد . رأس .

Cranilobé (F).

ضربة الكتلة

لحم وصفي يطلق على كل نبات مستخدم للعلقة .

ضربة

هو الدلب اللبني ، اطلبه .

Lutte (F).

ضربة

زمن النزاع او القتال عند انسان واللعز .

Moets (F).

Serving (E).

مضاد

نزر الذكور على الانثى في الحيوانات العواجن .

ضربة

هو الضرب ، اطلبه .

Brindille (F).

Sprig, Twig (E).

هو دقيق الحطب ويقل ما ضعف ولان من الحطب الذي
يسرع اشتعال النار فيه ويقل ما لا بحر له وما له بحر
فهو جزل .

Pyrométrie (F).

Pyrometry (E).

ضربة

قياس درجات الحرارة الشديدة الارتفاع .

ضربة

هي البطم ، اطلبه .



ضمة

Mamelle, Pis (F).
Breast, Udder, Dug (E).

١٦٧٨٨ - ضُرُومِيَّاتٌ

هو مدرّ اللبن عند البقرة والشاة والماعز .

١٦٧٨٩ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

هي النضية للفرع من البقر والشاة والماعز وغيرها .

Mammaire (F). Mammary (E). ١٦٧٩٠ - ضُرُومِيَّاتٌ

لعت تمرير يطلق على كل ما له صلة بالفرع .

١٦٧٩١ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

Mammifères (F). Mammifères (E).

أحد صفات الحيوان الخمسة ، تتميز بالثداء ، ألتها المرصعة ، يوضع الأولاد أسناء ويجهزها التنفس الذي لا يخلو من القوة . لذلك فهي تحتل مركز الصدارة بين الحيوانات الفقيرة || رتبها ١٤ تكتفي إلى شصتين المشيمات واللاشميمات .

١٦٧٩٢ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

Mamillaria (S). Mamillaire (F). Mamillary (E).

جنس نباتات لحية مسمرة من فصيلة الصباريات . أنواعها المعروفة زهاء ١٥٠ منبتها البلاد الأمريكية . معظمها تربي يزرع لفراية أشكاله وحسن أزهاره وروائحها وزخامها .

١٦٧٩٣ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

هو الأذن في الماء ، أظله .

Codium (S). ١٦٧٩٤ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

Codie (F). Codium (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضراء . أنواعها المعروفة قليلة العدد . أظلماتها بجوار البلاد المعتدلة الحارة || جميعها أسلنجية التركيب ، غاطية ، عادمة الأوراق .

١٦٧٩٥ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

هو حجر يشبه الأثاب في منطه وروحه وله ثمر أبيض مدور مفلطح كعين الخياط المصنوع بفرس (السان) .

Gourde (F). ١٦٧٩٦ - ضُرُومِيَّاتٌ

هو القرح الطويل ، أظله .

Querrellet (F). ١٦٧٩٧ - ضُرُومِيَّاتٌ

الفرع هي الخواص البحرية ، نبات طبي طيب الرائحة أزهاره مشربة بحبرها للصل .

Aiglon (F). Eaglec (E). ١٦٧٩٨ - ضُرُومِيَّاتٌ

هو فرخ العقاب .

Acidanthers (S). ١٦٧٩٩ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

Acidanthère (F). Acidanthères (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة السونيات . منبتها بعض المناطق الأفرقية . سورها دقيقة ترتفع من ٢٠ إلى ٣٠ سم . أوراقها عصفية التنصل معتدلة الطول ، بحرية الخضار . أزهارها عقودية التجميع . أزهارها مستطيلة الأنايب ، سداسية البتلات الملونة || أنواعها المعروفة ثلاثة ، أشهرها التالية :

١٦٨٠٠ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

Acidanthers lutes (S). Acidanthères jaune (F).

نوع من الضُرُوم . ساقه دقيقة ترتفع نحو ٣٠ سم . أوراقها عصفية التنصل البحرية الخضار . أزهاره كبيرة القد ،

Nyctzeribides (S). ١٦٧٨١ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

Nyctzeribides (F). Nyctzeribides (E).

فصيلة حشرات راشتة من رتبة ذوات الجناحين . أجناسها وأنواعها المعروفة نحو ٩٥ منتشرة في معظم مناطق العالم أعضها الاستوائية والحارة || أجناسها صغيرة معتدلة الطول من ٢ إلى ٤ سم . رؤوسها مزوالية الشكل ، شبه مدسمة . عينها شديدة الصغر . قوائمها نشيطة . جميعها عادمة الأجنحة ولقرزان || جميع أنواعها راشتة تعيش على الأعشاب والفاش || أشهر أجناسها للفرسة .

Gelsorrhiza (S). ١٦٧٩٢ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

Gelsorrhiza (F). Gelsorrhiza (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة السونيات . مهدا بعض مناطق أفريقية الجنوبية . أوراقها ضيقة التنصل السيلية الشكل أو الخيطية . أزهارها سفلى التجميع يركن على شراخ قصير . أزهارها قبة الشكل ، متساوية البتلات الملونة || أنواعها المعروفة عديدة معظمها برقي وبضها زرامي تربي ، أشهرها التالية :

١٦٧٩٣ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

Gelsorrhiza ovata (S). Gelsorrhiza à feuilles ovales (F).

نوع من الضُرُوم الأفرقية . أوراقها بيضبة الشكل قليلة العدد الذي لا يتجاوز ٤ فصلا عابقة الخضار المنتصب بالأسود . شراخها يرتفع نحو ١٥ سم . وينتهي بسيلة ودلة عديدة الأزهار . أزهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٢٠ مم . || تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار .

١٦٧٩٤ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

Gelsorrhiza secunda (S).

Gelsorrhiza monotrope (F).

نوع من الضُرُوم الأفرقية . أوراقها غيطية . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . وينتهي بمجموعة الأزهار السيلية الترتيب . أزهارها بنفسجية اللون ، متوسطة الحجم ، قطرها يراوح من ٢٥ إلى ٣٠ مم . || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

١٦٧٩٥ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

Gelsorrhiza humilis (S).

Gelsorrhiza modesta (F).

نوع من الضُرُوم الأفرقية . أوراقها غيطية . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . وينتهي بعض الأزهار المتساوية ، المتوسطة الحجم ، قطرها نحو ٣ سم . لتبا إلى الخضار الكثيرة المشيز بالأحر || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٦٧٩٦ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

Gelsorrhiza grandis (S).

Gelsorrhiza robusta (F).

نوع من الضُرُوم الأفرقية . أوراقها سيفية الشكل مستطيلة شراخها تثنى ضلع مدور يرتفع من ٢٥ إلى ٣٥ سم . أزهارها إلى الخضار الباهتة التي الملوخ يطو تشيز وسطى أحر || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

١٦٧٩٧ - ضُرُومِيَّاتٌ ، ضُرُومِيَّاتٌ

هو دابة بين الكلب والذئب أو بين الكلب والسنور (م).



ضُرُومِيَّاتٌ



ضُرُومِيَّاتٌ

سداسية البتلات التي تطول نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الكبريتي يملو تمسح برتقالي ناري المزاج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٦٨٠١ - فُتُرو هو البطل الشرقي ، اطلبه .

١٦٨٠٢ - فُتُرو Limier (F). Bloodhound (E). الاثنى عشرة ج شواء . والفُتُرو كلب كبير الجفة شديد المراس يستندم في سيد الوشوش .

١٦٨٠٣ - فُتُروغ الفُتُروغ : الصنبر من كل شيء

١٦٨٠٤ - فُتُري * Polygama (F). Polygamist (E). صفة كل حيوان ذكر يعيش مع عدة اناث . وصفة كل نبات يحصل ازهاراً خشوية وذكرية واكثرية على جذع واحد .

١٦٨٠٥ - فُتُريكة Impôt (F). Impost, Tax (E). الضريبة هي حصة اشتراك الفرد في نفقات الدولة العامة . لذلك فهي كل اسلوب تتبين به التكاليف العامة على المالكين . والضرائب عديدة تخص منها :

ضريبة استدلالية
ضريبة الارباح الاستثنائية
Impôt sur les bénéfices exceptionnels

ضريبة البلدية
Impôt municipal

ضريبة التراكات
Impôt de succession

ضريبة التمتع
Patente

ضريبة الدخل
Impôt sur les salaires

ضريبة الدخل العام ، ضريبة الربع
Impôt général sur le revenu

ضريبة الطرق ، بدل الطرق
Prestation

ضريبة القيمة المضافة
Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers

ضريبة التصاب
Impôt de quotité

ضريبة تصاعدية
Impôt progressif

ضريبة تنازلية ، ضريبة انحدارية
Impôt dégressif

ضريبة توزيعية
Impôt de répartition

ضريبة جزائية
Impôt forfaitaire

ضريبة شخصية ، بدل
Impôt personnel

ضريبة عقارية ، خراج
Impôt foncier

ضريبة حقية
Impôt réel

ضريبة غير مباشرة
Impôt indirect

ضريبة مباشرة ، مقروءة
Impôt direct

ضريبة نسبية
Impôt proportionnel

ضريبة نفعية
Impôt cédulaire

١٦٨٠٦ - فُتُريوف شُفُتُريوف

Multiple
الحاصل من عدد مضروب في ذاته .

١٦٨٠٧ - فُتُريوس Colibri (F). هو الطيرفلوس . اطلبه .

١٦٨٠٨ - فُتُريوس * Aristida (S). Aristide (F). Triple-awned grass (E). Dreygrannan (D). Aristide (I).

١٦٨٠٩ - فُتُريوس * Echinospeis (S). Echinospeis, Edinops (F). Echinospeis (E).

١٦٨١٠ - فُتُريوس * Echinospeis (S). Echinospeis, Edinops (F). Echinospeis (E).

Portulacaria (S).
Portulacaria, Pourpier en arbre (F).
شجيرة من فصيلة البرتليات . مهدا بعض المناطق الاقريقية المعتدلة الحاررة . ساقها متصبية تملو نحو اربعة امتار . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، لاطئة ، سمكية الاتصال المماسية . جميلة الخضار اللامع . ازهارها خضابة البتلات ، سداسية او سباعية الاسطحة ، وودية اللون ، قطرها نحو ٣ سم . || تزرع التزيين .

١٦٨٠٩ - فُتُريسيات * Trochilidae (S). Trochilidae (F). Trochilidae (E).
فصيلة طير من الجوارثم مشقوقات المناقير . انواعها المعروفة عديدة ، زهاء ٤٠٠ موطنها معظم اصقاع العالم باستثناء القطبية . اكثر انواعها ، نحو ٩٠ ٪ امريكية المهد || جميع انواعها صغيرة الحجم ، جميلة الالوان التراكية والزعانف والاقواق || اشهر اجنيتها الفريس والبطونين والقبيل .

١٦٨١٠ - فُتُريع * الجلفة على أنظم تحت البحر .

١٦٨١١ - فُتُريع Vasech, Vasec (F). Vasec, Sea-wrack, Sea-weed (E).
هو الفُتُريسيات نبات اعطش غثيف يرمي به البحر .

١٦٨١٢ - فُتُريك Vautour mâle (F). Vulture male (E).
هو البسر الذكر .

١٦٨١٣ - فُتُريوم * Calorification (F). Calorification (E).
الفرم احتاق بعض الحرارة من الجسم لان كل عمل يقوم به الجهاز العضوي يولد بعض الحرارة .

١٦٨١٤ - فُتُريوم * Gommosa (F).
وصم يصيب الاشجار المثمرة ويثيرها يمرض بالتصمغ ، اطلبه .

١٦٨١٥ - فُتُريوم * Endogamie (F). Inbreeding (E).
التصالب بين اقارب من اصل واحد او بين الانسال قديم واحد .

١٦٨١٦ - فُتُريوم * Echinospeis (S). Echinospeis, Edinops (F). Echinospeis (E).
جنس نباتات زينة شائكة مسمرة من فصيلة الصباريات انواهم عديدة بعضها اسطوانية ، فضلة ، لحية ، فزوة الشثانة . سدائرها شائكة تركز على ثيج الاضلع . ازهارها كبيرة اللند ، جميلة الشكل والالوان تقوم على شاربين مستطيلة تكسوها الحرافف المرسوقة المتراكبة . تزرع في المراكب لانها تخشى البرد .

١٦٨١٧ - فُتُريوم * Multiple
الحاصل من عدد مضروب في ذاته .

١٦٨١٨ - فُتُريوم * Consanguinité (F). Consanguinity (E).
هو في اللوجان اسطفاة الاقارب فاستفادوا ذلك لاصح النسل او تحسبه او تكتبت بعض الصفات الخاصة .

١٦٨١٩ - فُتُريوم * Cri du lapin (F). Cry of the rabbit (E).
صوت الارزب اذا اخذت .



فُتُريوم

١٦٨٣١ - **سَمَط دَمَوِي** (F). Tension artérielle (F).
Blood pressure (E).
الضغط الدموي أو التوتر الشرياني هو قوة ضغط الدم على جدران الشرايين بفعل حركة القلب .

١٦٨٣٢ - **سَمَطِي** (F). Glapissement du lapin (F).
Yelping of the rabbit (E).
صوت الأرنب .

١٦٨٣٣ - **سَمَطِيَّة** (F). Luxuriante (F). Luxuriant (E).
هي الفروسة النضرة الزرقة وبقل الشفيرة من بقل وشب .

١٦٨٣٤ - **سَمَطِيَّة** (F). Cristatella (S). Cristatelle (F).
جنس حيوانات طفيلية من طائرات الشرج تعيش في المياه العذبة . الموالها متحركة .

١٦٨٣٥ - **سَمَط** (F).
هي نارية الحطاة فراشة صغيرة القند سمراء اللون اذا لمست شري الجذع من لسعها وبتقير حراشفها . ج غفلة .

١٦٨٣٦ - **سَمَطَا** (F). Discoglossus (S).
Discoglossus (F). Discoglossus (E).
جنس ضفادع من فصيلة الضفاريات . أنواعه المعروفة خمسة ، أعطاهم تمتد من الهند الصينية الى الشرق الاوسط وبعض البحر المتوسط || اجسامها صغيرة الحجم تطول من ٥ الى ٨ سم . رؤوسها متوسطة القند . جبينها كبيرة نافرة . السنبا مستديرة الشكل . قليلة الحركة . اصابع قوائمها الخلفية قصيرة الحطاب الذي لا يتجاوز اثنان الاول . جلوسها عادية الثالثة والتمثل ، شديدة العمة || انوثها الى السمرة الخلفية يطولها تيجاج اسمر حادق وضط اصفر احمر تمتد من الرأس الى العجز . وتحتل اصمرا عايشان يمتدان من العينين الى طرف الحلق || يطونها سوية الالوان الباهية يغلب فيها الحلي الاخير || تعيش في المناطق الجارية الماء . تسرح في الليل . قنبا الحشرات والديدان || الاناث تسرا دعبها في الماء ضمن شلئين كل شلة تحوي من ٢٠ الى ٣٠ دعبلة تتكثف بعد التمرلة بنحو ثلاثة اسابيع .

١٦٨٣٧ - **سَمَطَا مَلُون** (F). Discoglossus pictus (S).
Discoglossus pictus (F). Discoglossus (E).
نوع من الضفادع ينتمي الى فصيلة الضفاريات التي تحمل اسمه . جسمه صغير القند يطول نحو ٦ سم . عند الذكر ونحو ٨ سم . عند الانثى . رأسه متوسط الحجم . عيناه كبيرتان جاحشتان . حنكه واسع الشفق . مسن الفك العلوي . قاتمته الاماميتين رابعيسا الاصابع الطويلة . قاتمته الخلفيتين خامسا الاصابع المقيدة بخطاب قصير || جلده قليل الثالثة ، شديد البهتان . ثوبه الى السمرة الخلفية يطولها تيجاج اسمر وضط اصفر احمر تمتد من مقدم الرأس الى طرف العجز وبتداتان كستيتان تمتدان || العينين الى طرف الحلق . بطنه الى الحلي الاخير || يألف المنطق والتدن . يسرح في الليل . قوته الحشرات والديدان والذباب والحوم . يباه الشثوي يستمر نحو اربعة اشهر || يعبر من الضفادع النافعة .

١٦٨٣٨ - **سَمَطَا جِيَات** (F). Discoglossidae (S).
Discoglossidae (F). Discoglossidae (E).
فصيلة حيوانات درداء قازية من لة القبيات ومرتبة

١٦٨٣٩ - **سَمَطَا** (F). Eurycaeros (S). Eurycaeros (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم سيات المتأخر وصيلة الزرزوريات . موطنه جزيرة مدغشقر || جسمه معتدل القند شبه السمرة . ثوبه الى السواد اللامع . ذاكه واباهر الى السمرة الطرازية . متقاده ازرق اللون شبه غروبي الشكل . كبير ونظيف يغلب مقدم الرأس كالكامنة . جناحه ذريا الاطراف . ذنبه مستدير الزوال || قوته الحبوب والتار واخترت .

١٦٨٤٠ - **سَمَطَا** (F). Eurycaeros (S). Eurycaeros (F).
هو الحليين المروى ، الحلي .

١٦٨٤١ - **سَمَطَا** (F). Renardeau (F). Fox-cub (E).
هو ولد الثمرة اي أنثى الثعلب .

١٦٨٤٢ - **سَمَطَا** (F). Poignée d'herbes (F).
Wisp of herbs (E).
الضفت : تيقنة من حشيش غسطة الرطب باليابس . وكل ما ملا الكف من النبات فهو سَمَطَا || وضفت النبات : جلده استغاثا .

١٦٨٤٣ - **سَمَطَا** (F). Roscoe (S). Roscoe (F).
Roscoe (E).
نبات عشبي نجيل الاربية من فصيلة الزنجبليات . مهدا بعض مناطق الهند والافغان . ساقها موقية ترتفع نحو ٥٠ سم . اوراقها لامعة متعاقبة متناحية التصل بحرية الخضار انزاعيا سبلي التجميع . انزاعيا صغيرة القند زرقاء اللون || تزود للقرين في الحقائق التي لا تفسد شدة القر .

١٦٨٤٤ - **سَمَطَا** (F). Poule (F). Hen (E).
هي الدجاجة . ج . سَمَطَا .

١٦٨٤٥ - **سَمَطَا** (F). Poussee (F). Thrust (E).
هو الطبع الاتي على جدار ما من جراء ككل التراب او الماء .

١٦٨٤٦ - **سَمَطَا** (F). Pression (F). Pressure (E).
سَمَطَا

١٦٨٤٧ - **سَمَطَا** (F). Tension de la vapeur (F).
Vapour pressure (E).
هو قوة امتداد البخار .

١٦٨٤٨ - **سَمَطَا جَوِي** (F). Pression atmosphérique (F). Atmospheric pressure (E).
الضغط الجوي هو مقدار وزن الهواء في أي نقطة كانت معينة فوق سطح الأرض . وهو يقدر حته سطح البحر بما يعادل ضغط هواء من الزئبق ارتفاعه نحو ٧٦ سم . لذلك فالارتفاع عن سطح البحر يتناسب كية الضغط كما هو الحال في الجبال حيث تقل كثافة الهواء التي تقرر الضغط || ويتأثر الضغط أيضا بميل الحرارة والرطوبة اذ كلما ارتفعت درجة الحرارة تمدد الهواء وضغط وزنه وكما زاد بخار الماء ضغط وزنه كذلك || وهذا الضغط الجوي يقاس بواسطة جهاز خاص يسمى المرواز (الباربوتر) .

١٦٨٤٩ - **سَمَطَا حَكُونِي** (F). Pression osmotique (F). Osmotic pressure (E).
اثبت العلم حل ان محتويات الحويصلات النباتية يد ان تأخذ كاتلة معينة من الحلول الملحي اللذائي تنفك من اللشاه الذي يحيط بها وتتقلص . فهذه البادرة الطبيعية الحيوية تسمى الضغط الحلولي او الانسلا .



سَمَطَا



سَمَطَا



سَمَطَا مَلُون

١٦٨٤٦ - صَفَدُغٌ أَحْمَرُ * عَدْمُولُ أَحْمَرُ

Rana esculenta (S). Grenouille verte (F).
Green frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. أصله تشتمل معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من الشرق الأقصى إلى الأندلس وأروبة الجنوبية والوسطى والغربية وإفريقية الشمالية. جسمه صغير الحجم. الذكر أصغر حجماً من الأنثى. يطول من ٥ إلى ٦ سم. بينا تطول الأنثى من ٧ إلى ٨ سم. رأسه متوسط الحجم. خطمه مستعرض للشفة. فكه السفلي عديم الأسنان. عيناه كبيرتان جاحشتان. أصابع قاتمته الأماميتين طليقة، أما أصابع الخلفيتين فليقية بحظاظ لا يتجاوز الزم الزم الثاني. جلده مائل البشرة خشية اللون. ثوبه إلى الخضار القامق تلوين مائية حطية ورقيقة سمراء لاقياسية الشكل تكثفت الظهر والاطلاق والقرن من جوانبه الخلفية. ينقله إلى البياض الأخير. وهذا النوع من الضفادع يمان، يبيض الشيء، البنية التي يبيض فيها. يتميز الذكر بملفين في مؤخر الرأس من البين واليسار ينتفخان عند التلقيح، ثم بالعلاب المحبسة التي تملأ أطراف أصابعه الأمامية في زمن التزاوج. يبيض معظم حياته، نحو ١٠ سنوات، في الغدران والمناقع يتكرها في الليل عندما يسرح في طلب القرع ويعد لها عند الفجر. قوته الحشرات والديدان. في الأناث تسرا في أوائل الربيع من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ بيضة لكل واحدة نحو ١ سم. في شلة هلامية المادة تلتفد بها في المياه الفسحة تفترض وتنتشر في مكانها حتى تنفث باقي الفرج منه من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع. أما الطور البلعوي فيستمر من ٧٠ إلى ٩٠ يوماً.

ضفان



صفدغ اخضر

١٦٨٤٧ - صَفَدُغٌ أَحْمَرُ * عَدْمُولُ أَحْمَرُ

Trichobatrachus robustus (S). Grenouille polue (F). Hairy frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. موطنه بلاد الكاميرون من أمال إفريقيا الاستوائية. جسمه صغير الحجم أبيض اللون بشكل يميز بكرة قد الذكر الذي يطول من ١٢ إلى ١٤ سم. ويصغر منه الأنثى التي تطول من ٨ إلى ٩ سم. ويتميز الذكر أيضاً بشعره الكثيرة التي تكثفت الأظليل وباعمال الفخزين. رأسه مستعرض القامة، منقوش الحلق، كبير الشف. عيناه صغيرتان، مستديرتان، جاحشتان. فكه السفلي عديم الأسنان. أصابعه طليقة في القاتمات الأماميتين وبقية في الخلفيتين بحظاظ لا يتجاوز الزم الأول. أطراف أصابعه الأمامية والخلفية مجعزة بطياف محبسة تمكته من تسلق السطح المائلة. ثوبه إلى الخضار الاسمر تلوين مائية صفاء قامة ورضان اسودان يمتدان من مقدم الحلق إلى مؤخر الرأس، ويبدو سمراء قامة تقطع الصفعة ألبانيا من قلة الرأس إلى العجز. ثم رشفة دقيقة سوداء وتزين مستدير اسود يملأ مؤخر الظهر والقرن الأربع. في الأناث تشتمل بذات الثوب ولكنها عادة تشعور الكثيرة والظباب الغريبة وهي تعيش وسحبا في البراري والسهول القريبة من مجاري الماء بينا يعيش الذكر في مياه الجبال العالية الحارة ولا يقفص عن الأناث ويقترب منها إلا في زمن الصفد.

صفدغ احمر



صفدغ اخر

١٦٨٤٨ - صَفَدُغٌ آخَرُ * عَدْمُولُ آخَرُ

Rana temporaria (S). Grenouille rousse (F).
Red Frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. أصله

السويدات ورتبة البتراوات أي عديلات الذهب. أجسامها وألوانها متوسطة الحجم. أجسامها شبيهة بأجسام الضفادع لكنها تتميز بالشبه المستديرة لقليلة الحركة. ثم يوجد إصلاح قصيرة تتركز على الفقار الأمامية المتقدمة، وأصغراً بتعدد التكاثر الطولية الجانبية القائمة على قعر العجز. أعرف أجسامها وأشهرها الضفادع والآليات والفتاق.

١٦٨٤٩ - صَفَدُغٌ مُذْنِبٌ

Urodèles (F).
Urodela (E).

رتبة من الضفادع تعرف بالسفريات، أصلها.

١٦٨٥٠ - صَفَدُغٌ

Boues de vache (F).
Cow-dung (E).

هو خشي البقر.

١٦٨٥١ - صَفَدُغٌ

Amnicole (F).

الصفاني من الحيوان والنبات الذي يعيش على صفاف الانهر والينابيع.

١٦٨٥٢ - صَفَدُغٌ

Omostra colon (S).
Omostra colon (F). Omostra colon (E).

حشرة ناعمة دامت من فصيلة الرزويات ورتبة صفادات الاجنحة. تألف الموالع الرطبة التي تكثر فيها الفطور. غناصها تعيش على الفطور وعلى المواد النباتية والفسوية المتحللة. يربطها ثوب الفطور وتعيش عليها دون سواها. جسمها صغير الحجم يطول من ٤ إلى ٥ سم. ثوبها إلى السمرة الجارية للملح. رأسها صغير الحجم. صياها صغيرتان، زباناها صولجانيان، نحيلان. ظهرها قليل الاحدهاب، مستدير الخواصر الخلف. شداهما غفيلتان التميز، كهيئة الخيل. لها جيل واحد في الحيل. تظهر الحشرة الجملدة في أواسط الربيع وتبقى حتى أواخر الصيف. تسرح في النهار. كساده بعد ظهورها بسة أسابيع. تمتع المكان في تكاثر الفطور في البرقة عنه بلونها الإدراك التام تطول نحو ٧ سم. جسمها مستطيل للمقدم والرأس، مستطيل المؤخر، سداسي الأرواح، حطلي. اللون اسمر للملح، حالك السمرة في الرأس والمفاصل. أطور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة أسابيع ينتهي في آخر تلقح تحضره البرقة في الفطر العالي.

١٦٨٥٣ - صَفَدُغٌ

الصفاد هو الضفدع الحمر.

١٦٨٥٤ - صَفَدُغٌ

الصفدغ مادة صفورية صلبة في حوف الحافر من الفرس. وقد تكون النسر. الحلب نسر.

١٦٨٥٥ - صَفَدُغٌ، صَفَدُغٌ، صَفَدُغٌ

Rana (S). Grenouille (F). Frog (E).

جنس حيوانات يترأ قاذية من فصيلة البومليات وصف الضفادع. أنواعه المعروفة ١١٧ موطنها العالم. تتميز بأجسامها الريمية وباستطالة قوائمها الخلفية التي تساعدها على السط والرياسة. تبيض في المياه الراتكة، يبيضها يبيض السبل ولقتر يفتق من بلاصت صغيرة تقع في الماء حتى برور واكمال قوائمها. قوته الحشرات والحوام والاسماك الصغيرة. ومن أمثاله البومول والنداد والفتاق. ولذكر يكبي باقي حيوة إلا الأناث تنصق صفدعة ويحاجة وكنيتها أم حيوة. أشهر أنواعها وأهمها ما يلي.

١٦٨٥٣ - ضفدع جبلي * ، عذوق جبلي

Rana goliath (S). Grenouille géante (F).

Goliath frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. موطنه بلاد الكاريون من أعمال إفريقية الاستوائية. اكتشف في أوائل القرن الحالي ويستمر أكبر أنواع الضفادع المعروفة وأكثها وإبطها. الذكر ينطق. الذكر ينطق ٣٧ من ٢٧ من والأشيق طول من ٤٥ إلى ٥٢ سم. يعيش قرب المنابع ويجاري الماء ولكنه لا يتردد إلا في زمن التزاوج. تقيته قرب الشبه بصيغ القور. قوته الحشرات والجوزاء والمظاء والوزغ والفئران وكل ما دب ويمكن منه.

١٦٨٥٤ - ضفدع نصيب * ، عذوق نصيب

Rana agilis (S). Grenouille agile (F).

Agile frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. أصله قعر من الشرق الأدنى إلى أروية الجنوبية الشرقية والأشيق. جسمه صغير القند. الذكر ينطق من ٦ إلى ٧ سم. والأشيق طول من ٨ إلى ٩ سم. ثورته قرب الشبه بصيغ الضفدع الآخر إلا أنه يتميز بانسلاخ القامتين الخلفيتين ما يجعل مجال قفزه نحو مترين. وهو يستمرض الشفق. عامد الانسان في الفك السفلي. عيناه صيرتان مستطيلتان. أصابه طليقة في القامتين الاماميتين وبقية في الخلفيتين بحظاظ متوسط الامتداد لا يتجاوز نصف الاصابع. جلده مالمش البشرة، قليل القليل الثقيلة المتبادلة المبيضة في ثوربه يمانن البيئة التي يعيش فيها وهو يتركز على الشفعة المحتلطة تملحها رشفة سمراء في الظهر والقوائم ويرتدات كستيتان تمتدان من مقدم الحلق إلى مستوى الكتف. يطنه وشفاة إلى البياض الاصفر. يعيش معظم حياته في الحلق ويبيت في النهار ولا يقترب من الماء إلا في زمن السناد والقترة وهنما يكرهه يرد الشفاء على هجر الماء الأرضي إلى الماء. قوته الحشرات والديدان. ذكره عادمة البيلة القصيرة. الأنثى تسرا ابتداء من أواخر نيسان من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ ديلة في حبل حلامي المادة تطرحه في المياه الفصيلة نفوس ويستقر في مكانه حتى تلفت الذي يتم عادة قرب أواخر تموز.

١٦٨٥٥ - ضفدع صيرت

Amphibia (S). Amphibiens, Batraciens (F). Batrachia (E).

صف حيوانات من الفقاريات الجملدية التنفس. سائله واجسائه وأوتامه كثيرة البمد جميعها ثلاث رتب: حديبات الذنب ومدجات الاربل والسرغويات.

١٦٨٥٦ - ضفدع و * ، عذوق و

Odontophorus (S). Odontophore, Capucine (F).

جنس بلور من فصيلة الطيوريات. انواعه المعروفة نحو ١٧ أصلها من المناطق الاستوائية الاسيوية والارويكية. ملحيها الجاهلي حامي. جماعاتها قليلة العدد. تألف البراري والارحاج الضلة. قوتها الحشرات المختلفة الفصائل والانواع وبعض الاصناف والوزور البرية. أجسامها ربة طول من ٣٠ إلى ٣٦ سم. رؤوسها صغيرة متوسعة يتنازع قصيرة مرفية الشكل تمتد من قواعد المناقيل إلى الاقداف متقبعا صيرتة غليظة الشكل، مسنة الأذنان السفلي. عيونها صغيرة، حارها عامد الريش خضف بالاحمر او الاصفر او الاصفر. سواقلها مستديرة، لاسنة. اذناها

تتمل معظم البلاد الاسيوية والشرق الاوسط واروية. جسمه صغير القند. الذكر ينطق من ٦ إلى ٧ سم. والأشيق طول من ٨ إلى ١٠ سم. رأسه متوسط القند. خطمه مستعرض الشفق. ذكاه الانسان. عيناه كيرتان جاحظتان. أصابه طليقة في القامتين الاماميتين وبقية في الخلفيتين بحظاظ متوسط الامتداد. جلده مالمش البشرة عامد القليل. ثوربه إلى الشفعة المحتلطة المزاج يمتد في الاطليل ويبرز في الجبل وتعلو رشفة سمراء متروفة في القوائم ربة كستيتة منه مؤخر كل حين. وهذا الضفدع الذي يمانن إلى حد ما البيئة التي يعيش فيها يشقر ويسمر وينطق، بعض الشيء، بالوان محيطه. يعيش معظم حياته في الحلق نحو ١٢ سنة قرب المنابع ويجاري الماء والقدان. يسرح في الليل ويحجب في النهار اما في الماء او بين الحجارة ونحوها في كل مكان يمين له الاستار والسكنية. قوته الحشرات والجوزاء والمظاء والوزغ والديدان. الأنثى تسرا في أوائل الربيع من ٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ ديلة. ظهر الوحيدة نحو ٢. في ثلة من الحبال خشائية المادة تموم على سطح الماء. التنف يحصل بمد التدرجة باسبوين وبلا يتجاوز ثلاثة اسابيع. والظهور البلوطي ينتمي في اواسط الصيف.

١٦٨٤٩ - ضفدع الجبل، ضفدع السم، ضفدع

الطيرين

Crapeud (F). Toad (E).

هو السليوم، الطبل.

١٦٨٥٠ - ضفدع الحبل، عذوق الحبل

Rana arvalis (S). Grenouille oxyrhina (F).

Arvalis frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. أصله قعر من الشرق الاوسط إلى أروية الوسطى. جسمه صغير القند. الذكر ينطق من ٥ إلى ٦ سم. والأشيق طول من ٧ إلى ٨ سم. ثورته شوزة الضفدع الأخضر وهو مستعرض الشفق. عامد الانسان في الفك السفلي. عيناه كيرتان جاحظتان. أصابه طليقة في القامتين الاماميتين وبقية في الخلفيتين بحظاظ ضيق لا يتجاوز الزام الاول. جلده مالمش البشرة قليل القليل الثقيلة المبيضة. ثوربه يمانن البيئة التي يعيش فيها وهو يتركز على الشفعة الصنابية تملحها ماجة سطحية وتقيج اسمر وشفة بنية. يعيش معظم حياته في الحلق نحو ١٢ سنة في الحلق والرماري والنباض القريبة من الماء. يسرح في الليل ويحجب في النهار بين اثبات وتحت الحجارة وتعلو على كل موضع يمين له الاستار. قوته الحشرات والديدان. الأنثى تسرا نحو ٢٠٠٠ ديلة في ثلة حلامية المادة تطرحها في المياه الفصيلة نفوس ويستقر في مكانها حتى تلفت الذي لا يتجاوز مدته ثلاثة اسابيع.

١٦٨٥١ - ضفدع كان

الصفحة الثاني نجم ثير من كوكبة قنطس مركزه على الشبة الجنوبية من الذنب.

١٦٨٥٢ - ضفدع قنطس

Rana mugiens (S).

Grenouille caucase (F).

نوع من الضفادع موطنه اسيركية الشمالية. كير الجلة طول نحو ٥٠ سم. ثورته يقبه صيغ القور.



صفحة الحبل



صفحة جبار



صفحة نصيب



صفحة قنطس

١٦٨٦٦ - فَيَكِيلَة ٥ Cypella (S). Cypello (F).

جنس نباتات عشبية حشوية من فصيلة السبوتيات، مهدبا بعض مناطق أمريكا الجنوبية. سيقانها مجراعية مرققة. أوراقها صغيرة، سنانية النصل. أزهارها متباينة التخصيب. تزهر القرنين ضمن البيوت وفي الحادائق. تروث في الأترية الخلفية التي يكثر فيها عصر الليل ٥ أنواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية :

١٦٨٦٧ - فَيَكِيلَة وَصَائِيَة الْوَيْن ٥ Cypella plumbea (S).

Cypella couleur de plomb (F).

نوع من الفصيلة. منبتها البرازيل. ساقها عذقية، كثيرة الأوراق الصغيرة، ترتفع من ٦٥ إلى ١٠٠ سم. زهراتها كبيرة الحجم، وسيدة، لونها إلى الأزرق الفرماسية المزاج يطولها بقية مستديرة وردية اللون ٥ تنمو باستمرار نحو ثلاثة أسابيع ويكثر في شهر آب.

١٦٨٦٨ - فَيَكِيلَة هَرَبِيَّة ٥ Cypella Herberti (S). Cypella de Herbert (F).

نوع من الفصيلة. منبتها فنزويلا. ساقها مرققة، عادية العقد، ترتفع من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها صغيرة بحرية اللون. أزهارها عديدة صفراء اللون مغطاة بالزهراني وبالنسجي ٥ تنمو باستمرار من آب إلى المثلث.

١٦٨٦٩ - فَيَع ٥ Côté (F). Side (E).

كل غلى من الخطوط التي تؤلف حدود الشكل.

١٦٨٧٠ - فَيَع ٥ Nerve médiane, Côte (F). Median nerve, Rib, Costa (E).

هي في الورقة عرقها اللين الذي يصل بالوسط والأي لتتشعب منه سائر العروق. وهي التي تنقل النسج إلى نسيج النصل فتورده بأغلى وتصنعه كغلى.

١٦٨٧١ - فَيَع الْبَكْرَة ٥ هو المخلب، ٥ اطلبه.

١٦٨٧٢ - فَيَع الْمَثَث ٥ Côté du triangle (F). Triangle side (E).

١٦٨٧٣ - فَيَع الْمَثَع ٥ Côté du polygone (F). Polygon side (E).

١٦٨٧٤ - فَيَلَمَة ٥

سكة صغيرة خضراء صغيرة الحجم (السان).

١٦٨٧٥ - فَيَلَحِي ٥ Cossal

١٦٨٧٦ - فَمَّ ٥ ، فَمَّ ٥ ، فَمَّ ٥ Annexion (F). Annexion (E).

هو اتباع شيء بأخر.

١٦٨٧٧ - فَمَّ الْأَرَاكِيزِيَّة ٥ ، جَمَل ٥ Remberment (F). Reconstitution (E).

هو توسيع القطع في الأرض المحرقة أو ضم الأراضي الزراعية إلى بعضها بعض حتى يتسع الملك ويهيل استئجار.

١٦٨٧٨ - فَمَّ النَّعْمَةُ إِلَى الْوَلَكَةِ ٥

Consolidation de l'usufruit (F). Funding of usufruct (E).

هو إحدى وسائل زوال الانقطاع بقضاء حق الملكية وسن المنفعة في مالك واحد.



فَرْع



فَرْعَانِ عَائِقِ الرِّبِّ



فَرْعَانِ مَثَثِ الْأَرْطَانِ

جذع مخروطية الشكل. ثنائيا وإسائيا شديدة النقط. الأوراق تختلف مع الأنواع، تكثر فيها الشقعة السوداء المرققة بالأسود في الرءاء والجناح. امتلأها سطوة بقلعة بيضاء اللون سود الحمار ٥ تدن أشعائها في الفاحص تنمها في التربة بين الأمال المستحصية أو بين مقل الحليش الرفيع الكثيف. أنثا تبيض وتحن من ١٤ إلى ٢٠ بيضة. الترمع يستمر نحو ثلاثة أسابيع ترمع به الألائث دون الذكر التي تكون لها الحياة والقداء.

١٦٨٥٧ - فَيَكْر ٥

Maçonnerie en pierres sèches sans liant (F).

الفصر البناء بمجارة بغير ملين ولا كلس.

١٦٨٥٨ - فَيَكْر ٥ Excrément de l'éléphant (F). Elephant excrement (E).

الفص: نجو الليل.

١٦٨٥٩ - فَيَكْر ٥ Parasitisme (F). Parasitism (E).

الفص هو الرقعة، أطليا.

١٦٨٦٠ - فَيَكْر ٥ ٥ Mycthones (S).

Mycthome (F).

جلس غلافش من حمارة المحيطات. موطنه المناطق الاستوائية الآسيوية والأفريقية والأمريكية. أنثاه عديدة، أجسامها صغيرة القد. رؤوسها مغطاة قبيصة. آذانها شبه مستديرة. فرائسها غزيرية. شفاها منفثة. يعيش جماعات كثيرة العدد. يسرح كامل الليل. قوته الحشرات على اختلاف أنواعها. يألف الانجرار الحربية الدائمة.

١٦٨٦١ - فَيَكْر ٥ Paxillus (S). Paxilla (F).

جنس فطور من فصيلة الفصيات. أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطتها بعض مناطق البلاد الممتدة الحرارة. تعيش على التبدل والمواد النباتية المتصلة والأرويات الشفرة. تتميز بكون نكاتها وبقرس سيقانها وبالوانها المابقة ٥ أعرف أنواعها وأشهرها الفصون المايق الزغب والفصون المنلف الأفرات.

١٦٨٦٢ - فَيَكْر عَائِقِ الرِّبِّ ٥

Paxillus strotomentaceus (S).

Paxille à tomentum foncé (F).

نوع من الفصون. يعيش على أروعيات الانجرار العروة اغصها المتديان. ساقه خضرة، قصيرة، كستية اللون. نكته كبيرة، عديدة، مزرية السطح، قطرها نحو ١٢ سم. لونها إلى الصبغة السوداء يطولها موج كسني ٥ لحية مأكولة لليلة العلم.

١٦٨٦٣ - فَيَكْر مَلَفَتِ الْأَرْطَاك ٥

Paxillus involutus (S). Paxille enroulé (F).

نوع من الفصون. يعيش على المواد النباتية المتصلة. ساقه مستدة الانزراع والفلانة. نكته كبيرة، مرققة، ملقفة الأفرات، قطرها نحو ١٠ سم. لونها إلى الصبغة الشفاه يطولها موج نحاسي اسف ٥ لحية مأكولة، لليلة العلم.

١٦٨٦٤ - فَيَكْرَة ٥ Pexom

جموية عصيات حشلية.

١٦٨٦٥ - فَيَكْرَة الْأَسَد ٥ Aldabra

فصيرة الأسد نجم لير من كوكبة الأسد الأصفر.

اسمر المرقوق. يظنها اسمر الصفحة العليا، اسود السفلى. قوائمها الى الشقعة اسفرا || مسرعا البراري والنايات حيث تكثر الاغشاب التجيلية. قوتها صفت التجيليات .

١٦٨٨٨ - مُصَيَّرَة مَرَقُوشَة

Miridius punctulatus (S). Miris punctatus (F).
حشرة غاشلة من فصيلة القمصيات . جسمها صغير اللد ، يطول نحو ٥ م. رأسها صغير ، محرم ، حنطى اللون . خطمها مستدل الطول . حناها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها حنطى اللون . كوسلها حنطى مرقوش بالاسمر . حجبها صغيرة . حجبها ظهرها مستطيلتان ، حنطيتان ، تعلوها رقعة حمراء وتبقى اسود واصفر . ظهرها لائح . يظنها الى السمرة السوداء حنار اصفر تبي . قوائمها سمراء || تألف البراري والمواقع كفضلة مرتعها الاغشاب البرية .

١٦٨٨٩ - مُصَيَّرَات

Capidae, Miridae (S). Capidae, Miridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غشقات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة المدد . بعضها صار . جميعها مصيرة اللد ، مستطيلة الشكل . ألوانها مختلفة الالوان يظن فيها الاصفر ثم الاخضر والبي . قرونها الاستشعارية رباعية الفواصل . استنكاها ثلاثية الاجزاء . اسنانها ثلاثية القل . تمتع مكبا داخل الانسجة النباتية وتركب عدة نباتات تمتص منها .

١٦٨٩٠ - مُصَيَّرَة ، مُصَيَّرَة

Panement (F). Dressing (E).
حياة الجرح والملاج والنفاد تسهل لانساه .

١٦٨٩١ - مُصَيَّرَة

Tetracentron (S). Tétracentre (F).
حشرة حرجية وزداعية تربوية من فصيلة الغشقات . ساقها مستقيمة فناء ، طول نحو ٣٠ م. اوراقها عابلة بيضية ، طول نحو ١٢ م. عرض نحو ٧ م. ناصفا الى الخضار الزاهي ، مرقوقا حراء اللون ، عددا من . اذواج الى ٧ . انهارها صغيرة اللد ، صفراء اللون ، رباعية القصل ، ثلاثية البليات ، رباعية الاسدية .

١٦٨٩٢ - مُصَيَّرَة

Bouquet (F). Grove, Arbour (E).
هي الآلة الصغيرة الخافضة ج. فموز .

١٦٨٩٣ - مُصَيَّرَة

Atrophie (F).
Atrophy, Atrophie (E).

١٦٨٩٥ - مُصَيَّرَات الخفاش

Protobranches (F). Protobranch (E).
رتبة من الرغويات صفحيات الخفاش تتميز بنحاشتها الخيطية البسيطة المنتصبة ، غير المتوتية ، لتصلها يعضها او تجمعها الى يعضها نزع من الملب الحقيق القصير .

١٦٨٩٦ - مُصَيَّرَة

Turgia (S). Turgia (E).
جنس نباتات عشبية سولية برية من فصيلة الخياثيات . انواعها المرقوقة قليلة المدد متنبها بعض مناطق سوس البسر الايض المتوسط اخضرها سورية ولبنان وفلسطين || سيقها مثلمة ، غشقة ، زبد ، قليلة الفروع الانشعاب .

١٦٨٩٧ - مُصَيَّرَة

Garantie (F).
Guaranty, Warranty (E).

الضمان هو حاية شخص من ضرر يهدد او تعرضه من ضرر وقع عليه . لذلك فصيته عديدة تخص منها بالذكر :

ضمان اليروب

Garantie des vices (F).

ضمان القتل الشخصي

Garantie du fait personnel (F).

ضمان فعل

Garantie de fait (F).

ضمان ملوك

Garantie d'éviction (F).

١٦٨٩٨ - مُصَيَّرَة زَوَاكِي هو التامين الزواحي ، المالبه .

١٦٨٩٩ - مُصَيَّرَة الجُنُجُل

Bouquet, Gerbe de fleurs (F). Bouquet, Bunch of the flowers (E).

١٦٩٠٠ - مُصَيَّرَة ، مُصَيَّرَة

Capsus vandilicus (S). Capsus du houblon (F).

حشرة من القمصيات ثوبا الى الصفرة الباضة . طولها نحو ٦ م. ومرضها ٢ || تركب اوراق الجنجل تنصص صارتها وتؤذيها .

١٦٩٠١ - مُصَيَّرَة الخُور

Phytoecoris populi (S). Phytoecoris du peuplier (F).

حشرة غاشلة من فصيلة القمصيات . جسمها صغير اللد ، يطول نحو ٧ م. لونها الى البياض الاخير يطوي تقيج اسمر يشمل جميع الاضداد بما فيها الزباني والقروم || رأسها صغير . خطمها مستدل الطول . حناها كيرتان ناضرتان . زباناها مستطيلتان . كوسلها في الفكك ، مقطوم الطرف . حجبها حمراء . حجبها ظهرها مستطيلتان . قوائمها ميعرة الملب || تركب اوراق الخسور والصفصاف والزيون .

١٦٩٠٢ - مُصَيَّرَة السُوسُكُون

Capsus pestinaceus (S). Capsus du pansis (F).

حشرة من القمصيات ثوبا الى الزرقعة يملوها موج اخضر . طولها نحو ٤ م || تركب مع رقاتها اوراق وانفسار السوسارون والجزر .

١٦٩٠٣ - مُصَيَّرَة المُرُون

Capsus carvinus (S). Capsus du sainfoin (E).

حشرة من القمصيات طولها نحو ٤ م. ثوبا الى الصفرة الزاوية . ارجلها خضر . زباناها الى الازرقية || تركب الرن حل اختلاط انومه فتؤذي الارواق وتذبلها .

١٦٩٠٤ - مُصَيَّرَة السُوسُكُون

Capsus bipunctatus (S). Capsus du chou (F).

حشرة من القمصيات ثوبا فسقي اللون . طولها نحو ٨ م. ومرضها نحو ٢ || رقتها دقيقة الجسم خضر اللد تنصف وتتشمل على الملقوف وتقتل فعل الحشرة الكاملة بالمتصاص مصابة الورق .

١٦٩٠٥ - مُصَيَّرَة سُوْدَاة

Capsus star (S). Capsus noir (F).

حشرة غاشلة من فصيلة القمصيات . جسمها صغير اللد ، يطول نحو ٦ م. رأسها مستعرض القفن ، اسود اللون . خطمها مستدل الجرم . حناها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها شديدة السمرة . كوسلها اسود . حجبها صغيرة حمراء . حجبها ظهرها مستطيلتان . ظهرها ابيض اللون ، اسود .



مصيرة الجنجل



مصيرة السوسارون



مصيرة المرون



مصيرة الملقوف

من ذنب البرغ والتجبر || يكثف ويستعمل احد الطرفين
القائمة المركزة على النملى تروا به الاثر او عند ظهور
عوارض القطر .

١٦٩٠٢ - شَهْر

Sternotherus (S). Sternothera (F).

جنس سلاف ثمانية من فصيلة الخفصيات . انواعه
المعروفة ثلاثة . اصلاتها بعض مناطق افريقية الشرقية
والخليج حتى الهند ، تألفت الاخرى والبحيرات والشلال ||
اجسامها متوسطة لثقل طول من ٤٥ الى ٩٠ سم . ذنبها
قليلة الابدواب ، شبه بيضة الشوزن . ثوبها الى السرة
التيانية الماجات ، فيها الجوزي والاخضر والاسم والبي
والصنابي . زعانها متوسطة لمسة بعد الفثال . رؤوسها
مكرسة . اعناقها متوسطة الطول والعلافة . اذنانها قصيرة .
قوائمها شديدة النقط ، خاسية الخالب في الزويين .

Debur masticurc (F). **شَهْل** ١٦٩٠٣
الشهل والاضهال هو اول النضج المعروف بالادراك .

Cyon (S). **شَهْل** ١٦٩٠٤
Dohle (F). Dohles (E).

جنس كلاب متوسطة مقترنة موطنها سيرة وسطى مناطق
آسية الوسطى وباليزية . له ثوبان شهل الشمال وشهل
الجنوب . يألف النباتات والبراري الجبلية . لحمه الحاني
جاني . جماعته تعد من حدة الى عشرة ازواج . لا يتشم
فرسته منفرداً معها كانت الحال . انقل طرائقه الطاء
والشواذن || شكله الخارجي منقسم المتقاطع فيه بالكلب
الاقل اما رائحته العاطفة رائحة ابن آدم . رين ميزان
جسه ان عدد اطراف الاثا هو ١٢ او ١٤ في حين ان
لكلية ١٠ اطراف فقط .

Cyon javanicus (S). **شَهْلُ الْجَنْتُوب** ١٦٩٠٥
Dohle méridional, Bureau (F).

نوع من الشهل . موطنه يمتد من جبال حلايا الى جزر
الزواج وبهال بورنيو . يألف الحشاب والجبال . جماعته
تعد من ٤ الى ٥ أزواج يقودها ذكر مسن . يقتصر جمع
المحيوانات الضعيفة والاوز والبط ... يصرح في الليل ولي
التيار || جسه ابيض الشكل يطول نحو ٩٥ سم . ذنبه
٢٠ سم . ارتفاعه ٥٠ سم . ثوبه الى الشفة السمر يزيداد
اسمراراً في الصيف ويضع في الشتاء || وهو سهل المراس
يألف حياة الاسر ويحب بقاءه اذا أخذ سيرة لكنه
لا يطيع الا من يربي به ويقدم له الطعام || قيل لنا
مضى ان بعض الكلاب الاطرية لمحت مرته . ثم تحقق
فما بعد ان النظرية خاطئة لان المادة السلية عند الكلب
تقل ٤٢ سناً في حين انها لا تقلل سوى ٤٠ سناً
عند الشهل .

Cyon alpinus (S). **شَهْلُ الشَّامِ** ١٦٩٠٦ ، **لَبُونُ الْجَبَل**
Dohle septentrional, Caon de montagne (F).

نوع من الشهل . موطنه يمتد من سيرة الى التركستان
والبيت . يألف المناطق الجبلية الكثيرة النباتات والارواح .
جماعته تعد من ٥ الى ٧ أزواج يقودها ذكر مسن . يقتصر
الطاء والارباب والراغور والافلح ... || جسه منقسم
ابيض يطول نحو ١٠٢ سم . ذنبه ٤٤ سم . ارتفاعه ٥٢ سم .
ثوبه الصفي الى الشفة كسر في الرأس والظهر وتبيض

اوراقها معتقة ، حاسنة ، متعاقبة ، مركبة ، وتربية
التصميم . وديقاتها متطيلة النصال المشارة التفرض .
ازهارها صفيرة ، سيوانية التصميم ، بيضاء اللون أو
اريجوانية . ثمارها حب حقيق ، مسطبل ، إيرى الشكل
المثابين الطول || ثوبها ريمبي || اعرف: الوأها واشهرها
للصيدة الرميعة الورق (*T. latifolia*) .

Benincasa cerifera (S). **شَهْلِيك** ١٦٩٠٧
Bénincase (F).

نبات زراعي حولي مداد وحيد الجنس والذو من فصيلة
القرعيات . هذه الثمر الاوصى . زراعته واسعة الانتشار
يستخدم كالكرسى في الطبخ وكالبطين في المربيات ||
ساقه مدادة طول نحو ٢٠٠ سم . حلقه متشعبة . اوراقه
معتقة ، كدية النصل المتصبع المزئير ، خاسية الغصص
أو سابعيتها . ازهار فردية ، محورية ، كبيرة الله ،
خاسية البليات ، صفراء اللون . ثماره متطيلة شبه
اسطوانية الشكل ، طول من ٢٥ الى ٤٠ سم . وطره
يرواح من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الخضار الباحت
يملو توشع اسمر . قشور الثمار في اول مهدها كثيفة الزغب
الحبي الاطراف ثم يتقلص الزغب ليشاعا مادة شبة
تكتبل مع الادراك . لياها جامد المكسر ، ابيض اللون ،
خافت العرف المسكي ، من الحفاق .

Dangila (S). **شَهْلِيك** ١٦٩٠٨
Dangile (F) Dangila (E).

سمكة بحرية من مفصليات اللسانه وفصيلة السرديات .
موطنها جمع البحر الهند والبلاد المجاورة || جسمها اعلاحي
الشكل ، عذب الظهر ، يطول نحو ٣٠ سم . ثوبها الى
الخضار الاخضر يمتد في الظهر ويتر في البطن . رأسها
معتدل الجرم ، يرمي الشكل . غطها ثنائي الطبقات
التيقة . شفتها قليل الانفرج . زعنفتها الظهرية كبيرة
الله ، حلالية التقعر . زعنفتها الذيلية نايقة || فيها
متوسط الصنف ، مأكلة .

Dissymétrie (F). Dissymetry (E). **شَهْب** ١٦٩٠٩

الضهب عدم التانسق في التركيب الاحاسي او الجسموري .

Cumminsiella (S). **شَهْبَة** ١٦٩٠٠

جنس فلور مجهرية قريبة الشبه من الصدفية . تتميز بيغها
البرخي المردلي الشكل ، الفيق الانتساب وتلطيف الله .
ذميتها عديدة الدعامات الرزوية التصميم . دملها مائلة
من حليتين لا متجانستين النصل اسطوانية الشكل واقليا
كروية . اغنيها متصلة السام الثنائية || انواعها
الاقتصادية قليلة اعرفها شبه الماهريه .

Cumminsiella sanguinea, Uropyx sanguinea, Puc-
cinia mirabilissima, Uromyces sanguines (S). Rouille
du mahonia (F). **شَهْبَة المَاهُونِيه** ١٦٩٠١ ، **شَهْبَة قُرْمَزِيه**

فطر مجهرى يتطفل على اوراق وثمار الماهريه فيؤذيها
ويطعمها || ظهوره الخارجي بثور عسية ميسرة لافلامية
التصميم تركب الاوراق والثمار الفتيه . تبو طلعها اللون
فسفيسية الاخلافة تتصبع النصل وترفعه ثم تنصرف الى الجوزة
فالسرة حيث تنفجر من بؤرها القرمزي اللون || وهو
على الثمار وأنها بثور صفيرة مستديرة رافعة ميسرة أو
متراسة تدير معلقه اللون ثم تحيل الى السرة مع اقترابها



صِيك



شَهْلِيك



شَهْبَة المَاهُونِيه



شهر



شهل

الضفديات. مهدا البلاد الحارة. اجسامها دودية مستطيلة، حلقاها حرقفية التركيب، غشقة، متجانسة من الرأس الى طرف الذنب. وروصها وكدية. عيونها دقيقة مغلقة. قوتها الحشرات. تموش بين الحجارة وتحبها وفي انفاق تسربها كالحيات.

١٦٩١٧ - ضفديات
Caecillidae (S).
Caecillidae, Cécillidae (F).
فصيلة حيوانات عادمة الارض من صف الضفديات اجسامها وانواعها عديدة مهدا البلاد الاستوائية والحارة. قوتها الحشرات والحوام والمواد العضوية المتحللة.

١٦٩١٨ - ضور
Sinus
هو التجويف للمقر في فصل النبات ج. اضلاع.

١٦٩١٩ - ضور
ضور العين : مزج به الماء ووضعه كذلك.

١٦٩٢٠ - ضفدكة
Enkanythus (S).
Enkanythe (F).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « الزهرة الفسحة ». جنس اشجار ونباتات حرجية وتزيينية من فصيلة الخنجنيات. منبتها يحد من الشرق الاوسط الى اليابان. ساقها ترتفع من متر الى عشرة امتار. اوراقها متعاقبة، مستطلة القواعد والاطراف. ازهارها حلقية النسيج، طرفي الازهار. ازهارها ملونة، عشارية الالوان، مفرقة المتكاثرة || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية :

١٦٩٢١ - ضفدكة جرسييه
Enkanythus campanulatus (S).
Enkanythe en cloche (F).
نوع من الضفدكة. مهدا الشرق الاقصى. ساقها فرعاء تملو نحو عشرة امتار. اوراقها تطلو نحو ١٠ سم. وتقرض نحو ٤ سم. نصالها مهدية، ذرية الانسان الحادة. ازهارها كبيرة متدلية جرسية الشكل صفراء اللون تلوها مشعة وردية || تنويرها يستمر طوال شهر ايار.

١٦٩٢٢ - ضفدكة هندية
Enkanythus deflexus (S). Enkanythe des Indes (F).
نوع من الضفدكة. مهدا جبال الهند، اخصها حلايا. ساقها متحللة الضفدكة تملو من ٣ الى ٧ امتار. اوراقها ولانها متراكبة. اوراقها لحياسية الشكل منها السنانية والاطليسية، تطلو من ٥ الى ٨ سم. وتقرض من ٣ الى ٤ سم. نصالها صغيرة الانسان اختارية. ازهارها حراء وردية. شجرة بالودية || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

١٦٩٢٣ - ضفدكة يابانية
Enkanythus japonicus (S). Enkanythe du Japon (F).
نوع من الضفدكة. ساقها فرعاء متراكبة الانفاذ والاغصان تملو من متر الى مترين. اوراقها اطليسية تطلو نحو ٤ سم. وتقرض نحو ٣ سم. نصالها مستطلة الحمار. ازهارها يستيق الاوراق. ازهارها بيضاء اللون، جلجلية التبرجات الحلياسية الحذبات || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار.

١٦٩٢٤ - ضور
Rut des bovidés (F).
Rut of the bovids (E).
هو استمرام البقر وسبها واء الثيران.

في الاطيان والبلن. ثوبه الشوي الى البياض الاصفر || نباحه يخلف من نباح الكلب ومواء الذئب وضياح الثعلب || يسرح في الليل وفي النهار. قولته الربوبية لا تتجاوز خمس ساعات.

١٦٩٠٧ - شهوة
Abajous (F). Cheek-pouch (E).
الشهوة جراب في بطن الفد تتميز به بعض الحيوانات. اخصها القرود تستعمله لطبع الطعام من سبوت وثيرها. وما شهوات عني ويسرى. ج. انشاء.

١٦٩٠٨ - شهول
الشهول : البقرة والشاة والمز والناقة التي قل لبنها. وهي البئر الغليلة الماء.

١٦٩٠٩ - شهية
Chardon (F). Thistle (E).
الشفهية اشوك على اختلاف انواعه. وشفهية كل اتي لا تحبس.

١٦٩١٠ - شهوة، نور
Lumière (F). Light (E).
النور هو المؤثر الطبيعي الذي يسبب الابصار. مصادر مختلفة منها طبيعية كالشمس ومنها صناعية كالمصابيح الكهربائية وغيرها.

١٦٩١١ - شهوة
هنة تخرج من سياه الناقة والبقرة والشاة قبل خروج الولد.

١٦٩١٢ - شهوة شرسية
Staurotypus triplicatus (S).
Staurotypus agresiva (F).
نوع من الضفدكة. سلطنة من فصيلة الحفانيات. منبتها يشمل معظم مناطق امريكا الوسطى. تألف المتاعق والعتوان والافواجر ويجاري الماء || اغلاقها شرسية ثوبية، تهاجم كل من يقترب منها || جسمها متوسط القد. ذيلها بيضي اللون، قليل الاحديداد، يطول نحو ٤ سم. زطها منبسطة بالصفحة لمصبي الشكل. رأسها مستدل الجرم شارف الفك الاصل. سنكها ثنائي الزوائد القرنية. حلقها غليظ قصير وذنبها قصير. قوائمها مستدلة القد، نشيطة || قوتها الضفادع والاسماك والبطا والضماد.

١٦٩١٣ - شهوة
Haliotinelles (S).
Haliotinelles (F). Haliotinelles (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات مهدا الاربعين غليظيات الخواص وعضية الكيميات. انواعها المعروفة قليلة العدد، اطرافها البحر الاحمر والخليج. تموش لامة بالصخور المنصورة الثرية من السطوط || اصداها صغيرة، داخلية، وثيقة تلمش الظهور. اجسامها اطليسية الشكل، متطرفة المقدم للمهب. اريدتها فضفاضة. غياشيها يمينية الازتكاز، نظلية الترتيب الصفي. افواها غليظة مستدلة الطول. لولاسها انبوبية مقلوبة السطوح الخارجية.

١٦٩١٤ - ضور
Erratiques (F).
هي الطيور التي تغلب الرزق.

١٦٩١٥ - ضور
هو السمين الشديد من الجال.

١٦٩١٦ - ضور
Caecilia (S). Cécilie (F).
جنس حيوانات صماء، دجوية، دودية الشكل من فصيلة



ضور



صخرة

Callictea (F). Rennet (E). ١٦٩٣٢ - صُفُون

هو المنفعة ، اطبا .

Rayonnement diurne, ١٦٩٣٣ - صُفُون

Radiation diurne (F). Diurnal radianca, Diurnal radiation (E). هو الاشعاع الضوئي النهاري .

Thalamiflora (F). ١٦٩٣٤ - صُفُون

Thalamifloral (E). تمت تدوين يخلق حل النباتات المزروعة الغلاف الزمني من ثنائيات الفلقة .

١٦٩٣٥ - صُفُون ، صُفُون
قال النعماني عن ابن سيدة : الضيب شي من دواب البحر على هيئة الكلب وخلقت .

Miel (F). Honey (E). ١٦٩٣٦ - صُفُون
النسج هو السمل فصل عن شهد .

١٦٩٣٧ - صُفُون ، صُفُون
سمكة كبيرة مأكولة تكثر في البحر الاحمر والمتوسط . وهي نوع من السمك تطلق نحو ٦٠ سم . ثوبها الاربعة القفصية زهر ويشفر حته البطن ويقل مع اقترابه من ثبح القلبي .

Poulche (F). Filly (E). ١٦٩٣٨ - صُفُون
فوس لم يقطن الاثان ولم ينز ثلث (السان) .

Hétérogame (F). ١٦٩٣٩ - صُفُون ، صُفُون
Heterogamous (E). تمت تدوين يخلق حل النباتات المزروعة التي تحمل اذعرا ذكيرة والثانية في زخير واحد .

Hétérogamie (F). ١٦٩٤٠ - صُفُون

Heterogamy (E). الصيغة جسدوديا حيوانيا هي تعاقب تواله بكري مع تواله كصي صحيح . وهي حادقا حالة تباين القناعات الوراثية من حيث الابداء المركزية او التكون . وهي شوزيبا حالة وجود اذعرا مختلفة الشكل في تنور واحد .

Icticyon venaticus (S). ١٦٩٤١ - صُفُون

Icticyon (F). Icticyon (E). حيوان لاح مقنص وحيد الجلس والنوم من نصيلة الكلبيات . موطنه بعض اصقاع امريكية الجنوبية اصعبها البرازيل . يالفت اطراف الغابات والاصراج المشعة الاشجار قوية كل ما استطاع قصه واقتراه من حيوان صغير . ملجته الحياتي جماعي ، جماعته تعد من ٥ الى ١٢ ذكورا . جسمه مستدل قليل الارتفاع بطول نحو ٩٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٢ سم . واهم مستضفئ الشكل عريض الجبهة والخلف . اذناه صغيرتان . ثوبه الى الثلثة السوداء يمتد في الراس والفقر ويبيت في البطن . ويرد قصير ليد . الاذن اصغر قدما من الذكور واهت ثوبا . عدد اطباها ١٢ . يحملها يشتر نحو تسعة اسابيع تقصع في تمامه من ٦ الى ٨ جراه طامسة لا يقصر التولد قبل مضي سبعة ايام .

Parasite ١٦٩٤٢ - صُفُون
هو الطفيلي ، اطبا . ومن اسمائه بالني دون الاختصاص ليش .

١٦٩٢٥ - صُفُون هو الشرقا ، اطبا .

Coraciidae (S). ١٦٩٢٦ - صُفُون

Coraciidae (F). Coraciidae (E). نصيلة طير من الجواثم تدعى ايضا شرقايات ، اطبا .

Speotzzy cunicularia (S). ١٦٩٢٧ - صُفُون

Hiboux des terriers (F). من اسماء ضوع الجوارح
H. des cavernes (F). ضوع الكهوف
H. des lapins (F). ضوع الارانب
H. des prairies (F). ضوع المراعي
H. des marais (F). ضوع المنابع

طائر من البويات وماراة القناعات يحير البلاد في طلب الرزق لا يقم في مكان اكثر من شهرين . يبيض جماعات كبيرة ، سره يمد من ٢٠ الى ١٠٠ طائر في وطر من الطيور النافقة اقارب حياتها . يالفت المروج والمراعي والبراري والنامق يلمس قوته في النهار . يصيد الحمر والذئاب والذباب والسمكة والحيات والفاقراب في يثن حشه في صروع الصغور والكهوف والجوارح وفي اسفل وفروغ الاشجار اليابسة . اثناء تضع اربع بيضات تحضنها ثلاثة اسابيع .

١٦٩٢٨ - صُفُون ، صُفُون

Engoulevent à collier (F). Fern-owl (E). طائر من السبد الرؤاس طوله نحو ٢٧ سم . وهو امدا الريش الاخير الموشم بخطوط سود وحر . واهم مفلق الشكل . متقار صغير لثقة راس الشدين يحمل صولجا يعض الريش التدقيق الملبس الركب . حقه مطوق بقلادتين عاجيتين . سقطاه مستطولان ذلقان . ساقاه مسرولتان . ذنبه متوا الطول . وهو من قرايط صوف البحر المتوسط . اذنه تثن في الفصوص تدره وسط الادغال تحضن فيه اربع بيضات من ١٦ الى ١٨ يوبا .

١٦٩٢٩ - صُفُون

Sallie (F). Cover (E). نرو ذكر الحيوان على الاذن . ضاك الجواد الحبر : نزا ملها .

١٦٩٣٠ - صُفُون ، صُفُون

Moschoema (S). Moschoema (F). جنس نباتات حولية يبرسة من نصيلة الشفويات اذناه قليلة العدد جميعا من الرياسين . سوقها دقيقة مرية الزوايا تدور من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها معتقة ، متناقية ، يضية الشكل نصليا سبك النسيج ، منشاري الحافة ، خمل البثرة على صفحته . ازهارها سليل التجميع . اذعراها صغيرة لثقة ، ضية ، متناقية ، لونها يراوح بين الازرق والاصفر الباهت . ازهارها يستر من كائون الاذن الى شياط او من تموز الى آب . اوراقها واذعراها مسكية الحرف الطري .

١٦٩٣١ - صُفُون

Lioplox (S). Lioplox (F). Lioplox (E). جنس حيوانات مائية سرلودة من الرغويات مديدت الاجليل وفضيلة البليونيات . انواحه المعروفة قليلة العدد اصلاطها بعض مناطق المناطق المعتدلة الحارة وشها امريكية الشانية في اصنافها اطليجية ، بطيية ، متباينة الاحجام ، رقيقة الشفاء اكسلي ، ملوية وزعفرية .



صُفُون



صُفُون



صُفُون

١٦٩٤٨ - صَيْكَلَة سَاطِعَة *

Masdevallia ignea (S), *Masdevallia flamboyans* (F).
نوع من الصيكة . ساقها تملو نحو ١٥ سم . أوراقها
حرفشية . زهرتها حمراء ساطعة يملوها موج قمرزي يتخلله
البنفسجي . فصلتها العليا مستطيلة منقطة عل الزهرة ||
تنويرها ويهي .

١٦٩٤٩ - صَيْكَلَة قِرْمِزِيَّة *

Masdevallia coccinea (S), *Masdevallia écarlate* (F).
نوع من الصيكة . ساقها تملو نحو ٢٥ سم . أوراقها
بريضية الشكل تطول نحو ٥ سم . زهرتها بنفسجية يملوها
مواج قمرزي أسفم || تنويرها يستمر عدة أسابيع ، من
أواخر آذار الى أوائل حزيران .

١٦٩٥٠ - صَيْكَلَة نَيْبُوتِيَّة *

Népocisme (F), *Nepotism* (E).
النضيلة تتجاوز مفاير للانظمة او الشرع يقوم به من
ييده السلطة في سبيل مصلحة قريبه او صديقه .

١٦٩٥١ - صَيْحُرَان * هو نعن الماء ، اطلبه .

١٦٩٥٢ - صَيُون
Matou (F), *Tom-cat* (E).
هو القط الذكر ج . صياون .

Parasitologie (F).

Parasitology (E).

Encastelure (F).

Contraction of the hoof (E).

عارض يصيب وبل القرس سبيه ضيق الدابة في الحافر .

Paraphimosis

١٦٩٤٥ - ضَيْقُ الْقَتَبِ
سوء تركيب طبيعي في القتب يمنع بروز الحشفة الى
الخارج وهو شائع عند الكلاب تادر عند الجياد .

١٦٩٤٦ - صَيْكَل * ، صَيْكَلُوس *

Janus (S).

Janus (F), *Janus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل
وفصيلة الخرشوبيات . انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها
بحار البلاد المنتدلة الحرارة || اجسامها حريالة مستطيلة
مغطاة بلواس متكاثفة ورقية الاطراف || اعرف انواعها
واشهرها الصيكل القنبراني (*Janus cristatus*) الذي
يكثر وجوده في المناطق الشمالية من البحر الابيض المتوسط .

Masdevallia (S).

Masdevallie (F), *Masdevallie* (E).


١٦٩٤٧ - صَيْكَلَة *
جنس نباتات امنية من فصيلة السطليات . جفورها
لحمية قليلة الانشعاب . سيقها فيه اسطوانية الشكل .
اوراقها حرفشية . ازهارها وسيدة ، كثيرة ، ملونة ||
انواعها المعروفة قليلة المدد الشهرا التالية :



صَيْكَل



صَيْكَلَة سَاطِعَة



ط



طاية

منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداؤها شبه يفسية الشونن ، كبيرة الفم المصراعي القاطب ، مائلة الصفحة المزخرفة بالالوان الزاهية ، عادة الحلزونة || اجسامها اعليجية ، فلق ارجلها تلحف الاصداف . رؤوسها قليلة الزنوج ، عادة الرأس .

Caractère (F). صفة - طابع ، صفة
Character (E).

Etage (F). Stor, Floor (E). طابق - طابق

Tapura (S). - طابورة ٥

Tapura (F). Tapura (E).

١٦٩٥٨ - طاحون ، طاحولة ، مطحنة
Moulin (F). Mill (E).
الرحى تحق الحب تنصره دقيقاً ، والطاحون يني أيضاً البيت المد الطحن . ج طواحين .

١٦٩٥٩ - طاعير ، طخور ،
Nimbostratus (S).
ضرب من الغيوم وهو محاب مراكب له اكهب اللون او اسمر يحجب الشمس .

Bullidae (S). - طاييات ٥

Bullidae (F). Bullidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل

خلفيات الخياشيم السقفية . اجسامها واتواها عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة الثالثة والبعض الآخر منتشر

في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة [الحرارة] اصداؤها

قراوح بين الاستدارة والاستطالة وقد يظف فيها الصفر

وارقة وهي كثيراً ما تكون مغلفة بالرداء او بالرجل .

غياشيمها مضمومة في تجاويف خاصة مركزها عند مؤخر

الظهر يغلها الرداء . رؤوسها قليلة الزنوج عادة الموالس ||

اعرف اجناسها وانهرها الطابية والجمبية والحيمية والحيزوب

والكوارية .

Bullana (S). Bullée (F). - طابية ٥

Bullana (S). Bullée (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل

وفصيلة الطاييات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة المدد،

١٦٩٦٠ - طادة

الطادة ضرب من السمك (السان) .

١٦٩٦١ - طكرحة *

Pissette, Pipette
اداة غبرية تستعمل في لقاء السوائل المغنة .

١٦٩٦٢ - طاروق

الطاروق نجم يقال له كوكب الصبح .

١٦٩٦٣ - طكوى ، طكوى ، اتجق

Adventif (F). Adventicous (E).

نمت تمرني يطلق على بعض اعضاء النبات كالبرام

وغيرها التي تظهر عرضاً في مواقع من النبات لم تألفها قياً .

١٦٩٦٤ - طكوى

Accident
راجع اصابة .



طارسة

١٦٩٧٨ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، مَرَضُ الْخَيْلِ الْأَفْرِجِي،

تَجَمُّعُ

Peste aquorum (S).

Peste equine, P. du cheval (F).

وباء شديد الخطر سريع الانتشار يصيب الخيل وصائر الدواب فيسيبها أن تم تالاج وقائياً .

١٦٩٧٩ - طَاعُونُ الطَيْرِ ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ ،

شَرَطْلَةُ

Pestis avium (S). Peste aviaire (F).
وباء خبيث سريع الانتشار يفتك بالطيور الباجية انحصا الدجاج . يعالج وقائياً .

١٦٩٨٠ - طَاعُونُ الْكِلَابِ ، جَلَاعَةُ الْكِلَابِ ،

بُرَسْتُور

Febris catarrhalis x nervosa
caum (S). Maladie de Carré, Morbus carre (F).
وباء خبيث يصيب الكلاب فيسيبها أن تم يعالج وقائياً .

١٦٩٨١ - طَاعُونُ بَقَرِي ، أَبُو هَدَلَانْ ، أَبُو

دُمَيْعَةُ ، هَبْ

Peste bovine (S). Cattle-plague, Rinderpest (E).
وباء شديد الخلق سريع الانتشار يصيب البقر والغنم والماعز والجائوس فيسيبها أن تم تالاج وقائياً .

١٦٩٨٢ - طَاعُونُ

Imperméable à l'eau (F).
Waterproof (E).

نمت تعريني يطلق كل مادة لا يغلها الماء .

١٦٩٨٣ - طَاعُونُ

Mutant (F).

فرد أو جزء من فرد ظهرت فيه طفرة أي شذو .

١٦٩٨٤ - طَاعُونُ

Pestromys petaurista (S).
Podomys petaurista, Taguan, Orsi (F).

نوع من البطارييس وهو حيوان قاصم من السنجايات موطن الهند وسريلاندي . طوله نحو ٥٠ سم . وزنه ٥٥ سم .

جسمه مستطيل الشكل . جوارزه قصيرة ، اطفاوه صغيرة مدنية . ثوبه الى الصهبة السوداء تديق مع اقترابها من النضج

ولرأس والصدر . يلقه الى البيرة المرحضة بالابيض . رائحته الجناسية الملدنية كاسية || يأنث الاجراج الكثيفة

ويقترب من الاماكن الاكلة || قوته البأر والقشور والحشرات والديدان .

١٦٩٨٥ - طَاعُونُ

Boopis (S). Boopide (F).

الاسم العلمي معناه « عين الثور » والاسم العربي للماعا الى شكل جميع الارواق والازهار . جنس نباتات مسمرة

بيرة وفريزيين من فصيلة الكليريوات . منبتها الطوسي بعض مناطق امريكا الجنوبية المعتدلة الحرارة || انواعها

المعروفة شرة ، اما ضروبها الزبينية فكثيرة المدد . سورها مخشوشة ، قليلة الفروع التي تنتهي بطاقات من

الارواق والازهار || تنويرها يستمر من اواخر الربيع الى اوائل الخريف .

١٦٩٨٦ - طَاعُونُ

Energie (F). Energy (E).

صفة كل جسم يستطع القيام بعمل .

١٦٩٨٧ - طَاعُونُ الْحَرَكَةِ

Energie cinétique (F).
Kinetic energy (E).

١٦٩٨٨ - طَاعُونُ حَرَكِيَّةٍ

Dynamisme (F).
Dynamism (E).

١٦٩٨٩ - طَاعُونُ عَفِيفَةٍ

Force cryptique (F).
هي القوة الخفية المستعدة التي تشمل تجميع الطاقة الذي يشمل بدوره الحياة والمثل والمثل .

١٦٩٩٠ - طَاعُونُ كَامَتَةٍ

Energie potentielle, Potentiel (F). Potential energy, Potential (E).
يرتقى الطاقة المقدورة أو المقدور الكامن .

١٦٩٩١ - طَاعُونُ

Energiétique (F).
Energetic (E).
ما هو منوط بالآلة .

١٦٩٩٢ - طَاعُونُ * ، طَاعُونُ

Budurcas taxicolor (S).
Takang, Takin (F). Takang (E).

حيوان لبون عاشب يجير من ذوات الاغلاف . موطنه يند من الاسام الى التبت على حدود التلج الدائم . ملجته الحيواني جامعي . قطانه صغيرة متفرقة لا يتجمع الا عند الرجل من

مقاطعة الى اخرى فيبلغ عدد الاجل ، اذ ذلك ، نحو ٥٠٠ نفر || جسمه رمية ، مستطيل الشكل ، فيه من

الثور والكنش والظبي . يقط نحو ٢١٥ سم . ويبلغ نحو ١١٥ سم . ويزن عند بلوغه الكلال الجسوري من ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو . قرن الذكر يقط نحو ٥٠ سم . وقرن

الانثى نحو ٣٠ سم . رأسه مستطيل الجرم ، عذبة قصيرة الانف . عيناه صغيرتان لوزيتان . اذناه صغيرتان مستعرضتان . قرناه خليلان يتحان الجهة . عنقه معتدل

القد ، كثيف الوبر المستطيل . صدره عريض النقص مادم النقب . كفه مقوس الطرف المنحدر . قوائمها خفيفة ،

شديدة النشط . ثوبه الى الصهبة الزرقاء الملوحة بغير ويشرق صفحي الفتق ويشرق الى الشقعة في البطن . فرج

الانثى ثنائي الخلف || قوته الاصاب الخضر والجلشاش اليابسة .

١٦٩٩٣ - طَاعُونُ

Table de pointage (F).
طَاعُونُ

جدول قياسي يحدد فيه قيمة الجزء من الذي بالنسبة الى كاهله .

١٦٩٩٤ - طَاعُونُ

Tan

الطمان هو المادة السائلة في مسحوق لحاء الفص وثيره من انواع السندان والكمسة الخ . يستعمل في تحضير

١٦٩٩٥ - طَاعُونُ

Indigene (F). Undigested (E).
طَاعُونُ

ما تملر انهضاه على المعدة .

١٦٩٩٦ - طَاعُونُ

le Paon (F). Pavo (E).

الطاووس كوكبة نجوم جنوبية الملقح ، ذكرها بين الحرب الفلكي والثلث والثلثين || عدد نجومها تسعة مراتها تراوح

من الخامسة الى الثامنة .

١٦٩٩٧ - طَاعُونُ ، طَاعُونُ

Pavo (S).
Paon (F). Peacock (E).

جنس طير من فصيلة التندريبات . مشهور بجبال ريشه والازهر يتنفس والخيلاء . كنيته ابو الحسن وابو الشبي .

انواعه قليلة . جميعها كثيرة اللمعة مستطيلة ريش القرواد والزعفرى ، قصيرة ريش الانثى ، رؤوسها صغيرة

متنوعة . متغيرها غليظة . ارسافها طويلة . غالبيتها صغيرة . انبيا سراكبة الالوان الهية يطوحا تشبه جمل ومشة



طَاعُونُ



طَاعُونُ



طَاعُونُ

Paradisea minor (S). طائر الفردوس الصغير
Paradiser petit émeraude (F).
Paradisea apoda (S). طائر الفردوس الكبير
Paradiser apode, Paradiser grand émeraude (F).

1٧٠٠٧ - طائر الفينيكس *
Oiseau-lyre (F). طائر من الجوامع لاقتات النمل يدعى مانور ، اطلبه .

1٧٠٠٨ - طائر الفينيكس الأبيض *
Oiseau-lyre superbe (F). طائر من الجوامع لاقتات النمل وفضيلة المانوريات يدعى مانور ميلور او اتيق ، اطلبه .

1٧٠٠٩ - طائر المغاليب *
Oiseau des tropiques (F). طائر من كليات القدم وفضيلة الفينيكسات يدعى فيتين ، اطلبه .

1٧٠١٠ - طائفك *
Sous-classe (F). Sub-class (E). الطائفة في تصنيف الاشياء تأتي بعد الصف وقبل النعمة .

1٧٠١١ - طب أنثييل *
Hippiatrie (F). Hippiatry, Vetrinary art (E). علم يبحث في امراض الخيل وهداؤها .

1٧٠١٢ - طب بيطري *
Médecine vétérinaire (F). Veterinary medicine (E). هو طب الحيوان او طب الحيوانات الداجنة .

1٧٠١٣ - طباب ، ديسك *
Disque (F). Discus, Disk (E). شكل قرصي الهيئة مطع الصلصة اورد عليها او مقعها .

1٧٠١٤ - طباج *
Lagria (S). Lagrie (F). Lagria (E). جنس حشرات غاشلة من غديات الاجنحة وفضيلة الطابجيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٧ الى ٨ م . رؤوسها شبه غروبية . متناكها غريبة . عينيها كبيرة نافذة . قرونها الاستشعارية غيبطة . كواسلها خبيثة مستطيلة . بطونها امليلية مقلطة . اعماؤها عذبة ، لاسعة ، خلية الكشار ، مهدية الاطراف . قرونها مستطيلة || تألفت المواقم الدفلة . قوتها الارواق والازهار . يرقاتها حادة تعيش على المواد النباتية المنحلة في الجلالة وتحت التقشور والحاء .

1٧٠١٥ - طابجيات *
Lagrideae (S). Lagridae (F). Lagridae (E). فضيلة حشرات من غديات الاجنحة مخفلات الاجزاء . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الحارة . جميعها غاشلة قوتها المواد النباتية . يرقاتها تعيش في الجلالة وتحت التقشور || اجسامها صغيرة تطول من ٤ الى ١٢ م . رؤوسها عرجمة . كواسلها خبيثة مستطيلة . اعماؤها جالسة القاعدة ، مستديرة الاطراف اللاسعة . قرونها الاستشعارية غيبطة مركبة من ١١ فصلة . مختلفة الاجزاء || اشهر اجناسها واعماها انتشاراً الطابج .

غلاية . ذنابها ربة اللد ، مروحية النثر || موطنه الهند وجوارها وسرنيش . يألف الغابات والدياش والمروج الدفلة . يعيش اسراباً صغيرة براوح صعدا بين ٦ و ٢٠ . قوته اللد والجرب والاشباب وقنواي والحشرات والوزغ والافاعي || جمده الاشجار المنجسة الاضمان . اناته تقسم نحو ١٠ فصلات تحسباً وسجدا في انحصرت دلتته في آخرة بين الاعدال والاشباب || اشهر انواعها ما يتبع .

1٦٩٩٨ - طاووس أسود *
Pavo nigripennis (S). Black peacock (E). طائر من الطاووس موطنه الشرق الاقصى . يتميز باموداد ريشه وباستدارة فصوص ذنابها وبالنسبة الفضية المواج التي تملو ريش صدره .

1٦٩٩٩ - طاووس الثيبث *
Paon du Thibet (F). هو قشكيس طائر من كندريجات ، اطلبه .

1٧٠٠٠ - طاووس صيني *
Pavo muticus (S). Paon spicifera (F). طائر من الطاووس . موطنه الهند . كبير الجفة والاعمال . رأسه وقتره وصفته الى الاخضر المايق الازرق المواج . صدره الى الاخضر الازرق الملعب المواج . بطنه شديد الخضار الازرق . ظهره اسفح لاسع يتخلله الاخضر والاصفر . قلدته الى الصبهة . اياهره الى السواد الازرق المواج . كلاء الى الخضار المايق . ذيله اكبر من ذيل الطاووس المعادي وازني لونا وابي رونقا .

1٧٠٠١ - طاووس عادي *
Pavo cristatus (S). Paon vulgaire, P. commun (F). Common peacock (E). طائر من الطاووس رأسه وصفته وصدره وبطنه الى الازرق الباقية والجسدية ، الخضراء المواج . لة رأسه سوداء حمرة مشوح بالابيض . ريش ظهره اخضر اسفح ، اسيد الحافة ، قلدته الى الصبهة الباقية . اياهره الى السواد الازرق المواج . ذيله اخضر اسفح تملو فصوص سود يحرقها الاخضر الزاهي .

1٧٠٠٢ - طاووس *
Paonne (F). Penhen (E). انثى الطاووس .

1٧٠٠٣ - طائر البوق *
Thalassidrome (F). هو البجسي اللجب ، اطلبه .

1٧٠٠٤ - طائر الترابيع *
Oiseau de pluie (F). طائر من كليات القدم مشهور باسم قدوم ، اطلبه .

1٧٠٠٥ - طائر الفيتث *
Paradisea (S). طائر من فضيلة الفينيكسات يعرف باسم قشاق ، اطلبه .

1٧٠٠٦ - طائر الفردوس *
Paradiser (F). Bird of paradise (E). جنس طير من فضيلة الفردوسيات ورتبة الجوامع المشروبات المناظر . انواعه قليلة معددا جزو المحيط الهادي . تتميز بزدها اوتياها المايقية الجبال . اجسامها متوسطة القد . طولها براوح بين ٣٠ و ٤٥ سم . رؤوسها معتدلة ، متناكها مستطيلة ، عذبة ، ذرية . مناقشها قاعدية الارتكاز منشأة بالزغب . اجنتيها متوسطة القد ، ذلفة . اذنابها قصيرة . ارباش افنتيها الجانبية مقوكة الشكل متناحية في الفتة والرسية || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

Paradisea rubra (S). طائر الفردوس الاحمر
Paradiser rouge (F).



طاووس صيني



طاووس عادي



طاير الفردوس



طابج

١٧٠٢٥ - مَطْرَحِي

Gutta-Percha
مادة حليبية تستخرج من بعض اشجار الفصيلة السبوتية . تستعمل كأداة عازلة في غنظ الهنداعات لأنها لا تنقل الكهرباء ولا تقوب بالجليد أما تلويب بالكولورومز ولفور الكبريت والبنزين .



مطاب

١٧٠٢٦ - مَطْرُودَة

هو الأبلوج ، الحلبه .

١٧٠٢٧ - مَطْرُودَن

Pain de sucre (F). Sugar-loaf (E).
هو السكر الأبيض المألوف ويصنع البلررز والبلرزل .

١٧٠٢٨ - مَطْرُوسَة مُسْتَحَبَّة ٥

Tetragnatha fufiva (S). Tetragnatha agréable (F).
دورية من العناكب الساعية القائمة من ثنائيات الروايا سداسيات المشانق وفضيلة الشياحات . موطنها معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم . جسمها شبه مدني الشكل يطول عند العنكب نحو ١٨ مم . وعد العنكب نحو ٣٠ م . صدورها يلسي الشكل اسير اللون . صياحها مركبتان زحمتان . شيفها دقيقان ذريان . فكها محبتان . جرائنها مستطيلة ، نشطة ، مسننة الاطراف . فوجا الى الصخرة الجميلة يطويها تقارون قائمة في قوتها الحشرات اغصنها الذباب والحمام .



مطر

١٧٠٢٩ - مَطْرِيَّات ٥

Cyprinidae (S). Cyprinidae (E).
فضيلة حيوانات بحرية من الرغويات سفيفيات الحياشم والابريل . اجنتها وانواعها المروفة كثيرة العدد . متشربتها تظهر في الطبقة البلطيرية . انواعها اصفاء متشرة في معظم بحار العالم . اصداها سميكة الاصفاة متباينة الاشكال والاحجام . تتميز بنحاشها الانسارسية ، ذئد ، عظامها الطويلة ، القصيرة وباربها المستطيلة القعدة الصفحات السفلى . اعرف انواعها واشهرها البلرية والوطيب والبريت .



مطروسة مستحبة

١٧٠٣٠ - مَطْرِيَّة ٥

Cyprine (S). Cyprine (F). Cyprina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات سفيفيات الحياشم والابريل من فصيلة الطيريات . انواعها المروفة حديثة اصطلها مصبات انهر المناطق الشمالية . اصداها شبه غروبية الشكل خمسية الاطراف او سباعية ، سميكة الصفحة المشقة ، مائلة الحمار . خيرا الزن غالبا . تعيش بين الرمال والحصى . لحمها كاعنة المصفت .



مطرية

١٧٠٣١ - مَطْرُز

هو الفالاج ، الجبل ذو السنانين ، الحلبه .

١٧٠٣٢ - مَطْسُون

هو اللسان السوي ، الحلبه .

١٧٠٣٣ - مَطْبَاب ٥

Megacephale (S). Mégacéphale (F).
جنس طير من فصيلة الشبانيات . انواعه قليلة تتميز باختلاف اجسامها . رؤوسها صلع تعلوها خوذ قلبية الشكل . اذنانها كبيرة القند . طاهر انوارها الى السمرة الشايقة يطويها موج زيرتي . ياطن الثوباء ويطيرها وانفاها الى السمرة الوردية . اجنتها مستديرة الشكل ، مستوية الحجم . اذنانها صغيرة فرقة . ارسلها قوية لونها الى البسود . تألفت الاجرالح القترية من الشولقي . تعيش



مطباب

١٧٠١٦ - مَطْبَارَة ، مَيْسَة شَتَوِيَة (F).
ثمرة الطبار وهي متوسطة الصنف كبيرة القند غلا الكن . والطبار غريب من التين الكشوي يعيش في البلاد المعتدلة الحارة .

١٧٠١٧ - مَطْبَاشِير

Craie (F). Chalk (E).
حجارة جيرية ناعمة البيضاء ، قليلة الصلابة ، حثية الأثر ، مسكونة من ذرات الجير تخالطها بقايا عارية صلبة صوطا مرور الزين بالضغط والترتيب . اما اصابع الطباشير التي تستعمل في الكتابة حل اللوح السدي فهي مزيج مركب من الجير مع كربونات الكلسيوم او كربونات الكلسيوم .

١٧٠١٨ - مَطْبَاشِيرِي

Crétacé (F). Cretaceous, Chalky (E).
نمت تعريفه يطلق على الحقبة الثالثة من الاباح الاوسط اي الثاني . وبذلك التسمير الطباشيري والاراضي الطباشيرية . تتميز هذه الحقبة بتطور انصاع القشرة الارضية وانقسامها الى بعض القارات . وبخاصة استيلا المناطق المناعية ، وبكثرة انتشار الرغويات وسبا سديات الابريل ومزدوجيات المسامير ، وبالتشعار الزخامات الكبيرة والجلابة وتطور الثدييات الصغيرة القدرية شبه بالثدييات الحالية .

١٧٠١٩ - مَطْبَاق ٥ ، مَطْيُون ، زَكْسَن دَبِي

Infus viscosus (S). Aunée visqueuse, Inule visqueuse, Conyze visqueux (F). Rock fles-bane (E). Alpenfloukraut (D). Enula viscosus (I).
نوع من الراس وهو نبات عشبي بري مسر من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . ساقه فراء ، زياء الحاء ، تلور من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقه صغيرة القند ، احليجية ، ذئد . اصلها انضبط البشرة الخريبة لم صفحية . وكه جاء عنه في السان : « الطبايق شجر منابه جبال مكة كثير المنافع » .

١٧٠٢٠ - مَطْبَاق البراغيث هو البرنزوف ، الحلبه .

١٧٠٢١ - مَطْبَب

Disque solaire (F). Solar discus (E).
شعاع الشمس وهي القرانق التي ترى فيها عت طلوبها .

١٧٠٢٢ - مَطْبَعَة

كل قلمة من الارض مستطيلة الشكل ، خيفة العرض كثر لبانها او قل تدعى طبعة .

١٧٠٢٣ - مَطْر ٥ ، عُنْدُرْمَة ٥

Ganoderma
فطر من السيات يركب الجلعق اليابسة في السديان والحار والاكابيا واذا والينق فيسب انفلاتها الطولي ثم عليها وانقيامها البقي . شبيه ابيض اللون كثيف الحيز . فطر طلي الشكل ، تشج السطح ، جل الاطار ، نام البشرة الزياء الحلية للفس ، لونه اصعب اغبر ، يمتد عند منخض خط الاطار . اما الاطار فاغبر والصمعة السفل بنية . لباه قرني اللون ، جامد الحظ ، نقي التركيب . سماكه من ١ الى ٣ سم . يورثاته قمية الشكل طولا نحو ٨ ميكرون وقطر ناعمتها ٥ ميكرون .

١٧٠٢٤ - مَطْر ٥

Pisetre (F). Plaster (E).

Tétine, Tétin (F). **طَبِيْءٌ - طَبِيْءٌ** ١٧٠٤٥

Teat, Nipple (E). حلمات الضرع التي من تحت وتلف وحافر واسع وأكثر ما يكون الطبي السباح ج الماء .

١٧٠٤٦ - **طَبِيْءُ الْكَلْبَةِ** هو الخلاف القوي الورق ، اطيه .

١٧٠٤٧ - **طَبِيْبٌ بَطْنِيٌّ** Vétérinaire, Médecin vétérinaire (F). Veterinary, Veterinary surgeon (E). هو الطبيب المختص بعلاج الحيوان .

١٧٠٤٨ - **طَبِيْحًا** هي الجبوسا ، اطلبا .

Gasteropelecus (S). ١٧٠٤٩ - **طَبِيْرَةٌ** Gastéropélaque (F).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفضيلة السلموينات ، انواعها المعروفة قليلة العدد مملوئة عند مصبات الانهر || اجسامها صغيرة ، مبططة ، طرية الشكل ، تقوّل من ٥ الى ٦ سم . رؤوسها واعظامها متوسطة الحجم . اشتدّها شبه حويصلة الانفراج . زعانفها الظهرية خلفية الا ان كان صغيرة . الصدرية جناحية الشكل . الحوضية شديدة الصغر . الشرجية مستطيلة والذيلية فائقة . جميعها تتميز بطبونها النصف دائرية الشكل . الالوان الى الخضار الغني المالح .

١٧٠٥٠ - **طَبِيْحٌ** هو لب الطلعة .

١٧٠٥١ - **طَبِيْعَةٌ** Nature

١٧٠٥٢ - **طَبِيْعِيٌّ ، مَادِّي** Physique, Matériel, Naturel (F). Physique, Material, Natural (E).

١٧٠٥٣ - **طَبِيْقٌ** Coronula (F). جنس صيولات بحرية من القشريات اصفاها طبقة الشكل ، مسننة الاضلاع ، صغيرة القد تعيش على غطاء اجناس الحيتان .

١٧٠٥٤ - **طَبِيْقٌ** Hymenocallis (S). Hyménocallide (F). Hymenocallis (E).

جنس نباتات عشبية دوفية من فصيلة التريسيات . موطنها بعض اقاليم امريكا الجنوبية . اوراقها اهليجية الشكل . ازهارها عطرية المرف ، صيرالية التجميع ، قواعده يحيط استبدان مستعرضة مندغة قديمة الشكل || تزور كثرتين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترطب في الازرة القليلة الاندماج المنسوبة التركيب . المنصري الزائرة المواد الغذائية || انواعها قليلة العدد ، اشهرها الثلاثة التالية .

١٧٠٥٥ - **طَبِيْقٌ أَهْيَفُ** Hymenocallis speciosa (S). Hyménocallide élégante (F).

نوع من الطيب . عشبة دوفية صبروتية . شراغها ثنائي الصلوع الزوازية ، يرتفع من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراقها اهليجية مستطيلة ، نصلها جيل الخضار الزاهي . ازهارها صيرالي التجميع . ازهارها بيضاء اللون ، كبيرة القد ، تقوّل نحو ١٠ سم . تاجها اي قدسها سداسي الشكل المندمعة المحلّاء الخضار || تنموها خريفي .

ذكرنا وانثى كالحمام . اسرابها تعد من ٧ الى ١٥ زوجاً . قوتها الجيوب على استغلتها . انثاها تبيض في الفصوص كبير القد تقوّل براوح بين ١٢٠ و ١٥٠ سم . وعقد من ٣٠ الى ٦٠ سم . تنفخه مع ذكورها ورفيقاتها من السرب الواسد في دمال الشاطئ على حدود مرسى المد . وهي لا تحسن بيضها بل تقسه في الاقصوص وتطليه بطبقة من الرمل ساجتها نحو ٢ سم . يفتق بعد اسبوعين . وهي تبيض في مومها من ٨ الى ١٠ بيضات تضعها بالتتابع حيث ينقضي بين الواحدة والي ثلثها من ١٢ الى ١٤ يوماً . والبيضة كبيرة القد مستطيلة الشكل تبدو عند وضعها قريديلة اللون ثم تتحول الى الصفرة وتستقر على البياض . الفرغ يفتق كلياً فثقباً مستديراً عن حفانة انه التي يجعلها ولا تعرفه .

١٧٠٣٤ - **طَبْعَانٌ** Argile grasse (F). Clay, Greasy, Rich (E).

١٧٠٣٥ - **طَبِيْقٌ** Vertèbre animale (F). Animal vertebre (E). تقار القنبر عند الحيوان .

١٧٠٣٦ - **طَبِيْقٌ ، كَتَبٌ ، أَبُو طَبِيْقٌ ، أَبُو قُرْصٌ** Holacanthus (S). Holacanth (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة السلطيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ مؤنثا بجار البلاد الحارة . جميعها صغيرة القد مغططة مستدرة طويلاً براوح بين ١٥ و ٢٠ سم . انثاها زاهية الالوان الجميلة المحملة بالاصفر والبرتقالي والوردي .

١٧٠٣٧ - **طَبَقَةٌ** Scras, Stratum, Couché (F). Stratum (E).

١٧٠٣٨ - **طَبَقَةٌ** Superordre (F). Superorder (E). باب في تصنيف الاسباب يأتي بعد الشبة وقبل الرتبة .

١٧٠٣٩ - **طَبَقَةٌ مَوْلَدَةٌ** هي القلب اي الكيسوم ، اطلبا .

١٧٠٤٠ - **طَبَقَةٌ** Tympan (F). هي الصمغاء ، راجع اذن .

١٧٠٤١ - **طَبَقَةُ الْأَذُن** Tambour de l'oreille (F). Ear drum (E). راجع اذن .

١٧٠٤٢ - **طَبَقِيٌّ** Tympanique (F). Tympanic (E). تمت تعريفه يطلق على كل ما له علاقة بطبلة الاذن .

١٧٠٤٣ - **طَبْنٌ ، طَبْنٌ** Pître de charogne (F). Food of carrion (E).

الجيفة توضع فيصاد عليها السور والسباع .

١٧٠٤٤ - **طَبْرُوعٌ ، قَمَلُ الْعَاةِ** Phitirus pubis (S). Morpion, Pou du pubis (F). Crab-louse (E).

نوع من القترصيات صغير الجسم مستعرض الشكل طوله براوح بين ملبرم وارزمة خطوط وعلبرم وسمكة خطوط . ارجله دقيقة ، ارساغه ثنتيني بمفاصل خادشة حادة . يعيش بين الشعر الخشن كشر المانة والايط والحاجب .



طَبِيْقٌ



طَبِيْعٌ



طَبِيْعٌ



طَبِيْقٌ

١٧٠٥٦ - طليق كبير الناج *

Hymenocallis calathina (S).
Hyménocallide à grande couronne (F).

نوع من الطليق، عشبة دوفضية سريرية. شرانها ثنائي الصلوع المزوانية يدلو من ٤٥ إلى ٨٠ سم. اوراقها قلبية الشكل، مستطيلة الطرف لذلك، طول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. وتعرض من ٤ إلى ٥ سم. ازهارها سيولي التجميع. ازهارها بيضاء اللون، كبيرة القذ طول من ١٥ إلى ٢٠ سم. تاجها اي قدما سداسي الشكل للندغة الباحة الخضار للثوريما يستمر من حزيران الى تموز.

١٧٠٥٧ - طليق متناجر *

Hymenocallis undulata (S).
Hyménocallide ondulée (F).

نوع من الطليق، عشبة دوفضية سريرية. شرانها عديم التضلع يرتفع نحو ٦٠ سم. اوراقها سنانية الشكل، رقيقة التصل المجزج، طول نحو ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٢ سم. ازهارها سيولي التجميع. ازهارها عابجة اللون، كبيرة القذ، طول من ١٥ إلى ١٨ سم. تاجها سداسي الشكل للندغة، زيتي اللون للثوريما ديمي او غريفي.

١٧٠٥٨ - طليق *

Cryptocera (F).
Cryptoceros (E).

نمت تعريفه يطلق على كل حشرة غطية الزباني.

١٧٠٥٩ - طشرة البطاطا *

Lygus solani (S).
حشرة من الطيريات صغيرة القذ طولها نحو ٦ م. ثوبا الى الخضرة. اطرافها صفراء اللون تتميز بكسيتها النظيف الغصم ورأسها الكبير المستعرض للتركيب اوراق البطاطا فتؤذيها.

١٧٠٦٠ - طشرة الزرع *

Blissus leucopertus (S).
حشرة من الطيريات صغيرة القذ طولها نحو ٥ م. ثوبا الى البصرة المايقة. جدرانها مستطيلتان متركستان وينشطان. ارجلها صفراء. ريقها تبدو صفراء اللون عند التفتت ثم تنصرف الى الخضرة ويزداد ازهارها بعد كل انشاج الى ان يستقر على المجزوة للتركيب الحطة والشعير والشيلم والشوفان والذعن والذرة والارز.

١٧٠٦١ - طشرة السنديان *

Lygaeus aequalis (S). *Lygée aequalis* (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الطيريات ورتبة غطيات الاجنة جسمها مبطل الجرم يطول نحو ١٢ م. رأسها احر اللون، اسود اطليق للمثل الطول. عنابها صفيرتان، انشافرتان. زياتها مستطيلتان، اسودتان. كسيتها احر اللون، اسود القسم الذي يتنام الرأس، بلتها وسدبا الى الخضرة، سيجتها مزوانية، اسودا. طولها احر المضاف، اسود الطرف واليتيج ويدلو من طرفه الاسود تجليج ايض وتفتيق. قشراتها شفاف. قوائمها الى البصرة للثوريما السنديان.

١٧٠٦٢ - طشرة الفطن *

Oxyarenus hyalinipennis (S).

حشرة من الطيريات صغيرة القذ طولها نحو ٥ م. ثوبا الى البصرة السوداء. جدرانها بلن كفضة الالامه للتركيب براعم البطن الزرية وتقع بها اشد الاذى.

١٧٠٦٣ - طشرة الكرمة *

Pyrrhocoris apterus (S). *Punaise tête de mort*, *Diabie* (F).

حشرة من الطيريات صغيرة القذ طولها نحو ٦ م. ثوبا ابيض اللون. اجنتها قصيرة. جدرانها جعقة للتركيب برام الكرمة فتؤذيها.

١٧٠٦٤ - طشرة *

Fourmis (F). *Anta* (E).

هو النسل واجنته طرية.

١٧٠٦٥ - طشريات * و ليغيات *

Lygaeidae (S). *Lygaeidae* (F). *Lygaeidae*, *Chinch bugs* (E). *Lang wazzen* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غطيات الاجنة. اجنتها وانواعها كثيرة العدد جميعها خاضعة او شائعة، صغيرة القذ او متوسطة. تتميز بطولها من عند فروز السوائل الكرمية الرائحة. عويناتها جانبية. قرونها الاستشعارية مستطيلة، مقوسة، لثائية المفصل. ارجلها لثائية المغل. مجاديفها خالية العروق القاطية الطولية.

١٧٠٦٦ - طشبة *

هشرة تسمر نحو القامة مشوكة من اسفلها الى اعلاها شوكها غالب لونها ورجلها صفراء ولها ثوريمة بيضاء يحرمها للتسل. ج طي (اللسان).

١٧٠٦٧ - طشكارا *

Etudes des nuages (F).

هي الايلان درس تكوين السحب وتحركتها.

١٧٠٦٨ - طشكاف، طشكاف، طشكاف *

Cirrus
غريب من النجوم وهو يتجلب مرتفع ريق ترى السماء من خلاله.

١٧٠٦٩ - طشكاف مركطة *

Tropiderus sepicola (S). *Tropidère moucheé* (F). *Tropiderus sepicola* (E).

حشرة خاضعة غاشية دامت من فصيلة القاطريات ورتبة مفصلات الاجنة. تألف اجراج السنديان. غشاشها تمش على الارواق. يرقاتها تمش على الجملع والاضبان اليابسة فتسربها بالقطول والعرض. جسمها صغير القذ يطول من ٤ الى ٥ م. ثوبا الى السوداء القسي الالاصب الموج يطول اطول وبعض التوزيع الكستانية. رأسها مستد الجرم، غشاشها متكي منق الطرف. متناها صغيرتان. زياتها صفيرتان. طولها مستد الموتر اللانث. جدرانها شديدة الصلابة، كسيتها الخمل. ارجلها لثائية المغل للجليل واحد الى الحيل. تظهر الحشرة الجملعة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز. تسرح في التبار. تساهد بعد ظهورها بنس اربعة اسابيع تمتع المكان في شفق الاغصان اليابسة او تحت قشورها للثيرة عند بلوغها الكمال الجسموي طول نحو ٨ م. جسمها مستطيل الرأس والمقد، سداسي الارجاج الصغيرة. ثوبا الى التني الاصفر المالج. رأسها اسود. تكاها غليمان ذويان للطور الكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي في السرداب الريقي ضمن غشاء خزيل.

١٧٠٧٠ - طشكال *

Rate (F). *Spleen* (E).
ضوء ياتي في الجسم يربط في تجويف البطن تحت الحجاب الحاجز. وظيفته التفاع من الدم عند الكبرويرات لذلك فهو يمتزج الكثير من كريات الدم احمر ويحتلها من الحاجة اليها. ج بطل والطحلة وطحالات.



طشة البطاطا



طشة الزرع



طشة التسل



طشة الكرمة



طشكاف مركطة

* ١٧٠٨٠ - طحروب السنديان *

Pleurotus dryinus (S). *Pleurote du chêne* (F).
نوع من الطحروب . يعيش على جذوع السنديان وأغصانه .
جميعه شبيهة العدد الذي يتألف من وحدتين أو أربع
وحدات . ساقه شديدة القصر . نكتة مفروطة ، متحدة
الحجم ، مكثورة الأطراف ، مزينة السطح ، لونها إلى
الحملة الصفراء المروج يملؤها تنبتش اسمر . اطراسها إلى
الصفرة السمره المروج || لحيته كاعثة الصنف ، غير
مرغوب فيها .

* ١٧٠٨١ - طحروب صخاري *

Pleurotus ostreatus (S). *Pleurote en huître* (F).
نوع من الطحروب يعيش على جلود الصنوبريات .
جميعه تعد من ٦ إلى ١٢ وحدة . ساقه قصيرة شبيهة
اللون . نكتة عارية الشكل لونها إلى الكهية السمره ،
اطراسها إلى اليلكي المايق || لحيته مأكولة ، لذيلة
العلم .

Nuage (F). * ١٧٠٨٢ - طحروب ، طحروب
Cloud (E).
الطحروب والطرورة : السحاب . والطحارب قطع
السحاب المتفرقة .

Muscleale (F). * ١٧٠٨٣ - طحلب
Muscolous (E).
نمت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على النباتات
الطحلية .

* ١٧٠٨٤ - طحلب ، طحلب ، طحلب

Mousse (F). *Moss* (E).
اسم شامل يطلق على مختلف النباتات الطحلية دون تمييز
رتبة أو فصيلة أو جنس . والطحلب من النباتات الماددة
الانزهار والجلود الحقيقية تلتصق الغذاء بمراش غبيلة
تثبتها في التربة وعلى الشجر والصخور .

Mousse (F). * ١٧٠٨٥ - طحلب السمك
مرض سار يفتك بأشكال المياه العذبة . مظهره الخارجي
نواص غلي التجصع ، قلبي اللون يملأ أجسام السمك .
سببه نظر مجهرى ينحى سرولوجية (*Saprolognia*)
يعيش في المياه الملوثة القذرة .

Sphagne (F). * ١٧٠٨٦ - طحلب المتناقع
هو الصمبل ، اطلبه .

Bryophytes, Muscinées (F). * ١٧٠٨٧ - طحلبيات
Bryophytes, Muscins (E).
قسم من المملكة النباتية يتميز بخلو نباتاته من الجلود
والانزهار . اجنسه وانواعه كثيرة العدد جميعها ثنائي
فصائل تنتمي إلى أربع رتب وصفين .

* ١٧٠٨٨ - طحباء
هي الشوكران ، اطلبه .

Mouture (F). *Grinding* (E). * ١٧٠٨٩ - طحن
جبل البر وسائر الحبوب دقيقاً .

Olivella (S). * ١٧٠٩٠ - طحيرب
Olivelle (F). *Olivella* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مبهيات الازبل
وفصيلة الطحيريات . انواعه الماصرة المروقة نحو ٣٠

* ١٧٠٧١ - طحالب

Mousses (F). *Moss* (E).
صنف من قسم الطحليات انواعه واجنسه عديدة جميعها
اربع فصائل تنتمي إلى مرتبتين : السبقيات والسفجات .
اما فصائلها فهي : الرويكيات والسفجات والثرنيثيات
والصرغيات .

* ١٧٠٧٢ - طحلي
Splénique (F). *Splanic* (E).
نمت تعريفي يطلق على ما له علاقة بالطحال .

* ١٧٠٧٣ - طحان
Meunier (F). *Miller* (E).
هو من تاعلى هيئة الطحن من صانع الطحين وبائه .

* ١٧٠٧٤ - طحانة
Meunerie (F). *Miller's crade* (E).
سرة الطحان وهي صناعة تحويل الحبوب دقيقاً .

* ١٧٠٧٥ - طحروب
Olivancillaria (S).
Olivancillaire (F). *Olivancillaria* (E).
جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مبهيات
الازبل وفصيلة الطحيريات . انواعه الماصرة المروقة
عديدة موطنها بدار امريكية الجنوبية || اصداها شبيهة
باصدا الطحرب الا انها ازلق منها ويواشها مقوسة
الشكل . صفحاتها ناعمة ، جميلة الالوان والزخرفة .

* ١٧٠٧٦ - طحروب
Olive, Dactylus (S).
Olive (F).
الواحدة طحربة . جنس حيوانات بحرية من الرخويات
مبهيات الازبل وفصيلة الطحيريات . انواعه المروقة نحو
٦٠ جميعها مفترسة . موطنها بدار البلاد الحارة . تعيش
على السطوح الرملية الممطرة || اصداها مألوفة شبيهة زيتونية
الشكل . متوسطة الحجم ، جميلة الالوان والزخرفة . بعض
انواعها يفرز مادة صناعية لونها وركيبها كالزبدون ||
اثير انواعه واكثرها قدا وايضا ارجوانيا الطحرب الزرق
(*Dactylus utriculus*) لونه إلى الشفحة الزخرفة
بالكهية . موطنه المحيط الهندي .

* ١٧٠٧٧ - طحيريات
Olividae (S).
Olividae, Dactylidae (F). *Olividae* (E).
فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مبهيات
الازبل . اجناسها وانواعها الماصرة المروقة عديدة موطنها
بدار البلاد الحارة || اصداها شبيهة املحلية ، زيتونية
الشلون ، متقاربة الاجسام ، جميلة الالوان . مستطيلة
كتنواص الضيقة الناعمة . ارجلها كبيرة ، ثنائية القلق ||
اعرف اجناسها واشهرها الطحرب والطحيرب والطحارب
والرولوب والمالعة .

* ١٧٠٧٨ - طحيرة
Tégument (F). *Tegument* (E).
للشاة الناعم الذي ينفذ القوة والبركة وما اشبه .

* ١٧٠٧٩ - طحروب
Pleurotus (S). *Pleurote* (F).
جنس طحروب كاملة التركيب من فصيلة الفاروقيات.
انواعه المروقة قليلة العدد اصلاها غابات وسراج جبال
المناطق المعتدلة الحارة . تعيش على جذوع الاشجار
واغصانها دون أن تفرقها . تتميز بساقها القصيرة وبكاعها
القسمية الشكل || اعرف انواعها واشهرها الطحروب الحاروي
وطحروب السنديان .



طحرب



طحرب السنديان



طحرب بحاري



طحرب

المروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مجار العالم || مستتراتها نادر كمنقذ ملوثة قطنية الخشب تلام في اللاه توجهها ملاسها المديدة وما ينشأ لها من الياث راشية مستطيلة عجيبة الاطراف .

١٧١٠٤ - طرزيات *
Phosphoridae (F).
Phosphorides (F). Phosphorides (E).

فصيلة من الضفائيات المنقبذات البحرية . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم مجار العالم || اشهر اجناسها الطرزة .

Type ١٧١٠٥ - طرلك

١٧١٠٦ - طرلك برنقالي *
Rupicola crocea (S).
Rupicola orangé (F).

طائر من فصيلة الطرزيات . موطنه بعض المناطق الجبلية من اليونان والبرازيل . تألف المراتق الصخرية والاراضي الوعرة باستثناء فصل الشتاء حيث ياتي الى الغابات . سره يند بعض المئات || جسمه مكروم الشكل يطول نحو ٣٠ سم . عنه الذكر نحو ٢٧ سم . عنه الانثى . ثوب الذكر الى الصفار البرتقالي . حمار قزخته الى الابيض المائل . لوانس قوامه وياهره الى الجوزة . وقال ذنبه جزئية اللون صفراء الاطراف . حقة عنه برقالية اللون . منقذه وساقه الى الصفار المائل . ثوب الانثى الى الصفار المائل . طوله مائة حمار في حماره الى الازرق واللب || طيرانه خفيف الحركة سريعها طويل النطو . قوته التار المختلفة والقدور || يشبه وكسه في مخالب الصفور . عمل طريقة السنور . بالثمن المزوج بالالياف النباتية . الانثى تحضن ثلاث مرات في الحمار . حفتها تتألف من بيضتين . الترخيم يمتد نحو اسبوعين تقوم به الانثى بيتا الذكر يزين لها الشتاء .

١٧١٠٧ - طرزيات *
Rupicolidae (S).
Rupicolidae (E).

فصيلة طير من الجوزم سنيت المناظر . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى اعصها اليونان . تألف البير والواقع الصخرية التي لا تبتد كثيرا عن شلالات اللاه || اجسامها حيلة مكرومة مستطيلة الاجنحة قصيرة الاذنان والارواح . صفيرة المنقبذ . كبيرة القنارح التي تمتد من المناش الى الانفية . القواها تختلف مع الترخ واثق || نظامها الحياتي جماعي . اسرارها تد بعض المئات . قوتها التار والبلور || اعرف انواعها واشهرها الطرلك البرتقالي .

١٧١٠٨ - طرقة البع *
Terapha hyocinai (S).
Punat des Jusquames (F).

حشرة غاشلة من فصيلة الكوربيات وردية خضفلات الاجنحة . جسمها ميجر الملب ، متعل التبطيط ، يطول نحو ١٠ سم . رأسها مستطيل ، محرم . عظمها متعل الملب . عينها صغرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلان || ثوبها الى الحمرة الصفراء المواج يعلاها تيج اسدي في الكول والحيفة وسنجي القلوان . طراناها اريد اللون . قنارها شفاف . يطا الى الحمرة يطولها تيج اسدي . قواها متكافئة الملب || تركب العديد من النبات واعصها الباذنجانيات ومنها البع .

موطنها مجار البلاد الحارة || اصداها مائة ثامة زيرينة الشوزن ، صفيرة اللحم ، حيلة الايلان الزلمية || منه انواع تنفخ فوق سطح اللاه وذلك بواسطة اربيلها المغلقة المسكن نفخها .

١٧٠٩١ - طحين
Farine (F). Flour (E).
هو التيق ، مسروق تلم يحصل من طمن حبوب القمح والذرة الصفراء وغيرها من الحبوب .

١٧٠٩٢ - طخاف
Cirrus (S).

ويدهى الطخاف ، صباب مرتفع رقيق .

١٧٠٩٣ - طخزور *
Nimbostratus (S).
هو الطاخز غرب من التيوم ، اطلبه .

١٧٠٩٤ - طخزور *
Languria (S).
Langurie (F). Langurie (E).

جنس مشرات من غديات الاجنحة ديوسيات القرن ونصفية الطرزيات . انواعها المروفة نحو ٧٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها صفيرة ، صيغة الشكل ، تطول من ٨ الى ١٠ م . رؤوسها محرمة . عيونها ناذرة . قنوتها الاستعمارية خيطية ، ديوسية الاطراف . كولها شبه مكورة . بطونها اسطوانية . الخادها صيقة ، لاحقة . قواها دقيقة . اقواها ثمانية اللون ، يكثر فيها الاحمر والبرتقالي . الخادها زرقاء او خضراء او كستنية او صفراء مدهمة المواج || معظم انواعها يعيش على التطور والبعض الآخر تحت قشور النبات النازل . رقاتها دامت .

١٧٠٩٥ - طخفكاه
الانان السوداء الاث .

١٧٠٩٦ - طخمكة
Troupeau de chèvres (F).
Flock of goats (E).

طبع المز .
١٧٠٩٧ - طخميل
Coeq (F). Cock (E).

هو التيك المزر .
١٧٠٩٨ - طخم
Takang (F).

حيوان لبون عايب مجز . يدهى طاكاه ، اطلبه .
١٧٠٩٩ - طر
Duvet (F). Down (E).

الطر : ما طلع من الور بعد التسول . وطر النبات : رطل او كبح .
١٧١٠٠ - طرخور
هو الاسقمري . نوع من السمك ، اطلبه .

١٧١٠١ - طرخور شائع
Maquerasu commun (F).

سمكة بحرية تدعى اسقمري معروف ، اطلبه .

١٧١٠٢ - طرخور كليسي
Maquerasu colias (F).

سمكة بحرية تدعى اسقمري كليسي ، اطلبه .

١٧١٠٣ - طرقة *
Phosphora (S).
Phosphore (F). Phosphore (E).

جنس عضاء من المشيات وفصيلة الطرزيات . انواعها



طخزور



طرزة



طرز برنقالي

١٧١١٨ - طرؤث *

Balanothorus (S).

Balanothorus (F).

جنس نباتات لحمية فطرية الشكل معمرة من فصيلة الطروثيات. أنواعها المشهورة ثلاثة تصقل على جلود مختلف الأشجار. سيقانها صفراء صفراء القدر غليظة الجسم. أوراقها شريفة متراكبة. أزهارها صفراء أو بيضاء أو حمراء. عصارها أعاليه شمية التركيب شائعة الاستعمال.

١٧١١٩ - طرؤث * ، مصرور ، زب الأرض ،

إبر الحقيقش ، إبر الذئب

Cynomorium coccineum (S). Cynomoir. Cynomorium écarlate, Champignon de Malte (F). Maltese mushroom, Scarlet synomorium (E). Malteser Pilz, Schwammvon Malta (D). Fungo di Malta (I).

نبات طفيل يسيد الجلس والنوع من سبط المصرورات. فضيلة الطروثيات. منته حوض البسر المتحط. أعاليه مأكولة قابضة وهو لا ينمو من بعض الحواش الطبية الصالحة للمقوية الثابتة ، كما يستعمل لقطع الزحف .

١٧١٢٠ - طرؤث أحمر * ، هالوك شرقي

Phelypea coccinea (S). Phélpée écarlate, Clandestine du Levant (F). Red showy broom rape (E). Clandestino di Levante (I).

نبات طفيل من فصيلة الجفليات ينمو في بعض مناطق الشرق الأدنى. لحميه بنفسجي اللون ، أزهاره أرجوانية ، حمر المراج . وهو شديد البقع والضرر ، يؤذي النباتات التي يركبها .

١٧١٢١ - طرؤث حلو

هو الأمازيغي المروي ، الحليه .

١٧١٢٢ - طرؤث مصري * ، هالوك ريجيني

Phelypea aegyptiaca (S). Phélpée d'Egypte (F). Sweet scented broom rape (E). Nalkensommerwurz (D). Succicamele piccolo (I).

نبات طفيل من فصيلة الجفليات يركب أكثر الأزروع السيفية ويوقع بها اشد الأذى .

١٧١٢٣ - طروثيات

Balanothoraceae (S).

Balanothoraceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات المثلثين. أجناسها وأزهارها عديدة تتميز بطلاقة سيقانها اللحمية . أوراقها شريفة متراكبة . أزهارها وردية أو ثنائية المسكن ، صغيرة القدر ، هامة الأركان ، قرصية التجميع ، لينة ، متتامة .

١٧١٢٤ - طرح

Soustraction (F), Subtraction (E).

Régime de banane (F).

Bunch, Stem (E).

هو القوط يتألف من عدة أشواط متتامة ترتكز على شخاخ لوني التركيب ، متين الحيك ، غزير العصاره اللدنية .

١٧١٢٦ - طرح في المؤايدة

Mise aux enchères (F). Bidding (E).

هو طرح مالي مقبول أو ثابت للبيع بطريق المزاد المالي ليشتره من يعرض أجل من فيه .

١٧١٢٧ - طرؤث

Corrupt water (E).

هو الماء الأجن .

١٧١٢٨ - طرح ، طرؤث

Puisard (F). Cesspool (E).

شبه حوض كبير عند خرج القناة يجمع فيه الماء .

١٧١٠٩ - طرائق الإستعداد

Méthodes de reproduction (F). Methods of reproduction (E).

طرائق الاستعداد في الحيوانات الدوابن تأتي بالنسبة إلى البداية المتوخاة على حدة الشكال : الاستعداد والتجهيز والانتقال والتخليط والانتخاب . وإيجها في مواضعها .

١٧١١٠ - طرؤب

Tourbe (F). Peat (E).

هو التراب ، الحليه .

١٧١١١ - طرؤب

Tourbière (F).

Peat-bog, Peat-moss (E).

هي التراب ، الحليه .

١٧١١٢ - طرؤب مطوحي * ، دوسة القصب

المطوكة

Cynchrus schenidus, Embertia schenidus (S).

Cynchrus schenidus, Bruant des roseaux (F).

Dalmatian Reed Bunting (E).

طائر من الدوس وفضيلة كشروريات . موطنه أروبة الجنوبية ويقع في الشتاء نحو قبرص ولبنان وفلسطين وسيناء ومصر . يتميز من الضواري التي تقف في لبنان من شهر إلى أربعة أشهر . جسمه ريع القامة ينمو نحو ١٥ سم . وتبلغ مسطته نحو ١٨ سم . تربيته إلى الطحلة البلية يعلوها توضيح كسفي . رأسه وذوؤه إلى السرة . ويمتد من قاعدتي الشندين خضان أبيضان فاصلان بين أحسرين والقرور ثم يتصلان بقلادة بيضاء تطوق الرأس . ويعلو الرداء والقنار والسرير خطوط كسفية يتخللها الأسود . ذنبه مستدل القدر ، فارق الطرف . صدره ويطة إلى القنرة البيضاء . أبطاء وموئاج بالني . حلقه عنه كسفية . منقاده سبوردي اللون . الأني أصفر قدام من الذكر وشرها قريب الشبه بظهره . يبالغ المنطق والأجام وضغاف مجاري للماء . يذبح عنه على الأرض بين الأشجار الكسفية . الأني تحضن مرة واحدة في العام . حشيتها تراوح من ٤ إلى ٦ بيضات ترطبها بمتانوة الذكر من ١٣ إلى ١٤ بيضا . يبيض من الصفائر النافضة القليلة الأذى .

١٧١١٣ - طرؤب

Equus asaticus (S).

Tayrun (F).

ضرب من الخيل موطنه فياني آسيا الشمالية . علماء الحيوان لا تتعرف بالطرؤب كنوع مستقل بل تقبل أنه ضرب من الخيل توحش بعد أن كان داجيا . جسمه أصغر من جسم الفرس العربي . ثوبه كسفي اللون يمتد في الشتاء ويرفع في الربيع والصيف . يتميز بالصلاب والشاط . وبطلاقة الرأس وبأساطلة النق الأضلع القصير العرف . ويصغر الحافر وبزواة شمر الذنب الذي يمتد حتى لوأخر الظهر .

١٧١١٤ - طرؤث العرؤب هو لابل الحقل ، الحليه .

١٧١١٥ - طرؤث

الطرية هي القطة الوحيدة .

١٧١١٦ - طرؤث

Bord (F). Edge, Margin (E).

طرؤ كل شيء : حرفة . وطرة الورقة حرفة أو حنايا . ج طرد وطرد وطرات وطراط .

١٧١١٧ - طرؤث

Huppe (F). Crest, Tufted (E).

شكل من اشكال القنطرة .



طرؤب مطوحي



طرؤب



طرؤث



طرؤث



طرؤث أحمر



طرؤث مصري



طرخون



طردوس



طرب



طرستوج اسمر



طرستوج دلي



طرستوج صهري

البايات . ملجته الحياقي زويي . سرسه دجوي . قوته الخشرات والذباب والبار وريق الانذار يرتفعه بلسانه الصيق المالح || جسمه صغير اقصد بطول نحو ١٨ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٠ سم . رأسه مخروطي الشكل ، دقيق القمم . عيناه صغيرتان . اذناه مستديرتان . قوائمه قصيرة . اياهه تقابل اسياحه . ويره كيت وقصير . ثوبه الى الشبهة يطولها موج لشع في الرأس والظهر وبداج اسفري في الصدر والبطن ، ويملها ايضا خط بني اسود قاطب يمتد من القف الى قاعدة الذنب . حصره الى الشبهة الصنانية || الاثني تحمل بعض الثوب وما جراب في اسفل البطن تقم في الوضع حتى الطام .

١٧١٣٩ - طَرَسُوجٌ ، سَطْلَان ابراهيم

Mullus (S). Mulla, Rouget (F). Mullet (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الطرسوجيات انزله ثلاثة موطنا شوطي القنوط والاغص . جميعها صغيرة القند طولا يراوح بين ١٠ و ٢٥ سم . اجسامها اعطانية الشكل عفاة . اوتياها زائفة الالوان التراكبة المتداخلة بين الرادي والوردي والبرتقالي والاخر والبني والاسمر . رؤوسها صغيرة . عظامها قصيرة . طبائها ثلثية مسطيلة . زعانفها الشرجية فائقة || انواعه الثلاثة مأكولة ومستعملة اما متفولة الصنف .

١٧١٤٠ - طَرَسُوجٌ اسَمرٌ ، قَرُورَةٌ

Mullus fasciatus (S). Mulla brun (F). Dark mullet (E).

نوع من الطرسوج قوته الشجيرة واكثر البحرية الرملية والصخرية . يكثر في البحر المتوسط . طوله عند اكتمال بلوغه يقارب ٢٥ سم . ملمسه اعطاني الشكل . ثوبه متراكب الالوان الزائفة يدخل فيها القوي والرادي والوردي والاخر الصناني المالح . ظهره اسود لونا من جنبيه . رأسه صغير القند . عظمه متوسط البروز . عظامها خيطان . عيناه صغيرتان . زعانفها الظهرية والصدرية معتدلة الحجم ، لينة . قلوبه صغيرة ودقيقة || يصير من اجيد الاسماك المأكولة ومنهم من ماله ان لم يغسله حل الطرسوج الصهري .

١٧١٤١ - طَرَسُوجٌ رَمَليٌّ ، سَطْلَان ابراهيم

الرَمَليٌّ ، بَرُوفِي صَغير

Mullus barbatus (S). Mulla rouget, Rouget-barbas, Petit barbarin (F). Red mullet (E).

نوع من الطرسوج قوته الثوب الردي البحرية . طوله يراوح بين ١٠ الى ٢٥ سم . ملمسه جالس الظهر . ثوبه متراكب الالوان الزائفة يدخل فيها القوي والرادي والوردي والارنجي . رأسه صغير القند . عظمه قليل البروز . عيناه دقيقتان مسطيلتان . عظامها خيطان . زعانفها الظهرية والصدرية معتدلة القند لينة . زعانفها الشرجية فائقة . قلوبه مسطقة رفيقة || يصير من اجيد الاسماك المأكولة الا انه يأتي بعد الطرسوج الصهري . وهو مبلول حل الشوطي البانانية السوري .

١٧١٤٢ - طَرَسُوجٌ صَحْرِيٌّ ، سَطْلَان ابراهيم

الصَحْرِيٌّ ، بَرُوفِي

Mullus surmuletus (S). Mulla surmulet, Surmulet, Barbarin (F). Surmulet (E).

نوع من الطرسوج قوته الثوب الصخرية المأكولة . طوله يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم . ملمسه ردي الشكل . ثوبه متراكب الالوان الزائفة يعلب فيها الرادي والوردي

١٧١٣٩ - طَرَسُوجٌ هُو المذهب البري ، اطلية .

١٧١٣٠ - طَرَسُوجٌ سَمَكَة بحرية تسمى شيم طرسودي ، اطلية .

١٧١٣١ - طَرَسُوجٌ

Artemisia dracunculus (S). Estragon, Armoise petit dragon, Dragons, Fargon, Tragon, Serpentine (F). Estragon, Tarragon (E). Estragon, Tragabuef (D). Dragonte, Dragoncello, Targone (I).

بقلة زراعية مبرسة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . ساقه تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اوراقه مستطيلة خيفة النصل . انماها منبيلة التجميع ، وركسية الشكل ، بحورية الارتكاز || وهو من التوابل الشائعة الاستعمال . اوراقه ولونها مأكولة . جميع اجزائه عطرية . بعض الشبهة وفيه المدة || يتكاثر بالبذر والتفريع . يوجد في جميع الاربة الزراعية لكنه ينشئ الرطوبة والصقيع .

١٧١٣٢ - طَرَدٌ ، طَرَدٌ

هو فرقة التلح . ج . طرد .

١٧١٣٣ - طَرَدَانٌ هُو السيران السوري . اطلية .

١٧١٣٤ - طَرْدُوسٌ

Onychoteuthis (S).

Onychoteuthis (F).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرغويات رأسيات الاجرل لفصيلة الطردوسيات . انواعه المعروفة حديثة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، مسطوية ، تنقسم بزوائد موزانة كبيرة القند . رؤوسها معتدلة الحجم . حيوتها كبيرة ماصة . جرابها معلقة ، ثمانية منها محمية متساوية الطول واثنان لقيقتان مسطيلتان تنبها برسي ستانية الشكل بمجوز كلابي . سادة || اشهر انواعه الطردوس القوي (On. robusta) الذي يكثر وجوده في بعض مناطق المحيط الهادي والذي يطول من ١٠ الى ١٢ مترا .

١٧١٣٥ - طَرْدُوسِيَّاتٌ

Onychoteuthidae (S).

Onychoteuthidae (F).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرغويات رأسيات الاجرل ، مزدنبات الخياشيم ، عشاريات الجرامز . اجسامها واوتياها المعروفة حديثة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة والباردة || اعراف اجسامها واشهرها الطردوس والوراس والقاس والفواس .

١٧١٣٦ - طَرَسٌ

جزء ودي الشكل من صفحة بعض القنوط . ج اطراس وطردوس . ج الاطراس فهو كائنا اطراف اوراق مرصوة متناصبة متطبة .

١٧١٣٧ - طَرَسَامٌ

Exuviable (F). Exuviable (E).

نمت تعريفه يطلق حل كل طائر يصير او حيوان يتجدد قشاره او جلده .

١٧١٣٨ - طَرَسَبٌ

Tarsipes rostratus (S).

Tarsipede rostré (F).

حيوان حاشر ثامر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القنقريات . موطنه بعض مناطق استراليا الشمالية . يألف

الزئيفة. الاناث تبني من ٤ الى ٥ بيضات والذكور تنابو الاناث في الحفر.

١٧١٥٠ - طُرُوبِيَّات * (S). Pteroptochidae
١٧١٥١ - طُرُوبِيَّات (F). Pteroptochidae (E).

فصيلة طير من الجُلام سيات المناقير. اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد. اصطلها بعض مناطق الشرق الاقصى وامريكا الجنوبية. تألفت البراري والمراعي قوتها الحشرات والحوام واليزور البرية || اجسامها صغيرة. اوتها باعامة الخشب الزاهر. اعرف اجناسها واشهرها الطرام والرامز.

١٧١٥١ - طُرُوب

هو الفرع الضخم الطويل المسترخي. ويقال لطويلة الفرع من الحيوان طرولة.

١٧١٥٢ - طُرُوبِيَّة

الطربانية من المزر الطويلة شطري الفرع.

١٧١٥٣ - طُرُوبِيَّات (F). Vanneau huppé

طائر يدهي ابو طيط متوج، اطله.

١٧١٥٤ - طُرُوب (F). Petite centauree

هو القنطريون الصغير او مرارة الحش.

١٧١٥٥ - طُرُوبِيَّة (F). Tartrage

هي معالجة الحجر بحامض الطرطريك سدا لعوز في نسبة حوضها.

١٧١٥٦ - طُرُوبِيَّات * (S). Clinus argentatus

(E). Clinus, Crested blenny

سمكة بحرية يبيض من فصيلة الجيريات شاكات الزمانف. اصطلها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || جسمها شبه اهلبيجي الشكل، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. توتها الى الحفزار البحري القفي للمراج يطو تجنح متفرق اسر بعد من الزئيفة الظهيرة الى البطن. رأسها صغير الخطر الدلق يطو في وسط الجبهة رتة صغيرة تجلح غشروية المادة. زعنفتها الظهيرة وبيدة مستطيلة || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

١٧١٥٧ - طُرُوب (F). هو البرازية، اطلها.

١٧١٥٨ - طُرُوبِيَّات

هو الكويين الكبير، اطله.

١٧١٥٩ - طُرُوبِيَّات (F). Topinambour

هو حباد الشمس المستولي، اطله.

١٧١٦٠ - طُرُوبِيَّات مُعَرَّز *، كُيُوبِيَّات

١٧١٦١ - طُرُوبِيَّات * (S). Coprophilus striatus

(E). Coprophilus striatus (F). حشرة نائلة من فصيلة الدنيات وربة سفدت الاجنحة.

تألف المزراع التي تكثر فيها الماشية لانها تعيش عل الزبل والورث || جسمها صغير القند يطول من ٦ الى ٧ م. توتها الى السمرة الكشمية الباقية. رأسها صغير الجسم ينتهي بفكين كبيرين. حينا بارزتان. زيانها غيبان ديقان. ظهورها يلمع نحو ثلث البطن. غمدنا قليلتا الصلاة، متباينة التميز. بطنها مستطال المخز ينتهي

والاجواني الصنابي اللوح. رأسه صغير القند. غطه ذلق بارز. جذناه مستطيلتان. حينا اريوانيتان. زمانفه الظهيرة والصدرية كبيرة القند لينة. زعنفته الخشبية فارقة مستطيلة || يثير من افخر الاسماك واجودها صغدا. وهو مبدول عل الشواطئ اللبنانية السورية.

١٧١٤٣ - طُرُوبِيَّات (S). Mullidae

(F). Mullidae, Goatfishes (E).

فصيلة اسماك من البطليات الشاكات الزمانف. اجناسها وانواعها عديدة جميعها مأكولة مستحبة اللحم. اجسامها رفيقة متوسطة القند او صغيرة. اوتها زامة الالوان الجميلة. اشهر اجناسها الطرئوج.

١٧١٤٤ - طُرُوبِيَّات * (F). Earvie

(E). Earvie (F). Earvie (E). الطرم ما يتخلل عه الجسم الحيواني عه التصير او الانلاخ او الاكمال.

١٧١٤٥ - طُرُوبِيَّات * (F). Exuviabilité

(E). Exuviability (E). الطرمة خاصة التصير او الانلاخ او ابدال القشار التي تنتج بها الطير والحشرات وبعض الحيوانات.

١٧١٤٦ - طُرُوبِيَّات (S). Aptenodytes

(F). Mancho (E). Mancho (F). Mancho (E).

جنس طيور بحرية من دمجات الريش وكفيات القدم. تتميز باجسامها الغليظة المستطيلة. طولها يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم. اجنتها بجذاف الشكل، حشوية الريش. اعتاقها وبنايتها مستطيلة، ورؤوسها صغيرة. اذنانها جدام كاسية || قوتها الاسماك والقشريات. تثن اوكارها في تخاليف المسنور فوق الماء. اناتها قبيض وتحسن بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع.

١٧١٤٧ - طُرُوبِيَّات * (S). Aptenodytes

(F). Aptenodytes (E). Aptenodytes (F). Aptenodytes (E).

فصيلة طيور بحرية من دمجات الريش كفيات القدم. اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد. موطنها بحار القطب الجنوبي || اجسامها شبة غروية الشكل. رؤوسها صغيرة، مناقبها جالسة، معتلة الطول، غنودة الاكاف العليا الباترة السطام الحاد. اعتاقها مستطيلة: اجنتها بجذاف الشكل، حشوية الريش. اذنانها جدام كاسية. ارسافها متوسطة الحجم واربعة الاصابع، كاملة الخطاف || اشهر اجناسها الطرئوج والفقاف.

١٧١٤٨ - طُرُوبِيَّات * (F). Agrodrome champêtre

(F). Agrodrome champêtre (F). طائر من فصيلة الليريات يدعى جقة الحقل. اطله.

١٧١٤٩ - طُرُوبِيَّات * (S). Pteroptochos

(F). Pteroptochos (F). Pteroptochos (F).

جنس طير من فصيلة الطربانيات. انواعه المروفة قليلة العدد. موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية. تألف المزراع والنباتات وضخاف مجاري الماء. قوتها الحوام والحشرات والينادن واليزور البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٤ الى ١٦ سم. اجنتها قصيرة. اذنانها مستطيلة، مستقيمة الاطراف. اوتها تراوح من الشقمة الى السمرة والصغرة والشبهة. صدورها وبطنها من البياض الى التبرة الموشة بالاسود || تثن اعاشتها في الاجار



طرم



طرام



طرب



طربوب

١٧١٦٦ - طَرَفُونِيَّاتٌ * Trogonidae (S).
Trogonidae (F). Trogonidae (E).
فصيلة طير من اللسقات. اجناسها وانواعها عديدة
اصلاها البلاد الاستوائية. تتميز بامتلاكها اذنانها وبجل
الوانها والوانها الزاهية. أشهر اجناسها الطرغون



طرفة

١٧١٦٧ - طَرْفُ الطرف أو الطرفان منزل من منازل القمر الشامية. وما
نجمان من برج الاسد يتقاسمان الجهة. سيما بذلك لاجلها
كمنى الاسد || رقيب الطرف يحى سد بلع.

١٧١٦٨ - طَرْفُ Racé, Pur sang (F).
Thoroughbred (E).
نعت تعريفى يطلق على كل حيوان سريع النسب الاصيل
اي كرم الطرفين طرف الاب وطرف الام.

١٧١٦٩ - طَرْفُ Partie (F). Part (E).
هو من اشترك في عقد قانوني مع غيره.

١٧١٧٠ - طَرْفُ المعادكة Membres de l'équation (F). Members (sides) of
equation (E).

١٧١٧١ - طَرْفَاء في الأثل، اطليه.

١٧١٧٢ - طَرْفَاء المنّ في أثل اللز، اطليه.

١٧١٧٣ - طَرْفَالِيَّاتٌ وتسمى اللاليات، فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديدة
الاقلام. وأرجع اللاليات.

١٧١٧٤ - طَرْفَةُ الطريقة نجم ثير من كوكبة برج السرطان مركزه على قائمة
السرطان المؤخرة.

١٧١٧٥ - طَرْقُي Couver (F).
طرق لقتل الاثني. كما عليها (المساح).

١٧١٧٦ - طَرْقُي Ecrouir (F). To hard-hammer (E).
طرق المدن. مدد.

١٧١٧٧ - طَرْقُكَة Rangée de dactyls (F).
Range of date-trees (E).
صف البتخل بها طال وايضا زرع.

١٧١٧٨ - طَرْقُونٌ Trygon (S).
Patensague (F). Whip-tailed sting ray (E).

جنس اسماك ملحية بحرية من فصيلة الطرقونيات. انواعها
المعروفة قليلة العدد اصلاها بحار البلاد الحارة يكثر ريوها
قرب الاغوار حيث تتلصق بالرايل والاسماك بانتظار ما
تفترسه || اجسامها مبطلة فيه مستديرة الشكل تفلون من
١٨٠ الى ٢٠٠ سم. بما فيه الاذنان المستطيلة كالسياط
تحبسها متاخس حادة شديدة الصلابة جرسها مؤذبة
سامة وقد تنابت ميتة. اذناها تفلون من ٨٥ الى ١٠٠ سم.
الوانها تختلف مع الانواع. اعرف انواعها المجلد والبتسبي



طرقون

١٧١٧٩ - طَرْقُونٌ بِفَتْحٍ Trygon violacea (S). Patensague violette (F).
نوع من الطرقون. يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط.
طوله بما فيه الذنب نحو ١٩٠ سم. ثوبه الكهلي الى

بشرج عريض. ارساغها خضابية الغل || طا جليل واحد في
الحبل. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتموت حتى
اواسط آب. تسرح في التمار وتبيت في الليل داخل افاق
مستطيلة تحفرها في التربة || التربة عند بلوغها الاذناك
التام تفلون من ١٠ الى ١٢ م. ثوبها الى السرة الكستنية.
حلقاها الصدرية مستطيلة الجرم. رأسها معتل للقد اسود
اللون. ذكافا نصيفان. رواجها وشرجها الى السرة
السوداء || طر الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع
ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية.

١٧١٦١ - طَرْفُ Caphalopteris (S).
Céphaloptère (F). Cephalopterus (E).

جنس طير من الجوارم منيات المناظر وفصيلة القطنجيات.
انواعه المعروفة قليلة العدد اصلاها بعض مناطق امريكة
الاستوائية. تألف الغابات، قوتها اثار البرية. ملجئها
الحياضي جاهي. انوعها قليلة العدد من ٤ الى ١٠ ازواج ||
اجسامها متوسطة القد شبيهة بالزرداب. رؤوسها متوجة
كبيرة الطور. اعناقها مقفلة باخبرها مستمرة الرض.
مناقلها ضلجة عزمة || أشهر انواعها الطرطب المزين
Ceph. ornatus (S). الذي يكثر وجوده على ضفاف
نهر الامازون. ثوبه الى السواد الاسفج الازرق المايح.

١٧١٦٢ - طَرْفُكَة Columella (S).
Colombella (F). Columbella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الاربل
وفصيلة الطرطلديات. انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ مظهرها
يعيش على شواطئ بحار المناطق الاستوائية || اصداها
متماسكة شبه بيضية، غنية مغازنة، فصيرة القلوب، مبطنة
ومجلمة بالالوان الزاهية. رؤوسها صغيرة مبطلة، ثنائية
القلوب الصغيرة مخروطية الشكل. انواعها ملحقة
بالرؤوس، مستطيلة الانضمام الانبوبية. ارجلها مستطيلة.
ضيقة مججمة باسفاط قرنية المادة.

١٧١٦٣ - طَرْفُكُونُوسٌ * ، طَرْفُكُونُوسٌ Trachilus (S). Colibri, Ouesu-mouche (F). Humming-
bird (E).

طرغوليس وفريس من الجاسط. صفور صغير القد
طوله نحو ١٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الزاهية الجميلة
فيه الرمادي والاخر والاصفر والاسمر وفي جناحيه ريشة
ذهبية. ذنبه متوازي التقط البيض النقيفة. متقاربه رقيق
مستطيل. قوته الذباب والحمام وريق الانزاع || يمش
عنه في الاشجار الفتاة فوق مجاري الماء || انشاء تحسن
من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حضنته لا تسمى
اربع بيضات.

١٧١٦٤ - طَرْفُكُونِيَّاتٌ Columbellidae (S).
Columbellidae (F). Columbellidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الاربل
مشطيات الجاهيم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة
منتشرة في سبط بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصلاها
صغيرة القد تنابت بالاشكال منها البيضية والمخروطية
والرشية، جميعها متماسكة الصفة المزخرفة بالالوان
الزاهية || أشهر اجناسها الطرفة.

١٧١٦٥ - طَرْفُونٌ Trogon
جنس طير من الطرغونيات لللسقات. انواعه عديدة
جميعها من الحشرات تتنارات تألف غابات واشراج البلاد
الحارة الاستوائية.

السديان. ساقه رفيعة، منتعبة، معتلة الجرم، غيراه
الذين. نكتة فائضة، مستديرة، قطرها نحو ١٠ سم.
لونها إلى الصبغة للسرار السفاه الموج. أطرافها إلى
الصبغة الوردية الموج || لحيتها جيدة الصنف، مرغوب
فيها.

١٧١٨٩ - طُرْمُوسُ
Mouton engraisé (F).
Fatten sheep (E).
هو أغروف السمين.

١٧١٩٠ - طُرْمُوسُ المَرْجُحُ
Longitarsus pratensis (S).
Longitarsus des prés (F). Longitarsus pratensis (E).

حشرة من فصيلة النصاريات. موطنها بعض الأقاليم
البسري الأبيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة. تألف
المرج والمريض وضفاف مجاري الماء. خنافسها تعيش على
أوراق النباتات التابعة لفصيلة الفريزيات والحمصيات
ولا تصف من السرق والخلوخ. يرقاتها تعيش في التربة على
جلود البزاقات المائل || جسمها صغير القد، شبه بيضي
للشكل، بطول من ٢ إلى ٣ سم. قشرها إلى الجلود يملؤها
موج اشعث. رأسها مستعرض الجرم، اسفليها الملمع.
زناناها غيبان مقوسان || لها جيلان في الحول. تخرج
الحشرة الجبلانة من مكانها في أواخر نيسان. تصافد بعد
ظهورها بأسيون وتهاجر مع المكان بعد الكرم يبين
تنتمن في التربة وترز المكان قرب استراح ويظهر النبات
المائل || البرقة منه تغذي كتوبه نحو جلود النبات فتنتفج
الادمة وتلج إلى الداخل، قشها المصادة والعلما النباتية.
وتبقى حتى اكتمال طورها البرقي أي نحو ٣٠ يوما ثم
تنتسب إلى التربة وتتسلل في طور الاكمال. والبرقة عند
بلوغها الإدراك بطول نحو ٥ سم. جسمها حنطي اللون،
أسطواني الشكل، رأسها اسود || أما خنافس الجيل الثاني
فإنها الشوي ينسرح حتى يبين زين النشاط ويكون ذلك
في أواخر نيسان.

١٧١٩١ - طُرْمُوقُ
Vespertilion (F).
هو الخفاش، اطلبه.

١٧١٩٢ - طُرْمُودُ * طُورْمُوسُ *
Torymus (S). Toryme (F). Torymus (E).

جنس حشرات من فصيلة الطيريدات. أنواعها المعروفة
نحو ٢٥ أصنافها الأقاليم الحارة والمتلة الحارة || جميعها
ناقة تتطفل على الحشرات الضارة إحصها الأبرار ||
أجسامها صغيرة بطول من ٣ إلى ٤ سم. رؤوسها مخروطية
للشكل، كوالها معتقة. بطونها فضية. مزلاتها دقيقة
مستطيلة. ألوانها مختلفة الألوان، لماعة.

١٧١٩٣ - طُرْمُودِيَاتُ
Torymidae (S).
Torymidae (F). Torymidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المضمورة.
أنواعها عديدة. أصنافها الأقاليم الحارة والمتلة الحارة.
جميعها ناقة تتطفل على الحشرات الضارة || حشرات صغيرة
القد وعصية بطول من ٢ إلى ٧ سم. أجسامها نحيلة ملونة.
رؤوسها مستعرضة. زناناها صولانية. قواها طويلة.
مزلاتها لإقامة الجرم منها القليلة منها الحارة الطول ||
أشهر أنواعها الطريد والديبور والجلمرية.

١٧١٩٤ - طُرْمُودِيَا
Tornella (F).
هي الشرس نبات من القلقليات، اطلبه.

البفسجي السابق تملو حاجات قراوح من الاترق إلى
الاسود. ثوبه السفلي إلى الخطي الاسمر. منتخه الليل
كبير القد طوله نحو ١٨ سم. || لحمه متوسط الصنف،
مأكول.

١٧١٨٠ - طُرْمُونُ مَبْدُولُ *

Tryon pastinaca (S). Pastanagae communis (F).
نوع من الطرُون يكثر ويجوده في المحيط الاطلسي. طوله
بما فيه اللتب نحو ٢٠٠ سم. ثوبه العلوي إلى الشقة
السرارة الناعمة. ثوبه السفلي إلى الخطي الاسمر. منتخه
الليل كبير القد، حاد الطرف، طوله نحو ٢٠ سم. ||
لحمه متوسط الصنف، مأكول.

١٧١٨١ - طُرْمُونِيَاتُ
Trygonidae (S).
Trygonidae (F). Trygonidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السفغيات الاطلاق. اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مفترسة وريدة. مرتها
الايخار واغوار الشطوط || أعرف اجناسها وأشهرها الطرُون.

١٧١٨٢ - طُرْمُ * طُرْمُ
Rayon de miel (F).
Honey comb (E).
الفرم والفرم هو الشهد من العسل.

١٧١٨٣ - طُرْمُ * طُرْمُ
Rayon (F). Ray (E).
هو شعاع الجلود والجذوع.

١٧١٨٤ - طُرْمُ مَكَاكِي
Rayon médullaire (F).
Medullary ray (E).

صفائح مبرشمية شعاعية الشكل تنطلق من محور الساق
أو الجذر إلى المكاء والخشب والكثير.

١٧١٨٥ - طُرْمَازُ
نعت تعريف. يطلق على الفرس الكرم القراع.

١٧١٨٦ - طُرْمُحُ *
Ommatostrophus (S).
Ommatostrophes (F).

الواحدة طرمحة. جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات
وفصيلة الطرمحات. أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم
بحار العالم || أجسامها كبيرة القد وشبه الشكل تنتهي
بزمانف رمية، رؤوسها مستطيلة. حيوها كبيرة،
جاسطة، رفيعة النقرة. ثمانية من جزامها محبة متساوية
الطول واثنان مستطيلان تنتهيان برسى ستانية الشكل ||
تتميز بقدة اليأس والنشاط وبالقفر فوق سطح الماء حتى
أن يمشي يقع على سطح المراكب || أشهر أنواعها
طرمحة كولانتي (Omm. Cloandeti) التي يكثر وجودها
في البحر الأبيض المتوسط.

١٧١٨٧ - طُرْمُحِيَّاتُ
Ommatostrophidae (S).
Ommatostrophidae (F). Ommatostrophidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات وأسيات
الاريل، مزدويات الخياشيم، حشريات الجرامز.
اجناسها المعروفة قليلة العدد أما أنواعها فكثيرة جميعها
يمية لا تقرب للشطوط. ملجها الحياتي جماعي، أسرارها
تعد بعض اللات || أعرف اجناسها وأشهرها الطرمح.

١٧١٨٨ - طُرْمُودُ *
Pluteus cornutus (S).
Pluteu couleur de cor (F).

طرممأكول من فصيلة القارديقيات. يكثر وجوده في
النباتات الجبلية. يعيش على رويات الأشجار المبررة إحصها



طرُون مَبْدُول



طرمح



طرمون



طرموش المروج



طرميد



طريشون الصافي

1٧٢٠٦ - طريق أشهب
Trigla milvus (S).
Trigla milva (F).
نوع من الطريخ يطول من ٥٥ إلى ٦٥ سم. ثوبه ال
للشبة القفصية يملأ موج وودي يتخلله شيء من الأصفر
والأخضر .

1٧٢٠٧ - طريق رناري
Trigla gurnardus (S). *Trigla gurnardus*, *Gronidus*
gris (F). *Gournard*, *Gurnard* (E).
نوع من الطريخ يوجد في جميع البحار أما يكثر في الترسد
وعلى الشواطئ الاطلسية الاوربية والاثرية || يطول
نحو ٦٥ سم. ثوبه الى الربة القفصية يمتد مع اقترابه
من قيع الظهور ويبيض منه البطن .

1٧٢٠٨ - طريق صبور
Trigla aspera (S).
Trigla ruda, *Cavillon* (F).
نوع من الطريخ الصغير القند يطول نحو ١٢ سم. ثوبه
الى الصفرة المرجانية الزاهية يزيد احمراراً مع اقترابه من
الظهور ويصفر نحو اليافس الاكبر منه البطن . يوجد
في جميع البحار .

1٧٢٠٩ - طريق كير
Trigla corax (S).
Trigla parlon, *Parlon*, *Parlan* (F).
نوع من الطريخ يطول نحو ١٠٠ سم. ثوبه الى الربة
القفسية السراء اللحية . يسكن منه الظهور ويبيض منه
البطن . يكثر وجوده في المحيط الهادي .

1٧٢١٠ - طريق مرجاني
Trigla cucullus (S).
Trigla morruda, *Gronidus barbarin*, *Orgus* (F).
نوع من الطريخ يكثر في المتوسط يطول من ٢٠ الى ٢٧
سم. ظهوره الى الحمرة المرجانية . جانباه ويك الى اليافس
الأصفر اللؤلؤ .

1٧٢١١ - طريق متمش
Trigla lineata (S).
Trigla Imbrigo, *Surmulet sans barbe*, *Camard* (F).
نوع من الطريخ يبلط في جميع البحار يطول من ٢٥ الى
٣٥ سم. ثوبه الى الحمرة الجوزية اللامعة تعلوها نمشة
سوداء .

1٧٢١٢ - طريق غيات
Triglide (S).
Triglide (F). *Triglide* (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة الشبليات الشاكلك الزعانف.
اجناسها وانواعها عديدة اعرفها واشهرها الطريخ والبلنج .

1٧٢١٣ - طريق
Rameau de moins d'un an (F).
الطريد هو العريون قبل ان يبلغ الحبل .

1٧٢١٤ - طريقلا
جلس اسماك بحرية تدعى الطريخ .
1٧٢١٥ - طريق
Courlis malle (F).
Carlew malle (E).
هو الكروان الذكر .

1٧٢١٦ - طريق
Voie (F). *Way* (E).
طريق طرق . كلمة شاملة تشمل في عدة معنى اشياء :
Voies de recours (F).
طرق الملن

Voie (F).
طرق المواصلات
Voie de droit (F).
طرق وقانونية
Voies et moyens (F).
طرق واساليب
Voie d'excusation (F).
طريق التفسير
Voie classée
طريق تنظيمية

1٧١٩٥ - طريكالية لند يلك
Tornelle délicate
هي الشمس اللذيذ للأكل آثار ، اطليه .

1٧١٩٦ - طريكة
هي البلباط ، اطليه .

1٧١٩٧ - طريشيليا
Trazschalla
جنس فطور مجهرية يعرف بالصفحة ، اطليا .

1٧١٩٨ - طريشيل
هو حواد الشمس السوي ، اطليه .

1٧١٩٩ - طريشون الصافي
Chrozophora tinctoria (S). *Chrozophora tinctoria*.
Chrozophora tinctoria, *Croton des teinturiers*,
Maurille (F). *Turnesola*, *Dyer's litmus paper* (E).
Turnesolpflanze, *Färber-Kroton* (D). *Turnesole*,
Girasole (I).
نبات عشبي زراعي صناعي من فصيلة القربيويات ، اطليه
موسس البحر للتصود ، يذهب في الربة الجيدة التركيب
المحتلة الانساج . زراعت تتطلب بعض الناية الخاصة
كالنقز والتشيب بعد التفتيح || يستخرج من سوكه
منه الانزهار ويعد لعلها ومحقها صارة صبغية شائعة
الاستعمال الصناعي .

1٧٢٠٠ - طريكة
Torula, *Torulée* (F).
جنس فطور مجهرية من الفطريات وفصيلة الطحيات .
مشبه مؤثر التركيب . جربه الكنديية سبحة الانساج .
انواعه عديدة تعيش على ماء الانسان اليابسة والارواح
المتارة على الخضوض ولؤلؤ البضوية البائرة الى الانحلال .

1٧٢٠١ - طريكة
Torreya
شجرة حرجية من القسوسيات تعرف بالوطوق ، اطليه .

1٧٢٠٢ - طريكة
Lithodomus (S).
Lithodoma (F). *Lithodomus* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم
وفصيلة الميديات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٢
منتشرة في معظم بلاد الحارة والمعتلة الحارة ||
اصداؤها شبه اسطوانية الشكل متراكبة الصفائح الملصقة
بمشاد آدمي . اجسامها فسفورية مشعة || تعيش في اول
مهدبا لاصقة بالصخور للمفورة ثم تتحدر من قيعها
اليقني فتشطب احلب الصخور وتعيش في الانفاق التي
تخلدها .

1٧٢٠٣ - طريق
هو الفرس ، اطليه .

1٧٢٠٤ - طريقلا، جريكالية
Trigla (S). *Trigle*, *Gronidus* (F). *Gurnard* (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الطريجات . انواعه نحو ١٥
منتشرة في جميع بحار العالم . رؤوسها كبيرة مسطحة ،
هزينة للشكل . اجسامها مختلفة الاجسام تطول من ١٢
الى ١٠٠ سم . زخايفها كبيرة شاكلك لاقطية . انثياها
متراكبة الالوان الزاهية . طويها مأكولة ، مستعمية
جيدة الصنف || اشهر انواعها ما يلي .

1٧٢٠٥ - طريق آخر
Trigla pini (S).
Trigle pin, *Rouget rouge*, *Trigle hirondelle* (F).
نوع من الطريخ ، يذبل في جميع البحار ، يطول من ٢٥
الى ٣٠ سم. ظهوره احر اللون . جانباه الى الوردي الزاهي .
يعد اغبر اللون .



طريخ

الجذور المتحرة تنقبض عليها وتتركز بين الجرادة والالياف الخشبية حيث تتابع نشاطها الجيوي وعملها التخريسي الذي يؤدي النبات لانه يمتص الاوية ويمنع التبادل التنفسي || يكافح بالتلاصق النباتات الموسومة ويظهر التربة بالكلس الحراق او بلفور الكربون.

Tazard (F).

١٧٢٢٦ - طزور

مكة بحرية تسمى اسفري طراز ، اطلها .

Véranda (F).
Veranda (E).

١٧٢٢٧ - طزور ، فوكندا

١٧٢٢٨ - طسق ، طسك ، تكس

Taxe, Contribution (F). Tax, Impost (E).

الطسق : ما يوضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرر على الارض . وكسب عمر الى صان ارفع الجزية من رؤوسها ومنح الطسق من ارضها . وقيل شبه الخراج له مقدار معلوم (السان) .

١٧٢٢٩ - طسل

هو الماء الجاري على وجه الارض وهو التراب البقيق الناعم ذو قوة السراب .

Géotropisme (F).
Geotropism (E).

١٧٢٣٠ - طسم

اثر الجاذبية الارضية في انحناء النمو النباتي . وهو يندعي ايجابياً اذا كان متجهاً نحو مركز الجاذبية الارضية وسلباً اذا اتجه ابتعاداً ماعاك .

Desman (F).

١٧٢٣١ - طسمان

جنس حيوانات حاشية من فصيلة البريديات . يألف ضفاد الأناهر والكيميرات ، قوته الحشرات المسالية والاسماك الصغيرة . له نبيان طسان المسك ولسان الجبل .

١٧٢٣٢ - طسمان المسك *

Myogale moschata (S). Desman musqué (F).
Musk-rat (E).

نوع من الطسان موطنه فسج الإرياء يمتد من بحر ارال الى بحر قزوين وإلى ضفاف بحر الكزير . وهو يشبه الزبابة لكنه يجمع السنجاب الكبير . صخر الين . فاسر الفراء . مستطيل الخطم والذنب . يعمل عند قلعة ذئبه خلد مسكية للمادة القوية المرفق || قوته الحشرات المائية والاسماك الصغيرة . يعيش في نفق يخلده على مستوى الماء .

Spheniscus (S).

١٧٢٣٣ - طسناج *

جنس طير من طيور الريش ، كفيات القدم ، وفصيلة الطسناجيات . انواحه المرفقة قليلة العدد موطنها القطب الجنوبي . اجسامها تقطع من ٦٥ الى ٨٠ سم . رؤوسها صغيرة . اعناقها قصيرة . مناقبها جاسلة ، مبطلة ، متعددة الافاك الملياة انشابة المذبذبة الخواص . اجنتها مجنافية الشكل ، حشوية الريش . اذنتها جداد كاسية || تدن في اخاصيص متنتلة المسق . انائها تبيض وكفن بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع || قوتها الاسماك والقشريات .

Spheniscidae (S).

١٧٢٣٤ - طسنتجيات *

فصيلة طيور بحرية من طيور الريش ، كفيات القدم .

Voie privée (F).

طريق خاص

Voie publique (F).

طريق عام

Voie de fait (F).

طريقة التفت

١٧٢١٧ - طريق البحر ، طريق السحب

Chemin de halage (F). Towing-path (E).

هي الطريق المصفاة حذاء النهر او القناة المصفاة لاجلحة وهي يجرز استعمالها لجر المركاب او سحبا .

Chemia rural (F).

١٧٢١٨ - طريق ريفية

Rural road (E).

كل طريق في الريف تربط للمساكن والقرى ببعضها بعض .

Chemin agricole (F).

١٧٢١٩ - طريق زراعية

Agricultural road (E).

كل طريق يمر بين الاراضي الزراعية او تربطها ببعضها بعض .

Méthode (F).

١٧٢٢٠ - طريقة ، منهج

Method (E).

هي الاسلوب المقروص اتباعه في شئ معين . كذلك طريقة الاستيثار والاستغلال او العمل .

١٧٢٢١ - طريقة الحدف

Méthode de réduction (F). Method by reduction (E).

١٧٢٢٢ - طريقة سيكية

Méthode sexagésimale (F). Sexagesimal method (E).

Système décimal (F).

١٧٢٢٣ - طريقة عشرية

Decimal system (E).

Système métrique (F).

١٧٢٢٤ - طريقة مترية

Metric system (E).

هي طريقة القياسات المترية .

١٧٢٢٥ - طريم *

Armillaria mellea, Armillariella mellea, Agaricus melleus, Rhizomorpha intestica, R. subcorticis, R. fragilis (S). Armillaire de miel, Pourridié-agric (F). Root-rot honey agaric (E). Hallimasch (D).
طير من الطسنتجيات موطنه فسج الإرياء ، يركب الجذور فيقطنها . يصيب من الاثمار الحرجية السنيان والزان والقرنم والبيولا والحور والاكسبا والسوسن والنبوت والارديس . ويصيب من الاثمار المشعة الكركية والحور والمشمش والدراين والكركز والكتفان والاباس والجوز والحشويات على اختلافها ثم للوز والقرنم والين والشاي والكاكار والكتنا والمطاط . ويصيب أيضاً بعض النباتات الزراعية والبريديات كالطاطا والفلقاس والابزر والاماليا والدرجس والوزان || مظهره الخارجي في دوره الفطري الصحيح : طير طويل الساق النيلية الاسطوانية ، اسوته قلنسوة الشكل ، بريقة الحافة المنكسرة الى الداخل ، ظهرها نحو هـ م . قوتها اصفر صلب يعلو سراج زهني . لباها جبانة الملقط ، ابيض اللون من الخواص . وهو من الفطور الماكولة . مردودته تلعب مع الفل || يظهر في الخريف ويؤدم حتى اوائل الشتاء . يركب للمواد الصخرية والخشبية المنحلة على الجفوع والاشخاب المظروسة ارضاً || وهو في دوره المشعبي ينتج بيرة مفطسة حديدية الاطراف ظهرها نحو ١٢ م . لونها الى البسرة ، تغلق من خيوط كتلية مستطيلة تسرح في التربة المسطحة الى ان تلتقي



طريم



طسان المسك



طسناج

1٧٢٤٣ - طَعْمِيَّة Agraine, Agrénage (F).

نثر الحب في مواقع معينة لتجذب عليه الطير فصاد.

1٧٢٤٤ - طَعْنٌ، وَجُوعٌ، إِلْجَاءٌ Recours (F).

Recours (F).

في الالتجاء إلى السلطة المسمول على القائد حكم أو تمليك

أو تقصير أو إعادة بحث.

1٧٢٤٥ - طَعْنُ الشَّهِيدِ Reproche de témoins (F).

Objection of witness (E).

وسيلة يتلوع بها أحد المتخاصمين ليلجئ بشهادة شخص معين.

1٧٢٤٦ - طَعَامٌ اِرْثَالُ الطير والسباع.

1٧٢٤٧ - طَفَر

الطفر طائر. ج طفران (السان).

1٧٢٤٨ - طَفْمُوسٌ Gorilla (F).

هو الغوريل، أظلم.

1٧٢٤٩ - طَفْمُوسٌ مُعْتَقِيَّةٌ *، سَمَكُورَةٌ

مُحْتَشِمَةٌ Cymbalophora

pubica (S). Cymbalophora pudica (F). Cymba-

laphora pudica (E).

حشرة من فصيلة الحريدات ورتبة حرشفيات الاجنحة.

موطنها بعض مناطق حوض البحر الايئش المتوسط.

لرأشتها جارية قتها رحيق الازهار. مرتبها خاصة قتها

صفت التنبيلها || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ م.

بسطها نحو ٤٤ م. رأسها غلوري للثكل، عيناها

كبرتان باقنيتان. زباناها مطعنان. مؤلفها مستطيل.

حبشها حطلي اللون. بطنها الى الخلفي الاحمر المراج ||

رؤشها الاسمان الى الياض التي يملو تضعيع ويجمع

كسني. رؤشها الخلفيان الى الياض الوردية المراج

يملو تقيج كسني || لها جبل واحد في الحبل. تظهر

لقراشة في حزيوان وبشي حتى أب. تسرح في الليل.

تتأكل بعد ظهورها بنحو اربعة أسابيع وتتمتع الممكن على

الصفحات الغلل من لصال الاوراق || السرعة طول نحو

٣٠ م. جسمها انوبي للثكل، ايد الاذن، سم المراج

تلو مجعوبات متفرقة من الحلب الاسود الانتشاب،

الحطلي الاطراف. رأسها اسود. معها ورواجها الى

الورادي || طسود الاكمال ينسمر نحو اربعة اسابيع

ويتقضي فمن صلبة تحبكيها السرعة في شقوق الحاء أو

تحت القشور.

1٧٢٥٠ - طَفَّافٌ، طَفَّاحَةٌ

Excédent de mesure (F).

1٧٢٥١ - طَفَّافٌ

الطفف هو سفح الجبل وساحل البحر ج طفوف.

1٧٢٥٢ - طَفَّافٌ Emerger (F). To emerge (E).

برز على سطح الماء.

1٧٢٥٣ - طَفَّافٌ *، طَفَّافٌ

Oreotragus saltator (S). Oreotragus sauteur (F).

Kilppbok, Kilppaspringer (E).

حيوان لين يجر من القاء وسيد الجنس والزوج. موطنه

ينته من الحيفة الى كنيه اولندا ورويديه. يألف

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، أطلتها القلق
الجنوبي || ملجتها الحيلالي جامي تمشي معظم حياتها في
الماء ولا تألف الجزر الا في زمن القساة والترسيم ||
قوتها الاسماك والقشريات || أشهر اجناسها الطنجان.

1٧٢٣٥ - طَفْمِيَّةُ النَّعْنَانِ *، نَارِيَّةُ شَهْبَاءِ

Cryptoblabes gnidiella (S).

Pyrale grise, Cryptoblabes polyphage (F).

Cryptoblabes gnidiella (E).

حشرة صغيرة من فصيلة الكاريات حرشفيات الاجنحة.

موطنها بعض المناطق الشرقية من حوض البحر الايئش

المحيط. تألف يساتين الليمون وسنائل البذران والمطوق التي

يكثر فيها النعنان، فراشتها صبيغة تمشي على غزونها

الاسمان، مرتبها ناعمة تمشي على بشرة ثمار البرتقال وصل

اوراك الدراق والكرية والنشنان || جسمها صغير قصيف

بطول نحو ٤ م. بسطها تراوح من ١١ الى ١٣ م. رأسها

مستل الجرم، قصير الخطم. عيناها كبرتان، نافذتان.

زبانها غطيان. طساعها دقيقان. مؤلفها جعدة.

حبشها وبعثها الى الشفة || رؤاشها الى الشفة يملو

مواج ثني وخار اسم || لها جيلان في الحبل. تظهر

قراشة الجبل الاول في ايار بقراشة الجبل الثاني في آب.

تسرح في الجبل وقبيت في الثمار || السرعة، عنه بلولها

الادراك التام، تطول نحو ١٠ م. جسمها شبه اسطواني

الشكل، مستطيل القدم والمخسر. ثوبا الى السرعة الجارية

المراج يملوها حطان جانبيان، قاطبان، شديدة السرعة.

رأسها اسود. معها ورواجها الى الخلفي الاسمي || طرد

الاكامل في الجبل الاول ينسمر نحو ١٥ يوما وينسمر

في الجبل الثاني نحو ٢٨ اسبوعا ويتقضي فمن صلبة

تسجها السرعة بين شقوق الحاء أو تحت القشور.

1٧٢٣٦ - طَعَامُ الْأَرْتَبِ Phagnale (F).

هو الحلبي، اطبخ.

1٧٢٣٧ - طَعْمُورٌ * Tolposporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفرمديات. بنوره

البوية لاقامية الشكل والحلم. طباله حشوة لامتجانسة

تغلغل عنه بلولها من غيرات حبابية لونها الى السرعة

القائمة.

1٧٢٣٨ - طَعْمٌ Golt (F). Taste (E).

هو ما يؤذي اللزق من تصنيف لكل ما يدخل الفم.

1٧٢٣٩ - طَعْمٌ Appét (F). Bait (E).

كل ما يوضع من طعام لاجتذاب الصيد من طير أو سمك

أو دسحش.

1٧٢٤٠ - طَعْمٌ، مَطْعُومٌ، هَرَبٌ، قَلَمٌ، هَرَلُوفٌ

Grafton (F). Graft (E).

هو جزء النبات المطلوب تكثيره والند للاهتمام بالعلم.

1٧٢٤١ - طَعْمُ الْمُرْدُوعِ، نَطْلٌ

Gout de verrou (F). Native tang (of wine), Raciness

(of style) (E).

علم خاص، يعود الى التربة والمخ، يكون في بعض

الحاصلات كالتيغ والنب وما اشبه.

1٧٢٤٢ - طَعْمَكَةٌ Production (F). Product (E).

هي ما نتج من محصول.



طبيّة للنّان



طفنوسه ممتشة



طفّار

Hydrargyris (F).
Hydrargirim (E).

١٧٢٦٢ - **ملقح زنجبي**

تسم بالزريق .

١٧٢٦٣ - **ملقح وزدي**

هو الحامى مرض جلدي ، اطلبه .

Electrophanes nivale (S).
Electrophane des neiges (F).

١٧٢٦٤ - **ملقح الثلج**

طائر من الجوارح غروبيات المناقر . فضيلة الغروبيات . موطنه يمتد من بلاد القطب الشمالي الى حوض البحر الابيض المتوسط ذلك لانه من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق والصيف والمشتى . ملجئه الحياتي جماعي . انجواجه تد بضعة الاف . قوته البزور والحشرات || جسمه صغير لقد يعطى من ١٧ الى ١٩ سم . ثوبه الشفوي يكثر فيه البياض وتقل فيه الشفحة والسررة . ثوبه الصفي يبقى حل البياض الصناعي الموج في الزور والصدر والبطن والاذنيك . اما الرأس والحشران والرداء والسقطان والذنب قال الشفحة المتباينة الماجات والمطوقة بالابيض . سقطاء ذلقان . ذنبه فارغ الطرف || يدخن عنه بين الحشرات وفي تخاليف الصخور . الاثني قطع من ه الى ٩ يعضات تحضنها بمثابة الذكر نحو ١٢ يوما .

Mutation

١٧٢٦٥ - **ملقحة**

تبدل فيالتي يحصل في وثل وسلة وراثية . راجع اختباه وشروء .

١٧٢٦٦ - **ملقح**

زين احمرار الشمس قبيل الغروب .

Argile (F).

١٧٢٦٧ - **ملقح**

هو التصلب ، اطلبه .

Tendre, soyeux (F).
Tender, Silky (E).

١٧٢٦٨ - **ملقح**

الفلل : الرنص التام من كل شيء . ج . طفال ومفلول .

Cotyledon (F). Cotyledon (E).

١٧٢٦٩ - **ملقح**

هو الافران نبات عشبي ، اطلبه .

Emerson

١٧٢٧٠ - **ملقو ، ملقو**

Herbe tendre (F).
Tender herb (E).

١٧٢٧١ - **ملقوة**

الطرق : لبت الرقيق .

Paralique (F). Paralic (E).

١٧٢٧٢ - **ملقوي**

تست قريفي يطلق على كل ما له سلة بالطن اي باسأل البحر .

Echis (S). Echis

١٧٢٧٣ - **ملقوية**

جنس حيات خفية من فصيلة الافيات الانوبيات الاعايد . انزلها مدينة جيهما من افاعي البلاد الحارة . طولها نحو ٧٠ سم . ثوبا الى الصبغة السوداء تملو رقشة يضاء وضمان اسودان اوا ابيضان متعرجان . وبضها حنلي الثوب الابلق ، مطوق البق || اشهر انواها الطلية الحرة وام الطليتين وضد الجوز والاريد .

التجاد الرقية التي تملو من ٢٤٠٠ الى ٢٧٠٠ م . عن سطح البحر . ملجئه الحياتي جماعي . إجله يتألف من ثلاث الى اربع اناث ومن ثلاثة الى اربعة شواهد يقودها ذكر مانع . قوته اوراق السط والاعشاب المختلفة . يسرح في طلب القوت من الفجر الى الساعة التاسعة ومن العصر الى الشاء ولا يرتاد الماء الا ابد المشاء . سميه طفر وساء || جسمه قريب الشبه من الشبوة ومن الرم . طولها نحو ٨٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم . ارتفاعه نحو ٥٦ سم . وطول قرن الذكر نحو ١٠ سم . اما الانثى فحياء واسم مستعري الجبهة صغير الخطم . اثنائه متصبتان . عيناه كيرتان كستيتان . قرناه غروبيان جبالان . مجاريه الضمية جلوة الرافض . جرائزه شديدة التلشط . ثوبه يتغير مع فصول السنة الا ان اللون السالك هو الصبغة الموشحة بالاسود . بطنه دائما ثوبي القرن احمر المواج || الاثني تحسلي ثوب الذكر وبني ثنائية الخلف . تقف شادنا واسدا قترهه نحو ثلاثة اشهر .



ملقاة

Zamenis (S). Zamenis

١٧٢٥٤ - **ملقاة**

جنس حيات من الثعابينات . انواها مدينة منتشرة في جميع البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها طوال دقائق تطفر بين الصخور وورق الكمال وفي للاء . اطولها تراوح من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . قوتها الامساك والضفادع والوزغ والفظاء . الخ .

Podocnemis (S).

١٧٢٥٥ - **ملقاة**

Podocnemis (F). Podocnemis (E). جنس سلاحف مائية من فصيلة الخفاشيات . انواها المعروفة عشرة . اعطائها بعض مناطق امريكا الجنوبية وجزيرة مدغشكر . تألف الانهر والبييرات والقنارات والنتاق || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة ويطوي والكبيرة . الصغيرة تقابل نحو ٣٠ سم . اما الكبيرة فطول من ٧٥ الى ٩٠ سم . ثولها الى الكلبة السوداء . ذابلها شمكة . قليلة الاحادياب . يفضية الثورن . زعانها منبسطة مسطحة تحت الدبال . رؤوسها مكروسة . اعناها متصلة الطول والفلافة . اخناها قصيرة . قوتها شديدة التلشط ، غلبة الخالب الامامية ، رباعية الخلفية .

Parélie, Parhélie (F).

١٧٢٥٦ - **ملقاة**

Parhelion, Mock sun (E). الطفالة صورة الشمس متعكسة في سحابة .

Immaturité (F).

١٧٢٥٧ - **ملقاة**

Immaturity (E). حالة الشيء غير الناضج . الملاق الحاضر في معظم الآبار دليل الطفالة .

Carne (F). Ring (E).

١٧٢٥٨ - **ملقاة**

البائرة الطالرة في مقطع جذع الشجرة .

Lave (F). Lava (E).

١٧٢٥٩ - **ملقح**

ملقح ج . طلوح . هي حم المادن للصهورة اللابة التي يثلف بها البركان عند ثورانه .

Débordement (F).

١٧٢٦٠ - **ملقح**

Overflowing (E). سيلان الماء خارج مجراه .

١٧٢٦١ - **ملقح النزو** هو البثار ، اطلبه .



ملقاة

١٧٧٨١ - طُفْسُوس **Taxus (S). W (F). Yew (E).**

جنس اشجار حرجية من الطفسوسيات السنوريات . يقال لها قمر نحو ٣٠٠٠ سنة . انواعه وضروبه عديدة . اشجارها متفانية القدر تملر من ٥ الى ١٥ م . اخصابها وفروعها منتصبه تقبل للتشذيب والتقليم . اوراقها متعابضة ، ثنائية الصف ، شديدة الخضار المايك ، لامة الصفعة العليا ، وهي جميلة للحدائق النبات والحدائق ولزينة الجدران والمنازل والفسان . ثمارها غنية الشكل ، محبة اللحم ، عادمة المواد السامة . اشعاشها صناعية جيدة الصف ، ناعمة اللمعة ، قوية الاتداج والورب ، لونها الى البجورة المستنبة بالاسمر . شكرها ابيض اللون قليل السامة .



فُصَيْة حَرَّة

١٧٧٨٢ - طُفْسُوس عَادِي * **Taxus baccata (S). Il commun (F). Common yew.**

Yew tree (E). Echta Eibe, Eibenbaum (D). Tasso, Libo, Livo, Albero della morte (I).
نوع من الطفسوس الجبلية شجرته تملر من ١٢ الى ١٥ م . ضروبه عديدة . جميعها بطيئة النمو الا انها تنضج لثمنت طرائق التشذيب الذي يجعل منها شئ الاشكال الممكن انسجامها مع الحظوظ والمكان .



طق احمر للمقاد

١٧٧٨٣ - طُفْسُوسِي * **هو التفسوسيون ، اعليه .**

١٧٧٨٤ - طُفْسُوسِيَّات **Taxinées, Taxodinéas (F).**
سبط من فصيلة السنوريات يشمل الطفسوس والطقون والشنج والسيليك .

١٧٧٨٥ - طُفْطُق **هو الاربل ، اعليه .**١٧٧٨٦ - طُفْطُقِيَّة * **Chetusia (S).**

Chétusie, Chécusie (F).
جنس طير من طوال الباق وفضيلة الزرقائيات . انواعه نحو ١٥ : جميعها من القواطع تجوب البلاد في طلب الرزق وللصيف والشتي . وقد تكثر الانقاة في البلاد الحارة . اجسامها صغيرة القد ، رشيقة القوام . اناثها صغيرة . ظهورها وابيضتها الى البصرة . بطونها الى البياض || تألف المنافع ويجاري الماء والمروج الفتاه . قوتها الحوام والخشرات والقشريات . تكثر في المنافع بين الاعشاب . الاثني تحسن وسعها نحو ٤ بيضات .



طفسوس عادي

١٧٧٨٧ - طُكُل * **Sève (F). Sap (E).**

هو اللصق ونهم من عصبه بالتلف الحمايط .

١٧٧٨٨ - طُكُل * **Brume (F). Hize, Mist (E).**

قيل اخف المطر واضمعه وقيل الذي يقبل ويؤخر دونه المطر . ج طلال وطلال .

١٧٧٨٩ - طُلَاة **Faon (F). Fawn (E).**

الصغير البمر من ذوات الظلف ج . اطلال .



طُلَاة

١٧٧٩٠ - طُلَاة **Enduit, Vernis (F).**

كل مادة مائعة تستعمل طلياً .

١٧٧٩١ - طُلَاة ، طُلَاة ، طُلَاة * **Coating, Varnish (E).**

١٧٧٩٢ - طُلَاة **Luette, Uvule (F). Uvula (E).**

زائفة لحمية التركيب ، غروية الشكل ، متحركة ، ناضجة ، توجد تحت مشعل الحلقوم .

١٧٧٩٣ - طُلَاة **Habitus**

رسم هيئة الشئ ، او النبات الخارجية الطبيعية .

١٧٧٩٤ - طُفَيْة حَرَّة * **Echis echis,**

Echis vulgaris (S). Echis commun, Vipère des sables (F). Echis (E).

سيرة سرلودة من الاتامي اثيوبيات الاغانيه . جسمها معتدل الكثافة بطول نحو ٨٥ سم . ثوبها الى الصبغة الخفيفة متلوها وقرعة بياض غنية ونضلات اسودان متبرجان . لرسها لوزي الشكل . عظامها مستطلة الجرم . عيناها خرزيتان ، انثارتان . منقحها رافضان مرتفعان نحو الملاذ . عدد اسنانها ٤٨ منها ٢٤ في كل فك . عظامها اماميتان متصركتان || تسرح في الليل وفي النهار . تنس في الليل والتراب بصره . قوتها كل ما داب وطار وتكثرت منه || يباها الشقوي يستمر نحو حة اشهر . تبلغ كامل نموها بمر عشر سنوات وتعيش نحو ٨٠ سنة || الاثني تساقد بمر اربع سنوات . جراجها الشواري يحوي من ١٢ الى ٢٠ بيضة . يتفك البيض عند خروجه من الانطوية الى الجراب ثم يسلك الشوار حتى الفلج حيث يخرج لقاء النور جوارن كاملة البنية سارسة || لثقتها غمة ان لم تملح بصره وقد تكون قاسية اذا اصابت احد الشرايين الدموية || تعبر من الثمانين السامة المهيئة الشديدة الاثني .

١٧٧٩٥ - طُفَيْي ، طُفَيْي ، طُفَيْي * **Parasite**
كل كائن يعيش على ما هو حي من النبات او الحيوان .١٧٧٩٦ - طُفَيْي بَاطِي ، اُنْطُفَيْي **Entophyte**
نعت تعريفي يطلق على الفطور المهيمنة الفطرية التي تعيش داخل النبات المبتلى بها .١٧٧٩٧ - طُفَيْي ظَاهِرِي ، اُنْطُفَيْي **Ectophyte**

نعت تعريفي يطلق على كل فطيل ينمو على ظاهر الاعضاء النباتية او الحيوانية .

١٧٧٩٨ - طُفِين * **Immature**

نعت تعريفي توصف به الثمار والبذور غير الناضجة .

١٧٧٩٩ - طُوق * **Toecus (S). Tock (F). Tockus (E).**

جنس طير من فصيلة الاركوكيات . انواعه قليلة البند ، جميعها من الطيور الافريقية . اجسامها كبيرة القد . متايحها غليظة ، محببة ، مسنة الكفاف ، تتميز بتلوها من التندوات القرنية || يألف الحيس والقنابات والاحراج . قوته الثار والجربج والبذور والخشرات والعطاء والفئران || اعرف انواعه الطن الاحمر المنقاد .

١٧٨٠ - طُوقِ احمر المنقاد * **Toecus erythrorhynchus (S).**

Tock à bec rouge (F).

نوع من الطن . اطالته تمتد من الحيشة الى السنان . جسمه كبير القد بطول نحو ٨٥ سم . متقاد غليظ القاعدة مغوس الشكل ، مسن طلائع الخطل الاحمر ، احمر اللون . اسمر المنطق || يألف الفياض وضفاف الانهر . طيراته يديه المهي متقطع الشوط كالنقار || قوته الثار والجربج والخشرات والورع ويطن في يدين في تجاويف الجلعج . تضع الاثني من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها نحو ١٥ يوماً محجور عليها بالطين واقتش على غرار البشير والخنو .

1٧٢٠٧ - طلع اللوزي *
Ixodes reduvius,
Hyalomma aegypticum (S). Tiquet du bétail,
Réduve (F).

نوع من الطلع الاسمر، المبط، البيضا الشكل، الصغير
القد. الذكر منه بطول نحو ٤ مم. والانثى بطول نحو
١٨ || يتطفل على جميع اللوزي اغصانها الاوراق والاشجار
والجبال.

1٧٢٠٨ - طليحيات
Ixodidae (S).
Ixodidae (F). *Ixodidae* (E).

فصيلة حشرات من القرايات قوتها الدم تنصه حيث
تستطيع. اجناسها وانواعها عديدة، جميعها صغيرة القد.
ذكرها اصفر حبيبا من اناتها. تتميز باخطائها الثابتة
للحاسة الفشارية التركيب التي تتشبه في اجسام المواليد
التي تركبها. لذلك يصعب زرع الطلع في حاله دون
فصل جسمه حيث يبقى الرأس مع اجزاء الدم في جلد
المائل.

1٧٢٠٩ - طلع
الطلع : ما يني في الحوش والدير من ماء كثرت فيه
التعاطيس لا سبيل الى شربه.

1٧٢١٠ - طليحكم
هو القليل في ذروة يأسه ونشاطه.

1٧٢١١ - طليخة *
Botrytis

جنس تطور مجهرية من الطليحات. وظيفتها الوطيات.
يتبين جميعها المتور الاسطوانى الشكل، الطليح القطر،
اخلاوي او السطحي الانتساب. جرياره الكندي منصوب
الجلوس، حديد الفروع العمودية الاوتكان. كائانه
طرية، متقوية او ضمية التجميع، يضيء الشكل،
نحية الثلاث، وحيدة او ثنائية الخلية || انواعه كثيرة
العدد اعرفها وانهرها ما يتبع.

1٧٢١٢ - طليخة البصل *

Botrytis squamosa (S).
لفظ مجهرية يركب اوراق البصل فيسبب يباس اطرافها
بمنه انعطاف لونها || يكالغح باستعمال بيسلفيت
الكلسيوم.

1٧٢١٣ - طليخة التوليب *
Botrytis tulipae (S).

لفظ مجهرية يركب اوراق التوليب فيؤذيها وقد يصيب
الشمراخ الزهري فيطعمه || مظهره المخاربي يقع صغيرة
شبه مستديرة وباعية اللون تركب التعلل تقسب جفان
نسجه المتحارة || وهو على الشمراخ الزهري لطف متندرة
صغيرة تشبه الزهور به ان تسي الى مجعا || يكالغح
من ظهوره باستعمال بيسلفيت الكلسيوم وبطبخير
التربة بالكلورولين.

1٧٢١٤ - طليخة الثوم *
Botrytis alli (S).

لفظ مجهرية يمتري الثوم والبصل في اثناء صفاتها. مظهره
المخاربي وشاح كيندي له التجميع، خلي الحية، اغبر
اللون، يركب اقراص الثوم والبصل فيطعمه || يدارك
باختناط حفظ الثوم والبصل في الامكان الرطبة.

1٧٢١٥ - طليخة الدمية *

Botrytis galanthina (S).
لفظ مجهرية يركب السمكة عند انشاها من التربة
فيتمتعها بولاح اغبر اللون نقي الشكل يسطر على الازراق
فيقرسها بعد ان يؤدها ييهوره السود الكثيفة.

1٧٢١٣ - طلام، قنيز
Chênevis (F).
هو التوم اي حب الشامندنج.

1٧٢١٤ - طلايح
هي الاعراض التي تسبق المرض ويشير اليه.

1٧٢١٥ - طلايح
هي البواكير، اطليا.

1٧٢١٦ - طلب، عريضة، إلتباس
Requête (F). *Requet* (E).

هو كل مطلب يقفه صاحب ال سلطة تملك حق النظر
بقضية واجراء اللازم.

1٧٢١٧ - طلب، دعوى
Demande (F). *Demand* (E).

هو ما يرمسه الماوس على المحكمة راجيا تقرر ويحب حق
له. ويأتي بمعنى الدعوى تومًا.

1٧٢١٨ - طلب الإلغاء
Recours en annulation (F). *Petition for annulment* (E).

هو طلب الغاء على اداري.

1٧٢١٩ - طلب إعادة النظر في القضية
Pourvoi en révision (F). *Petition for rehearing* (E).

هو طلب اعادة النظر في بعض القواعد القانونية لتثبت
من صحتها او في بعض الاحكام لالغائها.

1٧٢٢٠ - طلب قبول الإلتباس
Reconition (F). *Reconition* (E).

دعوى ضايتها نفس الحكم دون الالتفات الى موضوع
الدعوى التي صدر عنها.

1٧٢٢١ - طلب ما فوق الحق

Plus petit, Ultra petit (F).
هو الحكم ينير مطالب الجسم كان يحكم القاضي بشي لم
يطلب منه او بشي يزيد عما طلبه منه.

1٧٢٢٢ - طلب نقض الحكم

Pourvoi en cassation (F). *Appeal for reversal of judgment* (E).
هو الطلب بإبطال حكم، صدر من محكمة الدرجة
الانتهائية، طعن فيه.

1٧٢٢٣ - طلة
Arôme agréable (F).

Agréable aroma (E).
الطلة : النيلة من الروائح. يقال رائحة طلة وخر طلة.

1٧٢٢٤ - طلع

هو السط الصمغي، يخرج من النضار يرعاها الايل. الواحدة
طلمة.

1٧٢٢٥ - طلع
hodes (S). *hode* (F).

جنس قراد من فصيلة الطليحات تتركه ادم الذي يصنع
من الحيوان || اشهر انواعه طلع اللوزي وطلع الكلاب.

1٧٢٢٦ - طلع الكلاب *
hodes ricinus (S). *Tique des chiens, Pou des bois* (F).

نوع من الطلع المبط الصغير القد. الذكر منه بطول
نحو ٢ مم. والانثى بطول نحو ٩ مم || يتطفل على معظم
الحوانات الوحشية والدايمة اغصان الكلاب والحيوانات
فيتمتع منها ويؤذيها.



طلع الكلاب



طلع اللوزي



طليخة البصل



طليخة التوليب



طليخة الثوم

متة: البيوض، الملقة، الغفاس، الغففة، الغفاتوريك،
النشبة.

١٧٣٢١ - ملقة الزئبق

Colla (S).

Colla (F). Colla (E).



ملقة الزئبق

ملقاي هو الاسم المعدي. جنس اسماك بحرية وتربية
من مفتوحات الخانة فضيلة الصابونيات. انولها المررة
سبة اعطائها احوار اهر اهد في اجسامها ردية الشكل،
مستطلة التيطيط، طولها من ٢٠ الى ٣٠ سم. اشلتها
كبيرة، وسبة الانفراج. زمانها الظهيرة صغيرة،
الصردية مستطيلة صلبة الشكل. الشرجية خبيقة،
مستطيلة، تمتد حتى طرف الفيل. اولها الى الزرة
انفراج المولج. بطونها الى الصغار للهاب || لحوبها
ماكولة، جيدة الصنف.

Pollen

١٧٣٢٥ - ملقة، وكيع

هو الصلح، اطلبه.

Spadice (F). Spadice (E). **ملقة، هبة**
شكل من اشكال الازهار مركب من محور يحمل ازراراً
لاطة وسيدة الشق، مثاله ازرار النخل.

١٧٣٢٧ - ملقة، وكيعي

Pollinique (F).

Pollinic (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالطلع كالجبوب
والانابيب الطلمية.

Talc

١٧٣٢٨ - ملقى

Mica

١٧٣٢٩ - ملقى، ميكا

سوانة الاروين والبراس واغلبه والمفتزة. وهو احد
الاجسام التي يتألف منها الفرائيت اي الاصل.

١٧٣٣٠ - ملقى، ميكاشيت

Micaschiste (F). Mica-schiste (E).

هو ما حوى الطلق والحجر اللغدي في الشيت.

Nuage peu épaie (F).

١٧٣٣١ - ملقة

الملقة ما وق من السحاب.

Botryosporium

١٧٣٣٢ - ملقوبة

جنس تطور مجهرية من الماصريات فضيلة الطليحات.
انزله قليلة البد والاش. مظهرا رية تركب النباتات
السقية الخزيلة من التنبليات الى الانجار الحرجية.

Faon (F). Faon (E).

١٧٣٣٣ - ملقي

القل : ولد الغبية ج اخلاء.

Tache, Souillure (F).

Smeare, Dirt (E).

١٧٣٣٤ - ملقة

Aveugle de naissance **ملقى، ملقى**

هو الكه اي الامى خلقة.

Astazique (F).

Astazic (E).

١٧٣٣٦ - ملقى، متحرك

ما كان بجالة الاثران المتضاد للمسر.

Nidifuge (F).

١٧٣٣٧ - ملقى

نمت تعريفي يطلق على فراخ الحبار التي تنقف نطشة
كاسية تصطبغ الاستفناء من ابوها.

١٧٣٣٦ - ملقة الزئبق

Botrytis ellipica (S).

فطر مجهرى يركب بعض انواع الزئبق فيسبب يفسل
اوراقها بعد ان يوشم نصلها يقع حيلة لاقية الشكل
والجميع || يكافح باستمال ييلقبت الكليوم.

Botrytis fabae (S).

١٧٣٣٧ - ملقة الفول

فطر مجهرى يركب اوراق الفول وله بسبب الانضار
والقرن || مظهره الخاربي فقط مشيرة مستديرة سمراء
اللون تركب النصل على صفحتي ثم تنقص فيلغ ظهرا
من ١٠ الى ١٥ سم. بعد ان ينصرف لونها الى الرمادي
الزاهي تنمطقه حلالا متنابهة سمراء المولج || وهو على
القرن يقع نصله او متراكبة تطفل القشرة السنية
نصلها وتبدلها || يكافح عند ظهوره باستمال احد
الظواهر الخبيقة. وين المستحسن انتاج البذرة الزراعية
للالاية التي تقفي عليه نخلو البذرة من هائل.

Botrytis infestans (S).

١٧٣٣٨ - ملقة الشب

فطر مجهرى يركب سرة القنب عند شفاها وعولما من البزرة
فيولها بسرة || مظهره الخاربي لطقة سمراء عرضها
نحو ١ سم. تفرق الباق نصلها وتسبب يفسلها مع اوراقها
وازهارها || لا يستحب الكافكة لانه حدى النبات،
قليل الانتشار.

Botrytis trifolii (S).

١٧٣٣٩ - ملقة النفل

فطر مجهرى يركب النفل في سرة واوراقه || مظهره
الخاربي يقع صغيرة مشيرة مستديرة سمراء اللون تملو السرة
والاوراق فتدبب جفاف النبات.

Botrytis panonice (S).

١٧٣٤٠ - ملقة الفوح

فطر مجهرى يصيب الفوح وزئبق الوادي. مظهره
الخاربي يقع فضيلة الشكل والحجم تركب الاوراق
والسوق والزيات. تبدو على النصل يقع صغيرة حواء
اللون ثم تنقص وتنصرف نحو السرة يقابلها على الصفقة
السفل يقع رادية خلية لينة || يكافح بمشعال
بيسلفيت الكليوم المركز ١٪.

Botrytis cinerea (S).

١٧٣٤١ - ملقة زنادية

فطر مجهرى ميم الانتشار يركب جميع المواد النباتية
النسطة او السائبة الى الاغداد. كما يركب نباتات
المصاري والمشاغل الكثيفة || مظهره الخاربي نولس
خل متكبوي احمل اللون.

Botrytis cinerea (S).

١٧٣٤٢ - ملقة زنادية

Catananche corallae (S). Catananche, Cupidonae
bleue (F). Blue cupidone, Blue succory (E). Rassel-
blume, Blue Rasselblume (D). Cupidonie, Belve-
dere curcino, Madre d'amore (I).

نبات عشبي بري مصر ميلول من فصيلة المركبات.
كان يستعمل في كتابة طلاس الحب والبفس. ساقه
دقيقة زهاء تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اوراقه خبيقة
مستطيلة. نصلها قرصي الانتشار. طولها يراوح بين
٢٠ و ٣٠ سم. نصلها ثلاثي البروق ثنائي او رباعي
التفصيص، على الصفقة السفل. ازهاره رديسي، فردى
الجميع. ازهاره الى الزرة || تنوره يسر من تموز
الى ايلول.

Botrytis (S).

١٧٣٤٣ - ملقبيات

Botrytides (F). Botrytides (E).

عارة تطور مجهرية من فصيلة الطليحات. اجنلها



ملقة الزئبق



ملقة الزئبق



ملقة



ملقاي

Tomocerus (S). * طُمُوسُر ١٧٣٤٨

Tomocère (F). Tomocerus (E).
جنس حشرات قافزة دامت من فصيلة الطموسريات.
أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد
المتلة الحارة || أجسامها صغيرة محرشفة تعلو من ٤
إلى ٥ سم. ألوانها إلى الخشنى للباين الماجات. حراشفها
إلى السرة المايقة الغضبية المواج. بطونها لامشوية التريجات
ميشرة الحلب الذي يكثر في الخضر || أشهر أنواعه
الطموس الميول (Tomocerus vulgaris) الذي يقيم
تحت الحجارة والاشجار وطلا الأفيار اليابسة .

Tomoceridae (S). * طُمُوسُورِيَّات ١٧٣٤٩
Tomoceridés (F). Tomoceridae (E).

فصيلة حشرات قافزة دامت من رتبة النكهدليات . اجناسها
أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اقطار البلاد
المتلة الحارة || أجسامها صغيرة ، محرشفة ، تعلو من
٢ إلى ٦ سم. ألوانها ملوكة ، يكثر فيها الخضاب السوي .
رؤوسها مستطرفة . الحاكها وكثيرها ناشرة . عيونها زيمية .
قرونها الاششائية رباعية الفصل ، مستطيلة . بطونها
سدسية السك والاششائية العرض . اجنحتها القفزية
نشطة وسليمة بمناس حادة . مكائنها مستطيلة مدنة
وهيئة . قوائمها معتلة الطول تنتهي باظفار حادة ||
اشهر اجناسها الطموس .

Boue (F). * طُمِل ١٧٣٥٠

Loup (F). * طُمِلال ١٧٣٥١
هو الذئب ، أظله .

Eau bourbeuse (F). * طُمْلَكَة ١٧٣٥٢
Muddy water (E). ما يني في الحوض من الماء الكثر .

Inerma (F). Thornless (E). * طُمْلُول ١٧٣٥٣
الطلول هو الباري . وهو من النبات ما كان سراً مسلأ
لا زغب عليه .

١٧٣٥٤ - طُمَم * طمم نظم البطار : يقع على حصن .

١٧٣٥٥ - طَمِن * طمين البطن من الارض : السهل المنخفض .

Alluvion (F). Alluvium (E). * طَمِي ١٧٣٥٦
هو ما يحمله النهر من تراب ويلين يتصلق باملاك الماخين
على ان لا يبلغ قلعة من ارض يضيئها الى ما بعدها في
سيبه او الى ما يقابلها . ويعبر الطمي ملكاً لمن لصق
بأرضه .

Cryptophytes (F). * طَمِيَّو ١٧٣٥٧

Cryptophyte (E).
نمت تعريفه يطلق على كل نبات ينمو تحت سطح التربة .
الكرم من النباتات الطرية .

Gymnocladus (S). * طَمِيلَة ١٧٣٥٨

Gymnocladé, Chicot (F).
شجرة حرجية وحيدة الجنس والنوع من العنديات وفصيلة
القرنيتات || ساقها متعصبة ، رقيقة ، عامة الاثان .
اوراقها صغيرة النصال السنانية الشكل . اعجازها غمرية
كبيرة القند ، يضاء اللون ، غصنها المواج ، خافتة الورد
الطري . ثمارها حنابل متساكنة تلفت بعض البزور
الآعية المادة .

١٧٣٣٨ - طَلِيل

الحصير للتمسج من دود او من سف .

Tellins (S). * طَلِيْس ١٧٣٣٩

Telline (F).
جنس حمار من الرنويات الصفحيات الخيشم . أنواعه
عديدة جميعها سيولانية الاصفاذ تعيش غارزة في رمال
الشاطئ .

Tellinidae (S). * طَلِيْسِيَّات ١٧٣٤٠

Tellinidés (F). Tellinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرنويات صفحيات الخيشم .
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من محجرات
الاراضي الطليانية والبعث الآخر معاصر . موطنها يشمل
معظم بحار العالم باستثناء المناطق القطبية || اصداؤها
تتروح بين المستطيرة والاحليلجية الرقيقة اللتن ، جميعها
متصلة القند او كيرة . ألوانها جميلة الالوان الزاهية يكثر
فيها الاجر ويشقائه || اعرف اجناسها واشهرها الطليس
والديلدان .

١٧٣٤١ - طِم * ما حل وجهه لئلا من غناه .

Tomate (F). * طَمَاتِم ١٧٣٤٢

رايح بطورة .

Rhus à feuilles d'épine (F). * طَمِيخ ١٧٣٤٣

الطبخ شجر يدعى به يحمي ادعاه احمر اللون . ويصنع ايضاً
الدرب ، اظله .

Ernilago * طَمَر ١٧٣٤٤

هو اللقن في الطمورة كفن البلال والكلاء والساقط
لحفظها مدة من الزمن .

Enfouissement (F). * طَمَر ، دَقْن ١٧٣٤٥

Burying (E).
وضع الشيء في التربة وطمرو كالبادر والاصمدة >

Pleocotus (S). Orellard (F). * طَمَرُوق ١٧٣٤٦

جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . أنواعه عديدة تتميز
بشواظ كبير ذاتها المدفحة فوق الجبهة . معظم أنواعه
يعيش في البلاد الباردة وبعضها يأنف للمناطق المعتدلة .
أهوه الممروق الميول .

١٧٣٤٧ - طَمَرُوقٌ صَيْدُول * ٥

Pleocotus auritus (S). Orellard commun (F).
نوع من الطمروق موطنه فسح الاربياء يمتد من آسيا المتلة
الى الشرق الاوسط واروپة وأفريقية الشمالية || ثوبه الى
الريدة الحليقة السوداء يقيق مع اقترابه من فيج الظفر .
طوله نحو ٨٥ م . يسلط ٢٥٠ م ، ذنبه ٤٠ م . ولذنه
٣ م || يألف في الشتاء جميع المواق القليلة الرطوية
وهو الممرقة الى الرياح الباردة كالبيوت المنفردة والحربة
والكهوف الجنوية المعرض . ويألف في الصيف الاشجار
الحرجية النضة والارواح المنفردة والمناور الشمالية للمرض .
يعيش جماعات قليلة العدد . يمشي على الارض ويتسلق
الحيطان كما تقفل الثمارة وبرسها . قوة الحول والذباب
والحشرات الصغيرة المختلفة . مسرعه يدمم من الفسق
حتى فحة الليل وين الفجر الباكر حتى الشروق .



طليس



طمروق ميول



طمور



طنانة التربة



طنانة الحقائق



طنانة الحراج



طنانة القاع



طنانة حطرة



طننجية

Rejeton (F).

Shoot, Sprout, Offshoot (E).

الطنج ج أطباب : عروق تنحسب من أروية الشجرة .

Tombereau (F). Tip-cart (E).

الطنج كالمصبة حربة للقل ذات دولابين .

Thunbergia (S).

Thunbergia (F). Black eyed susan (E). Thunbergia (D). Thunbergia (I).

جنس نباتات من فصيلة الانتشبات معقودة التعريف على اسم الطبيب الرحالة السويدي « طنجرج » . أنواعها ثمانية منها المشقية الحولية ومنها الليفية المعلقة العصرة . أوراقها متعابلة الأركانز ، قليلة أو سهمية لتصل . أزهارها كبيرة القد ، زاعية الألوان || أشهر أنواعها ما يتبع .

١٧٣٧٢ - طنجرجية عطرية

Thunbergia fragrans (S). Thunbergia odorifera (F). جنس سريرية عارية معمرة تملو نحو ١٥٠ م . أوراقها سهمية مسنة الحافة . أزهارها عاجية اللون ، فواصه العرف البصري . قطرها نحو ٣ م || أزهارها يستمر من أيار الى أيلول .

١٧٣٧٣ - طنجرجية مجنحة

Thunbergia slata (S). Thunbergia silae (F). جنس سريرية عارية معمرة تملو نحو ١٥٠ م . أوراقها سهمية الشكل متعابلة السنتين المنحرف . أزهارها صفراء اللون أو برتقالية يعلوها في وسطها مزاج أسود تنحسب بقية يضاء || أزهارها يستمر من حزيران الى تشرين الأول .

١٧٣٧٤ - طنجرجية مدججة

Thunbergia chrysops (S). Thunbergia dorae (F). عشة سريرية حولية زينية تملو نحو ١٠٠ م . أوراقها لولية الشكل . كأس زهرتها سهمية المنحرف . ثمرتها برجي الحية ، يتلاتها ذمية اللون ، أريجوانية المزاج يعلوها طوق أزرق . أزهارها يستمر من أيار الى أيلول .

Xiphidris (S). Xiphidrie (F).

١٧٣٧٥ - طنجرجية جنس حشرات من فصيلة الخنثريوات . أنواعها عديدة منتشرة في جميع البلاد المعتدلة . أجسامها اسطوانية الشكل طولها يراوح بين ١٠ و ١٦ م . أجنحتها سوية الألوان يعلو فيها الامس والحنطي . قروبا الانتشارية حولية التركيب ، أفضية الانتشاب . رواشتها شائعة كثيرة العروق . مزاوت أجنحتها صغيرة القد ذرية || قروبا غاشية تركب جذوع الأشجار الحرجية المائلة أعصها للث والحور والدرادر .

١٧٣٧٦ - طنجرجية

Xiphidridae (S). Xiphidridae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الأجنحة الأشربات . أجنحتها وانواعها عديدة تتميز باستدارة رؤوسها واستطالة أجنحتها وقصر الجوانب أجنحتها . قروبا غاشية تحلق وتزود بدجوع اللث والينزلا والسيتيان والحور والدرادر .

١٧٣٧٧ - طنجرجية بؤويسي

Tanytus culiciformis (S). Tanytus culiciformis (F). حشرة من فصيلة المنحشبات . جسمها قريب شبه من البعوضة ، يعلو نحو ٥ م . || قروبا الى الصلابة السراء يعلوها ، عذ الذكر ، سلطان السراء في الصدر وسط

Cheval de race (F).

Botte de roseaux (F).

Bunch of reeds (E).

حزمة القصب . والقصب الواحدة طن .

١٧٣٦١ - طنان

هو المثلوس ويضي الطائر الطنان والمطار كلباني .

١٧٣٦٢ - طنانة

Sonométrie (F). Sonometry (E). الطنانة علم يبحث في مقاييس الأصوات ومقارنتها .

١٧٣٦٣ - طنانة

Bombus (S). Bourdon (F). Humble-bee (E). جنس حشرات نافعة من فصيلة النحل . أنواعها نحو ٢٠٠ موطنها العالم . تتميز بأجسامها الخطية الزهراء . أنواعها عديدة الألوان أزواحية المنفصلة ، منها الأصفر والاحمر والأبيض والأصفر والأصفر والبنفسجي || قروبا العلف ورسوق الأزارار . وهي من الحشرات النافعة للميدان لأنها تساعد على تأخير الزهر وأخصابه || لم أنزلها وأشهرها ما يلي .

١٧٣٦٤ - طنانة البرية

Bombus terrestris (S). Bourdon terrestre (F). طولها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ م . رأسها أسود يعلو توضع احمر وسط اصفر . قروبا سوداء . جوشها والمنفصل الأول من يعلو الى الصفرة . منفصلها الثاني والثالث الى السواد اللامع . اما الرابع والخامس فالأبيض الاخير . قروبا سود . عرشها متوسط القد في التربة أو تحت الشيا . تسرح ابتداء من أواخر أيار .

١٧٣٦٥ - طنانة الحدائق

Bombus hortorum (S). Bourdon des jardins (F). طولها نحو ٢٠ م . رأسها أسود يعلو توضع احمر . جوشها وقروبا والمنفصل الأول من يعلو الى الصفرة . منفصلها الثاني والثالث الى السواد . اما الرابع والخامس فالأبيض . قروبا سود . عرشها كثير العدد . تسرح ابتداء من نيسان . تألف الحقائق والجنانز القريبة من الأماكن الآهلة .

١٧٣٦٦ - طنانة الحراج

Bombus sylvarum (S). Bourdon des bois (F). طولها نحو ٢٠ م . جسمها كفيف الزغب الدقيق الطويل . ثوربا الى الصفرة الشفراء . قروبا جووية اللون . عرشها كثير العدد . تسرح ابتداء من أيار . تألف الحراج والذباب الكيفية الظليلة .

١٧٣٦٧ - طنانة القاع

Bombus lapidarius (S). Bourdon des carrières (F). طولها نحو ١٦ م . ثوربا الى السواد اللامع . منفصلها الثلاثة الطرفية الى الحمرة الصنائية . قروبا سمر يعلوها زغب احمر . عرشها متوسط القد بين الحجازة والصخور . تسرح ابتداء من أيار .

١٧٣٦٨ - طنانة عطرية

Bombus fragrans (S). Bourdon parfumé (F). طولها نحو ٢٠ م . رأسها ويعلو الى الصفرة . جوشها زيتوني . قروبا سود يعلوها زغب اشقر . عرشها قليل العدد تقيم في صمغ الاشجار . تسرح ابتداء من أيار .

خاسيا الفصّل. جوشها اصفر من بطنها. بطنها يبيّض الشكل. مرزّتها مستقيمة. اجنتها حاملة اللون، مهدبة الاطراف. ثوبها الى البني الاشقر المواج || تربيتها منتشرة في اودية وامريكة.

١٧٢٨٨ - **طنجوشيات** (S).
Trichogrammidés (F). Trichogrammidés (E).

فصيلة حشرات من رتبة عشائيات الاجنحة المصنوعة. اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها نائمة تغطّل على مكن الحشرات من غثفل الفصائل || حشرتها شديدة الصغر طولها من ١ الى ٢ مم. اجسامها ديمية. جواشها اقصر من بطنها. قرونها الاستشعارية قصيرة، خماسية الفصّل او سباعيتها. ارسافها ثلاثية الفصّل. مرزّتها قصيرة، مستقيمة. اجنتها مهدبة الحصار || اشهر انواعها الطنوش الشارد.

١٧٢٨٩ - **طنجاف** (S).
Stetun هو السديم ضرب من السحاب المرتفع.

١٧٣٩٠ - **طنجر**، **لقاء** (F).
Asepsis, Aseptic methods (E).
استخدام المواد البنية او الفاسدة التي تنقل الامراض.

١٧٣٩١ - **طنجورج** (S).
Ithaginis (E). Ithaginis (F).
جنس طير من الدجاجيات وفصيلة الطيوريات. انواعه المعروفة خمسة موطنها جبال الهند. لونها الحيالي جامي. قربها الاغشاب والحبوب والجلداتير والحشرات اغصها النمل || اجسامها متوسطة الطول من ٤ الى ٥ سم. اقواها الى الطحلة السراء المنطوية الماجات. رؤوسها صغيرة متوجة بفتاير لاقائية التنجيع والاستاطاة. صويتها مطوقة بالايض. مثالبها قصيرة ورفيعة. اعناقها طويلة. اذنانها متوسطة الطول، مقنطرة الاطراف || الانثى اصفر قدام من الذكر واقنع لونها منه. تكثر الصومع في الارض. تعيش من ٧ الى ٩ بيشات تحضنها نحو ثلاثة اسابيع بينما الذكر يبيت لها الغذاء || تعتبر من الطرائك الفاخرة.

١٧٣٩٢ - **طنيس** (F).
Endonastie (F).
الطنيس الثفاف الزنبد على السوق تسهيل لجوز الوردية من الوردية.

١٧٣٩٣ - **طنيس** (F).
To detariorate (E).
افسد العمل بسوء تصرفه.

١٧٣٩٤ - **طنيف** (F). Fresh (E).
نمت وصفي يند على طراوية الشيء كقشك زينة طيفه اي طازية.

١٧٣٩٥ - **طنيف** (S).
Milium nigricans (S).
Mals de Guinée (F). African millet-grass (E). Ecthas Flaccargras (D). Milio nero (I).

نبات عشبي زراعي حولي من التنجيليات. مهد البلاد الافريقية الحارة حيث تكثر زراعتها نظراً لاستعماله الغذاء والمالني. وهو قريب الشيء من القطن. اوراقه كبيرة القند، صلبة النصل، متقاربة الابعاد. حشوكه الزهري كبير الحجم. ثماره حبوب صغيرة مستديرة مغلقة فبره اللون.

سلط متدّنة في البطن. اما السلط المتدّنة في ثوب الانثى صفراء اللون || رأسها مستعرض. زياتها ورشيان عد الذكر، قلايدان عند الانثى. ورشها، عند الشقين، الى البياض الاخير المرقوش بالخطلي. قوامها الى الصفرة، مفاسلها سود || تظهر الحشرة الجملة من ايار الى تشرين الاول. تألف حشرات المنطق ويجاري الماء || يربتها عالية ثم قازية، وانجها ودائمة.

١٧٣٧٨ - **طنج** هو المور، الحلبه.

١٧٣٧٩ - **طنش مبدول** (F).
Tanrac comusa (F).
حيوان لين حائر يقى مذال، الحلبه.

١٧٣٨٠ - **طنز** (F).
طنز غريب من السك (الحيد).

١٧٣٨١ - **طنطور الجندي** (F).
Tanghin, Tanghin (F).
مادة جبالية تستخرج من عصارة ساق الطنينة السامة او من لباب ثمارها.

١٧٣٨٢ - **طنين** (S).
Tanghinie, Tanguin (F).
جنس اثمار برية وزيتية من فصيلة الفصليات انواعها المعروفة خمسة جميعها كبرية القند تملو من A الى ١٥ م. اخشابها صلبة متينة عطرية اللون. ثمارها نووية الشكل بنقية الحميم لونها يراوح من الاصفر الى الاحمر || اشهر انواعها الطنينة السامة.

١٧٣٨٤ - **طنين سامة**، **طنين مفسك** (F).
Tanghinie venenifera (S). Tanghinie de Madagascar (F).
نوع من الطنينة يهي ثمرة جملة الختام تملو نحو ١٥ اطار. اوراقها سائبة الشكل، نصلها جلد الصفرة حاقب انفسار اطل المواج || يستخرج من لباب ثمارها وين صارة ساقها مادة جمالية شديدة القوم تشل القلب والجهاز العصبي || يقال ان يقر ملك مفسك امر عام ١٨٣٠ باستحار جميع ثمره الجزيرة وقلها وكان مدم نحو ٦٠٠٠ فتم جلبهم باجترار صارة الطنينة السامة لتستريح البلاد من طفة الابهالة. وهكذا كان قاترا جميعهم بيوم واحد.

١٧٣٨٥ - **طنف**، **طنف** (F).
Auvent (F).
Pant-roof, Porch-roof (E).
الحيد من الجبل وما تشأ منه. والبرز الحائط وما اشرف غاربا عن البيت. والسقفة تشرع فوق باب الدار.

١٧٣٨٦ - **طنف** (F).
Auvent (F).
طير احمر يشبه السم (السان).

١٧٣٨٧ - **طنشوش شارد** (S).
Trichogramma evanescens (S).
Trichogramme errant (F).

حشرة نائمة من فصيلة الطنوشيات. موطنها بعض مناطق البلاد المتدلة الحارة. تغطّل على مكن الحشرات ومنها الترميزات (الكوشيل) || جسمها صغير القند بطول نحو ١ مم. رأسها مستعرض الجرم. زياتها قصيران، منفرجان.



طنشوش شارد



طجورج



طنف



طوباب مهذب

كبيرة ، ناضرة ، متباعدة عند الشقين . قربها الاستعمارية صغيرة ونحيلة . اعطائها لثقة او ماسة . كولها مستطيلة الشكل ، مبررة الحلب . شيلاتها كبيرة . بطونها شبه اسطوانية . قوائمها نحيفة . ارجلها كبيرة ، اثناسها الاسود ثم الاسمر الحلي || يرقتها ونجها او نائلة او غاحلة || اشهر اجناسها الطواسة والكردودة .

١٧٤٠٣ - طويكوك في الانثلة السوداء ، اطليا .

١٧٤٠٤ - طويكوكية التصرف (F). Disponibilités (F). Disposal (E). في في القانون المدني صفة متعلقة بالاموال يجعلها قابلة للتسليك .

١٧٤٠٥ - طويكوك الساق ، طويكوكيات الساق

Echassiers (F). Wading-birds (E). ربة من الطيور تتميز باستطالة سيقانها واعناقها وبانقيادها . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع في مشرة فصائل : القشريات والقشليات والقشليات والحياريات وحياريات الارض والفرزقيات والكركيات والقشليات والتسميات والكتاتيات

١٧٤٠٦ - طويكوك القرون في القزليات ، اطليا .

١٧٤٠٧ - طويكوكية * ، طويكوكية * Tupala (S). Toupala, Cladobate (F).

جنس حيوانات لينة حاشرة من فصيلة الطويكيات . انواعه المعروفة مبع . اعطائها تمتد من الحد الى الحد الصيفية والامام ويبرز الاربعين حتى صوته ، والقشليات تألف القنابات والاحراج . تسلك الاجمار بقعة . تسرح في التار وتبيت في الليل ، قوتها الحشرات والفروع والقشريات والجرذان ... || اجسامها تعول من ٣٠ الى ٥٠ سم . بما فيه الاذنان التي تطول من ١٢ الى ٢٢ سم . رؤوسها مستطيلة الاعظام ، غروبية الشكل . سبالها كبيرة . عيونها واذاها صغيرة . اذنانها مستطيلة جلة . ارجلها تختلف مع الانواع . اناها رباعية الاطراف .

اعرف انواعه واشهرها الاربعه التالية :

طويكوكية اسمر حديدي * Tupala ferruginea (S).

طويكوكية تانا - تانا * Toupala ferrugineux (F).

طويكوكية تانا - تانا * Tupala tana (S).

طويكوكية جاوا * Toupala tana, Tana (F).

طويكوكية جاوا * Tupala javanica (S).

طويكوكية نيكوبار * Toupala de java (F).

طويكوكية نيكوبار * Tupala nicobarica (S).

طويكوكية نيكوبار * Toupala de Nicobar (F).

١٧٤٠٨ - طويكوكيات * Tupalidae (S).

Tupalidae, Tupalidae (F). Tupalidae (E).

فصيلة حيوانات لينة حاشرة مشقة . اجناسها وانواعها قليلة البدن . اعطائها المناطق الحارة والاستوائية من الحد الى الامام ويبرز الاربعين || جميع اجناسها مبررة ، مستطيلة الاجسام والاذنان ، قريبة لثية بالسحاب . رؤوسها غروبية ، ذلقة الاعظام . اذنانها صغيرة . قوائمها الخلفية اطول من الامامية || تألف القنابات والحراج . تسلك الاجمار بقعة . قوتها الحشرات والقشريات والفروع والقشريات اعرف اجناسها واشهرها الطويكوكية .

١٧٣٩٦ - طوباب مهذب *

Dolomedes fimbriatus (S). Dolomedes franqé (F). Long-legged spider (E). Gartealchaspine (D). نوع من العناكب القانصة الساعية ثنائية ارجلها ساعية المشانق ينتمي الى فصيلة العنكبوتيات . جسمه متوسط القد بطول نحو ١٨ سم . عند الذكر ونحو ٢٤ سم . عند الانثى . صدراها اعليجلي الشكل ، اصعب اللون ، اثير التشريح عينا ، زيمتان ، شيفاه ضليمان ، عديا الغلاف . فكاه مستطيلان . جزامه قوية ، نحيفة ، مبررة الحلب . بطة مستطيلة الشكل البيضي ، حلي الاذن ، اسمر الحلي ، يملو تشريح ابيض واسود وحار مهذب الحبر || يال المنافع والاحوار . قوتها الحشرات الحليانة . يسرح في التبار . عكبه كالجارب ونسجها تحت الحجارة في مكان قصه || ملجته الحلياني لا يختلف من ملجين سائر العناكب .

١٧٣٩٧ - طوباب

Fourrage débine (F).

Straits fodder (E).

اليسير من الكلاء .

١٧٣٩٨ - طوباب

حشائش مرة كانت تأكلها اليهود في القصح . (السلان) .

١٧٣٩٩ - طوباب

Pimeleptacur tahmal (S).

Piméode (F).

سمكة بحرية مأكولة من متوسعات المثانات وفصيلة السلوريات . توجد في مطر البلاد الحارة . تتميز بزاية شكلها ، بقصر رأسها المقطوم ، بكثرة طبقاتها الفكية وباستطالة بطن حشائها الزمنية كما يبدو في الرسم . وهي عادمة الانسان ، خلية النظام الفكية .

١٧٤٠٠ - طوباب

Chautilia (S).

Chautille (F).

جنس حيوانات برية من الرغويات مديات الاربعين وفصيلة الحارويات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٢٠٠ متشرة في جميع الاصقاع الحارة والمعتلة الحارة || اصداها صغيرة القد وشبهية الشكل المستطيل . اطولها تراوح من ٨ الى ٢٠ سم . تعيش في المواق الرطبة وقرب المنافع ويجاري الماء . قوتها المواد النباتية .

١٧٤٠١ - طوباب

Scatophaga (S).

Scatophage (F). Scatophaga (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة الطويكيات وربة ذوات الجنانين . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في مطر اقطار العالم || اجسامها هياض تطول من ١٢ الى ٢٢ سم . رؤوسها كبيرة . ميزنا ناضرة ، متباعدة عند الشقين . قربها الاستعمارية شديدة القصر لتتبي بسيلة دقيقة . اعطائها ضليمة ، ثالية . كولها بطونها متكافئة الحلب . رواشها ملية . قوائمها نحيفة ، مبررة الحلب . ارجلها ملية ، اجسامها الحلي || الحشرة الجملانة قانصة . البرقة نائلة وواجبة .

١٧٤٠٢ - طويكيات * Scatophagidae (S).

Scatophagidae (F). Scatophagidae (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجنانين . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة البدن ، منتشرة في مطر اصقاع العالم . جميعها من القباب الملح اللحم || اجسامها متفاوتة القد ، تطول من ٤ الى ١٤ سم . رؤوسها شبه مكورة . ميزنا



طوباب



طوباب



طوباب

Phase

١٧٤١٧ - طور - Brebis (F), Ewe (E).

١٧٤١٦ - طوبانة

هي النجدة . ج. طوبانات . ولا يقال لكيش طوبال .

Disphase

١٧٤١٨ - طور انفصالي

١٧٤١٩ - طوبنة هي الاقنوص ، اظلمه .

Geopelia (S).

١٧٤١٩ - طوراني * ، طوروي

Géopélie, Pigeon-épervier (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحماميات . يتميز بصفرة ريشه وشكله واستطالة أظفره المتراصة الريش . قوته إلى الصعرة المخططة والمؤنثة بالأسود || موطنه الشرق يألف القتالي والحلق والزمردية . اسرايه صغيرة . يروح عدد أفرادها بين ١٢ و ٤٠ . قوته الجيوب والبلور . يند في الجينات والإفلال قليلة الارتفاع . أثناء تبيض يستعين على مرتين في السنة .

١٧٤٢٠ - طورانية *

Toranis gloriosa (S).

دوبية من التناكب الساعية القانصة ، ثنائية الرواية سداسية المشان تنتمي إلى فصيلة الحماميات . موطنها بعض المناطق الاستوائية من العالم القديم . تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة || جسمها صغير القند بطول نحو ١٥ سم . عند الذكر وهو ٢٠ سم . عند الأنثى . صدرها مستدير الشكل ، سطلي اللون ، اسمر المزاج . جناحا زغبتيان . فكها صغيران . جرابها كبيرة ، كثيفة الحلب . يطها يضيء الشكل ، اسمر اللون منقط بالآخر كالجملاز || لسمها مؤذية تسبب بعض السموم .

١٧٤٢١ - طوروي *

Corythax, Turacus (S).

جنس طير من فصيلة الموزيات . أصله البلاد الإفريقية الحارة . أنواعه المروقة قليلة العدد . جميعها آكلة . أحجامها تتراوح من ٤٣ إلى ٤٧ سم . ألوانها جميلة الألوان القانصة . متغيرها صغيرة ، غريبة الشكل ، شاذة الخطم العليا الموهوبة الطفاف . رؤوسها حادة بفتحة غريبة الشكل || أحرف أنواعه وأشهرها الطورق الإفريقي .

١٧٤٢٢ - طوروي أزجواني *

Corythax Buffoni, Turacus perris (S).

نوع من الطيور . أصله تشتمل معظم مناطق إفريقية الجنوبية . يألف الإحراج والقباب والتعاض حيث تكثر الثمار والحبوب البرية || جسمه بطول نحو ٤٧ سم . قوته إلى الحصار الإسيواني المزاج . جناحه مخططة بالآخر الأبيض والأزرق والآخر والأبيض . ذنبه إلى الزرقه المائلة الخضراء المزاج . قزخته خضراء القانصة والزمان الأول ، ينفسجية الزمان الثاني ، حمراء الثالث والرابع || يند في تجاويف الأشجار القديمة المهم . أثناء تقصع أربع بيشات تحضنها بمثابة الذكر || قوته الثمار البرية والحبوب . يعيش في التجمع إنما يربح في المواقع الظليلة . قوته في الاسر يرتكز على الثمار الباننة والرز المسلوقة والتجز المائل بماء السكر .

١٧٤٢٣ - طوس *

Pollution (F).

Pollution, Swarming (E).

١٧٤٢٤ - طوس هو الجبان الحبيبي ، اظلمه .

١٧٤١١ - طوبين Talpa (S), Taupe (F), Mole (E).

جنس حيوانات من آكلات الحشرات وفصيلة الطورينيات أنواعه المروقة ١٠ موطنها العالم القديم . أشهرها العلويين الجلود أو أظلمه الاروبي . جميعها جامة تعيش في أنفاق ورداء تخدعها على أحراق مختلفة تراوح بين ٣٠ و ٧٠ سم . أحجامها ممتدة استوائية بطول من ١٢ إلى ١٥ سم . رؤوسها رشيقة تلتهب بفتافيس صفية . عينها غريبة صغيرة . أذنانها المخاربية طامسة . أذنانها جدام تطول نحو ٢ سم . أظفارها قصيرة مستعرجة خلسية الأصابع المهيزة بالأظفار القوية المستطيلة الليرة . أرجلها صغيرة القند والأظفار || أذنان تحمل مرة في العام وتقع من جبرين إلى خمسة جبراء || يختبئ العلويين من الحيوانات المؤذية لانه يقضم كل نبات يخرى طريقه في التحري من الحشرات وهو يسرح أربع مرات في النهار عند الصباح وعند الساعة الثامنة وعند الظهر وعند الغروب || يتكاثر باستعمال الفخاخ والمصايد والعظم للسم .

١٧٤١٢ - طوبين أمريكي *

Scalops parvus (S).

حيوان لبين ساحر جاس من فصيلة الطورينيات . أصله بعض مناطق الولايات المتحدة أحجامه فلورديه والتكساس || جسمه صغير القند كروم بطول نحو ٢٠ سم . رأسه كبير الحجم مستطيل القند الذي يغير شكله الزبابية . عيناه غزيرتان . أذناه مساحتان ، طمستان . يذء قصيرتان غليظتان مغطيتا بالأصابع المهيزة بأظفار قوية . ذنبه شديد القصير عادم الور . قوته إلى الصعرة المابقة باستثناء آلة الرأس ومقحم القوائم فانها إلى الدرة الصفراء || يعيش تحت الأرض في أنفاق تخدعها على أحراق متفرقة النور أفضاءا ٤٥ سم . قوته الهدان وإساريه الحشرات ويرقاتها وراذن النمل والشنق ... || الأثى تحمل مرة في العام وتقع من جبرين إلى ثلاثة جبراء .

١٧٤١٣ - طوبينيات Talpidae (S).

Talpidae (F), Talpidae (E).

فصيلة حيوانات صغيرة من رتبة الحشرات تشمل العلويين واللبان .

١٧٤١٤ - طوت Totia (F), Grivet (E).

هو حبرس سبأ ، اظلمه .

١٧٤١٥ - طوق Plancton, Plankton (F).

Plancton (E).

كلية من المواد العضوية المنصودة بالماء قولها جسموات من الحيوانات الدنيا المائية والنباتات المهيضة من وحيدات الخلية . البتر أولاد من ماء البحر يحوي نحو ٥٠٠٠٠٠ كائن حي من هذه الحيوانات الدنيا والنباتات المهيضة . وسيت أن هذه الكائنات تتكاثر بسرعة لا مثيل لها ، تراوح من يوم إلى يومين ، لذلك فالطوح يعني كامل كائنات الكتلعة من حبة بيضة . ج. الطوح .

١٧٤١٦ - طوح Planctique (F), Planktic (E).

نعت ترميني يطلق على الكتل العضوية العائمة في الماء أو الثابتة فيه .



طوبين امريكي



طوراني



طوبانية



طورق لارجواني

١٧٤٣٨ - طوقك

أرض مستديرة سهلة بين أرضين غلاظ .

١٧٤٣٩ - طوقريون ، طوقريون

Teucrium (S), Germandrée (F), Germander (E).
جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الشفويات
أزواجه نحو ١٠٠ منظرها عشبي لذي مظهر شائع الاستعمال
الطبي . منافعها عديدة يزيل السعال ويقيح السعال . وهو
مر الطعم ، حار ومو ، يفر السعال ويقيح الاصاب
ويقيح على اللبدين || أوراها متعاقبة مفرقة كثيرة
التفرع . أزهارها ابيض غنطلة الالوان || اشهر أزواجه
ما يلي .

١٧٤٤٠ - طوقريون أصفر ، عشب الطحال

Teucrium flavum (S), Germandrée flavescens, Pouillot jaune (F), Yellow germander (E), Gelber Gamander (D), Camendrio giallo, Querciola maggiore (I).

عشبة برية معمرة تملو نحو ٤٠ سم . ساقها فروصا
متعصب زيا اللحم . أوراها كثيرة مفرقة وسنة التصل
الحمل البشرة على صفحيه . خلل أوراها وزنب خضاه
فروصا وساقها يبيض اللون ، صفر المراج . أزواجه
رؤسية التجميع ، حامية الزنكاز ، صفراء اللون .
أزهارها يستمر من حزيران الى آب || يقال انها تنفي
أكثر حال الطحال .

١٧٤٤١ - طوقريون إكزيري ، بكلك العروق

Teucrium creticum (S), Germandrée crétoise, Pouillot de Crète (F), Cretan germander (E), Cretischer bergwandell, Ysop-Gamander (D), Camendrio di Crète, Querciola di Crète (I).

عشبة برية طيبة معمرة مهادا الشرق الأوسط . يقال انها
من النباتات النافعة للناظف . تملو نحو ٨٠ سم . ساقها
فروصا متعصب . أوراها تطول نحو ٤ سم . وتعرض نحو
٦ م . أزهارها بنفسجية اللون ، فردية أو ثلاثية التجميع .
أزهارها يستمر من أيار الى تموز .

١٧٤٤٢ - طوقريون جبلي

Teucrium montanum (S), Germandrée de montagne, Pouillot de montagne, Thym blanc (F).

عشبة معمرة تملو من ١٠ الى ٢٥ سم . ساقها فروصا . فروصها
غشوشة ، غنطية ، مستديرة الاعوجاج . أوراها لافقة ،
ضيقة التصل ، خضراء الصفحة السفل . أزهارها يضاء
اللون ويلوحا موانج اصفر || أزهارها يستمر من أيار الى
آب .

١٧٤٤٣ - طوقريون شرقي

Teucrium orientale (S), Germandrée d'Orient (F).
عشبة برية وتزيينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ساقها
فروصا متعصب . أوراها غنطية التفريش . تصلها بدت
الحضار ، خلي البشرة . أزهارها متفوية التجميع ، زرقاء
اللون || أزهارها يستمر من تموز الى آب .

١٧٤٤٤ - طوقريون كبير ، طوقريون ليبي

Teucrium fruticosum (S), Germandrée ligneuse (F).
جنت تزيينية تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . فروصها
نباتية متباعدة . أوراها ممتدة مستطيلة . تصلها بارز
العروق والشرانين ، أزغب الصفحة السفلى . أزهارها
كبيرة الله ، زرقاء اللون ، أزهارها يستمر من شباط الى
حزيران || وهي من النباتات المجادة التي ترعب في بعض
الآربة للمدينة والمواقع الخاصة .

Châtré (F).

To castrate, To geld (E).

انزع الخصيتين في ذكور الحيوان .

١٧٤٣٦ - طوشاه

Asandra, Anandraire (F).
الطعام كل زهرة عاصمة الجهاز الذكري .

١٧٤٣٧ - طوشن ، مكشوش

Chapon (F).
فرخ اللجاج الفضي . ج طوشن وسقائش .

١٧٤٣٨ - طوط

Epervier commun (F).
هو الباشق المعروف ، اطليه .

١٧٤٣٩ - طوط

هو القطن او قطن البردي .

١٧٤٣٠ - طوطانيات

معامرة من فصيلة ذبابيات الارض . اجناسها وانواعها
مدينة جميعها من الفواظ الصغيرة اللد . أثوابا منقطة
مرقطة ، قطبا اهلجية الشكل . متاثيرها دقيقة نصفية
التعبد . ارساغها غنطية || تألف مجاري الماء وضطوط
البحار والواهار . قوتها اللبدين والشرارات والرسويات
والفقرات || تدش في الاشجار وبين الاعشاب وعلى
الآراب . الاث تبيض نحو ، يضاء تحضها سحبا
من ١٧ الى ١٩ يوم || اشهر اجناسها اللطوى والفرع
والقنص .

١٧٤٣١ - طوطي

هي البهنا (من ابي حامد الغزالي).

١٧٤٣٧ - طوشي

Spontané (F), Spontaneous (E).
نعت ترميني يطلق على كل نبات يتكاثر تلقائيا في تربة
معتة والقيم غنطية .

١٧٤٣٣ - طوشية

Spontanéité (F), Spontanéity (E).
صفة ما هو تلقائي .

١٧٤٣٤ - طوطي

Fretin (F), Fret (E).
اطار من حديد يطوق بعض الاشياء لمنع تصلعها . واطوق
هو حاويل التخل الذي يستعمل في الصيد البيا .

١٧٤٣٥ - طوقان

le Toucan (F), the Toucan (E).
الطوقان كوكبة نجم جنوبية الموضع تشبه بشكلها طائر
الطوقان || عدد نجومها ١٤ جميعها من المرتبة الخامسة
وما دونها .

١٧٤٣٦ - طوقان

Rhamphastus (S), Toucan (F).
جنس طيور امريكية مستهجنة الشكل . موطنها البرازيل
والغويان وبولارما . اجسامها كبيرة لثد طولا براوح بين
٥٠ و ٧٠ سم . أثوابا مختلفة يكثر فيها السواد اللامع .
اعتناها وعاسرها يبيض . أذناها حمر الالوانيك . متاثيرها
خليلة الشكل ، كبيرة الحجم ، وردية اللون ، سود البنية .
تألف اللابات وتدش في صلوح الاشجار . قوتها البار
والشرارات والفروع .

١٧٤٣٧ - طوقانيات

Rhamphastidae (F), Rhamphastidae (E).
فصيلة طير من المستنقعات . اجناسها وانواعها مدينة تتميز
بشكل متناقضا اللطيفة المصنوعة . اصطناعا البلاد الحارة
والاستوائية . اشرف اجناسها واشهرها الطوقان .



طوقان



طوقريون اصفر



طوقريون اكريني



طوقريون جبلي



طوقريون شرقي



طوقريون كبير

١٧٤٥١ - ملقون نكتات

Dendroplex picus (S).

Talapiot-pic (F). Talapiot-pic (E).

نوع من الطوب. طائر من فصيلة الطولييات. موطنه معظم المناطق الغربية من أمريكا الجنوبية. يألف الغابات والرياض حيث تكثر الديدان والاساريع والحشرات || جسمه مثلث القد بطول نحو ٢٢ سم. يتميز بمقناده الجالس كالحرية المستقلة الطرف. ثوبه الى القطعة السوداء يملوها بتجميع معترض اسود في الجناح والذنب وريشة سوداء في الصدر. صدره وبطنه وزنكاه الى الشقطة السوداء. حلقه عينه الى الزرقاء. مقناده وساقاه الى السرة الباقية || يتسلق الاشجار من الصباح الى المساء وينكت القشور والقحاء في طلب الديدان والاساريع || يذلل منه في تجاريف الاشجار. الاثنى تقسم من يمشين الى ثلاث بيضات بحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما.

١٧٤٥٢ - ملقونيات

Dendrocolaptidae (S).

Dendrocolaptidae (F). Dendrocolaptidae (E).

فصيلة طير من الجوارثم الملتصقات يقبضات المناظير. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٧٠ موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية. تألف الغابات والرياض والاسراج الجبلية. قوتها الحشرات واساريعها || اعرف اجناسها واشهرها الطوب والقضاب.

١٧٤٥٣ - ملقونق ، طورق

Torreya (S)

Torreya, Torreya (F).

جنس اشجار حرجية من الطقوسيات. انواعه عديدة مهددا الشرق والبلاد الامريكية. اجناسها متوسطة القد دائمة الخضار. غراحيها متعاقبة ابيدة. اوراقها حرة ثنائية الصف. مثقبة ، احليلية، ذرية. تصلها جامد التسج. شائك القصة ، حايق الخضار، تحطط الصفحة السفلى. اشهر انواعه مايل.

١٧٤٥٤ - ملقونق جوزي القصر

Torreya nucifera (S). Torreya à noix (F).

شجرة سروية حرجية وزينية بطيئة النمو. مهددا اليابان تملن من ٧ الى ٢٠ م. غراحيها تدور خضراء اللون ثم تنحرف الى الجارية. اوراقها شديدة الخضار النابك اللامع. مسام تصلها عند فركها نحر رمي المواد العنينة الكريكة الرائحة || ثمارها جوزية القد والشكل، لونها الى الأخضر المنشد بالابيض تقطيه بعض الحلووط الحمر.

١٧٤٥٥ - ملقونق زربني الورق

Torreya taxifolia (S). Torreya à feuilles d'if (F).

شجرة حرجية جادسة مهددا اسراج فلوريدا من اعمال امريكا الشمالية. تملن من ٧ الى ١٠ امار. غراحيها شديدة الخضار. اوراقها زربية الشكل ، ابرية المقصة، فواصة الرائحة الكريكة.

١٧٤٥٦ - ملقونق كبير

Torreya grandis (S).

Torreya grand (F).

شجرة سروية حرجية وزينية ، بطيئة النمو ، مهددا الصين. تملن من ٢٠ الى ٣٥ م. غراحيها فسقية اللون. اوراقها تطلو نحو ٤ م. تصلها لاح الصفحة السفلى المستقيمة اللون ، باعث السفلى المعتدلة الخضار ، ثمارها بيضنة الشكل، صفراء اللون تطلو نحو ٣ م. وتعرض نحو ٢.

١٧٤٥٥ - ملقونون كوربي ، ماروم ، صمتر

الحمر ، صمتر مسمخور

Teucrium marum (S). Germandrée ambrée, G. maritime, Marum, Thym aux chas, Herbe aux chas (F). Marum-germander, Cat thyma (E). Katzen-gamander, Katzenkrut (D). Camendrio maritimo, Maro (I).

بجلة برية طيبة ومصرة صغيرة القد ، ساقها فناء تملن نحو ٥٠ سم. اوراقها مثقبة بيضية الشكل تطلو نحو ١٠ سم. تعرض من ٢ الى ٥. تصلها رسيد العرق. خلى البشرة التينية اللون. ازهارها ابيلة الزكاز ، فردية او ثنائية التجميع. لونها الى الزرقاء الباهتة || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

١٧٤٥٦ - ملقونون عذري ، عكمدادون

كمدادون

Teucrium Chamandrys (S). Germandrée officinale, G. petit-chêne, Petit-chêne (F). Common germander, Ground oak, Wall germander (E). Echter Gamander (D). Camendrio officinale, Germandrie, Querclois (I).

عشبة طيبة مصرة تملن من ١٠ الى ٣٠ سم. ساقها نحيلة مسطحة. اوراقها مفروشة ومسلية. تصلها خلى الصفحة السفلى. ازهارها فسية التجميع ، هامة الزكاز ، حراء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول. منتفها القلبية عديدة راجعها في مادة طورقون.

١٧٤٥٧ - ملقون البتولا

Thelia betula (S). فرائض من فصيلة القنديات طولها نحو ٣٨ م. ذكرها اسمر الجسم، اسهب الراوش الموجهة والمبقجة بالاحمر والاصفر والخلط. انتاها كستية الجسم والراوش يملونها في روثنها الايامين بقية حراء صناعية || يسرح من آب الى ايلول. رقت تركب اوراق البتولا.

١٧٤٥٨ - ملقون السينديان

Thelia quercus (S).

فرائض من فصيلة القنديات طولها نحو ٣٤ م. ذكرها حطلي الجسم، اثير الصدر ، بنفسجي الراوش الملوطة بالاسمر. انتاها حطلية الجسم خراء الراوش المسجبة بالاسمر والمسلطة بالاحمر والاسود || يسرح من حزيران الى تموز. رقت تركب اوراق السينديان.

١٧٤٥٩ - طول

قياس درجيات طول الامكة. عماده قوس خط الاستواء القاتم بين هاجرة المقع والهاجرة الاصيلة.

١٧٤٥٠ - طول ، ابو ساق

Himantopus (S).

Echasse (F). Stilt (E).

طائر من طول الساق القواطع. طول نحو ٤٠ سم. مقناده جالس، مستطيل، اسود. ساقاه خادتا الطول جزويتا اللون. قنته وظهوره يسقط الى السواد اللامع يملوه موج اخضر. عنقه وصدره وبطنه وذنبه الى البياض التي يكتشفه موجا وردى || يرئاد المنطق والقشور البحرية. قوته الحشرات والقشوريات والرخويات والديدان || يقطن حته في المنطق بين الاحشاب يدبر اقصوصه في المواق التي تنمراها المياه. انتله تقسم من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وسدها نحو ١٧ يوما.



ملقونون كوربي



ملقونون عذري



ملقون البتولا



ملقون السينديان



طول



طول

وسيط الطيفيات. انواده المعروفة ٦٥ منظرها من نباتات المناطق الاستوائية. بعضها يغل مأكلي الارواق والاخر صناعي يستخرج منه صباغات صفر ، او طوي يدخل في عدة تركيبات وصقلير . اوراقه كبيرة القد . انزاعه فريدة التجميع ، محورية الارتكاز .

١٧٤٦٢ - طويئات

Didipodées (F).
سبط من الاقتنيات اجناله وانواده عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية منظرها اعشاب سولية وعرولة صغرية . القد ، مستدلة الارواق ، جملة الازهار قليلة العدد . لشهر اجناله الطويلة .

١٧٤٦٣ - طويى حي الاثيرة ، طليها . ج. الحوا .

١٧٤٦٤ - طويل الأرجل

Macropoda (F).
Macropodous (E).
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الارجل .

١٧٤٦٥ - طويل الاصابع

Macroductyle (F).
Macroductyl, *Macroductylous* (E).
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الاصابع .

١٧٤٦٦ - طويل الذئب ، طويل السرك

Macrocerus (F). *Macrocerus* (E).
نمت تعريفي توصف به كل فريدة او حشرة مستطيلة الذئب او السرك .

١٧٤٦٧ - طويل الذئيل

Macroure (F).
Macrourous (E).
نمت تعريفي يطلق على الحيوانات المستطيلة الذئيل .

١٧٤٦٨ - طويل الرأس ، مضعف الرأس

Dolichocephale (F). *Dolichocephalic* (E).
من نموت تصنيف الشكل في الحيوانات اللاحية .

١٧٤٦٩ - طويل الرنح

Long-jointed (F).
Long in the pastern (E).
هو في الخيل صفة الرنح الطويل الذي يقرب الحوض من الخضيس . وقد يتجر من عيوب جبال السبق .

١٧٤٧٠ - طويل الزمان

Macrochre (F).
Macrocerous (E).
نمت تعريفي توصف به الحشرات المستطيلة الزمان .

١٧٤٧١ - طويولات الأرجل

Macropodidae (S).
Macropodidae (F). *Macropodidae* (E).
فصيلة حيوانات من الجربليات . اشهر انزاعها القنقر .

١٧٤٧٢ - طويولات الريش

Longipennis (F).
Longipennates (E).
مرتبة من كثرات القدم تشل بعض الطيور المائية الكبيرة الجثة ، المستطيلة الريش والقوية الطيران كرجع الماء والقطر والخرشة .

١٧٤٧٣ - طويولات الساق

Longirostre, *Longirostral* (F).
نمت تعريفي يطلق على الطيور المستطيلة المنقير .

١٧٤٧٥ - طيلو ، مضعف

Volati (F).
Volatile (E).

١٧٤٥٧ - طوئق كليفونية

Torreya californica, *T. myrsinica* (S). *Torreya californica* (F).

شجرة سبروتية سرجية وتزيينية بهذا ارجاع كليفونية من اممال امريكية الشمالية . تملو من ١٠ الى ١٤ م . خراصها بجمرة الخشجار . اوراقها تقطع نحو ٧ سم . وتفرس نحو ٣ سم . نصلها جلد السنج ، اسود القصبة الاربعة الشاكلة . حاقب الخشجار حل صفحته العليا ، بحرى الصفحة السفلى ، انزاد الراتحة اللانسجية || ثمارها اسطوانية تقطع نحو ٥ سم . قطرها ٣ سم . ينما الى الخشجار الزاهي تملو شمسة حطية تتخللها خطوط ارجوانية .

١٧٤٥٨ - طويرة التعجيلات

Tholera capitis (S).
Tholera capiteus (F). *Tholera capitis* (E).

حشرة متراكبة الحراشف والرتب من فصيلة النسيقات وربة حراشيفات الاجنحة . موطنها بين من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها واسعة قوتها منظر الازهار . مرتها تميل على التعجيلات || جسمها متوسط القد يقطع نحو ١٨ م . يستط نحو ٤١ م . رأسها مستد الجرم ع كستي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، غيطيان عند الانثى . حوتها كستي اللون . بطنا حطلي اللون ، كستي الحية || ورشها الاماميان الى الكستي الحطلي الحولي تملو زراكتي وضبوط مسترزة غصاها يراوح من الجوزي الى الحطلي . ورشها الخلفيان الى الحطلي الانحن طمو موج رديي يمسر عند الاطراف || لها جيل واحد في الحول . تقطر القراشة في حموز وثقي حتى ايلول . تسرح في اليل . تتاطل بعد ظهورها بنحو ستة اصابع وتتمتع الممكن للتحا مل الصفحات السفلى من نصال الارواق || الصلة تقطع نحو ٤٢ م . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . قوتها الى السرة القاعة يعلوها موج امبر وعطل ينجي اسود وضبان جانبيين من كل جهة . رأسها جويي اللون . منها الى السرة . وادباها سري || طور الاكمال يمتد نحو ثلاثة اصابع وينقضي في القربة ضمن جلباب من العين .

١٧٤٥٩ - طوميس

Thomomys (S).
Thomomys (F). *Thomomys* (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة جاسة من فصيلة الجوميسيات . انواده المعروفة ٢٦ موطنها البلاد الامريكية . قوتها لمزاد النباتية . تميل كالكلة تحت الارض في اتفاق مستطيلة متعرجة تنتهي باجسام قصيرة لا يقل عنها من ١٥٠ سم . || اجسامها صغرية ، مكرومة ، تقطع من ١٣ الى ١٧ سم . واذنانها من ٥ الى ٦ سم . رؤوسها مستطيلة ، شبه مخروطية الشكل ، مغلفة القاضص . عينها خزرية شديدة الصر . اذانها لاطفية . جرابها قصيرة . اصابعها نسيطة الاظافر المغوصة الحادة . اولها تراوح من الركة الباحة الى الطعلة الصمراء || انثاها سداسية الاطباء ، تقص من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . تنابها من ٤ الى ٦ ادراس .

١٧١٦٠ - طون

Tonne (F). *Tun* (E).
وحدة وزنية قدما يساري ١٠٠٠ كيلوغرام .

١٧١٦١ - طوئقة

Didipera bivalvis (S).
Didipera, *Herbe dianthere* (F). *Balsam herb* (E). *Balsamkraut* (D). *Didipera* (I).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الاقتنيات



طويرة التعجيلات



طويس

الاشي مكها في فصال الاوراق فينتف من يرقات دقيقة حراء الون كسروب الصال ويقيم لها حتى الاكمال .

١٧٤٨٦ - **طيفار الشونان** * ، **ميسيل الشونان** *
Mayetiola avenae (S). Cécidomyie de l'avoine (F).
حشرة من الطيفاريات طويلا يراوح من ٤ الى ٥ م . نوبا
الى الزهرة ويلعها مولج جزوي || رقاتها تركب الشونان
وتقتل فيه قبل البشار للميد في القمح والشيلم .

١٧٤٨٧ - **طيفار الصنوبر** *
Cécidomyie pini (S). Cécidomyie du pin (F).

حشرة من فصيلة الطيفاريات . جسمها شديد الصغر يطول
من ٢ الى ٣ م . رأسها مكور ، شديد السرة . عيناها
زيتانية . زباناها غيطلية ، مستطيلة . صدرها الى
السرة الجوزية المراج . بطنها الى السرة الحمار المراج .
زغبها الى الغرة النضية . وشناها قسطنطينا الون . قوائمها
مستطيلة || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى
اواخر حزيران . تألف حراج الصنوبر . تمتع الاش
مكها في القشور قرب التنبات التي يسيل منها الرايح .
البرقة برقالية الون تمش على المواد الخشبية والراتنجية
حتى الاكمال .

١٧٤٨٨ - **طيفار العوسج** *
Lasioptera rubi (S). Lasiptère des ronces, Cécidomyie des ronces (F).

حشرة من فصيلة الطيفاريات . جسمها شديد الصغر يطول
من ٢ الى ٣ م . رأسها مفلطح . عيناها زيتانية . زباناها
عيطيان . صدرها اصفر تعلو ثلاثة خطوط سود متعومة
القاعدة . بطنها يرمي الشكل اخضر ، تعلو ستة خطوط
مزعومة . رزها مستطيل . وشناها صيران ابيضان .
قوائمها مستطيلة || تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى
تشرين الثاني . تألف المواق التي يكثر فيها العوسج ||
تمتع الاش مكها على المسالج فينتف بعد عشرة ايام
من يرقات بيضاء الون تبقى مجمعة حتى الاكمال تفرغ
القشور وتعلها .

١٧٤٨٩ - **طيفار القمح** *
Mayetiola tritici, Contarinia tritici (S). Cécidomyie
du blé (F). Wheat midge (E). Weizengalmücke (D).
حشرة من الطيفاريات صغيرة طويلا من ٢ الى ٣ م .
لونها الى الصفرة تمتع مكها حدة قاعدة سفاه البر فينتف
من يرقات تقضي عليه قبل تمام تكويته .

١٧٤٩٠ - **طيفار القنييط** *
Contarinia nasturtii, C. torquens (S). Cécidomyie
du chou-fleur (F). Swede midge (E). Kohlgall-
mücke (D).

حشرة من الطيفاريات صغيرة طويلا لا يتجاوز ٢ م .
نوبا فسفي الون . وشناها خلية . تركب القنييط في اول
عده فتضع مكها على برعمه القلب فينتف من يرقات
تلتهم ثم تمرد الى الاوراق فتضك بها . اجيالها الحولية
ثلاثة .

١٧٤٩١ - **طيفار الكرمة** *
Contarinia viticola (S). Cécidomyie de la vigne (F).
Grape midge (E). Rebenblüten-gallmücke (D).

حشرة من الطيفاريات صغيرة طويلا نحو ٣ م . نوبا
اسمر الون يطلو مولج اخضر . تمتع مكها على حشرات
الكرمة (الحشرة هي الزمعة بعد الاكاف) فينتف من يرقات
تقرض داخل الحشرات وتقضي عليها .

١٧٤٩٦ - **طيفار** *
Petrogonia (F). Petrogony (E).
الطيامة نظرية بيولوجية فصولها ان كل جنس حيواني ير ،
في تكويته الجنيني ، بمراحل نمازية متسلسلة الظواهر
التبائية تقيد في نهاية المطاف الى الشكل المختار .

١٧٤٩٧ - **طيفار** *
Parfum (F). Parfume (E).
كل ذي رائحة صطرة فواحة مستمدة من الطور والادخان .
ج الحباب وطوب .

١٧٤٩٨ - **طيفار العرب** * هو الاذخر ، اعطيه .

١٧٤٩٩ - **طيط** *
طائر من طول الساق يعرف بالي طيط ، اعطيه .

١٧٤٩٠ - **طيط متوج** *
Vannus huppé (F).
واحد ابر طيط متوج .

١٧٤٩١ - **طيفار** *
Cécidomyie (S).
جنس حشرات شارة من فصيلة الطيفاريات انولاه جديدة
جميعها صغيرة اللد تمتع مكها على التنبات فينتف من
يرقات مؤذية تسبب الكثير من الاضرار || اشهر انولاه
واشدا اذى ما يتبع .

١٧٤٩٢ - **طيفار الاجاص** *
Contarinia pyriovora (S). Cécidomyie des poires (F).
Pear midge (E). Birnengalmücke (D).

حشرة من الطيفاريات طويلا يراوح بين ٣ و ٤ م . رأسها
اسود . زباناها غيطلية حطية تتألف من ٢٩ فاصلة .
جسها اسود يطو مولج فضي . اربطها حطية زياه .
انها تمتع مكها في زهرة الاجاص فينتف من يرقات تلم
الضرة أثناء نموها فتسبب وتمتص || اضراره قد تكون
كثيرة في الانواع الباكورية . يكافح باستعمال احد
الحواشير القمالة غير المركزة على التماس .

١٧٤٩٣ - **طيفار البنفسج** *
Perrisia affinis (S). Cécidomyie des violettes (F).

حشرة من الطيفاريات صغيرة اللد ، حطية الون ، زياه
الجسم . تركب اوراق البنفسج فتضعها وتمتع مكها على
صفحاتها السفلى فينتف من يرقات دقيقة غبراء الون
تلتهم النصل فتؤدي لتنبات وتضع الازهار بعد ان تسبب
قلها .

١٧٤٩٤ - **طيفار التفلب** *
Perrisia cenophila (S). Cécidomyie des feuilles de
vigne (F).

حشرة من الطيفاريات صغيرة اللد سمراء الون تركب غلب
الكرمة فتضع مكها في البروق فينتف من يرقات دقيقة
نحيلة لونها الى الصفرة تمش تحت البشرة على حبيرات ونسج
البروق .

١٧٤٩٥ - **طيفار السينديان** *
Lestremis leucophaea (S). Cécidomyie du chêne (F).

حشرة من فصيلة الطيفاريات . جسمها شديد الصغر ،
يطول نحو ٢ م . نوبا الى السرة الصفراء المراج .
رأسها مكور . عيناها زيتانية . زباناها مستطيلة .
ملاسه رباحية الاجزاء . قوائمها مستطيلة . وشناها
صيران ، غضبان || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط
نيسان الى اواخر ايار . تألف حراج السينديان || تمتع



طيفار الاجاص



طيفار البنفسج



طيفار الشونان



طيفار القمح



طيفار القنييط



طيفار الكرمة

١٧٩٧ - طيشّار مُبيد * ذُبَابَة هيس

Mayetola destructor (S). *Cécidomyia destructiva*, *Mouche de Hesse* (F). *Hessian fly* (E). *Hessen fliege* (D).

حشرة من الطياريات. طولهاراوح بين ٢ و ٤ م. ثوبها الى البطة السوداء. يطنها الى الحشرة. زباناها مركبة من ١٤ فاصلة || تركب القنص والقيار والقيار: تظهر في نيسان ثم تنجح مكها في حلف الزرع فيقتل من يرقات دقيقة تلمن النصل وتتجه نحو الكمية حيث تختص التسع ويتسبب ذبول الحلف والسيال.

١٧٩٨ - طيشّار ورق الاجاص (S). *Perrisia pyri* (S). *Cécidomyie des feuilles de poirier* (F).

حشرة من الطياريات صغيرة القند طولها نحو ٣ م. ثوبها الى السرة الخفيفة. تظهر في اوائل الربيع فتتركب اوراق الاجاص وتنجح مكها على مسحاتها السفلى فيقتل من يرقات تتحرك حته اطراف النصل حيث تعيش حسل الحشرات النامية فضطها وتقتنها وتثقل عليها كثير يولتي الجوري. لها جيلان في الحول الواحد.

١٧٩٩ - طيشّاربات *Cecidomyiidae*, *Iconiidae* (S). *Cécidomyiidae*, *Iconiidae* (F). *Cecidomyiidae*, *Gall gnats* (E). *Gallmücken* (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجسامها وانواعها المعروفة زهاء ٣٠٠٠ صنفها صغيرة القند. اجسامها مستطيلة رقيقة. ارجلها نحيلة وطويلة. قرونها الاستشرية قلبية الشكل ملحية، طولها في الذكر يقتصر في الاناث. يرقاتها دقيقة، صغيرة، مدبة الاطراف. منسجها خاسل وبعضها طفيل او مفترس. تعيش حسل للتجليات والافليات والركبات وبعض الاشجار والنباتات الفطرية. تنفضي على النجس المجهرية وتسبب الاورام في غتلف الاجزاء التي تصيبها كالبزوم والازهار والثمار والاوراق والسوق والجذور.

١٧٩٥ - طيشّر ، طيشور ، أطيّار

Oiseaux (F). *Birds* (E).

مفرد الطير طائر. والطيور صف حيوانات من الفقاريات. انواعها المعروفة زهاء ٢٥٠٠٠ تقسم الى ثلاث فئات او شص: (١) الجولجيات (٢) القرواكض او العواوي (٣) عديمات افرش.

اما رتبة ولصائلها، حسب التصنيف الحديث، فهي موضوع الجدل التابع على الصفحة التالية.

١٧٩٦ - طيشّر ، تسر طائر

Alstyr (F).

Alstyr (E).

الطير او لئسر الطائر نجم ثير من كوكبة العقاب. مركزه في رأس العقاب قبالة النسر الواقع من كوكبة القيثارة. يبعد من الارض نحو ١٦ سنة ضوئية.

١٧٩٧ - طيشّر العراقيب

هو الشترق ، امله.

١٧٩٨ - طيشّر البكّل

هو الخلفاش ، امله.

١٧٩٩ - طيشّران

Vol (F). *Flock* (E).

انتقال الطير وبعض الحشرات التي تسير في الفضاء بواسطة اجتمعا.

١٧٥٠٠ - طيشّر * Myrpristis (S).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السيفيات القاتكات انولاه المعروفة قليلة العدد موطنها بحار المناطق الحارة انصها البحر الاحمر والخليج. اجسامها صغيرة القند طولها يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم. اقلها جميلة الالوان الزاحية لها الاحمر والازرق والوردي والاشهب والفضي.

١٧٥٠١ - طيشريّات Ornithologie (F).

Ornithologie (E).

الطيريات او علم الطير جزء من علم المولدة يبحث في الطيور.

١٧٥٠٢ - طيشس Myrtales (F). Myrtid (E).

الطيس العدد الحائل بكثرة.

١٧٥٠٣ - طيشسيّ Thalesophille (F).

Thalesophille (E).

نمت ترميلي يطلق على كل حشرة تعيش بعض اذار حياتها في البحر او في الماء الاجاج.

١٧٥٠٤ - طيشسل Prune (F). Bloom (E).

مادة عضوية لزجة مستنقة ناعمة كثر القبار تقش بشرة الثمار والقنطور وما اشبه.

١٧٥٠٥ - طيششركه Tischeria (S).

Tischeria (F). *Tischeria* (E).

حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشيات الاجنحة. اصطلحنا على مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تألف المراج التي يكثر فيها السديان || جسمها صغير ، نحيل ، شبه اسطواني الشكل . بسطها نحو ١٠ م. رأسها مثقل الجسم يكسو بعض السيف. عنانها صغيرتان ، بارزتان . خطها صغير . ملمسا قصيران ، زباناها غطيان ، مستطيلان . اجنتها خفيفة ، لامسارية الاحادب . بطنها نحيل ، كثيف الخمل . ثوبها الى السرة التنية المواج || سرقتها خاملة تعيش على اوراق النباتات الحربية . انصها السديان والمخلل.

١٧٥٠٦ - طيششركه مُسَمَّكة Tischeria complanata (S).

حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشيات الاجنحة . اصطلحنا على مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تألف حراج السديان والزان والبلص والمخلل || جسمها صغير القند . بسطها نحو ٨ م. رأسها مثقل الجسم . عنانها صغيرتان ، بارزتان . خطها ويلاسها قصيرة . زباناها غطيان . اجنتها خفيفة ، مدبة الاطراف . بطنها مثكاثف الخمل . ثوبها الى البطة السوداء المواج || سرقتها صغيرة ، دقيقة ، رقالة . تلمن نصال الاوراق وتعيش بين البشزين.

١٧٥٠٧ - طيششريكات Tischeriidae (S).

Tischeriidae (F). *Tischeriidae* (E).

فصيلة حشرات غرائشة من رتبة حرشيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض القاطم البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة قسبية . رؤوسها معتدلة الجسم . ناعقاتها منتشرة بمضائف حشرية . قرونها الاستشرية عيطية.



طيار سيّد



طيرة



طيشرة

الطير: شعيا ورتيا وصالها (حسب التصنيف الحديث)

[illegible]



طيطن منير



طيطري احر الساق



طيطري اخضر



طيطري البتايح



طيطري البياض



طيطري سلفاني

ونبه يبيض . اياهو وقوامه وكلاء سود الخمار . منقاره احر الانتشاب جزوي للمخاط . سيقانه الى الاخر القريزي || سره قليل البعد من ٦ الى ١٢ . يأنف اللتلق وضفاف المياه العذبة . ينش منه بين اشحاب اللتلق .

١٧٥١٤ - طيطري اخضر * تستنك

Totanus ochropus, Tringa ochropus (S). Chevalier cul-blanc (F). Green sandpiper (E).

طائر من الطيطري موطنه حوض البحر المتوسط . يحوي من مصفه الى مشته معظم بلاد الشرق وارويف و افريقيه الشماليه والشرقيه || يأنف اللتلق وضفاف المياه العذبة . ينش منه بين الاشحاب قرب الماء || ثوبه متركب الالوان الزاهية انضر للوراج . فتنبكه ناصع البياض . منقاره اسمر . سيقانه الى الخمار الزيتوني .

١٧٥١٥ - طيطري البتايح *

Totanus stagnatilis, Tringa stagnatilis (S). Chevalier stagnatilis, C. à pieds vorts (F). Marsh sandpiper (E).

طائر من الطيطري طوله نحو ٢٤ سم . رأسه وعينه الى الابيض الرمادي يطول تنطيط اسود مستطيل . طوره الى الرمادي الاخر تطو رقة سواد . صدره وبطنه واظفكه الى البياض الناصع تنخله رقة برء . مبسة . اياهو وقوامه ميلة . منقاره اسود . سيقانه الى الخمار الزيتوني . سره من ٢٠ الى ٥٠ . يأنف اللتلق وضفاف الانهر والبحيرات . يسبح ويبيض . ينش منه في اللتلق فوق القراب . الفصوصه مستطيل الشكل قليل البعد .

١٧٥١٦ - طيطري البياض *

Totanus glareola, Tringa glareola (S). Chevalier sylvain (F). Wood sandpiper (E).

طائر من الطيطري طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه متركب الالوان مرطب || يبيض لزواجا متفرقة يتجمع الى اسراب عند الزرع . يأنف اللتلق وضفاف الانهار والبحيرات . ينش منه في الخللج وفي الادلغال .

١٧٥١٧ - طيطري سلفاني *

Totanus griseus (S). Chevalier gris, C. aboyeur (F). Greyshank (E).

طائر من الطيطري طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه متركب الالوان الزاهية . طوره اسود الريش . ريشه جزوي الخمار منق بالابيض . رأسه وعينه غططان بالابيض بطنه واظفكه يبيضان . ذنبه مشح بالرمادي الاسمر . منقاره اسود . سيقانه الى السرة الخضراء || سره بعد من ١٢ الى ٢٠ . يأنف ضفاف الانهر والبحيرات . ينش منه في اشحاب اللتلق فوق القراب .

١٧٥١٨ - طيطيات

Teuthididae (S). *Teuthididae* (F). *Teuthididae* (E).

فصيلة اسمك بحرية من كملات العظم . اجناسها وانواعها للمروقة قليلة العدد جميعها من اسمك البحر الاخر || اجناسها اعليجية الشكل . حشكية . وسيدة الزعنفة الطورية . رؤوسها معتدلة الجرم . غطاطها صغيرة لاستنفة . استناتها صغيرة حادة وسيدة الصف في التكوين . اعرف اجناسها الطيط .

١٧٥١٩ - طيطن *

Gasterophilus (S). *Gasterophilus* (F). *Gasterophilus* (E).

جنس حشرات من فصيلة الطيطيات وربية ذوات الجناحين .

ملاسها بحيلة . مرافقها صفوة . بطونها كثيفة الحمل القصير . حلماتها مقنوقة . رواشيتها سنانية الشكل . بمرامزها تامة . غطاطها اكثفية وبامية للناصع || اساريمها لافحة . قربها خلجان الوؤن . عاداتها طليقة تنحور داخل نفق السرة . اشهر اجناسها الطيشر .

١٧٥٠٨ - طيط * Teuthis (F). Teuthis (E).

جنس اسمك بحرية من فصيلة الطيطيات . انواعها المروقة قليلة العدد اعطاتها البحر الاخر || اجناسها اعليجية الشكل . معتدلة الشكل . تغفل من ١٨ الى ٢٦ سم . اوثوبها الى الخطة تنبر وتزهر في النصف السفلي وتسر في النصف العلوي وتنصرف الى الرصاصي العاني في الرأس والظهر || لحومها متوسطة الصنف . مأكولة .

١٧٥٠٩ - طيطان * هو كرات البر . اظله .

١٧٥١٠ - طيطن صغير *

Pteromalus puparum (S). *Pteromale jouet* (F).

حشرة نافعة من فصيلة الطيطيات . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتغفل على البثوريات والكرنبيات والذهوريات || جسمها صغير القدر يطول نحو ١ سم . وثلاثه خطوط . رأسها مستعرض الشكل . زبانتها غطبان متفرجان . جبينها شبه اسطواني . بطنها يبغي الشكل . مقطوم القاعاء . مرزئها صغيرة مستقيمة . اجنحتها ودية تعلوها مشحة زرقاء خفيفة . ثوبها الى الخمار الالاسع المولج .

١٧٥١١ - طيطيات

Pteromalidae (F). *Pteromalidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة اجناسها وانواعها المروقة نحو ٢٠٠٠ جميعها نافعة تتغفل على الحشرات المؤذية من مختلف الفصائل || حشراتا صغيرة تغفل على ١ الى ٣ سم . اجناسها ودية . جوارشها اصغر من بطونها القروبية المؤخر . قروبيها الاستشارية متباينة الاشكال . مرزئها صغيرة مستقيمة . اوثوبها مختلفة الالوان يكثر فيها الاخضر || اشهر انواعها الطيلن الصغير والديراق الهم والنارون القصير الزوبان .

١٧٥١٢ - طيطري

Totanus (S). *Totanus* (F). *Totanus* (E).

جنس طير من عماره الطوطيات رفسيلة دجاسيات الارض . انواعه ١٥ جميعها من القواطع . اوثوبها مرقة . صدورها وبطونها يبيض . منقارها مستطيلة . شاذفة المخاط . سيقانها دقيقة . اوسافها بحيلة || تألف اللتلق ويجاري الماء وضفاف الانهر والبحيرات . قربها الحشرات على اختلاف انواعها والشرانيف والاسماك الصغيرة . تدش اوكارها في القراب وبين الاشحاب وفي الاجمار . انائها تبيض نحو ٣ بيضات تحضنها وسدعا نحو ٣ اسابيع || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

١٧٥١٣ - طيطري احمق الساق *

Totanus calidris, Tringa totanus (S). Chevalier gambette, C. à pieds rouges (F). Common redshank (E).

طائر من الطيطري . طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه الى السرة الرمادية لثريتية يطولها تنطيط اسود مستطيل . عتفه وبطنه

1٧٥٢٨ - طَيْفِيَّة Spectroscopie (F).
Spectroscopy (E).
علم يبحث في طيف النور وهو ما يسمح وبتوسيع بمجموعة العناصر الكيماوية التي تتركب منها الشمس.

1٧٥٢٩ - طَيْفَسَان Chlamydospora
هو الفثا الازويبي الشكل الذي يلحف ويخضن فونبات الفطور ج. طيلاس.

1٧٥٣٠ - طَيْفَسَانِي Pallé (F). Pallé (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما هو منسوب الى رداء الزخريعات وضدييات الازيل. كقولك التجوير الطيلساني والاحساس الطيلساني.

1٧٥٣١ - طَيْسَم هو بيشة الدين، اطلبها.

1٧٥٣٢ - طَيْسَن Argile (F). Clay, Argil (E).
الطين اي الصلصال هو سيليكات الالومنيوم المالي يربط غالباً غاروطاً باكسيد الحديد واكسيد المنغنيز وفيرها. وهو اذا كثر في التراب صيره متدبجاً صلباً. انواعه عديدة تختلف باختلاف مركباته ومقدار كل منها. وهو حل الزان من الاحمر والاخضر والجزوي والاصفر.

1٧٥٣٣ - طَيْسَن ، وَحَلْ ، فَرْسِل Boue (F).
Diré, Siltme, Mud (E).
تراب نام لرج يفسر الماء وقد يسمله على وجه الارض.

1٧٥٣٤ - طَيْسَن غَرْوَي Bol, Argile ocreuse (F).
Bote (E).
نوع من الصلصال الاحمر المغربي الشان النام.

1٧٥٣٥ - طَيْسَن غَرْوَي Argile colloïdale (F).
Colloidal clay (E).
نوع من الطين القزج النام السهل التشكيل.

1٧٥٣٦ - طَيْفَسِيَا Tinantia (S). Tinantia (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الوردانيات مقبودة التعريف على اسم العلامة الفرنسي طينان (١٨٠٣-١٨٥٢) || انواعها للمروة قليلة العدد، جميعها سبروتية، مهددة امريكة الوسطى. سوطها غرامه لبدة تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها ساقية تطوي نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٣. تصهلها جادة الصلصة، خلي البشرة العليا، امط السفل. انزعافها عقدي التجميع، تالهي الازنكار. ازهارها زرقاء اللون او بنفسجية || تنورها يستمر من تموز الى تشرين.

1٧٥٣٧ - طَيْشَش دَبَاغ Prionus coriarius (S).
Prionne tannear (F). Prionus coriarius (E).

حشرة خالصة من فصيلة القرزيات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها البلاد المعتدلة الحارة. تآلف الاحراج. خنافسها تعيش على غزونها للمري. يرقاتها تعيش على المواد النباتية المتحللة في جلود ويطوع الاشجار اليابسة || جسمها كبير القد يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. ثوبها ثنائي اللون، رأسها وزانها وكسلها ولبها وبرازها الى السواد اللعصي. غلزارها الى السرة الكستنية. رأسها كبير الجرم. عينها صغيرتان. زانهاا كيران. منطفان الى الوراء. مستطفان من الذكر و تهلان عند الاث. غلزارها مقطوع الخوض اللامع. غداها شديدة الصلابة. برداها كيرتا القد، حنطية اللون || جليها لثني الحول.

انواعها للمروة قليلة العدد منتشرة في معظم انحاء العالم || اجسامها متوصلة القد تطول من ١٢ الى ١٦ م. ورونها كبيرة، مستعرة. عينها كبيرة جاسطة، شياحدة عند الفتيقن. قرنها الاستشعارية شديدة التقعر تنتهي بنسيلة دقيقة. اعطالها ولبها صغيرة. كولسلها مكورة، كثيفة الخمل. بطونها يرمية متكاثفة الخمل. مرزاتها ذرية. وراشها كبيرة، مقبجة. قوائمها فشيطة. طيراتها سريع الحركة، يمد العين || الجملانة تسرح في كل مكان وتكتسب ذوات الحافر. البقرة تنقل باللمس الى اشياء اقم الحطاطة ثم الى المدة حيث تستقر حتى زين الاكمال حيث تخرج مع الروث.

1٧٥٢٠ - طَيْفَسِيَّات Gastrophilidae (S).
Gastrophilidae (F). Gastrophilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها للمروة متوصلة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم. تآلف الاساكن التي ترقادها الحفريات ان داجية أو متوصلة || اجسامها متوصلة القد، تطول من ١٠ الى ١٦ م. ورونها كبيرة، مستعرة. عينها كبيرة، جاسطة، شياحدة عند الفتيقن. قرنها الاستشعارية قصيرة. اعطالها ضامرة. ملابسها صغيرة. كولسلها مكورة، كثيفة الخمل التقعر. بطونها يرمية الشكل، متكاثفة الخمل. مرزاتها صلبة. وراشها قليلة التضبيب. قوائمها نشيطة. طيراتها سريع الحركة شديدة الطين، يمدد الاثني تهريق للكن فردياً على ذوات الحافر. يرقاتها شبه اعطالية الشكل، مبطة، عشارية السكر. تعيش المرحلة الاولى من عمرها في افضية لقم الحطاطة ثم تنقل الى المدة تستقر حتى زين الاكمال حيث تخرج مع الروث || انهر اجناسها الطيلين.

1٧٥٢١ - طَيْسَم Humidifier (F). To damp (E).
لين التي، بواسطة المطيع الذي يزين الرطوبة اللازمة.

1٧٥٢٢ - طَيْفَن Spectra (F).
Spectre, Spectrum (E).

1٧٥٢٣ - طَيْفَن عَيْطِي Rale noire du spectre (F). Spectrum-line (E).

1٧٥٢٤ - طَيْفَن "نَمْسِي" ، طَيْفَن النُور Spectre solaire (F). Solar spectre (E).
مجسمة الاشعة الملونة الناتجة من تفكيك الضوء الشمسي.

1٧٥٢٥ - طَيْفَن صَوْتِي Spectre du son (F).
Spectrum sound (E).

1٧٥٢٦ - طَيْفَن هَوْتِي Spectre de la lumière (F).
Spectrum light (E).

1٧٥٢٧ - طَيْفُور Aegialitis (S). Aegialite (F).
ماتر من طول الساق وفصيلة الزرقانيات. موطنه الشطوط البحرية وضفاف الانهر والبحيرات. قوقبه الحشرات والذعاصير ولقدبان والحوام. يمشي جماعات قليلة العدد || جسمه صغير القد، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبه الملوي جبل الحلحة الخضراء المولج. ثوبه السفلي الى البياض الماسجي. عتقه مطروق بالاسود. رأسه ميقج بالاسود والجزوي. جناحه ذلق الطرف يلحف اللب. ذنبه غزوي الشكل، صغير الجرم. سلقه تحيلة قيمة سمراء اللون.



طيلور



طيش دَبَاغ

تكثر فيها الجفة الرية . رؤوسها سفيرة ، مناقبها غليظة وصغيرة . سوافلها مستديرة . ارسافها قوية قصيرة . اثنائها زائجة الايران المتداخلة || اثنائها كثيرة العدد . اجناسها ١١ تنتمي الى عارئين : الحبيبات والخريصات .

١٧٥٤٢ - طيهوج راجع طير .



طيهوج نيشاري

١٧٥٤٣ - طيهوج القردوس

Oiseaux de paradis (F). Birds of paradise (E).

طيور من مختلف الاجناس والانواع تنتمي الى فصيلة القردوسيات ورتبة الجوارح . وهي مشهورة بفرط نمو ارياشها الجميلة الالوان .

١٧٥٤٤ - طيهوج اهليكية ، طيهوج ذاكجكة

Volailles (F). Poultry, Fowls (E).

هي الطيور التي صار البادعا وتكسيها فاصبحت اليفة تربي مع الانسان ولا تخشاه كالحمام والديج والجهنيات وبعض القبط والاوز والغنم .

١٧٥٤٥ - طيهوج لا تحفن بيضها

Oiseaux qui ne couvent pas (F).

الطيور التي لا تحفن بيضها كثيرة العدد تجمعها شرة اجناس تنتمي الى اربع فصائل : قتيقيات ، الشبانيات الخريجات والكاروبيات .

اما اجناسها فهي :

Indicateur (F).

الخريجات

Scythrops (F).

الشروب

Mégapoda (F).

القشبان

Oxylophaga (F).

الصفص

Mégacéphale (F).

الطيطاب

Eudynamis (F).

السنهس

Molothre (F).

الحناس

Cathérura (F).

النهق

Coucou (F).

الوقواق

Lalpoa (F).

البجوج



طيهوج كبير

١٧٥٤٦ - طيهوج هو عجلو الجروب ، اطلبه .

Oiseller (F).

١٧٥٤٧ - طيهوجي

Bird-seller, Bird-fancier

هو بائع الطيور .

Germanière (F).

١٧٥٤٨ - طيهوجين

هو الطوريين ، اطلبه .

Aunée viqueuse (F).

١٧٥٤٩ - طيهوج

هو الطيطاب . اطلبه .

تظهر الحشرة الجملانة في اواسط تموز وتعيش حتى اواسط آب . تنسج في الليل . تساقط بعد ظهورها باسموج . تروى المكان في شقوق الشب المطروح ارضاً || البرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٦٠ سم . جسمها غليظ الجسم به اسطواني الشكل ، حنقو اللون ، اسم الرأس عادم الملب والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوما يتفشي في الثروة فمن صلبة من المواد الليفة واللصوية المسجونة بالريال .

١٧٥٤٨ - طيهوج ، غيريس

Tétras (F).

Grouse (E).

جنس طير من عارة الخريصات وفصيلة الطيهوجيات له ثوبان القشيري والكثير || والطيروج يتميز بكبر الجفة وكثافة الريش . مشاهير غليظ الخطم الاعلى ، حاد الخلق ، اخفت البرية . ثوبه متراكب الالوان المتداخلة المابقة الالوان . وهو يختلف بين الذكر والانثى || يأنف الاجراج الجبلية الكثيفة البهجة عن السران . قوته البرام والبار والحروب والديان والحشرات || اثناء تنسج في الخنوس تدبره بين الخنوس والخنوس حيث تضع من ٨ الى ١٢ بيضة تحضنها وسدا نحو ٣ اسابيع .

١٧٥٤٩ - طيهوج ليكاري ، غيريس الشرق

ذلك التامول

Tetrao tetrix, Lyrurus tetrix (S). Tétras lyre, Petit coq de bruyère, Tétras à queue fourchue, Coq des bouleaux (F).

طائر من الطيهوج متوسط القد طول الذكر يراوح بين ٤٥ و ٦٥ سم . وطول الانثى ٤٠ الى ٤٥ . ثوبه متراكب الالوان يظلم فيه الازرق الاسفج المروج والاسود الشديد الالوان . اخفيكه مستدير الريش الجانبى على شكل قشارة . زيكاه يفضا الريش وجزءه من مناكبه وابعده || موطنه فسح الارباء . يربط في الموائل الرطبة القليلة الارتفاع . يكثر ويؤوده في الشرق .

١٧٥٤٠ - طيهوج كبير ، غيريس الجبلية

ذلك الخنوس

Tetrao urogallus (S). Tétras urogalle, Grand coq de bruyère, Grand tétras (F). Capercaillie, Cock of the wood (E). Auerhuhn (D).

طائر من الطيهوج . كبير الجفة ، طول يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم . ثوبه متراكب الالوان المابقة للالوان . اخفيكه اسود اللون مستدير الشكل يتألف من ١٨ ريشة . الانثى اصفر حصا من الذكر ثوبا الى الصبغة الصفراء يملو التوشم الاسمر من الرأس الى الاقنعة ومن الخلق الى الزنكي || موطنه شامخ الاطراف يمتد من الهند الى شمالي اوروبة . يأنف الاجراج الكثيفة اعصها اسراج الصنوبر .

١٧٥٤١ - طيهوجيات

Tetraonidae (S).

Tetraonidae (F).

فصيلة طير من رتبة الدجاجيات اطيورها مختلفة الاجسام

ظ



ظبي



ظبي التبت

١٧٥٥٥ - ظبياء

الظبياء كركاب .

Acacia mellifera (F).

١٧٥٥٦ - ظبئة

هي السط الممل من الاشجار المغيرة الزهر التي يكثر وجودها في بعض سفاب جزيرة العرب .

Ajuster (F). To adjust (E).

١٧٥٥٧ - ظبط

Antilope (F). Antelope (E)

١٧٥٥٨ - ظبي *

حيوان وسيد الجنس والفرع من ذوات الظلف المخبرات المخرجات القرون . وهو رقيق القوام ابيض القد ، يطول نحو ١٢٠ سم . ويصل ٨٠ ، بينا ذنبه لا يتجاوز ١٦ سم . رأسه معتدل القد ، خطبه مستدير الطرف ، عيناه كبيرتان فرحان . اذناه جالستان محدبتان ، جمرانه دقيقة وقوية . ثوبه يختلف باختلاف الشق والفرع . الذكور البالغة احمر قويا من الاناث والذكور الفقية . قرون ذكورها مستقيمة ، متشابها الخيد ، خماسية الدرة القرنية تطول نحو ٥٠ سم . اما الاناث فجاء الرووس . ثنائية الاخلاف ، فردية الطل . ج ظباء .

Cephalopa (F).

١٧٥٥٩ - ظبي أزرق

هو الحليم ، اظلي .

Cervicapra (F).

١٧٥٦٠ - ظبي أسود

هو القنبر ، اظلي .

١٧٥٦١ - ظبي التبت *

Pantholops Hodgson (S). Pantholops de Hodgson, Chiru, Antilope tibétaine (F).

شبرو هو الاسم المشهور في بلاد التبت . حيوان لبون عظيم من الظباء . موطنه نجد التبت من ارتفاع ٤٠٠٠ الى

Ectoproctes (F).

Ectoprocta (E).

ظاهرات الشرج فئة من الحيوانات الطحلبية تتميز بنشوز الشرج خارج لطاق القواس .

١٧٥٥٠ - ظاهرات الشرج

١٧٥٥١ - ظاهرات المتك

Ectognathes, Ectotrophes (F).

رتبة سشرات دابة من طائفة هدية الاذئاب . تتميز بالظلاق متكها . قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل غيبية الشكل . اجسامها مستطيلة يكثر فيها الشكل المردني . جميعها دالة هواكة ونسبا الناعلة والقارضة التي تلتص الكتب والنياب . اجناسها وانواعها زهاء ٣٥٠ تجمع الى فصليتين : لشمسيات والظنبريات .

١٧٥٥٢ - ظاهرات زوئية

Manifestations orageuses (F). Tempestuous manifestations (E).

هي العواجل الجوية التي تسبق او ترافق الزلازل والاعاصير كالرياح والقيار والسحب .

Phénomène (F).

١٧٥٥٣ - ظاهرة ، مكنش

Phenomenon (E).

هو كل تحول يحدث في حالة الجسم او في خصائصه . فان لم يكن مصحوبا بتغير في طبيعة مادته سمى ظاهرة حكمية (فيزيائية) . اما اذا اقترن بتغير في طبيعته فهو ظاهرة كيميائية .

Phénoménisme (F).

١٧٥٥٤ - ظاهريّة

Phenomenism (E).

الظاهريية وتسمى الحيلولة والمنشعية ، ملحق فلسفي يقبل بان المعرفة محصورة في الظواهر او في الحوادث الحسية . وهو بذلك يتناقض الانتولوجية اي علم الكائنات ذلك لانه لا يبحث في الاسباب ركنة الانتولوجية .



فربيان

Précaire (F). **فربيان** (F). **فربيان** (F).
Precarious (E). قابل الابطال والازوال .

Cloportes (F). **فربيان** (F).
Wood-louse, Sistar, Sow-bug (E).

دوية من القشريات مساويات الاجزال مشهورة باسم حمار قبان اطليه .

Oniscidae (S). **فربيان** (S).
Oniscidae, Cloportes (F). Wood lice, Sow bugs (E).
Kellersassin, Landasseln (D).

فصيلة دويات من القشريات مساويات الاجزال . اجسامها وانواعها المروفة قليلة العدد . اصلها البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالمين القديم والجديد . اشهر انواعها القزموط المروف بحمار قبان والقزموط والفربيان .



فربيان امريكي

Kodrautaria (S). Kodrautérie (E). **فربيان** (E).

جنس نباتات شجرية من فصيلة البتديات . انواعها عديدة معظمها حسيبي ويري . جميعها اشجار وشجيرات مرسة . اوراقها مركبة متعاقبة حاملة . ازهارها مستقلة القناعات ، رباعية البتلات ، صفراء اللون ، متشكلة التجميع ، لاجنية الايتكاز . اشهر انواعها ما يلي .

١٧٥٧٧ - **فربيان أسود** هو البكت ، اطليه .

١٧٥٧٨ - **فربيان شائك الريش**

Kodrautaria bipinnata (S). Kodrautérie bipennée (F).
نوع من الفربيان شجرية كبيرة القند تملو نحو ٢٠ م . اصنافها واثانها متراكبة . اوراقها كبيرة القند ، وورقاتها عديدة وثنية التجميع ، نصلها ينفي الشكل ، مسنن الحافة ، داخل الصفحة السفلى بطول نحو ٧٠ سم . وورقاتها ثنائية الريش . نصلها ينفي الشكل ، مسنن الحافة ، مائل البتلة . حنايكه الزهرية كبيرة القند قطرها يراوح بين ٤٠ و ٥٠ سم . ازهارها يتوحد طول شهر تموز .

١٧٥٧٩ - **فربيان عكوكلي**

Kodrautaria paniculata (S). Kodrautérie paniculée (F).

نوع من الفربيان شجرية سرولية تملو نحو ١٧ م . اصنافها واثانها متراكبة . اوراقها كبيرة القند ، وورقاتها عديدة وثنية التجميع ، نصلها ينفي الشكل ، مسنن الحافة ، داخل الصفحة السفلى بطول نحو ٩٠ سم . وورقاتها ثنائية الريش . حنايكه الزهرية غائرة قطرها نحو ٤٠ سم . ازهارها مغرية يحمرها النمل . ازهارها يستمر من سزيان الى تموز .

١٧٥٨٠ - **فربيان تحليكي**

Kodrautaria apiculata (S). Kodrautérie apiculée (F).

نوع من الفربيان شجرية سرولية صغيرة القند تملو نحو ٦ م . اثمار . اثمارها واثانها زباء العمد . نصلها صلبة ، وورقاتها احليجية الشكل ، شبيهة رصية ، نصلها خلل البشرة عل صفحته . حنايكه الزهرية كيفية التجميع قطرها نحو ٣٠ سم . ازهارها مغرية يحمرها النمل . ازهارها يستمر من سزيان الى آب .



فربيان

Helminthesporium (S). **فربيان** (S).

جنس فطرو مجهرية من الفريديات فضيلة الطمبات . جريه الكيفية ملوقة متصببة حزية التجميع . كائله طرية او جانية الايتكاز ، يضيقة او مدطرية الشكل ، مرفرفة ، شفعية الانقسام . انواعها عديدة تضلل حل تخلف البتات ، اعرفها واشهرها ما يتبع .

١٧٥٨٠ م . من سطح البحر . يالغ السهل والادوية الرية الخشبات . يحرق في الصباح بين البحر الى الغفلة . خشه الذي يارى اليه في النهار سفيرة في الرمل تخفيه عن العين . ملجته الحياتي فردي ، لذلك لا يقترب من الاثر الا في زين الودائع والساعات بقرنان . جسمه متوسط القند بطول نحو ١٢٥ سم ، ويرتفع نحو ٨٠ سم . قلبه ١٨ م ، قرنه ٦٠ م . ثوبه الى الصبغة تفسر في الرأس والفقر ويبيض في البطن . حبة الذكر وعمره الى السنة العاشرة . قراءه احيوان ، شديدة السواد اللامع . الاثر جاء ثنائية الخلف تقص شاذاً واحداً في اوائل الصيف .

١٧٥٦٧ - **فربيان الزهر** (F). **Oristragus sauteur** (F).

حيوان ليون مجر من الغطاء يدعى قطار ، اطليه .

١٧٥٦٣ - **فربيان شبيهة** (F). **Ancilopa uchitars** (F).

حيوان من الغطاء يدعى شمشة ، اطليه .

١٧٥٦٤ - **فربيان عربي** هو الآخر ، اطليه .

١٧٥٦٥ - **فربيان** (F). **Blebe** (F). **Hind** (E).

انثى الكلب ج غطاء وطيقات والظ . كتيها ام الخشت وام شادن رام اللام .

١٧٥٦٦ - **فربيان** (F). **Vagin des solipèdes** (F).

Vagina of solipeds (E).

الحياء من كل ذي حافر (السان) ومنخرج الولدي والجراب الصغير وربما كانت الضيقة لكيس اثنت مصفحة منها .

١٧٥٦٧ - **فربيان** (F). **Silux** (F).

الحجر الصواني احد الاطراف ج . طران وأطرو .

١٧٥٦٨ - **فربيان** هو القرباب اليابس من شدة البرد .

١٧٥٦٩ - **فربيان** (F). **Butte, Pierre sillante** (F).

ج فربيان . ما تاً من الحجارة .

١٧٥٧٠ - **فربيان** (S). **Ichthyomys** (S).

Ichomys (F). Ichomys (E).

حيوان من الارانب صغير الجثة ، تجتمع الرأس ، اسنم الاذن ، عظامه يريان ، اسنم المرأة ايضاً البطن ، قصير القوائم ، مسنن ارجلها الكريهة . ج . فربيان .

١٧٥٧١ - **فربيان امريكي** (S). **Mephitis** (S).

Moufette, Moufette (F). Shunk (E).

نوع من الفربيان يعيش في امريكة يتصل باكثر صفات فربيان الجزيرة ومنها التثانة التي ينفر منها الانسان والحيوان وثناته حله مسددها جراب يحيط بقاعته الذنب يتجمع فيه مادة سائلة قلوية مدنية التركيب يستعملها الفربيان لثقل عند الحث والفلان من الناس . وهو تجتمع الرأس . طول الخلف . مسنن الذنب الكث .

١٧٥٧٢ - **فربيان** (S). **Patunculus** (S).

Péoncle (F). Patunculus (E).

جنس حيوانات مجرية من الرضويات فضيلة الحيات . وفضيلة الفلكتيات . انواعها الماصرة المروفة عديدة مشفرة في مطر بحار المال . اصنافها شبه مستديرة الشكل ، متساوية المصاريع الخفدة ، الخفدة . الخفدة . تعيش بين الصغور وفي الرمال البعيدة الدور .

طولها ٧ سم. وعرضها ٣ سم. بيضا ينحرف لونها الى الجوزة يطوقه حمار قاتم || يسبب ذبول الارواق وقلة الانتاج. يكلف بتطهير البذار قبل زده.

١٧٥٩٠ - ظُرَيْرُ كَلْبٍ *
Zorilla (S). Zorilla (F). Skunk (E). Banditica (D).

جنس حيوانات ليلية ضاربة من فصيلة السرمويات انواعها للمروعة قليلة اسماؤها البلاد الافريقية يبي قرية الشبه من الزرنب. اجسامها مستطيلة مستقيمة طولها براوح ٨٠ سم. ٦٢ سم. ورواسها مخروطية القالب. فوائدها صغيرة. اذنانها جلقة طويلا مثل الشكل طولها نحو ٢٥ سم. اذنيها الى الصهبة السوداء طويلا ورواسها مخملية بالابيض والاسود. قوتها ابقار والجوز والبلور والوزغ والحيات وجميع الحشرات.

١٧٥٩١ - ظُرَيْرُ قِيسِ * ، **ظُرَيْرُ طَرِيشِ ***

Zonotrichia albicollis (S). Chingolo à gorge blanche (F).

طائر من فصيلة الثرشوريات. موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية. يألف المزارع والاماكن الاطعمة كاللوزي. نظامه الحياتي حامي || جسمه صغير يطول نحو ١٨ سم. ثوبه العلوي الى الكهبة الحمراء المواج يعلوها تسنج اسود. رأسه مرفوش بالكسيتي والاسود. زوره ابيض. عرسه وصغته وصدره الى الوردية. حقة عينه كسيتية اللون. متفاده ووساه الى السمرة. جناحه مستدل احمر. ذنبه مستطيل الشكل، مرفوش الطرف القليل الاستدارة || قوته البذور البرية والثمار العنينة. تتركبه مستحب الالاحان الطيفة || يطنش عنه في الاغصان والاشجار القريبة من سطح الارض. الاثنى تبين من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما.

١٧٥٩٢ - ظُرَيْرُ ثَمَرِ اَدَسِ *

Erythrosterne parva (S). Erythrosterne rougeatre (F).

طائر من الفصاريب الجوارح سنيات النقيق فصيلة المنيانيات. اسماؤه تمتد من الهند الى اوروبا يحوي حبها وبجبالها ذهابا وايابا كل عام. يألف الادغال والنباتات. قوته الحشرات المجنسة اغصها النباب || جسمه صغير القد يطول نحو ١٢ سم. ثوبه يتقلب بين الاسود ويختلف بين الذكر والانثى. الذكر عند بلوغه الاثنا يكون جوي الرأس والرداء والجناح والذنب وازرق احمر. احمر الزور اصفر الصدر، ابيض البطن. ثوب الانثى الى الشبه للسمراء تقي في الرأس والرداء وتهيئ وتغير في الصدر والبطن. يطنش عنه في الشجيرات المتوسطة الارتفاع بين الاغصان والفروع. الاثنى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات. التريثم يستمر نحو ١٣ يوما.

١٧٥٩٣ - ظُرَيْرُ ثَمَرِ
Dromedary de somme (F). Dromedary de burden (E).

البعير يحمل ويحمل عليه. ج. طمن.

١٧٥٩٤ - ظُفَّاف * ، **عُرُفُو ***

Eudytas (S). Gorfou (F). Gorfou (E).

جنس طير من عدييات الریش، كفتيات القدم وفصيلة الطرسويات. انواعه المرفوعة قليلة العدد اسماها جمار القتب الجنوبي || اجسامها شبه مخروطية الشكل. حبها حبيط الملبوط. ورواسها صغيرة متوجة بكشاش ملونة. سناقيها جنوبية اللون، مخدة الانثى العليا البائرة السطام.

١٧٥٩٢ - ظُرَيْرُ الثُّومِ *

Helminthosporium alli (S).

فطر مجهرى يتطفل على فصوص الثوم فيسببها || مظهره الخارجي يقع مستديرة او بيضية الشكل تركب فصوص الثوم في طولها الثقوي فتخرج الكشور المتحارة به ان تشبه بنخاعة مابية سوداء اللون تزدحم الى السطح. يكلف بتطهير الفصوص، قبل زرعها، بسائل الفروبول المخلول ١/٢٠٠.

١٧٥٩٣ - ظُرَيْرُ الخِيَارِ *

Helminthosporium cucumerinum (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الخيار فيسببها ويؤدي لنباتات || مظهره الخارجي يقع نسجة صفراء اللون قطرها نحو ١٥ سم. تركب التصل على سفحه العليا يتأهلها على السفلى لطفة خلية رصاصية || يكلف بتطهير البذار قبل استعماله.

١٧٥٩٤ - ظُرَيْرُ الشَّايِ *

Helminthosporium theae (S).

فطر مجهرى رمي يمتري جنيت الشاي الياصة فيركب على الجلود والقضبان ويتكاثر عليها.

١٧٥٩٥ - ظُرَيْرُ الغُصْنِ *

Helminthosporium gossypii (S).

فطر مجهرى يتطفل على بعض انواع القطن في ظروف خاصة قوامها مستحكما الجفاف الجوي مفرقا بارتفاع الحرارة واستمرار الارتفاع مدة من الوقت || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة وديدة او قرنزية اللون تركب الارواق والكؤوس الزهرية || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية.

١٧٥٩٦ - ظُرَيْرُ المَصَانِ *

Helminthosporium sacchari (S). Eye spot de la canna à sucre (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق المصان. مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة حمراء اللون، سوداء المحور، صفراء الحمار تركب نصل الارواق الفتية على حدود زوايا الاخير. اضراره زهيدة لا تستوجب العناية.

١٧٥٩٧ - ظُرَيْرُ المَلَطِ *

Helminthosporium heveae (S).

فطر مجهرى يتطفل على الماط في طوره الثقوي. تركب الارواق فيرققها يقع صغيرة صفراء اللون تتحول تدريجيا الى بقع قديمة تشبه التصل دون ان تقوي النبات.

١٧٥٩٨ - ظُرَيْرُ المُرِّ *

Helminthosporium musarum, H. torulosum (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق وممار المر || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سوداء اللون تركب النصل بموازاة اعصابها ثم تتسع فيصغر لونها به ان تصعد بشرية البنية الرقيقة || يوحى على الجار جذاف يحمل غطاء كثيرة يقوھا الى اسوداد القشرة ويضفا || يكلف باستعمال سائل بوردو المركب ١٠٠/٢/٢٠٠ الى ثلاث مرات. الاثر عند ظهور المرض على الارواق واللثانية عند ظهور الطرح والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع.

١٧٥٩٩ - ظُرَيْرُ لَدِي *

Helminthosporium turcicum (S).

فطر مجهرى يتطفل على الذرة الصفراء وقد شوهد في ظروف خاصة على المنقة والشوكان والشعير والمصان والارز. مظهره الخارجي يقع قديمة الشكل تركب الصف في نصله وعنده. ثوبه ضيقة صفراء اللون ثم تستطيل وتتسع فيلف



ظُرَيْرُ المَصَانِ



ظُرَيْرُ لَدِي



ظُرَيْرُ



ظُرَيْرُ



ظُرَيْرُ اَدَسِ



ظُفَّاف

اعتاقها مستطيلة . اجنحتها جاذفية ، حشفة الريش .
اذناها جراح كاسية . اذواها ملوثة ، رؤوسها واعتاقها
وظهورها واجنحتها سود . صغورها وبطونها بيض . كشائنها
ملحية اللون او رمادية او ليلكية || قوتها الاسماك
والثدييات ويضف الرضويات || ملجتها الحياتي جماعي .
اسرائها او بالاحرى مستعمراتها تمتد من ٢٠ الى ٣٠
الف نفر .

١٧٦٠٧ - ظفيرة هي النعش البري ، اطليه .

١٧٦٠٨ - ظفيرة * Thelyphonus (S).

Thélyphose (F).

موية سامة من الرقليات . مهددا البلاد المارة والاستوائية .
تتميز باستقالة الذنب والجرايز || فورها الى الطحلة يفر
في الرأس ويسمر في البطن وفي اللعاط . لسمتها سامة
مؤذية || تسرح في الليل وتلوى الى جلود الارواح
النعرة في الكبار ، قوتها الحولم والجرلات .

١٧٦٠٩ - ظلّ Ombra (F). Darkness, Shade (E).

الظل هو يقرض النعش وهو المنطقة المظلمة التي يكرها
الجسم الذي يمتدح سير لثة النور .

١٧٦١٠ - ظلال

داه في قوائم الدابة لا من مسير ولا من تعب .

١٧٦١١ - ظلع Défaut (F). Defaut (E).

١٧٦١٢ - ظلع Chaleurs des chiens (F).

هو ماعلة الكلاب . ويقال للكلبة المستعرة طاعمة .
اما الكلب فظاع .

١٧٦١٣ - ظلف Ongle (F). Hoof (E).

ظفر كل حيوان يجتر كالبقرة وراكشة والظفر ... وهو
كالظفر للفرس وكالف لبيح .

١٧٦١٤ - ظليف Rocailleux (F).

Rocky, Pebbly, Flinty (E).

لمت تعريفي يعلق على كل سطح تكثر فيه الصغور
التناثرة .

١٧٦١٥ - ظلف الفرس

ظلف الفرس يجمع ليد من كوكبة السجاجة .

١٧٦١٦ - ظلم Stuvia, Piqueira (S). Stévie (F).

جس نيات حشوية معمرة برية وزربية من سبط الفصيات
وفصيلة المركبات . الزواله مديدة . اوراقه ثلاثية العروق .
الحلقة منها والوسطى متقابلان الى السليا فصائية . ازهاره
رومحي . رؤوساته مركبة من ثلاث او خمس اذوار متساوية .
اشهر انواله الزربية ما يتبع .

١٧٦١٧ - ظلم أَرْجُوْكَوِي Stevia purpurea (S).

Stévie pourpre (F).

حفية معمرة زربية جادحة تملو نحو ٧٠ سم . ساقها فرعاء
فايزة . اوراقها غنضة النصل ، حلقة البشرة . ازهارها
حلقة التجميع . اربوسية اللون || ازهاره يستمر من
آب الى ايلول .

١٧٦١٨ - ظلم عُرْصُفِيّ الزَّوْكَ

Stevia inaeifolia (S). Stévie à feuilles d'Iva (F).

حشفة معمرة زربية جادحة تملو نحو ٦٠ سم . ساقها

١٧٥٩٥ - ظُفْر ، ظُفَر Ongie, Sabot (F).

Nail, Hoof, Claw (E).

الظفر مادة قرنية تنبت في اطراف الاصابع . ج انظار
واظافر .

١٧٥٩٦ - ظُفْر العُقاب

ظفر العقاب ضرب من الكيات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٧ - ظُفْر القَطّ Pied de chat

حشية برية معروفة برجل القط ، اطليها .

١٧٥٩٨ - ظُفْر اللَسَر

ظفر اللسر ضرب من الكيات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٩ - ظُفْرَاء هي النعش البري ، اطليه .

١٧٦٠٠ - ظُفْرَة

لبات حريف يتبع الفروج الحشوية والتاكيل . (اللسان) .

١٧٦٠١ - ظُفْرَة التَّجْوُز Graine de cribule

هي ثمرة الحسك . اطلب حسك .

١٧٦٠٢ - ظُفْرَة الزَّلْزَلان

ظفرة الزلزالن كواكب (محيط المحيط) .

١٧٦٠٣ - ظُفُوف * Tornatella (S).

Tornatelle (F). Tornatella (E).

جلس حيوانات بحرية من الرضويات ممديات الاريل
وفصيلة الباغية . انواله المعاصرة المعروفة قليلة العدد
متنشرة في بعض بحار البلاد الحارة اخصها الهند والبحر
الابيض المتوسط || اصدافها بيضية مستطيلة ، حلقة
الاصحاب ، مستطيلة الذبعية الاستوائية الرضوية . حيلة
التبييض ، زاحية الالوان .

١٧٦٠٤ - ظُفُوف Myrianglucose (S).

Myrianglucose (F). Myrianglucose (E).

عمارة طور مجهرية من فصيلة البقيات . اجناسها
وانواعها مديدة . اجربها الزقية كروية الشكل سطحية
الارتكاز . اذناها ريمية . ذكاتها اهلجية . غلواتها
غشائية المادة ، نصفية ، متعرضة منها نوع واحد
مؤذ يلهي الصفت .

١٧٦٠٥ - ظُفُفُور ، زَالِدَة Onglet (F). Mitro (E).

جزء الباق الملمعة الذي يترك ويتأ فوق العلم ، وهو أيضاً
ما يترك من النعش الملقم فوق أعر عين .

١٧٦٠٦ - ظُفَيْر * Cleidothaeus (S).

Cleidothère (F). Cleidothaeus (E).

حيوان بحري وسيد الجلس والنعش من الرضويات صفيليات



ظفوف



ظفر



ظفيرة

اصطابتها بعض مناطق البلاد الحارة والاستوائية من الماعلين القدم والجدي || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها جاحشة. قرونها الاستشعارية صغيرة الاطراف. تأثير الذكور مستطيلة شليمة. كراشها كبيرة عجيبة. انجدها لائحة. اوزانها متباينة الاناث منها الاجر الاسفع المواج والاعصر والبسجي والقصي || تألف الحراج الجبلية ولا تقرب الصنوبريات. تعيش في جلود الاشجار النخرة. يرقاتها غاشية مخضية.

Collet de l'arbre (F).

Neck of the tree (E).

هو اصل الشجرة اري مركز اقتشاب الجلود على الجذع.

١٧٦٢٩ - ظلم

١٧٦٣٠ - ظنبار عشاري النقط

Zonabris decimpunctata (S). Zonabris à 10 points (F).

Zonabris decimpunctata (E).

حشرة طيبة واثمة خاضعة واثمة من فصيلة الملويدات ورتبة معدقات الاجنحة. موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط. غنائها تعيش على بتلات الانهار وعلى التوتلي. يرقاتها تعيش في اول عودها على المواد المضوية ثم على ما تستطع اقتراسه من الحشرات الدنيا. الخفض التي تفرز عند لمسها مادة صفراء اللون كريمة الرائحة. تحوي في شواربها وفي جهازها الهضمي مادة نافذة تخرج بشرة الجلد وتثير الباء والايلاج || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم. قرونها اسود الرأس والاكوسيل والطين والبراز. اصفر الظهران المنقط بالاسود. رأسها صغير الحجم. زباناها صولجانيان. عيناها صغيرتان. ظهرها منقط الاحدياب و مستطير الطرف الاحف. غنداه خاضية المنقط السود || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اوائل تموز. تسرح في النهار. تساقط بعد ظهورها بظلاله اسابيع وتتبع المكان تحت غلاف الاشجار وتقومها وتحت الجلالة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٠ مم. جسمها مبسط الشكل، سداسي القروايب، اغبر اللون. اسمر المواج، عتاي الرأس، ضليح التاتير || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يوما يتقضي في القوية.

Heteropatalia (S).

١٧٦٣١ - ظنية

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلايمات. بكتيداته سطحية الارتفاع، كرشية الشكل، جلدية الجبل الاسود، كروية الانفلاق. بويغاته قوسية الاحدياب، حلبي الاطراف، مؤثرة الانقسام، شافقة || اوزامه المكؤبة قليلة لغرضها ما يتبع.

١٧٦٣٢ - ظنية الترنفل

Heteropatalia dianthi, H. valtellinensis (S).

فطر مجهري يصيب اوراق الترنفل فيعطلها ومنعها عن القيام بوظيفتها || ينمو على الازراق في اول عهده لطفًا مستطيلة محتلة اللون ثم غبراء تركب ساقه التصل الى كامل زامه الاعلى || وهو في طوره الثاني نقط سمر تملو الطلع تنسب انتساع البشرة وانزعاج النسيج || يكالغ بنفسخ التثليل باسء الفواظير الخففة وذلك بعد انتساع الازراق الموسوية. ومن الضروري انتساع الازراق عند ظهور الطلع.

١٧٦٣٣ - ظنية السيسم

Heteropatalia antirrhini (S).

فطر مجهري يصيب اوراق السيسم فيعطلها بعد ان يقرح

فرواه زياء. اوراقها عرضية الشكل، مستطيلة التصل، دقيقة الزام الاخير. انجدها بيضاء اللون، خلية البشرة. انزوارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

Stevia eupatoria (S).

Stévie eupatoire (F).

حشة عمرة زيبية جاحدة تطو نحو ٦٠ سم. ساقها فرواه مرطاه. اوراقها سنائية التصل. سنة الزام الاخير. انزوارها ودية اللون || انزوارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

١٧٦٢٠ - ظلم مستن

Stevia serrata, Piqueria trinervis (S). Stévia dencolée (F).

حشة عمرة زيبية حبروية تطو نحو ٥٠ سم. ساقها وفروها خلية الساء. اوراقها متماثلة، نصلا ساني الشكل، ماس البشرة، سنن الحافة. انزوارها حر. انزوارها يستمر من تموز الى ايلول.

Solifuges (F).

١٧٦٢١ - ظليات

رتبة من المنكبويات ترتب في الظل وتخشى الشمس.

Umbraticole (F).

١٧٦٢٢ - ظليل

نمت ترمفي يطل على كل حشرة تعيش في الظل وعلى كل نبات ينمو في ظل غيره.

Pénombre (F).

Penumbra, Semi-darkness (E).

هو الظل الخفيف او شبه الظل الذي يحوق بالظل.

١٧٦٢٤ - ظلم، عسقي، عسقي

Austruche (mâle) (F). Ostrich (male) (E).

ذكر النامج اظلمة وظلان. يقال عار الظلم حرًا اذا صوت.

١٧٦٢٥ - ظلمع

شجرة على صورة اللبلب. وهي ايضا شجرة التين في لغة طين. الراسدة ظلمة أو ظلمة. وينهم من قال شجرة الباق.

١٧٦٢٦ - ظلمعة ذهنية الورق

Castanopsis chrysophylla (S).

Castanopsis à feuilles dorées (F).

شجرة حبرية وفريبتية من فصيلة السوليات. ساقها غليظة صلبة تطو من ٢٠ الى ٣٠ سم. يحكلها دالح الثورن. اوراقها تطو من ٨ الى ١٨ سم. وترس من ٢ الى ٤ سم. نصلا جرداء لامعة، صفحتها العليا الى الخضار الزيتي صفحتها السفلى الى الصفار الذهبي. ثمارها قروية الشبه بالكستنة لكنها بطيئة النمو لا تنضج الا بعد مرور سنين كاملين.

١٧٦٢٧ - ظلميان

شجر ينبت بنجده يشبه القزط (السان) والقرط هو السط البري.

١٧٦٢٨ - ظلمباية

Lamprima (S).

Lamprime (F). Lamprime (E).

جنس حشرات غاشية من عذبات الاجنحة صفيميات

للقرون وظيفية المنظوبات. انواعها المعروفة قليلة الممد



ظنبار عشاري النقط



ظنية الترنفل



ظنية السيسم

تجمع المكان في لحاء سوق الأشجار يفتتح فيها ويجعلها ويصلها || أشهر أنواعها وأهمها انتشاراً قطعة المنزلة .

١٧٦١١ - **ثَنِيْبَة مُزَرَّكَة** *Emphytus cinctus* (S).
Emphyte cinct (F).

نوع من الثنوب . ثوبها إلى السرة السوداء يطولها زئير أصفر || يرقاتها شديدة الأذى تعيش على سوق النبات تستخرج اللحاء والشكير .

١٧٦١٢ - **ثَنِيْبُور** * *Pleurodelus* (S).
Pleurodèle (F). *Pleurodelus* (E).

ظهور هو الاسم للفرني القليل . جنس حيوانات صغيرة قاذبة من السرفويات وصيلة السمندليات . أنواعه المعروفة قليلة العدد أصلاتها بعض مناطق إفريقية الشمالية أعصها القرب || أجسامها مستطيلة الشكل ، تطول من ٢٠ إلى ٢٢ سم . رؤوسها مقلطة ، فيه مقبضية الإخطام . أذنباها سنة أختار الثنبي القليل التشو . أذنباها مستطيلة ، رفيعة ، سنة الخار العلوي . أذنباها مزركشة وسنجة وبندجة || تألف اللسان والقدان والأفوال . قنبا اللبدان والبلاصيط والحولم التي تغلف في وجه الماء .

١٧٦١٣ - **ثَنِيْبَار** هو الجانب القصير من الريش .

١٧٦١٤ - **ظَهْرِيَّة** *Epithélium* (F). *Epithellum* (E).
كل نسيج مكون من حبيبات أو خلايا صليحية التجميع تلتف أو تبطن الأجزاء الحية .

١٧٦١٥ - **ظَهْرِيَّة** *Epithélial* (F). *Epithelial* (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالظاهرة .

١٧٦١٦ - **ظَهْر** *Dos* (F). *Back* (E).
هو الجانب العلوي المقابل للبطن عند الحيوان يمتد من الحمارك إلى الكفيل .

١٧٦١٧ - **ظَهْر ، ظَهْرَان** *Elytre* (F). *Elytron* (E).
الظفر هو الندة الخشبية للفرني التركيب الذي يلفح جناح الحشرة من غشيات الإجنطة . وهما ظفوران وظفوران وبها في المصنوع من اجنطة الجراد ما حفرته : وقاليلطان يقال لها الظفوران والرفيقان يقال لها الثشران .

١٧٦١٨ - **ظَهْرُ الْأَسَد**
ظفر الأسد يجتر من كوكبة الأسد الأصفر .

١٧٦١٩ - **ظَهْرِيَّة** *Tortus* (F). *Tortoise* (E).
هي السلحفاة ، أطليها .

١٧٦٢٠ - **ظَهْرِيَّة** *Dorsal*
نمت وصفي يطلق على كل ما له صلة بظهر الحيوان .

١٧٦٢١ - **ظَهْرِيَّات ، ظَهْرِيَّات** *Ficolidae* (S).
Ficolidae, *Mesembryanthemaceae* (F).
Ficolidae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . أجسامها وأنواعها المعروفة نداء ٨٠٠ مظهرها بري وبسها لحي وزراعي وربي . أعرف أجسامها الظهرية .

١٧٦٢٢ - **ظَهْرِيَّة ، ظَهْرِيَّة** *Mesembryanthemum* (F). *Ficolide* (F).
ج ظهائر . الاسم العلمي من اليوناني بمعنى زهرة مستنصف النهار أي زهرة الظهر . جنس نباتات عشبية ليفية لحمية

نصلها || مظهر الخارجي يقع صخرة مستديرة ظاهرها نحو ٤ م . تركيب نصل الأوراق تنقضي على النجج المنحارة التي ليس وتنحت || يكافح عند ظهوره بانقطاع الأوراق الموصولة وينفخ الشتل يباسه القرواير القمالة .

١٧٦٢٤ - **ظَنِيْب** *Tibia* (F). *Tibia* (E).
الظنوب عند الحشرات العضو المستقيم الكائن بين الفخذ والرسغ . ويدهي الساق .

١٧٦٢٥ - **ظَنِيْب** *Machilis* (S). *Machile* (F).
جنس حشرات دابة من فصيلة الظنوبيات . أنواعه معددة جميعها خاضعة دامتة تعيش على التبل ولحاء الأشجار للمقطوعة . أجسامها حشرية الجلد ، مغزلية الشكل تطول من ٧ إلى ١٦ م . أعرف أنواعها وأهمها ما يلي :

١٧٦٢٦ - **ظَنِيْبُ أَسْطُوَانِي** * *Machilis cylindrica* (S). *Machile cylindrique* (F).
نوع من الظنوب طولها يراوح بين ٨ و ١٢ م . جسمه أسطواني الشكل ، ثوبه إلى الأصبهة المابقة الخطية الملوح . يتكرر في البيض والأخدال وسياجات الجنائن . يعيش على المواد العضوية السائرة إلى الإختلال وعلى لحاء النباتات اليابسة والمقطوعة .

١٧٦٢٧ - **ظَنِيْبُ الْغَاب** * *Machilis polyode* (S). *Machile polyode* (F).
نوع من الظنوب طولها يراوح بين ٩ و ١٢ م . ثوبه إلى الأصبهة يعطوها موج أشع ويضع سمر جانبة . ملامحه وزبانه وقوائمها وأسراكه مخزبة بالأبيض || يتكرر في الغابات والأحراج . يعيش على التبل وجميع المواد العضوية السائرة إلى الإختلال .

١٧٦٢٨ - **ظَنِيْبُ بَحْرِي** * *Machilis maritimus*, *Petrobius maritimus* (S). *Machile maritime*, *Pétrobie maritime* (F).
نوع من الظنوب طولها يراوح بين ١٠ و ١٤ م . ثوبه إلى السرة السفاه الملوح ، زبانه وقوائمها سوية اللون الختلي القامق . أسراكه مخزبة بالأبيض || يتكرر قرب الشواطئ البحرية وفي الجرف وعلى سفاه الأنهر .

١٧٦٢٩ - **ظَنِيْبِيَّات** * *Machilidae* (S).
Machillidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ظاهرات المك . أجسامها وأزناها عديدة تتميز بأجسامها المزدنية الشكل . أذنباها وتآفيراها وبسها الكبيرة كبركة اللد ، ثوبها ظفورية التركيب . جوارثها معددة . راجعها مستطيلة ، حلقاها مستديرة . أسطوانا الصربية ثلاثية الزوائد الذيلية ، مستطيلة الأظافر الدقيقة الذرية || أشهر أجسامها الاقتصادية الظنوب .

١٧٦٣٠ - **ظَنَف** *Emphytus* (S).
Emphyte (F). *Emphytus* (E).
الواحدة ظنفة . جنس حشرات مؤذية من فصيلة المنشاريات ورتبة غشائيات الإجنطة الاسريات . أنواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في الشرق الأوسط وأروبة وإفريقية الشمالية || أجسامها صغيرة مستطيلة تطول من ١٠ إلى ١٢ م . يسلها قزاح من ١٨ إلى ٢٠ م . أذنباها إلى المواد الختلف المماجات وسها المخفة والمزرة بالأبيض والأصفر || أنثاها أكبر قدماً من ذكورها ويكثر بمرزاتها المنشارية . أجسامها الحولية تراوح من اثنين إلى ثلاثة ||



ظنوب اسطواني



ظنوب الغاب



ظنوب بحري



ظهور

نحو ٢٥ م. سطحها أخضر اللون ، اغبر المواج ، زهرتها
هامية الارتكاز ، قرمزية اللون ، قطرها نحو ١٠ م.

١٧٦٦٠ - ظهوره تليسية

Mes. testiculare, Argyroderma roseum (S). Ficoide
testiculare (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل حلالية الشكل او
تليسية طويلا نحو ٥٠ م. عرضها ٣٥ ومماكبها ٢٥
سطحها يجرى اللون مبهر الزغب . انزهارها وردية اللون .
اريجوانية المواج . قطرها نحو ٢٥ م || انزهارها شوي .

١٧٦٦١ - ظهوره تشمينة

Mes. gaminum, Gibbacum gaminum (S). Ficoide
jumelee (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها غروبية الشكل توامية
التجميع تطلو نحو ١٥ م. انزهارها صغيرة القند ، قرمزية
اللون || انزهارها يستمر من آذار الى ايار .

١٧٦٦٢ - ظهوره ثنائية اللون

Mes. bilobum, Derenbergia biloba (S). Ficoide bi-
lobée (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة تملو نحو ٤ م. تركب من
قرص جلبي تملو ثلثتان مفلطحتان . متصدتا القاعدة
تتوسطها زهرة جملة ، كبيرة القند ، صفراء اللون . اما
القلعة فخرية اللون ، ثنائية التجميع الطري || انزهارها
تستمر طوال تشرين الاول والثاني .

١٧٦٦٣ - ظهوره حشيشية

Mes. calculus, Conophytum calculus (S). Ficoide-
calicou (F).

نبته تريينية شاذلة . جلجها فتلة حشيشية الشكل سطحها
مالس البشرة ، أخضر اللون ، احر المواج . طويلا نحو
٣ م. تملوها زهرة صفراء اللون قطرها نحو ١٢ م.
نفرتها تقوم من آب الى تشرين الاول .

١٧٦٦٤ - ظهوره عذرونية

Mes. turbiniforme, Lithops turbiniformis (S). Fi-
colde en toupie (F).

نبته تريينية شاذلة . جلجها فتلة تملو وترعرع نحو ٢٥ م.
سطحها مالس البشرة ، احر اللون . حشايها اغشيش وبدي .
نفرتها هامية الارتكاز، صفراء اللون ، قصيرة الاذن ،
قطرها يراوح بين ٣٥ و ٤٠ م .

١٧٦٦٥ - ظهوره مخليسة

Mes. velutinum, Gibbaea velutinum (S). Ficoide
veloutée (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها ناعشة ، مثلثة الشكل ،
خلية النصل ، طويلا الاكبر نحو ٩ م. انزهارها مسطوية
الاجن ، بيضاء اللون ، قطرها نحو ٥ م || انزهارها
يستمر من آذار الى نيسان .

١٧٦٦٦ - ظهوره خيمية

Mes. umbellatum, Ruschia umbellata (S). Ficoide
en ombelle (F).

جملة تريينية جاذلة تملو نحو ٩٠ م. اوراقها متقايلة ،
متصالبة ، اصصية الشكل ، لالاية الزوايا ، تطلو نحو
١٦ م. تصلها أخضر زاه || انزهارها خيمية التجميع ،
بيضاء اللون ، صغيرة القند || انزهارها يستمر طوال
فصل الصيف .

برية وزراعية من فصيلة الظهريات . انزوا نحو ٣٠٠
سطحها من النباتات الافريقية المنبت . اوراقها غريبة
الاشكال المختلفة الحبة والقدر . انزواها كبيرة القند وردية
اللون او مرجانية واريجوانية وصفراء || اكثرا من النباتات
لعمرة وبضها يحول وسولي . اشهرها ما يتبع .

١٧٦٦٣ - ظهوره ٥

Anserina (S).

Anserina (F). *Anserina* (E).
جلس حيوانات بحرية من العروجات مبدات الازبل
وفصيلة الدلافين . انواعها الممارسة المعروفة قليلة العدد
اعطانا البحر الابيض المتوسط والخليج الاطلسي || اصداها
شبه وسمية الشكل مستعرضة الجناح الايمن الثنائي الزوائد
الرقمية الشكل || اجسامها حلزونية ، رؤوسها مستطيلة ،
مقطوعة ، ثنائية القراس المميبة . لياها مسطوية دقيقة .
ارجلها بيضية التواء يملوا اسطاط قرينة المادة .

١٧٦٦٤ - ظهري

الظهي نبات شبه القبار او الكبر (محيط المحيط) .

١٧٦٦٥ - ظهوره ارجوانية

Mesembrian-

thamum coccineum (S). Ficoide écarlate (F).
جملة تريينية فرعاء تملو نحو ٨٠ م. جلجها وفروصا
دقيقة . اوراقها صغيرة القند ، تصلها الى الخضار الازرق
اللامع . انزواها ارجوانية اللون قطرها نحو ٤ م.
انزواها يستمر طوال الصيف .

١٧٦٦٦ - ظهوره الوردية

Mes. aloides,

Nananthus aloides (S). Ficoide-Aloide (F).
نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل الوردية الشكل ، وسمية
التجميع ، سطحية الصفحة ، غشراء اللون ، تطلو نحو
٥ م. انزواها قصيرة الاذن ، صفراء اللون ، ارجوانية
المواج ، قطرها نحو ٢٥ م. || انزواها يستمر من آب
الى ايلول .

١٧٦٦٧ - ظهوره بخرية

Mes. tigrinum,

Foucaria tigrina (S). Ficoide-Tigre (F).
نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل وسمية بيضسة
الشكل ، مسنة الحافة ، تصلها الى الخضار البصري
يملو تجلجع نبي يحته اطار احر . انزواها متوسطة الاذن ،
كبيرة القند ، قطرها يراوح بين ٥ و ٧ م. لونها الى
الاحمر المرجانية || انزواها يستمر من آب الى تشرين
الاول .

١٧٦٦٨ - ظهوره بلورية ، حشيشة البيلور

Mes. cristallinum, Cryophytum cristallinum (S).

Ficoide glaciale, F. cristalline, Herbe à la glace,
Glaciale (F). Ice plant, Diamond ficolde (E). Eis-
kraut-Mitagsblume (D). Cristallifolde, Diacloide,
Erbs cristallina (I).

حشة برية وزراعية صنعتها يستخرج من عصارة اوراقها
الملاح تقوية تدخل في صناعة البيلور || اوراقها كبيرة
القند ، ناعشة ، متصعبة للنصل الكثيف الحلييات البلورية .
انزواها صغيرة القند ، بيضاء اللون ، خفيفة البات .
انزواها يستمر من نموز الى آب .

١٧٦٦٩ - ظهوره بتيهية

Mes. oviforme, Oophytum oviforme (S). Ficoide
ovoidée (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . جلجها فتلة بيضية الشكل تملو



ظهري بلورية

أسطوانية ، مقطوعة ، عذبة المذاق . أزهارها صغيرة القذ
قصيرة الاذن ، ابطية الاركانز ، يبيض اللون || تستعمل
كالتسليك وفي مدة ليول تقييد المعدة وصر الحفم .

١٧١٧٤ - زهرة قارية

Mes. murinum, Scaevola murinum (S). Ficoide
souris (F).
نبت زينة شاذلة مقررة . اوراقها قتل غائرة الشكل
مسنة الخمار ، رديئة اللون || زهرتها مسكة المرف ،
مضادة القذ ، لنها الى الصفرة الباهتة || ازهارها صبي .

١٧١٧٥ - زهرة قنفذية

Mes. echinatum, Delosperma echinatum (S). Ficoide
hérisson (F).
بجلة زينة قنفذية الشكل تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها
أسطوانية تطول نحو ١٣ م . قواعدها مهدبة شاذلة ،
نصلها طليعية البشرة ، زبها الحليات || ازهارها فردية
التجميع ، يبيض اللون ، صلبة القذ ، قصيرة الاذن .
ازهارها يستمر طوال السنة .

١٧١٧٦ - زهرة مضمرة

Mes. edule, Carpobrotus edulis (S). Ficoide-figue
F. comestible, Figular des Hottentots (F). Hottentot
fig, Sour fig (E). Hottentotzenfeige (D). Fico degli
ottentotti (I).
بجلة زراعية مأكلة البذر ، تملو نحو ١٠٠ سم . ماتها
فراء . فروصها مسطحة مستطيلة غائرة . اوراقها متعاقبة ،
متشاذكة ، اصعبية الشكل ، ثلاثية الزوايا . مسنة
الخمار تطول من ٨ الى ١٢ سم . || ازهارها كبيرة القذ
قطرها نحو ١٠ سم . لنها الى الصفار الباهت يملو مذج
وردي . ماتها شفعية التجميع مدحما يراوح بين ١٢ و ١٤ .
أزهارها جوزية الشكل ولقده مأكلة سكرية الحليم .

١٧١٧٧ - زهرة مقطوعة

Mes. truncatellum, Conophytum truncatellum (S).
Ficoide tronquée (F).
نبت زينة شاذلة . بجلها قلة كروية الشكل مقطوعة
القاعدة قطرها نحو ١٢ سم . سطحها اخضر اللون مزركش
بالجلوي . زهرتها صفراء ، قطرها نحو ١٥ م . || ازهارها
يلوم من آب الى تشرين الاول .

١٧١٧٨ - زهرة مشكاذية

Mes. rostratum, Chiridopsis rostrata (S). Ficoide
à bec (F).
نبت زينة شاذلة مقررة . اوراقها قتل مقررة قبيصة
التجميع ، لا تليافية الحميم ، حلقة الخمار ، البشري
مهدبة الخمار . زهرتها فردية ، مسطحة الاذن ، كبيرة
القذ صفراء اللون ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٠ سم .
ازهارها رديي .

١٧١٧٩ - زهرة نسيكة

Mes. nobile, Pleiospilos nobile (S). Ficoide noble (F).
نبت زينة شاذلة مقررة . اوراقها قتل قبيصة التجميع
عززية الشكل . نصلها حلق الخمار البشري ، ابر
الخمار ، يطول نحو ٥ سم . زهرتها مهدبة ، كبيرة القذ ،
صفراء اللون ، قصيرة الاذن ، قطرها نحو ٥ سم .
ازهارها غريبي .

١٧١٨٠ - طواجر

Météores (F). Meteors (E).
جميع الحوادث الطليعية الجوية المرتبط زهرها كالمسافة
والبرق وقوس قزح والمطر والثلج والبرد الخ .

١٧١٦٧ - زهرة دجيرة

Mes. noctiflorum, Aridaria noctiflora (S). Ficoide
nocturna (F).
بجلة زينة فراء تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . اوراقها
أهلالية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٥ م . نصلها الى
الخضار البحري الاحمر المولج || ازهارها دجيرة
الانتيلاج ، يبيض اللون ، فواحة المرف البشري . قطرها
يراوح بين ٢٠ و ٤٥ م || ازهارها يستمر طوال
فصل الصيف .

١٧١٦٨ - زهرة رؤسية

Mes. capitatum, Conicosia capitata (S). Ficoide à
rosette, F. à fleurs capitées (F).
بجلة زينة مسرة تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها اصعبية
الشكل ثلاثية الزوايا تطول من ١٢ الى ١٨ سم . نصلها
الى الرتبة الضلعة . ازهارها رؤسية ، قطرها نحو ٥ سم .
لونها الى الصفرة اللطيفة || ازهارها يستمر من عوز
الى آب .

١٧١٦٩ - زهرة زعفرانية

Mes. croceum, Hymenocyclis croceus (S). Ficoide
safranée (F).
بجلة زينة تملو نحو ٦٠ سم . ماتها فراء متشعبة ، اوراقها
متعاقبة ، اصعبية الشكل ، ثلاثية الزوايا ، قصيرة القذ ،
باهتة الخضار ، سمراء الخمار || ازهارها فردية التجميع
قطرها نحو ٣ م . لنها الى الصفرة الزعفرانية || ازهارها
يستمر طوال الخريف والشتاء .

١٧١٧٠ - زهرة شاذكة

Mes. spinosum, Ebaranzia spinosa (S). Ficoide
épineuse (F).
بجلة زينة فراء تملو نحو ٦٠ سم . بجلها وفروصها
شاذكة . اوراقها قتل صغيرة تطول نحو ٢ م . نصلها
بحري اللون تملو رشفة سمراء || ازهارها صغيرة القذ ،
وردي اللون ، صفراء المولج || ازهارها رديي .

١٧١٧١ - زهرة مكبة

Mes. validum, Cephalophyllum dsaime (S). Ficoide
robusta (F).
بجلة زينة بجلها يطو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها
أسطوانية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم . لنها الى الخضار
الزاهي تملو نشفة قبيصة دقيقة || ازهارها وديئة اللون ،
متوسطة الحميم ، دقيقة الاذن التي يراوح طولها بين ٥
و ٨ م . || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٧١٧٢ - زهرة عطرية

Mes. fragrans, Gnotophyllum fragrans (S). Ficoide
parlurée (F).
نبت زينة شاذلة مقررة . اوراقها قتل لا تليافية الحميم
ينطب فيها الشكل النائي . طواجر يراوح بين ٥ و ٧ سم .
عرضها من ٢ الى ٣ سم . ومها كنبها نحو ١٢ م . زهرتها مهدبة ،
قصيرة الاذن ، كبيرة القذ ، صلبة المرف ، قطرها
يراوح من ٨ الى ١٢ سم .

١٧١٧٣ - زهرة عقدية * ، مكبة ، عكسول

Mes. nodiflorum (S).
مصري
Ficoide à nœuds fleuris (F). Egyptian fig-marigold (E).
Aegyptisches kalikraut (D). Erba del nodifloro (I).
عشبة برية تملو من ٢٠ الى ٢٥ سم . منها البراب ،
مهدبا شواطئ البحر المتوسط ، فروصها غائرة . اوراقها



زهرة مقدية

بعض مناطق افريقية الجنوبية . سيقها جلمووية مدادة أو مكشكة فوصية الشكل . أوزانها سيقية اتصال ، مزدوجة التصليف . أزهارها سداسية البتلات الثلاثية متساوية الحجم ، ثلاثية الاسدية ، عديدة الألوان . تزهر أقرين في الحدائق والمراكن || أنوعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

١٧٦٨٩ - فلوبرة نكاسية اللون

Moraea bicolor (S). *Moraea bicolore* (F).
نوع من الفلوبرة . جلمووها مداد . شراغها يرتفع من ٣٠ إلى ٩٠ سم . أوزانها عديدة ، ضيقة اتصال ، جميلة الخضار الأس . أزهارها كبيرة القذ ، قطرها نحو ٥ سم . لونها أصفر وأبيض || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

١٧٦٩٠ - فلوبرة شراغية

Moraea spathacea (S). *Moraea à spathe* (F).
نوع من الفلوبرة . جلمووها مداد . شراغها يرتفع من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . وقتها واحدة سيقية التصل البشري الخضر . أزهارها صفراء اللون . حطرية العرف || تنورها يستمر طوال شهر أيار .

١٧٦٩١ - فلوبرة طرويسية

Moraea pavonia (S). *Moraea paon* (F).
نوع من الفلوبرة . جلمووها فوصي الشكل . شراغها يرتفع من ٣٠ إلى ٦٠ سم . وقتها واحدة سيقية التصل المزجج . أزهارها جراء اللون يملوها عند قواعدها تبيج أسود غضب بالأزرق والأخضر || تنورها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٧٦٩٢ - فلوبرة صندبة

Moraea fimbriata (S). *Moraea frangée* (F).
نوع من الفلوبرة . جلمووها مداد . شراغها يعلو من ٢٥ إلى ٤٥ سم . أوزانها عديدة ضيقة اتصال الجامعة المهدبة الخلف . أزهارها متدلة الخيم . قطرها نحو ٤ سم . لونها ال اليلكي الزاقي || تنورها يستمر طوال شهر أيار .

١٧٦٩٣ - فلوبرة

دعامة تين إلى جانب حائط ليعم عليها .

١٧٦٩٤ - فلوبرة

Gymnosporangium (S).
جنس فلوبرة مجهرية من فصيلة السحاليات تتميز باستقلالها التطوري وبانتفاء البتلات المتحارة التي تصب في كل طور . لين هي تتقلل حل الورديات في طورها الأبدى إذ بها تتقلل حل حريانات البور في طورها النهائي . طورها الفلوري لا نظامي الإعداد وقد يعلو عدة أسابيع . مطورها الخالص يقع مستدرة ثم شائلي لولية الشكل لا قياسية التصنيع غلامية للمادة المتخلطة . شبيها الفطري يعيش ويتكاثر حل خلايا السج النباتية || أنوعها المؤدية عديدة أشهرها اقتصادياً ما يلي .

١٧٦٩٥ - فلوبرة الإجامس

Gymnosporangium sabinae, *Rostelia cancellata* (S). *Rouille grillagée du poirier* (F). *Pear rust* (E). *Birnenstecher* (D).

فطر مجهرى يصيب الإجامس والرمز والزأبل فيؤذي الأوراق والانتاد والآبار || مطهر الخاربي حل الأوراق ، في طوره الأبدى ، يقع مستدرة قطرها راوح

١٧٦٨١ - فلوب هو صلح التيس حة المياج

Alstromeria (S).
Alstromera (F). *Alstromeria* (E).

جنس نباتات عشبية سبروتية من فصيلة الفرجسيات . مهدا بعض مناطق أمريكا الجنوبية . سيقها موزة . أوزانها مستطيلة اتصال . أزهارها قمية الشكل ، متباعدة الايران الزاوية || تزهر أقرين في الحدائق وضمن البيت . ترب في الاثربة المنسوبة لتركيب التصري الفلوري المواد الغذائية الضوية والمعدنية || أنوعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

١٧٦٨٢ - فلوبرة برتقالية

Alstromeria aurantiaca (S). *Alstromera orangée* (F).
نوع من الفلوبرة منبتها الشبل واليربو . شراغها متصب يرتفع من ٦٠ إلى ١٢٠ سم . أوزانها مستطيلة اتصال الضيقة ، عابطة الخضر في الصفحات العليا ، بحريه في السفل ، تطول من ٧ إلى ١٠ سم . وتعرض نحو ١٥ سم . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها يرتقالية اللون || تنورها يستمر من حزيران إلى آب .

١٧٦٨٤ - فلوبرة حمراء

Alstromeria homantha (S). *Alstromera rouge sang* (F).
نوع من الفلوبرة . منبتها يمتد من الشبل إلى البرازيل . شراغها متصب يرتفع من ٩٠ إلى ٩٠ سم . أوزانها مستطيلة ، ضيقة ، تطول من ٨ إلى ١٢ سم . وتعرض من ١٢ إلى ٢٠ سم . نصالحا بحرية الخضر حل الصفحتين العليا والسفل . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها إلى الحيرة المابتة السعدا || تنورها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٧٦٨٥ - فلوبرة زخيفية

Alstromeria pulchella (S). *Alstromera élégante* (F).
نوع من الفلوبرة . منبتها بلاد المكسيك . شراغها متصب يرتفع من ٥٠ إلى ٩٠ سم . أوزانها مستطيلة الشكل تطول من ٨ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ٢ إلى ٣ سم . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها ودية اللون يملوها تبيج اخر يخالطه الاصفر || تنورها صهي .

١٧٦٨٦ - فلوبرة صكوكية

Alstromeria varicolor (S). *Alstromera varicolore* (F).
نوع من الفلوبرة . منبتها بلاد الشبل . شراغها متصب يعلو من ٢٥ إلى ٥٠ سم . أوزانها شبه مضطربة الشكل مستطيلة القذ . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها صفراء اللون يملوها تبيج اربوبي يتخلله الأبيض والبرتقالي . وفي قمية الشكل ، تطول نحو ٣ سم . || تنورها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٧٦٨٧ - فلوبرة

الفلوري من البقر هي الضجة (التاج) .

١٧٦٨٨ - فلوبرة

Moraea (S). *Moraea* (F). *Moraea* (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السجونييات . مهدا



فلوب



عطرة الإجامس

الجزء تملأ شمع النصل ويعرقه على صفحته السفلى وتبقى على حالها الى ان يكتمل دورها الايدي الذي يطول بنفسه ايام ثم تدخل في طورها اللدائي فيبلغ طول حاملها نحو ١٥ سم وهو على الانثى واغصان الثآليل ينمو قريبا لونها الى السمرة تطيب اللحاء والبشرة وتشوه الثآليل وتقلها. يكافئ كثر طول النظرة.



ظهرة التفاح



ظهرة الزعرور



ظهرة الورديات



ظليون

١٧٦٩٩ - ظهرة الورديات *

Gymnosporangium juniperi-virginianae, *Rozella pyrata* (S), *Rouille des rosacées cultivées* (F).

ظهر مجهرى واسع الانتشار خاصة في امريكا الشمالية حيث يتطفل على جميع نباتات الفصيلة الوردية || مظهره الخارجى على الفروع والانتاد يقع قريبا مبرقة لا نظمية الترتيب تركيب اللحاء تضطبه وتسبب التورل واليباس. وهو على الاوراق يقع لا قيسية الشكل والحجم تركيب النصل على صفحته العليا بين المروق والنسل. تبدو صفراء اللون ثم تتحول الى الحصى وتطرح بالنصل فتضدده وتتقده الى الانتفاخ على ذاته الى ان يذبل ويتس. يكافئ مكانسة ظهرة الاجناس.

١٧٧٠٠ - ظيان بقية السمل في الخلية.

١٧٧٠١ - ظيان هو الملى الضيقة الورق، اطلها.

١٧٧٠٢ - ظيكيمات *

Gymnolætes (F), *Gymnolæmata* (E).

ربة من الحيوانات الطليعية ظاهرات الشرج. فساكتها وانجاسها عديدة مظهرها مجرى ويضعها يعيش في الماء البذبة || انواعها عادمة البذبة. لواسها دائرية الانتشاب صنية الارتكاز.

١٧٧٠٣ - ظيون *

Curculigo (S).

Charançon (F), *Curculigo* (E).

جنس نباتات شعية ممررة ذرية الجلولو من فصيلة النرجسيات. موهنا بعض مناطق الشرق الاقصى انجاسها جليا. اوراقها كبيرة، جلعية الانتشاب تطول من ٢٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٥ الى ١٨ سم. نصالحا جملة الخصار اللامع. لزعزاعها صويالى تنجيم. انزعزاعها صفراء اللون او يضاء او ثنائية الخصب || انواعها المعروفة ثلاثة لا فارق بينها سوى لونها الانزعزاع وحجم الاوراق || تزود الزين في الخدائق فقط.

بين ١٠ و ١٥ م. مبرقة، لاقيسية التنجيم، حواء اللون، يرتقالية الحافة تركيب النصل على صفحته العليا يتقابلها على الصفحة السفلى يقع بنفس الحجم لونها الى الصفار الداكن. ومنه اكبال هذا الظهور الذي يبلغ تمامه نظرف سبعة ايام او ثمانية يتنقذ الظهور الحصى الذي تبصر عنه الصاميل التبدلية الشكل التي تملأ البقع الحمر يندوم نحو ثلاثة ايام ثم يذبل بعد ان يتصلب لونه الى الجزرة فاسمرة وبعد ان يفرح النسل المتنامة ويضفي عليها || يكافئ باستمال سائل يورود المركز ٠,٠٦ ٪. يضاف اليه كلس حراق يمدد ٠,٠٨ ٪ او سائل يورود المركز ٠,٠٦ ٪. يضاف اليه ٠,٠٣ ٪ من سلفات الحفيد.

١٧٦٩٦ - ظهرة الاكيدنيا *

Gymnosporangium confusum, *Rozella mespiti* (S), *Rouille du néflier* (F).

ظهر مجهرى يتطفل على الاكيدنيا والسقيل فيحطب الاوراق ويذوق الثآليل || مظهره الخارجى، على الاوراق، يقع مستدرة يرتقالية اللون سمر الخار تملأ النصل على صفحته العليا تنجيمه وترفع البشرة فتضد ذلك دامة اسطوانية طولا نحو ٥ م. تتجبر عنه ادراكها الى مدة قدد || وهو على الثآليل يقع قريبا صلبة لونها الى السمرة المابقة تشوه الثآليل وتطليا يسه ان تمرق مير نموا. يكافئ باستمال السوائل السلفوكسية عند الانزعزاع.

١٧٦٩٧ - ظهرة التفاح *


Gymnosporangium juniperinum, *G. tremelloides*, *Rozella penicillata* (S), *Rouille griligée du pomier* (F), *Scam gall of mountain juniper* (E), *Apfelrost* (D).

ظهر مجهرى يصيب التفاح والاجناس والنبات. مظهره الخارجى على الانتاد والانتاد يقع قريبا لا قيسية الشكل تملأ اللحاء ترفع البشرة وتغيرها وتطليا || وهو على الاوراق يقع مستدرة لونها الى الجزرة تملأ النصل على صفحته السفلى تنجيمه وترفع البشرة التي تبدو كالدامة الاسطوانية طولا يراوح بين ٤ و ٦ م. ثم تتجبر الى عدة قدد حلزونية الشكل || يكافئ باستمال السوائل السلفوكسية قبل الانزعزاع ومنه اكبال.

١٧٦٩٨ - ظهرة الزعرور *

Gymnosporangium clavariaeforme, *Rozella laceata* (S), *Rouille de l'aubépine* (F).

ظهر مجهرى يتطفل على الزعرور وانه يصيب الاجناس. مظهره الخارجى على الاوراق، يقع مستدرة لونها الى



ع



عاجة

Eburna (S).

Eburne (F). Eburna (E).

جلس حيوانات بحرية مفرسة من الرخويات مديات الاصل
وفصيلة الطحريات. انواعها المعروفة قليلة المدة منتشرة
في بعض بحار البلاد الحارة || اصداؤها مسامكة مألوفة
كالملح ، لناعية ، بيضاء اللون ، وردية الموانج ، يملوها
تفجع جزوي او عشائي وفي قريته الشبه من البق ، بطينة
القاعدة والوسط ، حلزونة القصب المذهب || شائعة الاستعمال
الصناعي .

١٧٧١٢ - عاجة *

Caducue (F).

Deciduous (E).

المائل اسم حال يطلق على النبات الذي تسقط اوراقه
كل سنة || والمائل هو تلك الاوراق المنتشرة الساقطة .

١٧٧٠٥ - عاتق

الماتق : فرخ الطائر اذا طار واستقل وقيل الماتق فوق
الناقص وهو الذي يتحسر من ريشه الاول وينت له
ريش جلدي اي قري .

١٧٧٠٦ - عاتق الثريا

Atik

عاتق الثريا نجم لير من كوكبة سيانس .

١٧٧١٣ - عاجيز عن الوقاء ، مخدّم ، مخعير ،

محلقي Insolvable (F). Insolvent (E).

هو من عاجز عن وفاء ديونه .

Ada (S). Ade (F).

١٧٧١٤ - عادآه

جنس نباتات عشبية اعمية معمرة من فصيلة السحليات.
انواعها المعروفة قليلة جميعها برية ورّ ينية . اديسائها
اسطوانية او مخروطية ، حشيتة ، تطول نحو ١٠ سم. اوراقها
من اثنين الى ثلاث وفي قرصية الانقسام ضيقة النصل
تطوي من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١٠ م. ازهارها
عنقودية التجميع ، ارجوانية اللون ، سواد التجميع ، ركز
على سرائح يملو من ٢٥ الى ٣٠ سم. ازهارها يستمر من
شباط الى نيسان .

Aglypha (F).

١٧٧١٥ - عادّم الأعدود

نمت تمريفي يطلق على كل حية غير سامة مألوفة الملائم
العامدة للتفديد .

Adactyle (F).

١٧٧١٦ - عادّم الأصابع

نمت تمريفي يطلق على بعض القشريات عديمات الملاقط .

Damarious (F).

Beet thinner, Thinning machine, Gapper (E).

معمل ميكانيكي يقطع في سيرة ما زاد من النبات عن المعدل
المفروب فيه . وهو يستعمل في الزراعات الكبيرة .

Infertile (F).

Infertile, Unfruitful (E).

١٧٧٠٨ - عاتكة

الشجرة التي لا تأثبر .

Antimite, Miteicide (F).

Mite-Killer, Miteicide (E).

١٧٧٠٩ - عاتوك

كل مادة من شأنها ابعاد المث او القضاء عليه تدعى
عاتوكاً .

Rigole (F).

Trench, Channel, Duct (E).

١٧٧١٠ - عاتلور

جرى الماء حفر له في التربة . ج عواتير .

Ivoire (F).

Ivory (E).

١٧٧١١ - عاج ، صنجاج ، مسك

انياب الفيلة او عظام اتيانها .

1٧٧٣١ - عاكسية ، قيرفيس Prêt (F). Loss (E).
مقد يدفع به اللز إلى غيره متقلوا أو حيا أو شيئا ميتا
بنحوه ليستسلمه زبنا محذوا ثم يرد .

1٧٧٣٢ - عاكسية الاستئصال Prêt à usage (F).
Commodes (E).
هي دفع شيء إلى المستير ليستسلمه ثم يرد يمينه بلا
مقابل .

1٧٧٣٣ - عاكسية الاستهلاك Prêt de consommation (F).
توايها ان المير ينقل ملكية العين المارة إلى المستير
ليستهلكها في منامه ويرد شلها في زمن معين .

1٧٧٣٤ - عاكول Isolant (F).
خير ناقل للكهرباء . Isolating (E).

1٧٧٣٥ - عاكول Isolateur (F). Insulator (E).
صفة للمواد أو الأشياء التي تتصل بخدمة عدم نقل الكهرباء .

1٧٧٣٦ - عاكساف Tris fort (F). Very strong (E).
لعت تعريفي يطلق على اشد التبرج سورة .

1٧٧٣٧ - عاكسوق Tinnunculus (S).
Crécerelle (F). Kestrel (E).
جنس طير من عائلة الصقور وضيعة الصقريات . انواحه
٢٠ جميعها صغيرة القد ، جميلة الشكل والجمال ، مستقيمة
الاقوام . طولها يراوح بين ٢٢ و ٣٢ سم . ثوبها أتم
الريش . موطنها ذائعة . أذنانها طويلة . ارباعها دقيقة ،
حريظة ، صفراء اللون . منابرها صغيرة ، سوداء اللون ،
قوة البرة الحادة || يذبح في الأغيار الشائعة . اناله
تضع وتضع من ٥ إلى ٧ بيضة || وهو من الجوارح
الناقلة لأنه يقضي جل منظر القوازم العذراء || انهم
انواحه المسمى المعروف ولسوق الثوري والوبيق .

1٧٧٣٨ - عاكسوق الدودي Tinnunculus sparverius (S). Crécerelle des moineaux (F). Windhover (E).
نوع من العاسوق وهو طائر خفيف الجناح ، حاد المزاج ،
ثديده البلس . طوله نحو ٢٧ سم . ثوبه إلى الحمرة الناعية
يبقى عنه الظهور ويصغر عنه البطن . ريشه أتم التزيين
اللامع || يصيد الثوري والعصافير الصغيرة والقوازم
والقطا والخشرات . وهو من الطيور القاطنة التي تجوب
الشرق والغرب .

1٧٧٣٩ - عاكسوق معروف Tinnunculus alandicus (S). Crécerelle commune, Emouchet doré (E). Common windhover (E).
نوع من العاسوق وهو أكبرها حج وأجها شكلا وأمتها
صيذا . قدره قدر الباسق . طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه إلى
الحمرة الناعية اللامعة للمزاج . وهو أتم الريش ، أسود
الترتيج المستطيل || قوته القوازم والقطا والقوازم
والخشرات .

1٧٧٤٠ - عاكسب ، عاكيب ، عاكيب ، عاكيب Herbeux, Herbu (F). Grassy, Herbous, Overgrown With herbs (E).
ما كان كبير المشب .

1٧٧٤١ - عاكشبات ، عواكشب Herbivorus (F).
Herbivorous (E).
الحيروانات التي تأكل الاغشاب .

1٧٧١٧ - عاكدم الرأس Acéphale (F).
Acéphalous (E).
أسم يطلق على بعض الرغويات من صفحيات الهياشيم
تتميز بانعدام الرأس .

1٧٧١٨ - عاكدم العروق Enerve (F). Enervate (E).
نعت تعريفي توصف به الارواق الخالية من العروق .

1٧٧١٩ - عاكدم العكسد Esode (E). Enod (E).
نعت تعريفي يطلق على الاغشاب الماددة العكسد .

1٧٧٢٠ - عاكدم الفك Agneche (F).
Agnathous (E).
هو من الحيوان من كان عادم الفك أو الفك الأسفل من
الشفق . ومن الحشرات من كانت عادمة الفك .

1٧٧٢١ - عاكدم المفاصل Inarticulé (F).
Inarticulate, Jointless (E).
اطبال لا مفصل .

1٧٧٢٢ - عاكدم مآك الفك Agnathes (F).
Agnatha (E).
فئة من الاسماك عادمة الفكوك ورتبة الزمائل . متجسراتها
تدعى صفحيات الجلود . هي أكلها غضروفية لا عظمية .
خياشيمها جيبية الشكل || الرتبة الوحيدة الماصرة تدعى
حلطيات الفوال . اعرف اسماكها الملكنى والملكسين .

1٧٧٢٣ - عاكدي Houtain (F). Haughey (E).
هي الكمية التي تعرض على الفجرة . ج حواد .

1٧٧٢٤ - عاكوج Grimpance (F).
Twining, Crooping (E).
كل نبتة تتسلق غيرها .

1٧٧٢٥ - عاكود Mycophagae (F).
Mycetophagous (E).
لعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على الفطور .
م. عاكود .

1٧٧٢٦ - عاكوشة ، معركشة ، معركشة Liane (F). Liana (E).
كل نبتة سائها طويلة قصفة لا تمكها من الانصاف
بدون عائل تركر عليه .

1٧٧٢٧ - عاكوش Traverser (F). Joint (E).
هو السمحاق نوع من البهرم ، اطله .

1٧٧٢٨ - عاكوشة Adventicia (F). Adventitious (E).
كل نبتة تنكسر مرشا وتلتقي مع غيرها من النباتات
المزدهدة .

1٧٧٢٩ - عاكوشة Traverser (F). Joint (E).
كل غشة جازنة تدعى عاكوشة .

1٧٧٣٠ - عاكوشة ، عاكوش Commodes (F).
Free loan (E).
مقد ياتزم به المير دفع شيء إلى المستير ليستسلمه زبنا
محذوا ثم يرد أو ملكه بمقابل أو بلا مقابل .



عاسوق الثوري



عاسوق معروف

Tempête (F). Storm (E).

احتلال جوي عنيف القوة شديد الوقع بهيج الموارض الجوية ويثيرها .

Fistipare (F). Fissiparus (E).

كل ما كان تسانله ضفوة اي بالانقسام الى شطرين .
ويدعى أيضاً مَقْطَع .

Serpent véneux (F).

Venomous snakes (E).

حية خبيثة يموت الذي تلسه من ساعته .

Stérile (F).

Sterile, Barren (E).

ما كان لا يقبل الاخصاب .

17754 - عاكور قرحاً * ، عُرْد القَرْح

Anacyclus pyrethrum (S). Anacyclus pyrethre, A. pourpre (F). Pellitory of Spain, Alexander's foot (E). Alexanderfuss, Spichelwurz (D). Pilastro, Parietaria de Spagna (I).

نبات عشبي طبي حولي من فصيلة المركبات . ساقه تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه كبيرة القند كثيرة التفريغ والتشريح . نصلها خلى البشرة . وريقاتها الزهرية كثيرة العدد . مستطيلة الاذن ، صفيرة القند . ثماره يزور مجتمعة الغلاف ، هدنة المادة ٤ جلوره واوراته واظهاره فواحة الحرف ، طمها حريف لاذع ، وانصها بهيج الانف وقد تسبب البطاس . يستخرج منها مضغوت نام مادته القمالة القروية يستعمل في القضاء على الحشرات . يستعمل في عدة تركيب طبية انصها مضغوت الانسان .

17755 - عاكول ، حاج ، وَتَحْسِيل المَصْم ، أَشْطَرُحَار

Alhai mannifus, Al. maurum (E). Alhage, A. des Maures, Sainfoin agul (F). Camel thorn, Hebrav manna plant (E). Alhagistrach, Mannastrach (D). Lupinella alhai, Mannella di Perlis (I).

نبات عشبي ، لبني مخشوش معمر من فصيلة القرنيات . ساقه شاذكة فرام تملو نحو ١٠٠ سم . فروه نحلة الشوك . اوراقه بسيطة كاملة مستطيلة ٥ وهو من النباتات التي تفرز اللبن ويقال ان من بني اسرائيل كان من فرزه لانه كثير اللبود في صحراء سيناء .

17756 - عاكول الفَرْكَال هو الشكاعة ، الحلبا .

Réflecteur (F). Reflector (E).

جهاز يعكس النور او الحرارة .

Claviceps (S).

17758 - عاكوب *
جشن تطور مجهرية من النساخيات وفصيلة الشبليات . تتميز باصاها التي تحيط الزونية وتنقسم فيها تشكل اطاراً حولي يحيط السرون ٥ يولها شبلي الشكل متوازي الترتيب تحفصه تكات مستطيرة ٥ اوراقه عديمة منها واحد يركب النبات ويؤيدوه هو عاكوب الشيلم .

17759 - عاكوب الشيلم *

Claviceps purpurea, Sclerodium clavus, Sphecilla segetum (S). Ergot du seigle (F). Ergot (E). Mutterkorn (D).

فطر مجهرى يركب الشيلم ويثيره من النباتات انصها البيشة والنف والتغرول ولقد كتيل والبوس والبس وذيل الغار واليزير والشبير والشوفان والصوية والمكرش والذرع

17762 - عاشق ومَشْقُوق اطلب غلدة كروية .

17763 - عاكيم *

Triglochin (S).
Triglochin, Trosart, Joncage, faux jonc (F). Arrow grass, Marsh arrow grass (E). Echter Dreisack (D). Triglochino, Gluncastrelle, Glunco falso (I).

جس نبات بري ، مروحية ، اسلية الشكل ، صمرة من فصيلة النساخيات . اوراقه عديدة مضطمة من نباتات الواقع الرطبة انصها المناع وريال الشوط الجيرة ونباتات الانهر واغوارها .

Triglochinaceae (S).

Triglochinaceae (F). Triglochinaceae (E).

فصيلة نباتية من صميدات الفلقة . اجناسها وازواها عديدة . جميعها اسلية الشكل والاوراق . ازارها كية ، مرتفعات الميض . اشهر اجنسها النائم .

Herbicide (F).

Herbicide, Weed-Killer (E).

كل مادة فاعلة تستعمل للقضاء على الاعشاب ج . عشيق .

17764 - عاشيق * ، عاشيق (F). * Corynetes (S).

جس حشرات غشبية من فصيلة اللزجنيات . انواعه المعروفة ١٤ معظمها من حشرات العالم القديم ٥ جميعها صميدة القند . اطوالها تراوح من ٤ الى ٨ سم . اطيها متراكبة الاذن الزاوية ٥ سرعها نهاري . قوتها رقيق الازداد انصها اذار الفصيلة الصموية ٥ اشهر انواعها الماشوق الارزقي (Corynetes caeruleus) الذي يعيش في الحدائق ويدخل المنازل حيث يقتنص بعض الحشرات الفاصرة .

17767 - عاشيق لزق *

Corynetes caeruleus (S).

Corynetes bleu (F). Corynetes caeruleus (E).

حشرة واحة غشبية قافصة من فصيلة اللزجنيات وريقة صميدات الاجنسة . يختصها تموش على ازار التباينات البرية والتربوية . يركبها غشبية قافصة تقتنص الحشرات الدنيا ٥ جسها صلب القند بطول من ٤ الى ٥ سم . ثوبا الى التزقة . رأسها مستعرض الجرم . زباناها غشبية ، مستطيلة . صماتها صميرتان بارزتان . ظهرها مستدير الطرف اللامع ، نحيل التجزير النعدي القاطب . اراسها خاسية المقل ٥ لها جبل واحد في الخلف . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في التبار وتبيت في الليل ٥ البرقة عنه ادراكها الكمال الجسودي تطول من ٨ الى ١٠ سم . جسها مدوني الشكل ، مستطيل القدم والراس ، مستدق الطرف اللامع ، سداسي الروابج ، ضلع التاكثير . اسد القرن ، اسر الموج ، مبهر الحلب ، اسد الحراس ٥ طول الاكامل الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً يقتضي في شقوق الحطب او تحت القشور والانقاض .

17768 - عاكس *

Réfractaire (F). Refractory (E).

كل مادة تقاوم التحويلات للمائرية ولا تنصاع الى غططها الرئيسي . كالبطين الذي يصنع الحرارة فلا تصهره .

Fouloir (F).

Bester (E).

آلة تستعمل لسحق الآل واستخراج صابرها انصها العنب .



عاشق



ماشوق لزق



عاكور قرحا



عاكوب الشيلم

Pubis

١٧٧٧٥ - عَائِكَة

١٧٧٧٦ - عَائِكَة اصل الإذن. ج. حوانة .

Anthropoïde (F).

١٧٧٧٧ - عَائِكَة

الإنسان طائر يسمى الإديج ، اطلبه .

Démolisse de Numidie (F).

١٧٧٧٨ - عَائِكَة نميدك

طائر يسمى اديج نميدة ، اطلبه .

Pubien (F). Pubic (E).

١٧٧٧٩ - عَائِي

Infirmid (F). Infirmity (E).

١٧٧٨٠ - عَائِكَة

كل أثر يبقى في البدن عقب إصابة أو مرض . والمصابة قد تكون وقتية إذا كانت وشيكة التوالد أو دائمة .

Taxes (F). Taxus (E).

١٧٧٨١ - عَائِكَات

هي الرسوم المفروضة على العقارات والبضائع . وأحياناً مائدة .

Rentabilité (F). Rentability (E).

١٧٧٨٢ - عَائِكَة

راجع إيراد .

Delphinium (S). Dauphinella (F).

١٧٧٨٣ - عَائِقُ

جنس نباتات حولية ومعمرة من المربقيات ونباتة الشقيقيات . أزهاره المرفوعة نحو ٦٠ مظهراً بري وبعضها زراعي زخفي . أولها متعاقبة ، منفعة ، مفصصة ومرفوعة . أنزهرها صنفوي أو سنبل التجميع . أنزهارها جميلة الشكل ، مختلفة الألوان || أشهر أنزهاره ما يلي .

١٧٧٨٤ - عَائِقُ الحَدَائِقُ * ، وجمل البُتيرة ، مَهْمَاكُ

Delphinium ajacis (S). Dauphinella des jardins, Pied d'ajouette des jardins (F). Rocket larkspur (E). Gazantrittersporn (D). Calcestrippe dei giardini, Speronella (I).

نبات عشبي حولي زخفي يعلو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم . ساقه فراء . أزهاره غليظة القترع . عقيدته الزخري كبير القند ، لبد الأزهار . لون أزهاره يختلف باختلاف الصمم . يكثر فيه الأزرد والأبيض والبنفسجي والوردي والأحمر || أنزهاره يستمر من حزيران إلى تموز .

١٧٧٨٥ - عَائِقُ الحَفَلُ * ، كُنْشُودَة مَكْبِيَة

Delphinium consolida (S). Dauphinella consoude, D. des blés, Consoude royale (F). Field larkspur, King's consoud (E). Feldtrittersporn, Hornkümmel (D). Consolida regale, Calcestrippe delle biade (I).

نبات عشبي حولي بري وزخفي يعلو من ٢٠ إلى ٦٠ سم . يحمله هربي الشكل . ساقه فراء . فروعه محمية بالمتاقيد الزهرية القليلة الكثافة . أزهاره زرقاء اللون ، أو بيضاء . أصراره الزراعية عديدة جنبا إلى جنب الكمية الزهر والصغيرة القند والمدنية المستطيلة . جميعها طيبة تستعمل كمادة لبرق وطاردة للعدو ودائمة الجروح إلا أنها سامة للمادة الغذائية مما يجعلها من النباتات السامة الخطيرة || أنزهاره يستمر طوال فصل الصيف .

١٧٧٨٦ - عَائِقُ الشَّرْقِي

Delphinium orientale (S). Dauphinelle d'Orléans (F).

نبات عشبي حولي بري وزخفي يعلو من ٢٠ إلى ٦٠ سم .

والنزار والقطبان والقمح والتبعر والتبيل والتبيل والمزمار والمخلص ، الخ . || مظهره الخارجي قريب أسود ، شكله شكل الدائرة ، يدخل بوفرة مع الجذرة عند تقطيع الزهرة فيشتت في اللبش حيث يمشي وينثر طفيفاً فيجوز الحية وما فيها إلى مادة صلبة سوداء اللون تحوي مع بوفه بعض الجواهر السامة والمواد التي تلوذ بها الحية المأكوبين . يكتمل بتظليل البذر من الحب المأكوب وقد يتم ذلك إما بالتلف وإما بالتلف في الماء حيث يرقه الحب السليم ويظهر الحب المأكوب . أو باستبدال أحد القواشير المظفرة .

١٧٧٩٠ - عَاكُورِين * ، لِرَاكُورِين ، دَاكُورِين

Ergotisme مادة شبه قلوية توجد في الحبوب الموهومة بفطر المأكوب .

Régne (F). Kingdom (E).

١٧٧٩١ - عَائِمُ العالم أو المملكة هو أول قسم في تصنيف الأحياء ، يقال عالم الحيوان وعالم النبات أو مملكة الحيوان ومملكة النبات . راجع تصنيف .

١٧٧٩٢ - عَامُ An (F). Year (E).

العام حول يأتي على التوالي الأربع الفناء والربع والصيف والخريف وكل هذا فالعام اخص من السنة .

١٧٧٩٣ - عَائِكَة Gerbe (F). Sheaf, Bundle (E).

مجموعة من غلظ الحصيد .

Facteur (F). Factor (E).

١٧٧٩٤ - عَائِلُ كل عنصر آخر من مجموع عناصر الوحدة .

Ouvrier, Salaré (F).

١٧٧٩٥ - عَائِلُ Workman, Salaried, Paid (E).

هو كل شخص مرتبط بمقد العمل أو مقد الاستعانة فيعمل بيده عملاً صناعياً أو زراعياً .

Facteur premier (F).

١٧٧٩٦ - عَائِلُ أَسَاسِي Prime factor (E).

Agent oxydant (F).

١٧٧٩٧ - عَائِلُ التَّأَكُّدُ Oxidizing agent (E).

Facteur expérimental, F. appliqué (F).

١٧٧٩٨ - عَائِلُ تَجْزِيئِي Applied factor (E).

Facteur biotique (F).

١٧٧٩٩ - عَائِلُ حَيَوِي Biotic factor (E).

١٧٧٩٠ - عَائِلُ وَسَيْطُ ، عَائِلُ مُسَاعِدُ ، وَسَيْطُ

Agent catalytique, Catalyseur (F). Catalytic agent, Catalyst (E).

جسم يحدث التحليل باللاسة . اطلب مساحل .

Facteur commun (F).

١٧٧٩١ - عَائِلُ مُشْتَرَك Common factor (E).

Amor (F).

١٧٧٩٢ - عَامُور Amor

العامور كوكب سيّار يسمى الزامي ، اطلبه .

١٧٧٩٣ - عَائِكَة

ألفان كوكب بعض اسفل من السعد .

Anesse (F). She-ass (E).

١٧٧٩٤ - عَائِكَة

هي الإتان ، أنثى الحمار .



عائِقُ الشَّرْقِي



عائِقُ الحَفَلُ

١٧٧٩٣ - عائق كشمير

Delphinium cashmirianum (S). *Dauphineelle du Cachemire* (F).

نبات عشبي معمر يصلو من ٣٠ إلى ٤٥ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة. أوراقه مستعرضة خامة التفصيص، نصلها خالي البشرة، مسن الحافة. أزهاره كبيرة القدر، قبابها غريزة الشكل، حطية اللون. بتلاتها بتنجسية. عناقيدها صغيرة رجلة. أزهاره يستمر من حزيران إلى تشرين الأول.

١٧٧٩٤ - عائق ممسك

Delphinium brunonianum (S). *Dauphineelle musquée* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو نحو ٣٠ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة. أوراقه كلبية الشكل، ثلاثية أو خامة التفصيص. أزهاره كبيرة القدر، زرقاء اللون، أرجوانية الختار، سواد القرقة، فواصة العرف المسكي المستحب. أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

١٧٧٩٥ - عاكيل *Plante hôte* (F). *Host-plants* (E).
هو كل نبات يعيش عليه نبات طفيل.

١٧٧٩٦ - عيب *Lamper* (F). *To toss off* (E).
أخذ الماء حيا من غير مص وهو ما يفعله الطائر. والعبء هو طريقة شرب الطير.

١٧٧٩٧ - عيبالية *Abetia* (S).
Abatia, *Abetia* (F). *Abetia* (E).

جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة النضسيات. أنواعها المعروفة قليلة البند أحاطها بعض المناطق الحارة من أمريكا الجنوبية. ساقها منتصبة فراء. أوراقها متعاقبة. أزهارها عقودية طرفي. أزهارها جميلة يكثر فيها اللون الوردي ثم الأصفر. بعض أنواعها تزدهن بزود في الحائل.

١٧٧٩٨ - عباد الشمس، عين الشمس، دوار الشمس *Heliannthus* (S).
Hélianthe, *Soleil* (F).

جنس نباتات عشبية حولية أو معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر. الأنواع المعروفة نحو ٥٠ ساقها اسطوانية جالسة. أوراقها منتقة أو لائفة، كاملة، كبيرة القدر. السفلية منها متعاقبة الاكثر اضا الوسطى والعالية فتناقية. أزهاره رؤسي التجميع، كبير الأقراص المستديرة التي تمل مع اتجاه الشمس. أزهارها انبوية، صغيرة، لبد، سراسرة، مستطيلة السنينات. بزورها وتدية الشكل، فضلة الحروف، دهنية الباب. أشهر أنواعها الزراعية ما يتبع.

١٧٧٩٩ - عباد الشمس الأزغب

Heliannthus mollis (S). *Hélianthe velu*, *Soleil velu* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه غليظة، زياء، حادة الفروع. أوراقه لائفة متعاقبة، بيضية الشكل، نصلها كبير الصفعة المشعة ثلاث المروق البارزة، الحبل اللون. قرصه الزهري متوسط القدر، قطره نحو ١٠ سم. لسينات أزهاره خلية البشرة لينا إلى الصفار الكبريتي. أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين الأول.

ساقه فراء. هيكله هرمي الشكل. أوراقه قوية التفرع. عناقيد الزهرة صغيرة القدر. أزهاره بتنجسية اللون. أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

١٧٧٩٧ - عائق أنيق *Delphinium speciosum* (S). *Dauphineelle élégante* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو نحو ٦٠ سم. ساقه موقفة قليلة الفروع. أوراقه خامة التفصيص، مسنة الحافة نصلها خالي البشرة. أزهاره إلى الزرقاة التليبة الالسة. عناقيد الزهرة صغيرة القدر رجلة. أزهاره يستمر من حزيران إلى ايلول.

١٧٧٩٨ - عائق جبتي، زيبب بيري، عيشة *Delphinium staphisagria* (S).
Dauphineelle staphisagria, *Staphisagria*, *Herbe aux*

poux (F). *Stavesacre*, *Lousewort* (E). *Scharfer rittersporn*, *Leuskraut* (D). *Calceatrippa staphisagria*, *Serfasaria*, *Tusano* (I).

نبات عشبي بري طبي يصلو نحو ٧٠ سم. ساقه فراء. فروعها منتصبة. أوراقه مقصصة وبشرة نصلها خالي البشرة مسن الحافة، بحري اللون. عناقيد الزهرة صغيرة القدر، لبد، أزهاره وردية اللون. بزور حامزة العلم تستعمل كهيصة يسلطه وطاردة للبدان. لكنها خطيرة نظرا لما تحويه من مواد بحالية مؤذية. أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

١٧٧٩٩ - عائق ذليل *Delphinium zall* (S).
Dauphineelle zall (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو من ١٥٠ إلى ١٥٠ سم. هيكله هرمي الشكل. ساقه فراء. فروعها منتصبة تشعب على ارتفاع ٣٠ أو ٤٠ سم. أوراقه شبيهة بالتفرع التدي الشكل. أزهاره عناقيد كبيرة القدر كبريتية اللون. أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٧٧٩٠ - عائق مستعرجي *Delphinium azureum* (S). *Dauphineelle azurée* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه وفروعها وأوراقه وأزهاره خلية اللحاء والبشرة. أوراقه خامة أو سباعية التفرع. أزهاره مستعرجية اللون. عناقيد الزهرة مستطيلة الشكل متدة الكنانة. أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

١٧٧٩١ - عائق كبير الزهر *Delphinium grandiflorum* (S). *Dauphineelle à grande fleur*, *Pied d'aloette de Chine* (F). *Large flowered*

haricarp (E). *Grossblütiger Rittersporn* (D). *Calceatrippa a fiori grandi* (I).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو نحو ١٠٠ سم. ساقه فراء. فروعها متعاقبة، عاحية العناقيد الزهرية. ثدية التفرع. أزهاره كبيرة القدر بيضاء اللون أو زرقاء أو حمراء. أزهاره يستمر من حزيران إلى ايلول.

١٧٧٩٢ - عائق كاردنلي *Delphinium cardinale* (S). *Dauphineelle cardinale* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه موقفة حادة الفروع ثلاثية أو رباعية المقاد. أوراقه خامة التفصيص والتفرع. سنيك الزهرية مستطيلة رجلة. أزهاره أرجوانية اللون صفر التيج. أزهاره يستمر من نيسان إلى تموز.



عائق أنيق



عائق جبلي



عائق كبير الزهر

١٧٨٠٠ - عيار الشمس المورق *

Helianthus orgyalis, *H. salicifolius* (S). *Hélianthe tizan*, *Soleil de six pieds* (F).

نبات زراعي معمر يصلو نحو ثلاثة أمتار وقد يبلغ في ظروف خاصة ستة أمتار. ساقه مرطبة مساه. أوراقه كثيرة البدن، متناظرة الارتكاز || اقراصه الزهرية كثيرة البدن، قطرها يراوح بين ٣ و ٧ سم. لسيات انزهاره سوية الصغار القاتم || انزهاره يستمر من ايلول الى تشرين الاول.



مباد الشمس الجبار

١٧٨٠٦ - عيار الشمس الضخام

Helianthus laetiflorus (S). *Hélianthe fastueux*, *Soleil fastueux* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه هدية الزغب الجامد. أوراقه سنانية الشكل، جامدة الصفة، نصلها غثن المسس، ثلاثي الفروق، مسن الحافة، بحري الخصار، قرصه الزهري صاجي الشكل. قطره نحو ١٢ سم. لسيات انزهاره صفراء اللون، وديعة اختار || انزهاره يستمر من آب الى ايلول.



مباد الشمس الشري

١٧٨٠٧ - عيار الشمس النيلي

هو طرفيلو الصباغين، امليه.



مباد الشمس السقولي

١٧٨٠٨ - عيار الشمس عبق الورق

Helianthus angustifolius (S). *Hélianthe à feuilles étroites*, *Soleil à feuilles étroites* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه هدية الزغب. أوراقه متباينة الارتكاز. نصلها يطوي ٧ الى ١٨ سم. ويبرس من ٤ الى ٨ سم. وهو سيك الصفة الخشن || اقراصه الزهرية قليلة البدن. قطرها يراوح من ٥ الى ٨ سم. لسيات انزهاره سفيرة اللد، صفراء اللون || انزهاره يستمر من آب الى تشرين الاول.



مباد الشمس القمي

١٧٨٠٩ - عيار الشمس كبير الورق

Helianthus strumosus, *Hélianthe* (S). *Hélianthe macrophylla*, *Soleil à grandes feuilles* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ١٢٠ الى ٢٢٠ سم. جلوه صفريه اصبحية الشكل. ساقه ثنائية او ثلاثية المفاصل، جامدة القروح، قليلة الزغب. أوراقه متناظرة، يديسة مستطيلة، نصلها كبير اللد مغبر الصفة، قرصه صاجي الشكل، قطره نحو ٨ سم. لسيات انزهاره الى الصفار الباهت || انزهاره يستمر من آب الى تشرين الاول.



مباد الشمس الماردي

١٧٨١٠ - عيار *

Tolypeus (S).

Apar, *Tolypeus* (F).

جنس حيوانات لينة من فصيلة المرمعات. أنواعه المعروفة ثلاثة اصطناعيا بعض مناطق أمريكا الجنوبية. تألف الغابات والاحراج. ملجئها الحيواني فردي. تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل اجسام تحفرها في التربة قرب جلوع الاشجار اجسامها صغيرة. رؤوسها غروبية. اقفاها مجهزة باسنان اطولية الشكل يراوح عددها من ٨ الى ٩ ازواج في كل فك. عيونها وباهتها صغيرة. اذنابها قصيرة مشعلة. قوائمها قصيرة. اطاليلها قوية. دويها مؤلفة من جن "رأسي" وحين "مكتبي" تقصه من الخن الحوضي ثلاثة احزمة غضروفية متعاطلة متحركة تنقبض وتتبدد مع الحاجة بما يصل البكر يتحرك عندما يشاء || انثاه ثنائية الاطباء تصنع في كل رمس من جرم ثلثة جراء || اما انواعه الثلاثة فهي التالية :



مباد الشمس كبير الورق

١٧٨٠٠ - عيار الشمس الجبار *

Helianthus giganteus (S). *Hélianthe géant*, *Soleil géant* (F).

نبات زراعي معمر يصلو نحو ٣٠٠ سم. جلوه صفريه جزائية طويلة. ساقه ضخمة، مائلة للحاء، جامدة القروح. أوراقه كبيرة اللد، نصلها سناني الشكل، مسن الحافة، جامد الصفة المسبك || قرصه الزهري متوسط الحجم قطره نحو ٨ سم. لسيات انزهاره جامدة الصفار || انزهاره يستمر من آب الى تشرين الاول.

١٧٨٠١ - عيار الشمس السنوي *

Helianthus annuus (S). *Hélianthe annuel*, *Tournesol*, *Grand Soleil* (F). *Golden flower* of Peru, *Sun-flower* (E). *Echte Sonnenblume* (D). *Elfanto del fioro grandi*, *Mirazole*, *Girasole*, *Tazza regia*, *Coppa di sole*, *Sole* (I).

نبات زراعي حولي يصلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه جامدة مستقيمة مؤبرة اللحاء تحمل في اعلاها بعض القروح البقيفة. أوراقه كبيرة اللد قليلة الشكل || نصلها غثن المسس، حاتين الخصار البحري. قرصه الزهري الفردي كبير اللد قطره يراوح بين ١٥ و ٥٠ سم. لسيات انزهاره صفراء اللون ذهنية المواج || انزهاره يستمر من تموز الى ايلول || وهو من النباتات المتنامية لثلاثة الزراعة والاستعمال. يزود هدية وطيقة.

١٧٨٠٢ - عيار الشمس السقولي *

كبتكر، ليلفاس دومي

Helianthus tuberosus (S). *Hélianthe tubéreux*, *Topinambour* (F). *Candopotosto*, *Jersalien artichoke* (E). *Knollensonnenblume* (D). *Elanto tuberoso*, *Tartufo bianco*, *T. del canna*, *Carciofo di terra* (I).

نبات سقولي زراعي معمر. جلوه سنزائية الشكل والقد، ساقه مستقيمة تدلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. أوراقه كبيرة اللد، مستطيلة المت، نصلها جامد الصفة الخشن، مسن الحافة، ثلاثي الفروق الرئيسية. قرصه الزهري متوسط اللد قطره نحو ٦ سم. لسيات انزهاره احمليجية الشكل، زاهية الصفار || انزهاره يستمر من ايلول الى تشرين. زراعته شائعة، صاقله مأكولة، يرغب في الارربة المتوسطة الانسجام والرطوبة.

١٧٨٠٣ - عيار الشمس الفضي *

Helianthus argophyllus (S). *Hélianthe argenté*, *Soleil argenté*, *S. du Texas* (F).

نبات زراعي حولي يصلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه فرمها فرومها دقيقة، جامدة، زيا للحاء، أوراقه كبيرة اللد، يضيقة الشكل، ثلاثية الفروق || نصلها انغب البشرة فصي للمواج || اقراصه الزهرية كثيرة البدن، صغيرة اللد، لسيات انزهاره مستطيلة الشكل، جميلة الصفار الزاهي، سطيلة المختار || انزهاره يستمر من تموز الى ايلول.

١٧٨٠٤ - عيار الشمس القاسي

Helianthus rigidus, *H. scaberrimus* (S). *Hélianthe rigide*, *Soleil scabre* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه جامدة مستقيمة قلبية. أوراقه متناظرة، كبيرة اللد، يضيقة، لسنة. نصلها جامد الصفة المسبك الخشن. اقراصه الزهرية قليلة البدن، محدلة اللد، قطرها يراوح بين ١٠ و ١٥ سم. لسيات انزهاره الى الصفرة الزاهية السوية. || انزهاره يستمر من آب الى ايلول.

١٧٨٢١ - عَيْدُ بُولِين * Eupeimidas (S).

Eupeimidas (F). Eupeimidas (E).

فضيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة الموصورة . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها نافعة تتغفل على الحشرات الضارة من نصفيات الاجنحة والضمديات والحشرقيات || حشراتنا صغيرة طولها من ٢ الى ٤ سم . اجسامها شبه اسطوانية . مرنّاتها سلبية ، مستقيمة . اذواها عديدة الاولان يكثر فيها الاسود القمعي . اجسامها شديدة القصر او لا يوجد لها || اشهر انواعها عيدول جيبي .

١٧٨٢٢ - عَيْدُ بِيحِي * Abdimia abdimi (S).

Sphénorhynque (F).

طائر من طول الساق وفضيلة القلقليات . اسلانه البلاد الافريقية يحبب بحيراتنا وانهارها كل عام || ثوبه اسود اللون تملوه مابة ارجوانية في الرأس والظهر والصدر ومابة خضراء في الجناح والذنب . عيروه وزوره ويطهه وزمكته بيض . واسه تتوج الثفن بكشفة صغيرة من الريش الارجواني الاسود اللؤلؤ || يالف مجاري الماء . قوته الحشرات والزحافات والقترينات وبعض الاشباب المائية .

١٧٨٢٣ - عَيْدُ رِبَ هو السَّاقِ الكاذب ، اطليه .

١٧٨٢٤ - عَيْدُ رُودُ

المشب العبدُ وشب عرد هو الرقيق الرديء الفشار .

١٧٨٢٥ - عَيْدُ رُوسُ * Epterus (S).

Eptera (F). Epterus (E).

جنس حشرات مؤذية من لمحات الاجنح ديهيات القرون وفضيلة الحشرات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ عاقلها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . تعيش تحت قشور وطاه الانجار في اثناء لانظامية الخطوط تحلبها بالعليل والمرض || اجسامها صغيرة عمدة الظهر ، بيضيه اللون ، طولها من ٢ الى ٣ سم . اذواها لامة يكثر فيها الاسود والكسني والماني . احماها مجة التحذير الطويل .

١٧٨٢٦ - عَيْدُ رِيَّ Jujubier des Iotophages (F).

هو القفال ينبت ويظم قرب شطوط الانهار .

١٧٨٢٧ - عَيْدُ رِيلُ * Abralia (S).

Abralie (F). Abralies (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات واسيات الارجل . انواعه المعروفة ثلاثة منها واحد يعيش في البحر الابيض المتوسط والثاني في المحيط الاطلسي والثالث في المحيط الهندي . جميعها تأكل الحياض والشطوط . اجسامها شبه غروبية الشكل . ارجلها حاسنة ، معتدلة الطول ، مجهزة بكلايات . تكتنف القرواع وبيضين من الماهات الطافية الارتيكار .

١٧٨٢٨ - عَيْدُ رِيَّ Année conyze (F).

هو القرونوف ، اطليه .

١٧٨٢٩ - عَيْدُ رِيَّ Obsidienne, Obsidiene (F).

Obsidian, Volcanic glass (E).

نوع من التللمبية البروتاني . جسم حجري شدة الصلابة مرجحه الصخور النارية || يكثر وجوده عند فوهات البراكين القديمة والحديثة ، وفي بعض مناطق مصر وسناروا والمكسيك والبيرو .

١٧٨٢١ - عَيْدُ رُولِين * Tolypeustes tricornatus (S).

Apar de Bullon (F).

موطه البرازيل والفيونان وبيلغية . جسمه يطول نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٧ سم . قوائمه خاسية الاصابع في الامامية والخلفية . دره عنبري اللون .

١٧٨٢٢ - عَيْدُ رُولِين الكذب * Tolypeustes conurus (S).

Apar à queue conique, Mataco (F).

نوع من البسار موطه بوليفية وبعض مناطق الاربنتين . جسمه يطول نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٦ سم . قوائمه الامامية رباعية الاصابع . دره اسمر اللون . اطمل المولج .

١٧٨٢٣ - عَيْدُ رُولِين * Tolypeustes Muriel (S). Apar de Muriel (F).

موطه الشبل وبعض مناطق الاربنتين . جسمه يطول نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥ سم . قوائمه الامامية رباعية الاصابع . دره اسمر اللون . اطمل المولج .

١٧٨٢٤ - عَيْدُ رُولِين * Expression algébrique (F).

Algebraical expression (E).

حلة حاسبة مردحا الجبر .

١٧٨٢٥ - عَيْدُ رُولِين * Pimaria domestica (S). Picière domestique (F).

حشرة منبهة ناقصة من فصيلة الردييات ورتبة اختلافات الاجنحة . جسمها صغير لثدي يطول نحو ٩ سم . رأسها صغير ، بطولي الشكل . غطتها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زبائنها دقيقتان مسطيلتان . كويلها وشي الشكل . الزوج الامامي من قوائمه مجهز قفص . للمورد يعمل متحسا حاداً || قوفاها الى اعطلي الاسمر يطول موالج تنبي في الرأس والكحول || سرسها دجوي . قوفاها الدم تنص من العيوش اولاً ثم من كل حشرة تستطيع قصها .

١٧٨٢٦ - عَيْدُ رُولِين * Eglantier (F). Briar, Dog-rose (E).

هو الترسين ويعرف بالورد الجليل ، ينظف وينظف حتى تقطع منه العصي .

١٧٨٢٧ - عَيْدُ رُولِين * القيب هو حب الكاكتين وشب الكلب وشجرة الردء من اللسان . ويحمر من الاغلات من ابي حنيفة .

١٧٨٢٨ - عَيْدُ رُولِين * القيد : نبات طيب الرائحة تكلف به الايل لانه ملينة سنة (اللسان) .

١٧٨٢٩ - عَيْدُ رُولِين * القيد اللأري هو السجور ، اطليه .

١٧٨٣٠ - عَيْدُ رُولِين * Eupelmus Geer (S). Eupelma Geer (F).

حشرة مباشرة نافعة من فصيلة الميديليات . موطنها بعض مناطق البلاد الحارة والمتنوعة نحو المعتدلة الحارة . تتغفل على الكثير من الحشرات اعصها المتوسيات ومنها متغصة الثقل || جسمها عديم الجناح ، صغير لثدي يطول ٢ الى ٣ سم . جوشها غدد الجناحين . يطها معتدل الحجم . مرنّاتها جالس التصل الجامة ، معتدل الطول . قوفاها الى السواد القمعي اللامع .



عَيْدُ رُولِين



عَيْدُ رُولِين



عَيْدُ رُولِين



عَيْدُ رُولِين



عقوبة آتية

١٧٨٣٦ - **عقوبة** *Osmanthe* (F).
هي البقعة ، أظلم . أما البقعة في وضع الأبرص صفلي للشباب .

١٧٨٣٧ - **عقير** ، **عقير** *Griffe* (hoc) (F).
Root (E).
أول ما ينبت من أصول القلب ونحوه هو عقير ونحوه
قبل أن يظهر حل سطح الأرض . الواحدة مبقرة .



مبقس

١٧٨٣٨ - **عقبس** ، **عقبس** *Zabrus tenebrius*, *Z. gibbus* (S). *Zabro des céralés*, *Z. bossu*, *Z. des moissons* (F). *Corn ground beetle* (E). *Getreidelackfiser* (D).
حشرة ضارة من البقويات . جسمها محبوس الشكل ،
طولها يراوح بين ١٤ و ١٦ م . ثوبها بني اللون ، أسود
المزاج . تعيش تحت الحجاره وبنيها ، تسرح في الخليل
تتركب الأزور وتقرض الحب قبل ادراكه . يرقاتها
تقيم في الأرض داخل اتفاق تحفرها قرب جلود الزروع ،
تخرج منها في الليل لتفشي حل الاقارب للتانية .



عقبس

١٧٨٣٩ - **عقبس** *Ibacus* (S).
Ibacus (F). *Ibacus* (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الأبرص
طوال الليل فضيلة الكركليات . انزله المعروف حديد
منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة . اجسامها مبطنة
كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . تتميز بصغر قوائمها
وبدهونها القصيرة للمنسة الطرف الاسامي . انزايها
متباينة الايوان يكثر فيها الاخضر ومطقاته . جميعها
ماكولة متوسطة المصنف .



عقبس اسفح

١٧٨٤٠ - **عقبس اسفح** *Amara seneca* (S).
Amara bronze (F).
حشرة ضارة من البقويات . جسمها لزدي الشكل ،
محبوب السطح طولها نحو ٨ م . قوائمها انضغاطية
يطول مزاج اسفح . زياتها حر الجسم ، سود الطرف .
قوائمها سود السيقان والانفذاذ ، حر الارباع . تركب
التجليات على اختلاف اجسامها وانزايها . تعيش على
الزروع قبل ادراكها . يرقاتها خافتة قليلة الاذى .



عقبس اصهب

١٧٨٤١ - **عقبس اصهب** *Amara fulva* (S).
Amara rous (F).
حشرة ضارة من البقويات . جسمها محبوس الشكل ،
طولها يراوح من ٨ الى ١٠ م . ثوبها اصهب اللون ،
اخضر المزاج . تركب الزراعات الخفيفة على اختلاف
انزايها . قوائمها الارباع والبرور تنقصها وتصلبها . يرقاتها
خافتة تعيش على مختلف اوراق النبات اغصانها التجليات
والسليبات والركيات .



عقبس كسني

١٧٨٤٢ - **عقبس كسني** *Amara euryzona* (S). *Amara chéuin* (F).
حشرة ضارة من البقويات . جسمها يعني الشكل يطول
نحو ١٠ م . ثوبها كسني اللون اشقر المزاج . زياتها
وقوائمها سود . تركب البقول والنباتات الخفيفة اغصانها
السليبات . يرقاتها خافتة قليلة الاذى تكفي بقضم
امرات الاروان .

١٧٨٤٣ - **عقبويات** *Pterostichidae* (S).
Pterostichidae (F). *Pterostichidae* (E).
فصيلة حشرات من رتبة عثويات الاجنحة . اجناسها
وانزايها كثيرة المند . جميعها صغيرة لينة ، نمدة الاتحاد ،

١٧٨٤٠ - **عقبوية** *Agelena* (S).
Agelene (F). *Agelena* (E).
جنس حناكب من فصيلة العنكبوتيات . انزايها المروعة
كبيرة المند ، منتشرة في معظم اصقاع البلاد الممتدة
الحرارة . جميعها كبيرة القند . تعيش في البراري بين
الاشجار والادغال . قوتها الذباب والحوام وبعض الحشرات
الصغيرة . اشهر انزايها عشوية آتية وعشوية آتية .

١٧٨٤١ - **عقبوية آتية** ، **عقبوية آتية** *Agelena labyrinthica* (S). *Agelene labyrinthica*, *Agelene labyrinthica* (F). *Labyrinth-Spider* (E).
نوع من العنكبوتية موطنها البلاد الممتدة الحرارة . تألف
البراري والحراج . قوتها كل ما خلق يراها من حشرات .
جسمها يطول نحو ١٢ م . عند المنكب ونحو ١٦ م .
عند المنكب . صغارها اعطليجي الشكل ، جزوي اللون
يتميز من عند الرأس ويغير مع اقترابه من البطن .
صينها زياتان . فوسها صغيران متفقدان . فكها
ضليمان مقوسان . جبرامها مستطيلة . كثيفة الحب .
بطنها يعني الشكل ينتهي بزالنتين فحيتين وهو الى السرة
المخفية يطولها شمشيح احمر وسرجه تنية . شمشي قمي
الشكل ، كبير القند ، قصير العنق الاجوف ، طليق
القاعدة المثبتة ببعض الحبوب . يياتها الشوي يستمر
نحو خمسة اشهر تقريبا في عكدة صغرية الشكل ، جامعة
الحبك تحمرا تحت الحجاره المروعة من غير الله .

١٧٨٤٢ - **عقبوية آتية** *Agelena elegans* (S). *Elegant-Spider* (E).
نوع من العنكبوتية . موطنها البلاد الممتدة الحرارة . تألف
البراري . قوتها الحشرات الصغيرة اغصانها الذباب والحوام
التي تعلق في شراكها بكثرة . جسمها صغير القند يطول
نحو ٣ م . عند المنكب ونحو ٤ م . عند المنكب . صغارها
قمي الشكل ، جزوي اللون . صينها زياتان . فوسها
صغيران متفقدان . فكها مقوسان . جبرامها مستطيلة
كثيفة الحب . بطنها يعني الشكل ينتهي بست زوائد
نحيلة . وهو اسير اللون ، اخضر المزاج يطول طوله اسود
يحمض حسة خطوط متزمنة اثل اسودا منه . شمشي
قمي الشكل ، كبير القند المستديرة ، طليق القاعدة
المثبتة ببعض الحبوب ، حديد الشراك والحجارة التي تملو
من جميع الجهات . مكنتها بطولية الشكل تحبها تحت
الحجاره او بينها في المراتع التي لا تخشى غير الله .

١٧٨٤٣ - **عقبويات** *Agelenidae* (S).
Agelenidae (F). *Agelenidae* (E).
فصيلة من العناكب . اجناسها وانزايها كثيرة المند .
اعطائها معظم اصقاع العالم . تتميز بفصلها الاجسام ،
بمطاطة الجرامز ، بالباح الشم وبكبر الاشجان العليا .
اشهر اجناسها العنكبوتية ، والفلس المعروف بتكبيوت
النازل ، والدية .

١٧٨٤٤ - **عقبية** *Andeln* (F).
Swach, Windrow (E).
البعثة كية العشب التي يحصد الحاصد عند كل خطوة .
اما اذا كانت من الزروع كالقمح والشعير تضيض فيطأ .

١٧٨٤٥ - **عقبية** ، **عقبية** *Antelope melle* (F). *Antelope male* (E).
هو الذكر القمل من البلاء .

يأتي زهرة سيدة بيضاء اللون ، صفراء المخرج ، فواحة العرف النطري || أزهاره يستمر من شباط إلى نيسان .

17852 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum pulchellum* (F). *Nivéole gracile* (F).

أوراته حصفية خفيفة النصل الفسفي اللون . ثمرانه الزهري يملأ نحو ٣٠ سم . زهرته صفراء اللثة ، بيضاء اللون ، صفراء الختار ، خافتة العرف || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران .

17853 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum hiemale* (F). *Nivéole d'hiver* (F).

أوراته حصفية ، نخيلة ، زائجة الخضار . ثمرانه يملأ من ١٠ إلى ١٥ سم . ثمرانه ثنائي المصراع . أزهاره ثلاثية أو رباعية التجسيم ، بيضاء اللون ، خضراء النشة . أزهاره يستمر من آذار إلى نيسان .

17854 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum aestivum* (F). *Nivéole d'été* (F).

أوراته حصفية الشكل جملة الخضار الزاهي . ثمرانه يملأ من ٢٠ إلى ٥٠ سم . يأتي بقصة من الأزهار راجح معددا بين ٤ و ٨ وهي عاجية اللون خافتة العرف النطري . أزهاره يستمر من نيسان إلى أيار .

17855 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum roseum* (F). *Nivéole rose* (F).

نبته نخيلة زهقة . أوراتها دقيقة ، مستطيلة ، خالية النصل ، بحرية اللون . ثمرانها يملأ نحو ١٥ سم . ثمرانها ثنائي المصراع ، زهرتها وردية اللون ، وسيدة ، تطول نحو ١٠ سم || أزهارها يستمر من أيلول إلى تشرين الثاني .

17856 - **عَبْرُوشِيَّ** (E). *Dictateur* (F). *Dictator* (E). **عَبْرُوشِيَّ** (E).

الجميل المطلق المتصرف . ج عباطة .

17857 - **عَبْرُوشِيَّ** (E). *Dictature* (F). *Dictatorship* (E).

الجملة الماطة المطلقة المتصرف .

17858 - **عَبْرُوشِيَّ** (E). *Magnitude* (F). *Magnitude* (E).

تمير اصطلاحي يستعمل في قياس الضوء الفلكي وتحديد لمعان النجوم والكواكب .

17859 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Esclavagisme* (F). *Pro-slavery* (E).

ملعن طبيعي حثه بعض أنواع النمل يرتكز على غزو قري غيره من الأنواع وعلى سلب ما فيها من بيتين لا استغاثته واستعباده فيها بعد .

17860 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Pro-slavery* (E).

المبور : الجملة من الفلم وقيل أصفر وقيل بعد الفلم ج حبار .

17861 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Apus* (F). *Apus* (E).

جلس دويبات مائفة مفترسة من التفرشات غشويات الاطراف وقصيلة البصويات . أنواعها المرولة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في المناطق والندارد والاهوار || أجسامها صغيرة شبه بيضية الشكل ، مبطلة

لامسة الاطراف المختلفة الالوان . قرونها الاستشعارية زبام المفصل ، حلقة الاطراف . اسواق قوائم ذكورها الامامية ثلاثية النقل تحصل صفان من الحامض || رقاتها دقيقة ، صفراء ، غيرة اللون ، سمره الرأس والملمب . امرضها وأضرها اقتصاديا البقوس .

17862 - **عَبْل** (F). *Grivet* (F).

هو الاقل المفصل ، اعطيه . وهو يجري في خالته وأوراقه الكثير من حامض التنيك لذلك يوقف الاسهال كما يصنع النمر وسيلفه أصفر قائم .

17863 - **عَبْلِيَّة** (S). *Aplidia* (F). *Aplidia* (E).

الواحدة حبيطة . جلس حشرات غاشلة من غليات الاجنحة وقصيلة الجمليات صفحيات القرون . أنواعها المرفقة ست . اطالها حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه املحلية الشكل ، صغيرة اللثة ، تطول من ١٦ إلى ٢٠ سم . قرونها الاستشعارية صفحية ثلاثية اللون . رؤوسها وكواشها وبطنها احمر خضاباً من الخامد . ظواهرها لا يخلص كامل البطن || قوتها اوراق النباتات البحرية ولا تصف من للزراعة والبقلي .

17864 - **عَبْلِيَّة** (S). *Vitrina* (F). *Vitrina* (F).

جلس حيوانات بوية من الرغويات مدهيات الابدل وقصيلة البزائيات . انواعها المرفقة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || تعيش في المواقع الرطبة تحت الصخور والجذات وتحت حبرز الحطب المقسورة بالثلج || اصداها صغيرة ، حلزونية ، رقيقة ، شفافة ، ملونة . اجسامها مستطيلة ، رباعية الالوان ، ملونة كالاصدا .

17865 - **عَبْلِيَّة** (S). *Leucolum* (F). *Leucolum* (S).

جلس نباتات بصلية من فصيلة التريسيات . اوراتها قروية الانتشاح ، قليلة العدد ، مستطيلة النصل العصي الشكل . انحدارها بحرية مراكبة البتلات ، يحسها ويحسها شمراخ دقيق مسط || اشهر انواعها الزراعية التريسية ما يلي .

17866 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Nivéole d'automne* (F).

أوراته خيطية نخيلة زائجة الخضار . ثمرانه يملأ من ١٥ إلى ٢٠ سم . ثمرانه سيد للمصراع . أزهاره صفراء اللثة ، ثلاثية أو رباعية التجسيم . بتلاتها وردية الناعمة والانتشاح بيضاء الصفرة || أزهاره يستمر طوال شهر تشرين الاول

17867 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum vernum* (S). *Nivéole printanière*, *Gréol blanc* (F). *Spring snow-flake* (E). *Frühlings-Knotenblume* (D). *Primestro*, *Campanello*, *Bulboso bianco* (I).

أوراته حصفية منبسطة تعرض نحو ١٦ سم . نصلها جيل الخضار المائق . ثمرانه الزهري يملأ من ٢٠ إلى ٣٠ سم .



عَبْل



عَبْلِيَّة



عَبْرُوشِيَّ



عَبْرُوشِيَّ

Orgasme (F). عُورُفَان - عُورُفَان
Orgasm (E).
المستمر والعظيم حالة الامااط التام التي تعقب التلج .

١٧٨٧٦ - عُورُفَان

هو سقاى حره ، اطلبه . واحدته عوربه .

Genre spécifique (F). عُورُفَان
Specific genus (E).

المتره في تصنيف الاحياء هي الجنس الذي يشمل معظم الميزات العامة والخاصة للموصلة .

١٧٨٧٨ - عُورُفَان

هو الذئك ، اطلبه .

١٧٨٧٩ - عُورُفَان ، عُورُفَان
Gallus (S).
Coqs (F). Cocks (E).

جنس طير من فصيلة التندريجات . ربع الجله . قصير الاجنحة مستديرا . انفيه يتألف من ١٤ الى ١٨ ريشة منتفخة الزوام الاخير . رأسه منوج برف لحمي ويجعل حل جانبي شقه رصتين لحيتين . منقاره قوي القرنية ، مقوس الفك الاعلى . ساقه عفيه . ريشه اسطى او كاسي . غايه خسة منها ثلاثة لامية دائمة واثنان خلفيان ، ويبدوها لا قياسي . دايرة قوية سادة الحروف || انماه خسة اشهرها العُورُفَان الداجِن للمروف بالدياج بالاعلى .

١٧٨٨٠ - عُورُفَان بَنَكِيَّة
Gallus Bankiva,
G. ferrugineus (S). Coq de Bankiva (F).

طائر من العُورُفَان جميل الشكل ، طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه مزيج الالوان الزاهية فيه الاسفر والذهبي والاسمر والاحمر والاريجاني والافضر والاسف المثلج والاسود والاسمر والاففس . حره احر اللون وريشاه كذلك || اثناء تدنن في القرية ورضع النوصيا بالقش والريش . تبيض من ٢٠ الى ٢٢ بيضة تحضنها بسدعا ثلاثة اسابيع . قوته الاشباب والحبوب والجار والخضار والحشرات . موطنه الهند الشمالية حتى ارتفاع ١٢٠٠ م . والسند وبورمه والهند الصينية والفيلبين .

١٧٨٨١ - عُورُفَان جَاوَه
Gallus fuscatus (S).
Coq de Java, C. tacheat (F).

نوع من العُورُفَان . طوله نحو ٦٥ سم . جميل الشكل حديد الالوان المزركبة الزاهية المنمقة ، يكثر في صدفه الاسود الاسف المثلج . حره الازرق الاشباب بنفسجي القبة ، فكه الاعلى اسود اللون اما الاسفل فاصفر || موطنه جاوه .

١٧٨٨٢ - عُورُفَان دَاجِن * ، عُورُفَان ، دَاجِن اَهلي

Coq domestique, Poule domestique (F). Domestic cock, Domestic hen (E).

نوع من العُورُفَان يربف بالدياج الاعلى . موطنه العالم . يقال انه يتصرف من عُورُفَان بَنَكِيَّة . حره الصينيين قبل الميلاد بنسو ١٢٠٠ سنة . وحره البابليين به ذلك بنسو ٨٠٠ سنة ، لما اليونان فكم يذكرو الا في عهد اريستوتل وذلك نحو ٤٥٠ سنة قبل الميلاد || فمرويه وبلااته عديدة لا تعد ، يقال انها تفوق الالف . فوارثها كثيرة منها الثوب والشكل والحليم والبرف والرحمة ومعد ابيض وصفت اللحم والطاقة الاعائية والمناعة اللدائية ، الخ .

تلحفها جنات عديدة تلتف الطور وتلتف بالرأس . ارجلها صردية شديدة الصفر ، كثيرة البد . اذنانها طليقة ثنائية الحركة .

١٧٨٩٢ - عُورُفِيَّات *
Apusidae (S).
Apusidae (F). Apusidae (E).

فصيلة دويبات مائية من القشريات عورفويات الارطاف . اجناسها وازواها موصلة البد ، منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في المنطق والادوار حتى جفافها وتعود اليها عندما تعود المياه . سرعا يحتفظ بحيوته في الارض الجافة اكثر من ثلاث سنوات || اجناسها صغيرة القده تلحفها جنات عديدة ملتصقة بالرأس . اقبالي الى الريدة الحفرها المزلج || جميعها مفترسة ، قوتها الحويثان والديدان التي تعيش في الماء || أشهر اجناسها الكويوس .

١٧٨٩٢ - عُورُفِيَّات
Adenoma (S).
Adénoma (F). Adenoma (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الانتنيات . انواعها المعروفة قليلة البد جميعها من ثورت افريقية الشرقية وسواحل الهند . تنبت في المواقع الرطبة || اوراقها متعاقبة ، صلبة القده ، اذنية الاتصال الاهليجية الشكل ، حطرية المرف الشبيه بالتمسك ، ازهارها وردية اللون ، عذقة المرف المتصبة . ازهارها سنبل التجميع .

١٧٨٩٤ - عُورُفِيَّان ، عُورُفِيَّان
هو الشيطان ، اطلبه .

١٧٨٩٥ - عُورُفِيَّان اَبْنَس
هو الشبح القضي . اطلبه .

١٧٨٩٦ - عُورُفِيَّان مَبْدُول
هو الشولا ، اطلبه .

١٧٨٩٧ - عُورُفِيَّان
هي اللد ، اطلبه .

١٧٨٩٨ - عُورُفِيَّات *
Abyla (S).
Abyla (F). Abyla (E).

البيضة حويان بحري من الحويثات ودية الماصات . يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

١٧٨٩٩ - عُورُفِيَّان
هو الشحية ، اطلبه .

١٧٨٩٠ - عُورُفِيَّان

الثاني والجار الثابتي واحد . راسع سمار الزرد .

١٧٨٩١ - عُورُفِيَّات السَينِيَّة
Agrès, Appareux (F).
Rigging, Apparatus, Gear (E).

هي الادوات التي لا بد منها لصلاحية وتعتبر جزءا من السفينة في حالة البيع والرم والحجز والتأمين .

١٧٨٩٢ - عُورُفِيَّات زَرَاعِي
Masériel agricole (F).
Agricultural material (E).

هي الاجهزة الزراعية الثقيلة .

١٧٨٩٣ - عُورُفِيَّات
الحنق من الخيل : النجائب ، مفردة حتى || العتاق من الطير : الجوارح ، مفردة حتى .

١٧٨٩٤ - عُورُفِيَّان
Hyène mâle (F). Hyène male (E).

الذكر من الضباع .



عُورُفَان بَنَكِيَّة



عُورُفَان دَاجِن

١٧٨٩٠ - عُنْم * عُنْم ، زَيْتُون بَرِي

Olea sylvestris, *O. oleaster* (S). *Oleastre*, *Olivier sauvage* (F). *Wild olive tree* (E). *Wilder Ölbaum* (D). *Olivo salvatico* (I).

هو الزيتون البري شجرته تملو من ٥ الى ١٠ امتار . فروعه وإفاته شائكة . اوراقه معتقة سنائية . نصلها جامد اللسيح ، مذهب المقصبة ، يطول من ٥ الى ٨ سم . صفحته العليا بجمرة اللون والسفل خالية يطولها مواج فضي . أزهاره عطوي التجميع ، محوري الازدكار . أزهاره صغيرة غير يضاء اللون ، غصنار المواج || ثماره بيضيه الشكل ، صغيرة اللد ، قليلة اللب تدهى الزنج .

١٧٨٩١ - عُنْدُود

العتيد هو الجدي الذي استكرش وقيل هو الذي بلغ السفاد .

١٧٨٩٢ - عُنُومَة *Chamelle bonne laitière* (F). *She-Camel great deal of milk* (E).

الناقة الغزيرة الدر .

١٧٨٩٣ - عُنُومِي * *Nova* (F). *Nova* (E). *النبي كل نجم يشد غيلقه لجأة ثم يجر . ج . حثات .*

١٧٨٩٤ - عُنُقِي *Cheval pur sang* (F). *Blood-horse* (E). *نمت تمرني . يطلق على كل فرس كريم منسوب السلالة .*

١٧٨٩٥ - عُنْث * *Mites* *كلمة شاملة تطلق على عدة حشرات من فصائل مختلفة يجمعها ما تلحقه من اذى بالحيوان والطير والفراء والالبسة الصوفية والكتن ، الخ .*

١٧٨٩٦ - عُنْثَان * *Fumago vagans* (S). *Fumagine*, *Noir*, *Suie* (F). *Sooty mould* (E). *Russta* (D). *وصم فطري يمد الى مختلف انواع العثان من فصيلة الفريسيات ورتبة الفريثات . يصيب نوعي النبات فيركب الاذن والافران والاوراق الفتية ويمتصها ويوشع لبد من السنام يمنعا من القيام بوظيفتها || اضراره قليلة لانه محدود الانتشار يمتد بالبرتقال والزيتون والكرمة وبعض النباتات الصناعية كالنخيل .*

١٧٨٩٧ - عُنْثَة *Dermestes*, *Attagenus* (S). *Dermeste* (F).

جنس حشرات مؤذية من فصيلة البشيات . انواعها كثيرة العدد ، جميعها صغيرة اللد باعثة الالوان . تعيش على اضرار النباتات || رقاتها مؤذية تفسد الحبوب والالبسة والبط واللحوم والصوف والريش والفراء واللحوم المقددة ، الخ . اضرارها واضررها ما يتبع .

١٧٨٩٨ - عُنْثَة الحُوب *

Trogoderma granarium, *T. versicolor* (S). *Trogoderma des grains* (F). *Khapra beetle* (E). *Khaprakifer* (D).

حشرة من البشيات طولها نحو ٣ سم . ثوبها بني اللون ، رأسها وبرشها ورطبها سود . زبالها الى الحرة الاوروبية . رقبها حليلة الجسم ، دقيقة اللد ، بنية الثوب الجذع بالايض . تركيب الحبوب المخزونة فتلتهمها وتلتفها .

١٧٨٩٣ - عُنْزُقَان سَرْتَدِب

Gallus stanleyi, *G. lineatus* (S). *Coq de Stanley*, *C. de Ceylan* (F).

نوع من العزرقان ، ثوبه ثوب عزرقان بكيفه الا انه اسفر البرق والورعيتين حاد الصوت للسيل للقرقرة . موطنه سرنديب .

١٧٨٩٤ - عُنْزُقَان هِنْدِي * *Gallus sonnerati* (S). *Coq de Sonnerat*, *C. sauvage de l'Inde*, *Katukoli* (F).

نوع من العزرقان . موطنه الهند . طول نحو ٥٠ سم . ثوبه كثالباب . جسده متراكب الالوان الكثيرة الزائجة غير انه يتركز على الالوان الازرق . عرفه احر اللون وريشاه كذلك ، مقاربه وريشاه الى الصفرة || جسمه مع سائر انواع جسده الاجنح الاقضية الاخصان .



عزيس

١٧٨٩٥ - عُنْزُيس * *Atherix* (S). *Athérice*, *Athérice* (F). *Atherix* (E).

جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المروفة عشرة اعطائها تمتد من الصين الى اوروبا || اجسامها ممتوجة اللد ، تطول من ٨ الى ١٠ سم . رؤوسها كبيرة . عريضات كبيرة ، فلقية عند التقين . قرنيها الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اعطائها مستطيلة . ملابها صغيرة . كراسها كبيرة . بطونها مستطيلة . ظنايب قوامها الوسيط والمخلفة شائكة للنماتس اللدية . وراشها ملونة والظايب ايضا || تألف الملقح الرطبة وشفاف عياري الله . جميعها قانصة . يرقاها تعيش في الماء على المواد الصوية المنحلة .



خم

١٧٨٩٦ - عُنْزُيس * *Campephagus* (S). *Campephage* (F). *Campephagus* (E).

جنس طير من فصيلة الترسيات . انواعها المروفة نحو ٥٠ جميعها من اويده وضوايرب العالم القديم . تألف النباتات والاحراج والحدائق || اجسامها صغيرة اللد ، زجاجية الالوان المستديرة الاطراف . صغيرة المناظير اللدية . الظايب متباينة الالوان المتراكبة . رؤوسها ميلقة . صدورها ويطونها محتلة تملوها رقة سمراء تنصر حتى الانقاذ || قوتها الحشرات الصغيرة والاسايرع والديدان والذباب . تكثر في الاجنح لقتل المعتلة الارتفاع البعيدة من السمرا . تحسن نحو خمس يضياف ترخها الاثان بمناوبة الذكور نحو ١٥ يوما .



عثان

١٧٨٩٧ - عُنْزُيسِيَات * *Campephagidae* (S). *Campephagidae* (F). *Campephagidae* (E).

فصيلة طير من الجوام مشروبات المناظير . اجسامها والظايب المروفة عديدة لا تقل من تسعين . موطنها العالم القديم ، معظمها اسيري وبعضها اوروبي وافريقي . الانواع الاسيوية والادوية من الضوايرب اما الافريقية قليلة || تألف النباتات والاحراج والحدائق . قوتها الحشرات واسايرها والديدان والذباب || اجسامها تراوح بين الصغيرة والوسطى تتميز بمناظيرها الصغيرة اللدية وبانفائها قرطاجية الريش || اشهر اجسامها الترس .

١٧٨٩٨ - عُنْثَك * *Agamie* (F). *Agamy* (E).

هو اندام الاضمار .

١٧٨٩٩ - عُنْثَلَة *Lever* (F). *Lever*, *Crow-bar* (E). *هي الزائجة اي الخلل . ج . حل .*



عنة الحبوب

١٣٧ - عثة السجاد * *Anthrenus verbasci* (S).*Anthrène des tapis* (F). *Carpet beetle* (E).

حشرة من العثيات يضيئة الشكل طولها نحو ٣ م. ثوبها اسود اللون. عذماها مدبجتان يقع شرقية طلاء اللون. ريقها دقيقة قصيرة حلوية الجسم، سمراء اللون، سوداء الرأس والأرجل، يضاء للذب. تلحق السجاد وتآكل الأثاث الصفي.

١٣٨ - عثة الشمع * *Dermestes lardarius* (S).*Dermeste du lard* (F). *Larder beetle* (E).

حشرة من العثيات طولها نحو ٩ م. ثوبها اسود اللون تملو شحمة خلية طلاء. تتركز في النصف الاول من العمدن || ريقها غبراء اللون تلمس الشمع والقراء وتآكل المواد الحيوانية.

١٣٩ - عثة الكيرك * *Dermestes vulpinus* (S).*Dermeste renard* (F).

حشرة من العثيات طولها نحو ٨ م. ثوبها اسود اللون، اظهر المروانف الحلوية. يطنها الى السمرة يملو خط قاطب احمر || ريقها سمراء اللون سوداء الرأس والفرج والأرجل. تركب القراء والجلين وتختلف المواد الحيوانية والنباتية.

١٤٠ - عثة الترائين * *Actagenus peltis* (S).*Actagene des pelledors* (F).

حشرة من العثيات طولها نحو ٤ م. ثوبها حستلي اللون. اظهر المروانف تحمل في كل من عذمتها نقطة يضاء || ريقها ففراء اللون سمراء الرأس تحمل عند ذريتها ضمة من الحلب الغويل. تركب وتقرض القراء والبسط واليابب الصفي.

١٤١ - عثة الكمون

Anthrenus pimpinellae (S). *Anthrène des pimpinelles* (F).

حشرة من العثيات يضيئة الشكل طولها نحو ٣ م. ثوبها الى السمرة تحمل في وسط عذمتها جدة متفرقة يضاء اللون. تركب بيوم عام جميع اجزاء نباتات فصيلة المركبات اعصها الكمون والانيسون.

١٤٢ - عثة المتاحف * *Anthrenus museorum* (S).

Anchrène des musées (F). حشرة من العثيات جسمها يضيئ الشكل مبطط. طولها نحو ٣ م. ثوبها ابيض اللون. تعيش على اجزاء نباتات الفصيلة الحمضية || ريقها صغيرة، دقيقة، غبراء اللون، مجعدة بطول حلوية حستلي، تقرض كل ما وصلت اليه من المواد الحيوانية المحفوظة كالخشب والجلين والحيوان.

١٤٣ - عثجول * *Clavatus* (S).*Clavatulè* (F). *Clavatulè* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدعيات الارجل وفصيلة للكريزيات. انواعها المعاصرة المروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي وشواطئ افريقية الشمالية || اصداؤها وشعبة الشكل تملوها بعض المتاحف الكبيرة المأددة. فروعها شبه فربية الشكل. سرود الفوية مجهز بثلاث اسنان، السن الوسطى قصيرة اما الجانبيتان فكثيرتا القد مدببتا الاطراف.

١٤٤ - عثور، عثري * *Culture sèche* (F).*Dry-farming* (E).

المشر والعثري والبدلي: ما سقته السياه من الاجار والزرع. ومنه في حديث الاكاذب: «ما كان يذر او مرقيا فقه لعشر».

١٣٧ - عثور

هو الأطر من النباتات الزينية، اطاله.

١٣٨ - عثرب

شعر نحو شجر الرمان في القدر وورقه احمر مثل ورق الحماض ررق عليه بطون الماشية ابل شيء ثم تغط عليه الشمع بعد ذلك وله صالح جحر وله حب كعب الحماض. واسفة شربة (من اي حنيفة).

١٣٩ - عثق

هو البقس الدائم الحفرة، اطاله. واسفة عثقة.

١٤٠ - عثكول

Panicule (F). *Panicle* (E).

عقود من السنبلات بسيطاً كان او مركباً.

١٤١ - عثكولي

Paniculé (F). *Paniculate* (E).

نمت تعريفي يوصف به الانزراع الذي شكله شكل الشكول.

١٤٢ - عثلب

Bouture (F). *Slip, Cutting* (E).

هو كل قصيب او فند او عطفة الخ. صار قطعة وقصيرة للفرس.

١٤٣ - عثلب

Bouturage (F).

Propagation by slips, P. by cutting (E).

حلية غرس الشتال بعد تأطيجا.

١٤٤ - عثلوييت

Schizophytes (F).

المثليات فئة من النبات تتكاثر بالتجزئة اي بقطع جزء منها وقرنه في التربة. يقال نبات مثلي.

١٤٥ - عثمان

فرع الجباري وقرع النيران.

١٤٦ - عثنج

المنجج: القسم الثقيل من الايل.

١٤٧ - عثبات

Dermestidae (S).

Dermestidae (F). *Dermatidae* (E).

Speckkäfer (D).

فصيلة حشرات البث من رتبة مدعيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القند، زهاب الجسم، متراكبة الانواع المختلفة الزركفة. قرونها الاستشعارية سرطانية الشكل. اوسافها حلوية الشكل || تركب الانزراع ولحاء الاشجار وتختلف المواد الحيوانية. ريقها تعيش على المواد المضوية وبقايا الحيوان الجافة كالجلود والقراء والريش واللحوم المقددة، الخ.

١٤٨ - عثيل

Densiflore (F).

Densiflorous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات متراكب الانزراع البلية.

١٤٩ - عجاجة

Ergot (F). *Spur* (E).

دائرة الطائر آتي يقرب بها.

١٥٠ - عجالة، عجالة

Salario (F).

Salary, Hire (E).

هي الاجرة التي يتقاضاها العامل لقاء لفسل الذي قام به.

١٥١ - عجم

العجم الخفاش الضخم.



عثة السجاد



عثة الشمع



عثة الكيرك



عثة المتاحف



عثة المتاحف



عجم

اجناسها وأنواعها المرفوعة عديدة معظمها من نمول المناطق الاستوائية والحارة || جميعها حرجية تألف الغابات والحدائق اجسامها كبيرة القند بمجهزة بمخاض حادة تهريق السم او تقلقه من بعد || يفسى أنواعها دجوي والبيض الأنغر يسرح في النهار || اشهر اجناسها المجروف والكبار .

١٧٩٣٦ - عَجَزْ
هي القباب الذهبية ، تأخذ السخلة لتطير بها . ج عجزان .

١٧٩٣٧ - عَجَزْ
Déficit (F). Deficit (E).
هو مقدار النقص المحقق بعد اجراء كمال الحساب .

١٧٩٣٨ - عَجَزْ ، قَبْ
Sacrum
عظم في آخر سلسلة الظهر .

١٧٩٣٩ - عَجَزْ الاستغلال
Déficit d'exploitation (F). Working deficit (E).
هو ما نقص من العمل بعد تقويم المستغل بالنسبة الى الكلفة .

١٧٩٤٠ - عَجَزْ الأسد
عجز الأسد اربعة كؤاكب صغار اسفل من المراء .

١٧٩٤١ - عَجَزْ حرثي
Sacro-iliac (F).
Sacro-iliac (E).

١٧٩٤٢ - عَجَزْ ذَيْلِي
Sacro-caudal

١٧٩٤٣ - عَجَزْ قُرْبِي
Sacro-rectal
ويسمى مستقي وهو يختص بالملي المستقيم .

١٧٩٤٤ - عَجَزْ عَصْفِي
Sacro-coccygien (F).
Sacro-coccygeal (E).

١٧٩٤٥ - عَجَزْ قَدْرِي
Sacro-vertébral (F).
Sacro-vertebral (E).

١٧٩٤٦ - عَجَزْ قَطَنِي
Sacro-lombaire (F).
Sacro-lumbal (E).

١٧٩٤٧ - عَجِفْ
Qui se prive de nourriture (F).
نمت تمريني يطلق على كل فراشة او حشرة جلابة لا تفارق القوت . وهي ، غالباً ، تعيش من يوم الى اسبوع . م . عيفة .

١٧٩٤٨ - عَجِفَاء
Terre aride (F).
Barren ground (E).
المبفء والارض المجفء : التي لا خير فيها .

١٧٩٤٩ - عَجِفَات
Entomophthoraceae (S).
Entomophthoracées (F). Entomophthoraceae (E).
فصيلة لطور مجهرية من مرتبة النطرييات ورتبة الليفيات .

١٧٩٥٠ - عَجَلْ
Veau (F). Calf, Veal (E).
ولد البقرة حتى السنة الثانية من عمره ثم يصبح جنداً .

١٧٩٥١ - عَجَلْ البَحْر
هو الفقة حيوان مائي لبون ..

١٧٩٥٢ - عَجَلْ خَصِي
Bouillon (F).
Young bullock, Steer (E).
هو المجل سلّت خصيتاء .

١٧٩٢٢ - عَجَان
Périnée (F). Perineum (E).
المسافة الكائنة بين عضو التنازل والشرج .

١٧٩٢٣ - عَجَانِي
Périnée (F). Perineal (E).

١٧٩٢٤ - عَجَانِيَة
Tendon
العمامة . ج عجي وصمايات وصبايا : اوتار قوائم الخيل والاول .

١٧٩٢٥ - عَجَبْ
هو جلاب انيل ، اطليه .

١٧٩٢٦ - عَجَبْ ، عَجَبْ
Racine de la queue (F).
Origin of the tail (E).

المعجب : اصل الذنب وهو من كل دابة مسا اتمم عليه الوركين من اصل الذنب المنفرد في مؤخر التيمر . وهو المعصب والمعصب . ج اعصاب ومعصب .

١٧٩٢٧ - عَجْدْ
Raisin sec (F). Raisins (E).
البيد هو التزبيب او حب التزبيب .

١٧٩٢٨ - عَجِير ، عَكِيد
Loupeux (F).
Wenny, Knobby (E).
من الثبات ما كان ذا عير او عقد .

١٧٩٢٩ - عَجْرَة
Éclat de souche, Souche,
Souquet (F). Shiver, Splinter, Ragstone (E).
جزء من اروية الشجرة ، يحل رمحة او يفسى الجرام ، يقطع ويلتص .

١٧٩٣٠ - عَجْرَة ، مَعَجْرَة
Défolié (F).
Defoliate (E).
شجر عجرد وبمعرد : حار من ولة .

١٧٩٣١ - عَجْرَم ، أَشْكَل
Rhamnus pestiolaris (S). Nerprun pestiolé (F).

الأشعة حمرية وأشكلة : شجرة برية ، حرجية ، جبلية من فصيلة النبقيات . اصنامها يفسى جبال الشرق الاقد وبها جرد لبنان || سلكها فرعاء كثيرة العقد الشائكة . فروصها متعاقبة ، متفرعة ، شائكة . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، سنائية الاتصال الجمعدة ، شديدة الحفار ، متعاقبة العروق . ازهارها ضمية التجميع ، عشوية ، خاسية الاجزاء . ثمارها كروية لحمية ، سامقة المذاق ، جزوية اللون عند الادراك || ازهارها يسرح من ايار الى حزيران .

١٧٩٣٢ - عَجْرَم
دوية سلبة تكون في الشجر (اللان) .

١٧٩٣٣ - عَجْرَمَة
شجرة شائكة كثيرة العقد . ج عجرم .

١٧٩٣٤ - عَجْرُون *
Camponotus (S).
Camponote (F).

جنس نمل كبير القند عديد الانواع يكثر ويهدد في اسراج البلاد الحارة . منه انواع تبي قراها بالطين وفيها تسرد الخشب وتنفسه .

١٧٩٣٥ - عَجْرُونِيَات *
Camponotidae (S).
Camponotidés (F). Camponotidae (E).

فصيلة حشرات من النمليات عشائرات الاجنحة المحمويات .



حبرون

١٧٩٦٢ - عَجُور * ، عَيْدُ اللّاهِي

Cucumis chate (S), Concombre chaté, Abdellavi des Egyptiens (F), Chate of Egypt, Orange melon (E), Agyptische Melone, Orangen Melone (D), Clatze, Cocomero d'Egitto (I).

نوع من الفناء المأكول الثمار تكثر زراعت في البلاد الحارة انحصار مصر والسودان . يجود في الاربة البدائية المتروكة الانتماع وهو يرغب في الري لكث يخشى الرطوبة المتحمكة



عجل

١٧٩٦٣ - عَجُورُ الْفَرَنْجِي

هو البياض الزراري ، اطبه .

١٧٩٦٤ - عَجِيج (F), Bauglement, Meuglement صوت البقر من ذكر واثق .
Bellowing (E).

١٧٩٦٥ - عَدَدٌ ، عَدَدُ (F), Dénombrement البعد والعدد هو الاصحاء التي لمشتلات مكان معين .
Enumeration (E).



عجور

١٧٩٦٦ - عَدَدَاهُ ، وَكُر (F), Couraer كل من كان سريع العدو او اشترك في سباق الركض .
Runner (E).

١٧٩٦٧ - عَدَدَاهُ الْفَط (F), Octodrome طائر من طوايق الساق يدعى جيتوك ، اطبه .

١٧٩٦٨ - عَدَدَاهُ ، وَكُلُ الْفَط (F), Tanguo, Tanque, Tangu (sable fin) (F), Slimy sand (E). رمل وعل والفر الفطار والفسار المشدنة التيشلية . يستعمل في دمل الاربة القامدة الانتماع .



عجور

١٧٩٦٩ - عَدَدَا (F), Effectif هو مجموع الاجزاء والامال والمؤنرين الذين يقتضون ال فكرة ما او مصنع او مؤسسة ، الخ .

١٧٩٧٠ - عَدَدَا السَّرْعَة (F), Compteur de vitesse آلة تستعمل في معرفة سرعة الشيء .
Quickness meter (E).

١٧٩٧١ - عَدَدَا * ، هِدْرَا (F), Hydra جنس حيوانات مائية من العنديات اربعة عشرة امدود جميعها مفرقة تعيش لاصقة على النباتات البحرية . اجسامها مؤلفة من اثني عشر عضوي دقيق طوله يراوح بين ٥٠ و ١٠٠ سم ومن عجاس خيطية نحيلة شديدة الغلظ وطيفتها القبيض على الحيوانات الدنيا التي تمر في حماها .



عدار

١٧٩٧٢ - هِدْكَو (F), Zoidiome نعت ترمي في يطلق على كل نبات لا يتم تأخير ازدهان الا بواسطة الطير او الحشرات .
Zoidiogramous (E).

١٧٩٧٣ - هِدْكَوَات ، هِدْرَا (F), Hydrains رتبة حيوانات مائية من المحفلات .

١٧٩٧٤ - هِدْكَوَا (F), Zoidigamin اسم يطلق على التأثير الذي يحصل بواسطة الطير والحشرات .
Zoidigamy (E).

١٧٩٥٣ - عَجَلَة (F), Vêlle اينة البقرة حتى السنة الثانية من عمرها ويعدنا تصح جلعة .

١٧٩٥٤ - عَجَلَة ، طَبْر (F), Charrette, Tomberau حربة النقل ذات دولابين .
Cart, Tip-car (E).

١٧٩٥٥ - عَجَلَس * (S), Hoplestachus سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة العفديات الشالكتات الزمائف . موطنها المتوسط والاقزم . تتميز بعينها الكبريتين المستديرتين وبزواية الانكسار الثالثة التي تملو كامل رأسها . طولها نحو ٢٥ سم . ثوبا الى السمرة الصفراء يعلوها مزاج بنفسجي . بطنها فضي اللون ، زعنفتها وزدية والزعنفية منها كبيرة القد فارقة .

١٧٩٥٦ - عَجَلَسُ الْمَتَوَسَّط (F), Hoplestachus mediterraneus سمكة بحرية بيوض من فصيلة العفديات رتبة شالكتات الزمائف . اصطناعها معظم اقالييم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تتميز من املاك الثنائ . ملجئها الحياتي شرسني || جسمها شبه بيضي الشكل ، متدل التليط ، طولها من ٢٠ الى ٢٥ سم . ثوبا الى الخضر الزهني يعلوها مزاج بنفسجي يميل في الظهر . بطنها فضي المالح . زعنفتها متراكبة الاخر والوردي . رأسها كبير الحجم ، اظفار الخيط ، تملو زعنارف ثائفة . شعها رطب الانفراج . فكها اسفلي يتقدم العلوي . استنابها صغيرة ، متراكبة ، حلية السطح . عينها كبرتان ، مستديرتان ، نافذتان ، معلقتان بالزوايق النائفة . زعنفتها الظهرية وحيدة ، مستطيلة الشكل . زعنفتها القيلية كبيرة ، لائقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٧٩٥٧ - عَجَمَكَة (F), Noyas القسم الداخلي من لشجرة صلب وقسا وسوى البزرة .

١٧٩٥٨ - عَجَمَكَة نخلة تثبت من فؤة .

١٧٩٥٩ - عَجَمَكَات ، لَوْرِيَات (F), Arbres à noyaux هي الاشجار الجمية البزور كالفراخ والخوخ والشمش والقرع ، الخ .

١٧٩٦٠ - عَجَمَن ، إِعْصِيَان (F), Pécrimage عملية غلط اللغوي بالمال ودعكه ليسير صعبا .
Kneading (E).

١٧٩٦١ - عَجَمَم * ، أَبْرُ جَكَم (F), Rhynchope اداة حدة جميعها لقطع اللوب . تتميز بشكل منقورها التي تشبه جلي الحياض . رؤوسها صغيرة القد . امتانها طويلة . اجنحتها مستطيلة ذائقة . اذنانها فارقة . موطنها البلاد الحارة . تأنف الضبوط البحرية والحرية . ثوبا الحشرات والامساك . مسرحها دجوي يتد من القرب الى الشروق || انثاها تثن في انحصار لغيرها على الرمل بين حصور الجرف والشرابي .

١٧٩٦١ - عَجَمَم * ، أَبْرُ جَكَم (F), Rhynchope اداة حدة جميعها لقطع اللوب . تتميز بشكل منقورها التي تشبه جلي الحياض . رؤوسها صغيرة القد . امتانها طويلة . اجنحتها مستطيلة ذائقة . اذنانها فارقة . موطنها البلاد الحارة . تأنف الضبوط البحرية والحرية . ثوبا الحشرات والامساك . مسرحها دجوي يتد من القرب الى الشروق || انثاها تثن في انحصار لغيرها على الرمل بين حصور الجرف والشرابي .

القدم || جسمها صلبى ، متوطد القد ، متكاثف الخمل .
يصلتها تراوح من ٤ الى ٦٠ م . الاذن اكبر قدماً من
الذكر واهت ثوباً منه . رأسها مخروطي . مينها صغيرتان ،
بارزتان . زباناها شطيان مزدوجتان . خطمها قصير .
ملساها صغيران . اجنتها كبيرة ، ملونة وبهية ||
سرقها غاشلة تعيش على اوراق البتليات .

Adrastra (S). * هَدْرَسِكَة *
Adrastra (F).

جنبة معمرة بيرية وزراعية تربيته من فصيلة الالانبات .
مينها جزر الزرايع || سلقها تنسبة . فرومها نحيلة .
اوراقها شتاقية ، سنانية النصال الجمادة المتوسطة القد .
ازهارها فردية التنسج ، طرفي الاوتكاز . انزهارها كبيرة ،
خماسية البتلات ، تبينة اللون يعلوها موانج ليلكي || تزرع
في الحدائق في الموانج الجنوبية لانها تحشى صبح الشتاء .

Endromididae (S). * هَدْرَمِيدِيَّة *
Endromididae (F). Endromididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة المند جميعها شتالية الاصلان .
مركزها التربيته يقرها من البتليات || اجسامها صلبة ،
شبه اسطوانية الشكل ، ينفذها خل مستطيل ، يسلها
تواضع من ٥٠ الى ٦٠ م . انثاها اكبر قدماً من ذكورها .
رؤوسها مخروطية . عينها مرطاة . اعطافها قصيرة . ملاسها
صغيرة . قرونها الاستشعارية شطية مزدوجة . اجنتها
كبيرة ، عادمة التهذيب . الوانها متراكبة الالوان الجبلية .
اسارمها شبه مرطاة ، تعيش على الانجبار . اكمال خادراتها
ثم ضمن صلجة مستقلة || اشهر اجناسها المدرس .

Mules (F). Mule (E). * هَدْس *
الهدس والهدس هو البيل وقد سموا بزمهر . قال الشاعر :
اذا حلت بذي من على حسن

١٧٩٨٨ - هَدْس * ، هَدْس *
Ervm lens, Lens esculenta (S). Lentille (F). Lentil (E).
Echte Linse (D). Lente, Lencichla (I).

نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفراشية .
شروبه عديدة تختلف باختلاف مقدورها الانماي والانتاجي
وبرحة ادراكها والوان حيويها . القع . جميعها صغيرة
القد ، جذورها سطحية ، سيقانها مضطمة لونها تلو من
٢٠ الى ٤٠ م . اوراقها مركبة ، متساقية ، حنية
الاطراف . وريقاتها صغيرة القد يفضية الشكل متعاقبة .
انزهارها محورية الاوتكاز ، طويلة المسيق ، يضاء اللون ،
زرقاء التبرج . ثمارها قرون صغيرة مغلطمة ، ماسة البشرة ،
يوجد في داخل كل منها من الحبة الى الحبتين || وهو
من البتليات الزراعية الشائعة الاستعمال بمجدي في جميع الاربية
المخفية للمنتد الانساج التي لا تقتصر الى الكلس . موقعه
في الثورة الزراعية يأتي في الاول ثم تليه الحبة او الصبر .
والعس من البتليات المشهورة بفزاره موداسها اللذائية
الثامنة . فهو يحوي نحو ٨٢ وحدة غذائية يمكن تحميدها
كما يلي :

مواد هيدروكربونية ٥٨ %
مواد بروتينية ٢٢ %
مواد دهنية ٢ %

اما تين العيس فهو من انواع الكلاء الجيدة التي تتلفها
المواشي بشوة .

Hydroides (F). هَدْرِيَّات ، هَدْرِيَّات
طبقة حيوانات مائية من شعبة الهيفات تشمل ثلاث رتب :
البدارات والمرجانيات والجلجليات .

Génétique (F). Genetic (E). * هَدَدَة *
علم يبحث في التمثل وروابطه واراسره عنه الحيوان
والنبات .

١٧٩٧٧ - هَدَدَتَم ، هَدَدَصَحِيح ، هَدَدَكَمِيل
Nombre entier, N. intégral (F). Integral number,
Whole number (E).

١٧٩٧٨ - هَدَدَقَانُونِي ، نَصَاب
Quorum
هو المند الاقل المفروض ليكون اجتماع اعضاء الجمعية
قانونياً .

١٧٩٧٩ - هَدَدَ كَسْرِي *
Nombre fractionnaire (F). Fractional number (E).

١٧٩٨٠ - هَدَدَ مَرْكَب *
Nombre composé (F). Composita number (E).

١٧٩٨١ - هَدَدِي *
Numéral, Numérique (F). Numeral, Numerical (E).

دال على عدد او مخصص بالعدد .

١٧٩٨٢ - هَدَر *
Striga (S).
Strige, Goutte de sang (F). Witch weed (E). Echte
Witchweeder (D). Striga (I).

جنس نباتات عشبية بيرية مرموعة من فصيلة الخنازيريات
مهدا البلاد الحارة تكثر في المروج وفي البور على السواء .
يقال انها طيبة .

١٧٩٨٣ - هَدْرَكْس مَعْقَب *
Adrastra limbatas (S). Adrastra bandé (F).
Adrastra limbatas (E).

حشرة غاشلة ناهمة من فصيلة السالويات ورتبة مدمدات
الاجنحة . موطنها بعض اقالم البلاد المطلة الحاررة من
الشرق الاطل واروبه . تألف الموانج للرطبة والمروج وضفاف
الاء والارواح المغلة . غنقتها تعيش على اوراق النبات .
يرقاتها تعيش على المواد الضعوية وعلى جذور البتليات
المسارة نحو الاخلال || جسمها صغير دقيق بطول من
٦ الى ٦ م . ثوبها ثنائي اللون ، اسود الجسم ، كشي
الظفران المصب بحداسهم . رأسها صغير القد . زباناها
عظيقات . مينها صغيرتان . ارباسها خلسة العقل ||
الاثن ايز قدماً من الذكر واهت ثوباً منه وتقص زبانا
واسمها يعلها || جيلها رباعي الخول . تظهر الحشرة
الجبلية في اواخر شهر ايار وتبقى حتى اواخر تموز .
تسرح في النهار وتبيت في الليل || زين الدساق يستمر
طول شهر حزيران وترز المكن في الجباله وحت الليل
ضمن انابيب سحبة الشكل || البرقة منه ادراكها الكمال
الجمسوري قطلي نحو ١٢ م . ثوبها الى الصفار المايق
التناهي المراج || طول الاكمال يستمر من ٤٥ الى ٥٥
ويما ويتفشي في التربة .

١٧٩٨٤ - هَدْرَس *
Endromis (S).
Endromis (F). Endromis (E).

حشرة من فصيلة المدمسيات ورتبة حشرقيات الاجنحة .
اصلها تشمل كامل المنطقة اللبنانية وما يتأخها من العالم



عدراس مصب



عدريس



عدرية



عس

١٧٩٨٩ - عَسَمَ الْمَاءِ * Irrévocabilité (F).

Irrevocability (E).

صفة تنبئ بها الحية بين الاحياء وقد لا تسمح بدونها
فمسلحها انه يحظر على الزواحف ان يحتفظ لنفسه مباشرة
او مفادورة في عقد الحية بحق الإبلاط او التطفل .

١٨٠٠٢ - عَسَمَ الصَّخْرَةَ Irrégularité (F).

Irregularity (E).

هو القعر الذي لا يصح للمرضع الا بدسه .

١٨٠٠٣ - عَسَمَ المَصْجُوعِيَّةَ عَسَمَ الاحتِجَاجِ Impossabilité (F).

Impossibility (E).

هو ان يستحيل على الخصم ان يبيع نفسه بحق له .

١٨٠٠٤ - عَسَمَ قَابِلِيَّةَ التَّعْزِيلِ Incassabilité (F).

Untransferable (E).

صفة الاموال التي لا يمكن نقل ملكيتها الى الغير .

١٨٠٠٥ - عَسَمَ قَابِلِيَّةَ التَّصَرُّفِ Inaliénabilité (F).

Inalienability (E).

صفة الاموال المينة التي لا يمكن نقلها او تكليفها
بحقوق حية جديدة كالارثاق والقرن ، الخ .

١٨٠٠٦ - عَسَمَ قَابِلِيَّةَ التَّقَادُّمِ Imprescriptibilité (F).

Imprescriptibility (E).

صفة تلازم حقاً او دهرى لا يستطاع مرور الزمن
كتجاوز الاحوال الشخصية والاملاك العامة .

١٨٠٠٧ - عَسَمَ قَابِلِيَّةَ الْحِزْمِ Insaisissabilité (F).

Unseizability (E).

صفة عين ثابتة او منقولة لا يستطيع الدائن مالكتها ان
يبيعها .

١٨٠٠٨ - عَسَمَ قَابِلِيَّةَ التَّسَمُّعِ Indivisibilité (F).

Indivisibility (E).

هي حالة ما تقدر قسمة مادياً او معنوياً . كالاقطار
وسبق الارتفاق والالتزام بفتح ثمن حيوان حي معين .

١٨٠٠٩ - عَسَمُولُ Pernopètre mâle (F).

Pernopetern male (E).

الذكر من الغريم .

١٨٠١٠ - عَسَمُولُ هو الصَّفْدَعُ ، اطليه .

١٨٠١١ - عَسَمُولُ اخْضَرُ Grenouille verte (F).

هو الصَّفْدَعُ الاخضر ، اطليه .

١٨٠١٢ - عَسَمُولُ اشْعَرُ Grenouille poilue (F).

هو الصَّفْدَعُ الاشعر ، اطليه .

١٨٠١٣ - عَسَمُولُ اَعْرَ Grenouille rousse (F).

هو الصَّفْدَعُ الاغر ، اطليه .

١٨٠١٤ - عَسَمُولُ الحَقْلُ Grenouille oxyrhine (F).

هو صَّفْدَعُ الحقل ، اطليه .

١٨٠١٥ - عَسَمُولُ جَبَّارُ Grenouille géante (F).

هو الصَّفْدَعُ الجبار ، اطليه .

١٨٠١٦ - عَسَمُولُ نَشِيطُ Grenouille agile (F).

هو الصَّفْدَعُ النشط ، اطليه .

١٧٩٩٠ - عَسَمَ مَرُ هو الينوسارون ، اطليه .

Lemma (S). Lentille d'eau, Lenticule, Canifelle, Canelle (F). Duck-weed, Water-lens, Water lentil (E).
Kleine Wasserlinse (D). Lenticularia, Lente d'acqua, Erba antrina (I).

جنس نباتات شبيهة مائية من وحدات الفلقة ونباتات
عسيمات الماء . تتميز بصغرها ودقة سوقها واستدارة اوراقها
المدسية الشكل والقد التي تغلق على سطح الماء . ازهارها
وحيدة المسكن ، ثلاثية التجميع يضمها شرفات واحد
يتألف من زهرتين ذكريتين وزهرة انثوية واحدة .

١٧٩٩٠ - عَسَمَ مَرُ هو الينوسارون ، اطليه .

١٧٩٩١ - عَسَمَ الْعَيْنَ Lentille de l'œil (F).

Eye lens (E).

١٧٩٩٢ - عَسَمِيَّاتُ الْمَاءِ Lemnaceae (S).

Lemnaceae (F). Lemnaceae (E).

فصيلة عسيدات الماء من وحدات الفلقة . اجناسها ١ وانواعها
٢١ . جميعها من النباتات المائية والمنتحية المنتشرة في جميع
اسواق العالم .

١٧٩٩٣ - عِدْقُ Gémiteur (femelle) (F).

Bageur (femelle) (E).

هو في النبات ما صار تنبغ ميسم زهره بمكبر زهرة
اغرى مصغرا للشم المنتصب .

١٧٩٩٤ - عِدْقُكَلَّة Incompressibilité (F).

Incompressibility (E).

عدم القابلية لقصط والانصراف والكبس .

١٧٩٩٥ - عِدْقُولُ Adélops (S). Adélops (F).

حشرة كفية من عذبات الاجنحة ديوريات القرون . تألف
الاجنية والكهون والواقع المظلمة في معظم اقطار البلاد
الحارة والمعتدلة الحرارة . جسمها ابيضاجي الشكل يطول
من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى السرة الثانية اللامع . زباناتها
ديوريات مستطيلة . قوائمها نحلة مستطيلة . قوتها المولدة
الغوية للنحلة تنلسها بزباناتها لانها كفة عادمة اليرس .

١٧٩٩٦ - عَسَمَ الاختِصَاصِ Incompétence (F).

Incompétence (E).

هو ان لا تكون لقاضي او المحكمة او لادنى السلطات
العامة سلطة على اجبار عمل قانوني .

١٧٩٩٧ - عَسَمَ الانْقِصَاصِ Asyzoie (F).

Asyzoie (E).

١٧٩٩٨ - عَسَمَ الْاَهْلِيَّةِ Incapacité (F).

Incapacity (E).

هو ان يحرم المرء إما من مباشرة حق او من تزويج
حق له . لذلك تقسم عدم الأهلية الى :

عدم أهلية الاداء Incapacité d'exercice

عدم أهلية التزويج Incapacité de jouissance

١٧٩٩٩ - عَسَمَ التَّعَادُلِ Asymétrie (F).

Asymétrie (E).

شذوذ غير مألوف في التناظر او التماثل .

١٨٠٠٠ - عَسَمَ التَّنْفِيطِ Inexécution (F).

Non-fulfilment (E).

هو ان لا يقوم المرء بأكمل ما التزم به او بضمه .



عَسَمُ الْمَاءِ



عَدْلُوب

الزبان والدخان ولا تقع في الش الراسد أكثر من
يضة .

١٨٠٢٦ - عَدْن

Dérochement, Epiarrage, Epierrament (F). Scouring, Clearing land of stones (E).

رفع الحجارة أو اتلاعها من أرض الحقل .

١٨٠٢٧ - هَدْنٌ و هَدْنٌ *Adenium venustum* (S). هَدْنٌ *Adenium* (F). *Adenium* (E). *Adenie* (D). *Adenis* (I). جنبة يرية ممررة من فصيلة العدنات . أوراقها معتقة . متعاقبة . سنانية . نصلها جلدي الصفحة بحري اللون . ازهارها حنكولي تاجي . ازهارها خيرة اللون || منبتها البلاد الحارة ، تكثر في الجزيرة وهي من النباتات السامة .

١٨٠٢٨ - هَدُو *Galop* (F). *Gallop* (E). ركض الدابة السريع .

١٨٠٢٩ - هَدُوَّة * *Idotes* (S). *Idotée* (F). *Idotes* (E). جنس دوبيات بحرية من فصيلة العدنات . أصلها بحار البلاد الحارة وأخصها البحر الأحمر والمحيط الهندي . تعيش بين النباتات البحرية قرب المباح والشطوط || أجسامها تساهية السكم متصلة التعليط ، تقطع من ٣ إلى ٦ سم . مناطقها الخشبية ملحقة بصفاة متدعة تبدو كالخشب المتصل . قرونها الاستشعارية مسطحة ، مدبة الأطراف . أرجلها سباحية الأزواج ، غصنة المقاطع الدرية || أنثاها متراكبة الجذري والأحر والأصفر والأزرق والبنيجي .

١٨٠٣٠ - عَدُوبَات * *Idoteidae* (S). *Idotidées* (F). *Idoteidae* (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات مساهرات الأرجل أجسامها وأولها المعروفة نحو ٤٠ متشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية . تعيش بين النباتات البحرية القريبة من المباح والشطوط || أعرف أجسامها وأشهرها المدنة .

١٨٠٣١ - هَدُوِي

Infection, Contagion, Contamination انتقال الجراثيم أو الميكروبات الطبية إلى جسم الحيوان السلم وأصابته بالمرض الذي تحدثه تلك الجراثيم أو الميكروبات . واسع إصابة .

١٨٠٣٢ - هَدِيد *Multi, Poly* (F).

١٨٠٣٣ - هَدِيد الْأَرْجُل *Polypode* (F). *Polypod* (E).

١٨٠٣٤ - هَدِيد الْبُزُر *Polysperme* (F).

١٨٠٣٥ - هَدِيد الثُفُور *Polysperm* (E). صفة بعض الثفورات التي تتميز فيها الأعضاء الثرية بوفرة البزور .

١٨٠٣٦ - هَدِيد الثُفُور *Polystomata* (F).

١٨٠٣٧ - هَدِيدَات الصِّحَاف *Polystomatous* (E).

١٨٠٣٨ - هَدِيدَات الصِّحَاف *Polyplocophores* (F). *Polyplocophora* (E).

شعبة من الرخويات الرباطيات . أنواعها المعروفة نحو ٦٠٠ ينتمي إليها على محور الشاطئ * أشهر أنواعها الحديدة والكيتون .

١٨٠١٧ - عَدُوبَات *Ranidae* (S).

١٨٠١٨ - عَدُوبَات *Ranides* (F). *Ranidae* (E).

فصيلة حيوانات درداء قاذبة من لة الحيديات ورمقية السويبات ورمية التراتوت أي عديبات القلب || أجسامها وأولها كثيرة العدد متشرة في جميع أصقاع العالم القديم والجديد || أجسامها متفردة القبة تتميز بمساواة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها ، ويجعل فقرة السبر من الترسبات المنظمة الجانية . فكوكها العليا مسنة . أصابع قوائمها الخلفية مفيدة بحطاب لاقامي الرسابة || أشهر أجسامها المدلول أي الضفدع .

١٨٠١٩ - هَدْمُون * *Adimonia* (S).

١٨٠٢٠ - هَدْمُون *Adimonia* (F). *Adimonia* (E).

جنس حشرات غاصلة من مفصليات الأرجل وفصيلة النصاريات . أنواره المعروفة نحو ٣٠ أصلها مناطق البلاد المعتدلة الحارة . تأليف الحرامي والحقل والنباتات المشية من الأوراق إلى الزواجر والجذوع والجذور || أجسامها متوسطة القد . أنثاها أكبر جرمًا من ذكورها وتضع لويًا واسعًا طولًا إذ أنه لا يلبث كلال البين عند الاثلاث . أنثاها متباينة الألوان يكثر فيها الأسود والاسمر القاتم والجذري السابق || أعرف أنواره وأشهرها الاثنان التاليان :

١٨٠٢١ - هَدْمُون سُرُوي * *Adimonia rustica* (S). *Adimonia rusticus* (F).

يعتبر من الخنافس الخفيفة لانه يلبث الأوراق التي تلامس سطح التربة . لويه إلى السرعة القاعة ، أصغر المواجه عند الذكر ، بأحد عن الأثني .

١٨٠٢٢ - هَدْمُون عَتِيد * *Adimonia tenax* (S). *Adimonia obtus* (F).

يعتبر من الخنافس الخفيفة لانه يلبث كل ما استطاع إليه سبيلا من أجزاء النبات . ثوبه إلى الجذوة يزدهر عند الذكر ويهت عند الأثني .

١٨٠٢٣ - هَدْمُون * *Eudynamis* (S).

١٨٠٢٤ - هَدْمُون *Eudynamis* (F). *Eudynamis* (E).

جنس طير من فصيلة القيتريويات . أنواره المعروفة عشرة موطنها يمتد من إيران إلى الهند والصين واليابان || أجسامها رفيعة تقطع من ٣٥ إلى ٤٠ سم . أجسامها كبيرة ذلقة . أذناها مسطحة ، متعبرة الأطراف . مناقبها ضلعية معتقة الخاطم العليا الشاذة ، حاشية السفلى . سيقانها معتدلة تقطع . قوائمها مطوقة يختار ماسح امرط لا ريش فيه || قوائم الجراد والخشرات البرية والجزور || أعرف أنواره وأشهرها العديميس الشرقي .

١٨٠٢٥ - هَدْمُون شَرْقي * *Eudynamis orientalis* (S). *Eudynamis oriental* (F).

سبي قولًا لأن صياحه يشبه القول . طائر من السيفس . موطنه يمتد من الهند إلى إيران || جسمه وثيق القوام يطول نحو ٤٠ سم . ثوب الذكر إلى السواد الأخضر الملبس . الأصفر . ثوب الأنثى إلى الخضار اللامع المرقش بالأبيض . صفحة البين سوداء اللون عند الشفق || يألف الإخراج البهيمية الاثجار . قوته الخشرات والجراد والآبار البرية والبلور || طيراه سفيف وتصعد تهبط . شوطه قصير المدى || أنثاه لا تمش بل تقع البيض في أعشاش



عديمون



عديمون شرقي



عدونه

- 1٨٠٣٢ - عُدَيْمَة Lenticelle (F). Lenticel (E).
 1٨٠٣٣ - عُدَيْمِي Lenticulaire (F). Lenticular (E).
 1٨٠٣٤ - عُدَيْم الحَبَاة Abloue (F). Abiosis (E).
 1٨٠٣٥ - عُدَيْم اخْتِلَافِي Abranchiate
 1٨٠٣٦ - عُدَيْم الدَّم Essangus (F). Bloodless (E).
 1٨٠٣٧ - عُدَيْم الرُّؤْس Acéphale (F). Acephalous (E).
 1٨٠٣٨ - عُدَيْم الطَّعْم ، فَتَّ Insipide (F). Tasteless (E).
 1٨٠٣٩ - عُدَيْم العَصْد Anadytre (F).
 تمت تعريفه يطلق على كل حشرة جلادة عديمة اللحمه .
 1٨٠٤٠ - عُدَيْم الفِكر ، لا فِكرِي Acaulous, Stemless (E).
 تمت تعريفه يطلق على النباتات التي ليس لها سوق ظاهرة او التي سطحها جلدة . اما عديمة السورق بتتألف من قصير المقعر .
 والتي ساقها قصيرة جداً فهي النجمه .
 1٨٠٤١ - عُدَيْم الفِلكَة ، لا فِلكِي Invertébré (F). Invertebrate (E).
 هي الحيوانات التي لا فقار لها . ولا فقرانيات هي :
 الالوانى والاسفنجيات والمحيوانات والشوكيات والديدانيات والرخويات والمفصليات .
 1٨٠٤٢ - عُدَيْم الفُوهَة Acotyldone (F). Acotyldoneus (E).
 تمت تعريفه يوصف به النبات الذي لا خلقه في نتيجه .
 1٨٠٤٣ - عُدَيْم الحَبَاة ، لا بَنَكِي Apetale (F). Apetalous (E).
 هو النبات الذي لا قاعلة في زهرته .
 1٨٠٤٤ - عُدَيْم اللِّسَان Aglossa
 1٨٠٤٥ - عُدَيْم الرُّؤْس Achromatique (F). Achromatic (E).
 1٨٠٤٦ - عُدَيْم النَّمِيْمَة Aplanental
 1٨٠٤٧ - عُدَيْمَات الِاعْدَايِد Aglyphodontes
 هيوات خبيثة منها فصيلة النملين وفصيلة الالسيات .
 1٨٠٤٨ - عُدَيْمَات الِأَرْجُل Apodes, Gymnephones (F). Apodae, Footless (E).
 رتيبة من السفنجيات .
 1٨٠٤٩ - عُدَيْمَات الِأَمْدَاف Aplacophores (F). Aplacophora (E).
 شعبه من الرخويات الراباطيات الالوانى . اجنسها وانواعها المعروفة نحو ٢٥٠ .
 1٨٠٥٠ - عُدَيْمَات الجِنَاح Aphanipteroides
 طبقة حشرات من شعبة الحمدليات تشمل رتيبة واحدة تدعى القذانيات . فصائلها عديدة ، اشهرها البرغوثيات اما اجنسها وانواعها لكثيرة العدد جميعها من الحشرات الناقبة المماصة الصغيرة القدر .
 1٨٠٥١ - عُدَيْمَات الذَّنَب Anoures (F). Anurous (E).
 اطلب يتر .



ملطوط

Fritillaria lutea (S). **١٨٠٧٤ - عَرَكَر أَصْفَر**
Fritillaria jauno (F).
 نوع من المرار. أوراتها العليا متعاقبة ، ضيقة ، ستانية .
 شراخه يعلو من ١٥ إلى ٣٠ سم. زهره وحيدة كبيرة
 القذ. لونها الـ صفار الكبير يعلو تقطيع بنفسجي .
 أنزهاره يستمر من نيسان إلى أيار .

Fritillaria persica (S). **١٨٠٧٥ - عَرَكَر الْعَجَم**
Fritillaire de Perse (F).
 نوع من المرار دوصت غليظة متراكبة الاسقاط اللبدة .
 شراخه يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراته صغيرة .
 ستانية ، متعاقبة ، بحرية النصل ، تركب الشمران بكما .
 أنزهاره اعتقودية التجميع ، صغيرة القذ ، عريفة الرائحة ،
 لونها الـ البنفسجي الأزرق المواج || أنزهاره يستمر
 من نيسان إلى أيار .

١٨٠٧٦ - عَرَكَر الْغَاب ، نُؤَيْبِ الْمُرُوج

Fritillaria meleagris (S). *Fritillaire pintade*, *Pintade*,
Damier, *Tulipe des prés*, *Œuf de vanneau* (F). *Chack-*
ered lily, *Checkered tulip* (E). *Echte Schachblume*
 (D). *Fritillaria meleagro*, *Melesgride* (I).
 نوع من المرار الجري أوراته متعاقبة تطول من ٨
 ١٥ سم. وتعرض من ٢ إلى ٤ سم. شراخه الزهري يعلو
 من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أنزهار تطول من ٣ إلى ٥ سم. لونها
 الـ الحمرية البنفسجية يعلوها تقطيع أبيض . ضروره
 الترييبنة مدينة فارها لون الزهر || يستمر في بصله
 بعد سلقه ، مادة نشوية مأكولة تشبه البطاطا .

١٨٠٧٧ - عَرَكَر عَرِيضِ الْوَرَق

Fritillaria laefolia (S). *Fritillaire à feuilles larges* (F).
 نوع من المرار أوراتها ستانية النصل مستعرضة . شراخه
 يعلو من ٢٥ إلى ٣٠ سم. زهرته كبيرة القذ وسيدة . لونها
 الـ الحمرية الموحدة بالأصفر || أنزهاره يستمر
 من نيسان إلى أيار .

Fritillaire impériale (F). **١٨٠٧٨ - عَرَكَر قَيْصَرِي**
 نوع من المرار يعرف بأكليل الملك ، الحلب .

Fritillaria surea (S). **١٨٠٧٩ - عَرَكَر مُدْهَب**
Fritillaria dorée (F).

نوع من المرار أوراتها العليا متعاقبة أو ضخمة التجميع ،
 خطيئة النصل . شراخه يعلو من ١٥ إلى ٢٠ سم. زهره
 تطول نحو ٣ سم. لونها الـ صفار الأخضر المذهب المواج
 يعلوه تقطيع حثلي || أنزهاره يستمر طوال شهر نيسان .

Ophidium barbatum (S). **١٨٠٨٠ - عَرَكَسَة ***
Ophidie barbu, *Donzelle* (F).

مكة بحرية يروض من فصيلة الجيريات شالكانت الزعانت.
 أصلها بعض أقزام البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ||
 جسمها نعلي الشكل ، معتدل التيطيط ، قارب الشبه
 بالثقب ، يطول نحو ٢٥ سم. ثوبها الـ المرجاني القضي
 المواج يعلو في الظهر تمتشج أزرق و يعلو في الجانبين
 تحفة زرقاء حمراء . رأسها أزرق الشكل ، ذات الحلق .
 زعانفها الظهرية والذيلية والشربية متتابة تشكل زعنفة
 واحدة . زعنفتها الحوضية طامسة . فكها الاسفل يتأخر
 عن الاعلى ويعمل أربع عذبات دقيقة مستطيلة || لحمها
 متوسط الصنف ، مأكول .

طولها يراوح بين ١٤ و ١٦ م. وشتاها السيلاني الـ
 الحطلة الصفراء تترفها جد سود . وشتاها السيلاني الـ
 الحطلة الغصية || رقاتها ثلث مرارة اللون ثم تتحول الـ
 الزردي وتنتهي بالأحمر ولذا يسمونها اللبدان الحمر . لها
 جيلان في السنة . بيضها النثوي تقصيه كغادوة تحت
 لحاء بعض الأشجار اعصها الكرمية . تظهر القراشات الـ
 الربيع وتضع مكنها حل البرام الزهرية والورقية فينقب
 من رقات تركب تلك البرام || وفي جيلها الثاني الذي
 يبعثها حادة في تحور تمتع الأناث مكنها حل النار وينها
 الضنب فينقب من رقات دقيقة تشعل النار من حيث
 نقلت قسطها وتقيم حتى تنسلخها الأخير ثم تتركها
 وتنتج نحو اللحاء حيث تحشى وتصلو الـ غادرات .

١٨٠٦٦ - عِدْقِي، نُوْرَة *Corymbe* (F). *Corymb* (E).
 شكل من أشكال الأنزهار يكثر في الفصيلة الوردية
 كالأجرار الاجاس والفلح .

١٨٠٦٧ - عِدْقِيَّات *Corymbilères* (F).
Corymbiferous (E).

سبط من فصيلة المركبات الابوية الزهر . ومنت تمرني
 توصف به النباتات الضيقة الأنزهار .

١٨٠٦٨ - عِدْقِي *Culture non irriguée* (F).
Dry-farming (E).
 كل نبات لا يسقي إلا المطر . غلاظة ذرة . الحطلة الزنة
 هي الحطلة المروية .

١٨٠٦٩ - عَرَّ النَّخْل * *Graphiola phenicis* (S).
Graphiole des dattiers (F).

وصم نظري سببه فطر مجعري من فصيلة المريات ودوية
 النعاميات || يصيب غصن النخل فينبو كأنها جريه
 لانه يزدها ينشع صفة الشكل بنية اللون يعلوها حدة
 عموها الاسمر ، المنخفض الارتكاز ، غيط دقيق مركب
 يحمل غيرات القنطر || يقال لنشعة المصابة هذا الجسم
 قنطلة معراو || يكاثف باستمال بائل يورده المخلول من ٢
 الى ٢,٥ ٪ .

١٨٠٧٠ - عَرَاب
 « شجر يفتل من لحاء الحبال . الواحدة حراية . تأكله
 القردة » (اللسان) .

١٨٠٧١ - عَرَادَة *Sauterelle femelle* (F).
Female locust (E).
 الجرادة الانثى .

١٨٠٧٢ - عَرَكَر *Cri de l'autruche mâle* (F).
Cry of the male ostrich (E).
 صوت الطير

١٨٠٧٣ - عَرُور * ، **فَرِيْلِيْأَرِيَا** ، **حَشِيْشَة الْحَجَل**
Fritillaria (S). *Fritillaire* (F). *Fritillary* (E). *Schach-*
blume (D). *Fritzellaria* (I).

جلس نباتات دوصية برية و ترييبنة من فصيلة الزنبقيات.
 أنزهارها جرسية الشكل ، معتقة ، متدلية ، عجمها شراخ
 تكلمه قنط من الأوراق للسنه المتراكبة . أنولها المعروفة
 نحو ٣٠ . مصارة بصلها جحالية المادة ، حازمة الطعم ،
 سهلة وقد تصعب سامة عند الاكثار منها || أشهر أنزاهه
 ما يتبع .



مر النخل



مرار



عرانة

Agropyrum junceaum	نجير ، سيلين	١٨٠٨١ - عَرَاقَة ٥
Herniaria maritima	نومان بحري	Thlignotaxie, Thlignotropisme (F). Thlignotaxy, Thlignotropism (E).
Kochia arenaria	هشم الرمال	خاصة النباتات المتسلقة اذ تجملها تلتف بسوطها على ساندنها او تلتف بحولائها الحظرة او المحجمة .

٢ - نيوت الاثربة الرملية للباحية

Spergularia campestris	ايو غلام حقل	Placier (F). Town traveller (E).
Arabis arenosa	ابرس دلي	من عرض الشيء لتصريفه او يمه .
Agrostis alba	أدرا ابيض ، نجير ابيض	١٨٠٨٣ - عَرَاقَة ٥
Vicia lachryroides	بالقة جلبانية	Oniscia (S). Oniscie (F). Oniscia (E).
Scleranthus annuus	حشيشة القتاويل الحولية	جنس حيوانات بحرية من الرخويات مغطيات الارجل
Scleranthus perennis	حشيشة القتاويل الدمرة	وفصيلة الخويجات . انواعه المعاصرة المعروفة سنة منتشرة
Rumex acetosella	حشيش النغم	في جدار البلاد الحارة اصداها شبه يضيئة الشوزن ،
Airs caryophylla	عُرطالية قرنفلية	لولبية التخديد التائش ، مستطيلة الانفلاق الطولي للقاطب ،
Airs praecox	عُرطالية مبكرة	تقية الانقلاب المستندة الاطراف .
Draba verna	دراية ربيعية	



عَرَاقَة

Vulpia Myurus	ذيل الجرز	١٨٠٨٤ - عَرَاقَة الأَثَرِيَّة
Ornithopus sativus	ريضان مرعوي	Détermination des sols d'après la végétation spontanée
Spergula arvensis	سبرغولة حقلية	عَرَاقَة الاثربة اسلوب واقفي يقود الى معرفة نوعية الاثربة
Spergula vernalis	سبرغولة ربيعية	من نيوتها الطوعية ذلك لان لكل تربة ثبوت تستقر فيها
Carex arenaria	سمادى الرمل	للقائيا . وقد وضعتنا في الجداول الثانية اهم هذه الثبوت
Saxifraga tridactylis	سفرس ثلاثي الاصابع	الدلالية واشهرها :

١ - نيوت الاثربة الرملية الساحلية

Arrhenatherum elatius	شيام رفيع	أثل ، طفاء (عدة انواع)
Selene conica	هلوك مخروطي الورقة	Tamarix
Eragrostis minor	عززع صغير	Statice maritime
Eragrostis pilosa	عززع حقلاني	أريل أحر
Eragrostis major	عززع كبير	Linaria arenaria
Armeria plantaginina	عيفقان لسوني	حباحب الرمال
Luzula	لزولة	Ammophila arenaria
Plantago arenaria	لسان الحمل الرمي	حشيشة الرمال
Plantago lagopus	لسان الحمل المقدي	Scirpus holoschenus
Helianthemum guttatum	مداخن لؤلؤي	سلال القدران
Herniaria glabra	نومان امرد	Lagurus ovatus
Herniaria hirsuta	نومان مزقبر	ذيل الاونب
Agrostis spica venti	هزوز	Polypogon maritimum
		ذيل الفار البحري
		Crepis bulbosa
		سرغة دولصية
		Honeckenya peploides
		سرمق بحري
		Carex
		سمادى (بعض انواع)
		Elymus arenarius
		شعير الكتبان
		Eryngium maritimum
		شنداب بحري
		Mesembryanthemum nodiflorum
		ظهيرة مقدية
		Phleum arenarium
		عصوية الرمال
		Ephedra distachya
		عند البحر
		Gallium arenarium
		غالبون الرمال
		Cakile maritima
		فجيلة الشط
		Polygonum maritimum
		قردب الرمال
		Dianthus gallicus
		قرنفل الرمال
		Linum maritimum
		كتان بحري
		Calystegia soldanella
		لبلاب بحري
		Plantago coronopus
		لسان الحمل القثري
		Matthiola sinuata
		متيولا مقورة
		Malcolma
		سبلح (بعض الانواع)

٣ - ثبوت الاثربة السبخة وتدعى بحجيرة او الف الملح

Artemisia maritima	أبست بحري	
Silicornia	اشنان (جميع الانواع)	
Salsola kali	حرض	
Aster tripolium	خرغام	
Suaeda	دلو (جميع الانواع)	
Inula crithmoides	راسن بحري	
Atriplex halimus	سرق بحري	
Senecio crassifolia	شروقة لحية الورقة	
Glyceria maritima	عشبة الما البحرية	

<i>Orchis maculata</i>	مهلبلب أبيض	<i>Plantago maritima</i>	لسان الحمل البحري
<i>Carex</i>	سمادي (بعض الأنواع)	<i>Plantago crassifolia</i>	لسان الحمل لحمي - الورق
<i>Quercus pedunculata</i>	سنتيان مزند ، دور	٥ - نبات الأثرية الصوانية ، بزلح	
<i>Ganista germanica</i>	شيزاء جرمانية		
<i>Salix caprea</i>	صفصاف الماعز	<i>Betula verrucosa</i>	بتولا ثؤلورية
<i>Potentilla tormentilla</i>	عرق انجبار	<i>Campanula persicifolia</i>	جريس دواقي - الورقة
<i>Fistuca arundinacea</i>	عكروش علباني	<i>Jasione montana</i>	جزيون أزرق
<i>Dianthus Armeria</i>	قرنفل اديريه	<i>Sedum Forsterianum</i>	حي - العالم القريرف
<i>clisium ferox</i>	قصون شكس	<i>Malva moschata</i>	عجبانة سكية ، صخر
<i>Erythraea pulchella</i>	قنطريون اتيق	<i>Erica cinerea</i>	خلنج ربادي
<i>Cerasus padus</i>	كرز عبقودي	<i>Erica scoparia</i>	خلنج سكتسي
<i>Lobelia urens</i>	لوبيلية محرقه	<i>Erica ciliaris</i>	خلنج مهدب
<i>Lotus uliginosus</i>	لوتس	<i>Hypericum pulchrum</i>	داذي اتيق
<i>Molinia caerulea</i>	مولينيه ، غرطالية زرقاء	<i>Digitalis purpurea</i>	ديجيتال ابرواني
<i>Scutellaria minor</i>	هربون صغير	<i>Pteridium aquilinum</i>	دشدار
<i>Ulex europaeus</i>	وزال كبير	<i>Ornithopus perpusillus</i>	ريبدان لزم
<i>Ulex nanus</i>	وزال مثنون	<i>Antennaria dioica</i>	ريبل القسط - الشامع

٦ - نبات الأثرية الكلسية

<i>Laburnum anagyroides</i>	ابنوس كاذب	<i>Senecio adonidifolius</i>	شروقة زلفية الورق
<i>Coronilla emerus</i>	امروس الزمارين	<i>Senecio viscosus</i>	شروقة لزجة
<i>Berberis vulgaris</i>	بربريس ، عيد الريح	<i>Genista tinctoria</i>	شيزاء الصباغين
<i>Buxus sempervirens</i>	بقس دائم الخضرة	<i>Potentilla argentea</i>	عشبة القوى القوية
<i>Asperula tinctoria</i>	جوية الصباغين	<i>Festuca heterophylla</i>	عكروش هاتك
<i>Ophrys</i>	حاجبية (جميع الأنواع)	<i>Veronica verna</i>	فيرونيكا ربيعية
<i>Lavandula latifolia</i>	غزالي ذكورية	<i>Veronica officinalis</i>	فيرونيكا مخزنية ، ليلاب المهيوس
<i>Lavandula officinalis</i>	غزالي مخزنية ، خيري البر	<i>Dianthus deltoideus</i>	قرنفل دالي
<i>Lactuca perennis</i>	غس الغالب	<i>Vaccinium Myrtillus</i>	قام آسي
<i>Rhamnus alaternus</i>	زفرين الجرد ، ثيق مترادف	<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	كوسفية حرسية
<i>Hysopus officinalis</i>	زولفا	<i>Castanea sativa</i>	كستنة بلولة ، شاهبلوط
<i>Thymus serpyllum</i>	سعر الير ، زعر	<i>Nardus stricta</i>	ناردين المروج
<i>Thymus vulgaris</i>	سعر شامع	<i>Epilobium angustifolium</i>	نذ - سنبل
<i>Quercus lanuginosa</i>	سنتيان اذيب	<i>Sarothamnus scoparius</i>	وزال الشيع
<i>Ononis natrix</i>	شبارق ، لتين القدماء	٥ - نبات الأثرية الطينية الرملية	
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	شقيق النمان المبثول		
<i>Eryngium campestre</i>	شنداب حقلي	<i>Teucrium scorodonia</i>	اسقودين مائي ، ثوم الحية
<i>Lonicera xylosteum</i>	سرعية الجدي ، الدفلية	<i>Juncus squarrosus</i>	أسل خشن
<i>Vincetoxicum officinale</i>	صقلاب غزلي	<i>Betula pubescens</i>	بتولا زغبية
<i>Crucianella angustifolia</i>	صلبانة ضيقة الورق	<i>Viola canina</i>	بنفسج كلاي
<i>Catananthe caerulea</i>	طلسية ، عتباء زرقاء	<i>Peucedanum gallicum</i>	بوسيدان غالي
<i>Teucrium montanum</i>	طوقريون جبلي	<i>Campanula patula</i>	جريس عريش الورق
<i>Teucrium chamaedrys</i>	طوقريون غزلي	<i>Pedicularis sylvatica</i>	حشيشة القمل الحرسية
<i>Globularia</i>	عينون مبثول	<i>Pedicularis palustris</i>	حشيشة القمل المتقمية
<i>Geranium sanguineum</i>	غرنيق دموي	<i>Scirpus compressus</i>	حلل ليد
<i>Calamagrostis argentea</i>	غر - ار قصي	<i>Aira caespitosa</i>	غرطالية التيسص
<i>Rubia peregrina</i>	قوة - مرحلة	<i>Hypericum humifusum</i>	داذي رطب
<i>Veronica teucrium</i>	فيرونيكا اثني	<i>Scorzonera humilis</i>	ديج سفير

<i>Pastinaca sativa</i>	ميسارون كبير	<i>Cornus mas</i>	قرنوس ذكر
<i>Lithospermum officinale</i>	شنجبار غزني	<i>Cirsium acaule</i>	قصوان قريش
<i>Saponaria officinalis</i>	صابونية غزنوية	<i>Brunella lyssofolia</i>	قلاع حسل ^١ الورق
<i>Potentilla reptans</i>	عشبة القوي المسلحة	<i>Brunella grandiflora</i>	قلاع كبير الزهر
<i>Potentilla anserina</i>	عشبة القوي الورقة	<i>Colutea arboreascons</i>	قصصور شائع
<i>Euphorbia helioscopia</i>	فريبون النجر	<i>Centaurea scabiosa</i>	قطريون اجرب
<i>Euphorbia verrucosa</i>	فريبون مثالي	<i>Andropogon ischaemum</i>	كتيبة
<i>Melampyrum arvense</i>	قرطب القزوح	<i>Carlina vulgaris</i>	كرلين شائع ، زند البید
<i>Erytraea centaureum</i>	قطريون صفير ، مرارة الحنث	<i>Linocyrta vulgaris</i>	لنسير مبدول
<i>Allium ursinum</i>	كرات الدب	<i>Cerasus mahaleb</i>	محلپ
<i>Ononis campestris</i>	لئين الحقل	<i>Sorbus aria crantz</i>	مخلص
<i>Ononis spinosa</i>	لئين شائك	<i>Helianthemum vulgare</i>	مداين شائع
<i>Lychnis floe-cuculi</i>	لحنس ودي	<i>Melica dilatata</i>	مشرية مهدبة
<i>Anthyllis vulneraria</i>	لوتيا نافقة ، حشيشة الجرح	<i>Sedurela montana</i>	ندغ الجبل
<i>Lotus corniculatus</i>	لوطس قرني	<i>Hippocrepis comosa</i>	نمت الفم
<i>Fragaria vesicaria</i>	مرکان شامخ	<i>Sparcium junceum</i>	وزال الشرق
<i>Dipsacus fullonum</i>	مسط القرابي ، شوك الدراج	<i>Ligustrum vulgare</i>	ياسم معروف
<i>Rhamnus cathartica</i>	نبق سهول		
<i>Agrostis canina</i>	نجير كلي		
<i>Epilobium hirsutum</i>	ند غفائي		
<i>Mentha arvensis</i>	نمق صفيري		
<i>Falaria vulgaris</i>	ميردان شائع		

٧ - نبوت الاثرية الطينية الكلسية

<i>Cirsium luteolans</i>	أبو سلام ، عشرق
<i>Juncus glaucus</i>	أسل بحري اللون
<i>Aquilegia vulgaris</i>	أكيلاجيا عقابية
<i>Coronilla varia</i>	إمروس اوقش
<i>Sambucus ebulus</i>	بيلسان صفير ، حمان صفير
<i>Sonchus oleraceus</i>	تقاف معروف
<i>Bromus asper</i>	قرشول كبير
<i>Campanula trachelium</i>	جريس الست ، قفاز مريم
<i>Campanula glomerata</i>	جريس صفري
<i>Lathyrus tuberosus</i>	جليان مدرن
<i>Tussilago farfara</i>	حشيشة السعال
<i>Bupleurum falcatum</i>	حليلاب منجل
<i>Mercurialis perennis</i>	حليوب مسمر
<i>Androsaeum officinalis</i>	داذي غزني
<i>Daphne laureola</i>	دفنة عود النار
<i>Aegopodium podagraria</i>	رجبل للمزى ، حشيشة المزى
<i>Fagus sylvatica</i>	زان معروف
<i>Orchis mascula</i>	محلپ ذكر
<i>Orchis latifolia</i>	محلپ عريض الورق
<i>Orchis incarnata</i>	محلپ قزمي
<i>Stachys annua</i>	مطاقس حولي
<i>Stachys recta</i>	مطاقس سنبل
<i>Carex sylvatica</i>	سمادي حرجي
<i>Carex pendula</i>	سمادي مدلل
<i>Tragopogon pratensis</i>	مسلخيل المرج
<i>Colchicum autumnale</i>	سورتجان الخريف
<i>Iris fastidissima</i>	سوسن متين ، قوسون

٨ - نبوت الاثرية المتعقبة

<i>Achillea ptarmica</i>	أخيلية بقلة الطاس
<i>Myosotis palustris</i>	أكذان القار المتقي
<i>Juncus</i>	أسل (بعض الانواع)
<i>Viburnum opulus</i>	اللون تلجي
<i>Equisetum maximum</i>	اسوخ كبير
<i>Equisetum palustre</i>	اسوخ متقي
<i>Sanguisorba officinalis</i>	بلان غزني
<i>Gaum rivale</i>	جيم بري
<i>Pedicularis palustris</i>	حشيشة القمل المتقية
<i>Scirpus caespitosus</i>	حلل الحصر
<i>Populus tremula</i>	حور ريجراج
<i>Scrophularia aquatica</i>	خنأزيرية المتانق
<i>Scrophularia nodosa</i>	خنأزيرية عقدا
<i>Pulicaria vulgaris</i>	وراع شائع
<i>Stachys palustris</i>	مطاقس المتانق
<i>Carex</i>	سمادي (بعض الانواع)
<i>Symphytum officinale</i>	سمفون غزني
<i>Salix caprea</i>	صفصاف الماعر
<i>Cardamine pratensis</i>	مناب الماء
<i>Comarum palustre</i>	عشبة القوي المتقية
<i>Schaenus nigricans</i>	عين البقر
<i>Eupatorium cannabinum</i>	غفت ابن سينا
<i>Lythrum salicaria</i>	فرنكل مبدول

بیشة مقطوعة المتوسطة تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها
خلى الصفحة السفلى || ازهار نوربها تمد من ٣ الى ٥
وي صيوانية التجميع بيضاء اللون || ازهارها يستمر
من نيسان الى ايار .

١٨٠٨٨ - عَرَاوَة دَاذِيَّة الْوَرَق *

Spiraea hypericifolia (S). Spirée à feuilles de millepertuis (F).

جنيبة عمرة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها كاملة ،
مستطيلة ، مسنة الزام الاخير . نصلها انقب البشرة
ثلاثي المروق او خلسيا || ازهار نوربها تمد من ٥ الى ٧
وي صيوانية التجميع ، بيضاء اللون || ازهارها يستمر
من ايار الى حزيران .

Spiraea douglasii (S). عَرَاوَة دُوغلاس (F).
Spirée de Douglas (F).

جنيبة زينة تملو من ٨٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سنانية
مستطيلة . نصلها بطول نحو ٨ سم. وهو خلى الصفحة
السفلى ، مشاري الحافة في زامة الاخير || ازهارها
عنفودية التجميع ، وردية اللون القاني || ازهارها يستمر
طوال الصيف .

Spiraea pubescens (S). عَرَاوَة زَبَاء (F).
Spirée pubescente (F).

جنيبة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. فروها ارجوانية
اوراقها اهلجية مقطوعة القاعدة . نصلها خلى الصفحة
السفلى ، مسن الزايمان الاخيرين || ازهار نوربها متوسطة
العدد ، ضمية التجميع ، لونها الى البياض الاصفر الموج .
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٩١ - عَرَاوَة صَفْصَافِيَّة الْوَرَق

Spiraea salicifolia (S). Spirée à feuille de saule (F).

جنيبة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها سنانية تطول
من ٤ الى ٨ سم. نصلها عابق الخضار مسن الحافة يستعمل
في غش الشاي || ازهارها وردية اللون ، خشكوية التجميع ،
هرمية الشكل ، خشكوية بطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهارها
يستمر من حزيران الى تموز .

Spiraea chinensis (S). عَرَاوَة صَيْغِيَّة (F).
Spirée chinoise (F).

جنيبة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مستديرة
مفصصة . نصلها خلى الصفحة السفلى الطموه اللون .
ازهار نوربها حلقة الاضواء ، متوسطة العدد ، صيوانية
التجميع ، لونها الى البياض الاصفر الموج || ازهارها
يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٩٣ - عَرَاوَة عُسْقُولِيَّة *

Spiraea filipendula (S). Spirée filipendule, Filipendula (F). Common-dropwort, Italian may (E). Knollenstodesüss, Knolliges Mädesüss (D). *Spiraea filipendula*, *Erba peperina* (F).

جنيبة برية طيبة تملو نحو ٦٠ سم. جلوهها عسقلية
عقدية . اوراقها اهلجية ذرية . نصلها مشاري الحافة .
ازهارها صغيرة القند بيضاء اللون خشكوية التجميع . ازهارها
يستمر من حزيران الى تموز || عسلها سائمة الطعم ،
طيبة وندرة البذر .

Spiraea cantoniensis (S). عَرَاوَة كَنْتُون (F).
Spirée de Canton (F).

جنيبة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها ايديسة ، سنانية ،

Veronica beccabunga
Arundo phragmites
Hydrocotyle vulgaris
Cirsium palustre
Cladium mariscus
Alnus glutinosa
Valeriana officinalis
Mentha aquatica

فبرونيكَا قَرَّةَ الْمِين
قصب ، يوس
قصّة الماء الشائنة
قصبون النلقع
كلاديون متقي
مفت غروي
فاريين غزني
نمّع الماء

٩ - ثبوت الازهرة الطرية وهي معظمها نباتات ناقصة

Arnica montana
Carum verticillatum
Andromeda polifolia
Viola palustris
Succisa perennis
Erica tetralix
Osmonda regalis
Carex
Salix repens
Spaghnum
Triglochin palustre
Oxycoccus palustris
Gentiana pneumonanthe
Lobelia urens
Menyanthes trifoliata
Drosera rotundifolia
Drosera longifolia

ارنيكا جبلية ، زهرة الساس الجبلية
اطريلال حاتقي
الندروبيد كتيبة الورق
بنفسج متقي
حصص مسمر
غلنج ربابي ، الاهداب
سرخس ملكي
سحادي (بعض الانواع)
سوسر مدّاد
طحلب المتابع (جميع الانواع)
عاشم متقي
قام صلب
كوشاد متقي
لوبيلية حمرة
نفل الماء
نيسان مستطير الورق
نيسان مستطيل الورق

Spiraea (S). Spirée (F).
Spiraea (E).

١٨٠٨٥ - عَرَاوَة
جلس نباتات برية وزينة وطيبة من فصيلة الورديات .
انواعها كثيرة القند جميعها جنات وبينيات . اوراقها
متعاقبة ، حاملة ، مختلفة الاشكال والاحجام . ازهارها
صغيرة القند ، لا قياسية الشكل والتجميع . اما الاغصانين
في علم النبات فيقسمون انواع العراوة الى ثلاث فئات :
- الفئة الاولى تشمل الانواع ذات الازهار الصيوانية
والمعقودية غير المنشعب . - الفئة الثانية تشمل الانواع
ذات الازهار الملقحي . - الفئة الثالثة تشمل الانواع ذات
الازهار المفكوك والمعقودية المنشعب || اشهر انوعه
الطبية والزينة ما يبع .

Spiraea cana (S). عَرَاوَة بَيْضَاء (F).
Spirée blanche (F).

جنيبة تملو من ٢٠ الى ٩٠ سم. اوراقها اهلجية الشكل
تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها مسن الزام الاخير ،
خلى الصفحة السفلى البيضاء اللون || ازهار نوربها كثيرة
العدد ، ضمية التجميع ، صغيرة القند ، بيضاء اللون ،
غبراء الموج || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٠٨٧ - عَرَاوَة حَوْشِيَّة الْوَرَق

Spiraea prunifolia (S). Spirée à feuilles de prunier (F).

جنيبة عمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها



عَرَاوَة دَاذِيَّة الْوَرَق



عَرَاوَة عُسْقُولِيَّة

18102 - **عُرْوَةُ الْمَاءِ** *Naladacose* (S).
Naladacose (F). *Naladacose* (E).
 فصيلة نباتية من فصيلة الفلقية. اجناسها وانواعها نداء
 ١٠٠ جميعا مائية. ازهارها وسيدة الشق || اشهر
 اجناسها دروس الماء.



مرأوة لية النيس

18103 - **عُرْوَةُ النَّيْلِ**
 هي التيلوز الايض، اطليه.

18104 - **عُرْبُ** *Cautrier* (F) *To cautieria* (E).
 عُرْبُ النابية : ينمها حل اشجارها ثم كولها.

18105 - **عُرْوَةُ شَاحِكَةِ** *Voiture agricole* (F).
Farmer vehicle (E).
 حجلة كبيرة تستعمل في نقل الحاصل الزراعي وغيرها
 من سائر الاشياء.

18106 - **عُرْبُج** *Chien de chasse* (F). *Pointier* (E).
 هو الكشم أي كلب الصيد.

18107 - **عُرْبِيد** هو الاربد، اطليه.

18108 - **عُرْبُوب** هو سقا المسابين، اطليه.

18109 - **عُرْبُك** *Urbec* (F).
 حشرة تدمي ولشيت الكربة، اطليها.



مرأوة ملكة المروج

18110 - **عُرْبُون**، **عُرْبُون** *Arrhes* (F).
Earnest, *Deposit* (E).
 هو مبلغ من التقد أو أي عين متغولة يدفعها احد طرفي
 العقد إلى الآخر ساعدا للتأكد.

18111 - **عُرْبُج**
 المربج نوع من الكلاب الاسوية الضامرة الضخمة.

18112 - **عُرْوَة** هي المرأة، اطليها.

18113 - **عُرْوَن** *
Myricaria (S).
Myricaire, *Petit tamarisk* (F). *Small tamarisk* (E).
Rispelstrauch (D). *Piccolo tamarisk* (I).

جلس جنبا برية وريينية معمرة من فصيلة الالديات.
 سوقها فراء مسطلة التقصان الجزرية
 اللون. غراسيها دقيقة تنقي بالنتايد الزهرية || وهو

من النباتات السبروية التي تعيش في أي مكان كان حتى
 بين الصخور || اعراف انواعها ما يلي.

18114 - **عُرْوَن جِرْمَانِي** *Myricaria germanica* (S).
Myricaire d'Allemagne (F).

جنبة برية وريينية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. غراسيها
 دقيقة تسك نحو ٣ سم. حثايقها الزهرية كبيرة رطلة.

انواعها صغيرة القد، ودية اللون، يضاء المروج.
 ازهارها يستمر من ايار الى تموز.



عُرْوَن

18115 - **عُرْوَن دَوْرِي** *Myricaria dahurica* (S).
Myricaire de Daourie (F).

جنبة برية وريينية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم.
 غراسيها غليظة تسك نحو ٦ سم. حثايقها الزهرية كبيرة

القد، لينة. ازهارها صغيرة، ودية اللون، محزوية
 القنابات الخفيفة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

مسفة الزام الاخير || ازهار نوربًا قليلة العدد، صيرانية
 التجميع، متوسطة القد، مَرَاكِيَة البتلات المكبية،
 لونها اليباض الموحج بالأخضر || ازهارها يستمر
 طوال شهر حزيران.

18095 - **عُرْوَةُ لِحْيَةِ النَّبِيِّ** *، **دَقْنُ الْعُرْوِي**
Spiraea aruncus (S). *Spirée de chèvre*, *Barbe de*
bouc (F). *Goat's beard*, *Steeple weed* (E). *Wald-*
geissbart, *Spiertande* (D). *Spiraea spigata*, *Barba di*
capra (I).

جنبية برية طيبة تملو نحو ٨٠ سم. اوراقها يضيء مطبوعة
 القاعدة تطول نحو ٤ سم. نصلها خاسي الفروق، خلي
 الصفعة السفلى || ازهارها يضاء اللون، محكولة التجميع
 شكل محكولا يشبه لية النيس || وهي من النباتات
 الطيبة تدبر البول وتفيد اوجاع المغاسل والالتهابات.

18096 - **عُرْوَةُ مُحَجَّدَة** *Spiraea bullata* (S).
Spirée à feuilles cloquées (F).

جنبية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها يضيء
 الشكل لا قياسية التسنين. نصلها مجده الصفعة، خلي
 البشرة، مَهاوِج اللون || ازهارها ودية، صغيرة القد،
 لينة التجميع، نوربًا خفيفة الشكل || ازهارها يستمر
 طوال فصل الصيف.

18097 - **عُرْوَةُ مَرْيَانَة** *Spiraea bella* (S).
Spirée décorative (F).

جنبية تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. فروعها فائضة مطبوعة.
 اوراقها ستائية الشكل، نصلها عايق اخضر ثنائي
 التسنين || ازهار نوربًا خفيفة التجميع، ودية اللون.
 ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

18098 - **عُرْوَةُ مَلِكَةِ الْمُرُوج** *
Spiraea ulmaria (S). *Spirée ulmaire*, *Ulmair*, *Raines-*
des prés (F). *Meadow-sweet*, *Queen of meadows*
 (E). *Echos Mädesüss*, *Weissenkönigin* (D). *Ulmaria*
regina dei prati (I).

جنبية برية طيبة تملو من ٢٥ الى ١٠٠ سم. اوراقها
 مركبة. ورقها اهلبيعية ستائية. نصلها بارز المروق
 والتسنين. ازهارها يضاء اللون. غراسها المواب، خفيفة
 التجميع || وهي من النباتات التي تستعمل في الطب التجاسي.

نقيها يفيد الاستسقاء والالتهابات والحمايات والسعال.
 ويستخرج من قضبانها اللغية عصارة لزجة صفراء اللون
 تحوي الكثير من الحامض المراري (*acide spiréique*).

18099 - **عُرْوَةُ ويلسن** *Spiraea Wilsoni* (S).
Spirée de Wilson (F).

جنبة تملو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. فروعها زياء اللحاء.
 اوراقها مشرمة، نصلها اغير اللون، خلي البشرة حل
 صفحي || ازهار نوربًا خفيفة التجميع، قطرها نحو

٥ سم. لونها اليباض الاصفر الموحج || ازهارها
 يستمر من حزيران الى تموز.

18100 - **عُرْوَةُ يَابَانِيَّة** *Spiraea nipponica* (S).
Spirée nipponne (F).

جنبة تملو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها يضيء
 مطبوعة القاعدة، طرفها نحو ٢٠ سم عرضها ١٦. نصلها

خلي الصفعة السفلى للبراء الموحج || ازهار نوربًا كبيرة
 العدد، غمية التجميع، صغيرة القد، مستطيلة البتلات،
 يضاء اللون || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

18101 - **عُرْوَات** *Spirées* (F).
 سبط من فصيلة الورديات، اشهر اجناسه المرأوة.

١٨١٢٥ - عُرْجُوْد Rafie (F). Grape-stalk (E).
هو السيقان من العنب وغيره بعد انتزاع حبه .

١٨١٢٦ - عُرْجُون شرب من الكفاة قدر شرب وهو طيب ما دام خفياً ، وهو كالقطر يابس وهو مستدير .

١٨١٢٧ - عُرْجُون Rameau (F). Bough (E).
هو اللشد المحل قبل أن يكون خشباً . ج . عراجين .

١٨١٢٨ - عُرْجُونِي Ramsale (F). Ramal (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما ينشب في العرجون من ابن وزمات .

١٨١٢٩ - عُرْدَ حرد النبات ؛ طلع وانقصب واشته .
١٨١٣٠ - عُرْدَ الحرد ؛ الحار في طبع اللحم .

١٨١٣١ - عُرْدَاد Eléphant de somme (F).
الرداد ؛ القيل العامل .

١٨١٣٢ - عُرْدَ مِيَّة Phallime (F). Phallim (E).
المرمية عبادة الرمد عند الاقدمين كالسوريين والمصريين ولكنكانيين والتبليبيين والاشوريين و عرب الجاهلية واليونان طقوس وثنية قوامها إقامة الشعائر التعبدية امام نصب يبرز الى الرمد لاله بمقدم محور الحياه في الكون .

١٨١٣٣ - عُرْدُوسُ الصَّنَوْبَرِ الْبَرِّيَّ

Aradus cinnamomeus (S).
Arade du pin sylvestre (F).
حشرة مخاضة من فصيلة المردوسيات ، جسمها صغير ، مسطوح ، يطول نحو ٤ م . عند الذكر ، ونحو ٦ م . عند الانثى || ثوبها الى الخشنى الا انهم يعدونه مروج برارح من الشجعة الى الليرة . رأسها مزخرف بتلوينات واطنان . غططها ينتمن في اعمد لا يتجاوز الحلقة الصدرية الاولى . عيناها جانبيتان . زباناها معتدلا الغلاظة . كوسلها مقطوم القامة والمقدم . حجبتهما قليلة ، صغيرة . حنجرة الطهران مسنجة بالاخير . ظهراتها اسود العروق ، يلحم البطن دون الحثار . حثار ظهرها اسود التجذيع . قوائمها صيرة || تألف للواقع التي يكثر فيها البرز . تعيش على الاهداب .

١٨١٣٤ - عُرْدُوسُ الْعُكْصِيَّ

Aradus corticalis (S).
Arade plat (F).
حشرة دامة من فصيلة المردوسيات ، جسمها صغير مسطوح ، يطول نحو ٦ م . رأسها مزخرف . عنقها معتدل الطول . غططها ينتمن في اعمدود يمتد حتى الحلقة الصدرية الثانية . عيناها صغيرتان . زباناها معتدلا الغلاظة . حجبتهما صيرة . ظهراتها اعدام الخشبية ، لا يلحم كامل البطن || رأسها وزباناها الى الخشنى الاسمر . كوسلها رصحنى الى الخشنى المبيج والمخبط بالاسود . ظهرها اخر التبيج ، اسمر للتسبيج المتضرر . الصفعة السفلى الى السرة القاعة || تألف للفايات . تعيش تحت قشور الفصص والسليديان قوتها المواد النباتية المنحلة .

١٨١٣٥ - عُرْدُوسِيَّات Aradidae (S).

Aradidae (F). Aradidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة مخلفات الاجنحة وطبقة اصغيات

١٨١١٦ - عُرْكُون ، جَوْزُ مُرْتَانِي ، جَوْزُ مُجْتَنَح Pterocarya (S). Pterocaryer (F).
جس اجبار سرجية وزينية من فصيلة الجوزيات مهابها البلاد الاسيوية ، انواعه قليلة جميعها اشجار فرعاء ، دفلة ، كبيرة الحجم وارابة الفل . اوراقها صياغية عابلة مركبة ، وريقاتها من ١٥ الى ٢٥ مسنة الحافة تشبه لوراق المزان ولذا دعوا الجوز المراني . اما ثمارها فجوزية مجنحة ومذا ايضاً ما جعل بعضهم يسميها الجوز المجنح . للثمرة صيرة اللد ، غلافها الجلدي لاصق بالقشرة الخشبية ، لبانها حنكي اللون يعني الشكل لا يؤكل .

١٨١١٧ - عُرْكُونُ صِيصِي Pterocaryasenoptera (S).
Pterocaryer de Chine (F).
شجرة من المرتين تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها طويلة المائلين ، وريقاتها لسنة طويل من ١٠ الى ١٢ سم . نصلها ازغب السلسلين . ثمارها مجم البتق ، اجنحتها صيقة مستطيلة || مهابها الصين . اوراقها صياغية .

١٨١١٨ - عُرْكُونُ مُرْتَانِي الْوَرَق Pterocarya fraxinifolia (S). Pterocaryer à feuilles de frêne (F).
شجرة من المرتين تملو من ١٢ الى ٢٠ م . اوراقها مستطيلة المائلين ، وريقاتها نحو ٩ سم . نصلها عابق الصفعة العليا ياحت السفلى . ثمارها مجم البتق ، اجنحتها وافة المرش قليلة الطول || مهابها الصين والقوقاس . تستعمل للزينة ، اوراقها صياغية .

١٨١١٩ - عُرْكُونُ يَابَانِي Pterocarya rhoifolia (S).
Pterocaryer du japon (F).
شجرة من المرتين تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها جلدية النصل الاصفر اللون ، صفحته العليا مسلة البشرة اما السفلى فزياة . ثمارها مجم الجوز الصغير . مهابها اليابان وقد انتشرت زراعتها الزينية نظراً لقربها شكلها ولانصرار اوراقها .

١٨١٢٠ - عُرْكُونِيَّ Arabotrys (S).
Arabotrys à parfum (F).
لبات طري سرجي ممر من فصيلة القشديات . منته بعض المناطق الحارة من البلاد الاسيوية اعصها اغتد وجاليا . ويؤرخ كتابات صناعي لاستثمار طهر || يستخرج من اثماره دهن طري فاخر الصنف شائع الاستعمال في الهند وجناروا واصل الاقطار الاسيوية .

١٨١٢١ - عُرْكُونِيَّ Artemisia (S).
Artémie (F). Artemie (E).
دوية من القشريات الدنياء عيشوييات الاطراف . تعيش في المناطق واللدعان السيئة حيث للملحة لا تقل من ملوحة البحر وقد تفترها || جسمها اعدام العائف . عيناها مزفتتان . زباناها مسطولين عند الذكر . ارجلها الصدرية صغيرة للشكل .

١٨١٢٢ - عُرْج Boloterie (F). Halting, Limplig (E). عُرْج
حطب يحل بواكم اللواب فلذا كان مقطوعاً اعتبر من الصيرب المبلطة لليع .

١٨١٢٣ - عُرْجِيَّ Rameau tortueux (F).
Tortuous bough (E).
هو اللشد العادم الاستقامة الكثير التاربج والقدع .



عُرْل

Alard

١٨١٤١ - عَرَشِي

العرش بجسوة كواكب صناد تقتلم البلك الاحزل .

١٨١٤٢ - عَرَشِي التَّرْبِي

بجسوة كواكب بالقرب من التربة .

١٨١٤٣ - عَرَشِي عو ورد اشد ، الحله .

١٨١٤٤ - عَرُودْ مُتَقَلِّبْ ه

Orsodacne variabilis (S). Orsodacne variable (F). Orsodacne variabilis (E).

حشرة خاضعة ومفترسة من فصيلة الساريليات وربة مفدمات الاجنحة . موطنها فصح الارباع بينه من الشرق الاصل الى اوروبا واسريكة الشجالية . تألف اللوايح الي يكثر فيها الزهور والبرقوق والحلب والكرز . غنائها تعيش على اضرار النباتات المذكورة وعلى اضرار الصيرليات . يرقاتها تلتزم الارواح وتعيش في داخلها || جسمها صلب اشد بطول من هـ ٨ م . ثوبا مغلب الالوان تغلب فيه الشقعة الحنطية الملوح مع اسوداد الرأس . رأسها مستد الجرم . عيناها كيرتان جاحستان . زباناها خيطان مقلدان . خلفها مخروطي مزق الطرف . ظهرها مستدير المؤخر للامح . غذاها مستكنا الصلابة . متناجنا التحيزز الخفيف . ارساها رباعية المغل الظاهرة || ذا جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . تسرع في التبار . تماثل بدء ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تنممكن على فصال الارواح || ورجعها عند ادراكها الكالك الجسوري بطول نحو ١٢ م . جملتها دقيق الجرم . شبه اسطواني الشكل . سداسي القرواج النحيلة . اكهب اللون ، اسمر الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوما يتقضي في الجلالة فسن صلبة من المواد النباتية والتربة والبرية المسجوة بالريال .

عردل اريد



عرصول



عرصد مغلب



عرصت جعدي



عرصت شرقي



عرصت شتقوره

الجنح . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجناسها صغيرة ، مبطلية . رؤوسها مزخرفة . انطماها صغيرة ، مضطبة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصل . قواياها صغيرة . ارساها ثنائية المغل || جميعها خاضعة او دامة تعيش على اوراق النبات او على المواد النباتية المنحلة .

١٨١٣٦ - عُرْدِيلْ أُرُودْ ه

Adelocera murina (S). Adelocera gris souris (F). Adelocera murina (E).

حشرة خاضعة ومفترسة من فصيلة الساريليات وربة مفدمات الاجنحة . موطنها فصح الارباع بينه من الشرق الاصل الى اوروبا واسريكة الشجالية . تألف اللوايح والمقلات والحقول المزروعة . غنائها تعيش على اوراق النبات من تحتل الفصائل ونها البقول التي تغلفها على غيرها . يرقاتها تعيش في التربة ، نحو اربع سنوت لا كالك دورتها الحياتية . تغتلك مجلور الزروع والبقول والنباتات الترتيبية والاشجار المثمرة وتقتصر اسابيع بعض الحشرات وكزيرة ذوات الاجنحين || جسمها متوسط القد ، اهليلجي الشكل ، يطول من ١٢ الى ١٨ م . ثوبا الى السرة المابقة بملوحا زغب احمر يصل الى القرن . رأسها مستعرض الشكل . عيناها مخروطي . فكهاا غليمان زباناها خيطان . خلفها صيرتان صاحتان . كرسها قليل الاسدياد . ارساها خاضعة المغل ، حمية الخالب || الاثني اثنى قدامن الذكر واكد ثوبا به واقصر زبانا واضخم بطنًا || جملها رباعي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرع في التبار وتبيت في الليل . تنس على الارض بقعة واذا وقعت على ظهرها تلتف لامتداده وضعا الطبيعي .

١٨١٣٧ - عَرَزِي

Gastridium (S). Gastridie (F). جنس نباتات عشبية برية معروضة من فصيلة النجيليات انواعها المعروفة قليلة منها بعض اصناف حوض البحر الابيض المتوسط . تتميز انواعها بفخامة سيللاتها المكشورة الشكل || بعض انواعها ينبت طويلا في الجرد القبناتية .

١٨١٣٨ - عُرُوس ، عُرُوسْ عو ابن عرس ، الحله .

١٨١٣٩ - عُرُوسُولْ ه

Ortixelus Meiffreni (S). Ortixéle de Meiffren (F).

طائر وحيد الجنس والفرع من فصيلة الزرقائيات . موطنه بعض مناطق افريقية الاستوائية يجمو في طلب القوت . يألف غشاف جمادي الماء والبيجرات والمستنقعات . قوت الحشرات والديدان وبعض الاشباب اللاتية . ملجته الحياتي جماعي || جسمه صلب القد ، رشيق القوام ، مغلف الرأس . صير المتقاد اللدب الطرف . جناحاه كيرتان لاحسان . ذنبه مستدير الطرف . ثوبه الى الشقعة الموحدة بالابيض . رأسه كسني القرن . عيناها مكملتان . حمراء الى البياض الحامي . منقاده ورساه الى السرة الحنطية || يدثن انحوصه في التربة بين الاشباب الرقية . الاثني تحفن رسدا من هـ الى هـ بياض . ترنجيمها يستمر نحو ١٥ يوما . الذكر يلين لها الفاء .

١٨١٤٠ - عُرُوسِيَات

هي فصيلة السوريات . اطبا .

Artanthe (F). عُرُفَت شَيْءٌ ١٨١٥٨
نوع من الناموس. جنبة معمرة من فصيلة الغلغللات
أوراقها طيبة رائحة وبهم من يستعملها مضغاً. راجع
ناموس غيبق الورق.

١٨١٥٩ - عُرُطَيْتَا هو السكك ، اطلبه .

Athous obscurus, ° عُرُطُوس مُتَقَسِّس ١٨١٦٠
Athous haemorrhoidalis (S). Athous confus.
Taupin confus (F). Athous obscurus (E).

حشرة مؤذية ناعمة مقرنة من فصيلة السوسيات ورتبة
مخيدات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الأوسط الى معظم
الاصقاع الاروپية. تألف المهاجرات والحلقات المزدودة
والادغال والاصراج. خنافسها تعيش على بقايا الاثمار
وأوراق القراص والحرفش. يرقاتها مؤذية تقضم جمل
التبليات والبقول والبطاطا والشديد وتقتصر كل ما
تستطيع من الحشرات || جسمها متوسط القد بطول من ١١
الى ١٤ م. ثوبها ملتصق اللؤلؤ ، اسود الرأس والكسول ،
احمر البطن ، كسني الظهران ، اسمر الجرايز . راسها
صغير الجرم . زباناها عظيمان ، مستطيلان . صيهاها
صغيرتان بارزتان . ظهورها متصابح التميزير الفدي
القلاب . ارسافها خالصة السفل تتميزر باستطالة الفتلة
الاولى وبقصر الرابعة || الانثى تدعى عرطوسه وهي امير
قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زبانا || جملها
رباعي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى
تموز . تسرح في النهار وزيوت في الليل || البرقة بظنية
النمو تملك الكال الجسوري بمرر ثلاث سنوات فيصبح
طولها نحو ٢٧ م. ثوبها الى الصفرة الصنائية يعلوها
مواج امفر .

Orthonyx (S). عُرُطُون ° ١٨١٦١
Orthonyx (F). Orthonyx (E).

جنس طير من الجوارث رقيقات المنقار وفصيلة المانوريات.
انواعه المعروفة اربعة موطنها استراليا وزيلندة الجديدة .
تألف الاصراج والفايات العاتية الانحجار . ملجئها الحياتي
زويبي . قوتها الحشرات والنمل والباير والباير || اجسامها
متوسطة القد ، ريشة القروم تطلو من ٢٤ الى ٣٢ م.
رؤوسها مستدلة الجرم . منابتها رقيقة صغيرة . اجنتها
مستديرة . اذنانها مستطيلة ، مقطوعة الاطراف . اثنائها
متباينة اللون تكثر فيها الكهبة الخنطية الحامض والمزقة
السرا . جميعها مرقوشة الدماء والجناح والذنب || تدش
امشائها في الادغال القليلة الارتفاع من سطح الارض .
الاناث تحضن رسلها من بيضة الى يفتش من مرتين
او ثلاث مرات في الحول . الترخيم يستمر نحو ثلاثة
اسابيع . الذكور تلين الحماية والذواء .

Erotylus (S). Erotylus (F). عُرُطِيل ° ١٨١٦٢

جنس حشرات من غديات الاجنحة دبوسيات القرن
وفصيلة الميرطيليات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في
مظم مناطق البلاد الاستوائية || اجسامها فيه بيضية
الشرنق . بحبة الصفحة العليا ، تطلو من ١٠ الى ١٥ م.
الانثى ملونة ، زاهية الخصب وسنها المؤذرة والمجذبة والبيضة .
تعيش على جميع انواع الفطور اغصها الليلية التركيب .

قصدان ترتفع من ١٠ الى ٣٠ م. أوراقها للقرصية مدجة
بالجروي والاسفر الاسفنج المواج . ازهارها معقودية
التجميع زرقاء اللون || ازهارها يستمر من نيسان الى
تموز .

١٨١٤٩ - عُرُصَف شَيْءٌ °
Ajuga chia (S). Bugle chia (F). Chia bugle (E). Chia Günsel (D).
Ajuga chia, Bugula chia (I).

عشبة معمرة تملو من ١٠ الى ٤٠ سم . أوراقها الجذعية
السفل مستطيلة . عقودها الزهري يمتد على طول الساق .
ازهارها زرقاء اللون . قناباتها صغيرة كثية || ازهارها
يستمر من ايار الى آب .

١٨١٥٠ - عُرُصَف صَوْبَرِي ° كَالِيَطُوس
Ajuga Chamæpitys (S). Bugle peti-pin, Chamæpitys, Ivette (F). Ground pine, Yellow bugle (E).
Gelber Günsel, Ackergemander (D). Bugula ivretica, Campizlo (I).

عشبة حولية تملو نحو ٢٠ سم . أوراقها ثلاثية الشتر المحدثي.
ازهارها صفراء اللون ستلية التجميع || ازهارها يستمر
من نيسان الى تشرين الاول .

١٨١٥١ - عُرُصَف صَوْبَرِي °
Ajuga pyramidalis (S). Bugle pyramidal (F).

عشبة معمرة تملو نحو ٢٥ سم . ساقها مفصلة زياء اللحاء.
أوراقها مستطيلة ، نصلها متصبع الصفحة المابقة
الحضار البحري . ازهارها معقودية التجميع المبري الشكل ،
لونها الى الزرقاء البنفسجية || ازهارها يستمر من نيسان
الى آب .

١٨١٥٢ - عُرُصَم °
Streptosolen (S). Streptosolène (F).

جنس نباتات جنسية زيبينة معمرة من فصيلة الباذنجانيات.
سوقها فواهد تملو من ١٠٠ الى ٣٥٠ سم . أوراقها ابيدة ،
كاملة ، بيضية الشكل ، نصلها غلي البشرة حل صفحتيه .
ازهارها يرتقالية اللون ، حلقية التجميع ، تاجية الارتكاز .
ثمراها جزوية القد ، بيضية الشكل ، مقطوعة القنب ،
لية السوف . يزورها حنسية صغيرة ، رقيقة ، حنطية
اللون || ازهارها يستمر طوال الربيع .

١٨١٥٣ - عُرُصَم °
Sidærodendron (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الفويات . انواها قليلة
العدد منها البلاد الحارة . سوقها فواهد تملو من ١٢ الى
٢٥ م . أوراقها متقابلة اطيحية مستطيلة . ازهارها
معقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، ثمراها حنسية .
اشعاشها ناعمة الرقة ، ثقيلة الوزن ، شديدة الصلابة ،
خرية اللون ، فاعرة الصنف ، تستعمل في الصناعات
الخشبية .

١٨١٥٤ - عُرُصَم °
Lastuda
اللسانة البكائة بين مرقع معين وسط الاستواء .

١٨١٥٥ - عُرُصَم °
Offe, Proposition (F). Offe, Proposal (E).
هو طلب ابرام عقد يتفق مع الشروط المقروضة .

١٨١٥٦ - عُرُصَمِي °
Accidental, Fortuit (F). Incidental, Casual (E).

١٨١٥٧ - عُرُطَب °
هو القطريون الكبير ، اطلبه .



عرصف شياء



عرصن



عرطوس ملتس



عرطون

مستطيلة، رملية، متدلية. اهدابها فلسية، ذرية متقابلة. ثمارها جزوية اللون، عتية الشكل، قطرها نحو ١٠ م. اغشائها صناعية شائعة الاستعمال.

١٨١٦٩ - عَرَبُورُ رَقِيع (F). *Genévrier de Tauride*. هو الزأب، اطلبه.

١٨١٧٠ - عَرَبُورُ مَسِينَة (F). *Genévrier rabine*. هو الايل، اطلبه.

١٨١٧١ - عَرَبُورُ سُورِي * و دَقْرَان

Juniperus drupacea (S). *Genévrier de Syrie*, *G. drupacé* (F). *Syrian juniper* (E). *Syrtscher Wacholder* (D). *Ginepro di Siria* (I).

شجرة وشية الشكل سبروتية مبلولة تملو من مترين الى ٢٠ م. غرايبها وبناتها قصيرة مذاكية. اهدابها تطويل ١٢ الى ٢٥ م. وتعرض من ٣ الى ٥. نصلها بحري الصفحة العليا، اخضر القليل. ثمارها نووية الشكل قطرها نحو ١٥ م. لونها الى الارجواني اللامع المالح اللاح.

١٨١٧٢ - عَرَبُورُ شَالِع *

Juniperus communis (S). *Genévrier commun* (F). *Common Juniper* (E). *Wacholder*, *Mechandelbaum* (D). *Ginepro* (I).

جنية سبروتية ترطب في الارابة الكلسية تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ م. غرايبها فارقة. بناتها اسطوانية. اهدابها خيطية تطويل من ٨ الى ١٥ م. ثمارها عتية الشكل ولقد تلبو متدلية ثم تزد مع الاذلاكي وتتمثل في تطويل حدة مستحضرات منها الكحولية كالجل والليتر وسها الكنسرو كالشوكروت.

١٨١٧٣ - عَرَبُورُ عَال

Juniperus procera (S). *Genévrier élevé*, *G. d'Afrique* (F). *Uganda juniper* (E). *Afrikanischer Wacholder* (D). *Ginepro abissino* (I).

شجرة سبروتية مهدا الحيفة وقد عت زراعتها خطوط حوض البحر المتوسط. ساقها منتصبة فراء تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. غرايبها متدلية. بناتها رباعية التضلع. اهدابها صفية حامدة التسنين. ثمارها مستدرة صغرة قطرها نحو ٥ م. لونها الى الخلفي الاصفر. اغشائها صناعية جيفة الصنف.

١٨١٧٤ - عَرَبُورُ فِيرَجِينَة

Juniperus virginiana (S). *Genévrier de Virginie*, *Cédro de Virginie*, *C. rouge* (F). *Red juniper* (E). *Virginischer Wacholder* (D).

شجرة سبروتية متدلة كثيرة اللق تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. اغشائها انيقة الانتساب. غرايبها رملية. بناتها رباعية التضلع. اهدابها غرزوية الشكل لونها الى الخضار الازرق القمايق يفرح منها عت للسر عوف كويه مسجن. ثمارها ييفية الشكل تطويل نحو ٧ م. وتعرض نحو ٥. لونها الى البسجي المائم. اغشائها صناعية جيفة الصنف حراء اللون.

١٨١٧٥ - عَرَبُورُ فِينِيكِي

Juniperus phoenicea (S). *Genévrier de Phénicie*, *Morven*, *Lydien*, *Sabine maritime* (F). *Phoenician juniper*, *Arabian juniper* (E). *Phönizischer Sadebaum*, *Rotfrüchtiger Wacholder* (D). *Ginepro fico* (I).

شجرة سبروتية صغرة اللق تملو من ٤ الى ٨ امتار.



عرب سورى



عرب شائع

١٨١٦٣ - عَرَبِيَّاتٌ *

Erotylide (S). *Erotylides* (F). *Erotylides* (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة دبوسيات القرون. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية والحارة. اجسامها متباينة اللق والشكل، منها البيضاء والاهليجية والاسطوانية، تطول من ٤ الى ١٦ م. انوثها جيلة الخصاب الزأبي الاسفع الموج. قوتها الاستشارية مؤلفة من ١١ فصلة، الفصل الثالث الاخير دبوسية الشكل. اربابها خامسة النقل. المقلعة الرابعة شديدة الصغر لكاد لا تظهر. اشهر اجناسها العرمول والعنخروت.

١٨١٦٤ - عَرَبُورُ * فِينُورِي

Juniperus (S). *Genévrier*, *Genèvre* (F). *Juniper tree* (E). *Ge-meiner Wacholder* (D). *Ginepro* (I).

جنس نباتات حرجية وزيتونية من السرويات. انواعها عديدة، منها الاجمار والشجيرات والجنات، جميعها ابيدة. بناتها منتصبة لا شمية. اوراقها عتية غرزوية الشكل او سرشبية. اثمارها وسيدة المسكن. ثمارها عتية اللق والشكل، حلوة الطعم، عطرية العرف يستخرج منها بالقطر بعد التخضير قندي مقو ينشط الباه ويغر البول. اغشائها صلبة. عصارتها عتية بخورية سريفة الجفاف. اعرها واشهرها ما يتبع.

١٨١٦٥ - عَرَبُورُ الْبُخُور

Juniperus thurifera (S). *Genévrier à l'encens*, *G. porte-encens* (F). *Incense juniper* (E). *Weihrauchwacholder* (D).

شجرة سبروتية صغرة اللق تملو نحو ٥ امتار. غرايبها منفردة الزوايا. بناتها اسطوانية، اهدابها فلسية ذرية متقابلة، لونها الى الاصفر البحري الاسفع المالح. ثمارها عتية قطرها نحو ١٠ م. لونها الى الزرقاء الختلية. يستخرج منها بالخر مادة عطرية تستعمل استعمال البخور.

١٨١٦٦ - عَرَبُورُ الشَّعَالَة (S). *Juniperus occidentalis*

Genévrier d'Occident (F). *Western juniper*, *Sierra juniper* (E).

شجرة سبروتية تنمش في جميع الارابة والمواقع تملو من ٣ الى ٢٠ م. غرايبها جامدة منتصبة. بناتها اسطوانية. اهدابها ثلاثية الصنف، فلسية، ذرية، يفرح منها عت للسر عوف اغاذ وانثي الرامحة. ثمارها زرقاء اللون، عتية الشكل قطرها نحو ٨ م.

١٨١٦٧ - عَرَبُورُ الصِين

Juniperus chinensis (S). *Genévrier de Chine* (F). *Chinese juniper* (E). *Chinesischer Wacholder* (D). *Ginepro chine* (I).

شجرة سبروتية كبيرة اللق تملو من ١٥ الى ٢٥ م. اجسامها عديدة، اشهرها المذبة والقضية. جميعها زيتونية سريفة النمو. غرايبها جبالسة منفردة. بناتها اسطوانية منتصبة. اهدابها غرزوية ثلاثية التجميع تطويل من ٨ الى ١٢ م. نصلها اخضر اللون، ابيض المختار. ثمارها يتسحبها اللون، طليقة البثرة، ييفية الشكل تطويل نحو ١٠ م. وتعرض نحو ٧.

١٨١٦٨ - عَرَبُورُ خَرُوع

Juniperus flaccida (S). *Genévrier flasque*, *G. pleureur* (F). *Drooping juniper* (E). *Trauerwacholder* (D). *Ginepro piangente* (I).

شجرة منتصبة اللق تملو من ٨ الى ١٠ امتار. غرايبها

ولا شك. وقال أبو حنيفة: إن العرقية أصلها واسع يأخذ قطعة من الأرض تنبت لها قصبان كثيرة بقدر الأصل وليس لها ورق له نكهة إنما هي عيدان دقاق وفي أطرافها زرع يظهر في رؤسها شيء كالشعر أصفر، وهو مثل قعدة الإنسان بيض إذا يبس وله ثمرة صفراء والأبل والقم تآكله ويلبها ويأبسا ويليه شديد الحمرة. فيقال كان غيته غرام عرقية. || والعرق جنس نباتات برية وتزيينة من فصيلة البرديات. أنواعه المعروفة لا تقل من ٢٥ جنسها جنبتات وبجيرات. أصلاتها بلاد الشرق وأروية. سيقان قصيرة معطها حرياط وبعضها شائك. أوراقها بسيطة، كاملة، تصلحاً لمشاربة الحافة، جامدة النسيج، مزينة الصفحات السفلى. أزهارها عديدة الأضدية، صغيرة القد، مستديرة البتلات، نورية التجميع أو فردية. ثمارها نورية تحوي من ٢ إلى ٥ بذور. || أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع:

C. horizontalis	عرقية أفقية
C. frigida	عرقية الثلج
C. Zabeli	عرقية ذابل
C. tomentosa	عرقية زبده
C. melanocarpa	عرقية سوداء الثمر
C. salicifolia	عرقية سورية الورق
C. simoni	عرقية سيموني
C. microphylla	عرقية صغيرة الورق
C. racemifolia	عرقية عنقودية
C. multiflora	عرقية كثيرة الأزهر
C. lucida	عرقية لامعة
C. vulgaris	عرقية مبلولة
C. acuminata	عرقية مدنية
C. disticha	عرقية مزدوجة التصليف
C. rotundifolia	عرقية مستديرة الورق

١٨١٨٧ - **عُرْقُط** *Acacia orfex* (S).
 ١٨١٨٨ - **عُرْقُط** *Acacia Froskoi* (F).
 نوع من السنت وهو جنبة شائكة تملو من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ سم. فروعه سريعة كثيفة منشعبة. أوراقه مركبة، وروقاتها بيضية صغيرة القد خاشية الخضار. أزهاره متخفية التجميع، وزهره صفراء اللون || أصلاته الجزيرة وسانت البلاد العربية. يصلح للزينة ولسياجات. الواحدة عرقطة.

١٨١٨٨ - **عُرْقُط**
 «دوبية لا خير فيها تذكر لغرب أنها لا تبول إلا غفرت ببولها إلى صوب القبلة ولحبات تأكلها» المدبري.

١٨١٨٩ - **عُرْقُط** *Orphie* (F) *Garfish* (E).
 سمكة بحرية تسمى عرقان، أصلها.

١٨١٩٠ - **عُرْق** *Arak*
 شراب مسكر يصنع من كحول العنب مع الانيسون.

١٨١٩١ - **عُرْق** *Sueur, Transpiration* (F).
Sweat, Transpiration (E).
 سائل تنفسه مسام الجسم وتفرزه بعض الغدد الخاصة.

غراسيها متفرجة جامدة. بتلاتها اسطوانية. أهدابها سداسية الصف، غرزية الشكل، كثيفة التجميع، متراكبة. ثمارها عنية، قطرها نحو ١٥ مم. لونها إلى الحمرة اللونية اللامعة || يستخرج منها بالخر أجود أصناف البخور العربي.

١٨١٩٦ - **عُرْقُ كَادِي**
Juniperus oxycedrus (S). *Genévrier oxycedre*, *Oxycedre*, *Cade*, *Cadier* (F). *Prickly cedar*, *Sharp cedar* (S). *Zader Wacholder* (D). *Ginepro ost-cedro* (I).
 شجرة سرورية مبلولة تملو من مترين إلى ثمانية أمتار. غراسيها منتصبة، بتلاتها اسطوانية دقيقة. أهدابها عروية الارتكاز تطول نحو ١٦ مم. نصلها أخضر الصفحة العليا، أبيض السفلى التي يتوسطها خط أخضر. ثمارها جزوية اللون حصى الشكل ولقده || يستخرج من خشبها بالتقطير زيت الكاد وهو دهن أسود اللون شديد اللعالية يستعمل في معالجة الأمراض الجلدية.

١٨١٩٧ - **عُرْقُ كَادِي** *Genièvre* (F). *Juniper-berry* (E)
 هي ثمرة المرمر

١٨١٩٨ - **عُرْق** *Odour* (F). *Odour* (E).
 العرق: الرائحة أو غلبة أو ممتدة وأكثر استعماله في الطبية.

١٨١٩٩ - **عُرْق**، **عُكَاك** *Coutume* (F). *Custome* (E).
 هي المبادئ القانونية المستمدة من التقاليد والعادات.

١٨١٩٠ - **عُرْق** *Criniera* (F). *Mane* (E).
 جناح شعر الساق في الخيل والبغال والحمير.

١٨١٩١ - **عُرْق**
 هو شجر الأترج. ج. عُرْق وأحرف.

١٨١٩٢ - **عُرْقُ الأسد** *Zosma*
 عرق الأسد نجم ثير من كوكبة الأسد الأصفر. ويدعى شميرة الأسد والحزنة.

١٨١٩٣ - **عُرْقُ الدبلك**
 حبة تزيينية تسمى حبة خلية، أصلها.

١٨١٩٤ - **عُرْقُكَا** هي الفصم المصطفة، أصلها.

١٨١٩٥ - **عُرْقُكَا** * *Acrida turrita* (S). *Acrida* (F).
 حشرة كبيرة القد من فصيلة الجراديات. أصلها بلاد الحجاز. تألف المواق الربطة حيث يكثر الشب. الذكر منها يطول من ٣٠ إلى ٤٥ مم. والأنثى من ٥٥ إلى ٧٥ مم. رأسها مخروطي الشكل. زياتها مستعرضة القاعدة مستتقة الطرف. قوائمها مسطبة. ظهورها في الذكر يطول نحو ٤٠ مم. وفي الأنثى ٧٢. قوامها إلى الخضار الموش والمثنى بالمثلي.

١٨١٩٦ - **عُرْقُكَا** * *Cotonéaster* (S). *Cotonéaster*, *Quince leaved medlar*, *Rockspray* (E). *Steinquitze*, *Quitzenmispel*, *Zwergmispel* (D). *Cotogastro*, *Cotonastro* (I).
 جاء في اللسان: «عرب من النبات سهل سريع الانقياد واسخه عرقية. وقيل هو من شجر الصيف وهو لين أخضر له ثمرة عشاء كالحلح. وقال أبو زياد: العرق طيب الريح الخمر إلى الحفرة وله زهرة صفراء وليس له حب



عمر كادي



عرقان



عرق

ساقها فرعاء . أزهارها بيضاء اللون ، جميلة الشكل ، عشوية
التجميع ، ناسبة الارتكاز ، متعصب || أزهارها يستمر
طوال فصل الصيف .



عرق الدم

١٨٢٠٢ - هِرَقُ الذَّهَبِ الْمَغْرِبِي *
Uragoga ipecacuanha, Cephaelis ipecacuanha,
Psychotria ipecacuanha (S). Psychotrie ipecacuane,
Ipecacuanha, Ipeca du Brésil (F). Ipecacuanha (E).
Ipecacuanhapflanzen (D). Ipecacuara (I).

تُعرف من عرق اللّهب وهو عشبة لبّية حشيرة القند تملو
من ٣٠ الى ٤٠ سم. أصلها البلاد الحارة الرّطبة. يستخلص
من جذورها النّليقة ، الحليدية ، البقدية ، مادة قلوية
قابلة تحوي نحو ٢ ٪ من عنصر الاميتين (Emetine)
الشائع الاستعمال الطبي .

١٨٢٠٣ - عرقي السُّوس هو السوس ، اطلبه .

١٨٢٠٤ - عمق السهم، البوي

هو الاسطرناغاليين هرقى السوس ، اطلبه .

١٨٢٠٥ - مرقى التجليل هو المسمى الآخر ، أطلقه

Nerf sciatique (F).
Ischiatic nerve (E).

* ١٨٢٠٧ - مرقى، انجيك *

Potentilla erecta, *P. tormentilla*, *Tormentilla officinalis* (S). *Potentilla tormentilla*, *Tormentilla officinalis* (F). Blood-root, Tormentil, Septfoil (E). Blutwurzfingerkraut (D). *Potentilla tormentilla* (I). نوع من عشبة اقوى وهو نبات شجيري لهي مفلد من فضلية الشليكيات يكثر في الغابات والجراحي. جذائره غليظة اغنية الانتشاب. ساقه قهراء. ازهاره زائدية فردية تاجية، صفراء اللون.

١٨٢٠٨ - عربى مَدَنِي من هداية المدينة ، اطلها

Collet (F). Neck, عِرْقَانَة ، عِرْقَانَة
Collar (E). أرومة الشجرة إلى. تنقسم من الأوراق.

١٨٧١٠ - عرقلة
Filaria (F). Filaria (E).
هي الهداية ، اطلبها . اما العرقلة فهي تسمية الدكتور
حبيب صاندر .

453-9 = 18211

Sciophila (S). ١٨٢١٢ - عَرُكُصْ
Sciophila (F). Sciophila (E).

جنس حشرات من فصيلة القمصيات ورتبة ذوات الجناحين.
انتمائها المرفقة نحو ١٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد
المعتدلة الجغرافية | أجسامها صغيرة ، نحيلة ، تطول من
١.٦ مل. رؤوسها صلبة ، شبه مزنازية صغيرة ،
عيونها صغيرة ، متباعدة عن الفكين . قرونها الاستعمارية
خفيفة مركبة من ١١ فصلة . سلاسلها رداية العقول
رأسها غشائية . كركسها بيضيه . قوتها مزنازية .
ملونه . رانها غشائية الخصب . قوتها مزنازية .
والخلفية مهدبة الطرية . بجزة متعاض ذرية || تألف
النابت والمواقع القريبة . اسامها غنابة أو عارودة توش
تحت علم الانحمار أو علم القطر .

١٨٢١٣ - عَرَقَمُونْ هو جلهم الحيشة ، اطلبه

١٨٩٢ - عِرْق ، وَتِين ، وَرِيد ، وَدَج
Veine (F). Vein (E).
عضو وراثي من اعضاء الجهاز الدوري في الجسم .

Nervure (F). Nervure, Nerve (E). عِرْق - ١٨١٩٣
عضو وهائي ثانوي من أعضاء الجهاز التنويري النباتي
مركزه الرئيسي في فصل الورقة ينشعب من ضلعها -

١٨١٩٤ - عراقي - من العراق ، ايطاليا

Veine blanche (F). عرق أبيض
White veins (E).

وصم وشتم الموابب الاقتصادية تسببه حشرات التريس
والغزير يد التي تركب أوراق التبغ تنفضط الخفيف وتغص
حصارة الخلايا والفسح الناضج ولا تترك على نتيج العمل
بمحاذاة الضلع والقوق والترايين سوى الألفا غلوية
جامعة مبنوة لا مثابة عنها تحمينا من حيث الأمراض
القطرية ولا طاقه حذوها تمنحها من مثابة نفاها
الجويي [كفاف حذو الرعم بالقضاء على الحشرة التي
تسببه ذلك نور ظهورها على الأوراق. راجع تريس التبغ.

١٨١٩٦ - هرق أبئس
هو الجزر الأبيض ، اطلب .

١٨١٩٧ - عرق اکٺور هو عود الوج ، اطلبه .

١٨١٩٨ - عرق الحلاوة
من الصابونية الخفيفة ، اطالما

١٨٩٩ - عِرْقُ الدَّمِ * ، دَمَوِيَّة
Sanguinaria canadensis (S). Sanguinaire du Canada
(F). Blood-root, Red puccoon, Blood-wort (E). Kan-
adisches Blutkraut (D). Sanguinaria del Canada (I).

لغات عشية جمهوري مصر وساحة المجلس والتوسع من
فضيلة الاختصاصات. جديده غلظه عقيدة مدادة غزيرة
الصناعة الحديثة الحمراء اللون. اوراقه فردية كتشيب
متد كل عقدة يعلوها شراخ. وفي معقده، خلية، خلية،
او سداسية الفصوص المسننة الخواقة؛ تنصلها الى الخفاص
البحري يعلوه مروج اخر. جارجية الزهرية تملو نحو
١٥ سم. وهي فردية الازفة التي تتألف من ٨ نفاثات الى
١٦ فصيلة الشكل بياض اللون (١٢ انزارة و٨ من انزالات
ايار. وهو من النباتات الصناعية الطبية والزيوتية وذلك
لإستمراره الدهنية تستعمل في سباح الإقف لان جميع
اجزائه من الجلسون والفرارة تستعمل طبيا ككبر
عظم.

١٨٢٠ - عربى الذهبى
Psychotria (S), Psychotria, Psychotria (F), Psychotria (F), Breckkraut, Breckpflanze (D), Piscotia (I).
جنس نباتات برية من فصيلة الفويات اصلها اى بلاد
الحارة. انواعها عديدة مجتمعة كائنات وحيوانات منتسبة
الى السوط. اوراقها متعاقبة مجتمعة كائنة. ازهارها عقديوي
الجمع او تاجية الانكسار. ثمارها عشية جلدية وباقية
له نوعان مشهوران واحد طبي واخر زينة.

١٨٧٠١ - عِرْقُ الذَّهَبِ الْأَبْيَضُ الزَّهْرُ
Psychotria leucocephala (S). *Psychotria leucocephala* (F).
 نوع من عرق الذهب وهو جنبة معمرة تعلو نحو ١٥٠ سم



عرق الذهب الحزني



صرف انجبار

فردية التجميع ، أبيلية الارتكاز || اعرف انواعه واشهرها المرقون الحزني .

١٨٢٢٢ - عُرْفُونٌ مَعْرِفَنِي * Euphrasia officinalis (S). Euphrasia, Common eye bright (E). Echter Augengrost (D). Eufrasia, Spezza occhiali, Luminella (I).

نوع من العرفون وهو نبات عشبي يري حولي شبه طفيل لانه يركب بجذوره جنود النباتات الاخرى || اقلبه حوض البحر المتوسط ، اوراقه صغيرة لثقة متعاقبة لصلها مشاربي الحافة متعطف التسين . ازهاره وردية اللون . اوراقه وازهاره تنطق الورد وجع التهابات العين .

١٨٢٢٣ - عُرْقِيل
Jaune d'oeuf (F).
Yolk of an egg (E).
هو صفار البيض .

١٨٢٢٤ - عُرْم
Œufs de gangas (F).
Eggs of the Pin-tailed grouse (E).
المرم : ييش القطا .

١٨٢٢٥ - عُرْمٌ ، قَارَصٌ ، أُصِير يَأَسِير
Carissa (S). Carisse (F). Carandas plum (E). Carisse (D). Carissa (I).
جنية معمرة برية طيبة من سبط المرميات وفصيلة القنطاريات . اصطناعها الهند وبيض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية . ساقها فراء . فروصها سرعية شائكة . اوراقها سائفة متعاقبة . ازهارها حشوية التجميع ، محورية وتاجية الارتكاز ، بيضاء اللون || ازهارها ديمية يستمر من ايار الى تموز .

١٨٢٢٦ - عُرْمَاضٌ ، عُرْمَضُ
طحلب كانه نسيج العنكبوت . واللفظ الاخضر الذي ينتفي الماء .

١٨٢٢٧ - عُرْمَةٌ *
Georychus (S). Géoryque (F).
جلس حيوان من فصيلة اللخديات . اولهاه ثمانية . اجسامها اسطوانية الشكل تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . اوتارها الى السرة . وروصها مستديرة ، قفاهها مقطوعة . قوتها خرزوية . اذنانها لا قوية ، قوتها قصيرة . اظافيرها قوية ، اذنانها حصل شعر تملو جذاع || اناها تقص من جبرون الى ارجفة . تألف الهام والاراضي الرملية الشجرية . اجسامها متوسطة المق . انفاقها طويلة متعرجة كثيرة الفوه ، قوتها جلود ولها وشكير النبات .

١٨٢٢٨ - عُرْمَةٌ ، عُرْمَةٌ
Meule (F). Stack (E).
الكس من الحصيد يرم ويحفظ رويلا يدرس .

١٨٢٢٩ - عُرْمَصُ
Salpichroa (S).
Salpichroa, Œuf de coq (F).
جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة الباذجانيات . انواعه عديدة جميعها سرورية . سوقها فراء تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . فروصها سرعية . اوراقها اطلبية مستديرة القاعدة ، صغيرة لثقة ؛ نصلها نامج التسيج ، خلج المجلس جميل الخضار . ازهارها محورية الارتكاز ، جليجية الشكل ، بيضاء اللون . ثمارها جوزية الشكل والقد ، لية السوداء ، فراء اللون .

١٨٢٣٠ - عُرْمَضُ
المرص : كل حجر لا يمش ابدأ .

١٨٢١٤ - عُرْمُصِيَّات *
Scrophillidae (S).
Scrophillidae (F). Scrophillidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المرموقة عديدة منتشرة في سبط اقطار العالم || اجسامها متفاوتة القد ، تطول من ٤ الى ١٦ سم . وروصها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . صيوتها صغيرة ، متباعدة عند التسين . قوتها الاستعمارية خيطة ، مركبة من ١١ صلة . مرادفها وبلاسها متدلة الطول . قوتها الخلفية مستقيمة الافخاذ || تألف الرياض والغابات والحراج . يرقاسها تدبش على الاشجار النخرة وتحت القشور || اشهر اجناسها المرمص والميكوبية والية .

١٨٢١٥ - عُرْمُطٌ مَعْرِج *
Oreolia cristata (S).
Oreolia huppé (F).
طائر وحيد الجنس والذعر من فصيلة المرمديات ورتبة الجروم سنات المنقار . يملك اذنايات والاحراج . ملجته انمائي جامي . جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات والثمار القبانة واليزور || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٢ سم . ثوبه جميل الالوان المتداخلة . رأسه معتدل الجرم المنس الخضر الامغم ، تملو ، عند الذكر ، قزعة شراعية الشكل حيلة اشجار اللهب . رفاقه وجناحه وذنبه الى الخضر الامس يملو مواج يراوح بين الشبهة والثرقة . زوره الى الياس العاجي . امل صدره الى الحمرة الجوزية . يعل الى الصفرة يملو مواج يراوح بين الشبهة والخضرة || يطن عنه في الادخال المستعمية . الاثني تحسن بملاوة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات .

١٨٢١٦ - عُرْمُوبُ
Jarrez (F). Hough, Hock (E).
عنصر من امضاء القوام في الدواب وهو ما ضم ملش الساق والرقب من مؤخرها .

١٨٢١٧ - عُرْمُوبُ الرَّمِي
Arkeb
عربوب الرامي كركب نثر من برج الرامي . مركزه على الساق اليسرى وهو الاوله من المرمدين .

١٨٢١٨ - عُرْمُوبُ القَطَا
ساقها . وهو ما يبالغ به في القص يقال يوم اقصر من عربوب القطا .

١٨٢١٩ - عُرْمُوكَةٌ
المرقوقة نجان متعشان من كوكبة القوس الاعظم .

١٨٢٢٠ - عُرْمُوكُلُ
Duchesnea (S). Duchesnéa (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الورديات . انواعه قليلة العدد جميعا قريبة الشبه من الشبلك . سوقها مدادة تطول من ٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها متعطف مستطيلة المائلق ، نصلها مفصص الضفحة . ازهارها الى الصفرة اللحية . ثمارها جوزية التركيب ، شليكية القد والشكل ، حراء اللون ، مأكولة ، لكنها عادمة النكهة والرق .

١٨٢٢١ - عُرْمُوكُلُ *
Euphrasia (S). Euphrasia (F).
جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة الخنازيريات . انواعه نحو ٢٠ منظرها من امشاب المناطق الحارة . اوراقها صغيرة متعاقبة سنت الحافة . ازهارها



عُرْمُطٌ مَعْرِج



عُرْمُونٌ



عُرْمُونٌ غُرْنِي



عُرْمَةٌ



عرد



عرد النثم



عرون



عروسة



عروسة الترامس

١٨٢٤٠ - عُرُوسٌ *
Epi de maïs (F).
Maize head, Maize ear (E).
عور اسطواني الشكل غليظ القدر تتركز سوله على صفوف متناوبة حبوب القذرة الصفراء .

١٨٢٤١ - عُرُوسَةٌ *، عَرَّيَ الحُوتِ
Cilo (S). Cilo (E).
جنس دوبيات بحرية من الرخويات مجتمعات الازبل وفضيلة المرصيات . انبواها المرفقة عشرة منتشرة في المحيط الاطلسي والمحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط || ملجئها الحيائي بجاني . اسرايسا تند بضعة ملايين || اجسامها صغيرة عادمة اللثاف الصلبي شبه وشية الشكل تطول من ٢ الى ٤ سم . افواها حلقة بزرالده غروبية نابضة . زانفها زويية منتصب في الفت . انواها عديدة منها الازرق والبنيجي والجذوي والاحمر || الحياتن تتدح اسرايسا وتلقها بشرامة .

١٨٢٤٢ - عُرُوسِيَّاتُ *
Clonidae (S). Clidées, Clonidées (F). Clonidées (E).
فضيلة دوبيات بحرية من الرخويات مجتمعات الازبل مريانات . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || تتميز باجسامها الصغيرة القشة وشية الشكل وبملامها الهجبة الاطراف وبخلها من اللثاف الصلبي || اشهر اجناسها المرزوة .

١٨٢٤٣ - عُرُوسُومُ ، عُرُوسُونُ
Champignon (F). Mushroom, Fungus (E).
هو كل فطر تام الخلفة بين الساق والكمكة .

١٨٢٤٤ - عُرُوسَةٌ
Pérenne (F). Perennial (E).
صفة نباتات المعمر . وقد تستعمل يعني المسخرة الانضغار في النبات الذي لا ينضج للاصلاح لزمني المويوت . ضعا بالمضى الاول حولي . وبالمضى الثاني حابل وناضف ونيفش .

١٨٢٤٥ - عُرُوسُ الماء
Naiade, Nais (F). Naiad, Water-nymph (E).
جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . افواها المرفقة ١٠ جميعها من نباتات المياه العذبة . سوتها منشبة قصفة . اوراقها رقيقة شائعة . انماها ثنائية الشكل ، ابطية الارتكاز ، فردية التجميع . الكثرية منها قواها مدادة والاثوية مبيض || يبي من نباتات القمرودية في المساك الاستوائية لانها تدخل في فدا . بعض الاصاك انصها الشوط .

١٨٢٤٦ - عُرُوسُ الثيلِ هو لوسى الثيل ، اطليه .
١٨٢٤٧ - عُرُوسَةُ البَحْرِ هي السحل المنطع ، اطليه .

١٨٢٤٨ - عُرُوسَةُ الْقَرَّاصِ *

Eurrhynce urtica (S). Eurrhynce de l'ortie, Teigne des orties (F). Eurrhynce urtica (E).
حشرة مزوقة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنسة . موطنها بعض اقاليم البلاد المصدلة الحارة من الشرق الاوسط ولروبية . فراشها واشنة قويا رقيق الازداد . غاضلة تركب اوراق القراص والشعيرات اربعة والزراعية تقتل الارواك وتقم في داخلها || جسمها بطول ١٠ م. ١٢ م. بطولها تراوح من ٣٠ الى ٢٤ م. رأسها صغير الحجم . قصر الخلم . عينها زيتيان . صغيرتان .

١٨٢٣١ - عُرُوسِيَّشُ
Rafle (F). Grape-stalk (E).
المروش والممشوش هو المتدثر انتزع عنه .

١٨٢٣٢ - عُرُوسُوطُ
Congre commun (F).
سمكة بحرية تسمى زرقية مبلولة ، اطلبها .

١٨٢٣٣ - عُرُوسِيَّاتُ
Carissées (F).
سبط من فصيلة العذليات يشمل بعض الاجناس والانواع جميعها جنبا وجنبات وشجيات فروع شائكة ، اشهرها الهرم .

١٨٢٣٤ - عُرُونُ
Forme cartilagineuse (F).
شكل من الزبدات وهو انتفاخ عظمي قاسي يمتري المنفعة الجائية من اطرة الحافر .

١٨٢٣٥ - عُرُونُ * ، سَلَّةُ زَرَاعِيَّةٌ ، سُنْفُونُ
Onobrychis sativa (S). Sainfoin cultivé, Esparcette, Bourgogne (F). Sainfoin, Holy clover, French grass (E). Echte Esparcette, Hannekammkress (D). Sano-fieno, Sedragola, Crocetta (I).
نبات عشبي علني معمر من فصيلة القنريات القرارية . جلدوره وتدية قوية تنور في الارض من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . سوله مخينة جولة تطول من ٥٠ الى ٧٥ سم . اوراقه متعاقبة مركبة ، وريقاتها بيضية الشكل كثيرة العدد . انجاده سنبلية التجميع ، محورية الارتكاز او تاجية ، مستطيلة الزناد ، ودية اللوي ، مستحبة العرف ، مشرفة الرسيق يحرسها النحل . ثماره زور مفلحة خطية اللوي ، بارزة الزراكش ، عبيبة الاطراف ، لا تحافظ على طاقها الابتائية اكثر من سنتين || وهو من نباتات التي تجود في جميع الاثرية ولا تحصى سوى الرملية الماعدة الانتماع .

علفه لغير الماشاة ، جيد الصنف ، يحسن اللحم ويزيد فيه نسبة البنية .
١٨٢٣٦ - عُرُونُ القَتَنِ * ، سَلَّةُ عَرِفِ النديك ، سن العجوز
Onobrychis cristagalli (S). Sainfoin crête de coq, Hérisson (F). Cock's head, Medick vetch (E). Hahnenkamm (D). Cresta di gallo (I).
نوع آخر من العرون وهو من نباتات العلفية المحلية التي تحتش مرة واحدة . ساقها الظرية مدبرة قلند ، حربية الشكل ، مستطيلة الزناد ، يزود حنلية اللوي العباب ، كثيرة التماريع والزراكش القاترة || يجود في جميع الاثرية ولا يحصى الزراعة العلية .

١٨٢٣٧ - عُرُنَّاسُ ، عُرُنَّاسُ
طائر كالحامة لا تقهر به حتى يطير من تحت تمسك فيفزمك . هو انتقاز ، اطليه .

١٨٢٣٨ - عُرُنَّاسِيَّاتُ
Cracidae (S). Cracidés (F). Cracidae (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات ، اجناسها خمسة طيرها تنتمو الى الجئة ، مستطيلة الشكل ، قوية المتقار الاجسن ، قزعية الرأس ، مسخرة الاجنسة ، مستطيلة الذيل . اجناسها المشهورة ثلاثة انتقاز واغزان واشكس .

١٨٢٣٩ - عُرُنَّكَّةُ *
Tétozisme (F). Telocism (E).
المرنة حالة الصلابة وسداها في العضو الفيجاج .

١٨٢٥٦ - عُرْيَانُ السَّيْحِ

Gymnogyne (F).
Gymnogynous (E).
نمت ترميفي يطلق في علم النبات على كل زهرة عريانة للبيض .

١٨٢٥٧ - عُرْيَانَاتُ ٥

Pterotracheidae (S).
Pterotracheidae (F).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مَيْمَةٌ ، اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || معظم انواعها عديم الصفات والقليل منها يحمل امصدافاً لتلصق الاشياء || اعرف اجناسها واشهرها المرابانة والشفارة والفردولة والنبلية .

١٨٢٥٨ - عُرْيَانَاتُ الْأَسْكَانِ

Gymnodontes
مربية اسماك من الطليات تنقص الى رتبة ملحويات الفك . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة تجمعها فصليات الفصحيات والفطقيات .

١٨٢٥٩ - عُرْيَانَاتُ الْبُورُورِ

Gymnospermes (F).
Gymnosperms (E).
اسم قلمي باديات الزهر في النبات .

١٨٢٦٠ - عُرْيَانَاتُ الْخَيْشُومِ

Nudibranches (F).
Nudibranchiates (E).
صف حيوانات من الرخويات المدلية .

١٨٢٦١ - عُرْيَانَةٌ ٥

Pterotrachea (S).
Pterotrachée, Firole (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل وفصيلة المرابانات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة ، يكثر وجودها في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اجناسها عريانة مستطيلة هلامية شفافة تنتهي باذناب متعاقبة الطويل دقيقة الاطراف . زعانفها صغيرة وقرية التجميع . افواهها خطبية . خياشيمها قريبة الانقسام تلاصق القلوب في مجموعة واحدة مركزها تحت البطن .

١٨٢٦٢ - عُرْيَانَةٌ كَيْسُ الْبُرْقِ

Gymnosporange
هي الفطور الطليقية التي لا ينفذ اكياس بعضها ششاء او لحاف .

١٨٢٦٣ - عُرْيَانَةٌ ٥

Imperata (S). Impératè (F).
جنس نباتات عشبية ، مبرية ، مرغوة ، من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم || جميع انواعها عشبية . عصفها ضيق ، تنمو الطول . سنبليها مركبة ، صغيرة .

١٨٢٦٤ - عُرْيَانٌ ٥

Ctenolabrus (S).
Céanolabre (F). Ctenolabrus (E).
جنس اسماك بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة الكيديات انواعها المعروفة قليلة . جميعها صغيرة القد . اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة والباردة . ومنها نوعان مسرهما البحر الابيض المتوسط .

١٨٢٦٥ - عُرْيَانٌ سَوْتِي

Ctenolabrus Iris (S).
Céanolabre Iris (F). Ctenolabrus Iris (E).
سمكة من العريس اعطائها بعض مناطق البحر الابيض

زبانها عيطيان . لمساحها دقيقان . مرفقها معتدل الجرم . جوشها ونبها الى اليمين الموج || رواشها الى اليمين العاجي يعطو تقيج وزركشة متعاقبة الاربد والاصفر والاحمر القفي || لها جبل واحد في الحبل . تظهر القرافة في اباد وتقيج حتى آب . تسرح في النهار || الانثى تنح للمكن مباحداً على الصفحات العليا من مصال الارواق || الفطور الاسروي يستمر نحو ٢٨ يوماً ولسنة مت بلوغها الاذكاء تمام طول من ١٢ الى ١٤ م . جسمها اسطواني الشكل ، اغبر اللون ، اسمر الموج ، تملوه ثلاثة صفوف قاذبة من الحلب القصير رأسها جوي اللون . رواشها البنية مجهزة بكلايب صغيرة حادة الاطراف || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلبة متينة الحلب تسحب السرعة بين طيات الارواق المفتوحة .

١٨٢٦٩ - عُرُوقُ الصَّبَاغِينَ ٥ ، عُرُوقُ صَفَرٍ ، بَلَكَةُ الْخَطَايِفِ ، مِيرَانٌ

Chelidonium majus (S). Grande chélidoine, Eclairé, Herbe aux hirondelles (F). Celandine, Swallow-wort, Greater celandine (E). Gemeine Schellkraut, Schellkraut (D). Chelidonia majus, Celandine, Erba nocta (I).

نبات عشبي بري مدمر من فصيلة الخشخاشيات . اوراقه مركبة مفردة بحرية اللون . ازهاره كبيرة اللد ، طويلة الزناد ، لونها الى الصفار الزاهي || يكثر وجوده قرب البيوت الريفية وفي السياجات . صصارته لينة كايوة صفراء اللون تقضي على القليل . يهبط من اوراقه عند فركها رائحة لازمة تأخذ بالانف والحلق . ويستخرج منه صباغ اصفر مرغوب فيه .

١٨٢٥٠ - عُرْيَانَاتُ ٥

Graphiolaceae (S).
Graphiolacées (F).
فصيلة الفطور العزمية من رتبة التعاليات . تتميز بعضها الرسيد الخلية ، اما بعضها فتتألف الجيلة شفي الانقسام .

١٨٢٥١ - عُرْيَانَاتُ ٥

Inermæ (F). Thornless (E).
نمت ترميفي توصف به الاحياء النباتية العادمة الشوك والرشب .

١٨٢٥٢ - عُرْيَانُ الْجَيْمِ

Gymnosome (F).
Gymnosomate (E).
نمت ترميفي يطلق في علم الحيوان على كل جسم عديم الكساء .

١٨٢٥٣ - عُرْيَانُ الْجِلْدِ

Gymnodermate.
Gymnoderme (F). Gymnodermosus (E).
نمت ترميفي يطلق في علم الاحياء على كل حيوان مكشوف الجلد .

١٨٢٥٤ - عُرْيَانُ اللَّذْيَلِ

Gymnure (F).
نمت ترميفي يطلق في علم الحيوان على كل ذيل عديم الورب او الحلب او الحراشف .

١٨٢٥٥ - عُرْيَانُ السَّاقِ

Gymnocaulis (F).
Gymnocaulous (E).
نمت ترميفي يطلق في علم النبات على كل ساق عادمة الارواق .



هروق الصباغين

18771 - عُرَيْبَةٌ * Anarrichus lupus (S).

Anarrichus, An. lup (F).

سمكة بحرية يعيش من شائكيات الزئبقان وصيلة البحريرات. موطنها المناطق الباردة والمعتدلة الحارة من المحيط الاطلسي. قلياً تقترب من الجحاح. اسرابها متوسطة العدد || جسمها شبه اهليجي الشكل، كبير القند، وطول نحو ١٤٠ سم. رأسها انطس. شفتها رطب الانفراج. اسنانها كبيرة بجادة الاطراف. عنانها صغيرتان ماصتان. جلدها عديم السهف يحجب السطح. زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة. زعنفتها الذيلية صغيرة مدببة الطرف || ثوبها الى الخضر البحري القاتم يميلو تجلج معترض اسر تشد سمرة في الرأس وأعلى الظهر || لحمها جيد الصنف ويطبخا مدغوب فيه.

18777 - عُرَيْنٌ Anre du lion (F). Lion's den (E).

الرين والعريفة : مأوى الاسد.

18778 - عُرَافٌ * Euphonia (S).

Euphonia (F). Euphonia (S).

جنس طير من فصيلة الترنيرات. انواعه المعروفة نحو ٢٤. جسمها من طيور امريكة الوسط والجنوبية. تألف القابات والحراج. نظامها الحيائي بحلي. اسرابها متطاوعة العدد || اجسامها صغيرة القند، عياله، فطول من ١٢ الى ١٦ سم. مثليتها غروبية صغيرة. اجنتها معتدلة الجسم. انثاهي متوسطة القند، مقطوعة الاطراف. اسرافها دقيقة. اصابعها صغيرة. اولياها بجلة الاوران الساطعة يكثر فيها الازرق والاصفر || تمييز بكترة قفريها المستحب الانعام. جميعها تعيش في الغار الشجر والبيادر. اخلاقتها رضية. معط انواعها يألف القفص ويحب التقرب || تدفن احشائها في الاشجار الفتاه المعتدلة الارتفاع من سطح التربة. انثاهي تقنع من ٤ الى ٨ بيضات تحضنها بتناوبة الذكور نحو ١٤ يوماً.

18779 - عُرَاقٌ * Esacus (S). Esacus (F).

طائر من طوال الساق وفصيلة الزرقائيات. يتميز بصفته وبسرعة حده. موطنه مناطق الهند والافانك ويران. يألف المتاعق والقيمان ويصاف الجاه وكثبان لربل. ملجئه الحيائي بحلي. جوامعته قليلة العدد. قوته الحشرات والديدان والقماعيس || جسمه بطول نحو ٢٨ سم. يتميز بكبر مقفاده المركب من جزئين، جزء صفوري يتد من القاعقة حتى ثلثي المتفاد ويبرز قرني يكون الثلث الاخير. جناحه ذات الطرف يلسف الذنب. ذنبه غروبي الشكل، قصير. ثوبه العلوي الى الوردية السمر، يميلو مزاج اسيد. رأسه اشد سمرة من رده. عنانها مقلتان بخط ابيض يمتد كالجابج حتى القفن. زورده واظفك الى القبرة. مدونه وبلته الى الشبهة. مقفاده وساقه الى الكهبة السمر.

18780 - عُرَاقَان Rectrices caudales (F).

Caudal tail-feathers (E).

المزلاقان : الريشتان التان في طرف ذنب العقاب.

18781 - عُرَاقٌ هو الايروس البطر، اطله.

18782 - عُرَيْبَةٌ Ferme (F). Farm (E).

القرية كلمة مصرية ترادف مزرعة. والقرية هي كل ارض زراعية موصوفة المحفود يستقمرها صاحبها او يؤجرها بقدر.

المتموسط اخصها المناطق الثيالية || جسمها صغير القند بطول نحو ١٣ سم. ثوبها الى الحمرية الزاهية. زعنفتها سود || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

18776 - عُرَيْشٌ صَخْرِيٌّ * Ctenolabrus

rupestris (S). Ctenolabrus des rochers, Ronqué (F).

Ctenolabrus rupestris (E).

سمكة بحرية يعيش من الراس. اصلها من سطر التاليم البحر الابيض المتوسط. سرجهها حشاش الجاحد والتفاف || جسمها اهليجي الشكل. معدن التبطيط، بطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى الصبهة الوردية يميلو مزاج اخضر ومشرع غسوط متطيلة قاطبة. رأسها غروبي الشكل، مدبب انطس. فكاهها صغيرتان. شفتها قليل الانفراج. عنانها كيرتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة الشكل، لامتساوية الارتفاع. زعنفتها الذيلية مقطوعة الطرف || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

18777 - عُرَيْشٌ الْأُرْدَاكِي Platyphylle (F).

Platyphylous (E).

18778 - عُرَيْشٌ الْبِتْلَات Platyptéle (F).

Platypetulous (E).

18779 - عُرَيْشَات Plathelminthes, Placodes.

Vers plats (F). Platyhelminthes (E).

شعبة الديدان الراض. تشمل ثلاث رتب: التريليات والمثقبات والمهزئات.

18770 - عُرَيْبَةٌ، مَعْرُوش Péction (F).

Pestion (E).

كتاب يرفع الى السلطات العامة يعرض فيه رأياً او طلباً او شكوى.

18771 - عُرَيْبَةٌ الْمَدَكَة Platygnathra (F).

جلس سحرات مفيدة من قشائيات الاجنحة تعيش يرقاتها حل اسارع بعض الحشرات المفرة تنسها.

18772 - عُرَيْبَةٌ * Testacelle (F). Snail-slug (E).

تدعي في لبنان ويزا قريمان و جنس دوبيات من فصيلة الميريطيات. انواعها قليلة العدد، اصلها حوض البحر المتوسط. وهي من الدوبيات النافعة المفترسة التي تلهم الديدان على اختلاف انواعها.

18773 - عُرَيْبَتَان Testacellidae (S).

Testacellidae (E).

فصيلة دوبيات من الرضويات المدميات الارجل الرئوية الشبثانية. اجسامها وانواعها عديدة. اشهرها المعربة.

18774 - عُرَيْبُ الْمُرُوج هو الساهر، اطله.

18775 - عُرَيْبَةٌ * عُرَيْبَةٌ عُرَيْبَتَان

Platycerus (S). Platycère (F).

جنس سحرات كبيرة القند من مدميات الاجنحة. انواعها عديدة، اصلها اسراج البلاد المعتدلة الحارة. اجسامها غليظة، قرونها الاستشادية صفحية الشكل، اولها الى السواد الباهم الاسفح الملوحي || يرقاتها تتركب اوراق الاشجار الحرجية تنسها.



عُرَيْشٌ صَخْرِيٌّ



عُرَيْبَةٌ



عُرَيْبَةٌ



عُرَاقٌ



عُرَاقَان



عُرَاقٌ

يألف الثنايات ويقترّب من الاماكن الآهلة ولا يتعدى على الانسان. ملجته الحياقي زوجي || جسمه ابيض اللون ورشيها ، يطول نحو ١٧٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٩٠ سم. رأسه صغير الحجم. اخذاه صغيرتان ، صغيرتان. عيناها صغيرتان. سباله كثيفة مستطيلة. فترته قصيرة الثوب. ثوبه الى الصخرة الحمراء المواجه يمين في الظهر ويذهب في الصدر والبطن. ويجعل غدة ادرية المركز تفرز مادة كبريتية الرائحة. الانثى تضع ثوباً من الذكر || يتسلق الاشجار غنقة ويهدم على الارض بسرعة. قوته الطير والمناظر وكل ما استطاع اليه من الحيوان.

١٨٢٩٨ - عسّاكة كبيرة *

Leucospis gigas (S). *Leucospis géant* (F). حشرة من العساكيات كبيرة القند. موطنها بعض اقطار البلاد الحارة والمشمخة نحو المعتدلة || جسمها مستطيل الشكل ، مثل الجوشن ، يطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى السواد اللامع تملو خطوط عريضة صفراء كاربينية المواج رأسها شبه مخروطي الشكل. زباناها خيطيان. قوائمها مستطيلة. سكتة الثنايب. اجنحتها غشائية ، ضيقة ، قليلة المروق والاصاص. اشترتها مستطيلة ، منقطة تسفر عند الاستراحة في اخدود يقطب الظهر حتى الجوشن || تنطفل على الزنايب والزرايط قرّر اشترتها في جهل الخشاء مها كان صلباً ومثنت المكن في البدا وعليها.

١٨٢٩٩ - عسّاكيات *

Leucospidae (S). *Leucospidae* (F). فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة. انواعها عديدة جميعها نافعة تنطفل على الحشرات الضارة من ذوات الجناحين || حشرات متوسطة القند وكبيرة تطول من ٧ الى ١٥ سم. اجسامها غشيمة ملونة ، رؤوسها مخروطية. زباناها خيطية. قوائمها طويلة. سكتة الثنايب. مرزاتها مستطيلة ، حادة منقطة نحو الظهر عند الاستراحة || اشهر انواعها العسّاكة الكبيرة.

١٨٣٠٠ - عسّاكة * هي غشاية النحل ، اطلها .

١٨٣٠١ - عسّاكة *

Morphogenèse (F). *Morphogenesis* (E). العسامة مجموعة للنوايس التي تتحد وتتحكم شكل النج والاضواء في كل جسم حي منذ ابتداء تطويرة.

١٨٣٠٢ - عسّب * هو الاربوس العطر ، اطلها .

١٨٣٠٣ - عسّب *

Sperme du chameau (F). *Sperm of the camel* (E). شلخ النحل من الابل .

١٨٣٠٤ - عسّب * عسّب *

هو في النبات القدر الذي يتحمل بجميع صفات الضرب المثالية المطلوبة .

١٨٣٠٥ - عسبار * ، عسبارة *

Proteles cristatus (S). *Protète à crête*, *Loup fous-seur* (F). *Aard-wolf* (E).

حيوان من اللوامس ويحيد الجنس والذكور يشبه الضبع المخذعة لكنه اصغر منها جثة واثق ثوباً وأخشن صوفاً. اعطاه البلاد الافريقية ، يسرح في الليل ، قوته الجيف وكل ما استطاع اليه سبيلاً من صابر الحيوان والطير .

١٨٢٩٣ - عزّة - Bichette (F).

Little hind, *Young hind* (E). هي بنت الظبية حتى افرقتها عن امها .

١٨٢٩٤ - عزّور * عزّور *

الزور واليزور : هو ثمن الكلا به الحصيد. تقول : حل اخذت حيزر هذا الحصيد اي حل اخذت ثمن مرادها .

١٨٢٩٥ - عزّور * Tercio compacta (F).

Compact soil (E). التمرز : الارض القليلة البريمة الليل .

١٨٢٩٦ - عزّوف * هو الحمام الطوراني ، اطلها .

١٨٢٩٧ - عزّوق * Sarcage (F). Weeding (E).

سرت القشرة الطبيعية من القرية بالمزق الآلي او اليدوي وذلك لتنظيف التربة باقتلاع الاصشاب الضارة ولتخريب انابيب الاستلاب نمناً لتبشر الماء .

١٨٢٩٨ - عزّوك * Isolement (F).

Separately, *isolation* (E). فصل الحيوان المريض عن السليم .

١٨٢٩٩ - عزّوك من الروصاية Destitution de la tutele (F). Dismissal of the tute-lage (E).

تجريد الوصي من مهمة الروصاية التي استندت اليه .

١٨٢٩٠ - عزّومكة * Energide (F). Energid (E).

الزومة محيط غليوي يشتمل على نواة ومنطقة زكينة تنتمل بتوجيهها .

١٨٢٩١ - عزّويل * Pigeon mâle (F). Pigeon male (E).

الزويل واليزيل : الذكر من الحمام .

١٨٢٩٢ - عزّو * Imputabilité (F). Imputability (E).

هو القول بان فلاناً فعل فلهة معينة مادياً وادبياً .

١٨٢٩٣ - عزّوق * هو الزوق : حل القسق المادم للاب وهو دياخ .

١٨٢٩٤ - عزّيب * Dose

راجع شعة وجبرمة .

١٨٢٩٥ - عزّيزاء * هي الجشنة ، اطلها .

١٨٢٩٦ - عزّيم * Azimus (S). Azime (F).

جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الثنايات. انزاهه المعروفة عديدة منها المناطق الاستوائية من البلاد الاسيوية والافريقية || سيقانها سريعة او ملتفة . اوراقها منقطة ، متعاقبة . نضالها اعطليجية الشكل ، جميلة الخضار اللامس . انزهارها ابيض وهامس الارزكاسز ، عشقوي التجميع . انزاهها صغيرة يضاء اللون او وردية ، عطرية الدرف الخالط .

١٨٢٩٧ - عسّاس * ، فوسّة * Cryptoprocta ferox (S).

Cryptoprocta féroca, *Foussa* (F).

حيوان لاسم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه جزيرة مفسكر . يعتبر اكبر ضواري الجزيرة . مسرعه دجوي.



عزيم



عسار



عسّاكة كبيرة



عسبار

١٨٣١٢ - **عُشْبُون*** Phyllostachys (S).

Bambou (F), Bamboo (E).

جنس نباتات قصية بزية وزراعية من عائلة الخيزرانيات وصليبة التيجليات. أنواعه عديدة ترطب في الأربة القليلة الانتاج ، السيفة النور ، الضوية ، القالية ، القرطية . اشهرها ما يتبع .



صرب

١٨٣١٣ - **عُشْبُون أسود**

Phyllostachys nigra (S), Bambou noir (F), Black bamboo (E), Japanese Blattsähre (D), Bambie nero (I).

نوع من العشون يطول من المترين الى السبعة امتار . سيقه بكاملها مع سلاسلها وصبرها الى السواد اللامع . اوراقه تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم . نصلها مائل للصفحة العليا ، ازغب السفلى ، مذهب الخافق . ينبت من النباتات البروية القليلة المتطلبات . يفضل الأربة الخفيفة الرطبة .

١٨٣١٤ - **عُشْبُون أصفر**

Phyllostachys aurea (S), Bambou doré, B. jaune (F), Yellow bamboo (E), Gelbe Blattsähre (D), Bambie giallo (I).

نوع من العشون يطول من ٤ الى ٥ امتار . سلاسله مقعرة قصيرة ، صبره بارزة مقعرة . انتاده عديدة ، دقيقة ، متشعبة . اوراقه تطول من ٧ الى ١٤ سم . نصلها مسن الحافة ، مائل للصفحة العليا خلى السفلى || وهو نبات سبروي ينبت ويحوي في جميع الأربة .



صربوة مرققة

١٨٣١٥ - **عُشْبُون بنفسجية**

Phyllostachys violascens (S), Bambou violacé (F).

نوع من العشون يطول من الثلاثة الى الست امتار . سيقه بكاملها بنفسجية اللون . اوراقه تطول من ٥ الى ١٨ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها مسن الحافة || زواحه تطلب بعض العناية ، يرغب في الأربة المعتدلة الانتاج والرطوبة . الزائرة المواد الضوية .

١٨٣١٦ - **عُشْبُون بيشي**

Phyllostachys ruacifolia (S), Bambou petit-houx (F).

نوع من العشون يطول من ٤٠ الى ٩٠ سم . سلاسله تنمو خضراء اللون ثم تصفر . اوراقه تطول من ٦ الى ١٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مستدير القاعدية ، ذلق القصبة . وهو نبات سبروي يحوي في جميع الأربة القليلة والمتوسطة الانتاج .



عشرون

١٨٣١٧ - **عُشْبُون زبرجدي**

Phyllostachys viridilutescens (S), Bambou vert glaucescent (F).

نوع من العشون . يطول من ٥ الى ٦ امتار . سلاسله متوسطة الطول ، خضراء اللون . صبره بارز أسود . اوراقه تطول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا خلى السفلى || وهو نبات سبروي ، زواحه كثيرة الانتشار لكنه ينشئ الجفاف .

١٨٣١٨ - **عُشْبُون كستيلون**

Phyllostachys castillonis (S), Bambou de Castillon (F).

نوع من العشون ، يطول من ٣ الى ٥ امتار . سلاسله متخلفة الخضرة والصفرة . اوراقه تطول من ٨ الى ١٤ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها منشدي الحافة يطول وتضع اصغر وودي || ينبت من النباتات البروية التي تجود في جميع الأربة الممكن زرعها .

١٨٣١٦ - **عُشْبَر ، عُشْبُون** Chien-loup (F).

Wolf-dog (E).

سلالة من الكلاب تتميز بسلطها وبقابليتها الى اقتباس ما يطلب منها .

١٨٣١٧ - **عُشْبَق** Pileostegia (S), Pileostégia (F).

جنس جنبات كزيتية معمرة من فصيلة السبوسيات ، أنواعه قليلة العدد ، سوقها زرجونية تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها كاملة ابيضة سنانية اتصال الجملد الصفعة وهي حاضرة مرة تدلوي بها الجراحات . ازهارها صيروانية التجميع ، يضاء اللون ، سلاسلها غيبية الشكل بارزة || ازهاره يستمر طوال الصيف .

١٨٣١٨ - **عُشْبَكَة** هو اللهب ، اطلبه .١٨٣١٩ - **عُشْد** هو البير ، اطلبه .١٨٣١٩ - **عُشْرَاب*** Butalis grisola (S).

Butalis gris (F), Brown fly-catcher (E).

طائر من الصوارب من فصيلة المنبابيات . موطنه جميع المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاقصى واروية . يألف جميع الاسماك القريبة من الماء || جسمه صغير القد يطول نحو ١٥ سم . ثوبه العلوي الى الرقبة . وجهه ورأسه مرقشان بالاسود . ويعمل في جناحه بعض التسنجج الابيض . ثوبه السفلي الى البياض الاخير . منقعه وصدره وايضاه مرققة بالاسود . منقاده وحفة صبه الى السواد الخالك . ساقه واصابعه الى السرة السوداء . ثوب الاذن عادم التسنجج في الجناح || طيرانه خفيف الحركة رشيقا . وينتقل على الارض بلقاقة . قوته الحشرات من الذباب الى الفراش والياسيب ولا ينف عن التار السنية اليانعة || يدفن حشه بين الاضغان . الاثنى تضع في اوائل حزيران من ٤ الى ٥ بيضات متحصنا بجانبه الذكر نحو ١٤ يوما .

١٨٣١١ - **عُشْرُوبَة مُعْرَكَة***

Notodonta zizac (S), Notodonta zizac, Zizag.

Bols veiné (F), Notodonta zizac (E).

حشرة من فصيلة الشرسليات وزيتية حرشيات الاجنحة . موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط والاراضي واروية . فراشها واسمه قزبا رقيق الانتاج . سرقتها تميش على اوراق الخور والصفصاف || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ سم . بسطها نحو ١٢ سم . رأسها صغير الجرم ، بني اللون . عينها صغيرتان . زناناها مشطيان مزودجان عند الذكر ، مشطيان بسيطان عند الانثى . جنينها الى البني الخفي الموج بطنها الى البني الاصفر المواج . ورضعها الاياماني الى الخفي المتفاوت السرة تملوه مشطيات بنية ونسوط وعروق سمراء اللون . ورضعها الحفليات الى البياض النقي المواج . اهدابها جانبية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تعامل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع ويضع للكن مساعدا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة تطول نحو ٢١ سم . جسمها مائل لانتشار اكعب الابن اسود التحول . مستطيل الرأس ، مستضيق البطن حتى السكة السابعة ثم يضيق تدريجيا حتى الشرج الذي ينتهي بزاويتين صغيرتين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي فسم صلبة تحميها السرة تحت القشور او في شقوق الحاء .

١٨٣١٩ - عُشْطُوس مَأْكُول

١٨٣٢٦ - عُشْكَد * Asperococcus (S).

Aspérocoque (F). Asperococcus (E).
جنس نباتات مجرية من أخشاب السمر. أنواعه الممرقة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد المعتدلة الحارة || كلالها صغيرة وقصيرة. أوراقها قلبية، علاحية التركيب. مزاجها الحلو حامضية تحت امتداد النصال || تعيش على الصغور المصنوعة.

١٨٣٢٧ - عُشْكَل * عُشْكَوْل هو الدرة، الملبا.

١٨٣٢٨ - عُشْكَلان Chapeau, Péridium (F).
مستقلان الفطر: اعلاه رؤسه. Pileus, Peridium (E).

١٨٣٢٩ - عُشْكَلوْنة * Escallonia (S).

Escallonie (F). Escallonia (E).
جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية، من فصيلة السفريات. معها بلاد الشيلي. سويها فناء ترتفع من متر الى ثلاثة أمتار. أوراقها أبيضه ومنتحبة، مسنة الخفاف. أزهارها لاقحياس الشكل والتجميع. أزهارها ملونة || أنواعها الممرقة قليلة، أشهرها التالية.

١٨٣٣٠ - عُشْكَلوْنة رائتجيه * Escallonia ilinita (S). Escallonie résineuse (F).

نوع من المسكولة. ساقها تملو من مترين الى ثلاثة أمتار. أوراقها صغيرة تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصالها جلدية، جرداء، مسنة الخفاف، لامعة الخفشار. صفحتها العللى مبرقة الغدد الراتنجية. أزهارها بيضاء اللون، محورية الإرتكاز، صغيرة القد، قطرها نحو ٨ مم. تنويرها صيفي.

١٨٣٣١ - عُشْكَلوْنة عكره * Escallonia pulverulenta (S).

Escallonie pulverulenta (F).
نوع من المسكولة. ساقها تملو من متر الى مترين. أوراقها أحليجية، مقلوبة. نصالها خلية البشر، عفرة. أزهارها صغيرة القد، وريدية اللون أو بيضاء، تتجمعا متعاقبة طرفية الإرتكاز متدلية || تنويرها يستمر طوال شهر تموز.

١٨٣٣٢ - عُشْكَودَة دَرَامَة *، أَكْرُليْكَنا

دَرَامَة * Acronycta leporina (S).

Acronycta livrea (F). Acronycta leporina (E).
حشرة من فصيلة العنقيات وريدية حشريات الالاجنة. موطنها بعض اصقاع حوض البحر الأبيض المتوسط. قراشتها واسعة قوتها رقيق الأظفار. سرقتها تعيش على أوراق الاجمار الوردية || جسمها مستدل ألق يطول نحو ١٦ مم. يسطها نحو ٤٠ مم. رأسها كبير الجسم. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان مستطيلان. جرشها سحري اللون. يطها الى الزرقه تملوها خسة خطوط معترسة عبره اللون || ورشاتها الاماميان الى الزرقه الباهتة يملوها تنقيط اسود ووردية حلاية الشكل. ورشاتها الخلفيان الى الخفلي الاصفر الملوحي || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب. تشرح في الليل. تتألف بعد ظهورها بنحو أربعة أسابيع وتفتح الممكن لتطاع على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || المرققة تطول نحو ٣٠ مم. جسمها اسطواني الشكل، مالى

Phyllostachys mitis (S). Bambou comestible (F).
نوع من العسوط، يملو من ٨ الى ١٢ م. قطر ساقه يراوح من ٥ الى ٧ سم. سلامياته مستطيلة صفراء اللون. أوراقه تطول من ٨ الى ٩ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصالها اخضر الصفحة العليا، ازررق السفلى. اماليجه القتيه مأكولة تستعمل اصحاب الحليون || يرغب في الاربة الدبالية للموسمة الانتاج والرطوبة.

١٨٣٣٠ - عُشْطُوس مَعْلَع

Phyllostachys narmorea (S). Bambou marbré (F).
نوع من العسوط، يملو من ١٠٠ الى ١٥٠ م. سلامياته تنضجية مشوة بالرمادي. أوراقه تطول من ٧ الى ١٢ سم. وتعرض من ١ الى ٢ سم. نصالها حافى الخفشار يملو تنضج اغبر يالوت || يرغب في الاربة الرطبة او القليلة الانتاج القتيه الرطبة.

١٨٣٣١ - عُشْطُوس * Isotoma (S).

Isotome (F). Isotoma (E).
جنس حشرات قافزة دامت من فصيلة العسوطيات. أنواعه الممرقة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٤ مم. ألوانها سوية اللون منها الاسود والافضر والاطحل. رؤوسها منضجة. بطنها أحليجية الشكل، مبرقة الحلب. جهازها التنفزي نشيط || أشهر أنواعه العسوط الاغضر (Isotoma viridula) الذي يكثر رويده على الطحالب ونحسها.

١٨٣٣٢ - عُشْطُوسِيَّات * Isotomidae (S).

Isotomides (F). Isotomides (E).
فصيلة حشرات قافزة، دامت وقافزة من رتبة الكهلديات. اجناسها وأنواعها الممرقة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة تطول من ١ الى ٤ مم. رؤوسها شبه بيضه الشوزن. انفاها وتكثيرها لاطة. حيرتها زئقية. قرونها الاستشارية قصيرة، رباعية الفصل. صودرها ثلاثية الحفلات. تتميز بقصر مقدم الجوشن المدام الحلب. بطنها سداسية السكر مجهزة بجهاز قفزي نشيط. مكانتها ثنائية أو ثلاثية الانسان. قوامها قصيرة تنتهي باظافر مجنحة حادة || أشهر اجناسها العسوط.

١٨٣٣٣ - عُشْكَار * Eschara (S).

Eschire (F). Eschara (E).
جنس حيوانات طليعية من فصيلة المسقاريات. أنواعه الممرقة قليلة العدد منتشرة في أكثر مناطق البحر الأبيض المتوسط || مستعمراتها مغمورة قليلة الفور، من ٣٠ الى ٥٠ م. تحت سطح الماء. جميعها متشعبة منتفخة المحيطات المائية الطبقات.

١٨٣٣٤ - عُشْكَاريَّات * Escharidae (S).

Escharides (F). Escharides (E).
فصيلة حيوانات طليعية مجرية اجناسها وأنواعها الممارسة قليلة العدد مملوها يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحارة || تتميز بفوطها الدائرية وياشكالها القديسة المحصورة.

١٨٣٣٥ - عُشْكَب *، عُشْكَبَة Grappellato, Grappillon (F).

Grappillon (F). Small bunch of grape (E).
عشيد صغير منفردا كان أو متصلا بملاق غيره. ج صلاب.



عسوط



عسقلنة رائتجيه



عسودة درامة

انهارها متقوية التجميع . عصارة ساقها تشفى من الجرب وتستعمل في تنظيف الآسنة الصلبة .

١٨٣٣٧ - عَصَلَجُ الْفَنَائِي

Leontice chrysogonum (S). *Leontice chrysogone* (F). نوع من الصلج الطبي البري والبرزي . ساقه تملو نحو ١٥ سم . أوراقه وريشة الشكل ، ورقها اصليجية ثلاثية او خاسية التفصيص ، تصالها بحري اللون . انهاره ال صفار الذهبي يحلها خراج دقيق مسط || انهاره يصل في أيار .



صفودة هريلة

١٨٣٣٨ - عَصَلَجُ الْأَسَد * ، راحة الأسد ،

خميرة الفكر ، ركف

Leontice leontopetalum (S). *Leontice pied-de-lion*, *L. commun*, *Lioune* (F). *Lion's-foot*, *Lion's-turnip* (E). *Echte Löwenblatt*, *Löwentrappe* (D). *Leontice pied de lion* (I). نوع من الصلج وهو نبات عشبي طبي بري يملو نحو ١٥ سم . أوراقه مركبة ثنائية التليث . ورقها بيضية الشكل ، مقطوعة القاعدة ، مشرطة الطرف . انهاره صفر اللون . انهاره يحصل في أيار .

١٨٣٣٩ - عَصَلَجُ الْفَنَائِي

Leontice altaica (S). *Leontice de l'Altaï* (F). نوع من الصلج البري والبرزي . ساقه موقفة ، تملو نحو ١٢ سم . أوراقه مركبة ورقها اصيحية الشكل || متساوية القد . انهاره كبريتية اللون كيفية التجميع . انهاره يستمر طوال شهر نيسان .



صلج الاسد

١٨٣٤٠ - عَصَلَجُ *

Felis pardalis (S). *Ocelot* (F). *Tiger-cat*, *Leopard-cat* (E). حيوان لاحم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه شاسع الاطراف يمتد من امريكا الشمالية الى المكسيك والبرازيل . يألف الاخراج . ملبته الجاني زويبي || جسمه اخيف القوام رشيقيها يطلو من ١٢٥ الى ١٥٠ سم . ما فيه الذنب الذي يطلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . رأسه مستد الجرم . اذناه صغيرتان ، مستقرتان . عيناه صليتان ، حادتان . ثوبه الى الصهوة الحمراء الحواج يملوها تنير اسود ورقشة سمراء وتتشيز حنطلي . ذنبه عشاري الاطواق السود || مسرعه دجوي يستمر من الغروب الى فحة الليل ومن الصبر العميق الى بزوغ الشمس . يتسلق الاجنبار بشفة السنور ويعود على الارض بسرعة الخيل . قوته الطير والابايل والقردة والخناثيس والجرذان || يحبل الاث يوم نحو ٧٥ يوما تقع في نهايته من جروين الى ثلاثة جراء بقي مع والديها نحو ستة اشهر .



سنان

١٨٣٤١ - عَصَلُوج

Brindille (F). *Spig.*, *Twig* (E). قضيب دقيق قصير امس طوله من ٥ الى ٢٠ سم . ينتهي غالبا برعمة او ببرام عمرة || والصلج في الفرف الحريسي هو القضبب الدقيق على الفسمن او الفت .

١٨٣٤٢ - عَصَلِيَت

Melanthaceae (S). *Melanthaceae* (F). فصيلة نباتية من مزدوجيات القلفة مستقلة العائلات . اجنتها وانولها قليلة العدد جميعها جيجيرات وينبتات معمرة ابيدة الورق .

القتار . ثوبا الى الربة الخضراء تملوها سمة خطوط مزدوجة ، قاطبة ، جزوية . رأسها الى الجوة القامة . مدنها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صلوية تحبكهما السرعة بين حلاه الاجنبار .

١٨٣٣٣ - سُقُودَة هَرِيْلَة * ، اَكْرُونِيَكَا

Acronycta strigosa (S). *Acronycta strigosa* (E). حشرة من فصيلة النكتيات ورقية عرشيات الاجنحة . موطنها الاقاليم المحتلة الحارة من الشرق الاوسط والافد واربدة . فراشها جاربة قوتها رقيق الاطار . سرقها تمش على أوراق العرود والفرخ || جسمها صغير القد ، هزيل . يطلو نحو ١٥ سم . يستلها نحو ٢٩ سم . رأسها مستد الجرم ثني اللون . عيناه كبرتان . زباناها جوشيات . جوشها ويصل الى اثني الاكلف الحواج || رواشها عنه الشقين الى اثني الاكلف تملوها في الزوج الاسامي بقعة قاعدية صفراء واخرى حثارية سمراء وتجليح وتنظيف وزرقة الى البني الاشقر . وتملوها في الزوج الخلفي نقطة قاعدية صفراء وبعض الزرقة السوداء . اهدنها الى الصصرة || لها جيل واحد في الحيل . تظهر الفراشة في ايار ويلقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعاطل يمد ظهروها بنحو ستة اسابيع وتحت الممكن لطفها على الصفحات السفلى من تصال الأوراق || السرعة تطلو نحو ٢٢ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالمس القشار . ثوبا الى اصغلي الاسمر تملو اطراف بنية . رأسها شديدة السرة اصفر الحواج . مدنها الى اثني . وراجها الى السرة القامة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوما يتقضي ضمن صلوية مثوية الحبلك تسجها السرعة بين حلاه الاجنبار او تحت القشور الصلفة .

١٨٣٣٤ - عَصَلَسْ ، اُوي

Miel (F). *Honey* (E). مادة سكرية يصنعها النحل من رسيق ويضفر الانهار والبار والارواق ليصنعها ويحفظها في تخاريب سلسة خاصة ، يستطيعها من التجمع وينطلي بشفرة رقيقة شفافة شبيهة المادة تمنع عنها الفساد || اجود الصل طمعا وراحة ما كانت عنبه الصسر والخرام ويصا اليان والوجع واللين والبرن والحنقورق والتفل والسنت || اما حصوص تركيه المادي فهو :

فلوكوز وفليزوز	٧٠ %
سكاروز	٥ %
سء	٢٢ %
موت وديسترين	٢ %
مولد صمغية ومعدنية	١ %

١٨٣٣٥ - عَصَلَج ، عَصَلَج ، نَاجِم

Scion (F). *Scion*, *Shoot* (E). الصلج هو القضبب الثاني على الطعم قبل بلوغه الحيل . وقد يكون برقا فينسي اذ ذلك ناسجا . ج صاليج || ويقال صليبت الشجرة اذا اخربت عبالجها .

١٨٣٣٦ - عَصَلَج

Leontice (S). *Leontice*, *Patte de lion* (F). *Leontice*, *Lion's-foot* (E). *Löwenblatt*, *trapp* (D). *Leontice* (I). جنس نباتات صغولية طيبة من فصيلة البرباريسيات . انهاره ٦ عساقها معمرة ، سوكها حولية ، أوراقها مركبة .

١٨٣٤٩ - حَمِيَّات * Combrées (F).

سبط من فصيلة الأليليبات، أشهر نباتاته السمس.

١٨٣٥٠ - عَمِيْلِيَّات * Osmylidæ (S).

Osmylidæ (F). Osmylidæ (E).

فصيلة حشرات من رتبة شافانث الأجنسة. أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم القطار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || أجسامها متوسطة الحجم، تكثر فيها الامتدالة. بسطها تراوح من ٣٢ إلى ٤٨ سم. رؤوسها شبه اسطوانية الشكل. عيونها كبيرة جاحضة. قرونها الاستشعارية غليظة مسطيلة. أجناسها مزخرفة ومبججة بالألوان وهي كبيرة، لاحقة، شبه متساوية بين الزوجين. جلونتها الاستدراك عند الراحة. بطونها شبه اسطوانية الشكل. أثوابها مزودة بالأصفر والأحمر والوردي والأخضر || تألف طبقات مجامير السواد حيث تكثر الاحتباب || أنثاها تتجمع المكان على نصال الأوراك. يرقاتها مفترمة، قاذبة توشش في البر وفي الماء || أشهر أجناسها السليل.

١٨٣٥١ - عَمِشَن * Périthécæ (F). Perithécium (E).

هو خلاص الثمرة في الفطر وهو الثمرة الفطرية التي تحضن الاثاق. ج. إصان.

١٨٣٥٢ - عَسْبُ * Cere (F). Beeswax (E).

١٨٣٥٣ - عَسْر * هو الشمع السلي.

١٨٣٥٤ - عَسُودَة * Lepidodactylus (S).

Lépidodactyle (F).

جنس حطام من فصيلة السويديات. أنواعه ١٠. جميعها صغيرة القند، طولها يراوح من ٦ إلى ٧ سم. أثوابها بين الصفار والخضار تملؤها نمشة حمراء أو سوداء. ج. صايد.

١٨٣٥٥ - عَسُودَات * Lepidæ (S).

Lépidés (F). Lepidæ (E).

فصيلة حيوانات زسافة من رتبة الظفانيات. أجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القند، رباعية الأليل، خنسية الأصابع المبطنة. المصممة || أشهر أجناسها السوسة.

١٨٣٥٦ - عَسُوس * Issus (S). Issa (F). Issus (E).

جنس حشرات ناسفة من فصيلة السوسيات. أنواعها المعروفة متوسطة العدد أصغلتها بعض مناطق البلاد الباردة ويعظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || أجسامها صغيرة القند، مستطيلة الرؤوس، ناشرة الجناح والعيون، صغيرة القرون الاستشعارية، مسطيلة القوائم المسننة الشائكة. أجناسها مستعرضة، مشبكية، لاحقة، شفافة. ألوانها متباينة الألوان، تكثر فيها السمرة على اختلاف مناطقها التي تراوح من الشفافة إلى الحمرة الوردية والخضار الزيتي || قوتها النش متممة من الأوراك.

١٨٣٥٧ - عَسُوس السِنْدِيَّان * Issus coleoptratus (S). Issa des chènes (F).

شجرة ناسفة من فصيلة السوسيات. جسمها صغير القند، يطول نحو ٧ م. || رأسها مستطيف، خطمها ذرب.

١٨٣٤٣ - عَسَلِيَّة * زَهْرَةُ الْعَسَل Melianthus (S).

Mélianthus (F). Mélianthus, Fleur de miel (F). Melianthus, Honey flower (E). Honigblume (D). Fior di miele, Melianta (I).

جنس ثجيرات ونباتات طيبة وزيينية من فصيلة السلييات. أنواعها قليلة العدد صغيرة القند. أوراقها متعاقبة مركبة وثرية التجميع. أزهارها عشوية لا تلباسية الشكل، خنسية القصل الامتدائية، رباعية البتلات والامدية. احادية الياض. ثمارها جرداء مفصلة رباعية القريقات، وهي فواحة العرف الطوري، غزيرة الرسح السكري الاسمر اللون الذي يستمر من أخص حلاجات الامراض الصدرية. اعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع.

١٨٣٤٤ - عَسَلِيَّة صَغِيرَة Melianthus minor (S).

Mélianthus minora (F).

جنية سبروتية صغيرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها جرداء أوراقها صغيرة القند. أذنباتها سائلة. وريقاتها ٧ أو ٩ وهي شقيقة النسل للمشاري الحافة. أزهارها عشوية التجميع، محورية الارتكاز، متدلية. لونها إلى السرة الخفيفة يلوها مزاج أسفح || أزهارها يستمر من آب إلى ايلول.

١٨٣٤٥ - عَسَلِيَّة مُسَدَّكَة Melianthus comosus (S).

Mélianthus chevelu (F).

جنية صغيرة القند تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. ساقها مسطحة. أوراقها عشيرة مستعرضة مهدلة. وريقاتها خفيفة دقيقة. أزهارها عشوية التجميع، محورية الارتكاز، متدلية. بتلاتها برتقالية اللون، خضر القفاضة حر التجميع || أزهارها يستمر طوال فصل الخريف.

١٨٣٤٦ - عَسَلِيَّة مُسَطَّيَّة Melianthus pectinatus (S).

Mélianthus pectiné (F).

جنية سبروتية تملو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها جرداء جالسة. أوراقها متوسطة القند. أذنباتها سائلة. وريقاتها سنانية النصل، خلية الصفحة السفلى قد من ١٣ إلى ٢١. أزهارها عشوية التجميع، تاجية الارتكاز، ارجوانية اللون || أزهارها يستمر من أواسط آب إلى أواسط تشرين الاول.

١٨٣٤٧ - عَسَلِيَّة هَرَمِيَّة Melianthus major (S).

Mélianthus majeure, M. pyramidalis, Pimprenelle d'Afrique (F).

جنية جالسة تملو من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم. ساقها جرداء متعرجة. أوراقها كبيرة. أذنباتها متدنية. وريقاتها لاحقة قد ١١ أو ١٣ أو ١٥ نصلها مجري اللون بالغ التسنين. أزهارها عشوية التجميع، هرمية الشكل، تاجية الارتكاز، لونها إلى الحمرة الباقية || أزهارها يستمر طوال فصل الخريف.

١٨٣٤٨ - عَسَم * Combretum (S).

Combret, Chigomier (F). Vegetable-glus plant (E). Langfaden (D). Combrete, Combrato (I).

جنس نباتات حرجية من السمييات وفصيلة الأليليبات. أنواعها نحو ٨٠ منها الأشجار والشجيرات والجنات. أطلابها البلاد الاستوائية. قفورها نحوي بعض السواد الصمغية الراتنجية القابضة. بزورها دعنية يستخرج منها زيوت مأكولة.



عسلي



عس



عسود

اللون ، غبراء الجدار . تركيب الارواق في حورها الهائل الذي يستحق الارواق صبغ ، تضبط التصل وتكفي الصنف والانتاج دون ان تسي الى نمو النبات .

١٨٣٦٤ - عُثَّة - هُوكِين - هُوكِينَة

Nid (F), Nest (E).

النش موضع حفر ينش الطائر يحسه من دقائق الحطب ويختلف الحشائش والحياد فيدثه في الشجر . وان كان في جبل او عمارة فهو وكروك ، اما اذا كان في الارض فهو انصوص وادي . ج عشش وأعشش وعشقة .



عصية البنج

١٨٣٦٥ - عُثَاوِي الْأَقْسَام - Decatome (F), Decatome (E).
ما كان مقسوما الى عشرة اجزاء .

١٨٣٦٦ - عُثَاوِي الْأَوْجُه - Décadétre (F), Decahedral, Decahedron (E).
من الحاد ما كان عشاري الابهة او التواءد .

١٨٣٦٧ - عُثَاوِي الْفَصَل - Décamère (F), Decamere (E).
ما كان مركبا من عشر فصل .

١٨٣٦٨ - عُثَاوِيَات الْأَرْجُل - Decapoda (S), Decapoda (F), Decapoda (E).
اسم تعريفي يطلق على القشريات وعلى الرغويات الرأسيات الارجل الرباعيات الحشوشم .

١٨٣٦٩ - عُثَاوِيَّة الْمِدَكَات - Décagyna (F), Decagin (E).
من الازعاج ما كان وزيمها مؤلف من عشر ملفات .

١٨٣٧٠ - عُثَاكَة ، زُوغُونِيَّة ، Zoogonia (F), Zoogony (E).
المشاة علم يبحث في تطور الحورن .

١٨٣٧١ - عُثَاكَة : المشاة : اصل الكلمة .

١٨٣٧٢ - عُثَب - Essarter (F), To clear, To grub (E).
اقتلع الاشجار المفسدة من الرية .

١٨٣٧٣ - عُثَبَة - Herbe (F), Herb, Grass, Wort (E).
المشقة ج . عشب وأعشاب . كل نبات رغو مومي الساق والارواق اللدورية .

١٨٣٧٤ - عُثَبَة الْأَكْرِيض - هي البقية ، اطليا .

١٨٣٧٥ - عُثَبَة الْأَبْرَاق - هي البقية ، اطليا .

١٨٣٧٦ - عُثَبَة الْبَرَاكِيث - هي يزو تفلن ، اطليا .

١٨٣٧٧ - عُثَبَة الْبَلُور - هي القفيرة البلورية ، اطليا .

١٨٣٧٨ - عُثَبَة الْبَوَاسِر - هي شيشة الخطاف ، اطليا .

١٨٣٧٩ - عُثَبَة الْبَوَاسِر الْمَقْدَاه - هي الخنازيرية المنقاه ، اطليا .

١٨٣٨٠ - عُثَبَة الْبَكَار - هي الفسبة ، اطليا .



عصية مزوانية

حينها كبريتان . زوانها قصيران ، نحيلون . كوسلها مزواني صغير . حشيتها تماثل الكوسل شكلها وكذا . ظهرتها يرمي الشكل ، لاحت ، شارف . بطنها غروطي . قوامها مسنة القنابيط الخلفية || ثوبها الى الحطلي الاقنص يملو تنسج كسني في الرأس والكوسل والحلقة والظهران والقوام . بطنها الى الحطلي الاسمر || تألف حراج السديان واللمس . قوامها نسج الارواق .

١٨٣٥٨ - عُصَوِيَّات - Isidae (S), Isalids (F), Isidace (E).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطيفة فضليات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها صغيرة ، لاقنسية الشكل ، متحدة التصليد . رؤوسها غليظة ، مخرمة المقع . اطلامها ذرية متصلة الطول . كوسلها صغيرة ، شبه هربية الشكل ، جالسة القنوط . اجنحتها مشبكة ، ملونة ، لاحقة . بطونها غروطية الشوزن او سنالية . قوامها قوية ، مستطيلة ، فضلية القنابيط الخلفية المسنة الخلفان الخارية || اشهر اجناسها الموس .

١٨٣٥٩ - عُصُوف - Corad (F).

نمت تعريفي توصف به البزوغ الشديدة السوية .

١٨٣٦٠ - عُصَوِيَّات - Eurytomidae (S), Eurytomidae (F), Eurytomidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة الصغيرة اجناسها وانواعها قليلة العدد منها النافعة التي تتطفل على الحشرات الضارة ومنها المانسة للزنية التي تتطفل على التيجليات || حشراتا صغيرة القند تطول من ٢ الى ٤ سم . اجسامها مستطيلة . بطنها ضامرة . مرزاتها فضية . زوانها الانيرة عحرانية الشكل || اشهر انواعها يصوم التيجليات .

١٨٣٦١ - عُصِيل - Verge de l'éléphant (F), Verge of the elephant (E).

السول : قصب القيل ج . عسل .

١٨٣٦٢ - عُصِيْمَة الْفَيْح - * ، زَالِيَة الْفَيْح - Pseudomonas tabaci (S), Feu sauvage, Feu rouge, Rouille brune (F), Wild fire, Wild fener (E).

وصم يكثيري فتاك سريع المبدؤ يترى الفَيْح في المشاتل وفي الحقل || الامال الواسم بكثيره في قضيبية اسطوانية دقيقة ، طولها يراوح من ١٤٠ الى ٢٨٠ ميكرون وعرضها من ٥٠ الى ٧٥ ميكرون تحمل في احد طرفيها ثلاث حديدات سولية يراوح طولها من ٢٥٠ الى ٧٠٠ ميكرون || مظهره الخاريسي ، على اتصال الارواق ، يقع مستديرة لا قياسية الحجم تبو صفراء اللون ثم تتحرف الى السرة وتنتهي باللباس || يكثف وقتا يتطير تربة المشاتل ويظهر البذار يحمل القرمول او يحول نيزرات القفصة المركز ١ / ١٠٠ على ان لا تفوق مدة تقع البذار في الحقل ١٥ دقيقة .

١٨٣٦٣ - عُصِيْمَة مُزَوَانِيَّة - * Pseudomonas angulata (S), Maladie des taches anguleuses, Feu noir (F), Angular leaf spot, Black fire (E).

وصم يكثيري شديد الفَيْح قليل الانتشار يركب الفَيْح في الحقل بعد دخوله في الدور الثاني من شباعه || مظهره الخاريسي يقع لا قياسية الحجم . مزوانية الشكل ، موداه

اللبن، خلية اللحاء. اوراقها خاسية او سباعية الوريقات. نصلها ايليجي الشكل، سنن الحافة، خلي البشرة على صفحتيه. ازهارها عابية اللون، ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٨٣٩٥ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصَّخْرِيَّة *

Potentilla pulcherrima (S). *Potentilla superba* (F). عشبة معمرة تطلو من ٣ الى ٥٠ سم. ساقها منتصب. اوراقها خاسية او سباعية الوريقات. نصلها ابيض الصفرة السفل، اغضر العليا. ازهارها الى الصفار الزاهي || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٨٣٩٦ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصُّفْيَا * *Potentilla argrophylla* (S). *Potentilla argrophylla* (F).

عشبة معمرة تطلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها السفل ثلاثية التركيب، ووريقاتها خلية البشرة، نضية اللون، ناعمة للمس. ازهارها صفراء اللون، قطرها يراوح من ٢ الى ٤ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٨٣٩٧ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْكَبِيرَةُ الرَّوْمِيَّة

Potentilla grandiflora (S). *Potentilla à grandis fleur* (F). عشبة معمرة مبلولة تطلو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية. ووريقاتها مسنة الزام الثالث والرابع. ازهارها غنية التجميع، زنادها يحمل من زهرتين الى خمس كبيرة القند قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة المابقة للامعة || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٨٣٩٨ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْكَلْبِيَّة

Potentilla fruticosa (S). *Potentilla frutescens* (F). عشبة لينة معمرة تطلو نحو ١٠٠ سم. ساقها خلية اللحاء طحلاد اللون. اوراقها خاسية او سباعية الوريقات الايليجية الشكل. نصلها خلي البشرة، ناعم للمس، ازهارها خضية اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

١٨٣٩٩ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْمُنْتَصِبَةِ

Potentilla ambigua (S). *Potentilla ambigua* (F). عشبة معمرة منتبسة الساق. اوراقها ثلاثية التركيب جامدة النصل. ووريقاتها الوسطى مستطيلة مسنة الزام الاخير. ازهارها فردية، طويلة الزناد، صفراء اللون. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٨٤٠٠ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْمُنْتَصِبَةِ

Potentilla erecta (S). *Potentilla dressée* (F). عشبة معمرة زياه تطلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ووريقاتها خاسية مستطيلة، نصلها جامدة الصفرة مزبر البشرة السفل. ازهارها الى الصفار الكبريتي الزاهي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٨٤٠١ - عُشْبَةُ الْقَوَى الرَّوْمِيَّة *

Potentilla anserina (S). *Potentilla anserina*, *Herbe aux oies* (F).

عشبة طيبة معمرة مبلولة ترطب في المراتع الغلظية الرطبة. تطلو من ١٥ الى ٥٠ سم. ساقها منبسطة تفرش عند كل عقدة. اوراقها ثلاثية السفل المتقابل. ووريقاتها تعد من ١٥ الى ٢٥ نصلها خلي البشرة، غضي المواجه. ازهارها كبيرة القند قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفار الكبريتي الباهت || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٨٣٨١ - عُشْبَةُ الْجَيْلِد

هي الشهيرة البلورية، اطلبها.

١٨٣٨٢ - عُشْبَةُ الْخَلِيلِيَّوْنِ هي الخليلون، اطلبها.

١٨٣٨٣ - عُشْبَةُ الدَّابَّاحِيْنِ هي الدربل، اطلبها.

١٨٣٨٤ - عُشْبَةُ السَّبْعِ

نبات من القفة، اطلب كرد.

١٨٣٨٥ - عُشْبَةُ الطَّحَلِكِ

في الطريقين الاسفر، اطلبها.

١٨٣٨٦ - عُشْبَةُ السَّلَقِ هي الزنظلية، اطلبها.

١٨٣٨٧ - عُشْبَةُ الْقَرَارَةِ

هي حشيشة القرقار، اطلبها.

١٨٣٨٨ - عُشْبَةُ السَّمَلِ هي المائق الجبل، اطلبها.

١٨٣٨٩ - عُشْبَةُ الْهَوَكَةِ *Herbe aux décus* (F).

عشبة يقال انها طيبة تدر البول. تدعى حشيشة القمر الحولية، اطلبها.

١٨٣٩٠ - عُشْبَةُ الْقَوَى، بُونْتِيْلَا، بُونْتِيْلُونِ

Potentilla (S). *Potentilla* (F). *Potentilla* (E). جنس نباتات عشبية طيبة مدادة معمرة من الفروليات. انواعه عديدة. اوراقها مركبة، ازهارها مبيطة الزناد، غظظة التجميع. مظهرها يري وتضي وبضها طيب يستعمل في عدة مستحضرات وعلاجات مقوية || اصرف انواعها واشهرها ما يتبع.

١٨٣٩١ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْاَبْيَكَةِ

Potentilla speciosa (S). *Potentilla élégante* (F). عشبة زلفية معمرة تطلو من ١٠ الى ٣٥ سم. اوراقها ثلاثية التركيب. ووريقاتها مزفيرة النصل المسن الحافة، الاغضر الصفرة العليا، الحلي السفل النضية المواجه. ازهارها ثلاثية او خاسية التجميع، متوسطة القند، يضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٨٣٩٢ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْيَهْدَاءِ *

Potentilla alba (S). *Potentilla blanche* (F). عشبة معمرة جبلية مبلولة. ساقها غيلة تطلو نحو ٢٠ سم. اوراقها السفل خاسية او سباعية التركيب. ووريقاتها خلية النصل تمام المسن الحافة. ازهارها نورية التجميع، طويلة الزناد، بتلاتها يرتقالية القناعة والوسط، حاجية الاطراف || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٨٣٩٣ - عُشْبَةُ الْقَوَى الدَّامِيَّةِ

Potentilla acroanguinea (S). *Potentilla rouge sang*, *P. sanguine* (F). عشبة معمرة زلفية اعضاء تطلو من ١٠ الى ٦٠ سم. ازهارها مكبية دموية اللون كبيرة القند قطرها نحو ٤ سم. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

١٨٣٩٤ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصَّخْرِيَّة *

Potentilla rupestris (S). *Potentille des rochers* (F). عشبة معمرة مبلولة تطلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. تربد بين الصخور وعلى اطراف الاراضي الملاحية. ساقها جرد



عشبة القوي البيضاء



عشبة القوي الصفرة



عشبة القوي النضية



عشبة القوي البيضاء



عشبة القوي الزرقية

١٨٤٠٢ - عُشْبَةُ الْمَسْك * ، أَدُو كَسَا

Adoxa moschatellina (S). Adoxa, Herbe au musc, Moscatella (F). Hollow-root, Moschatel, Musk-root (E). Echtes Biskankraut, Moschus-Kraut (D). Erba del muschio, Mucastella (I).

نبات عشبي طلي، جلوسري، وحيد الجلس والفرع من فصيلة الفويات، وأوراقه قرصية الانتشاج، مركبة، مستطيلة الماعيل المنصبة، ثلاثية القنصوص، نصلها مفرد المنصبة الحولية البثرة. أزهاره نورية التجميع مستطيلة الزناد، خالية البتلات الوردية اللون || جلوسه ولوراته وأزهاره فواحة الرائحة الطرية المسكية وهي طيبة جزيلة النفع مضادة للشيخ.

١٨٤٠٣ - عُشْبَةُ الْمَن * ، غِيُورِيَا

Glyceria (S). Glycérie (F). * نباتات عشبية من فصيلة النجيليات. أزهاره نحر ٣٠ سقفا منصبة بجواه تنهي ببطا كل سقيلة. أوراقها صفية الشكل كآوراق الخنطة. منها أنواع طافية مزروعة غنية بالمواد النشوية ومنها أنواع منتقية بألفها لمن السال الذي يذوق سنانها عند انتصاف النهار في أحر أيام الصيف فيترك عليها مادة لزجة سكرية الهضم مأكولة.

١٨٤٠٤ - عُشْبَةُ الْهِنْدِيَّةِ فِي الْجَبَلِ الْعَلِيِّ ، اَطْلِبْ .

١٨٤٠٥ - عُشْبَةُ بَرِّيَّةٍ فِي الْأَرَالِيَةِ الْعَالِيَةِ ، اَطْلِبْ .

١٨٤٠٦ - عُشْبَةُ حَمْرُكَةٍ فِي ابُو غلام ، اَطْلِبْ .

١٨٤٠٧ - عُشْبَةُ مَقْدَمَةٍ فِي الْقَيْسِيْنَ ، اَطْلِبْ .

١٨٤٠٨ - عُشْبَةُ هِنْدِيَّةٍ فِي الزَّيْتَانِ ، اَطْلِبْ .

١٨٤٠٩ - عُشْبِيٌّ ، حَشِيشِيٌّ

Herbaceous (F). *Herbaceous* (E).

تمت تسميته يطلق على النباتات ذات السوق اللينة التي تكون صلابها دين صلابة النباتات الخشبية.

١٨٤١٠ - عُشْبَةٌ

الشج : الشجرة النيقة القصبان المنطرة .

١٨٤١١ - عُشْبَقَار * ، اَسْتَارْتَا

Astarte (S). *Astarte*, *Astarté* (F). *Astarte* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة المشتريات. أزهارها المربعة ٢٠ منها النارية والماصرة. الماصرة منتشرة في جميع بحار البلاد القاروة || أصدانها صلبة ، يكثر لها الشكل السيلوي. مصاروبها متساوية الأطراف ، دقيقة التسنين الخشوي ، ويلجا تحزير طويي تحيل يستمر حتى الفنة . ماعيا ثنائية ، طليقة ، مستطيلة ، الأوابا زاهرة ، يكثر فيها الأحمر والوردي || تمشي عذوبة في الروال المعمرة باللاء.

١٨٤١٢ - عُشْبَقَارِيَّات * ، اَسْتَارْتِيدَا

Astartidés (S). *Astartidés* (F). *Astartidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم. أصدانها وأزهارها قليلة البدن ، منها النارية التي تمتد متحيراتها من الأراضي السيلورية إلى الثالثة ومنها الماصرة المنتشرة في جميع بحار البلاد القاروة || أصدانها صلبة ، صيرانية الشكل ، متساوية المصاريع ، دقيقة التسنين الخشوي || أعراف أصدانها وأزهارها المشتار.

١٨٤١٣ - عُشْبَرَكَةٌ * ، دِيَانِلَلَا

Dianella (S). *Dianella* (F). *Dianella* (E).

جنس نباتات عشبية معمرة جادحة من فصيلة الزنبقيات . منتبها ثنائية وبض مناطق استرالية . أوربها راقية . أوراقها متعاقبة ، ثنائية الصف ، غيبطة الشكل ، أبيض ، داخلة الأعضار . أزهارها حثولي التجميع . أزهارها متدة الحجم ، سداسية البتلات النبطية النجبة الشكل ، البتنية المروق . سداسية الاسدية المنصبة الأطراف || تزود للزيت . قروب في الأتربة الملوحة الاندماج للوراة العناصر الغذائية والمضوية || أشهر أنوعها المعروفة الأربعة التالية :

١٨٤١٤ - عُشْبَرَكَةٌ تَسْمَانِيَّةٌ * ، دِيَانِلَلَا

Dianella caesarea (S). *Dianella de Tasmanie* (F). نوع من العشبة . منتبها جزيرة تسمانية . تملو من ١٢٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقها تطلو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم . وتعرض من ٢٠ إلى ٢٥ سم . أزهارها حثولي التجميع ، كبير الله ، كثير الفروع والقص . أزهارها إلى الزرقة الزاهية . ثمارها عتية ، زرقاء اللون ، متدلة || تنويرها صلي .

١٨٤١٥ - عُشْبَرَكَةٌ زَرْقَاء * ، دِيَانِلَلَا

Dianella caerulea (S). *Dianella bleue* (F). نوع من العشبة . منتبها بعض مناطق استرالية . تملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها كثيرة البدن . صفية الشكل ، تطلو من ٢٥ إلى ٣٠ سم . وتعرض من ١٢ إلى ١٨ سم . أزهارها حثولي التجميع قليل الانتراج ، قصير القروع . أزهارها إلى الزرقة الماعية الجسلة . ثمارها ديبية متدلة || تنويرها يستمر من آذار إلى حزيران .

١٨٤١٦ - عُشْبَرَكَةٌ صَقِيلَةٌ الْوَرَق * ، دِيَانِلَلَا

Dianella laevis (S). *Dianella à feuilles lisses* (F). نوع من العشبة . منتبها بعض مناطق استرالية . تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها صفية الشكل ، صقيلة المنصل ، شديدة الخصار ، تطلو من ٣٠ إلى ٤٥ سم . وتعرض من ١٢ إلى ١٨ سم . أزهارها حثولي التجميع ، هريس الشكل . أزهارها إلى الزرقة الساجنية . ثمارها عتية ، ليلكية اللون ، متدلة || تنويرها ديبية .

١٨٤١٧ - عُشْبَرَكَةٌ مُنْقَعَةٌ الْوَرَق * ، دِيَانِلَلَا

Dianella revoluta (S). *Dianella à feuilles enroulées* (F). نوع من العشبة . منتبها استرالية . تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها صفية الشكل ، جامدة التسج ، مالة الخفاف ، ملقة ، تطلو من ٧٠ إلى ٨٠ سم . وتعرض من ٦ إلى ٨ سم . أزهارها حثولي التجميع . أزهارها إلى الزرقة السايوة . ثمارها عتية زرقاء اللون || تنويرها يستمر من تموز إلى آب .

١٨٤١٨ - عُشْبَةٌ * ، سِيُكُوَلَا

Séquoia (F). *Gang, Crew, Set* (E).

الشج ما يحل بالإنسان من طة سبها مرض أصابه أو علية جراحية أجريت له .

١٨٤١٩ - عُشْر * ، دِيْمَا

Dime (F). *Tithe, Dime* (E). نوع من جزء من شجرة يقطع من انتاج الأرض ويذوق إلى ولي الأمر غريبة عن الأرض .



عشبة المسك



عشبة المن



عشبة تسمانية

الزهرية رجلة مستطيلة || ازهارها يستمر من آب ال
تشرين .

١٨٤٧٨ - **عُثْرَة مَبْدُولَة *** ، **قُوس مَسْكَن**
Hedera helix (S). Lierre commun (F). Hedera, common ivy (E). Gemeiner Efeu, Epheu (D). Edera, Ellera, Verna, Verola, Vite nera (I).

جنية سروية ليفة متسلقة تطول من ٢ الى ٣٠ م .
اوراقها لا تليسه الشكل ينط لها الايليجي . مالحق
ازهارها واحدا خلية البشرة طملاء اللون . ثمارها نوية
تجمل ال السرة المابقة || ازهارها يستمر من ايلول ال
تشرين .

١٨٤٧٩ - **عُثْرُون** .
Arbre sec (F). Dry tree (E).
العثرون هو الشجرة اليابسة .

١٨٤٣٠ - **عُثْرِيَّات ٥** .
Pyrénomycètes (F).
فضيلة لطور مجهرية تنتمي ال مرتبة الفطريات ورتبة
الزقيات تتميز بمق جانب من التكاثر او بالانكاف بوع
واحد من الزرق وذلك بعد تمام ادراكه . اما اصنافها
بسيطة ولا تكون فردية او مركبة || اجناسها وانواعها
عديدة يجسمها ثلاث عائل وهي السخاقيات والسنانقيات
والباقيات .

١٨٤٣١ - **عُثْرِي**
Cri de l'hyène (F).
Cry of the hyena (E).
العثري : صوت الضبع .

١٨٤٣٧ - **عُثْرِيَّي * عَظِي**
Agapornis (S).
Agapornis, inséparable (F). Love-birds (E).
طائر وصيد إجلس والتزوج من زنايف البهجات . موطنه
يشمل جميع مناطق افريقية الوسطى وجزيرة مدغسكر ||
يألف القفص لكنه لا يعيش الا ذكرا وانثى . تربيته
منتشرة في جميع انصار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة لانه
يشي البرد || جسمه صغير اللد ، ذلق القلب والجناس
متفاده عريض وقصير . لونه جميل الالوان المتراكبة فيه
الاسمر والاخضر والاصفر والبنفسج || قوته الدخن والقنبر والمفوف
والخمس والبار الناصجة || الانثى تدين عشها في تجويف
جلع . حضنتها تزاوج من ٣ ال ٤ بيضات ترقلها نحو
١٥ بيضا .

١٨٤٣٣ - **عَصَا الدَّهَب** هو قصب الذهب ، اطله .

١٨٤٣٤ - **عَصَا الزَّيْء** .
Houtetia (F). Crook (E).
صا رأسها اجوف كالملقعة يستعملها الراعي لقلع الحجارة .

١٨٤٣٥ - **عَصَا الزَّيْء**
هي القرد نبات بري وتربي ، اطله .

١٨٤٣٦ - **عَصَا الزَّيْء** هي الدار ، اطله .

١٨٤٣٧ - **عَصَا هِرْمِس** هي الحلوب ، اطله .

١٨٤٣٨ - **عَصَا عَقُوب** هو القربوه السبيلة ، اطله .

١٨٤٣٩ - **عُصَاب ، صُؤَاك الزَّيْء ، شُطْرَج**
Lepidium (S). Passerage (F). Dittander (E). Senf-
kraut (D). Lepidlo, Peparella (I).
جنس نباتات عشية برية معمرة من فصيلة الصليبيات .

١٨٤٣٠ - **عُثْر**
Calotropis (S).
Calotrope, Calotropis (F). French cotton, Mudar
plant (E). Wehre mudarypflanze (D). Calotropo (I).
جنس نباتات برية طيبة من فصيلة الصقلابيات . انواعه
عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنات . لحاء جلورها
مقوية ومروية . اصلها الجزيرة وبعض المناطق الاسيوية
والارافقية الحارة || جلد عته في القاموس : « العثر
شجر فيه حراق لم يقتنع الناس في ايجده مته ويحش في
الحقاد ويخرج من زهره ريشه سكر وفيه مرارة » . وقال
ابو حنيفة : « العثر من الضياء وهو من كبار الشجر .
وله صمغ حلو وهو عريض الورق صلبا في الساء وله
سكر يخرج من شبيه وواضع زهره » . وفي الصالح :
« وعرته نفاضة كنافذة القناد الاسفر » || الواحدة
عثرة والجمع عثر وعثرات .

١٨٤٣١ - **عُثْرِي** يعرف باي سلام ، اطله .

١٨٤٣٢ - **عُثْرَكَة** .
Préfoliation, Vernation (F).
Vernation (E).
هي الترتيب للتعمر اي انتظام الاوراق داخل البرمة
الورقية .

١٨٤٣٣ - **عُثْرِيَّات ٥**
Circosées (S).
Circosées (F). Circosées (E).
فضيلة نباتية ، كانوا يصورونها في التصنيف السابق
كسبب من فصيلة الاعدريات ، وهي من ذوات الفلقتين
عديدة القعالات . اجناسها اودية وانواعها نحو ٣٦ ||
نباتاتها عشية ، منها الحولية والممررة والممررة ، اصلها
بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . اوراقها بسيطة ،
متعاقبة او متناوبة . ازهارها خشوية رباعية الكثر .
ازهارها سبيل التجميع ، تاجي الايتكاز .

١٨٤٣٤ - **عُثْرِي**
Décimal (F). Decinal (E).
لست تعري يطلق على الفليات والسابات المرتكزة على
عشرة .

١٨٤٣٥ - **عُثْرَكَة**
Hedera (S). Lierre (F). Ivy (E).
جنس نباتات معمرة من فصيلة الاراليات . انواعها نحو
٦٠ جميعها ليفة خشبية عارية اظفورية . مظهرها بري
وبعضها ذراعي تربي . سيقانها تتساق بواسطة افطارها .
اوراقها متعاقبة متعقة جالدية الصل ايده . ازهارها عشوية
التجميع وعوري او ابلي الايتكاز . ازهارها صغيرة اللد
بيضاء اللون || اوراقها طيبة ويستخرج من سيقانها عصارة
صمغية مقوية وهيجية || اشهر انواعها التريينية ما لي .

١٨٤٣٦ - **عُثْرَكَة كَلْبِيَة**
Hedera colchica (S).
Lierre de Colchide (F).
جنية جادسة ليفة متسلقة تطول من ٥ الى ٢٥ م . اوراقها
ثلاثية او خماسية التفصيص ، نصلها يطول نحو ١٢ سم .
ويبرز نحو ١٠ مالحق ازهارها واحدا كثيفة الحرائش
الاصفر اللون || ازهارها يستمر من تموز ال ايلول .

١٨٤٣٧ - **عُثْرَكَة كَنَارِيَة**
Hedera canariensis (S). Lierre des Canaries (F).
جنية سروية ليفة متسلقة تطول من ٣ الى ١٥ م .
اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص ، كبيرة اللد ، تلبية
الشكل تعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . مالحق ازهارها واحدا
سرخسية اللد ، نجمة الحرائش الطملاء اللون . عشيقها



عُثْرَة مَبْدُولَة



عُثْرِي



عصاب غريفس الورق

18447 - **عُصَابَة مَعْدِيَّة** (F).
Gastric juice (E).
سائل حامضي التركيب ، يحوي بعض الصفات والكولوريدات القلوية والمضخات ، يفرزه غشاء المعدة ، يصلح خاصة لحضم المواد الآسية .

18448 - **عُصَابَة مِعْرِيَّة** (F).
Intestinal juice (E).

سائل حامضي التركيب ويختلف متابة على المصيدة في حضم الطعام واستخلاص مولده البنائية .

18449 - **عُصَابَة نَوِيَّة** (F).
Nuclear sap (E).

راجع سائل نووي .

18450 - **عُصَابَة** (F). Shell, Pod (E).
هي مجموع الصفات والصفات التي تغصّل من الحلب عند الدّراس .



عصاة متوجّه

18451 - **عُصَابَة** (S).
Ospheya (F). Ospheya (E).

جنس حشرات من فصيلة التّهرطيات وريقة عذبات الاجنحة . انواعها المعروفة تسع منتشرة في جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التّسطيط ، تقطّل من ٦ الى ٩ سم . رؤوسها صغيرة ، مستطيلة الاضلاع . عينها بارزة . تأثيرها متوسطة القوّة . ملابسها النّكيّة كبيرة . قرونها الاستثمارية غليظة ، سنّة . كواسلها مقببة الشكل . بطونها مستديرة المخرّص . احمادها تلمّح البطن باستثناء الطرف المستدير . قوائمها نضطية . تتميز بانفخاد قوائمها الخلفية الثلاثة الفصاحة . اثولها ملونة || الحشرة الجملانة واسعة وشاخلة . اما البرقة فشكارة او فاجحة .

18452 - **عُصَابِي** (F).
Scarce pourpré (F).
سمكة بحرية تدعى دقة البحر ، اطلها .



عصاة

18453 - **عُصَاب** (S).
Céblépyris (S). Céblépyris, Echenilleux (F). Céblépyris (E).

جنس طير من الجوارث وفضيلة المذبذبات . هذه بعض مناطق البلاد الانريزية . انواعه قليلة العدد . قوته الحشرات اعصها الاساريح والبرقات ولا يصف من القار التناضجة من برّة وزراعية || جسمه متوسط القوّة . ذنبه وتاجه الريش المستطيل ، الفراق الطرف . بعض ارياش اثنيتي جامة التركيب مدببة الاطراف الشاككة || ثوبه متباين اللون . رأسه احمر . عسراه الى السرة الباقية . سباله اسود . ظهوره الى الربعة الخنطية المواج . جناحاه الى السوداء الاسفم . صدره ويكته ويؤخر ظهوره وقاعدة ذنبه الى الربعة الخنطية المؤنجة بالاسود || يدان عنه في الاشجار القريبة . الاثنى تحضن نحو اربع بيضات ترعيها ينشر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الاثنى دون الذكر الذي يؤن لها الطعام .



عصاة

18454 - **عُصَابَة** (F).
Immunologie (F). Immunology (E).

علم يبحث في مقاومة الجهاز المناعي الحي لتدنيات الاوصام المختلفة .

18455 - **عُصَابِي** (F).
Immunologique (F). Immunologic (E).

نمت ترميزي يطلق على ما هو يخص بالصناعة .

انواعه نحو ٧٠ اصنافا جميع البلاد المعتدلة الحرارة . جديروها وشية مدادة . سبها دقيقة منتضبة . اوراقها معتقة و متناحية ، فصلها سبك الصفحة ، سرح البشرة . انزعارها متكولي التجميع ، طرفي الاوتكان . انزعارها صغيرة القند يضاد اللون او صفراء . حملها غريزية . اشهر انواعه العصاب الغريفس الورق .

18456 - **عُصَاب غُرَيْص الزَّرْف** (F).

Lepidium latifolium (S). Grande passerage, Moutarde des anglais, Cresson à arges feuilles (F). Pepperwort, Green mustard (E). Pfefferkresse (D). Lepidio ibride, Erba mostarda (I).

نوع من العصاب وهو عشية برية طيبة مدمرة ملحولة في الاساكن الظليلة المشية . ساقها تلون من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها ثلثية الشكل . انزعارها صفراء اللون . متناحية الطيبة كثيرة وهي مفيدة لاداء الحفر ويقلل انها تنفي من الكلب .

18457 - **عُصَابَة ، حَوَقَت** (S).
Heterodon (S). Hétéron (F). Hétéron (E).

جنس حيات بيوضة من فصيلة الحشويات عذبات الاغادي والصوم . انواعها المعروفة نحو عشرة . اصنافها بعض المناطق الحارة من الماكن القديم والجديد || جميعها صغير القند اطولها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . اثولها مبطقة او مبلّقة او مجذّعة بالاسود والجوزي والاحمر . رؤوسها شبه غمرطية الشكل و رقيقة الخاطم . اذنانها مسطحة الاطراف || قوتها الحشرات والورديات والضفادع والظفادع والثعابين والنسافير ويضربها || اعرف انواعها والظهورها العصابة المتوجة .

18458 - **عُصَابَة مُتَوَجَّهَة ، حَوَقَت مُتَوَجَّه** (S).

Heterodon diadema (S). Hétéron diadème (F).
نوع من العصابة . موطنها بلاد الجزائر والمغرب . تألف للبراري والادغال . قوتها الحشرات والورديات والضفادع والثعابين || جسمها يطول نحو ٥٥ سم . رأسها شبه غمرطي الشكل . ربيع الخلم . عينها صغيرتان ، ماحتان . ثوبها الى الصبغة يعلوها تمصيب اسود يمتد من الرأس الى طرف الذنب . عصبه رأسها يمتد الى الجبهة فينبو كالتاج . يطها الى السرة الخنطية || تتميز من الحيات المقيدة الاروذية .

18459 - **عُصَابَة ، قَرَابَة** (F).
Consanguinité (F). Consanguinity (E).

طريقة اصطفاة خاصة باصلاح النسل او بتثبيت بعض الصفات الميزة قولها تساهل الاقارب المتشعبة دون مراعاة درجات النقب .

18460 - **عُصَابَة** (F).
Jus (F). Juice (E).

ما عصر من الثمار ومخلط الاعضاء النباتية .

18461 - **عُصَابَة التَّبِيع** (F).
Jus de tabac (F). Juice of tobacco (E).

نقع اوراق التبغ وهو غني بمادة التوكينون المتمصر القلوي الثامن في التبغ . يشتمل في مكافئة الحشرات اعصها الارق .

18462 - **عُصَابَة خَلِيَوِيَّة** (F).
Soc cellulaire (F). Cell-sap (E).

Plante volubile (F). **عَصْبِيَّة ، عَصْفِيَّة** - ١٨٤٧٣

Voluble plant, Twining plant (E).

كل نبات عارض يلتف على غيره .

١٨٤٧٤ - **عَصْبِيَّة السُّوس** هي الشَّم ، اطبخه .

١٨٤٧٥ - **عَصْبِيَّة التَّلَب**

هي الميثاريقون المعروف ، اطبخه .

١٨٤٧٦ - **عَصْبِيَّات الجَنَاح** Neuroptera (S).

Névroptéroides, Névroptères (F). Neuroptera (E) Netzflügler (D).

طريقة حشرات من شعبة الحسدليات تشمل ثلاث رتب وهي سادات الاجنحة وشارفات الاجنحة وشبكيات الاجنحة . اما فصائلها وابناسها وانواعها فكبيرة العدد جميعها من الحشرات الثلاثة || تحليتها : حشرات تامة التطور مجتمعة ، اجنحتها غشائية مشابهة . رؤوسها وزناها كبيرة للقد . استطاعها قارضة . ارساغها خاسية العقل . ملاسها الشعرية جذعة . رقائقها مفرطة قوية التأثير .

١٨٤٧٧ - **عَصْبِيَّة الأَجْنَحَة** Névroptère (F).

Neuropteral (E). هي كل حشرة تنتمي الى طبقة عصبيات الجناح .

١٨٤٧٨ - **عَصِيد** Sperme animal (F).

Animal sperm (E).

المعد هو الشلغ اي افراز اللقد للثناسلية عند ذكور الحيوان .

١٨٤٧٩ - **عَصْر ، عَصْرَة ، عَصْرَة**

Expression, Pressurage (F). Expression, Pressing (E). هو كبس الشيء لاستنزاف مصارته .

١٨٤٨٠ - **عَصْر** Epoque, Période (F).

Epoch, Period (E). أنه من الزمن .

١٨٤٨١ - **عَصْر الجليد** Période glaciaire (F).

Ice age (E).

١٨٤٨٢ - **عَصْر العَنَب** Foulage (F). Fulling (E).

بحق العنب واستخراج مصارته . ومنهم من قال هرس العنب .

١٨٤٨٣ - **عَصْر حَجَرِيّ** Age paléolithique,

A. de la pierre taillée (F). Palaeolithic age (E). هو للزود الطراني ، اطبخه .

١٨٤٨٤ - **عَصْفُوس ، عَصْفُوس** Coccys

طرف اللب وقد شاع اسناده الى طرف آلة النغم . ج صاصص .

١٨٤٨٥ - **عَصْف ، قَرْف** Ecimage (F).

Topping, Pollarding (E).

اقتطاع بعض فتن النبات انصها الفتن الهامة . ومنها تكون الناية من المصنف اقتطاع الاثمار فهو الخصى .

١٨٤٨٦ - **عَصْفَة** Pame (F). Blade (E).

ورقة الزرع وبظم النباتات التجيلية . ج صصف .

١٨٤٨٧ - **عَصْفَة الخَمَر** Bouquet (F). Aroma (E).

ريح الخمر . يقال ان الخمر صفة مستحبة .

١٨٤٥٦ - **عَصَب** Nerf (F). Nerve (E).

هو الوحدة التي يتكون منها الجهاز العصبي في الجسم الحيواني . وظيفته تنظم وتكثيف عمليات الجسم والسيطرة عليها واغضاضها الى مختلف اجساماته . ج أصاب .

١٨٤٥٧ - **عَصَب** Nervure secondaire (F).

Secondary nerve (E).

هو في اوراق النبات الوعاء النسبي الوصل ما بين الفرق والشريان . اما ترتيب اوعية الورقة فهو غلب ورق وصعب وشريان || والعصب في ريشات بعض الحشرات يحل المرتبة الثانية بعد العروق .

١٨٤٥٨ - **عَصَب**

العصب شم اخر تراه في الاقن عند غلب الشمس . يقال عصب الاقن اي اخر .

١٨٤٥٩ - **عَصَب** راجع اسطرافالوس نلوس .

١٨٤٦٠ - **عَصَب** Bistournage (F). Castration (E).

طريقة في الحصاد تقتل فيها حيال الحصى ولا تسل فتضر وتتلأى .

١٨٤٦١ - **عَصَب بَصَرِيّ** Nerf ophtalmique (F).

Ophthalmic nerve (E). هو العصب المختص بالبصر .

١٨٤٦٢ - **عَصَب حَرَكِيّ** Nerf moteur (F).

Motor nerve (E). كل عصب اختصاصه الحركة .

١٨٤٦٣ - **عَصَب حِسِّيّ** Nerf sensorial (F).

Sensory nerve (E). هو العصب الذي ينقل الى جهاز الحس .

١٨٤٦٤ - **عَصَب حَنَجَرِيّ** Nerf laryngé,

N. laryngien (F). Laryngeal nerve (E).

كل عصب غصص بالحنجرة .

١٨٤٦٥ - **عَصَب رِئَوِيّ** Nerf pulmonaire (F).

Pulmonary nerve (E). العصب المرتبط بالرئة .

١٨٤٦٦ - **عَصَب سَمْعِيّ** Nerf acoustique (F).

Acoustic nerve (E). العصب الخاص بجهاز السمع .

١٨٤٦٧ - **عَصَب سَنَحِيّ ، عَصَب نُحْرُوِيّ**

Nerf alvéolaire (F). Alveolar nerve (E).

العصب الخاص بنخاريب الانسان .

١٨٤٦٨ - **عَصَب شَمِيّ** Nerf olfactif (F).

Olfactory nerve (E). العصب الخاص بجملة الشم .

١٨٤٦٩ - **عَصَب عَصْدِيّ** Nerf brachial (F).

Brachial nerve (E). العصب الخاص باليد .

١٨٤٧٠ - **عَصَب قِحْفِيّ ، عَصَب مُخِيّ**

Nerf crânien (F). Cranial nerve (E).

العصب الخاص بالجسم .

١٨٤٧١ - **عَصَب مُبْعِد** Nerf abducteur (F).

Abducent nerve (E). كل عصب اختصاصه الابعاد .

١٨٤٧٢ - **عَصَب بَصَرِيّ** Nerf optique (F).

Optic nerve (E). العصب المختص بالبين .

١٨٤٩٩ - **عَصَلٌ** Urineer (F). To urinate (E).
صل الكلب والقطب والعلب : بال .

١٨٥٠٠ - **عَصَلٌ** Rhododendron (S).
Rhododendron (F). Rhododendron (E).
Rosebaum (D). Rododendro (I).

جنس نباتات معمرة برية ويزرع من فصيلة الوردية.
أنواعه المعروفة نحو ١٧٠ منها أزهار والشيحيرات والجلبات.
أوراقها مثقبة جلدية النصل. أزهارها خمسية البتلات
بارزة الاسدية الشفوية التجميع الكثرية العدد. واحده
عصلة || أشهر أنواعه الزينية ما يتبع .

١٨٥٠١ - عَصَلَةُ الْفَانِيَّةِ

Rhododendron collectianum (S). Rosage de l'Afghanistan (F).

جنية سرورية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها وفروعها
نشيطة قوية . أوراقها سنانة تطول من ٥ الى ٨ سم.
نصلها خلي الصفحة السفلى العلوية اللين . نوربها متجمعة
الشكل عديدة الأزهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٢
و ٣ سم . بتلاتها خلية البترة ، بيضاء اللون . أوراقها
سطرية الرائحة عند الفك || أزهارها يستمر طوال شهر
أيار .

١٨٥٠٢ - **عَصَلَةُ الشَّرْقِ * ، عَصَلَةُ شَيْخِي ، بِقِيل**

Rhododendron ponticum (S). Rosage d'Orient (F).

جنية سرورية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. أوراقها
سنانة ، خفيفة ، ذرية ، تطول نحو ١٥ سم . نصلها أخضر
اللون المايق اصبح المواج . نوربها تضم من ٣ الى ٥
قطر الواحدة منها يراوح بين ٦ و ١٠ سم . لونها الى
البنيجي يعلو توشم اسمر || أزهارها يستمر من أيار
الى حزيران .

١٨٥٠٣ - عَصَلَةُ الْيَانِ

Rhododendron yunnanense (S). Rosage du Yunnan (F).

جنية سرورية متوسطة القند تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها
أعليلية الشكل خفيفة الزغام الاخضر اللذان المذهب ؛ نصلها
يطول من ٦ الى ١٠ سم. تملو خلق من الحلب الجامد .
نوربها تضم من ٥ الى ١٥ زهرة قطر الواحدة منها نحو
٥ سم . لونها الى البياض الساطع تملو مشعة وريدة ورشة
حرار || أزهارها يستمر من أيار الى حزيران .

١٨٥٠٤ - عَصَلَةُ بَاهِرَةٍ

Rhododendron fulgens (S). Rosage éclatant (F).

جنية سرورية كبيرة القند تملو من ٣ الى ٦ أمتار . ساقها
فرداء فناء . أوراقها بيضية الشكل ؛ نصلها يطول نحو
١٢ سم . صلحت البلى أخضر اللون مالمه اما السفلى
فحنطية ندية ونفسية . نوربها تضم من ١٥ الى ٢٠ زهرة
أرومانية اللون ، زاهية المواج ، صغيرة القند || أزهارها
يستمر طوال شهر أيار .

١٨٥٠٥ - عَصَلَةُ بَحْرِيَّةِ الْوَن

Rhododendron hypoglucum (S). Rosage glauque (F).

جنية سرورية جميلة الشكل تملو نحو ٣٠٠ سم. ساقها
وفروعها قليلة الزغب . أوراقها أعليلية تطول من ٥ الى
٧ سم . نصلها جامد الصفة ، اسمر البترة ، بحري
الخصار . نوربها سيوائية الشكل تضم من ١٠ الى ١٦
زهرة متوسطة القند لونها الى البياض المايحي تملو نمشة
سمرار || أزهارها يستمر طوال شهر أيار .



عصفرور الشوك الجبل



عصفرور الشوك الصغير



عصلة الشرق

١٨٤٨٨ - **عُصْفُورٌ** هو نورم المصافين ، اعطيه .

١٨٤٨٩ - **عُصْفُورٌ** Oiseau (F). Bird (E).

قال حزة : سمى عصفورا لانه يصغر وير . والعصفر اسم
شامل لجميع الطيور الصغيرة القند . الاثنى صفورة والجسج
مصانير . قال الشاعر :

« كصفورة في كت مقل يسومها
سبحان الردى والطفل يلهو ويلعب »

١٨٤٩٠ - **عُصْفُورُ الثَّيْنِ** Bec-que (F).

اسم شائع يطلق على بعض المصانير من أكالات ثنتين
كأبي قلنسوة وغيره .

١٨٤٩١ - **عُصْفُورُ الْجَنَّةِ** هو الخفاف ، اعطيه .

١٨٤٩٢ - **عُصْفُورُ الشَّوْكَ** Prunella (S).

Accenteur (F). Accenteur (E).
جنس عصافير صغيرة القند من الجواثم . أنواعه قليلة العدد
اثنائها الى الصلحة تدبر وتسر وتزهر وتنبق مع مختلف
الانواع . اثنائها مشعة بالابيض . اجنسها موشة
بالاسمر . متاقبرها دقيقة قوية . ارباغها حبيبية الجلد .
قوتها الحشرات والحوام والبرور البرية || احرف انواعه
واشهرها ما يلي .

١٨٤٩٣ - عُصْفُورُ الشَّوْكَ الْجَبَلِيِّ *

Prunella collaris (S). Accenteur alpin, Pagot (F).

طائر آبد طوله نحو ١٨ سم . يتنجم بتجميع جناحه وبياض
عنه وطرف ذنبه . يألف الجبال . قوته الحشرات والحوام
والسناك والديدان والآبار النووية الحرجية ويزور البتات
البرية اصحبها الشوك || يثدن في الارض وبين خثايف
العصفور . الاثنى تضم من ٥ الى ٦ بيضات على مرتين
في السنة تحضنها بتسارفة الذكر من ١٢ الى ١٤ يوما .

١٨٤٩٤ - عُصْفُورُ الشَّوْكَ الصَّغِيرِ *

Prunella modularis (S). Accenteur moucheté, Ac. mouchet, Mouchet chanteur, Traina-bulison (F).
Hedge-sparrow (E).

طائر آبد طوله نحو ١٥ سم . ثوبه عادم البياض تملو
مشعة صناعية وتوشم اسمر . يألف الحدائق والادغال
والسيابجات واحراج الصنوبر والتنوب . قوته الحشرات
على اختلاطها والبرور البرية والزراعية || يثدن في
الادغال والاشجار الفتان . الاثنى تضع من ٥ الى ٦ بيضات
على مرتين في السنة المرة الاولى في أيار والثانية في تموز .
الحسن يدوم من ١٢ الى ١٤ يوما وقته يشترك فيه الذكر .

١٨٤٩٥ - **عُصْفُورُ قَارِي** Oiseau-souris (F).

طائر يدعى الخنثور ، اعطيه .

١٨٤٩٦ - **عُصْفُورُ مَائِي** Oiseau-diamant (F).

طائر من فصيلة الصرديات يدعى ريش ، اعطيه .

١٨٤٩٧ - **عُصْفُورٌ** Organe copulateur (F).

Copulatory organ (E).
شوار ذكر كل حشرة مجتمعة واخصها الجرار .

١٨٤٩٨ - **عَصَلٌ** Scorpioide (F). Scorpoid (E).

نمت تعريفي يطلق على ماكان شكله شكل ذنب العقرب
بالانواء والتسمين .

من ٣ الى ٤ سم. صفحت العليا لمساء البشرة خضراء اللون . صفحت السفلى خلية ، فلسية ، خضراء المواجه . نوربًا خفيفة الشكل عديدة الازهار الصغيرة ، قطر الواحدة منها نحو ١٢ سم. لونها الى الياض النحاس || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٨٥١٣ - عَصَلَة صَفْرَاء

Rhododendron lutescens (S). *Rosage jaunâtre* (F). جنبة صبروتية اللد تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها ورفوها دقيقة اوراقها سنائية ذرية . نصلها يطول نحو ٦ سم. صفحت السفلى طلاء اللون ذهبي الحراشف المبشرة . نوربًا تقص من ٢ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. لونها الى الصفار الزاهي || أزهارها يستمر من شباط الى اذار .

١٨٥١٤ - عَصَلَة صَوْبِيَّة الزَهَب

Rhododendron lanatum (S). *Rosage laineux* (F). شجرة صبروتية تملو من ٢ الى ٦ اثمار . ساقها ورفوها واثانها كثيفة الزغب المستطيل العمودي الشكل . اوراقها احليجية مقطوعة . نصلها يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وهو خلى البشرة على صفحته . نوربًا تقص من ٦ الى ١٠ اثمار لونها الى الصفار الباهت تملو نمشة خضراء . أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٨٥١٥ - عَصَلَة عَطِرِيَّة

Rhododendron fragrans (S). *Rosage parfumé* (F). نجلة صبروتية تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ساقها ورفوها دقيقة . اوراقها صفراء احليجية الشكل تطول نحو ٢٥ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا ، اسمر السفلى الفلسية الحراشف . نوربًا طليقة تقص من ١٢ الى ١٥ زهرة ، قطر الواحدة منها نحو ١٢ سم. عرتها مستحب الرائحة لونها الى الصفار الباهت || أزهارها يدم طوال شهر نيسان .

١٨٥١٦ - عَصَلَة قَاصِرَة *

Rhododendron calophytum (S). *Rosage superbe* (F). شجرة صبروتية جميلة الشكل المزدني المقطوع . تملو من ٨ الى ١٥ م. عروفلها واثانها مسرة . اوراقها سنائية تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. نصلها أزغب الصفحة السفلى ، زغبه ليد التجسيم ، اصفر اللون . نوربًا تقص من ٥ الى ٧ اثمار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٥ و ٦ سم. لونها الى الحمرة القاتية الزاهية || أزهارها يستمر طوال فصل الربيع .

١٨٥١٧ - عَصَلَة كَرْوَلِينِيَّة

Rhododendron carolinianum (S). *Rosage de la Caroline* (F). جنبة صبروتية متوسطة اللد تملو من ١٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها غروبيلة الشكل قصيرة البقعة المنبهة . نصلها يطول من ٥ الى ٧ سم. صفحت السفلى خلية البشرة طلاء اللون . نوربًا تقص من ٢ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. لونها الى الوردى اللامع المواجه || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٥١٨ - عَصَلَة كَلِيفُورِنِيَّة

Rhododendron californicum (S). *Rosage de Californie* (F). جنبة صبروتية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها سنائية ، تطول من ٨ الى ١٥ سم. نصلها اطحل الصفحة

١٨٥١٦ - عَصَلَة جَرَبِيَّة

Rhododendron campanulatum (S). *Rosage campanulé* (F). شجرة جاحدة تملو من ٤ الى ٥ اثمار . اوراقها بيضبة الشكل مستديرة الطرفين . نصلها يطول من ٨ الى ١٥ سم. وهو اخضر الصفحة العليا اطحل السفلى . نوربًا كبيرة اللثة ، كثيرة الازهار الجرسية . قطر الواحدة منها يراوح بين ٢ و ٢ سم. لونها الى الالبيض يطلو موجه ليكي وستار احمر || أزهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٨٥١٧ - عَصَلَة خَمَلِيَّة

Rhododendron villosum (S). *Rosage velu* (F). شجرة صبروتية صغيرة اللد تملو من ٥ الى ٦ اثمار. ساقها ورفوها مالة للحماء . اثانها واثانها اوراقها طلية . اوراقها بيضبة الشكل مقطوعة القفاحة ، مذهب القفحة . نصلها خلى البشرة على صفحته طوله يراوح بين ٥ و ٨ سم. نوربًا تقص من ٣ الى ٥ اثمار كبيرة اللد لونها الى الحمرة البنفسجية || أزهارها يستمر طوال الربيع .

١٨٥١٨ - عَصَلَة ذَهَبِيَّة الزَهَر

Rhododendron aureum (S). *Rosage jaune d'or* (F). نجلة صبروتية تملو نحو ٥٠ سم. ساقها ورفوها دقيقة ، رمضاء اللحاء . اوراقها سنائية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم. نصلها قلبي الصفحة السفلى . نوربًا تقص من ٢ الى ٣ اثمار ، قطر الواحدة منها نحو ٢ سم. لونها الى الخضر الاخضر الجليل || أزهارها رديني .

١٨٥١٩ - عَصَلَة رَافِعَة

Rhododendron maximum (S). *Rosage élevé* (F). شجرة صبروتية جميلة الشكل شاملة الاستعمال التريبي . تملو نحو خمسة اثمار . اوراقها خفيفة ذرية تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. نصلها اخضر البشرة على صفحته . نوربًا حلقة الشكل ، حلالية الزناد والمالين والاعم ، حلدية الازهار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم. لونها الى الوردى يطلو توبخ اصفر نمشة خضراء . أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٨٥١٠ - عَصَلَة زَيْتُونِيَّة الْوَرَق

Rhododendron oleaeifolium (S). *Rosage à feuilles d'olivier* (F). نجلة صبروتية متوسطة اللد تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها زيتونية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها فضي اللون احمر الحار . نوربًا تقص بعض الازهار الوردية ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ سم. أزهارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٨٥١١ - عَصَلَة سَمِرْنُوف

Rhododendron Smirnowi (S). *Rosage de Smirnow* (F). جنبة جاحدة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها سنائية مذبذبة تطول من ٧ الى ١٢ سم. نصلها اصفر القلم ، غائر الحروق ، خلى الصفحة السفلى ، مالى العليا الزاهية الخضر . نوربًا تقص من ٣ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٣٠ و ٨ سم. لونها الى الوردى يطلو موجه ليكي || أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٨٥١٢ - عَصَلَة صَغِيرَة الزَهَر

Rhododendron micranthum (S). *Rosage à petites fleurs* (F). جنبة صبروتية صغيرة اللد تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها ورفوها غليظة . اوراقها سنائية الشكل ، نصلها يطول



عَصَلَة قَاصِرَة

الشكل، ليد الارتكاز. تكثر في المروج وفي منظم الأراضي الرطبة من أقاليم البلاد المتحدة.

١٨٥٢٦ - عَصَافَةُ الرُّوجِ *



عصاة مشكة

Phleum pratense (S). *Piéole des prés*, *Massacca*, *Timothy* (F). *Cat's tail*, *Herd's grass*, *Timothy grass* (E). *Timotheeschryas*, *Timotheegrass* (D). *Codolina*, *Foco del prati*, *Erba di Timoteo* (I).

لشجر أنواع العسوية وأصنبا علفاً وأولها إنتاجاً جيد في المراعي بالاشتراك مع الفحل ويختلف البتات القرنية. يرغب في الأقاليم المعتدلة والأترية الجبلية الرطبة المنخفضة في الانسجام. تشبه الصفب تمتلئ بالأكافرا وألفم.

١٨٥٢٧ - عَصَافُ ، عَصَافُ *Juteux* (F). *Juicy* (E). كثير المصير أو الرب.

١٨٥٢٨ - عَصَافُ ، عَصَافُ *Moët* (F). *Musc* (E). سائل سكري يستخرج من بعض الفلار كالمنب والفتح ، الخ.



عصاة الروج

١٨٥٢٩ - عَصَافُ الحَصِيرِ *Verjus* (F). *Verjuice* (E). عصير حب الثوب في طوره القشري المغمسي. يستعمل في تخميص الثريات السكرية وفي صناعة الخردق. وقد يضاف لك الخمر التزويد حوضتها لئلا لو دعت الحامية.

١٨٥٣٠ - عَصَافُ الدُّبِّ هو القالب الفلاح ، أطليه.

١٨٥٣١ - عَصَافُ الدُّبِّ *Cuvée* (F). *Tubful* (E). هو ما يستحوه الدُّب من عصير.

١٨٥٣٢ - عَصَافُ *Ligularia* (S). *Ligulaire* (F). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المريكبات. أنواعه كثيرة العدد ، منها منظم اصقاع العالم. سقفا فردية متصصة تنقسم بالانقسام. أوراقها جلدية الانتساب كبيرة القلعة. أزهارها رؤسي التركيب سبلي أو مفردية للتجميع. قنابات ثلاثية وسيدة الصفب || يرغب في المواقع الرطبة والأترية المنخفضة التركيب الحكي || أعرف أنواعه وأشهرها ما يجمع.



عصاف الحجاب

١٨٥٣٣ - عَصَافُ الحجاب *

Ligularia divorum (S). *Ligulaire des coqueux* (F). نوع من العصف الممر. ساقه زياة مفردة تملو نحو ١٠٠ سم. أودله شبه مستديرة الشكل طولها نحو ٥٠ سم. ورفرها ٤٥ سم. أزهارها حشركلي التجميع. رؤسهاة الزهرية كبيرة القلعة حشلية الإقراص يرتقالية اللسان، قنابها براوح بين ٩ و ١٢ سم || تنوره يستمر من آب إلى أيلول.

١٨٥٣٤ - عَصَافُ بَحْرِيّ القِن *

Ligularia glauca (S). *Ligulaire glauque* (F). نوع من العصف الممر. ساقه مرسة تملو نحو ١٥٠ سم. أودله قلبية الشكل تطلو من ٥٠ إلى ٧٠ سم. نصلها باعث الحفصار سبك الصفبة. أزهارها سبلي التجميع رؤسهاة الزهرية ذعية اللون || تنوره يستمر طولاً شهر تموز.



عصاف بحري القن

١٨٥٣٥ - عَصَافُ سِيرِيَّة *Ligularia sibirica* (S). *Euvif sibirica* (F). نوع من العصف الممر. ساقه مرسة تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أودله كبيرة القلعة تطلو نحو ٤٠ سم.

السلق ، أخضر العليا ، مخين السجج . نوربها تنم من ٢ إلى ٧ أزهار ، قطر الواحدة منها براوح من ٥ إلى ٦ سم. نوربها إلى الإرجواني المنش بالقروزي || أزهارها يستمر طولاً شهر أيار.

١٨٥٣٩ - عَصَافَةُ مُسْتَدِيرَةِ الرُّوجِ

Rhododendron rotundifolium (S). *Rosage à feuilles rondes* (F). جنبه سبروتية تملو نحو ثلاثة أمتار. أودلها مستديرة الشكل قلبية القاعدة تطلو نحو ١٢ سم. ورفرها نحو ١١ نصلها بحري الصفبة السفق ، أخضر العليا. نوربها تنم من ٨ إلى ١٢ زهرة ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. نوربها إلى الوردية الزاهي || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

١٨٥٤٠ - عَصَافَةُ مُشْرَكَةٍ *

Rhododendron hirsutum (S). *Rosage hérissé* (F). بجلة عسوية القلعة تملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. مالها ورفرها دقيقة. أودلها يضيء الشكل ، مقفولة القاعدة ، مدينة العسفة الشالكة. نصلها على البشرة تطلو من ١٥ إلى ٣٠ سم. لوله إلى الحفصار الزاهي. نوربها تنم بفسف الأزهار الصغيرة القلعة الوردية اللون || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

١٨٥٤١ - عَصَافَةُ مُلْتَبِسَةٍ

Rhododendron ambiguum (S). *Rosage ambigu* (F). جنبه سبروتية كبيرة القلعة تملو نحو ٣٠٠ سم. انتابها ضمية الانتساب. أودلها أحليجية الشكل ، نصلها تطلو من ٥ إلى ٧ سم. بشرته بجلة الحفصار اللامع قملوها نمشة خدية سمراء. نوربها تنم من ٥ إلى ١٥ أزهار جرسية الشكل ، كبيرة القلعة ، قطر الواحدة منها نحو ٥ سم. نوربها إلى الصغار اللبوري || أزهارها يستمر طولاً شهر نيسان.

١٨٥٤٢ - عَصَافَةُ مُشْتَكَاةٍ

Rhododendron insignis (S). *Rosage remarquable* (F). بغيرة جادة عسوية الشكل تملو من ٣٠ إلى ستة أمتار. أودلها سنائية تطلو من ٨ إلى ١٢ سم. نصلها جميل الحفصار اللامع البشرة. نوربها تنم من ٨ إلى ١٠ أزهار ، قطر الواحدة منها براوح بين ٤ و ٥ سم. نوربها إلى الأبيض الموشج بالوردية || أزهارها يستمر طولاً فصل الربيع.

١٨٥٤٣ - عَصَافَةُ مُهْدَبَةٍ

Rhododendron ciliatum (S). *Rosage cillé* (F). بجلة كبيرة القلعة سبروتية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أودلها سنائية الشكل ، خدية النصل ، مدينة الزام الأخير ، طولها نحو ٥ سم. صفحتها العليا ناعمة البشرة الأخضر اللون. صفحتها السفلى خدية ، مرفطة ، مهدبة ، طحله اللون. نوربها تنم من زهرتين إلى ست أزهار ، قطر الواحدة منها براوح بين ٤ و ٥ سم || أزهارها يستمر طولاً شهر نيسان.

١٨٥٤٤ - عَصَافُ *Vent violent* (F). *Strong gale* (E). العصف والعصفب الربع الشديدة.

١٨٥٤٥ - عَصَافَةُ ، ذَيْلُ القِن

Phleum (S). *Piéole*, *Phéole* (F). *Cat's-tail grass* (E). جنس أعشاب مرعوية برية وزراعية من فصيلة النجيليات، أنواعه المعروفة ١٠. جميعها شتلية. سقفا حقيقة متصصة. عصفها سنائي مستطيل. أزهارها سبلي التجميع ، اسطواني

ذهبتا الحلقة المطوقة بالابيض . زعنفتها الظهريّة مستطيلة قاطبة . زعنفتها الشريفة خط من المناسخ اللّدية . زعنفتها اللّيلية حلالية الطرف || لحها متوسط الصّنف ، مأكول .

1٨٥٤٥ - عُصْبَاكَة ، أَلْبَيْدَاك

Alidade
جهاز التشطيط يستعمل في المساحة وهو مركب من مسطرة لها مصوّتان شاقوليتان موجهتان بالتوازي مع حافة طرفها .

1٨٥٤٦ - عُصْكار
Loranthus schimperi (S).
نوع من الحاصل يزرع للزّين . راجع حصال .

1٨٥٤٧ - عُصْاه
النضار: كل شجر يعظم وله شوك . وما صغر من شجر الشوك فهو الغص . وما ليس بغصّ ولا عصاه من شجر الشوك ، فالشكامي والحلاوي والحاذي والكتب والساج . الواسعة عصاة وضّة .

1٨٥٤٨ - عُصَاكَة ٥
Organisme (F).
هي الجهاز النضوي الذي يميز الاجسام الحية من الجاهز .

1٨٥٤٩ - عُصَاخِي ، مُعَقَق ، مُعَقُون

Organisé (F). **Organic** (E).

1٨٥٥٠ - عُصْبُ البشب : هو المبل عند طلوع قرنه .

1٨٥٥١ - عُصْبَة * ، عُصْبَة البَيْكَاك

Silphium (S). **Silphe**, **Plante au compas**, **Silphide**, **Silphie**, **Silphion** (F). **Compass plant**, **Bastard chrysanthemum**, **Polar plant** (E). **Geschlitzte Tassenpflanze** (D). **Silfo** (I).

جنس نباتات جنينية زينة ممرّة من فصيلة المركبات . انواعه ١٢ ، اصلها المائي . سوقها دماغة صابرة وانجيّة . اوراقها ضيقة التجميع . ازهارها رؤسيّة كبيرة اللّدة صفراء اللون . زهورها مفلطحة ومجمّعة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

1٨٥٥٢ - عُصْبَة ثَلَالِيَة الْوَرَق

Silphium trifoliatum (S). **Silphe à feuilles ternées** (F).
جنبة ممرّة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها اسطوانية تتميز بنفارة مادتها الراتنجية . اوراقها ضيقة ثلاثية التركيب ، مراءاة الشكل ، قليلة القواعد ، جلدية النصل ، مسنة الحافة ، طول نحو ٣٠ سم . وتقرض ١٥ سم . || رؤسيّاتها الزهرية متوسطة المدد قطرها يراوح بين ٤ و ٥ سم ، لونها الى الصفرة || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

1٨٥٥٣ - عُصْبَة رَاتِنْجِيَة

Silphium terebinthaceum (S). **Silphe térébinthacé** (F).
جنبة زينة ممرّة تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها تتميز بنفارة مادتها الراتنجية . اوراقها ضيقة التجميع ، بيضيّة الشكل ، قليلة القواعد ، جلدية النصل ، مسنة الحافة ، طول نحو ٣٠ سم . وتقرض ١٥ سم . || رؤسيّاتها الزهرية عديدة ، قطرها يراوح بين ٥ و ٨ سم . لونها الى الصفرة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

1٨٥٥٤ - عُصْبَة مَحْرُوقَة

Silphium perfoliatum (S). **Silphe perfolié** (F).
جنبة ممرّة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها رباعية التضلع . اوراقها متقابلة مدعّمة الاذنين التي تبدو مقعرة كالكتب توصّلها الاذنان || رؤسيّاتها الزهرية عديدة ، قطرها يراوح بين ٥ و ٨ سم . لونها الى الصفرة الشاحبة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

وتقرض نحو ٣٠ . رؤسيّاته الزهرية ذهبيّة اللون ، سليليّة التركيب ، قطرها يراوح بين ٤ و ٥ سم . لسنتها ثنائية التفرع تبدو كأنها مزوجة || تنوره يستمر من تموز الى آب .

1٨٥٣٦ - عُصْبَيْف كَبِير الْوَرَق

Ligularia macrophylla (S). **Ligulaire à grandes feuilles** (F).

نوع من العصيف الممر . ساقه زياه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه اعليجية الشكل طول من ٤٠ الى ٥٥ سم . نصلها الى الخضار الازرق المائج . ازهاره سبلي التجميع ، رؤسيّاته الزهرية كبيرة اللّدة ، عطلة الاقراص ، صفر السنتات || تنوره يستمر من تموز الى آب .

1٨٥٣٧ - عُصْبَيْف يَابَانِي

Ligularia japonica (S). **Ligulaire du Japon** (F).

نوع من العصيف الممر . ساقه سرطه تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة اللّدة سباجية او تساعية التفرع . نصلها طابق اخضر سبك الصفرة . ازهاره عقودي التجميع . رؤسيّاته الزهرية صفر الاقراص ، حر السنتات ، كبيرة اللّدة ، قطرها نحو ٩ سم || تنوره يستمر طول فصل الصيف .

1٨٥٣٨ - عُصْبَيْفَة

Glume (F). **Husk**, **Chaff** (E).
قناة تحيط ببنتيلة النجيليات وما عصيفتان لكل سنبلة .

1٨٥٣٩ - عُصْبَيْفِيكَة

هي الجها ، اطبا .

1٨٥٤٠ - عُصْبِيل ٥

Sclerospora (S).
جنس فطور مجهرية من عمارة السنتات ونسيلة السنتات . يتميز بقصر خيوطه البويّة ولّقة تشعبا وكبر يبيضها واستدارة مرافقها || انواعه المرفقة قليلة اشهرها عصيل النجيليات .

1٨٥٤١ - عُصْبِيل النَجِيلِيَّات ٥

Sclerospora graminicola, **S. macrospora** (S).
فطر مجهرى من العصيل يتميز بلسوداد يبيضاته الكبيرة الحجم التي يبلغ قطرها نحو ٦٠ مي . || ركب شرائف الحنطة والذرة وقد يتعداها الى الازرار . ظهوره الحادوي سقم واصفرار ثم تتبع اتصال وقد يؤدي الى الجسنة وانعاص الازرار .

1٨٥٤٢ - عُصْبِيل

Feuilles des arbres (F). **Leaves** (E).
العم : هو ورق الشجر .

1٨٥٤٣ - عُصْبَا ، عُصْبَى

Lotir (F).
قسم الارض الى عدة حصون .

1٨٥٤٤ - عُصْبَايَة لِيْفِيَة ٥

Lapidopus argentatus (S). **Lépidope argenté**, **Argentin** (F). **Argentine** (E).

سمكة بحرية مقعرة يبيض من فصيلة السيفيات شائعة الزمان . اصلها اقراص ونفاق البحر الابيض المتوسط || جسمها مستطيل الشكل ، مبط الجرم كمثل السيف يطول نحو ١٤٠ سم . لونها الى الازرق ملبها موج ودي وشقة فضية تتخللها نقط ذهبيّة . رأسها وظهورها امبق عصافاً من ابطلها وبطنها || رأسها شبه اسفين الشكل مستطيل الطول . شفتها كبير . اسناتها كبيرة اللّدة منها الثابتة والمسرّكة والذرية والمنقعة || ميناها كيرتان



عصيل النجيليات



عصاة فضية



عصبة

وفلسطين. يكثر قرب الحقول المزروعة والبيارات. يلتصق بقوة في النهار. جمره دهاليز فسيحة عديدة الانفاق يخزن فيها ما استطاع من حبوب.

Silphium laciniatum (S). عشب مشرقى - ١٨٥٥٥
Silphium lacinié (F).
 عشب معمر متعلق من متر الى مترين ساقها حليلة خشنة .
 اوراقها لائشة متعاقبة دائمة الاتجاه الى اليمين .
 شتم الصفحة ، تشريحه يبلغ الضلع ١١ ورياسها الزهرية
 ككرة القند ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٢ سم .
 ايضا الى
 المصار الكبريتي الزاهي .
 انزعروها يستمر من تموز
 الى ايلول .

عضلة 18077

مجموعة من الألياف تتبسط بواسطة الجهاز العصبي الإرادي. تتصل العضلات بالجهاز الهيكلي التي يتركب منها الجهاز الحركي إلى ثلاثة أقسام : قسم العضلات الإرادية أو العضلات الخشنة التي يتحكم فيها الجهاز العصبي وتتقلص وتتصلب بفضل الإرادة . وقسم العضلات غير الإرادية أو العضلات اللينة ، التي غير الخشنة هي التي لا تأتمر بأوامر العضلات كعضلات الحنجرة والعضلات الأوعية الدموية . ثم قسم عضلات القلب ، هي من العضلات الخشنة ولكنها غير الإرادية تتبسط بإستمرار الحركة طوال الحياة .

Loe ١٨٥٦ - عضة
هي الحصة أو السهم أو النصيب وهي القسمة من الشيء
أو الجزء منه : ج عضون .

Emondage (F). عَصْد - ١٨٥٧
Pruning, Lopping (E).
عصر الفرع والاختصار الكبيرة التي تبنت على السوق.

Bras (F), Arm (E). ١٨٥٥٨ - عَفُود
من اعضاء نواتم التواب الامامية . ج اعضاء واعضد .

١٨٥٩ - عَضُدُ زَيْدِي، عَضُدُ مِرْقَاسِي
Brachio-cubital, Huméro-cubital (F). Humero-
cubital (E).

١٨٥٦ - عَقْدُ كُفْرِي ، عَقْدُ كُوعِي
Humero-radial (F), Humero-radial (E).

Brachlopoda (S). - عَفْدِيَّاتُ الْأَرْجُلِ
Brachlopodes (F). Brachlopoda (E).

شعة من صف الشاه الديدان .

١٨٥٦٦ - عسفر
هو الحطبي الخزني زهره قال " الحيرة تسد منه جحافل
النداب اذا اكلته .

Calotes (S). ١٨٥٦٣ - مَغْرَلُوط *

Calote, Lézard-ariéquin (F).
جلس عظام من فصيلة الحرفونيات. أنولاه ♀ أعطاهها
البلاد الحارة الاسيرة. تتميز باستطالة اذنانها البنية
وبقدرتها على الاستطوان (الماتنة) || تألف الادخال والنايات
والحراس. قوتها الحشرات.

١٨٥٦٤ - عَفَّيْ كُوطْ مِلْثَوَانْ *

Calotes versicolor (S). Calote versicolore, Lézard-arlequin versicolore (F). Versicolour calotes (E).

حيوان يعيش من الظل، وقصبة الخرنوبيات شرافات
الإنسان، كمسكنات الالسة، ربايعات القمام،
خناصات الأصابع الخجسه يطول من ٢٧ إلى ٤٠ سم.
تربة الربة الخشبية تنلها رقة مرار. قوائمه مجده.
بالسر. وهو كاسائر أنواع جنسه يتميز بالشوكة لثابت
الحيط الذي يوجد فيه الخأف الأدغال والمراج المبشرة
الانجرار. يعيش ذكراً وأنثى من اواسط الربيع الى اواخر
الخريف.

Psammomys obesus (S). * ۱۸۶۵ - عَفْصَل
Psammomys obesus (F).

ميوان لبون قاض من فصيلة الفأرييات. وحيد الجنس والنوع. شكله شكل الجرذون، طوله نحو ١٩ سم. وذنبه ١٤، ثوبه الى الريدة الصهباء. موطنه ربال مصر وسيناء.

Muscle extenseur (F). عضلة ممتدة - 1867
Extensor muscle (E).

Muscle abdominal (F). عَفَلَة بَطْنِيَّة - ١٨٥٦
Abdominal muscle (E).

Muscle alaire (F). **عضلة جناحية** - ١٨٥٦٩
Alary muscle (E).

١٨٥٧ - عَفِيلَة حَاجِيَّة ، عَفِيلَة كَامِلَة

Muscle corrugateur, Sourcilier (F). Corrugator muscle (E).

Muscle Iliaque (F). عَصَلَة حَرْقِيَّة - 1A0V1
Iliacus muscle (E).

Muscle malarie (F). عَضَلَةُ خَدِّيَّة - ١٨٥٧٢
Malaris muscle (E).

Muscle circulaire (F). عضلة دائرية - ١٨٥٧٣
Circular muscle (E).

Muscle releveur (F). عَفْلَة وَ الْعَفْلَة
Levator muscle (E).

Muscle anal (F). **عضلة قُرْجِيَّة** - 1A090
Anal muscle (E).

Muscle pectoral (F). عضلة صدرية
Pectoral muscle (E).

Muscle temporal (F). عَفَلَة مُذْهَبَة - ١٨٧٧
Temporal muscle (E).

Sphincter - عضلة عاصرة

١٨٥٧٩ - عَفْلَكَة مَادَّة ، عَفْلَكَة مُدَّة
Muscle protracteur (F). Protractor muscle (E).

١٨٥٨٠ - عضلة مُبْعِدَةٌ ، عضلة فَائِحَةٌ
Muscle abducteur (F). Abductor muscle (E).
عضلة مسندة عضواً عن محور الجسم .

Muscle striô (F). عَضَلَةٌ مُنَطَّلَةٌ - ١٨٥٨١
Striated muscle (E)

هي كل ضلة في الجسم يسيطر عليها الجهاز العصبي
فيسر انقيانها وانسائها.

١٨٥٨٢ - عضلة مدارية ، عضلة الملاحم
Muscle orbicularis (F). Orbicular muscle (E).



مضمون قوت



عنصر قوت ملوان



عقلا

البرية تستغرق ٢٤ ساعة و٥٠ دقيقة . اما دورته الفلكية حول الشمس فتستغرق نحو ٨٨ يوماً || يقال ان حجمه لا يفوق بطن من جرم الارض وهو يرى دائماً مغشوراً بنور الشمس نظراً لقربه منها . ويقال انه لا يوجد حول سطحه غلاف جوي وان حرارته تبلغ نحو ٢٥٠° مع || اما المتجملون فيدعونه منافقاً لكونه مع السد سداً ومع الناس نحساً .

١٨٥٩٩ - عَطُوف هو التاردين الاقليبي ، اطلبه .

١٨٦٠٠ - عَطُوط * Telophorus (S).

Telophore (F). Telophorus (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم مشروبات الخناثير وفضيلة الصرديات . اصطناع تمتد من افريقية الجنوبية الى الاستوائية والشرقية . وهو من الصوارب التي تجوب البلاد في طلب الرزق . ملجئه الحيائي زبجي الا في زمن القطار . قوته الحشرات والديدان الصغيرة والبروزور والثآليل جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم . متقاده متدل الجرم . ضليح . جناحه متوسطا القد . ذنبه متدل الطول ، مستدير الطرف . ثوبه الملوي الى الخضار الالاس ، اطراف ابطاه واطراف رقاله الى الحمرة الاريموانية . ثوبه السفلي ، من الرزور الى الافنيك ، احمر القين صناعي المربع . متقاده جريزي . رضاء واصابعه الى * السرة القائمة || يدن عشه في الاشجار الرقيقة . الاثني تحسن من ٤ الى ٦ بيضات . التريشم يشر نحو ١٥ يوماً تقوم بها الانثى دون الذكر الذي يزين لها الغذاء والحماية .

١٨٦٠١ - عَطُاسِي * Faunistique (F). Faunistic (E).
كل ما له صلة بالعلم وبالحيوانات الداجنة في كورة معينة .

١٨٦٠٢ - عَطُاس ، عَقُص Tanin (F). Tannin (E).
مادة حامضة قابضة توجد في النسج بعض النباتات . حصرها الفعال يدعى الطان . والطان يختار من المغويات الطبية الصنية وهو يستعمل في الدبابة .

١٨٦٠٣ - عَطُوب هو القطع ، اطلبه .

١٨٦٠٤ - عَطُوب ، عَطُوب النلية الطويلة المتق .

١٨٦٠٥ - عَطُر Essence (F). Species, Attar (E).
سائل طيار طيب الرائحة يكون بحالة شيفات في خلايا النبات او في قوتلها وبيورها الخاصة .

١٨٦٠٦ - عَطُر هو البهون المر ، اطلبه .

١٨٦٠٧ - عَطُر القنداح ، دهن القنداح ، نيرولي Neroli (F). Neroli (E).
عطر يستعمل عليه من تقطير زهر التارنج الذي يدعى قنداحاً .

١٨٦٠٨ - عَطُر جَعْدِي هو الحيازة الجسدية ، اطلبها .

١٨٦٠٩ - عَطُوف Vipère (F). Viper (E).
الانثى الكبيرة القد .

١٨٥٨٣ - عَصَلَة مَرْقَبَة ، عَصَلَة قَلِيلَة

Muscle adducteur (F). Adductor muscle (E).
عضلة مرقبة مضموا الى محور الجسم .

١٨٥٨٤ - عَصَلَة مَقْتَصَة Muscle constrictor (F). Constrictor muscle (E).

١٨٥٨٥ - عَصَلَة مَسَاء Muscle lisse (F). Skin muscle (E).
هي العضلة غير الخططة التي لا تؤثر فيها الإرادة او الجهاز العصبي .

١٨٥٨٦ - عَصَلَة هُدَيْبِيَّة Musc ciliaire (F). Ciliary muscle (E).

١٨٥٨٧ - عَصَمَكُورِي Micro-organisme (F).
هو كل كائن حي متناهي الصغر . ويدعى قفطور ، اطلبه . اما كلمة عصمكري فن وضع المجمع العلمي في مصر . ج . عصمكريات .

١٨٥٨٨ - عَصُوف Organe (F). Organ (E).
جزء من كائن مركب ، ويوجد له لازم او ضروري . ج . اعضاء .

١٨٥٨٩ - عَصُوف التَلَكِيح ، عَصُوف Organe copulateur, O. de copulation (F). Copulatory organ (E).

١٨٥٩٠ - عَصُوف سُبَاكِي ، عَصُوف ودَاكِي Organe carotide (F). Carotid organ (E).

١٨٥٩١ - عَصُوف شَمِي Organe olfactif (F). Olfactory organ (E).

١٨٥٩٢ - عَصُوفَة Fissiparité (F). Fissiparism (E).
المضوة والتضفية ، التناسل بالاتقسام الى شطرين كما هي الحال عند الاولاي والتكثيريات .

١٨٥٩٣ - عَصُوفِي Organique (F). Organic (E).
نمت تعريف توصف به اعضاء والاجسام والمواد المضوية من اي فئة كانت .

١٨٥٩٤ - عَصِيد Effouillure (F). Stripping off the leaves (E).
ما انتزع او اسقط من الورق .

١٨٥٩٥ - عَصِيد * Palmette (F). Palm-shaped (E).
شكل من اشكال تقلم الاشجار المشرفة .

١٨٥٩٦ - عَصِي Fente longitudinale (F). Longitudinal slit (E).
العد : الشق طولاً . انعطاف الخشب : الشققة طولاً .

١٨٥٩٧ - عَطَار Strombus lantiginosus (S).
نوع من الدلاء يكون منه انظار الطيب .

١٨٥٩٨ - عَطَارِد Mercure (F). Mercury (E).
كوكب سيار من الخس ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي وهو اقربها من الشمس . سرعة دورته الانتقالية في الفضاء تبلغ نحو ١٩٩٥٠٠ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية



عصيدة



عطا

Tige volatile (F).
Volatile stem (E).

١٨٦١٥ - **عُطُوفَة**

هي الساق التي تنطف وتلتف حل دعامتها .



عُطُوف ثَنَات

Vrille (F). **عُطُوفَة ، حَالِيَة ، لُزِيْبَة**
Yendril (E).

ورقة تحولت الى حرق لين التركيب اسطواني الشكل ، مستطيل ، يمكن الثبات من التقلص والتقبض كما في الكرومة وبغيرها .

Antophorus imperialis (S). **عُطُوفُور** *
Aétophore impériale (F).

حشرة ذاتة من فصيلة السلكيات ورتبة مفدمات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة . تألت المقاصب والمناقص التي يكثر فيها الاصل لانها تعيش على المواد النباتية المتحللة تحت التقصيب والاصل المطروح ارباً في جسمها مستطيل الشكل ، مبطط الجرم ، يطول نحو ١٢ سم . زياتها غيلاني . كولها منزلي الشكل . ثوبا الى الصفرة الصنائية المواج بملها في ظهورها خمس نقط سود . ظهورها لا يلحف كامل الجسم .



عُطُوب

Hédéracé (F). **عُطُوفِي ، تَبَلَايِي**
Hederaceus (E).

نمت ترعقي توصف به السوق النباتية اللدادة او اللسلفة الليلية الشكل .

١٨٦١٩ - **عُطُوف** راجع افسد .

Otolithus (S). **عُطُوفِيَة** *
Otolithe (F). Otolithus (E).

جنس اسماك بحرية من شاتكات الزعانف وفصيلة البهاريات . انواعها المعروفة نحو عشرة . اصلها بجار البلاد الحارة || جميعها كبيرة القد ، مستطيلة للحد الاسفل ، مقعرة الزعانف الظهرية الشائكة ، عمودية التليل || الثوبا الى الجلود يطولها مواج اخضر يثير عنه البطن ويسمر في الظل || لحونها جيدة الصف مرقوب فيها .



عُطُود

Faune (F). Fauna (E). **عُطُود** *
انظم هي مجموعة حيوانات كورة او قطر او حبة جيولوجية .



عُطُود

Faune abyssale (F). **عُطُود لُجِيَّة** *
Abyssal fauna (E).

مجموعة الحيوانات البحرية على اختلاف رتبها وعضائها وابتناسها التي تعيش في المناطق العميقة من البحر .

Faune aquatique (F). **عُطُود مَائِيَّة** *
Aquatic fauna (E).

مجموعة الحيوانات المائية التي تعيش في منطقة بحرية عاصة او معينة .

FaunIQUE, FaunIQUE, **عُطُوفِي** *
FaunIQUE (F). FaunIC (E).

نمت ترعقي يطلق على ما هو خاص بالعلم .

Milieu climatique naturel (F). **عُطُوف** *
Natural habitat (E).

هي البيئة المناخية الطبيعية الخاصة بالحيوان او النبات ج اطلان .



عُطُوف

١٨٦١٥ - **عُطُوف ثَنَات * ، بَخَاغ ، بَزَائِي**
Sapedon haemachata (S). Cobra cracheur,
Haemachata, Serpent cracheur (F).

حية سرلودة سامة من العظوفات امانيات الاخاديد مشهورة بقلقت معها مع العلم في وجه من تخبره مهاجراً || جسمها متوسط الثخانة يطول نحو ٦٥ سم . ثوبا الى الصفرة الحليطة المواج بملها من عنقها الى طرف ذنها تجتمع جميع جلوي متعرج وتضطوط دقيقة متكررة ومتضاربة سوداء اللون . رأسها لوزي الشكل . عنقها مستطيلة . عيناها مستطيرتان قزميتان . عدد اسناتها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و٢٦ في الاصل من اصلها عقاقطان امانيات دربتان لامتراكسان || بيئاتها الشتوية يستمر نحو حبة اشهر . تبلغ كامل نموها بمر ١٢ سنة وتعيش نحو ٩٥ سنة || تعتبر من الثعابين الشديدة الاذى .

١٨٦١١ - **عُطُوفُور** *
Ectropius (S).
Ectrople (F). Ectroplus (E).

جنس اسماك بحرية وبحرية من شاتكات الزعانف وفصيلة البهاريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصلها اغوار انهر الهند || اجسامها بيضية الشوزن ، مبططة ، متقشرة ، تطول من ٢٠ الى ٢٧ سم . رؤوسها شبه مخروطية الشكل ، صغيرة الاضلاع . عيونها صغيرة ناشرة . زعانفها الظهرية مستطيلة عشارية الاضلاع والمناقص الحادة تقابلها الشرجية المائلة شكلاً وقداً ، الحوضية صغيرة مزوانية والبطنية كذلك . الذيلية مستعرضة مقطعية || الثوبا الى انضمار البحري يملو تجتمع متعرج ينسجى اللون . ونها انواع مرقوبة بالفضي واخرى فضية البين || لحونها مأكولة مرقوب فيها .

١٨٦١٢ - **عُطُورِيَّة** *
Erythrurus (S).
Erythrure (F).

جنس صغافير صغيرة القد من الجروام مخروطيات الشاثير وفصيلة الزنبقيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الفزابع . ملجئها الحيواني جماعي اسرابها تمد اكثر من مة زوج || اجسامها صغيرة مكنكة قريبة الشبه بالنوري الا انها قصيرة الذئاب المقنونة . ثوبا الى انكهية بملها مواج اخضر او اشقر . بطونها الى القفزة . ونها نوع ثلاثي الالوان الزاخرة يكثر وجوده في غابات تيمور .

١٨٦١٣ - **عُطُورُور** *
Chloranthe (F).

جنس نباتات جينية وعشبية معمرة من فصيلة الطورديات . انواعها المعروفة عديدة اصلها بعض المناطق الاستوائية والحارة من القارة الاسيوية || اوراق زانها جميع الاتواح عطرية العرف المسحب . وينهم من استعمل الاوراق استعمال التنوع والشاي .

١٨٦١٤ - **عُطُورُورِيَّات** *
Chloranthaceae (S).
Chloranthacées (F). Chloranthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمات القمالات مرتفعات المنبس . اجناسها وانواعها عديدة فيها الاشجار والشجيرات والنباتات والاشواب . اصلها المناطق الاستوائية والحارة من الهند الى جزر المحيط الهادي الى اسركية الجنوبية || اوراقها بسيطة متعاقبة . ازهارها سبيلة التسبيح . ثمارها لوتوية ، متدلية ، صغيرة التيط المحفوف بلبقة آمية متسكة || اشهر اجناسها الطورود والاسكرين .

مختلفة الأسياح والالوان ، تغلب فيها الاستطالة والاشكال المتسجمة والالوان الخضر النحاسية الالامه || جميعها مفيدة صغيرة قوتها الحشرات والحوام .

١٨٩٣٦ - عَظَامِيَة الحَيِطَان

Lézard des murailles (F).

هي بحلية الحيطان ، اطليا .

Lézard vert (F).

١٨٩٣٧ - عَظَامِيَة خَضِرَاك

هي بحلية خضراء ، اطليا .

Lézard agile (F).

١٨٩٣٨ - عَظَامِيَة رَشِيكَة

هي بحلية رشيقة ، اطليا .

Lézard vivipare (F).

١٨٩٣٩ - عَظَامِيَة وَلَوْد

هي بحلية ولود ، اطليا .

Azara microphilia (S).

١٨٩٤٠ - عَظَر

Azara à petites feuilles (F).

شجيرة برية وتربى بين من فصيلة النضيبات . مهدها بلاد الكليل ، ساقها غراء تملو من ٤ الى ٦ م . فروصها متعاقبة مزدوجة للتصنيف . اوراقها ابيدة متعاقبة معتقة صغيرة القد تطول من ٢٥ الى ٣٠ م . تصلها جامد الصفة ، رمي الشكل ، سنن الحافة . ازهارها عطرية العرف ، صغيرة القد خضراء اللون ، محورية الارتكاز . ثمارها غنية ، برتقالية اللون || تنورها يستمر من اواسط شباط الى اواخر آذار .

١٨٩٤١ - عَظَلَم

هو الوصمة ، ثبات عظمي من الصليبيات . وهو اسم عدة صيغيات ذرق انحصار الوصمة والثلث ...

١٨٩٤٢ - عَظَلَم

هو غرط الصفاين ، اطليا .

Os (F). Bone (E).

١٨٩٤٣ - عَظَلَم

نسيج شام صلب يتكون منه الهيكل العظمي الحيواني وهو مركب من اربع طبقات : - (١) الطبقة الخارجية المرونة بالسماق وهو غشاء ليفي غالف - (٢) الطبقة القشرية الشديدة الصلابة - (٣) الطبقة الداخلية الهشة المعروفة بالانغسية - (٤) الخضاعة وهي المادة البنية التي تملئ جيوات الطبقة الانغسية ومن اسماها الرم والقي . والنظام تتعمل في عدة صناعات اهمها صناعة الاسنة القصورية كما تدخل في غذاء الحيوان والطير .

Os spongieux (F).

١٨٩٤٤ - عَظَلَم اسفنجي

Spongy bone (E).

Fémur (F).

١٨٩٤٥ - عَظَلَم الفخذ

Femur, Thigh-bone (E).

اقوى عظام الجسم واسهلها ، يتألف من العظم الطويل يحده من طرفه الأعل الدور وتوابعه ومن طرفه الاسفل تنوء اللقمة أو القمتين .

Bréchet (F). Breast-bone (E).

١٨٩٤٦ - عَظَلَم القَص

هو الجوشور ، عظم صدر الطير .

Scapulum (F).

١٨٩٤٧ - عَظَلَم الكتف ، عَظَلَم لَوْرِي

Calcaneum (F).

١٨٩٤٨ - عَظَلَم الكَعْب ، عَظَلَم

Heel-bone (E).

Echusa (S).

١٨٩٢٦ - عَظُوز *

Echusa (F). Echusa (E).

جنس دوبيات بحرية من قشريات عشاريات الابريل قصار الليل فضيلة اللباليات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطيا عبار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها ينج لا تقرب الشطوط الا في زين التسهرة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، متراكبة للتصايف المدببة الاطراف . تتميز بالانجاس القرمط المزدوج بين قوائمها ، زويان كبيران مستطيلان ، وزويان صغيران . ملاصقها قصيرة ، شديدة القسظ . حيثما دبوبية . اولياها الى الخضر الازرق تملو ساجه حراء . قوائمها الكبيرة ويلاصقها مطوق بالاصفر والوردي .

Don (F).

١٨٩٢٧ - عَظِيَّة ، نَحَلَة

هي الحبة على اختلاف اشكالها .

Androcée (F). Andracium (E).

١٨٩٢٨ - عَظِيل

هو جهاز التذكير في النبات ، واسع جنس .

Filago (S).

١٨٩٢٩ - عَظِيل *

Filago, Filago, Herbe à coton (F). Horsetail, Cotton rose cud-weed, Cud-weed (E). Schimmeltkraut (D). Filago, Filonia, Camapicchio, Erba da Cotone (I).

جنس نباتات عشبية برية من المركبات الشرويات . انواعه المعروفة لا تجوز الالبانية جميعها نباتات بحلية غرام . اوراقها عطية . ازهارها دوبيية كثيفة التجميع يطولها عند الادراك زغب ابيض اللون يشبه لطف القطن . قالوا انها لا تنخر من المنافع الطبية لكنهم اهلوا ذكرها .

١٨٩٣٠ - عَظَلَم

اسم تعريفي شامل يطلق على معظم الزسولات التي كلتني الى رتبة لفظيات .

Sauriens, Lacertiliens (F).

١٨٩٣١ - عَظَلَمِيَّات

Saurians (E).

رتبة العظاء وهي حيوانات زحافة بيوضة عادمة الدم . مفترسة قوتها الحشرات والحوام . فصائلها ٢١ ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها صماء الاذن ، جليزية الصدر ، رباعية القوائم او ثنائيتها او عادمها . اجسامها مستطيلة ، اصلها حشوية ، اجناسها متحركة || اشهر فصائلها الجروديات والحرباويات والحزدييات والمنجويات والحناقيات والمستقرديات والسليليات والصديقيات واليهشقيات والقافرات والقهرقيات والورليات والورقيات .

Carpe (F).

١٨٩٣٢ - عَظَلَم المِغْم

Carpus, Wrist (E).

Iles (F). Ila (E).

١٨٩٣٣ - عَظَلَم حَرَكِيَّة

le Lézard (F). Lacerta (E).

١٨٩٣٤ - عَظَلَمَة

العظاية كركبة تجوم شمالية المخج مركزها بين كوكبي الدجاجة والذرة المسلسلة || جميعها قليلة العدد بعضها ملون ألونها من المرتبة الرابعة .

١٨٩٣٥ - عَظَلَمَة * ، صَئَابَة ، صَحَلِيَّة

Lacerta (S). Lézard (F). Lizard (E).

النظاية والصفانة ج عطاء وطيابا ونظايات ، جنس حيوانات زحافة من فصيلة السقايات . انواعه عديدة



عظيل



عظاية

18166 Saurographie, Saurologie (F). عَفَافَة

Saurology (E).

الطبعة علم يبحث في الطائيات على اختلاف فصائلها وأجناسها .

18167 Saurographique, عَفَافِيَّة

Saurologique (F). Saurologic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمعنة .

18168 عَفَاكِر

شجر يشتهر منه الزناد كاللرخ . قال أبو حنيفة : « أخيرني بعض الإعراب أن العفار شبيه بشجرة التبرء ونورها أيضا كنورها وهو شجر حوكر . ولذلك جاد الزناد . وحده عفاكة » .

18169 عَفَاكِرَة

أداة خاصة تدر بولسها مختلف المساحق الحشورية والفاطورية المستعلة في مكائسة الحشرات والقطور والأصنام .

18170 Noix (F). Walnut (E). عَفَاكِرَة

المفازة في الجوزة للأكلية . ج. عفاز .

18171 Capsule de coton (F). عَفَاكِرَة ، بَيْتَم

Nut of the cotton (E).

المفازة والكنية . ج. عفاز وكناج ، هي جرة القطن المروقة مائياً يجوز القطن أو لوز .

18172 Traitement curatif (F). عَفَاس

Curative treatment (E).

العفاص . ج. عفاصات هي العلاجات الشافية في الحيوان والنبات .

18173 Fulgula (S). عَفَاس

Fulgule, Nyroca, Canard plongeur (F). Nyroca (E). جنس طيور مائية من عائلة العفاصات وفضيلة البطيات . اقترحه عديدة جميعها من القواطع . أجسامها ربة قدرها قدر الريشة الصغيرة . منقحتها مبطلة مرفضة القاعة . أوتارها بلقاء اللون فيها الأبيض مع الرمادي مع الآخر والأزرق والبنفسجي والأسود . ذكورها أثير من أنثاها وأكبر . جسمها مئياً . قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات وكل ما هو صغير . لها تقشقة بالطنس . وهي تغفل المياه البحرية على البنية || تدفن في الأسر والقصب على ضفاف البحيرات . أنثاها تضع من ٨ إلى ١٠ بيضات تحضنها وحدها من ٢٢ إلى ٢٣ يوماً .

18174 عَفَاس أَبْلَق

Fulgula marila, Nyroca marila (S). Fulgule à collier, F. milouina (F). Scamp (E).

نوع من العفاص طولها نحو ٥٠ سم . أخضر الرأس ، مطوق العنق ، أسود الجوزة والذنب ، أبيض البطن ، سحلي للثقاد ، أحر العين ، أصغر الرجل .

18175 عَفَاس أَبْيَض * ، عَفَاس كَبِير

Catangula glaucion, C. hyemalis (S). Fulgule de milouen, Garrot vulgaire (F). Several duck (E).

نوع من العفاص يطول نحو ٦٥ سم . رأسه ورعقونو أل . اللون . سائر جسمه الى الأبيض الناصع . منقده أسود . يألف مياه المناطق الباردة والمستعلة .

18169 Ischion (F). Ischium (E). عَظْمُ المَعْدَنَة

Vomer

18169 عَظْمُ المَيْكَمَة ، مَيْكَمَة

Os parietal (F). عَظْمُ جِدَاكِرِي

Parietal bone (E).

18169 عَظْمُ جَفِي

Os cotyloide (F).

Cotyloid bone (E).

18169 عَظْمُ حَلَزُونِي ، عَظْمُ مَقْنُون

Os turbid (F). Turbinal bone (E).

18169 عَظْمُ زَوْرَكِي

Os scapoid (F).

Scapoid bone (E).

18169 عَظْمُ صُدْهِي

Temporal bone (E). هو الجزء المحيط من عظم القفص .

18169 عَظْمُ طَوِيل ، مَشَاش

Diaphyse (F).

Diaphysis (E).

18169 عَظْمُ فُرَاكِي

Os coracoid (F).

Coracoid bone (E).

18169 عَظْمُ غَشَائِي

Os membraneux (F).

Membranous bone (E).

18169 عَظْمُ مَحْتَجَر

Osteolith (F).

Osteolith (E).

العظم المنحني أو العظم القربالي أو العظم المنحني هو ركيزة الأنف في الجمجمة .

18169 عَظْمُ وَتَدِي

Os sphénoide (F).

Sphenoid bone (E).

18169 عَظْمِيَّة ، عَفَاسِي

Osses (F).

Bony, Osseous (E).

نعت تعريفي يوصف به ما هو كالعظم طبيعة أو تركيباً أو شكلاً .

18169 عَظْمِيَّات ، كَامِيَّات العظام

Téléostéens (F). Téléostei (E).

صنيف من الاسماك يشتمل أكثرها . أجناسه وأنواعه عدة الا ان جميعها ثنائيات العفائل وتنفصها خمس زغب ، هي : عفاصات الحياض ، شالكات الزماتف ، مفتحات الخاف ، ملبويات الفك ، سلاوات .

18169 عَظْمِيَّات الرُّؤُوس

Osteoglossidés (F). Osteoglossidae (E).

فصيلة اسماك نهريه من كفاصات العظام تتميز برؤوسها المنحنية بمصانع عظمية المادة . أجناسها وأنواعها ثلثة العدد منتشرة في بعض أنهر وبحيرات البلاد الاسيوية والافريقية والامريكية .

18169 عَظْمِيْن

Ostéine, Ostéine (F).

Osein, Ostein (E).

العشاء الحلامي الموربد في العظم .



عفاص ابلق



عفاص ابيض

١٨٦٨٥ - عَفَّاصُ Bouchon (F). Stopper (E).
عمام القارورة . عَفَّاصُ : سدنا بالعفاس .

١٨٦٨٦ - عَفَّاسِيَّاتُ Paléodictyoptères (F).
Paléodictyoptera (E).

طبقة حشرات من شعبة السرنجيات وطائفة المجنحات أصلاً .
أنواعها وأجناسها وفصلاتها عديدة تنضم إلى ثلاث رتب
السرماطيات والزهريات والقروديات . جميعها من مخلوقات
الزمنة النادرة . أحاديثها تتناول من أواسط إلى أواخر
الابح الأول ، جميع حشراتنا كبيرة القصد وبعضها
مستفهم .

١٨٦٨٧ - عَفَّالَةُ Epiphila (S).
Epiphila (F). Epiphila (E).

جنس حشرات فراشية من فصيلة البشوريات ورتبة
حرفشيات الاجنحة . أنواعها المعروفة متوسطة القصد اعطياتها
بعض جبال امريكا الجنوبية || فراشاتها واثمة قوتها
رسوق الازهار البرية . اساريها خاضعة تعيش على اوراق
النبات || اجسامها معتدلة القصد طولها من ١٦ الى ٢٠ سم .
سبطها تراوح من ٤٨ الى ٦٠ سم . رؤسها صغيرة ،
ملونة . عيونها نافذة ، كبيرة . قرونها الاستشعارية
صوليانية . مراشها دقيقة . جوارشها وبطنها مزينة او
خالية . جميعها ملونة . رواشها غضبية متراكبة الاالوان .
معظمها يجمع الزوج الاسامي المنطق بالابيض وبعضها
يجمع الاسامي والخلفي || اعراف انواعها واكثرها انتشاراً
العفالة المتجنبة (Epiphila dilecta) .

١٨٦٨٨ - عَفَّانُ الرَّصَع Loque, Pourriture du couvain (F). Rag, Breeding-
cells rot (E).

وصم جرثومي فتاك يصيب العفانة يترى رصع النحل يفتقي
عليه || يكافح لانتفاع اقسام الخنازيب المنصبة وينقل
النحل الى قدير او غلية نظيفة ويطهره .

١٨٦٨٩ - عَفَّةُ اللفة «مكة جرداء يضاء صغرة مطبوخها كالراز» .

١٨٦٩٠ - عَفَّجُ Duodenum
الفتح : ما يتنقل الطعام اليه بعد المعدة ، وهو لسباع
كلها بمنزلة المسارين لنوات الخلف والتلف التي تلدوي
اليها الكرش ما دفعت . ج افطاج وطعجة .

١٨٦٩١ - عَفْدُ ، لَعِيدُ Lagopède (F).
Lagopus (E).

جنس طير من عائلة الخرسيات وفصيلة الطيوريات .
انواعها ١٤ معظمها قطبي يالغ اسراج الجبال العالية .
ثوبها غطف الالوان . رأسها كاسي الريش . اجنحتها
قصيرة شبه مستدرة . اذنيها قصير مستدير يتألف من
١٤ ريشة . ارباضها كاسية من خالها . ج عفدان .
اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

١٨٦٩٢ - عَفْدُ أَبْكَمُ Lagopus mutus (S).
Lagopède muet, L. des Alpes, L. ptarmigan (F).
Ptarmigan, Willow grouse (E).
طائر من القصد ، طوله نحو ٣٨ سم . ثوبه صديد الالوان ،
دائم التغير ، يتبدل كل شهر ، تتلف فيه الصبهة والجفوة
والبياض ، قيوامه واذنيكه وباطن سقطه سود || موطنه

١٨٦٩٦ - عَفَّاسُ أَشْهَبُ Nyroca ferina (S).
Fuligule milouin (F). Pochard (E).
نوع من العفاس يطول نحو ٤٧ سم . رأسه معتد الى الشبهة
المائلة ، جيتو وذنبه الى البراد القنسي ، سائر اشهب
الجل . عيتاه الى الحسرة . متقاده حطلي .

١٨٦٩٧ - عَفَّاسُ مَتَوَجَّعُ ، وَكْسُ Netta rufina (S). Fuligule roussâtre, Brante roussâtre, Stiffleur huppé (F).

نوع من العفاس طوله نحو ٥٥ سم . رأسه اصهب اللون
متشوش الريش . عتقه وجيتو ويك وذنبه الى البنفسجي
الاسود المبراج . جناحاه الى العترة ، مناكبه ييض . عيتاه
وربلاه ومتقاده الى الحسرة .

١٨٦٩٨ - عَفَّاسُ مَعْمَرِي Fuligula cristata, F. nyroca (S). Fuligule morillon,
Sarcelle d'Egypte (F). Tufted duck (E).

نوع من العفاس طوله نحو ٤٢ سم . رأسه اخضر اللون
اسمع المبراج . جسده يراعي التوب . جيتو الى البنفسجي
اللامع . عيتاه الى الحسرة ، متقاده الحطلي ، ربلاه الى الحسرة
الحطلية .

١٨٦٩٩ - عَفَّاسِيَّاتُ Fuligulines (F).
عراز طير العفاس من فصيلة البليات .

١٨٦٨٠ - عَفَّاشُ Ovaritis (S).
جنس فلور مجهرية من الطليسات وفصيلة الطليسات .
انواعه عديدة معظمها طفيل لا مؤذي . جبراه الكتيدي
مجداني الشكل ، فهي التجميع . كتائده يضيئة او
اهليجية . مشبهه علوي الانتساب يركب السروق والاوراق
فيقرح التسج واليشرة .

١٨٦٨١ - عَفَّاشُ الْحَفَّاشُ ، عَفَّاشُ اوبليكا Ovaritis obliqua (S).

فلور مجهرية يصيب اوراق الحفاس فيلونها || مظهر
الخارجي يقع مستدرة فسيمة طعراها من ٦ الى ١٥ سم .
تركب نصل الاوراق على صفحتها العليا . تيفر سمراء
اللون ، حراء الحالة ثم تنصرف الى السمرة الكالحة التي
يضعها اليواس .

١٨٦٨٢ - عَفَّاشُ الْوَرُثُ ، عَفَّاشُ كَرَوِي Ovaritis asphaeroides (S).

فلور مجهرية يترى وريقات الورث فيسبها || مظهر
الخارجي يقع من تركب النصل على صفحته العليا قديب
يباس البشرة يقابلها على الصفحة السفلى ندغ غلي ،
ايض للون تفرزه المسام المويومة .

١٨٦٨٣ - عَفَّاشُ الْبَحْمُونُ Ovaritis citri, O. Briosii (S).

فلور مجهرية يصيب ثمار الليمون الحامض في قشورها
فيلونها || مظهر الخارجي يقع رداية او يضاء اللون
تركب قشرة الشرة قبل اكثال نموها فتشوها وتصلها .

١٨٦٨٤ - عَفَّاشُ التَّحْجِيلُ Ovaritis pulchella (S).
فلور مجهرية يركب اوراق التحجيل على اختلاف انواعه .
مظهر الخارجي يقع صغرة ، مستدرة ، ميمرة ، غبراء
اللون ، تملو النصل على صفحته العليا يقابلها على الصفحة
السفلى ندغ غلي اسفل اللون .



عفاس اشهب



عفاس متوجع



عفاس مصري



عفاس الحفاش



عفاس الليمون



عفالة



عُذَّةٌ أَبْهَمَ

الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها شبه بيضية اللون ، طولها من ٥ الى ٨ سم . رؤوسها معتدلة الجرم ، قليلة التفريز ، يلمعها خلف الكويل . قرونها الاستشعارية عجيطة مركبة من ١١ فصلة . عيونها صغيرة ، ناشرة . ثآشيرها ضليقة . كولها مستعرضة ، معتدلة الاحدياب . احادها لائحة ، نخلة التحديد القاطب . قوائمها نطيقة . انوثها متباينة الخلفاء تكثر فيها الحفرة ثم الصمعة فالعفرة || الحشرة الجملانة قاصصة ، سريعة الحركة ، تألف ضفاد بجاري الماء الصلب ، خاصة الضفاد الرملية حيث تنسج بسرعة . القيرة الناجمة وبهضها غاضل .

١٨٧٠٠ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Omophrionidae (S).

Omophrionidae (F). Omophrionidae (E).



عُذَّةٌ أَيْبُش

فصيلة حشرات من رتبة عذبات الاجنحة - اجسامها وانوثها المحرقة عديدة منتشرة في معظم المنطقة الشمالية وفي افريقية والهند || اجسامها شبه بيضية اللون . رؤوسها صغيرة . قرونها الاستشعارية عجيطة ، مركبة من ١١ فصلة . مقدم جونها خلف ملغور اليريد . حافة البلورة مقوية . كولها شبه منقعة الشكل . مستعرضة القاطبة . احادها نخلة التحديد القاطب الذي يد ١٤ او ١٥ اغنوداً . قوائمها نخلة ، معتدلة الطول || مكها شبه اسطوانى الشكل ، تحته افراديا في التربة . يرقاتها سلمية القوائم . قوائمها سداسية القمل . سورياتها مرطاة تنحدر في التربة داخل رواق انثوي الشكل || تعيش على ضفاد بجاري الماء . سلط اجسامها غاضل وبهضها مفرس والقيرة كذلك لكنها لا تسرح في النهار || أشهر اجسامها المتفريز .

١٨٧٠١ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Pulverulent (F). Pulverulent (E).

نبت وصي يدل على الزغب الخمل الذي يثني بعض الاصحاء الباتية والحويانية .



عُذَّةٌ

١٨٧٠٢ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .



عُذَّةٌ

١٨٧٠٣ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

١٨٧٠٤ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

١٨٧٠٥ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

١٨٧٠٦ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

١٨٧٠٧ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

١٨٧٠٨ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

١٨٧٠٩ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حوصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

الجبال العالية والقمم الرقيقة . قوته الاعتاش والجلبور والبرام والارواق والبار والجوب حل اختلافا || ينش في الخلع . انتاء تبيض من ٨ الى ١٠ يبيضات .

١٨٦٩٣ - عُذَّةٌ أَيْبُش ° Lagopus albus (S).

Lagopède blanc (F). White grouse (E).

طائر من العفد ، طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه الى البياض الناصع ، اياهه وانثيك الى السمرة . اما ثوبه الصيفي الرسمي فالى الصبغة والصفرة والجولة ويلوه توضيح اسمر ومواج اسفح || موطنه المناطق الشمالية . قوته المواد النباتية على اختلافها ويبيض الحشرات || انتاء تبيض من ١٢ الى ١٥ يبيضة تحضنها بتوايه الذكر في عش تدته في بعض الجنبات القناد دائما بانها الجنوب .

١٨٦٩٤ - عُذَّةٌ إِيكُوسِيَّةٌ ° Lagopus sordicus (S).

Lagopède d'Ecosse (F). Red grouse (E).

طائر من العفد ، طوله نحو ٣٧ سم . ثوبه الشتوي البياض واحد . يكثر فيه الياض ، قوامه وياهه وانثيك الى السمرة القسمة || موطنه شمالي انكلترا ، تألف المنطق والبيسرات ، قوته الاعتاش والارواق والبرام والبار والجوب || ينش عشه في الخلع ، انتاء تبيض من ١٠ الى ١٢ يبيضة .

١٨٦٩٥ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Anchomenus (S).

Anchomène (F). Anchomenus (E).

جنس حشرات مجهرية للسرحة مفرقة نافعة من مضفات الاجنحة وفصيلة السلوكيات . انواعه المحرقة عديدة منتشرة في معظم المناطق المعتدلة الحارة والمشرقة بحر الباردة || اجسامها صغيرة طولها من ١٢ الى ١٧ سم . انوثها مبظلمة مابقة الالوان السوية . يكثر لها الاسود والكشبي || يرقاتها مفرقة تقضي على الكثير من الحشرات الضارة .

١٨٦٩٦ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Sanglier (mâle) (F).

Wild boar (male) (E).

هو ذكر الخنزير الوحشي . ج حفار واحفار .

١٨٦٩٧ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Camail (F).

Hood (E).

هي ريش حقل الديك وتقرق أيضاً بالبرائل .

١٨٦٩٨ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Aphrophora corticea (S).

Aphrophore des écorces (F).

حشرة من فصيلة السرديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القند وطولها من ١٠ الى ١٢ سم . || ثوبها متراكب الاسفر والخطي والاسود والالافير . رأسها حلالي الشكل ، اصفر اللون ، أسود الجبهة . عظمها ثلاث الاجزاء اسود . عيناها كيرتان . زباناها قصيران . كولها مبعج بالاسمر والاسود . حبيبتها صغيرة . ظهورها كامل الحنجرة ، لاسف ، حنطى اللون ويلوه مبعج اصفر وزغارف بنية وسود . رؤسها غشائيان . ينش الى الحنطى الاسمر . قوائمها مبلقة || مسرحة سراج الصنوبر . تعيش بين القشور وتحتها . يرقاتها غاضلة تعيش على اوراق الاشجار .

١٨٦٩٩ - عُذَّةٌ رُومِيَّةٌ ° Omophrion (S).

Omophrion (F). Omophrion (E).

جنس حشرات نافعة من فصيلة المفرونيات ورتبة عذبات الاجنحة . انواعه المحرقة عديدة منتشرة في بعض المناطق



عُذَّةٌ

- 18710 - **عَفْثَةُ حَشَرِيَّة** (F). *Entomocécide*.
بثرة تشبها الحشرات عند لمسها أوراق النبات.
- 18711 - **عَفْثَةُ سَلَكِيَّة** (F). *Nématocécide*.
تفشم في لسج النبات سببه بعض الحشرات السلكية.
- 18712 - **عَفْثِيَّات** (F). *Gallicoles*.
هي الآفات فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة.
- 18713 - **عَفْثِيَّة ، قِنْفِيَّة** (S). *Cynips*.
جنس حشرات من فصيلة الآفات. راجع آفة.
- 18714 - **عَفْط ، عَفِيط** (F). *Ebroisement*.
نثر الشاء بأنفها أو حشاش المازر. Snorting (E).
- 18715 - **عَفْن ، عَفْنِيَّة** (F). *Chandaceure, Moisissure*. Mustiness, Mouldiness (E).
فساد من تلفة أو طيرها يصيب المأكول والبار والمسال والمحبوب.
- 18716 - **عَفْن ، مَتَعَفْن** (F). *Chanci, Mold*.
ما هو مصاب بالطن. Mouldy, Musty (E).
- 18717 - **عَفْثُوس الصَوْنَر** (S). *Aphanus pineti*.
Aphanus des pins (F).
حشرة غاشلة من فصيلة الطرائد ورتبة غشائيات الاجنحة. جسمها مستطيل الشكل ، بسيط ، يطول نحو 8 م. رأسها شبه مخروطي الشوذن ، أسود اللون. خطمها مستدل الطويل ، أسود. عيناها صغيرتان. زباناها مستطيلتان. كسولها ملعب النصف الخلفي ، أسود النصف الامامي ، يطوي في كل من جانبيه نقطة سوداء تاتم القاطعة. حجبها مزراية ، سوداء ، يطويها خطان طحليان. بطها أسود اللون ، أبيض الحار. قشراتها أكبر. قوائمها مسنة الثنايب لا مسرها غابات الصنوبر. تتركب ازمار ولوراك النباتات البرية.
- 18718 - **عَفْثِيَّات** (F). *Mecorinodes*.
فصيلة فطور مجهرية من رتبة النظيريات ورتبة البيضيات.
- 18719 - **عَفْر** (F). *Anon*. *Am's foal* (E).
ولد الحمار والأثنى عفرة. ج. عفاء.
- 18720 - **عَفْثُوس** (S). *Aphycus*.
Aphycus (F). *Aphycus* (E).
جنس حشرات نافعة من فصيلة الثرائيات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصورة. انزاعه المروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق البلاد الحارة. جميعها تنطفل على الحشرات المؤذية من ذوات الجناحين والمرفوفيات || اجسامها مسطرة اتقد تطول نحو 1 م. رؤوسها نصف دائرية الشكل. قرونها الاستشعارية غريبة. جوافها اسطوانية. بطونها قصيرة ، مخروطية المختر ، مهدبة التراج. مرزاتها قصيرة. اثوابها تزدحم من الوردي الى البني. اجنتحها موهجة بالأزرق الفاتح.
- 18721 - **عَفْرُوتَة** (F). *Pourriture*.
Rot, Rottenness (E).
اسم شامل يطلق على عدة اوصام تصيب النبات بمختلف اعضاء سبها فطور مجهرية مختلفة.
- 18722 - **عَفِير** (S). *Amphicyllis*.
واحد زرع الفخر.
- 18723 - **عَفِيشَة** (S). *Ovulariopsis*.
جنس فطور مجهرية ، وسيم النوع ، من الطليبات وفضيلة الوطحيات || جرابه الكتيدي اسطواني الشكل يحمل في طرقة كنيشة واسعة يضيء || توه المعروف عفرشة القطن.
- 18724 - **عَفِيشَة القُطْن** (S). *Ovulariopsis gossypii*.
فطر مجهرى يركب أوراق القطن فيؤذيها || مظهره الخارسي يقع خلية ، قصيرة الزغب ، لا قياسية الشكل والحجم ، تملأ التصل فتبدو كالإبريداء || اضراره محدودة ، وثيقة الصلة بكثرة الرطوبة الجوية ، لا تتوسبب للكانسة.
- 18725 - **عَفِيل** (S). *Amphicyllis* (F). *Amphicyllis* (E).
جنس حشرات من فصيلة اليبديات ورتبة غشائيات الاجنحة. انزاعه المروفة قليلة العدد اصلاها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، محدودة ، نصف كروية الشكل ، تطول نحو 2 م. رؤوسها مستعرضة. صوبها قليلة البروز. تآثيرها يذكوها قياسية ، ملاسها الفكية قصيرة. قرونها الاستشعارية صوبانية. كواسها مستعرضة. الجحاده لافقة. قوائمها ذبيلة ، مهدبة. اثوابها لامعة يكثر فيها الجلودى والامود البنفسجي المواج والكتشي الاسفع || تعيش على الفطور وعلى الاغشاب السائرة الى الانحلال.
- 18726 - **عَفِين** (F). *Ptomaline*. *Ptomain* (E).
عنصر قلوي التتركيب ينجم من انحلال المواد العضوية. ج. حشيتان.
- 18727 - **عَفِي** (F). *Jauge*. *Trench* (E).
حفرة مستطيلة في الارض توضع فيها الفراس المقلوعة من المشتل ريثما تدرس في مستورها.
- 18728 - **عَقَاب** (F). *HAigle*. *Aquila* (E).
العقاب كوكبة نجم شمالية الميخ. مركزها بين كوكبة حور وسبة وكوكبة الدلجين. عدد نجومها 15 اشهرها «البشر» او «النسر الطائر» الذي يولجسه النسر الواقع من كوكبة القيثارة. نجم «الشاهين» و «ذئب العقاب» و «انور الظليين» في ذئب العقاب.
- 18729 - **عَقَاب** (S). *Aquila* (F). *Eagle* (E).
جنس طير من الكولاس وفضيلة السمقرليات يشبه ائبل الجوارح واحتادها واشدها بأساً وأبيسها مزاجاً واحدها بصرأ وارسها طرائاً || انزاعه حدبنة. جميعها مسرولة ، قوية الخالب الحادة ، قصيرة الناصر ، محببة البهار اللرية. تصيد فريستها ولا تقع على الجيف الا اذا مضها الجوع. تدن اركانها في قم الجبال بين الصخور الناتئة او في قنات الانجهار البسقة. اناثها تضع من وقتين الى اربع رفئات تحضنها وحدها نحو 6 اسابيع || قيل فيه: العقاب سبه الطيور والنسر حريقها. كنيته ابو الاشيم وابو الحجاج وابو حسان وابو الدهر وابو الحيم. والاثني ام الحواح وام الشمور وام طلبة وام لوح. من اسمائها: سهم لقرة وعقاف مفرب || أشهر انواعه ما يتبع:



مثيل

١٨٧٣٨ - عقاب مُسَيَّرَة ، عقاب البادية ، خُصَاوِيَة

Aquila pennata, A. mineta, A. nipalensis (S). *Algue botté, A. nain, A. des steppes* (F). *Steppe eagle, Booted eagle* (E).

طائر من العقاب الصغيرة لونه ، طوله نحو ٥٠ سم. وبسطه ١٢٠ وهو أبيض السطحين والظهر والذنب ، أبيض المنكبين والصدر والبطن || أصداءه الباردة الحارة والممتدة بجوها باستمرار وهو لا يفرق الأسراج الكثيفة والبادية لكنه لا ينظم من ورود مجاري للذ || والعقاب المسيرة تألف الحيلة الجماعية سرها يراوح بين ثلاثة وتسعة أزواج . تصيد القوامش والبرقش والقرزور والزاغ . أثناء تحضر مرة واحدة في السنة من وفنتين إلى ثلاث وفنات.



عقاب ذهنية

١٨٧٣٩ - عقاب مُؤَزَّرَة

في السويد ، طائر من العقاب ، اطلها .

١٨٧٤٠ - عقابية • *Biogenèse* (F). *Biogenisis* (E).

نظرية بيولوجية تأسس النظرية القائلة بالتنازل الذاتي . عودها أن كل كائن حي يتولد من كائن حي آخر .

١٨٧٤١ - عقابدة • *Insolubilité* (F). *Insolubility* (E).

صفة الاشياء التي لا تنحل .

١٨٧٤٢ - عَقَار • هو ألسر ، اطلها .

١٨٧٤٣ - عَقَار • عَيْن ثَابِتَة

Immeuble, Bien-fonds (F). *Real, Real property, Estate* (E).

في مال لا يمكن نقله من مكانه بحكم طبيعته أو بخصيصه والأعيان الثابتة تصنف إلى أربع فئات : || الأولى : الأموال الثابتة بطبيعتها وهي التي لا يمكن نقلها من مكانها بحكم طبيعتها كالأرض والشجر والمنازل || الثانية : الأموال الثابتة بالخصيص وهي بطبيعتها أعيان متحركة إلا أن مسلحها الحقها بين ثابتة فأصبحت لقوانين صفة الثبوت . الثالثة : الأموال الثابتة بالانقضاء أو بالتصديق وهي حقوق تنصب حل من ثابتة غير حق الملكية || الرابعة : الأموال الثابتة بقرار المالك وهي حقوق متحركة يفرض عليها مسلحها صفة الثبوت مجازاً بقراره .

١٨٧٤٤ - عَقَار مُرْتَقِق • *Fonds dominant* (F).

العقار المرتفق أو المضمون هو الذي يتنفع من الارتفاق .

١٨٧٤٥ - عَقَار مُرْتَقِق بِهِ • *Fonds servant* (F).

العقار المرتفق به أو الخادم هو الذي عليه حق ارتفاق لعقار آخر .

١٨٧٤٦ - عَقَار

العقار : عشية ترتفع قدر نصف القامة وقره كاليندق وهو عضو البيت ولا يأكله شيء حتى أنك ترى الكلب إذا لايه يموي ، ويسعى عقار ناعمة . وتامة امرأة طبعته ربيد ان يقبح الخبيث بناتلته فأكلته فقلها (السان) .

١٨٧٤٧ - عَقَارِي

Foncier (F). *Landed* (E). كل ما له صلة بالعقار كالصرف العقاري والقصرية العقارية الخ .

١٨٧٣٠ - عقاب البادية

هي العقاب المسيرة ، اطلها .

١٨٧٣١ - عقاب البحر

هي المورينا ، سمكة من الشفنيات ، اطلها .

١٨٧٣٢ - عقاب البحر الجفافة

Mourine commune (F).

هي المورينة للملحة ، سمكة بحرية ، اطلها .

١٨٧٣٣ - عقاب الفخ

هي الشفنة الثالثة ، اطلها .

١٨٧٣٤ - عقاب ذهنية • ، عَجَزَة ، لَمَاعَة

Aquila fulva, A. chrysaetos (S). *Algue doré, A. royal, A. boru* (F). *Golden eagle* (E).

طائر من العقاب وهو أجملها قدراً وأصلها جنة وأصداءها بأسا وبسطاً . طوله نحو ١٠٠ سم. وبسطه مقنط نحو ٣٠٠ سم. لونه إلى الصبغة الخطية يطولها توشح أسمر . رأسه مغطى ذهبيا الريش . أما باطن سبطه فذهبي البياض . زيكاه كدراء اللون . ذنبه إلى الصبغة السمره يطولها تجميع متمرس || تألف الجبال الشاهقة للنبعة ، تثن وكها في صدره الصنوبر الثابتة أو في أمالي الاشجار الكبيرة الباسطة . أثناء تبيض مرة في السنة نحو ثلاث وفنات تحضها وحدها نحو ستة أسابيع || وهي تصيد كل ما دب وطار واستطاعت إليه سيك . وقد تفضل الشفوة والوجل والمعزاة وأصل ثم الثعلب والكلب والقرزور والسنور . لكنها لا تنف من البيل والارانب والسمور والقتلذ والقات والزاغ وأصلح الخ .

١٨٧٣٥ - عقاب رَحْمَاء • هي الرخاء ، اطلها .

١٨٧٣٦ - عقاب سَعَكَاء • ، عَجَز الأَرَب

Aquila clanga, A. naris (S). *Algue criard* (F). *Spotted eagle, Rough-footed* (E).

نوع من العقاب كبير الجثة ، طوله نحو ٧٢ سم. وبسطه سبطه تفوق ٢٠٠ سم. توشه إلى السمره الموشمة يطولها مولج أسمر يزيد على أسوداً || أصداءها أمالي القدم وهي من الطيور الآتية التي لا تهجر حلقها إلا عندا شتداد الحر في إبان الصيف لتعود إليه عند قدوم الشتاء كما تألف مجاري الماء وترقب في الأماكن الرطبة || أثناء تحضر وفنتين مرة واحدة في العام وحضها يفوم ستة أسابيع . وهي من الطيور الثالثة الواجب سجايتها لأنها تقضي حل جميع القوامش والزناجات بما فيها الأنثى .

١٨٧٣٧ - عقاب قَيْصَرِيَّة • ، خَالِصَة ، خَطَابِيَة

ملكك المصنجان

Aquila imperialis, A. heliaca (S). *Aigle impérial* (F). *Imperial eagle* (E).

طائر من العقاب كبير الجثة ، طوله يراوح بين ٨٠ و ٩٠ سم. وبسطه سبطه من ٢٤٠ إلى ٢٦٠ سم. توشه أصد الصبغة ، أسفح المولج . ذنبه متجاسق الريش يطول توشح مريض لا يقاس الشكل والحجم || وهو من القوامش التي تجرب الماء . يألف الأسراج والسهول ولا يخشى الأماكن الأظلمة . يفتن وكته في فنان الأشجار الرطبة أو في صدوح الصنوبر النابتة . أثناء تحضر وسبعاً مرة في العام من وفنتين إلى ثلاث وفنات || يصيد الأوليل والياور والثعلب وكبير الطير ويقضي حل جميع القوامش من أي نوع كانت.



عقاب سمداء



عقاب قيصرية

الشكل . أذنابها مجدانية . أثوابها مبقعة تكثر فيها الكلبة الصفراء يملؤها تنقيج أخضر بنفسجي المواج .

18754 - **عَقَان** ، **مَلَخ** (F). Dragon (F). Sucker (E).
قضيبي ينمو من برعة عرضية ناشقة على أرومة أو جذل بعض النباتات الملقحة .

18755 - **عَكِب** (F). Calcanéum (F). Calcanseum (E).
هو مؤشر القدم .

18756 - **عَقَب** (F). To vary or rotate (E). Assoler (F).
رتب الزراعات الحقلية على طريقة دورية تماثلية وفقاً للمراج خاص يعرف بالدورة الزراعية .

18757 - **عَقَبَان** (F). Algues, Aquilans (F).
Eagles, Aquila (E).
عارة طير من فصيلة الصقريات تشمل ثمانية أجناس وهي العقاب والهوك والنس والتغفة والدلفون والبعق والبيشة والسرنيث . جميعها كبيرة الجثة قوية المنسر الجالس الانتساب الاسمين البهرة الشديدة الانعكاف الحادة الطرف .

18758 - **عَكِيي** (F). Calcanéen (F). Calcanesal (E).

18759 - **عَكِي** (F). Biogène (F). Biogen (E).
لمت تعريفه يطلق على ما يحدث الحياة أو ينشأ الخصائص الحيوية وينبضها .

18760 - **عَقَمَة** ، **عَقِمَة** (F). Variété (F). Variety (E).
هي القرب ، أطلبه .

18761 - **عَقْد** ، **قَوْس** (F). Cintre (F).
Arch, Curve (E).
هو القوس الخشبي الذي يستعمل لبناء المقعد عليه وهو البناء على شكل قوس .

18762 - **عَكِيد** (F). Trachelospermum (S).
Trachelosperme (F).
جنية عارضة تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . أوراقها متقابلية معتقة ايضاً . نصلها يفي الشكل ذرب الزايم الاخير يطول نحو ٧ سم . ويبرش ٤ . وهي طيبة نائمة تلحم المراج بسرعة ويدين زائل || ازهارها يضاء اللون ، عرقة الرائحة ، حلقية التجميع ، تاجية الارتكاز . ثمارها جراء اسطوانية الشكل تطول نحو ١٥ سم . زورها مستقيمة القنطرة البورية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

18763 - **عَقْد** (F). Nouaison (F).
راجع انتقاد . هو في النبات بدء تكوين البزرة بدء اتصال البويض البويضية أي بدء اخصابها .

18764 - **عَقْد** ، **عَمَل** ، **تَصَرَّف** (F). Acte (F). Deed (E).
هو الابانة التي تنشأ آثاراً قانونية وقد صار تدوينها في وثيقة كتابية تثبت صحتها .

18765 - **عَقْد** (F). Contrat (F). Contract (E).
المقد والاتفاق قد توافق الإرادة بين اثنين أو أكثر على انشاء التزامات فيما بينهم .

18768 - **عَقَاصَةُ الْعَنْبِ**

هي أدويس الكربة ، أطلها .

18769 - **عَقَاصَة** (F). Dent canine de la vipère (F). Canine tooth of the viper (E).

هي التيب المدية الطرف ، الانبوية أو المنددة التي تستعملها الأفعى لبع السم . ج عقاف .

18770 - **عَقَاصَةُ الْوَرْد** (F). Argropyloca ochroleucana (S).
Argropyloca du rosier, Tordeuse du rosier (F).
Argropyloca ochroleucana (E).

حشرة من فصيلة الفانلات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة . فراشها صفة تميش على غزونها الاماني . سرقتها خافضة تميش على اوراق الورد بعد ان غطقتها بوشاح من التماس . جسمها صغير القد بطول من ٧ الى ٨ سم . يستطاع قنارح من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها معتدل الحجم ، صغير الخطم ، للشهب اللون ، سيوري المواج . عينها زرقانية ، صغريتان ، ناشرتان . زياتها غيظيان . ملاسها الفكية والقفوية صغيرة . مرشها جعدة . جوشها ويطنها الى الشبهة . روشتها الاماميان الى النحلة الزائرة يملوها تجنح اشهب تكنته ماجة زرقاء . روشتها الخلفيان الى الشبهة السوداء احداها ماجة || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في اواخر نيسان وفراشة الجيل الثاني في اواسط تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار . والاني تلقي المكن مباحداً او لطفاً صغيرة وتربة المدد تطفله مادة خروية تفتبها على الصفحات العليا من نصال الازراق || المور البري يستر في الجيل الاول نحو ثمانية اسابيع ويستمر في الجيل الثاني نحو ١٧ اسبوعاً ويتغذى على الازراق التي تغتنفها السرقة وتميش في داخلها على الخشب والمصارى || السرقة عند الادراك التام تطول نحو ٢٠ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستطيف الوسط ، اخضر اللون ، اصفر المواج ، يملو في كل سكة من سكم البطن طوق من التورق السيد الخشبة بالهلب . رأسها وذوقها الصغرية الى السرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوماً ، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٠ اسبوعاً ويتغذى ضمن ورقة مفتوحة كالبق ، وشبكة بخيط حريرية المادة .

18771 - **عَقَق** ، **عَقَق** (F). Gestation (F).
Pregnancy (E).
المَعَقُ والمَعَقُ : الحمل عند الحيوان عامة وعند ذوات الحافر خاصة . والحامل من ذوات الحافر تدعى المَعَقُوق ج عَقَق وعَقَقاق .

18772 - **عَقَاقِير** (F). Drogues (F). Drugs (E).
ما يتناول به من الادوية . وقال الجوهري : العقاقير اصول الادوية .

18773 - **عَقَام** (F). Platurus (S).
Plature (F). Platurus (E).

جنس حيات خبيثة سامة من اساميات الاخاديد وفصيلة الهيدرويات . انزاعه المعروفة قليلة المدد اصطناعها بحار البلاد الحارة اخصها البحر الاحمر والمحيط الهندي وبعض مناطق المحيط الهادي || اجسامها مبطلة مستطيلة ، تطول من ١٢٠ الى ١٤٠ سم . رؤوسها صغيرة شبه مخروطية



عَقَاصَةُ الْوَرْد



عَقَام

18779 - **عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ** (F). **Contrat à titre onéreux**

هو ما أخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلًا لما أُعطى .

18780 - **عَقْدُ الرِّعْدِ ، مَتْرُوعُ الْعَقْدِ**

(F). **Avant-contrat** (E). **Advance contract**

هو الاتفاق اللفظي المنبثق مع تعهيد المسؤولية المتقاة على تحقيق الاتفاق للقول .

18781 - **عَقْدُ الرُّكَالَةِ ، تَوْكِيلٌ ، وَكَالَةٌ**

(F). **Mandat** (E). **Mandat**

عقد يُعْطَى به المرء غيره أن يدل به باسمه شيئاً له . أما صيغ الرُّكَالَةِ فمندية منها البعالة والحامسة والصريجة والقصينة والتثريمية والتبائية .

18782 - **عَقْدُ بَيْعٍ تَامِيٍّ**

(F). **Contrat pignoratif** (E). **Pignorative contract**

عقد القراض على شكل البيع بالوفاء يبيع به المقرض مقادراً إلى المقرض ولكنه يحتفظ بمجازاة المقرض المبيع ويدفع سنوياً المقرض فوائد قرضه .

18783 - **عَقْدُ تَبَادُلِيٍّ ، عَقْدُ مَلْزُومِ الطَّرِيقَيْنِ**

(F). **Contrat synallagmatique** (E). **Indented deed**

هو الذي يلتزم فيه كل فريق من المتعاقدين نحو الفريق الآخر كعقد البيع فانه يتقابل فيه التزام البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه . والالتزام الشاري بدفع الثمن وتسليم المبيع .

18784 - **عَقْدُ تَبَرُّعٍ** (F). **Acte à titre gratuit**

عمل قضائي قوامه تملك حق أو مال بلا بدل يؤخذ أو معاوضة تشترط .

18785 - **عَقْدُ تَبْعِيٍّ** (F). **Contrat accessoire**

(E). **Accessory contract**

هو ما كان تابياً لقد أصلي قائم قبله كالكفالة والرهن .

18786 - **عَقْدُ تَحْفِظِيٍّ ، عَمَلٌ تَحْفِظِيٌّ**

(F). **Acta conservatoire** (E). **Conservative deed**

عمل يراد به انقاذ مال من خطر ملحق .

18787 - **عَقْدُ تَرَافُضِيٍّ** (F). **Acte consensual**

(E). **Consent deed**

هو العقد الذي يكفي لانقضاء الإيجاب والقبول بين المتعاقدين مهما كانت طريقة إجراءه .

18788 - **عَقْدُ تَوْكِيدٍ** (F). **Acta confirmatif**

(E). **Confirmative deed**

عقد قانوني يُزِيلُ به عاقبة عيوباً كانت لصيقة بعقد سابق .

18789 - **عَقْدُ جَامِعٍ** (F). **Contrat collectif**

(E). **Collective contract**

هو الذي ترتب فيه أفراد جماعة معينة بمجرد رضاهم متوحد .

18790 - **عَقْدٌ حِكْمِيٌّ** (F). **Quasi-contrat**

(E). **Quasi contract, implied contract**

العقد الحكمي أو شبه العقد تسمية تطلق على الالتزامات التي يتكبد صاحبها أعمالاً إرادية غرضية لا ينتج منها تعهدات الغير كالمضاربة ودفع غير المستحق ، الخ .

18791 - **عَقْدٌ عَلَى التَّخْفِيفِ**

(F). **Acte à titre particulier**

هو تملك عين أو امتياز مملوكة أربابها .

18792 - **عَقْدٌ احْتِيَالِيٌّ** (F). **Contrat aléatoire**

(E). **Aléatory contract**

ويدعى عقد المخاطرة أو عقد الفرو . عقد يشترط فيه للمتعاقدون أو أحدهم حدثاً من الراجح أو أمناً من الخسارة إذا وقع حادث غير مفسد الحدث .

18793 - **عَقْدٌ إِدَارِيٌّ** (F). **Contrat administratif**

(E). **Administrative contract**

هو كل عقد تنفذه الإدارة في سبيل إنجاز أعمال عامة أو خاصة مروها للخدمة العامة أو الخاصة .

18794 - **عَقْدٌ أَوْسَمِيٌّ** (F). **Contrat solennel**

(E). **Solemn contract**

هو الذي لا يكفي لانقضائه اقتران القول بالإيجاب بل لا يكون صحيحاً إذا لم تتيج في تكوينه مراسم خاصة حددها القانون .

18795 - **عَقْدٌ اسْتِثْنَائِيٌّ**

(F). **Fiducie**

عقد يلتزم به مشتري العقار ظاهراً بأن يرد له البائع شيئاً يليه له بالالتزامات التي قطبها على نفسه نحو .

18796 - **عَقْدٌ إِسْتَادِيٌّ** (F). **Acta attributif**

(E). **Attributive deed**

هو عقد موضوعه نقل حق إلى شخص أو استئذنه إليه .

18797 - **عَقْدٌ أَصْلِيٌّ** (F). **Contrat principal**

(E). **Principal contract**

هو ما كان مستقلاً عن عقد آخر كالبيع والإيجار .

18798 - **عَقْدُ الْإِدْخَانِ** (F). **Contrat d'adhésion**

(E). **Adhesion contract**

هو عقد وضع شروطه الجبرية مقدماً أحد أطرافه ليتماثل بها مع كل من يرغب في التماثل معه .

18799 - **عَقْدُ التَّبَرُّعِ** (F). **Contrat à titre gratuit**

(E). **Gratuitous contract**

عقد يولي به أحد الطرفين الطرف الآخر فائدة بلا عوض .

18800 - **عَقْدُ التَّرَافُضِيِّ** (F). **Contrat consensual**

(E). **Consensual contract**

هو الذي يكفي لانقضائه اقتران القول بالإيجاب .

18801 - **عَقْدُ الْجَبَرُوتِ** (F). **Vipère commune**

(E). **Common viper**

حيّة خبيثة سامة تسمى أنثى مذنوبة . أظلمها .

18802 - **عَقْدُ الْخَطِيطَيْنِ**

(F). **Contrat de travail**

(E). **Labour contract**

هو الاتفاق الذي يرصد أطرافه به لشامل ومعارفه على خدمة أسمى آخر فيسمل تحت إشرافه مقابل جمل يلقى أجره . وهو في الفرق الشائع التماثل الذي يشمل مجموعته المامل لدى رب العمل .

18803 - **عَقْدُ الْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ**

(F). **Contrat collectif de travail**

(E). **Convention collective de travail**

هو تعاقده جامع يرم بين رب العمل أو عمالته وبين عمال إحدى النقابات . موضوعه تنظيم شروط العمل التي تحمّر على أساسها العقيد الفردية بين رب العمل وأعضائه هذه النقابات .

١٨٨٠٦ - عقَدَة عَنَّاكِرِيَّة، عقَدَة دَرَبِيَّة

(F). السُّلْمَة ، اَطْلَبَا .

١٨٨٠٧ - عقَدِيَّة

بِكْتَرِيَّة سَمْتَرِيَّة لِشَكْل تَعْرِف بِالسُّبْحِيَّة ، اَطْلَبَا .

١٨٨٠٨ - عَقْرَب ، قُصْبُل

Scorpion (F). Scorpion (F).

العقرب الذكر والانثى حل السواء. ج. عقارب. وعند التخصيص يقال للذكر عقربان وللانثى عقرباء وعقربة || والعقرب جنس دويبات خبيثة سامة من فصيلة الشبديات ورتبة المبريات. انواعه عديدة مختلفة الاحجام والانوان. طولها يراوح بين ٢ و ١٥ سم. جميعها دسوية تسرح وتسي في الليل وتختبئ في النهار. تحمل في طرف ذنبها ابرة منقطة، سادة الحية، جوفاء. تتصل بها غدتان تفرزان مادة قلووية سامة. وهي تستعمل ابرتها للدفاع عن النفس او لتخدير وقصص فريستها من الفطاة الصغيرة.

١٨٨٠٩ - عَقْرَب اَسْوَد * ، عَقْرَب اَصْفَر

الذَّكَب

Euscorpion flavicauda (S).

Scorpion noir, S. à queue jaune (F).

Black scorpion (E).

نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبديات. جسمه صغير القد، اسود اللون، اسير الذنب الخشن المواجه بطنه مسكي التركيب مفلطح الشكل ينتهي بذنب مضطرب الشخانة، سداسي السكم، يحمل في اوله مبطان مفلغان الشوار الجنسي ويحمل في طرفه شوكه منقطة سادة جوفاء يستعملها في بث سمه. حياته مركبتان فحياتها البصر القصير المبال. مقبناه الفلكيان كبيراً الجرم. مبطانه دقيقاً الانسان التي يبلغ عددها عشرة ازواج عند الذكر و١٢ زوجاً عند الانثى || الذكر اصغر قدماً من الانثى، يطول نحو ٣٥ سم. اما الانثى فتطول نحو ٤٥ سم || مسرحة دسوي. قوته الحشرات المختلفة الاجناس وكنها ويرقاتها || الانثى تساقط بصر ثلاث سنوات وتعيش نحو خمس سنوات. اما الذكر فيعيش الى حين يحكم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدويبات المؤذية الفارة.

١٨٨١٠ - عَقْرَب اَصْفَر * ، شَبْدَع اَصْفَر

Buthus australis (S). Buthus jaune, Scorpion

jaune (F). Yellow scorpion (E).

نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبديات، موطنه البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || جسمه كبير القد، اصفر اللون الباهت. بطنه مفلطح ينتهي بذنب مضطرب سداسي السكم. شوكته قوية منقطة جوفاء سادة الحية. لحيته مؤلة. سمه شديد الاذى || عيانه مركبتان تبصران في جميع الاتجاهات. مقبناه الفلكيان مسننا الحلقة للاتفة. مبطانه كثير الانسان التي تبطل عند الذكر ٣٠ زوجاً. وعند الانثى ٢٢ زوجاً || الذكر اصغر قدماً من الانثى، يطول نحو ٦٥ سم. وتطول الانثى نحو ٨٠ سم. مسرحة دسوي. قوته كل ما دس واستطاع اليه سبلاً || الانثى وتلد شبيحة تعيش نحو ست سنوات وتساقط بصر سنتين. الذكر يعيش الى حين يحكم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدويبات الشديدة الاذى والضرر.

١٨٨١١ - عَقْرَب اَكْمَة * ، رُشْك

Bélsar, Scorpion aveugle (F). Blind scorpion (E).

نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبديات. موطنه

١٨٧٩٢ - عقَد على الشُّؤْل

(F). Acte à titre universel

هو تلك بعض اموال شخص او كلها بلا تعيين ولا تخصيص.

١٨٧٩٢ - عقَد عَيْنِي

Contrat réel (F).

Real contract (E).

هو الذي لا يتمد إلا بتسليم المقيود عليه كالدوية

والنقض ورهن الحياة.

١٨٧٩٤ - عقَد غير مُسَمًّى

Contrat innommé (F). Unnamed contract (E).

هو الذي لم يخصص القانون باسم معين بل أخضع لشروط واستكامه لقواعد العامة المقررة لجميع المقيود.

١٨٧٩٥ - عقَد فَوْرِي

Contrat instantané (F).

Instantaneous contract (E).

هو الذي يكون تنفيذه فوراً بدأ به متى شاء ذلك المتعاقدان.

١٨٧٩٦ - عقَد قَضَائِي

Contrat judiciaire (F).

Judiciary contract (E).

هو الذي يقدّم الخصوم امام القاضي خلال الدعوى

ليخلصوا به موضوعاً متنازعاً فيه.

١٨٧٩٧ - عقَد مُعَادَد

Contrat commutatif (F).

Commutative contract (E).

هو الذي يعقد المتعاقدان فيه معنى الزام كل منهم فيعرفه الحلبي ما اعطى والاخذ ما اعطى سوا لو تفاضلا.

١٨٧٩٨ - عقَد مُزَوَّج الطَّرَفَيْنِ

Contrat bilatéral (F).

Bilateral contract (E).

هو ما عقدته ماعدان باراضي والاتفاق.

١٨٧٩٩ - عقَد مُسَمًّى

Contrat nommé (F).

Named contract (E).

هو ما خصصه القانون باسم معين كالبيع والمقايضة والشركة والوديعة والمارية.

١٨٨٠٠ - عقَد مُكَوَّعَة

Acte à titre onéreux (F).

عقد لا يمد بكتابة على المقيود له الا اذا قدم بدلاً عنها.

١٨٨٠١ - عقَد مُتَّعَد

Contrat successif (F).

Successive contract (E).

هو الذي يشترق تنفيذه مدة من الزمن كالاجارة وعقد العمل والبيع بالتقسيط الخ.

١٨٨٠٢ - عقَد مُتَّفَرِّد

Contrat unilatéral (F).

Unilateral contract (E).

هو الذي لا ينشئ التزامات الا في جانب واحد. كالمارية فان على المستعير ان يردّها وليس على المارء اي الزام.

١٨٨٠٣ - عقَد لِحَاجِز

Contrat en mains (F).

Contract in hands (E).

من عقود البيع التي لا يترتب فيها حل الشاري اي نفقة من تفقات التصريح ورسوم التسجيل، بل تكون كلها على البائع.

١٨٨٠٤ - عقَدَاكَة

هي غنام سلبان، اَطْلَبَا .

١٨٨٠٥ - عقَدَة

Loupe, Noeud (F).

Wen, Knob, Knot (E).

المقعدة والسبرة تنوع خشبي في سوق بعض الانجبار.



عقرب اسود



عقرب اصفر



عقرب اكمه

جميعها مفعولة : سوفها مدادة . اوراقها متعلقة كاملة .
اندهارها فردية ، محورية ، مستطيلة الزوائد صفراء اللون .
تمامها متفدية محددة وصحبة الطرف ، قلبية الشبه من ذنب
المقرب وين اساراج بعض الحشرات || امروف انواعها
للبلولة هي :

S. muricatus (S). Scorpione petite (F). عقربية صغيرة
S. varicellatus (S).
Scorpione grosse (F).
S. sulcatus (S). Scorpione rayée (F). عقربية ملتمة ، ودية
S. subvillosum (S). عقربية ودية ، ملتمة
Scorpione velus (F).



عقرب حنطي

١٨٨٢٠ - عقرب طبل
Eléphant pleine (F).
She elephant with young (E). أنثى الفيل الحامل

١٨٨٢١ - عكس

Pterocéphale (S).
Pterocéphale (F).
شجرة ممررة زياد من فصيلة البتسليات . ملتقى فروع .
فروعها غطاء ملتوية . اوراقها متعلقة ، معتمة ، اجاسية
الشكل . لصلها جامد النسيج ، لونه الى
الخضار الاصفر . اندهارها محورية كبيرة اللثة ، اندها
الى البتسليتي تملو شعبة ودية .

Pointe de la feuille (F). عكسة
Point of the leaf (E). في طرف نصل الورقة للمب .

١٨٨٢٣ - عكسي هو البيق ، اعليه .



عقربية

١٨٨٢٤ - عكس ، كندش
Pica (S). Pie (F).
Magpie (E). Estorn (D).

جنس طير من فصيلة القرابيات . اندها حنيفة ، اصالتها
المال . اندها بقاء . اندها طرية . امروا عكسة .
قوتها الحشرات والجرب والبار ويوس الصائير . وين
طابعها اختلاط كل ما يهر نظرها . تألف الحقائق
والانبات القريبة من الممران . تقطن في الانجار الرمية .
اندها تبقيش من ٣ الى ٦ بيضات تحضنها رسدا نحو ٣
اسباح || ولة اعطفا في سبب تسميت عكسا فقال
المجاسط لاته ينق قراعه كسائر القربان ويقل اشتقاق
من صوته . قال الشاعر :

اذا ياربك الله في طائر فلا ياربك الله في العنق
طويل الذناب قصير الجناح حي ما يجد غلظة يرق
يقلب عينيه في رأسه كأنها قنطرة رقيق

١٨٨٢٥ - عكس أزرق

Pica cyaneus, Cyanopica cyaneus (S). Pie bleue (F).
Blue magpie (E).

نوع من العنق طوله يراوح بين ٤٠ و ٤٥ سم . لونه
ازرق اللون ابيض . رأسه الى السواد القاتم . رسدا الى
السرة الخفية . يألف الحقائق والنبات والاسراج .

١٨٨٢٦ - عكس معروف

Pica caudata (S).
Pie vulgaire, P. bavarde (F). Common magpie (E).
نوع من العنق طوله نحو ٥٠ سم . لونه اسود اللون ابيض .
مقاروه ورسدا الى السرة القاتمة . يألف الحقائق والنباتات
القريبة من الممران . وهو مبين في جميع بلاد الشرق
الواسط وينتشر من الطيور المؤدية للفتنة .

١٨٨٢٧ - عكس

Orcha (S). Orcha (F).
الرسدة عكفا وهي جنبة صغيرة اللثة من فصيلة السنايات .



عنق أزرق



عنق معروف

البلاد الحارة من العالم القديم . يألف المغاور والكهوف
والالاية القديمة . مسرحة دجوي . قوته الحشرات ويكسها
والذباب والحمام تقوده اليها حاملة اللحم ثم السع || جسده
صغير اللثة يطول عنه الذكر نحو ٢٥ سم . يطول عنه
الانثى نحو ٣٠ سم . ثوبه الى السرة الخفية . يلبه مفلطح
سكني التركيب ينتهي بذب سداسي السكني يحمل في طرفه
شولة جوفاء حادة الحمة يستعملها في بث سم لتخدير
فريسته والزيد من الحياة || عيناه مركبتان عادتا البصر
لذلك يدعى العقرب الاك || الانثى تميش نحو خمس سنوات
اما الذكر فيعيش الى حين يكوم الانثى التي تقفي عليه .

١٨٨٢٢ - عقرب البحر

هو الجلاج ، من الاسماك البحرية ، اعليه .

١٨٨٢٣ - عقرب الماء هو سرطان البحر ، اعليه .

١٨٨٢٤ - عقرب حنطي ، شيدع حنطي

Buthus occitanus (S). Buthus brun, Scorpion
brun (F). Brown scorpion (E).

نوع من المقرب ينتمي الى فصيلة الشبهيات . موطنه جميع
المناطق الحارة من العالم القديم || جسده مستوط اللثة ،
حنطي اللون ، مفلطح البطن . ذنبه مستدل الخيط ،
سداسي السكني يحمل في طرفه شولة جوفاء حادة الحمة .
عيناه مركبتان تبصران في جميع الاتجاهات لكنها ضعيفا
البصر تقتصر المجال . ميفط الذكر مركبان من ١٨
زويجا من الاناث . اما ميفط الانثى فن ٢٠ زويجا ||
الذكر يطول نحو ٥٥ سم . والانثى من ٦٥ الى ٦٤ سم .
مسرحة دجوي قوته الحشرات وكل ما دب || الانثى
تميش نحو ست سنوات . اما الذكر فيعيش حتى القيام
بمصلحة الكوم || ينتشر من اللويات الشديدة الانثى
والضرر .

١٨٨٢٥ - عقربان

Scorpion (mâle) (F).
Scorpion (male) (E).
ذكر المقارب يعيش الى حين يكوم الانثى حيث تقفي
عليه .

١٨٨٢٦ - عقربيات

Scorpionides
رتبة دويبات خبيثة من التكبويات . ضالها سبع
عائلة الاشكال والاجسام والالوان . اشهرها فصيلة
الشبهيات التي تحوي المقارب .

١٨٨٢٧ - عقربيات الماء

Nepidae (S).
Népidae (F). Nepidae, Water scorpions (E).
Wasserskorpione (D).

فصيلة من بق الماء التابعة الى رتبة نصفية الاجنحة .

١٨٨٢٨ - عقربيات كاذبة

Pseudoscorpionides
رتبة من التكبويات . اجنسها وانواعها عديدة تتجمع
الى فصليتين . شراتها عادمة اللحم ، صغيرة اللثة ، مبطلة
الاجسام ، مستطيلة اللامس .

١٨٨٢٩ - عقربية ، ذنب العقرب

Scorpiurus (S). Scorpione, Ornithopse, Chenille,
Chenillette (F). Scorpion's tail, Casapillar plant (E).
Raupenkraut, Raupenklee (D). Coda di scorpione (I).
جنس نباتات عشبية برية مدادة من فصيلة القرنيات
الفراشية . اندها عذبة مهدها حوض البحر المتوسط .

قوائمها نشطة . ثوبها الى البني الاسفع المروج || تألف الثعالب التي يكثر فيها الزئان والملي. (ت) مرقاة تميش حيث تنقف على المواد النباتية المنحلة .

١٨٨٣٣ - عَقَقَانِيَّات (S). Eucnemidae (E).
Eucnemidae (F). Eucnemidae (E).

فصيلة حشرات من عُمَدِيَّات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجناسها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، معتدلة التطبيع ، تطير من ٤ الى ١٢ م. وروسيها مستعرضة القفص . عيونها بارزة . تأثيرها ودياسها نظامية . قرونها الاستشعارية متباينة الاشكال منها الخيطية والشعوية والمسننة والمنشارية ، جميعها مؤلفة من ١١ فصلة . كرواسلها لاقامية ، يكثر فيها التريب . اتحادها لاشعة . قوائمها نشطة . ارساغها خاسية القفل . اولها ملونة || تألف الثعالب . مظهرها دجوي المسرح . جميعها خاسية ودامنة . يرقاتها مرقاة تموش حيث تنقف على المواد النباتية المنحلة || أشهر اجناسها الميقتيد .

١٨٨٣٤ - عَقَوِيَّة (F). Penaty (E).
في الاقتصاص من المجرم باسم المجمع .

١٨٨٣٥ - عَقَوِيَّة (F). Correa (S).
جلس نباتات برية ورتينينة من فصيلة الشدايات . انزاعه قليلة جميعها نجيرات صغيرة القند تملو من ١٠٠ الى ٣٠٥ م. سطوها فرعا زياه . اوراقها ابيدة متقنة متقابلة . نصلها اهلجيلي الشكل ، جامد النسيج ، خلي الصفعة السفلى . انزاعها يبقية ، وديعية البتلات المنصعة ، ثمانية الاسدية . اولها زاهية بها الابيض والوردي والفسفي والاحمر || انزاعها يستمر من نيسان الى تموز .

١٨٨٣٦ - عَقَوِيَّة (F). Pleine (F).
العقوي هي الاثني الحامل من ذوات الحافز والظلف خاصة ج عَقَوِيَّات .

١٨٨٣٧ - عَقَبَان (F). Or natif (F).
هو الذهب الصرغ الطبيعي .

١٨٨٣٨ - عَقَب (F).
هو المرة الروداء ، اطلبها .

١٨٨٣٩ - عَقِيد (F). Insoluble
نمت تمريني يطلق على كل مادة لا تلوذ وصل كل عمل سحابي وما اشبه لا ينحل .

١٨٨٤٠ - عَقِيد (F). Plinth (F).
سطح مربع في قاعدة حرد او في تاجه .

١٨٨٤١ - عَقِيد هِنْدِي (F).
هو الكركم الهندي ، اطلبه .

١٨٨٤٢ - عَقِيص (F).
هو السيرة الزياه ، اطلبها .

١٨٨٤٣ - عَقَقَانِيَّات (S). Calotermitidae (S).
Calotermitidae (F). Calotermitidae (E).

فصيلة حشرات قارضة دجوية من رتبة العققانيات . انواعها عديدة جميعها غليظة الرووس ، قوية المشافر ، عادمة اللون . قوتها المواد الخشوية والسليولوزية . نياكها رداء

بائها فرعا تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ م. اوراقها لاشعة متقنة سنانية الشكل . نصلها بطول نحو ١٥ م. وهو جامد الصفعة ، خلي البثرة ، جنثيلي العرف . انزاعها متفوي النسيج ، محوري الاوتكار . انزاعها صغيرة القند ، صفراء اللون . اوراقها غزيرة للمادة الجمالية القتالة تقتل القلة والبقرة ، تؤذي الحمر ولا تفسر بالابل .

١٨٨٣٨ - عَقَقَانِيَّات (S). Isoptera (F).
Isoptera (S). Isoptera (E).

رتبة حشرات قارضة صغيرة الجسم ، مستطيلة الشكل ، غليظة الرأس ، قوية المشافر الحادة ، طويلة الاجنحة صند وجوها . نظامها الاجتماعي والاقتصادي نظام النمل . نبي نياكها تحت الارض وقوتها وداخل الاشعاب . اشهر فصائلها : الارضيات والعققانيات .

١٨٨٣٩ - عَقَلَّة ، قَسَلَّة ، قَلَم ، عَقَب (F). Bouterie (F). Slip (E).
قصب او جزء من قصب يفصل عن النبات ويغرس . والقفل تقع على اشكال خطفة اعصها :

عَقَلَّة برعية او زيمية (F). Bouterie a oeil (F).
Slip for bud (E).

عَقَلَّة جذرية (F). Bouterie par racine (F).
Slip by root (E).

عَقَلَّة جمجورية (F). Bouterie de rhizome (F).
Slip of rhizome (E).

عَقَلَّة ديبوية (F). Bouterie a talon (F).
Slip at butt (E).

عَقَلَّة لندية (F). Bouterie par rampeau (F).
Slip by bough (E).

عَقَلَّة عخلية (F). Bouterie a crosse (F).
Slip for cutting (E).

عَقَلَّة ورقية (F). Bouterie par feuilles (F).
Slip from leaves (E).

١٨٨٤٠ - عَقَم ، عَقَر (F). Stérilité (F).
العدم والقلم : حال الاثني التي لا تحمل .

١٨٨٤١ - عَقَقَانِيَّة (F). Volucella (S).
Volucella (F). Volucella (E).
جنس حشرات من فصيلة الريفيديات . الوامه عديدة . طوطا يراوح بين ١٢ و ١٨ م. تتميز بسمرة طرانيها واصفرار انوارها المحملة واللديجة بالاسود والابيض . يرقاتها قاسية الجلد ، كثيفة الغلب للسطل . مظهرها يمش على هي ودوس الزنايز . واثرها قاطد وما اشبه . اشهر انواعها :

عَقَقَانِيَّة زياه (F). V. bombylians (S).
Volucella bourdon (F).

عَقَقَانِيَّة خالقة (F). V. pellucens (S).
Volucella transparente (F).

عَقَقَانِيَّة معلقة (F). V. zomaris (S).
Volucella zonée (F).

١٨٨٤٢ - عَقَقِيد (S). Eucnemis (S).
Eucnemis (F). Eucnemis (E).

حشرة وجيلة الجلس والروع من فصيلة العققانيات ورتبة عُمَدِيَّات الاجنحة . اعضاءها بعض مناطق اوروبية الشمالية والوسطى ويهاجم الثرق الالف || جسمها صغير القند ، مستطيل الشكل ، قريب اليه بالسائل . طولها نحو ٨ م. رأسها صغير . صيغها يارتزان . تأثيرها ودياسها الفكية مستقلة الجسم . زيانهاا مشطيان . كرواسلها شبه مربع الشكل . غداها لاحتقان يملوها تحفيد تحيل قاطب .



مقنصة زياه



مقنصة شفافة



مقنصة منقطة

١٨٨٥١ - عِكْبِيَّةٌ عَمَلِيَّةٌ

Tridacanta pilosa (S). *Ephémère veuve* (F).
عشبة ترينينة معمرة تملو نحو ٥٠ سم. أزهارها شطبية
فرداء. أوراقها لائقة متعاقبة. تصلها صني الشكل،
خلي البشرة حل صفحته بطول نحو ٢٥ سم. ويعرض
أزهارها ٢ سم. أزهارها كثيرة العدد ليلكية اللون || أزهارها
يستمر من حزيران إلى تشرين الثاني .



عقيلان

١٨٨٥٢ - عِكْبِيَّةٌ فَرَجِيَّةٌ

Tridacanta virginiana (S). *Ephémère de Virginie* (F).
عشبة سرولية معمرة ساقها متعقبة فرداء تملو نحو ٦٠ سم.
أوراقها لائقة متعاقبة : تصلها ضيق الصلصلة مدلب
المقصة بطول نحو ٣٠ سم. ويعرض من ٢٥ إلى ٣٠ سم.
أزهارها جملة الشكل تعرض نحو ٣ سم. الوانها تختلف
باعتلاف الضروب فيها الأزرق والبنفسجي والأبيض
والوردي والاحمر || أزهارها يستمر من أيار إلى تشرين .

١٨٨٥٣ - عِكْبِيَّةٌ وَدِّيَّةٌ

Tridacanta rosea (S). *Ephémère rose* (F).
عشبة سرولية معمرة تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها ضيقة
التصل عددة تطول نحو ١٨ سم. يعرض من ٢ إلى ٣ م.
أزهارها وردية اللون مستطيلة الزناد || أزهارها يستمر
من حزيران إلى تشرين الثاني .



عقبة

١٨٨٥٤ - عِكْبِيَّةٌ
Génophère (F).
تختلف أشكال الانفعالات البنيية التي تملو حل عكر
موصوف معين .

١٨٨٥٥ - عِكْبِيَّةٌ
Araignée (mla) (F).
Spider (mla) (E).
ذكر النكبوت .

١٨٨٥٦ - عِكْبِيَّةٌ
Commutatrica,
Permutatrica (F). *Rotary converter*, *Rectifying*
commutator (E).
المكاس جهاز خاص يسمح بتحويل التيار الكهربائي
من متواصل إلى تناوبي والمكس بالمكس .

١٨٨٥٧ - عِكْبِيَّةٌ
Toile d'araignée (F). *عكاش*, *عكاش*,
Colweb, *Spider-work* (E).
العكاش والمكاش العكاشة : بيت النكبوت .



عكابة

١٨٨٥٨ - عِكْبِيَّةٌ
Orbicole, *Orbitolaire* (F).
نمت ترينيني يطلق حل العكاش التي تسج عكاشها
كالشعاع . نواسه سهل الانكسار ، جيد الحانة ، شديد
القة ، يستعمل في تعديد القلائس المجهرة .

١٨٨٥٩ - عِكْبِيَّةٌ
Cosmopolite, *Cosmopolitan* (E).
حفة المدينة الجملة من كل طوائف البشر وصفة من
لحب جميع البلدان وأهلها ومن اعتبر العالم كوكبه أو
من كان العالم كله كيمض الحيوان والمير والنبات .

١٨٨٦٠ - عِكْبِيَّةٌ
هي الجنسة ، أطلها .

١٨٨٦١ - عِكْبِيَّةٌ
Pollen récolté (F).
جذرات الريح يحج بها التحل عمل اسراغها وسبقها
وانفادها تجملها في الشهد .

وانفاق دهايز قنينا بالطين في التربة وعلها وقوق الاخشاب
التي تفرحها || تعيش في النظام . نظمها الاجتماعية
والاقتصادية قريبة الشبه من نظم النحل والاسل ، فيها الملكة
البيض والذكر الكامل والجنيد والها والهاثيث || أشهر
أنواعها :

عقيلان *
Reticultermes lucifugus (S).
Termite lucifuge (F).

عقيلان اصفر العنق *
Calotermes flavicollis (S).
Termite à cou jaune (F).

عقيلان احمر *
Hodotermes ochraceus (S).
Termite ocre (F).

١٨٨٤٤ - عَفِيفَةٌ *
Gryphaea (S).
Gryphée (F). *Gryphceae* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة الحماريات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في البحر
الايوني المتوسط وفي بعض مناطق الاطلسي || أصدانها
تصنف مستوية الشكل ، متعقبة القدم ، لاسنوية
المصاريع ، كبيرة اليسارية صغيرة اليمينية || أنواعها
الماكولة عديدة أشهرها العميقة المقرنة (*G. angulata*) .

١٨٨٤٥ - عَفِيفٌ ، عَفِيفٌ
Agave
حجر كريم من مركبات المرو (الكوارتز) المختلطة ببعض
الكسيد الحديدي التي تصبغها بالوانها المتخلية القائمة بين
الاصفر والاحمر .

١٨٨٤٦ - عَفِيفٌ يَمَّان
Omyx
نوع من البق الجله الصفب يتميز بخطوطه المتوازية
الترتيب المشتركة المركز .

١٨٨٤٧ - عِكْبِيَّةٌ *
Commelinaceae, *Commelynaceae* (F). *Commelin-*
naceae (E).

هي فصيلة الزولانيات من وحيئات الفلقة ، اجناسها
وانواعها كثيرة العدد . اصلها البلاد الحارة والاستوائية .

١٨٨٤٨ - عِكْبِيَّةٌ *
Tridacanta (S). *Tridacantie*, *Ephémère* (F). *Com-*
mon spider-wort (E). *Tagblume*, *Dreimasterblume*
(D). *Efemaro* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة العكبليات. أنواعها
عديدة معظمها بر ي وبضها ترينيني . أزهارها حامية ثلاثية
الفصل والبيتلان ، سداسية الاعمدة ، خلية الاقدام || أشهر
أنواعها ما يلي .

١٨٨٤٩ - عِكْبِيَّةٌ الرِّوِيَّةُ
Tridacanta fluminensis (S). *Ephémère de Rio* (F).

عشبة سرولية ترينينية معمرة تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها
بيضية مستطيلة . تصلها عاقب الخضار حل صفحته البهلياء ،
بنفسجي الصفحة السفلى . أزهارها كثيرة العدد ، يضاء
اللون ، عصارتها قابلة الحطب || أزهارها يستمر طوال
السنه .

١٨٨٥٠ - عِكْبِيَّةٌ يَبْدَهَةُ الزَّهَرِ
Tridacanta albiflora (S). *Ephémère à fleurs blan-*
ches (F).

عشبة ترينينية مركنية معمرة . سوقها مسطحة تنشر عند
كل مقدة . أوراقها بيضية الشكل ، قلبية القاطعة ،
مدنية المقصة ، تصلها جميل الخضار الزلفي . أزهارها
قليلة العدد يضاء اللون || أزهارها يستمر من أيار إلى
تشرين الثاني .

١٨٨٦٧ - عُكْبَر مُقْتَدِد

Microtus oeconomus (S). *Campagnol économe* (F). نوع من العُكْبَر ، موطنه البلاد الروسية ، طوله نحو ١٢ سم. وذنبه ٤ ، جسمه اسطواني الشكل مقبضه مقطوم الطرف ، اذناه مستديرتان صغيرتان . ظهره الى الصهبة السراة الباقية . ايلاده الى الصهبة الصفراء بطنه ابيض اشمر || يعيش جماعات كثيفة العدد وهو من العُكْبَر القاطنة التي تجوب البلاد في طلب الحبوب والحبوب والحبوب التي تجوز في هذا ما لا يقل من ٥ كيلو من الحبوب والحبوب .

١٨٨٦٨ - عُكْبَرَات

Arvicolinés (F). العُكْبَرَات او قُرَان الزرع عارة حيوانات لبونة قاضية من فصيلة القُارِيَات . اجناسها وانواعها عديدة موطنها العالم . جميعها صغيرة القند ، اجسامها ريمية . رؤوسها غزوية غليظة . مقاضها مقطومة . آذانها مستديرة بارزة . اذنانها صغيرة كاسية || اُعرف اجناسها العُكْبَر واللمين والسفة .

١٨٨٦٩ - عُكْد

Baie de sorcière (F). *Witches broom* (E). فصة من الاغصان الكثيفة التجميع تشبه المكسدة تسببها بعض طيور الترنينة . راجع ترنينة .

١٨٨٧٠ - عُكْدِيَّة

Nid d'araignée (F). *Nest of spider* (E). المكسدة كشكش ليد النواص ، جرابي الشكل ، ينسجه المنكبيوت حيث يقع للاستراحة فيه .

١٨٨٧١ - عُكْدَاة

Base du cœur (F). *Base of the heart* (E). هي قاعدة القلب .

١٨٨٧٢ - عُكْر

Génosype (F). *Genosype* (E). هو الذي يمثل نتيجة عمل الجين في التركيب الخلوي وهذا ما يحصل التركيب العكري مثلاً لنباتات الصفات الوراثية .

١٨٨٧٣ - عُكْر ، كَمَاءُ الْمَاء ، قَسْطِلُ الْمَاء

Traps (S). *Macre*, *Châtaine d'eau*, *Truffe d'eau*, *Tribule*, *Cornuella*, *Echarbot* (F). *Water chestnut*, *Water caltrop* (E). *Echte Wassernuss* (D). *Tribolo aquosum*, *Castagna d'acqua* (I). جنس نباتات عشبية ، صقلية ، مائية ، حولية من فصيلة الاغديات . انواعها الزراعية ثلاثة ، اوراقها كبيرة القند مستطيلة الزناد فصلها مبسي الشكل متشاري الحافة . ازهارها فردية محورية بيضاء اللون . ثمارها جوزية شاذكة ، متباينة الاشكال ، كستنية اللباب المأكول .

١٨٨٧٤ - عُكْر أَبُو شَوْتَكِيَن

Traps bipinosus (S). *Macre à deux épines*, *Singhara* (F).

نوع من العكر الشري تكثر زراعته في الهند والهند الصينية . ثماره كثة الشكل ثنائية الفصل الجالسة الخشبية الحادة الشوكية . دقيق لباها يستعمل في تحضير بعض الحلويات .

١٨٨٧٥ - عُكْر أَبُو قَرْيَن

Traps bicornis (S). *Macre bicornis*, *Ling*, *Ling Kio* (F).

نوع من العكر الشري تكثر زراعته في الصين حيث يستعمل في معظم المأكولات . ثمرته تشبه رأس الكباش بقرنيه للثقبين سحجها سحج الكستنة . لباها حيد الصف وذا ما يحملها تحتل المركز الاول بين انواع العكر .

١٨٨٦٢ - عُكْبَر

Microtus, Arvicola (S). *Campagnol* (F). *Vole*, *Field-mouse* (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية ، من العُكْبَرَات وفصيلة القُارِيَات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القند تتميز بفرازة ثمرها . اناثها تقصم من ثلثات الى اربع مرات في السنة كل مرة من ٤ الى ٦ ادوارس تيسر وتكسي يد بعضها بلسون وتسرح في طلب قوتها بمرسة اسابيع || قوتها الحبوب والحبوب ومختلف المواد النباتية انحصارها لاه الاجشجار في الشتاء عند الانواع العامة البيات الشتوي .

١٨٨٦٣ - عُكْبَر أَصْمَر

Microtus glareosus, Arvicola glareosus (S). *Campagnol fauve*, *C. des grèves* (F).

نوع من العُكْبَر ، طوله نحو ١١ سم. وذنبه ٤ ، قوته الى الصحراء يقيم مع اقرباه من تيج الظهور وينصرف الى البياض عند الصبر والطين || يألف المزوج والحقول والارحاج والافخاف والحدائق . يعيش جماعات كثيفة العدد تلج بعض الاوليف || قوته الحبوب والثمار والحبوب ولكنسة والحبوب واه الاجشجار عند الجوع .

١٨٨٦٤ - عُكْبَرُ الْبَر

Microtus terrestris, Arvicola terrestris (S). *Campagnol terrestre* (F).

نوع من العُكْبَر ، موطنه الشرق الاوسط ، طوله نحو ١٨ سم. وذنبه ٧ ، جسمه اسطواني الشكل مقبضه مقطوم الطرف . اذناه مستديرتان كبيرتان . قوته الى الصهبة البندراء يقيم قليل مع اقرباه من الظهور ويبيض عند البطن . يألف الحقل والمراعي ومختلف الاثر ويجاري الماء . قوته المواد النباتية على اختلافها من الحبوب الى الثمار والحبوب والقماء وكما القصب .

١٨٨٦٥ - عُكْبَرُ الْحَقْل * ، قَلَاةُ الْفَيْط

Microtus arvalis, Arvicola arvalis (S). *Campagnol des champs* (F).

نوع من العُكْبَر ، موطنه فسح الاربياء يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اردية ومن البلاد المصرية حتى امالي السودان . جسمه اسطواني الشكل ، طوله يبلغ ١١ سم. وذنبه ٣ ، قوته الى الصهبة الصفراء ، بطنه الى البياض الشبي . عذب جرمزه ابيض . مقبضه متدلل القضيبي اذناه مستديرتان صغيرتان || يألف الحقل والمراعي والارحاج والحدائق ويجاري الماء والمستنقعات . يعيش على السواحل البحرية وفي الجبال حتى ارتفاع ١٨٠٠ م . يركض بسرعة يحمي السير ويحسن السياسة لكنه اخفق التسلق عليه || قوته جميع المواد النباتية مما كان صعبها وروها .

١٨٨٦٦ - عُكْبَرُ قَلَاةِ

Microtus amphibius, Arvicola amphibius (S). *Campagnol amphibie*, *C. aquatique* (F). *Water rat*, *Water vole* (E). *Wasserratte*, *Mollmaus* (D).

نوع من العُكْبَر ، طوله ١٦ سم. وذنبه ٨ ، جسمه ضم الحية . مقبضه ذات الشكل . اذناه كبيرتان . قوته الى الصهبة السراة يقيم مع اقرباه من تيج الظهور وينصرف الى البندرة عند الصبر والى البياض عند البطن ونحوالي الجرامس . يألف مستنقعات البيرات والاهر ويجاري الماء . يسبح ويطس ويقلق الاجشجار . قوته الحبوب والحبوب والحشرات والقشريات والاسماك الصغيرة .



عُكْبَر اصمر



عُكْبَر الحقل



عُكْبَر قَلَاةِ



عُكْر ابو قَرْيَن



عُكْرُ أَبُو قُرُون



عُكْرُ أَحْمَر



عُكْرُ الْمَرْج



عُكْرُولُ مَلُوق

الانسياب . تعيش في الماء ولا تطفو على سطحه إلا عند الحاجة إلى تجديد الهواء إلى جسمها كبير القند يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم . ثوبها إلى السرة القصية يبلغها مروج أخضر . كوسلها وظهورها مغطيان بخمار أصفر . وأصبا مشعشع الشكل ، قصير السطح . فكاهها قوالب . حينها كيرتان زائها مقيقان ، مستطيلان . غوارها مستدير الطرف اللاصق . جرابها صفراء اللون تتميز بغير الفرج الخلفي المبط الساق والارياض المدة لتجديد . أرسافها خالية النمل || الاشي اكبر قنما من الدكر وابت ثوباً منه وأبلغ تحديداً في غصنها || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجملانة في أوائل الربيع وتعيش حتى أواسط الخريف . قوتها كل ما تفسر لها من الحيوانات الدنيا التي تقتنصها في الماء || الاشي تجمع المكان في لبر على صفحات الاوراق التي تلتصق التراب . يتخفى ولكن يند منه نحو ثلاثة أسابيع عن يرقات مدوية الشكل ، حمراء اللون ، سود قرؤوس ، كثيفة الخلف تسمى الماء بعد التفت يربون وهي كالحشرات الجملانة تسبح وتطس وتقرس كل ما تفسر لها من الحشرات الدنيا والاوالي .

١٨٨٨٤ - **عُكْرُولِيَّات** (S).
Dytiscidae (S). Dytiscidae, Predaceous diving beetles (E). Schwimmkäfer (D).

فصيلة حشرات قاصصة ، مائية من رتبة غدييات الانجسة . اجنساها وانواعها المروفة عديدة ، معظمها من حشرات مياه المناطق الحارة . تألف النائم والاهوار والبيمرات والانهير والراكدة المياه ولا تطفو على سطح الماء إلا عند الحاجة لتجديد الهواء إلى اجسامها متفائلة القند ، منها الصغيرة اللقية التي تطول نحو ٢ سم . ومنها الكبيرة المستفصنة التي تطول نحو ٤٠ سم . جميعها يضيئة الشكل ، معتدلة الاجساد . تتميز جرابها الخلفية المبطلة الارياض المدة للسياحة . ارياش الجراب الامامية ، عند الذكور ، مجهزة بحصان تمكّنها من التفتت بظهور الاالات عنه الكوم . وهي لا تخرج من الماء الا في زمن التمكنة او عند الانتقال إلى مكان إلى مكان تقصر اذ ذاك في الليل || البرقة كالحشرة الجملانة تسبح وتطس وتقرس كل ما تفسر لها من الحيوانات الدنيا || اشهر اجنساها المكنول والذيقول والمندروس والفراس .

١٨٨٨٥ - **عُكْس** - قَدْرِيَّع ، قَرْدِيَّع
Marcottage (F). Layering (E).
احدى طرائق تكثير النبات تقوم بحني السمن ودننه في التربة دين فصله عن امه الى ان تبرز له جذور فيفصل ويفرس .

١٨٨٨٦ - **عُكْسُ التَّنَوُّجَة** (F).
Denitrification (F). Denitrifying (E).
تحويل يحصل في بعض الارية الربطة بتأثير جراثيم خاصة تحول النترات الى نيتريت فامونيك فازوت وهو بذلك يكون عكس التربة ومنه ضرر كبير لان النترات القرب تفيض واسهل امتصاصاً من النيتريت .

١٨٨٨٧ - **عُكْسِين** (F). Invertin (E).
Invertine (F). Invertin (E).
خيرة العكس تمكس السكروز فيصير غلوكوزاً .

١٨٨٨٨ - **هِكْم** (F). Envelope (E).
Enveloppe (F). Envelope (E).
العكس الغلاف . ج امكاه ومكاه .

١٨٨٨٧ - **عُكْرُ أَبُو قُرُون** (S).
Trapa natans (S).
Macro commune (F).

نوع من العكر الجليل يعيش في جميع مناطق البلاد الحارة والمستنلة . ثماره مأكولة تستعمل مسلوكة أو مشوية بني بحجم الكعكة تحمل أربعة قرون متعاقبة ذرية سادة شاذكة .

١٨٨٨٧ - **عُكْرُش** (S). Fétuque (F).
Festuca grass (E). Schwingel (D). Festuca (I).
جنس نباتات عشبية مرعوية حولية أو مدمرة من فصيلة النجيليات . انواعه زهاء ١٠٠ معظمها احشاش كلثية تنطفلها الماشية من الخيل الى الماعز . وقد قيل فيه :
« احلت حمارك عكرشا حتى يحيد ويكشا »

وهو من النباتات التي ترعب في الارية المستنعة الحافظة على رطوبتها || اشهر انواعها المرعوية التي تزرع في المروج والمراعي الثلاثة التالية :

عُكْرُش أَحْمَر (F). Fétuque rouge (F).
Festuca rubra (S).
عُكْرُش الْمَرْج (S).
Festuca pratensis (S).
Fétuque des prés (F).
Festuca elatior (S).
عُكْرُش مَسْتَصَب (F).
Festuca ovina (F).

١٨٨٨٨ - **هِكْرُشَة** (F). Doe-rabbit (E).
Hase (F).
هي انثى الارانب .

١٨٨٨٩ - **هِكْرُشِيَّات** (S).
Festucaceae (F). Festucaceae (E).
سبط من النجيليات يشمل عدة اجناس وانواع ، اشهرها العكرش . معظمها نباتات عشبية برية وبعضها علمي ، يزرع في المراعي .

١٨٨٩٠ - **هِكْرَمَة** (F).
Pigeonne (F).
هي الحامة ، أنى الحام . اما الاكبر فهو المزنط والمخيل .

١٨٨٩١ - **هِكْرِيَّو** (S).
Aldchryson (F). Aldchryson (E).
نبات عشبي ممر من فصيلة الخلدات . منته بعض الايام البحر الابيض المتوسط . ساقه فارقة خلية الماء ، تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه متعقبة ، متعاقبة ، كلوية الشكل ، جميلة الخضار المزاجي . ازهاره متقوية التجميع . ازهاره صفراء اللون .

١٨٨٩٢ - **هِكْرِيَّسْ أَسْوَد** (S).
Xylodoris aser (S).
Xylodoris noir (F).

حشرة مدترمة من فصيلة القترسيات . جسمها شديد الصفر يطول نحو ٣ سم . ثوبها إلى السرة القطنانية ، يهت في البطن ويصق في الرأس والكتول والحجفة والخنجين || رأسها محرم . خطمها معتدل الحجم . حينها صفيرتان . كوسلها عمودي . حجبها حمرة . حجبها صفيرتان . روشناها اخضران . قوتها دقيقة ، حمراء اللون || تألف حراج العشور وتعيش بين القشور وتحتها . قوتها الحشرات والحولم .

١٨٨٩٣ - **هِكْرُولُ مُطْرُوق** (S).
Dytiscus marginalis (S). Dytique marginé (F).
Dytiscus marginalis (E).
حشرة مائية قاصصة من فصيلة المكنوليات ورتبة غدييات الانجسة . تألف المناطق والفران ويجاري المياه البليطة

Sarcoptes (S). Sarcopte (F). **عُكْسَة** ١٨٨٩٨ - **عُكْسَة**
Sarcoptes (E).

جنس حشرات جلدية من فصيلة الجربيات ورتبة القُرَدِيَّات
انزاعه عديدة جسمها صغيرة القد، ذرية، مؤذية عابطة
بعضها يحدث الجرب في الإنسان والحيوان || يكاتف
بإستعمال مركبات الكبريت .

١٨٨٩٩ - **عُكْسَة أَيْفَة** * **جَرَب أَيْفَة**
Sarcoptes laevis (S). Sarcopte lisse (F).

نوع من الجرب يركب بصل أرياش الطير فيسبب قسوطها.

١٨٩٠٠ - **عُكْسَة قُمْلِي** * **جَرَب قُمْلِي**، **جَرَب**
Sarcoptes scabiei (S). **نَاصِب**

Sarcopte de la gale, Acara de la gale, Gale sèche (F).
Iech-mite (E).

نوع من الجرب الشائع يتطفل على النمل والأبل والبق
والنمل والماعز فيؤذيها في جلودها ويسبب لها الحكاك
والقشر والشحار .

١٨٩٠١ - **عُكْسَة مُتَغَلِّب** * **جَرَب مُتَغَلِّب**
Sarcoptes mutans (S). Sarcopte changeant (F).

نوع من الجرب يتطفل على أرواغ الطير اخضعها الداجنة
فيؤذيها ويشوها .

١٨٩٠٢ - **عُكْسَة**
Empoquetouse (F).

هي الصارة جهاز ميكانيكي يصم ويبلب الأشياء .

١٨٩٠٣ - **عُكْسَة** * **عُكْسَة**
Bionomie (F). Bionomics (E).

علم البيئة الخارجية ويدعى تأثيرها في الكائنات الحية .

١٨٩٠٤ - **عُكْسَة**
Traitement (F). Treatment (E).

هو الدواء المُستعمل في مكافحة مرض معين أو وسم مقدر .

١٨٩٠٥ - **عُكْسَات شَالِيَّة** ، **أَدْوِيَّة**
Traitements curatifs (F). Curative treatments (E).

هي الادوية الناجمة المستعملة للشفاء من علة بدت أو
لقضاء على حشرة ظهرت . واجب فاس .

١٨٩٠٦ - **عُكْسَات وَكَلِيَّة**
Traitements préventifs (F). Preventive treatments (E).

هي الادوية التي يحسن استعمالها وقاية من مرض يمتنى
وقوعه أو لاجتناب وسم مرتقب .

١٨٩٠٧ - **عُكْسَة**
Chélat (F).

الطلاس مركب عضوي يمكنه اختلاط مع المادان الثرية
من تكوين تآلف عنصري يقوم الانحطاط دون ان يترك
سيرة التشكيل النهائي .

١٨٩٠٨ - **عُكْسَة**
Olace

جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة العُكْسِيَّات .

انواعه المعروفة ٢٥ منها معظم المناطق الحارة والاستوائية
من العالم القديم واسرائيلية || الجهر انواعه عُكْسَة مرتدب
(Olace de Ceylan) اوراقه مأكولة وتطبخ كالمكفوف
وفيهر .

١٨٩٠٩ - **عُكْسِيَّات** * **عُكْسِيَّات**
Olaceace (S). Olacées (F). Olacaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مشتقة القنالات مرتفعات
المبيض . اجناسها المعروفة ٢٦ اما انواعها تنمو ١٧٠ ||

١٨٨٨٩ - **عُكْسَة أَيْفَة** *

Mycetophila elegans (S). Mycetophille élégant (F).
حشرة لارؤية من فصيلة العُكْسِيَّات . جسمها صغير القد
يطول من ٢ الى ٦ مم . رأسها صغير . عيناها بارزتان .
زباناها خيطيان . ثوربا الى الصفرة الصتائية . ودونها
الى الصفار الباهت . قوائمها كبيرة . غنايبها مجهزة
بمتناسخ حادة || مرتعها القبابات . الاثني اكبر قدأ من
الذكر ، تنجح مكبتها في سرق الفطور وفي نكاحه فينتف
من يرقات تميل على الفطور حتى طور الكمال .

١٨٨٩٠ - **عُكْسِيَّات** * **عُكْسِيَّات**
Mycetophilidae (S). Mycetophilidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد . معظمها من علم الاقاليم المعتدلة
المتحركة نحو البادية . مرتعها القبابات حيث تكثر الفطور ||
اجسامها صغيرة . نحيلة . رؤوسها صغيرة مثنية . عيناها
زمنية . قرونها الاستشعارية خيطية ، تعد من ١١ الى ١٧
فصلة . اعطامها فاجية . قوائمها مستقيمة . غنايبها مجهزة
بمتناسخ نشطة || يرتعها شبه اسطوانية الشكل ، يمشاء
اللون . جميعها خاملة أو دامتة . خادراتها طليقة لا تنمن
في التربة لكنها تلتصق بشاء رقيق .

١٨٨٩١ - **عُكْسَة** * **عُكْسَة** * **عُكْسَة**
هي سويجان الجبل ، اطبل .

١٨٨٩٢ - **عُكْسَة** * **عُكْسَة**
Gundella tournefortii (S). Gundéle, Gundélie, Accoub (F).

نبات عشبي بري شوكي معمر ويصد الجلس والقرع
من فصيلة المركبات . اصطناع بلاد الشرق الاوسط يكثر
في المناطق البرية الجبلية . وهو بقلة نادرة لا تتحلل من
بعض الفيتامينات والناصر المفيدة . فلانها مأكولة تستعمل
مطبوخة .

١٨٨٩٣ - **عُكْسَة**
Racine de la queue (F).

اصل ذنب الدابة حيث حري من الشعر من مغز الذنب .

١٨٨٩٤ - **عُكْسِي** * **عُكْسِي**
Ixa (S). Ixa (F). Ixa (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات حشرات الاربل ،
قصار الذيل وفصيلة القشريات . انواعه المعروفة قليلة
العدد اصطناعا بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة تطيل
من ٢ الى ٣ سم . وتعرض من ٥ الى ٦ سم . تتميز
بامتداداتها الجانبية الاسطوانية الشكل الهزلية الأطراف
الدنية . ارجلها نحيلة مستقيمة . ملاصقتها حقيقة
الأطراف || انزاجها الى السمرة المتفاوتة الشدة والملاجات
الحطية والزمنية .

١٨٨٩٥ - **عُكْسِي** * **عُكْسِي**
Achronique, Acronyque (F). Acronychal (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نجم أو كوكب عندما يكون
مركزه في الفضاء مائكا الشمس فيظهر عند غروبها
ويغرب عند شروقها .

١٨٨٩٦ - **عُكْسِي** ، **دَرِيْنَة** ، **رَكِيْدَة**
Marcotte (F). Layer (E).

النصن الذي يمسك أو يدرغ أو يرقه .

١٨٨٩٧ - **عُكْسِي** ، **رَكِيْدَة** ، **رَكِيْدَة**
Provin (F). Layer of a vine (E).

سرع الكورة الذي صار تدريج .



عُكْسَة أَيْفَة



عُكْسَة



عُكْسِي



عُكْسِي



عُكْسِي

١٨٩٢٠ - عُلُجُوم

الطراد والائل والحاج والبيت والكوش جميعها من العُلُجُوم .
ج اعلاش (اللسان) .



علائش

١٨٩٢١ - عُلُجُوم

Onagre gros et gros (F).

هو الحمار الوحشي السمين القوي .

١٨٩٢٢ - عُلُجُوم * ، عُلُجُوم

Arundinaria (S).

Bambou (F). Bamboo (E).

جنس نباتات قصية برية وزراعية من عائلة الخيزرانيات
وفصيلة النجيليات . اولوهة خضراء رطب في الاربة الرملية
القبالية الرملية . اشهرها ما يلي .



علائش

١٨٩٢٣ - عُلُجُوم نَمَاح

Arundinaria nitida (S).

Bambou luisant (F).

نوع من العُلُجُوم يملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . سلاحيته
الى الجذوة البنفسجية . صبره عليه الاقنان . اوراقه تطول
من ٦ الى ٨ سم . نصلها مائل للبرشة جبل الخضار اقزامي
اللاصق || رطب في الاربة القليلة الاندماج الوفرة للمواد
المضوية .

١٨٩٢٤ - عُلُجُوم مُشَبَّح

Arundinaria tessellata (S). Bambou à réseau (F).

نوع من العُلُجُوم يملو من ٨٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه
ذقنة اقزام الاخضر تطول نحو ٤٥ سم . وتعرض نحو ١٠
نصلها جبل الخضار يحيطه اطراف اصفر ويحمل حل صفحته
السفل خطين اقزاميين متوازيين مع الصلغ || رطب في
الاربة الرملية القبالية الرملية .

١٨٩٢٥ - عُلُجُوم مُوَسَّح

Arundinaria veitchii (S). Bambou penché (F).

نوع من العُلُجُوم يملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . سلاحيته
اسطوانية . صبره محيطة مفندة . اوراقه مثقبة تطول
من ١٢ الى ١٥ سم . وتعرض نحو ٣ . نصلها اخضر الصفحة
العليا املح السفل يحيطه اطراف اصفر || رطب في الاربة
الخفيفة القليلة الرملية .



علائش

١٨٩٢٦ - عُلُجُوم نَخْلِي

Arundinaria palmata (S). Bambou-Palme (F).

نوع من العُلُجُوم يملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . سلاحيته
اسطوانية . صبره محيطة مفندة . اوراقه مثقبة تطول
من ٢٥ الى ٣٥ سم . وتعرض من ١٠ الى ١٢ . نصلها اخضر
الصفحة العلويا يجري السفل || رطب في الاربة الرملية
القبالية الرملية .

١٨٩٢٧ - عُلُجُوم وَصِيح

Arundinaria humilis (S). Bambou de fortune (F).

نوع من العُلُجُوم يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . سلاحيته
اسطوانية خضراء اللون . صبره دبينة . افناده قليلة . اوراقه
مبسرة تطول من ١٠ الى ١٥ سم . نصلها مائل للبرشة
جبل الخضار || رطب في الاربة الرملية القليلة الاندماج
الغنية بالمواد المضوية .



علائش

١٨٩٢٨ - عُلُجُوم * ، ضِفْدَع الحَبْلِي ، ضِفْدَع

Bufo (S). Crapaud (F). Toad (E).

جنس حيوانات دوداء صغيرة القذرة قاذرة من فصيلة
النجيليات ورتبة عديدات الاقنان . اولوهة نحو ٨٠
منتشرة في جميع العالم تتميز من الضفادع العادية بقصر



عُلُجُوم

جميعها اشجار وبخيرات . اسطاحتها بعض اصقاع البلاد
الحارة والاستوائية من العالم القديم . سبطها رطبة ، قرماء .
اوراقها متعاقبة ، كاملة . انزاعها متعقودية التصنع او
فردية || اشهر اجناسها العلائش .

١٨٩١٠ - عُلُكُش * Sardinella surita (S).

Alliche (F). Alliche (E).

سكة بحرية قريبة الشبه بالسردين من فصيلة الصافييات .
اسطاحتها بحار البلاد الاستوائية والحارة وبعض مناطق البحر
الايض المتوسط . سرورها الافواض والقفاف والهاياج .
سرهما كثير العدد كالسردين || جسمها احلياني الشكل
يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . فمها مائل ورفيق . زعنفتها
الظهرية مقعرة الطرف واقرن من الرأس من زعنفة السردين .
زعنفتها الذيلية فارقة مستطيلة الجناح . نوحا الى الرينة
الزرقاء يملوها موج لضي يمين عند الظهر . يطنها الى
البياض القضي المائجة || لحمها مأكول متوسط الصنفت .

١٨٩١١ - عُلَاط Facis latérale de l'encolure (F).

صفحة المتقني في الدواب والمارش . والعلائش صفحتا
المتقني من الجانين || بين الحامة طرفها في صفحي عتقها .
ما اسفل علائشها || وعلائش الشمس هو الذي يترأى كالتلوي
منها كانه غيب .

١٨٩١٢ - عُلَاط Fil (F).

الخط الدقيق . يقال اسطحي الاربة بطلاها اي يخطها .

١٨٩١٣ - عُلَاق Elyme des sables, Oyat (F).

هو الهوس الكتيان ، اطلبه .

١٨٩١٤ - عُلَاقَة ، عُلُكُش ذُتْبِي Pétiole (F). Pétiole (E).

جزء دقيق من الورقة يحمل النصل فينبغ اليه بالنسخ الجليل
ويقتل النسخ الكامل . وهو صلة الوصل بين الورقة والقصو
النباتي الذي يرتكز عليه .

١٨٩١٥ - عُلَاقَة هو الخيش ، اطلبه .

١٨٩١٦ - عُلَاقَة Amande du nerprun (F).

لب جسم البني .

١٨٩١٧ - عُلَاق * Accipiter majus (S).

Epervier majes. Grand épervier (F). Greater sparrowhawk (E).

طائر من البواشق ، طوله نحو ٤٠ سم . ويصله ٨٥ سم .
جسمه رقيق الخوام . ثوبه جل التوش . صدره ابيض الرقعة
الفراء المظلمة بالاسود || خلفه خلق البواشق الا انه
احمر مزاجا واخذ بطلما من سائر انواع جنسه . وهو من
الفواشق التي تجرب العالم القديم ولا تقم في الشرق الاقل
اكثر من خمسين يوما في السنة .

١٨٩١٨ - عُلَاقَة هي السة ، اطلبه .

١٨٩١٩ - عُلِكِب * Tragelaphus euryceros (S).

Tragelapha euryceros, Bongo (F). Tragelaph, Bongo (E).

نوع من الجليل وهو اكبرها قدا وقربا وانسبا قالا واسمها
انتشارا . ثوبه كيت اسمر يملو تجديد ابيض ورتقة صفراء
كسائر انواع جنسه . الاكثر امين لونا من الاثنى || اسطاحتها
فضية الارواء تمتد من بحيرة تشاد الى كيريه والغانين .

Bufonidae (S).

١٨٩٣٢ - عئجويئات

Bufonidae (F), Bufonidae (E).

فصيلة حيوانات من لمة الرئيات ومرتبة السوطيات ورتبة البرمائيات أي عديمات الذنب || أجناسها المعروفة ثمانية وأولها ١٣٠ منها القاذرة والمائية والبرية الجلمة والشاحبة. أصابها نوع أصناف استثناء جزيرة سنغافورة وبعض جزر المحيط الهادي || جميعها عديمة الأسنان. السنبها اليابسية الشكل، فقارها الأمامية المتقدمة عديمة الضلع. أما التتوي الضامي الذي يمتد من الصدر والظهر فينبأ التمدد. أصابع قوائمها الأمامية طويلة. أما أصابع قوائمها الخلفية فقصيرة عظام لاقيامي الذي لانه يختلف مع الأجناس والألوان || أعرف أجناسها وأشهرها العلجوم.

Ephedra (S), Ephèdre (F).

١٨٩٣٤ - عئد

جس نباتات معمرة برية من فصيلة العئديات. أنزاعه المعروفة ٢٠ جميعها جنات فراء عئدة تلو من ١٠٠ إلى ٤٠٠ سم. فروعه متعاقبة ثنائية أو ثلاثية الالتصاف. أوراقها صغيرة متعاقبة تركب القعد. أزهارها وريسة المسكن، الأكثرية منها فردية أو ثنائية التجميع، أسسا الانثوية ضلعية. ثمارها عئية. مهدا شواطيء بحار البلاد الحارة والمتندلة. أعرفها وأهمها العئد المزروع السائبل.

١٨٩٣٥ - عئد مؤدوج السئابل * عئب البحر

Ephedra distachya (S), *Ephèdre distique*, *Raisin de mer* (F), *Sand cherry*, *Ses grape* (E), *Gewöhnliches Meertrauben* (D), *Uva di mare* (I).

نوع من العئد، موطن شواطيء البحر المتوسط، جسته تلو نحو ٢٥٠ سم. سئابل أزهار الانثوية مؤدوجة التجميع. ثماره عئية، صغيرة القعد، حاضرة الطعم، مأكولة، لا تخلو من بعض النافع الطبية وتستخدم في عدة شرايات قئدية مقوية.

١٨٩٣٦ - عئدوس الزوال * ٥

Alydus calcaratus (S), *Alyde des genêts* (F).

سفرة خافضة من فصيلة الكوربيات ورتبة عئلفات الاجسمة. جسها مسط، مئمر الملب يطول نحو ١٢ سم. رأسها شبه يئهي الشوزن، أسود اللون. عئطها متندل الطولي. صئاعها صئيرتان، نافرئتان. زباناها مسئيلان. كئيلها مسئلي اللون، أسود الرباط بالراس. صئبئها صغيرة، مؤدوجة، شديدة السرعة. ظئيرها الى الخئلي الاثير. بطئها احمر، جئوي الخئار المشق بالخنئلي. الصئفة السفلى من بطئها الى السواد. قئشرايا شفاء. قوائمها متكاثفة الملب || مسرحها البراري. تركيب العئيد من النبات اصعبا القريبات الفراقية وسبها الزوال.

Gnetaceae (S).

١٨٩٣٧ - عئديئات

Gnétiacées (F), Gnetaceae (E).

فصيلة نباتية من ربيانات البؤور. أجناسها ثلاثة : العئد والربرجس والوعئس.

Alliment (F), Food (E).

١٨٩٣٨ - عئس

هو العئد، اطلبه.

قوائمها. اجسامها تلو من ١٥ الى ٣٥ سم. تبلغ كامل نموا ونشائها بمرحس سنوات. ائليها عئطية، ثلوية الجلمة، تحمل بعض الند القاذرة. سئالها كرية الرئحة كارية تنفسها ورتئها دفعا عن النفس.

١٨٩٣٩ - عئجوم أخضر * *Bufo viridis* (S), *Crapaud vert* (F), *Green toad* (E).

نوع من العلجوم القاذرة. أصنافه جميع الاصناف المتندلة الحارة من المال القديم || جسسه متوسط القعد يطول نحو ١١ سم. عئد الذكر ونحو ١٥ سم. عئد الانثى. جلده كثير التئول الصغيرة تتخللها بعض الند القاذرة. سئالها كرية الرئحة كاو بقلده العلجوم دفعا عن النفس || رأسه قصير. عئاه كيرئتان. فه واسع الشفق. فكاه عائدات الأسنان. أصابع قوائمها الأمامية طويلة. أما الخلفية فقصيرة عظام يكئفئ الزام الاثلى || ثوبه الى السرة الزينة المواج تلوها رقيقة حراء ورسئجة خضره يطولها الاسود || مسرحه دجوي. قوته الحشرات وما استطاع من الزحافات || الاثنى تئرا من ١٥٠٠ الى ١٢٠٠ دئلة في حبال مسئيلة تلفها على النباتات المائية || يئثر من الحيوانات النافعة لانه يقضي على الكئير من الحشرات والجران والديبة.

١٨٩٣٠ - عئجوم البئجر

Baudroie (F).

هو الكركع، جسس اسماك بحرية، اطلبه.

١٨٩٣١ - عئجوم جئجر * *Bufo marinus* (S), *Agua*, *Bufo géant* (F), *Giant toad* (E).

نوع من العلجوم. أصنافه امريكة الجئوية والوعئس. جسسه كبير القعد يطول نحو ٢٥ سم. عئد الذكر ونحو ٣٥ سم. عئد الانثى. جلده متعل وتعلو غدد قاذرة، سئالها كرية الرئحة كاو. رأسه غليظ وقصير. عئاه كيرئتان، جاسئطان. عئطه واسع الشفق، مقطوع الطول معلو بن عئلي المادة يئد من طرف الخئط الى سئوي العين. فكاه عائدات الأسنان. أصابع قائمئها الخلفيئن مقئدة عظام يكئفئ الزام الاثلى || ثوبه الى السرة الخئطية يلوها مواج اخضر ورقيقة سواد تتخللها الذيرة || مسرحه دجوي. قوته الحشرات والزحافات. الاثنى تئرا من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ دئلة في حبال مسئيلة تلفها على النباتات المائية || يئثر بئقئحه الفئاج الشبيه بمواء الكلب.

١٨٩٣٢ - عئجوم مئدول * *Bufo bufo* (S), *Crapaud commun* (F), *Common Toad* (E).

نوع من العلجوم. أصنافه جميع اصناف البلاد المتندلة الحارة من المال القديم || جسسه متوسط القعد يطول نحو ١٥ سم. عئد الذكر ونحو ١٤ سم. عئد الانثى. جلده كثير التئول يتخللها بعض الند القاذرة، سئالها كاو كرية الرئحة || رأسه قصير. عئاه كيرئتان-جاسئطان. عئطه واسع الشفق. فكاه عائدات الأسنان. أصابع الخلفية وائرة الخلفي. ثوبه الى الخضر الاسمر يطول مواج زئبي ورقيقة كئئئسة || مسرحه دجوي. قوته الحشرات والزحافات والديبان || الاثنى تئرا من ٤٠٠٠ الى ٧٠٠٠ دئلة في حبال مسئيلة تلفها على النباتات المائية || يألئ حياة الاسر ويئثر بحاسة التئوج. يئثر من الحيوانات النافعة.



علجوم اخضر



علجوم جئجر



علجوم مئدول



عئد مؤدوج السئابل



عئدوس الزوال

الاستعمارية خطية طويلة . مرزاتها قصيرة مدببة . رقاتها عادمة الأبريل البطنية ، مزدوجة التقويس الماكس الذي يشبه الكلاب .



علة الاجاص

١٨٩٤٥ - **عُكْسَالِيَّاتُ** * (F). *Phalaropus* (S).
طائر وحيد الجنس والنوع من حمارة البطاليات . طوله نحو ٢٢ سم . ظهره الى السمره الصهباء يعلوها جناح اسود . رأسه وصمرا الى السمره . زروه ابيض . عتقه وصدره الى الصهبه الرمادية . بطنه وخوابيه واثنيها يهش . جناحه ضيق ذئق ، اسود الظاهر ، ابيض الباطن . ابطاره وقوامه صفر الخمار . منقاره مستطيل احمر اللب . ارسافه قوية اصابعه مفصصة الخياط || الاثني اسمر قدام من الاكبر واقل تلويها . ثمن بين الاضباب قرب الماء . تبيض ٤ يبيضات تحفصها بمناوئة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوما .



علة الزرع

١٨٩٤٦ - **عُكْسَالِيَّاتُ** * (F). *Phalaropodius* (F).
حمارة طير من فصيلة دجاجيات الارض القواطع . اجناسها وانواعها قليلة . اجسامها صغيرة القدر . مناثريها مستطيلة . ارسافها قوية ، اسابعها مفصصة الخياط || رتادها خطوط الجدار وضفاف الجحيرات . تقضي نصف اوقاتها حائمة على سطح الماء ولتصنف الآخر في الاجواء وحل الحفص . قوتها القشرية والرخويات والخرافيت والاسماك الصغيرة والحرايز ويضض الاضباب || لها جيلسان : الملعل والمخلفات .



عطر جلع

١٨٩٤٧ - **عُكْسَالِيَّاتُ** * (S). *Melanocorypha* (S).
جنس طير من فصيلة القتريات . انوعه ٩ ، اطلسها البلاد الاسوية والافريقية والارودية . جميعها غريبة الرأس ، مستطيلة الجناح ، قصيرة الذنب ، دقيقة الرسع ، قوية المنقار . انثياها الى الصهبه الخفيفة تعلوها ريشه صمرا . تأثف الحقل المنزوية والمراعي والرباق . ثمن في المراعي وبين الزروع . انثياها تحفص وضعا من ٤ الى ٥ يبيضات || اعرف انواعه واشهرها :

عسل الحيشة * (S). *M. albiterminata* (S).
عسل المند * (F). *Calandra d'Abysinie* (F).
عسل روسيا * (F). *M. maxima* (S). *Calandre de l'inde* (F).
عسل زنجي * (F). *M. tatarica* (S). *Calandre de Russie* (F).
عسل معروف * (F). *M. negra* (S). *Calandra negra* (F).
M. calandra (S). *Calandre commune* (F).



ملال

١٨٩٤٨ - **عُكْسَالِيَّاتُ** * (S). *Tapiscia* (S).
جنس نباتات تزيينية مسرة من فصيلة النسيات . انواعه قليلة جميعها شجرية تعلو من ٦ الى ٨ انتار . اولقاتها حاملة ، مركبة ، ورية . وريقاتها خاسية او سباحية البند . نصلها يبيضي الشكل ، ظلي القناعت يعلو من ٦ الى ١٣ سم . صفحته العليا غضراء اللون اما السفلى لصلها . ازهاره متكونة التجميع ، محورية الإرتكاز ، صفراء اللون ، صغيرة القدر ، قواصة البرف الطري .



عسل

١٨٩٤٩ - **عُكْسَالِيَّاتُ** * (F). *Alfener* (F).

١٨٩٢٩ - **عُكْسَالِيَّاتُ** * (S). *Cephus* (S).
الرأسية علة . جنس حشرات من فصيلة العليسات . انوعه عديدة . اجسامها نحيلة مستطيلة . وريثها شفافة ، كثيرة المروق . قروتها الاستعمارية خطية ، رقاتها دقيقة الجسم كالأبنة الشكل ، عادمة الأبريل البطنية اعرف انوعه واعمرها علة الاجاص وعلة الزرع .

١٨٩٤٠ - **عُكْسَالِيَّاتُ** * (S). *Cephus* (S).
جنس من العليسات ، طولها يراوح بين ٩ و ٨ سم . جسمها اسطواني الشكل . جوشها اسود اللون تعلوها مشعة صفراء . يعلوها الى الصفرة البرتقالية . تظهر في الربيع وتجمع مكانها في لحاء الاقنان يفتن في رقات تلمد الكثير والشجب فضله وتسبب ذبول التوايح وموتها .

١٨٩٤١ - **عُكْسَالِيَّاتُ** * (S). *Cephus pygmaeus* (S). *Céphé du poirier* (F).
جنس من العليسات ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم . جسمها نحيل البنية ، اسطواني الشكل . نوبها الى السمره ، يعلوها يجمع بالاصفر . تجمع مكانها في قصب الزرع فيقتف عن رقات تدخل القصب وترعى لب الكمار فتصنع اللنج من السنايل التي تبيض وتلوي || تكلف بتقلاص وسرق الجلمل لانها تبيت فيه ضمن فرائق صغيرة وشمة الشكل .

١٨٩٤٢ - **عُكْسَالِيَّاتُ** * (F). *Altimètre* (F).
جهاز يمين رماء الموضع بالنسبة الى سطح البحر اي ارتفاع المكان من مرمى مياه البحر .

١٨٩٤٣ - **عُكْسَالِيَّاتُ** * (F). *Chilochorus* (F).
حشرة خاتلة آفة ناعمة من فصيلة الصمقيات ودية مندعات الاجنسة . تأثف غايات الصنوبر وخرابيه . خناضها وريقاتها تبيض على الارق الذي يركب الصنوبر || جسمها صغير القدر يعلو من ٤ الى ٥ سم . نوبها الى الاسود الباقين . غمداتها ثلاثا البقيع السنايب . واسها مستدل الجرم . عيناها كيرتان . زبائنها صقيان . فكها ضليمان . ظهورها مستدير الاطراف اللامعة . غمداتها شديدة الصلابة كيثفت النمل . ارسافها رباعية العقل || اجسامها الحولية ثلاثة . تخرج الحشرة الجملانة من يائها الشتوي في نيسان . تسرح في الجدار رتيبت في الليل || البرقة سريعة النمو شبه اسطوانية الشكل تعلو عند الادراك اتمام نحو ٧ سم . نوبها الى السمره النحسية يعلوها ظل اغبر || اما غنصها الجبل الثالث فانها تقضي فصل الشتاء مختفية تحت الحجارة ولا تخرج من مكانها الا عندما تدب الحرارة في اواسط شهر نيسان .

١٨٩٤٤ - **عُكْسَالِيَّاتُ** * (F). *Cephidae* (S). *Céphidae* (F).
فصيلة حشرات من رتبة شحاتيات الاجنسة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها نحيلة مستطيلة ، قروتها

الشفة جزء من العطاء المذكور بحري ما قدره

مادة العطاء	عناصر حمام										الحين الطائفي بالنسبة الي	مواد أسية منهضة الي	القيمة الطائفة التنوية لي منه جزء
	عناصر منهضة					عناصر حمام							
	مواد التي منه جزء	مواد التي منه جزء	مواد التي منه جزء	مواد التي منه جزء	مواد التي منه جزء	مواد التي منه جزء	مواد التي منه جزء	مواد التي منه جزء	مواد التي منه جزء	مواد التي منه جزء			
ريضان مرموي	٣٤٧	٧٠	١٣٥	١٠٩	٤٥	٤٥	٧٠	١٣٥	١٠٩	٤٥	٧٠	١٣٥	١٠٩
جلبان	٣٥٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣
بالية	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥

٣ - في الثمن

١٨٩	٢٥	٠٤٩	١٥٦	١٩٣	٠٥	٣٤	٣٣٥	٣٨٢	١٥	٧٥	٨٥٧	١٨٩	٢٥
٢٣٧	٣٢	٠٥٨	١٥٣	٢١١	٠٦	٤٦	٢٩٢	٣٩٧	٢٠	٩٢	٨٥٧	٢٣٧	٣٢
٣١٠	٣٨	٠٦٧	١٥٠	٢٥٧	١٠	٥٤	٢٩٣	٤١٤	٢٥	٩٧	٨٥٧	٣١٠	٣٨
٤٦٢	٥٠	٠٧٤	١٣٨	٢٧٩	١٣	٧٤	٢٩٩	٤١٦	٢٨	١١٧	٨٥٠	٤٦٢	٥٠
٤٠٦	٦٥	٠٧٨	١٣٧	٣٠١	١٥	٩٢	١٩٣	٤٠٤	٣٠	١٣٥	٨٥٠	٤٠٦	٦٥
٣٥٧	٥٥	٠٧٣	١٤٠	٢١٤	١٦	٦٩	٢٢٥	٣٩٤	٣٤	١١٥	٨٥٢	٣٥٧	٥٥
٣٧٧	٦٠	٠٧٧	١٣٢	٢٧٢	٢١	٨٢	١٩٧	٤٠٤	٤٠	١٢٤	٨٥٠	٣٧٧	٦٠
٢٨٥	٦٤	٠٧٤	١٥١	٢٧٠	٢١	٨٢	٢٢٦	٣٩٧	٣٦	١٢١	٨٥٥	٢٨٥	٦٤
٣٤٧	٣٧	٠٦٩	١٥٨	٢٨٣	١٣	٥١	٢٩٧	٤٤٢	٢٤	٩٣	٨٩٠	٣٤٧	٣٧
٣٣٨	٥١	٠٧٢	١٤٥	٢٥٤	١٢	٧٥	٢٣٣	٤٠٤	٢٥	١١٤	٨٥٠	٣٣٨	٥١
٣٣٧	٥١	٠٦٩	١٥٣	٢٧٦	١٠	٥٠	٢٩٠	٤٣٢	٢١	٨٧	٨٥٠	٣٣٧	٥١
٣٠١	٣٠	٠٦٥	١٦٤	٢٤٦	٤٢	٤٣	٢٨٤	٤١٧	٢٧	٨١	٨٨٣	٣٠١	٣٠
٢٠٩	٣٠	٠٥٢	١٥٠	٢١٨	٠٨	٢٨	٢٣٤	٣٧٢	٢٤	٧١	٨٧٠	٢٠٩	٣٠
٣٥٢	٤٨	٠٦٧	١٨١	٢٦٧	١٧	٥٦	٣٠١	٤٢٤	٢٤	٧٥	٨٨٥	٣٥٢	٤٨
٣٠٣	٤٨	٠٦٤	١٧٦	٢٣٤	٠٩	٦١	٢٩٤	٣٨٥	٢٢	١٠٨	٨٦٦	٣٠٣	٤٨
٢٢٥	٣٣	٠٦٦	١٥٤	١٩٩	٠٨	٥١	٣٠٢	٣٦١	٢٧	١٠٢	٨٥٧	٢٢٥	٣٣
٢١٠	٣٥	٠٥٥	١٥٦	١٧٥	٠٨	٤٦	٢٩٤	٣٢٦	٢٧	١١٢	٨٥٧	٢١٠	٣٥
٣٠٦	٤٩	٠٧٣	١٤٩	٢٦٦	١٤	٧١	٢٢٩	٤٠٤	٣٢	١١٢	٨٥٧	٣٠٦	٤٩
٢٦٦	٦٢	٠٦٩	١٧١	٢٧٣	١٥	٧٣	٢٨٥	٣٩٠	٢٥	١٠٤	٨٥٧	٢٦٦	٦٢
٢٩١	٣٢	٠٦٤	١٥١	٢٥٥	١٠	٤٠	٢٨٥	٤٠٤	٢٤	٨٥	٨٥٧	٢٩١	٣٢
٢١٠	٥٥	٠٧٠	١١٣	٢٦٠	١٧	٨٥	٢٤٠	٣٧١	٢٩	١٣٤	٨٣٥	٢١٠	٥٥
٢٦٥	٨١	٠٦٣	١١٣	٢١١	١١	١٢١	٢٧٠	٣١١	٢٤	١٦٢	٨٤٠	٢٦٥	٨١
٢٢٤	٩٢	٠٧٥	١٣٢	١٨١	٢٢	٩٧	٢٩٥	٣٩٢	٢٧	١٤٢	٨٣٥	٢٢٤	٩٢
٣٢٩	٧٨	٠٦١	١٠٧	٢٥٢	٢١	١٠٩	٢٤٩	٣٠٤	٢٢	١٥٤	٨٤٠	٣٢٩	٧٨
٣١١	٧٥	٠٦٦	١١٨	٢٥٣	١٦	٦١	٢٨٠	٣٢٥	٢٥	١٣٢	٨٣٥	٣١١	٧٥
٣١٠	٨٦	٠٦٩	١٠٨	٢٣٢	١٦	١١٨	٢٤٥	٣٣٢	٣٤	١٥٤	٨٤٠	٣١٠	٨٦
٣٣٠	٥١	٠٧٢	١١٢	٢٧١	١٥	٧٤	٢٥٢	٤٠٧	٣٠	١٣٥	٨٧٥	٣٣٠	٥١
٢٧٤	٥٥	٠٦٤	١٢٣	٢٣١	١٠	٨٣	٢٦٢	٣٥٥	٢٤	١٢٠	٨٣٣	٢٧٤	٥٥
٢٥٨	٨٣	٠٦٠	١٢٩	٢٠٢	١٢	١١٧	٣٠١	٢٨٩	٢٠	١٥٢	٨٣٢	٢٥٨	٨٣
٢٨٨	٦١	٠٦٧	١٣١	٢٣٨	١٣	٨٣	٢٥٧	٣٤٥	٢١	١٣٦	٨٤٠	٢٨٨	٦١
٢١٤	٩٢	٠٦٨	١٢٤	٢٠٩	٢٠	١٢٤	٢٦٢	٣٣٧	٣٠	١٢٥	٨٤٠	٢١٤	٩٢
٢١٤	٤٤	٠٥٥	١٣٦	١٨١	١٤	٨٥	٣٠٣	٢٧٩	٢٨	١٦٧	٨٤٣	٢١٤	٤٤
٢٣١	٤٩	٠٧١	١١٨	٢٥٠	٢١	٨٥	٢٣١	٣٥٧	٢٦	١٤٩	٨٤٠	٢٣١	٤٩
٢٣٦	١٢٠	٠٧١	١٢٨	٢٥٠	١٧	١٢٧	٢٣٣	٢٨٨	٢٨	٢١٨	٨٤٠	٢٣٦	١٢٠
٢٧٨	٦٦	٠٦٦	١٢٦	٢٠٥	١٦	٩٤	٢٥٢	٣٤٤	٢٦	١٤٣	٨٣٣	٢٧٨	٦٦
٣٠٤	١٠٨	٠٦٩	١٢٦	١٨٥	١٤	١٥١	٢٣٤	٢٨٥	٢٣	١٩٨	٨٣٣	٣٠٤	١٠٨
٢٦٩	٦٦	٠٦٥	١٢٨	١٩٧	١٥	٩٤	٢٥٥	٣٢٨	٢٥	١٤٢	٨٣٣	٢٦٩	٦٦
٢٣٨	٨٥	٠٦٩	١٢٤	١٩٦	١١	١٣٧	٢٦٥	٢٤٦	٢٣	١٨٥	٨٤٠	٢٣٨	٨٥
٢٩٠	١٣٧	٠٧٣	١٥٥	٢٢٨	١٤	١٨٩	٢٥٤	٢٨٩	٢٣	٢٢٥	٨٤٠	٢٩٠	١٣٧
٢٧٠	٨٥	٠٦٦	١٢٦	١٩١	٠٧	١١٩	٢٤٥	٢٨٩	٢٣	٢٧٢	٨٤٠	٢٧٠	٨٥
٢٣٠	٨٠	٠٦٩	١٢٢	٢٥٢	٠٩	١٢١	٢٥٣	٣٤٦	٢٥	١٧٣	٨٣٥	٢٣٠	٨٠
٣٥٨	٦٣	٠٧٤	١٣٠	٢٧٢	١٢	٧٧	٢١٨	٤١٨	٢٣	١٢١	٨٥٥	٣٥٨	٦٣

لغة جزء من العلماء المذكور بحري ما قلده

عاجية الخفاء	عناصر محام								الحق العلماني بالنسبة إلى التشاك	موايد آسية منهضة في مكة جزء	القيمة العلمية منهضة في مكة جزء
	عناصر منهضة				عناصر محام						
	موايد جافة	موايد أزوية	موايد دعوية	موايد غير أزوية	موايد جافة	موايد أزوية	موايد دعوية	موايد غير أزوية			
ن نظم	٨٦٠	١٠٥	٢١٠	٢٢٢	١٠٠	٦٢	٣١٢	٣٠٦	١٠٠	٤٧	٢٧٧
ن السليم	٨٦٥	١٥٧	٣٤٥	٢٤١	٢٠٥	١١٠	٢٠٥	٢٤٥	٨٥	٧٥	٣٥٨
ن الخردل	٨٥٠	١١٠	٢٠٨	٢٧٢	٢٦٢	٦٢	٢٤١	٢٧٢	٤٠	٦٥	٢٧٧
ن الزوال	٨٥٠	٩٠	٢٠	٢٨٧	٤١٨	٣٦	٢٠٦	٢٨٧	٢٠	٢٧	١٤٠
ن السفين	٨٥٠	٢٠٧	٢٠٧	٣٥١	١١٥	٢٠٠	١٠٨	٢٠٧	٢٠	٨٥	٣٧٥
ورق القراميس	٨٦٥	١٨٣	٢٨٠	٢٧٧	١٠٦	١٢٨	١٠٦	٢٨٠	٩٣	٩٣	٤٨٠
ورق سوق الجنبيل	٨٩٤	١٢٥	٢٠	٢٨١	٢٤٥	٨٥	٢٠	٢٨١	٢٠	٦١	٣١٠
شن البطاطا	٩٠٠	٩٤	٢٠	٤٠٦	٢٦٠	٢٠٨	٢٠	٤٠٦	٩٦	٢٣	٢٥٣
ورق الانجار القديمة (في ابانح تونز)	٨٤٠	١٠٥	٢٠	٤٩٣	١٤٢	٦٢	٢٠	٤٩٣	٢٠	٢٧	٣٧٧
ورق الحور في تشرين الأول	٨٤٠	١٠٨	٨٧	٢٩٦	١٧٤	٦٠	٢٠	٢٩٦	٢٠	٧٣	٢٦٧
ورق التكملة في الحريف	٨٦٥	١٢٤	٧٥	٥٢٩	٨٠	٦٧	٥٠	٥٢٩	٩٠	٩٠	٤٢٥
ورق الاكاسيه في الحريف	٨٧٦	٩٨	١٧	٤١٠	٢١٥	٥٥	٦٠	٤١٠	٤٠	٤١	١٢٦
شن الطوبوف	٨٧٥	١٢٧	٢٢	٤٨١	١٤٢	٧٦	١٠	٤٨١	١٠	٨٢	٣٧٣
ورق التبردار	٨٨٠	١٥٩	٢٩	٤٩٩	٨٠	٦٠	١١٠	٤٩٩	٨٥	٩٠	٥٠٠

٤ - في الفصح

قش الخندروس	٨٥٧	٢٧	١٤	٣١٨	٤٤٠	٨٠	٤٠	٢٢٠	١١٨	٢٢٨	٦٠	٩٧
قش الشمر العربي	٨٥٧	٢٥	١٤	٣٩٥	٣٩٥	٩٠	٣٩٥	٣٩٥	٢١٣	٤٤٦	٦٠	١٠٠
قش الشمر الشري	٨٥٧	٢٢	١٤	٣٢٥	٣٢٥	٧٥	٣٢٥	٣٢٥	٢١٠	٢٢٠	٥٥	١٠٧
قش الطوفان	٨٥٧	٢٨	١٦	٢٨٧	٢٨٧	٣٠	٢٨٧	٢٨٧	٢٠٨	٤٤٣	١٠	١٧٠
قش الدخن	٨٥٠	٢٣	١٢	٣٦٤	٣٦٤	١٠	٣٦٤	٣٦٤	٢٠٥	١٩٤	٢٠	٢٢٣
قش القردة الصفراء	٨٥٠	٥٠	١٥	٣٤٥	٣٤٥	١٧	٣٤٥	٣٤٥	١٧٢	٤٤٧	١٣	٣٠٥
قش الارز	٨٦٨	٢٥	٢٢	٢٢٥	٢٢٥	٢٥	٢٢٥	٢٢٥	١٠٧	٤٤٠	١٢	١٣٠
قش التيلم	٨٥٧	٢٠	١٢	٢٢٢	٢٢٢	٦٠	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٠	٣٢٠	٤٠	١٠٦
قش الخنقة	٨٥٧	٢٠	١٢	٢٥٩	٢٥٩	٢٠	٢٥٩	٢٥٩	٢٠٤	٢٢٢	—	١٠٩
قش القليل المصري	٨١٦	٨١	١٠	٣١٠	٣١٠	٤٠	٣١٠	٣١٠	٢٠٥	٤٤٨	٢٢	٩٢
قش الحصن	٨٦٤	٩٠	١٦	٢٢٧	٢٢٧	٧	٢٢٧	٢٢٧	١٨٥	٤٤٤	٢٢	١٢٢
قش البالية	٨٦٧	٩٠	١٧	٢٩٨	٢٩٨	٤٠	٢٩٨	٢٩٨	١٦٤	٢٣٥	٢٢	١٢٧
قش القيس	٨٤٠	١٢٩	١٧	٢٨١	٢٢٦	٦٨	٢٢٦	٢٢٦	١٦٨	١٣٧	٤٠	١٦٤
قش القوس	٨٤٠	٦٥	٤٠	٣٠٨	٤١٤	٢٥	٢٥	٢٥	٢٠٠	٤٤٥	١٦	١٩٤
قش الفضل المغربي	٨٤٠	٩١	١٨	٢٢٨	٤٢٦	٢٠	٤٢٦	٢٢٨	١١٨	١١٨	٢٠	٨٥
قش الكرسه	٨٤٠	٦٢	١٢	٢٢١	٢٢١	٢٨	٢٢١	٢٢١	١٥٥	٢٢٣	٢١	١٢٤
قش الصويحه	٨٤٠	٢٤	٢٠	٢٨٣	٢٢١	٢٧	٢٢١	٢٢١	٢٥٢	٢٥٢	٢٠	١٢٢
قش الجلبان	٨٥٢	١٢١	١٧	٢٩٠	٢٩٠	٨٧	٢٩٠	٢٩٠	١٥٠	٢٣٧	٢٠	١٢٧
قش التتم	٨٤٠	٤٨	١٢	٢٢٦	٢٨٢	٢٢	٢٨٢	٢٨٢	١٧٢	٤٤٢	١٧	١٢٥
قش الخشاش	٨٤٠	٦١	١٢	٢٢٩	٢٢٩	٢٨	٢٢٩	٢٢٩	١٨٤	٤٤٢	٢٢	١٢٢
قش السليم	٨٤٠	٢٥	١٢	٢٨٧	٢٢٨	٢٠	٢٢٨	٢٢٨	٢٠٤	٤٤٢	١٧	١٢٢

٥ - عصافه الحبوب

القله	٩٤٣	٢٩	٢٩	٥٥٧	٢٥٨	١٥	٤٠	٢٢٤	٢٢٤	١٢٩	٨٥	٤٠٧
الخندروس	٨٥٧	٢٥	١٢	٢٢٦	٢٢٦	١٠	٢٢٦	٢٢٦	٢٠٠	١٢٧	٧	٢٢٨
الشمر	٨٥٥	٢٩	١٥	٢٨٤	٢٨٤	٨٠	٢٨٤	٢٨٤	١٤٤	١٢٧	٥٥	٤٢٥
الخرفاطل	٨٦٢	٥٠	٢٥	٤١٥	٢٦٧	٩٠	٢٦٧	٢٦٧	١٩٩	١٢٧	٤٠	٢٨٦
الدخن	٨٨٠	٤٨	٢٢	٢٩٠	٤٠٨	١٧	٢٩٠	٢٩٠	١٥١	١٢٢	١٢	١٩٤
القله الصفراء	٨٦٩	٢٥	٢٠	٤١٣	٢٨٩	١٦	٢٨٩	٢٨٩	٢٢٢	١٢٥	٢٠	٢١٠

المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قلده

ماحية الغذاء	عناصر غذاء										الحقن الطبي النسبة الى النشا	مواد أخرى منهضة في مئة جزء	القيمة الطبيعية في مئة جزء
	عناصر غذاء					عناصر غذاء							
	مواد الزيتية	مواد دهنية	مواد غير زيتية	مواد زيتية	مواد دهنية	مواد غير زيتية	مواد زيتية	مواد دهنية	مواد غير زيتية	مواد زيتية			
الارز (السلط)	٩٠٠	٣٧	٤٤	٣٢٧	٣٨١	٤٤	١١٣	١٠٩	١	٢٥			
الشيلم	٨٥٧	٣٥	٤٣	٢٩١	٤٤١	٤٤	١١٣	١٠٩	١	٢٥			
الحنطة	٨٤٠	٤٧	١٧	٣٧١	٣٧١	٤٤	١١٣	١٠٩	١	٢٥			
الفاسوليا واللوبيا	٨٥٠	١٠٧	٢٠	٣٢٥	٣٢٥	٤٤	١١٣	١٠٩	١	٢٥			
الحمص	٨٦٠	٩٨	١٢	٣٢٧	٣٢٧	٤٤	١١٣	١٠٩	١	٢٥			
البنس	٨٥٠	١٨٣	١٨	٣٨٤	٣٨٤	٤٤	١١٣	١٠٩	١	٢٥			
الترس	٨٥٠	٦٨	٧	٤٥٤	٣٠١	٢٦	٢٠١	٤٤	١	٢٥			
الاصحبه	٨٨٠	٦٣	٥	٤٢٠	٢٠١	٢٨	٢٠١	٤٤	١	٢٥			
الكافيه	٨٥٠	١٠٩	٢٢	٣١٨	٣٢٧	٤٤	١١٣	١٠٩	١	٢٥			
القمح	٨٦٨	٤٦	١	٣٥٤	٤٣٥	٤٤	١١٣	١٠٩	١	٢٥			
الكتكان	٨٨٤	٣٥	٣٤	٣٥٠	٤٠٧	٤٤	١١٣	١٠٩	١	٢٥			
السلمج	٨٤٠	٣٥	١٦	٣٤٤	٣٧٤	٤٤	١١٣	١٠٩	١	٢٥			

٦ - في الجلود والفاصل

١٩٠	١	١٠٠	-	١٨٩	-	١	١٧	٢١٠	١	٢١	٢٥٠	بطاطا عادية
١٢٧	١	١٠٠	-	١٢٥	-	١	٩	١٣٩	١	١٦	١٧٠	بطاطا كثيرة الماء
١٩٨	١	١٠٠	-	١٩٧	-	١	٨	٢١٩	١	٢١	٢٦٠	بطاطا قليلة الماء
٢٤٨	١	١٠٠	-	٢٤٦	-	١	٩	٢٧٣	١	٢٥	٣٢٠	بطاطا شديدة الفقر بالماء
٣١٥	١	١٠٠	-	٣١٣	-	١	٩	٣٤٨	١	١٦	٣٨٤	بطاطا مجمدة
١٧٧	١	٩٥	-	١٨٤	١	١	٧	٢١٧	١	٢٢	٢٦٥	بطاطا مطبوخة
٦٨٨	١	١٠٠	-	٦٨١	-	١	٥	٢٢٣	١	٤٥	٨٨٠	بطاطا مجففة
٦٧	١	٩٠	٦	٦٥	-	١	٢	٧٢	١	٢٢	١٢٠	كزب
٨٧	١	٨٧	٧	٨٩	١	١	٨	١٢٣	١	٢٢	١٣٠	جزر
١١٦	١	٨٦	٨	١٢٥	١	١	٩	١٢٣	١	٢٢	١٦٨	ميسلون كبير
٥٠	١	٧٤	٣	٦٤	-	١	٩	١٠٠	١	٢٢	١٥٥	شونيز علي كبير
٧٤	١	٧٠	٣	١٠١	-	١	٨	١٠٦	١	٢٢	١٣٥	شونيز علي صغير
٦٣	١	٧٢	٣	٨٣	-	١	٩	٨٧	١	٢٢	١٢٠	شونيز علي متوسط
٤٦	١	٧٧	٣	٥٥	-	١	٨	٦٥	١	٢٢	٨٥	لفت اسود
١٦٤	١	٩٢	٢	١٥٨	-	١	٧	١٦٩	١	٢٢	٢٠٤	طرطوف
١٥٨	١	٧٥	٥	٢٠٣	-	١	٩	٢١٤	١	٢٢	٢٥٠	شونيز سكري
٤٨	١	٧٨	٤	٤٥	-	١	٨	٥٩	١	٢٢	٩٢	لفت

٧ - في الحبوب والفاصل

٧٤٢	١	١٠٠	١	٦٠٥	٣٠	٧٧	١٩	٧١٢	٣٨	٩٦	٨٨٩	ذرة
٥٢١	٧٢	١٠٢	٦٨	٤٤١	١٠	٨٢	١٥٥	٥٢٢	٤٤	١٠٩	٨٦٣	خنثويس
٧٤٣	١٠٠	١٠٠	١٢	٦٠٠	١٩	١١١	٢٦	٦٥٢	٢٧	١٣٩	٨٦١	خنثويس مقشور
٧٢٠	٦١	٩٩	١٣	٦٤٢	١٩	٦٦	٢٩	٦٧٨	٢١	٩٤	٨٥٧	شعير (معدل وسطى)
٧٥٨	٩٥	٩٩	١٢	٦٦٧	١٦	٦٣	٢٧	٧٠٢	١٨	٨٧	٨٥٧	شعير كبير الحب
٦٦٤	٦٥	٩٧	١٢	٥٦٧	٢٢	٧١	٦٥	٦٣٧	٢٥	١٠٢	٨٥٧	شعير مبسط الحب
٥٩٧	٧٢	٩٥	٦	٤٤٨	٤٠	٨٠	١٠٣	٥٨٢	٤٨	١٠٣	٨٦٧	خرطال (معدل وسطى)
٦٣٤	٥٦	٩٦	٢	٥٠٦	٣٥	٦٢	٨١	٦٣٢	٤٢	٨٢	٨٦٧	خرطال مقل الحب
٥٤٨	٩٢	٩٢	٣٧	٣٧٠	٤٦	١٠٢	١٥٠	٤٩٩	٤٢	١٢٧	٨٦٧	خرطال مبسط الحب
٥٩٧	٧٤	٩٥	٢٧	٤٥٨	٣١	٨٠	٨١	٦١٢	٣٩	١٠٦	٨٧٥	دخن
٨١٥	٦١	١٠٠	١٢	٦٥٧	٣٩	٧١	٢٢	٦٩٢	٤٤	٩٩	٨٧٠	ذرة صفراء (معدل وسطى)
٨٢٠	٥٥	١٠٠	٧	٧٥٨	٨٢	٨٨	١٥	٧٨٠	٤٤	٧٧	٨٧٤	ارز مقشور
٧١٣	٨٧	٩٥	١٠	٦٢٩	١١	٩٦	١٩	٦٩٥	١٧	١٥٠	٨٦٦	شيلم (معدل وسطى)

١٨٩٤٤ - **عِلْمُ الْبَحَارِ ، عُضَامَةٌ**

Océanographie (F). Oceanographie (E).
علم يبحث في علم البحار ونبوتها وما هي عليه من مختلف الأحوال الطبيعية .

١٨٩٦٥ - **عِلْمُ التَّارِيخِ الطَّبِيعِيِّ ، عِلْمُ التَّوَالِيدِ**

Histoire naturelle (F). Natural history (E).
علم يبحث في وصف الأسماء وتصنيفها .

١٨٩٦٦ - **عِلْمُ التُّرْبَةِ ، أَغْرُولُوجِيَّةٌ**

Agrologie (F). Agrologie (E).
دراسة التربة حكمياً وكبائرياً وبيكانيكياً وبيولوجياً . وهو أيضاً دراسة الأثرية الزراعية وصلاتها بالزروع .

١٨٩٦٧ - **عِلْمُ التَّصْنِيفِ**

Taxonomie, Taxinomie (F). Taxonomy (E).
هي للتدقيق ، الطبلى .

١٨٩٦٨ - **عِلْمُ التَّعَاجِبِ ، تَرَاتُولُوجِيَّةٌ**

Téatologie (F). Teratology (E).
علم يبحث في أسباب غرائب المخلوقات ومن دواهيها . كالإندماج في العوارب والشملة في النبات والأغراب الخ .

١٨٩٦٩ - **عِلْمُ التَّدْيِيَّاتِ**

Mammalogie, Mammologie (F). Mammalogy (E).
قسم من علم الحيوان يبحث في الثدييات دون غيرها .

١٨٩٧٠ - **عِلْمُ الْحَشَرَاتِ ، أَنْثُوْمُولُوجِيَّةٌ**

Entomologie (F). Entomology (E).
قسم من علم الحيوان يبحث في تصنيف الحشرات ونبوتها وأطوارها وطبائنها وأضرارها .

١٨٩٧١ - **عِلْمُ الْحَفَرِيَّاتِ التَّدْيِيَّةِ**

Paléontologie (F). Palaeontology (E).
هو الإحاطة ، الطبلى .

١٨٩٧٢ - **عِلْمُ الْحَيَّاتِ ، حَتَافَةٌ**

Ophlographie, Ophlogologie (F). Ophlography, Ophlogology (E).
علم يبحث في وصف الحيات وتصنيفها .

١٨٩٧٣ - **عِلْمُ الْحَيَّاتِ ، زُولُوجِيَّةٌ**

Zoologie (F). Zoology (E).
فرع من التاريخ الطبيعي أو علم المواليد يبحث في الحيوان .

١٨٩٧٤ - **عِلْمُ الْحَيَّاتِ الْفَرَاغِيَّةِ ، زُولُوجِيَّةٌ زُرَّاعِيَّةٌ**

Zoologie agricole (F).
Agricultural zoology (E).
الدراسة المفصلة الوافية لجميع الحيوانات المفيدة والمضرة بالزراعة .

١٨٩٧٥ - **عِلْمُ الْخَمَرِ ، صَهْبَةٌ**

Oenologie (F).
Oenology (E).
دراسة كل ما يتعلق بالخمر كصنعها وتخليطها وحفظها وإمرارها الخ ...

١٨٩٧٦ - **عِلْمُ الْخَيْلِ ، خَيْالَةٌ**

Hippologie (F).
Hippology (E).
علم يبحث في الخيل يشمل كل ما ينص به من جميع الوجوه .

١٨٩٥١ - **عُفْ ، عُفْ**

الْعَفْ وَالْعَفْ : طير يائي ورثه الكلب ويتبع ويعطف ويطيح به الدم عوضاً عن الخل (١ م).

١٨٩٥٢ - **عُفْ ، عُفْ**

Ablepharus (S).
Abléphare (F). Ablepharous (E).
جنس زحافات صغيرة من العظائيات وفصيلة السقنقوريات . أنوارها المبرقة قليلة العدد أسطفاً المناطق الحارة من العالم القديم || أجسامها صغيرة ، مستدلة الخشاعة ، تقطع من ١٥ إلى ١٥ سم . رؤوسها شبه مخروطية الشكل . حواسها صغيرة عادية الواجب . أذنانها دقيقة || جميعها ناضجة ، قشياً اللبدان والحرارة .

١٨٩٥٣ - **عُفْ ، عِلْمُ**

هي السفة ، الطبلى .

١٨٩٥٤ - **عُفْ ، عِلْمُ**

هي ثغيل الحقل ، الطبلى .

١٨٩٥٥ - **عُفْ ، عِلْمُ**

هو الجلع ، الطبلى .

١٨٩٥٦ - **عُفْ ، عِلْمُ**

Hirudo (S).
Sanguis (F). Leech (E).
علقة ج علق : اسم شامل يطلق على اجناس وأنواع كثيرة من الملق الماسر . يعيش في الماء ، قوته الدم يمتصه شيئاً يستطع .

١٨٩٥٧ - **عُفْ ، عِلْمُ الْخَيْلِ**

Hoemopsis vortex (S).
Sanguis du cheval, S. verte, Vortex (F).
علقة صغيرة لثة أسنينة الشكل غضراء اللون ، تعيش في الماء ولقوس وقد تركب الحيوان إذا اقرب منها وهي تؤذي الخيل إذا دخلت أنفها وطلقت في استنكاها لذلك يحسن أنوارها عند رؤيتها قبل تقاطع شراها .

١٨٩٥٨ - **عُفْ ، عِلْمُ السَّمَكِ**

Sanguis piscicole (F).
علقة صغيرة لثة خفيفة الجسم تعيش على مختلف الأسماك البحرية والبرية تمتص الدم وقد تسبب الموت .

١٨٩٥٩ - **عُفْ ، عِلْمُ نَهْرِيَّةٌ**

Axiostoma (F).
علقة صغيرة لثة أسنينة الشكل سمراء اللون ، تعيش في المياه العذبة تركب الأسماك والقشريات .

١٨٩٦٠ - **عُفْ ، عِلْمُ**

نبت قشبية مذاق صر وضها يتخذ من المكائس ويشرب طيبته لاستنقاء (اللبان) .

١٨٩٦١ - **عُفْ ، عِلْمُ**

Hirudineae (S).
Hirudineae (F). Hirudinae (E).
طائفة من الديدان الحلقية لها رؤبان الغرطوبيات والحشريات أكثرها من القوديات المائية ومنها الأرضية التي تعيش على الأجار . مهبط المناطق الاستوائية . تتميز بأجسامها المستطيلة الأسطوانية التي تبدو كأنها خالية من الرؤوس قشياً المواد الحيوانية . مظهرها ماسر يمتص الدم .

١٨٩٦٢ - **عِلْمُ الْأَحْيَاءِ ، عِلْمُ الْحَيَاةِ**

هي البيولوجية ، الطبلى .

١٨٩٦٣ - **عِلْمُ الْأَصْدَافِ ، كَنْخُولُوجِيَّةٌ**

Conchyliologie (F). Conchology (E).
علم يبحث في الأصداف والجار وأشباهها .



عُفْ



علقة



علقة الخيل



علقة نهريّة

والتماز والفيزيولوجية . وعلم النبات الخامس الذي يبحث في التحلية والتصنيف والجغرافية وتختلف العمليات والتأثيرات الزراعية والعلمية والصناعية .

١٨٩١٢ - علم النبات البحرية ، فيكولوجية

Phycologie (F). Phycology (E).

١٨٩٩٣ - علم الفسح ، إستولوجية ، تساجية

Histologie (F). Histology (E).

علم يبحث في التسج الضخمة والحلايا النشوية في الأحياء .

١٨٩٩٤ - علم النواة ، كاريولوجية

Caryologie (F). Karyologie (E).

١٨٩٩٥ - علم الهواء ، علم طبقات الهواء

Adrologie (F). Aerology (E).

١٨٩٩٦ - علم أمراض الحيوان ، زووباثولوجية

Zoopathologie (F). Zoopathology (E).

١٨٩٩٧ - علم حياة النبات ، فيتوباثولوجية

Phytopathologie (F). Phytobiology (E).

١٨٩٩٨ - علم قوة السوائل ، هيدرونامية

Hydrodynamique (F). Hydrodynamics (E).

هو علم قوة الموائع من مائية وبريها .

١٨٩٩٩ - علم وصف النبات ، فيتوغرافية

Phytographie (F). Phytography (E).

رابع نملة .

١٩٠٠٠ - علمانية ، سكيولاريزم

Sécularisme (F). Secularism (E).

العلمانية مذهب فلسفي إنكليزي ينفي الفكرة الدينية في المسير البشري .

١٩٠٠١ - علمية ، سايينس

Scientisme (F). Scientism (E).

العلمية مذهب فلسفي يعلن التفوق المطلق العلم في كل شيء .

١٩٠٠٢ - علمية ، سايينس

في المنقلب . أما كلمة علمية فهي من وضع الأثير

مستقى الشهائي .

١٩٠٠٣ - علمية ، هيبوتراغوس

Hippotragus, Egcoceros (S). Hippotragus, Egcoceros (F). Sable antelope (E).

جنس حيوانات لبونة نملة برابية يختلف من بقرة الوحش . أنطوط الحالية ثلاثة جميعها كبيرة القدر قرية

الشي من الارح . قربونها طوية حديده كالكسوف العربية وهي في الذكور أكبر مما هي عليه في الاناث . اذناها كبيرة

مستطيلة . اذناها قصيرة أو متوسطة القدر . اعطائها البلاد الافريقية . تأوي القبايلي والبروج والاراج . تعيش

بهاجات متوسطة العدد اجلها براوح بين ١٠ و ٥٠ ، ولها طوب ذكر مانع رائحة من الذكور ال الحسة

ذكور ياقنة لا تمحص بعد . اما الذكور المسته فتصل من القطمان وتجنس الى بعضها أو تعيش على انفراد .

١٩٠٠٤ - علمية ، هيبوتراغوس

Hippotragus leucophaeus (S). Hippotragus leucophaeus (F).

نوع من العلوب وهو اكبرها جنة وانثيا قولاً واجلها شكله يملو نحو ١٦٥ سم . ثوبه ال قزقة اللامعة . رأسه اسود الجبهة واليالة العريضة . محمره الى اليافض

١٨٩٧٧ - علم الدواجن ، دجاجة ، زوتوتكنية

Zootechnie (F). Zootecny (E).

علم يبحث في أنسال وسلالات الدواجن ووسائل تربيتها وطرق استغلالها الخ...

١٨٩٧٨ - علم الزراعة ، آغرونوميا

Agronomie (F). Agronomy (E).

هي العلوم الزراعية أو الاخرى هي دراسة قواعد الفنون الزراعية التي تسمح بتطبيق العلوم على الزراعة .

١٨٩٧٩ - علم الزواحف ، زيربولوجية

Erpétologie, Herpétologie (F). Herpetology (E).

علم يبحث في وصف الزواحف وتصنيفها واهولها الطبيعية .

١٨٩٨٠ - علم الشرايين ، آرترولوجية

Artériologie (F). Arteriology (E).

١٨٩٨١ - علم الصحة ، هيغينه

Hygiène (F). Hygiene (E).

علم يبحث في حفظ الصحة ووقايتها .

١٨٩٨٢ - علم الصخور ، بيتروغرافية

Pétrographie (F). Petrography (E).

علم يبحث في الصخور وتركيبها .

١٨٩٨٣ - علم الصناعات الزراعية ، تكنولوجية زراعية

Technologie agricole (F). Agricultural technology (E).

درس جميع الوسائل العلمية والعملية المختصة بالصناعات الزراعية كصناعة السكر والكمون والتربس والحمر والجلين .

١٨٩٨٤ - علم الطير ، أورثولوجية

Ornithologie (F). Ornithology (E).

علم يبحث في الطير من جميع نواحيه العلمية والتأثيرية والاقتصادية .

١٨٩٨٥ - علم الفلد ، أدنولوجية

Adénologie (F). Adenology (E).

١٨٩٨٦ - علم الكائنات ، أونولوجية

Ontologie (F). Ontology (E).

علم يبحث في الكائنات وباعيتها .

١٨٩٨٧ - علم المعادن ، معدنيات

Minéralogie (F). Mineralogy (E).

١٨٩٨٨ - علم للمعنولات ، ميتافيزيقية

Métaphysique (F). Metaphysics (E).

علم يبحث في اصول المبادئ وفي الملل النشوية الاول .

١٨٩٨٩ - علم المفاصيل ، آرثولوجية

Arthrologie (F). Arthrology (E).

١٨٩٩٠ - علم الميكروبات ، ميكروبولوجية

Microbiologie (F). Microbiology (E).

علم يبحث في تصنيف الميكروبات ووصفها ونشأتها وبيئاتها واهوارها وكائناتها .

١٨٩٩١ - علم النبات ، بوتانيك ، فينتولوجية

Botanique, Phytologie (F). Botany, Phytology (E).

درس العلوم الطبيعية الذي يتناول النبات وهو قدام : علم النبات العام الذي يبحث في الشوزبة والايستولوجية

٣٠٠ منها الحولية والمولدة والمصرة . أصنافها نسبة الإرباء تشمل جميع الاسماع المتعددة الحرارة . معظمها بري وبعضها زينة وطي . سقيا فراءه . اوراقها كلسية ، متقلبة ، سائفة النصل . ازهارها مستطيلة الزناد ، لاقسية التجميع والارتكاز || أشهر انواعها ما يتبع .

١٩٠١٣ - عَلُوكُ أَحْمَر * ، سِيلَان طَائِي ، صَمْنَع الدَّيَاب

Silene armeria (S). *Silène à bouquet*, *Atropa-mouches* (F). *Common catchfly* (E). *Gartenimkraut* (D). *Silene a mazzetti*, *Achilappa mosche* (I). عشية حولية برية طيبة مبقولة . ساقها فراء تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها حاشية . نصلها يقني الشكل جامد الصفة ، عايق الخضار . ازهارها طليقة التجميع ، حمر البلات || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٩٠١٤ - عَلُوكُ أَخْضَرُ الزَّهَر * ، سِيلَان أَخْضَرُ الزَّهَر

Silene viridiflora (S). *Silène à fleurs vertes* (F). عشية معمرة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها عشية . اوراقها سائفة . ازهارها ابطية الارتكاز . بتلاتها ثنائية التجميع خضراء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٠١٥ - عَلُوكُ بَحْرِي ، سِيلَان بَحْرِي

Silene maritima (S). *Silène maritima* (F). عشية برية معمرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . مهدا شطوط المنسط ، ساقها ليفية فراء . اوراقها بضيعة الشكل ، بحرية اللون ، ازهارها حشوكية التجميع . بتلاتها الى الياض الاصفر اللامع || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول . يقال انها طيبة تنقي المدة والاماء .

١٩٠١٦ - عَلُوكُ سَحْلَبِي * ، سِيلَان سَحْلَبِي

Silene orchides, *S. stocion* (S). *Silène orchidées* (F). عشية حولية تربيتية مهدا الشرق اليرسط . ساقها فراء زياء زينة تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها صليفة الشكل ، شبيقة النصل الخليل البشرة . ازهارها ودية اللون . بتلاتها مقنطية الاطراف المسنة الملقوة || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٠١٧ - عَلُوكُ شَفْطَل * ، سِيلَان شَفْطَل

Silene schafra, *S. inflata* (S). *Silène schafra*, *S. enflé*, *Behen blanc*, *Cornilif* (F). *Bladder campion*, *White bottle*, *White ben* (E). *Kropfalmkraut* (D). *Bubblin*, *Mazzettini*, *Strotoli* (I). عشية ردية معمرة تملو من ٨ الى ١٥ سم . ساقها وطرصا نخيلة . اوراقها بضيعة الشكل طويل من ١٠ الى ١٥ سم . ازهارها حراء اللون او بيشاء ، بتلاتها مقنطية الاطراف المسنة || ازهارها يستمر من آب الى ايلول . وفي من النباتات الطبية . يقال انها تنقي المدة والاماء .

١٩٠١٨ - عَلُوكُ هَدِيمُ السَّاق

هو حشيشة الدباب ، أطبا .

١٩٠١٩ - عَلُوكُ فَرَنْسِي * ، سِيلَان الدُّبَاب ، لُسَيْعَة

Silene gallica (S). *Silène de France*, *S. à cinq plaies* (F). *Little brown pigs*, *Small flowered catchfly* (E). *Französisches leimkraut* (D). *Silene cinque plaies*, *S. salvatico*, *Mazzettino* (I).

نبات حشيشي طيبي عول ، ساقه فراء زياء تملو من ٣٠

الايبر || موته احراج وبراعي الترانسفال . إجله قليل لمدد يراوح بين ٥ و ١٥ فرداً .

١٩٠٠٥ - عَلَبُ اسُود * ، أَبُو عُرْفُ الاسُود

Hippotragus niger, *Egoceros niger* (S). *Hippotragus niger*, *Egocère noir* (F). نوع من العلب كبير الجثة يملو نحو ١٢٥ سم . قرنه بطول ١٠٠ سم . وهو غليظ الانتشاب ، ذيب الطرف ، حادي الجسم ، سالى الزناد الاخير . لويه الى السود اللامع . يملو بصره وجليه ييش . موته فسح الارباء يمتد من الحيفة الى الترانسفال . إجله يراوح بين ٢٠ و ٤٠ فرداً .

١٩٠٠٦ - عَلَبُ أَهْبَر * ، أَبُو عُرْفُ الْأَهْبَر

Hippotragus equinus, *Egoceros equinus* (S). *Hippotragus chevalin*, *H. équin*, *Egocère chevalin* (F). نوع من العلب كبير الجثة ، جسمه يملو نحو ٢٢٦ سم . ويملو نحو ١٥٠ . قرنه لا يفرق عن قرن العلب الاسود شيكاً . لويه الى القيرة السراء ، يياض رأسه قليل الانتشار ، جبل التضخيم ، يكتنف العين من مقدمها ومؤخرها . موته فسح الارباء يمتد من ضفاف بحيرة فيكتوريا . نيزا الى اطراف السنغال || إجله لا يقاسي المدة يختلف باختلاف اصنافه وسلالته ، يراوح بين ١٠ و ٥٠ لقرأ .

١٩٠٠٧ - عَلَبُج

Eomecon (S). *Eomécone* (F). ينبت نباتات عشية معمرة من فصيلة الحشائشيات . انواعها قليلة العدد ، سقيا فراء تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقها قلبية الشكل ، مستديرة القامة . نصلها متصبع الصفة ، مسن الحافة ، جبل الخضار الزاهي . ازهارها ابطية وصاية الارتكاز ، قطرها نحو ٥ سم . لون بتلاتها يختلف باختلاف الانواع منها الياض والودي والبني والبيج . اما اسديتها فضرر || ازهارها يستمر ثلاثة شهور تمتد من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

١٩٠٠٨ - عَلُوز * ، عَلُوز

Phorophea (S). *Phorophea* (F). جنس حشرات ذرية من فصيلة الجربيات ودية القراديات انواعه عديدة تستغل حل الخيل والتمن والابقار والارانب تقسب لها الجرب الربط (*Gale humide*) الذي يكتلغ باستعمال بعض الادمان الكبريتية التركيب .

١٩٠٠٩ - عَلُوكُ ، لَزْنَاع

Hauteur (F). المسافة السويدية من القامة الى القمة .

١٩٠١٠ - عَلُوبُ هو سد الحصر ، اطبا .

١٩٠١١ - عَلُوكُ * ، عَلُوكُ

Desmodus (S). *Desmoda* (F). *Desmodus* (E). جنس غفائش من فصيلة الورقيات . انواعه قليلة العدد . اجسامها صئرة طولها يراوح بين ٧٥ و ٨٠ سم . وبعضها من ٣٥٠ الى ٣٦٠ سم . فرائطها اسفينة قصيرة . ازوارها الى الرتبة العلوية الصناعية . جلودها خلية للمس . موطنها ييم المكسيك والبرازيل والشيلى . تعيش منفردة . ذكورها تقرب انثاهي عند الكرم فقط . قريباً لهم تمصه ايضاً استطلعت . تألف الاشجار الحرجية وابقاب الصنوبر .

١٩٠١٢ - عَلُوكُ ، سِيلَان ، سِيلَنُوس ، تَمَنُوكَة

Silene (S). *Silène* (F). *Campion*, *Catchfly* (E). *Leimkraut* (D). *Silene* (I). جنس نباتات عشية من فصيلة القرنفليات ، انواعه زما



علب اسود



علب اسود



علوز



علوك احمر



علوك اخضر الزهر



علوك سحلبى



علوك شفعة

الى ٥٠ سم. اوراقها اطيالية الشكل مستطيلة الزام الاخير
نصلها خلى البشرة اللزجة. ازهارها صغيرة لثقة و رودية
اللون. حلقية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى
آب.

١٩٠٢٧ - عَكِيث

السُّلَيْس تبت يرقم به ويضط منه الرق (المان).

١٩٠٢٨ - عَكِيص

Otolithe (F).

سكة بحرية تسمى حطايص، اطليا.

١٩٠٢٩ - عَكِيْط

Parrotia (S). Parrotia (F).

جنس اشجار ونباتات برية و زينة من فصيلة المشرطات.
انواعها المعروفة اربعة اوراقها مثاقية عابطة. ازهارها
عقودية التجميع تاجي الازتكاز. ازهارها عادة البتلات
سباعية الالدية و سبعة المياس. مزدوجة غريقات
المبيض || اعرفها واشهرها البليط القاري.

١٩٠٣١ - عَكِيْط قَارِوِي

Parrotia persica (S).

Parrotia de Persa (F).

نوع من البليط، مهد بلاد ايران. ثمرته تملو من ٦
الى ١٢ م. اوراقها عابطة تشبه اوراق اقاقيا طولها ٤
الى ١٠ سم. نصلها جامد التسج خلى العروق. ازهارها
تتفصية اللون يعلوها مواج زخرفي. ثنائياتها خلية.
اسديتها الى الحرة القانية || ازهارها يستمر من نيسان
الى ايار.

١٩٠٣٢ - عَكِيْطَة

هي القنبلة السوداء، اطليا.

١٩٠٣٣ - عَكِيْطِي ، عَدِيد ، عَكِيْط

Coupage (F). Cutting (E).

تينة الملف قبل تقديده الى الحوان قد يكون اما يخلط
الحبوب المحرقة مع الخلطة والكبس والتين الخ. او
يقطع الاغصان والكلأ كالقصير والقص. او بتشفيخ
الجذور والمسائل كالبزور والشلندر والبطاطا الخ.

١٩٠٣٤ - عَكِيْطِي هو الصوج، اطليا.

١٩٠٣٥ - عَكِيْطِيَّات

سبط من فصيلة الورديات يدعى المومبيات.

١٩٠٣٦ - عَمَّكَة

الهام السحاب المرتفع الكثيف.

١٩٠٣٧ - عَمَّكَة فِجِه * Amata phagen (S).

Amata phagæ (F). Amata phagen (E).

حشرة من فصيلة الهيات ونية حشرليات الاجنحة.
موطنها بعض المناطق الحارة من الاقاليم المعتدلة الحرارة.
فراشتها جارية قوتها رقيق الاذوار. مرقها عابطة ناعمة
تموش على اوراق النبات وله اشجار || جسمها متوسط
القد بطول نحو ١٤ م. يستط نحو ٣ م. رأسها اسود.
عينها كبرتان. زباناها خيطان. شفها مستطيل.
جوشها ويعدا الى الكسني الاسود الخيط || وراثن للذكر
الى الجارة لسماء الموج يتخللها في تزوج الاسامي رقة
ومن بتج ويختلها في تزوج الخلفي بقية يشه
وتقتان || وراثن الاثى في الجوزي الكاهب للمواج
العدم الرقة || لها جيل واحد في الحول. تظهر القرفة



عكك فرنسي



عكك نجيل



عمكة فيجيه

١٩٠٢٠ - عَكِيْط كِيد ، سِيلَان كِيد

Silene compacta (S). Silène compact (F).

حبة زينة حولية، مهدا الشرق الاوسط. ساقها فرما:
تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اوراقها اطيالية الشكل متدخعة
الناطقة و ذوية الزام الاخير المذهب النعسة. نصلها
جامد التسج، بحري اللون. ازهارها حامية الازتكاز، حلقية
التجميع، لينة. بتلاتها فضية الشكل و رودية اللون.
ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٩٠٢١ - عَكِيْط مُزْهَرٌ ، سِيلَان مُهْدَب

Silene hispida (S). Silène hispida (F).

حبة حولية يونانية المهد، ساقها فرما تملو من ١٥
الى ٣٠ سم. اوراقها ثنائية التصل خلية البشرة. ازهارها
عقودية التجميع ثنائية الانقسام و رودية اللون || ازهارها
يستمر طوال فصل الربيع.

١٩٠٢٢ - عَكِيْط كِيدِي ، سِيلَان كِيدِي

Silene astaria (S). Silène Astérie (F).

حبة سبروتية معمرة، مهدا حطاب مغولية وهي من
النباتات القائمة الاستعمال الزيني. ساقها قوية لزجة
عامة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها
صفلية الشكل طولها من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من
١٥ الى ٢٠ م. ازهارها ابروانية اللون، حلقية التجميع.
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

١٩٠٢٣ - عَكِيْط كِيدِي * ، سِيلَان كِيدِي

Silene delicatula (S). Silène gracile (F).

حبة حولية دقيقة، مهدا الشرق الاوسط. ساقها نحلة
فرما تملو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها صفلية الشكل
دقيقة. ازهارها فردية التجميع يشبه اللون || ازهارها
يستمر طوال فصل الصيف.

١٩٠٢٤ - عُلُوم زَرَعِيَّة

Sciences agronomiques (F). Agronomic sciences (E).

العلوم الزراعية دراسات شاملة تيمث في الاربعة والنباتات
والحيوانات والحشرات والفطور والامراض الحيوانية والاصوام
النباتية والكيمياء والفيزياء والاقتصاد والصناعات الزراعية
و زربية النواجر والابنية الريفية واستثمار التربة واستعمال
المعدات الآلية الخ.

١٩٠٢٥ - عَكِيَّات

Paraneoptera (S).

Paraneoptères (F). Paraneoptera (E).

شعبة حشرات من طائفة الحنجمات أصلاً تشمل ثلاث
طبقات وست رتب، والسديد من الفصائل || طبقاتها ترمز
بالقليات ومدنيات الجناح ونصفيات الجناح. اما رتبها
فهي القليات والقلليات والصفليات وهدية الاجنحة
وصحناصة الاجنحة ومختلفة الاجنحة.

١٩٠٢٦ - عَكِيْطَة ، يَكْسِيْد

Pyxide (F).

Pxydium (E).

ثمرة كالجوز او كالحنق تتفتح بالرش ينفصل جزواها
الاعلى كانه غطاء حلبة.

في الليل وتماثل بدء ظهورها بشهرين في السنة السرة تظل نحو ٢٠ م. جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القطار . ثوبها الى الزبدة الشديدة السمرة يطولها تجمع ممتص اذرق . وسط ثوبها اصفر بين خطين احمرين . رأسها اسود اذرق . مدنها الى القطعة . وواجبها سود في طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٨ يوما يتقضي في القربة حيث تنتمن السرة ملتصقة بجلباب من العنق .

١٩٠٤٥ - عَمَاش ٥ Rhinolphus (S).

Rhinolphus (F). Rhinolphus (E). جنس حوران من فصيلة العماشات . انواعه المعروفة ١٠ تتميز بزرولها المنخرية الوقية التنصوية الشكل . آذانها بيضة لا رقيقة . ثنائيا العليا بارقة || اجسامها صغيرة القدر تظل من ٧ الى ٩ م. وبسطها من ٣٠ الى ٢٠ م. وآذانها من ٢ الى ٤ م. اولها الى الكفة العابقة في الذكور والكفة الصائبة في الاناث . موطنها فسح الارياح يمتد من اليابان الى الهند وبريطانيا العظمى ويضم افريقية من شواطئ المتوسط حتى رأس الرجاء الصالح . تألف الكهوف والمغاور ، تعيش بجاهات كثيرة للهدم . سرسها من التفسق حتى نسمة الليل . قوتها الحشرات على اختلاف اجنسها وانواعها || اشهر انواعه : عماش قراس

Rh. capensis (S).

Rhinolphus du Cap (F).

Rh. minor (S). Rhinolphus nain (F).

Rh. euryale (S).

Rhinolphus euryale (F).

Rh. affinis (S). Rhinolphus affinis (F).

Rh. ferrum equinum (S).

Rhinolphus unifur, Grand fer à cheval (F).

Rh. trifolatus (S). Rhinolphus tréfle (F).

١٩٠٤٦ - عَمَاشِيَات ٥ Rhinolphidae (S).

Rhinolphidae (F). Rhinolphidae (E). فصيلة من الخفافيش . اجناسها خمسة اما انواعها عديدة تتميز بزرولها المنخرية الوقية الشكل . آذانها كبيرة القدر مغزبية القاعدة الانحسية . ثنائيا دقيقة . نواجذها مدبية حادة || انثاها تقص جروا واحدًا تحمله دائما وترضعه اثنا طيراتها || موطنها فسح الارياح يمتد من آسيا الى افريقية واروية . اما اجناسها الخمسة فهي : الماش والحامل واللبان واللولوح واللبان .

١٩٠٤٧ - عَمَاشِيَّة ، عَمِشِي Rhinolphidae (S).

Rhinolphidae (F). Rhinolphidae (E).

Commission (F).

Percentage (E).

في الاجرة النسبية التي يتقاضاها من عهد الالقيام يميل تجاري هو عقاري فننده .

١٩٠٤٩ - عَمَاشَة في القدر الرومي ، اطلبه .

Mettre en valeur une exploitation (F).

سفر المستغل ويهزم واحده للاستثمار .

١٩٠٥١ - عُمُوس Agnesu (F). Lamb (E).

هو الحمل ، ج عماريس . قال الشاعر :

في حيزوان ويثقي حتى آب . تسرح في التبار . تماثل بدء ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح للكن مهاديا على الصفحات المغل من نصال الاوراق || السرة تظل نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، الحبل اللين ، اصغر المراج ، تظل نحو جانبيه تشغل جميع السكم باستثناء الثديية . رأسها اسود . مدنها ورواجبها الى القطعة السمره || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع يتقضي داخل صليبة يحكمها السرة لاصقة ببعض اجزاء الثبات انحصاها الاذن والافناد .

١٩٠٢٨ - عَمَاشِيَات ٥ Amasidae, Syntomidae (S).

Amasidae, Syntomidae (F). Amasidae (E).

فصيلة حشرات من حشرقيات الاجنحة مختلفات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة المد سطوها من حشرات البلاد الاستوائية . انواعها المعروفة نحو ٢٢٠٠ جميعها متوسطة القدر او صغيرة . اجسامها اسطوانية . رؤوسها مثندة الحجم . حوزها يسطة . قرونها الاستشعارية خيطية ، منسوبة الجرم او مستقلة الاطراف . ملاصقة قصرة . عراشها كبيرة . رؤسها لانساقية - الامامية منها مستقلة والخلفية مستديرة وصغيرة . ورواجبها عند الاستكان تنطبق على شكل جملون . ارجلها تامة للتمو ثلاثية المماس || وراجبها || مكها مكور الشكل . اساردها حارية يطولها نمط متوجة بلب دقيق . خادولها لتصف بصليجات رقيقة النسيج ، متينة الحيك || اشهر اجناسها العائمة والديوق .

١٩٠٣٩ - عَمَاسُ هو الاس المسكي ، اطلبه .

١٩٠٤٠ - عَمَاسُكَة Sous-famille (F). Sub-family (E).

تأتي العماشة في تصنيف الاحياء وقد خصصتها بالحويون فوق الجنس وتحت الفصيلة .

١٩٠٤١ - عَمَاسُكَة Défrichement (F). Clearing (E).

قلم الاجار من الارض وتخليتها من تخلف النباتات لاخذها مزرعا . راجع احياء .

١٩٠٤٢ - عَمَاسُكَة Emblevure (F). Wheat-sowing (E).

هو الحقل وكل مزرع محد وكر وبذر واثير .

١٩٠٤٣ - عَمَاسُكَة

في البواب شجرة افريقية عظيمة ، اطلبه .

١٩٠٤٤ - عَمَاسَة بَنَفَسِيَّة ٥

Triphaena janthina (S). Triphaena violet (F).

Triphaena janthina (E).

حشرة من فصيلة البنفقيات ودية حشرقيات الاجنحة . موطنها يشمل بعض القالم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . قراشها جارية قوتها رديق الاضرار . سرتها خاضعة قوتها اوراق النباتات البرية || جسمها متوسط القدر يظل نحو ١٥ م. بسطها نحو ٢٧ م. رأسها اصفر اللون ، كبريتي المراج . حيتاها كبريتان . زناهاا خيطيان . بيوتهاا ويطنها الى الزبدة الزرقاء المراج || رؤسهاا الايمان الى الزبدة الزرقاء المراج يتبعج كسني كسولة بقمه صفراء الاطراف . رؤسهاا الخلفيان الى الصفرة البرتقالية المراج تملوها بقجة قاعدية وبيدة طرفية لونها الى الكسني || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع حيزوان وتبقى حتى اواسط آب . تسرح



مكاسة بنفسية



عاش

١٩٠٦٨ - عُمُدِي لَقْرِي، عَصَب، سِلْسِلَةُ الْفَكَار

Colonne vertébrale (F). Vertebral column (E).

١٩٠٦٩ - عُمُدِي كَهْرَبَائِي، نَائِبَةُ كَهْرَبَائِيَّة

Pile galvanique, Pile voltaïque (F). Voltaic or galvanic battery (E).

١٩٠٧٠ - عُمُدِي

Orthogonal

١٩٠٧١ - عُمُدِي، قَائِم

Perpendiculaire, Vertical (F). Perpendicular, Vertical (E).

١٩٠٧٢ - عُمُدِي الرِّقَّة

Orthognasza (F). Orthognathous (E).

نمت تعريفي توصف به الإنسان القليلة الانحناء، أو اللانحنائية.

١٩٠٧٣ - عُمُودِيَّات

Ammonitidae (S). Ammonitidae (E).

مرتبة من الرخويات تنتمي إلى رتبة رباعيات الأضلاع. فصائلها وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد الذي يتجاوز ٤٠٠٠. جميعها من متحجرات المصنوع النادرة. أحافيرها نفيسة من الرخويات الجيولوجية لأنها تدل على توالي طبقات الأرض عبر الزمن.

١٩٠٧٤ - عُمُودِيَّات

Ammonites (S). Ammonites (F). Ammonites (E).

جنس حشرات بحرية من الرخويات رباعيات الأضلاع. ومرتبة المرفوعة حديثة. جميعها من متحجرات الأبنية النادرة، انحصار الأبنج البشري || اصلاها مستديرة، مبطنة ومخزونة.

١٩٠٧٥ - عُمَي الدَّجَاج

هو الخنافس المشورة، اطليه.

١٩٠٧٦ - عُمَي

Couvain en état d'éclosion (F). Eggs of bees (E).

بيض ملكة النحل في عيون الشهد، التفاريق، قبل أن يتف.

١٩٠٧٧ - عُمَي عُدَّتِي مَعَك

هو الإرتقون، اطليه.

١٩٠٧٨ - عُمَيَت

Amite, Ammita (F).

كل جاد مذكور الحيات كما في الرمل.

١٩٠٧٩ - عُمَيَّة، لِيَالِيَّة

Diploisens (S). Diploisens (F).

جنس نباتات جينية برية معمرة من فصيلة الداليات. أنواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || سويها وقرورها غفالية. أوراقها متناحية، خلية النصال الصغيرة. أنماها رؤوسية التجميع محورية الانتكاز، طرية السوف || أما اسم لفافية فهو من وضع الأمير مصطفى الشهابي.

١٩٠٨٠ - عُمَيْرَكَة، جَزْع، مَشْحَكَة

Rucher (F). Stand or shed for bees (E).

مجموع قنار أو خلايا النحل. ج. حمار وأجزاء وبناسل.

وكان كاذب السوء إذ قال مرة

لرسوة والأذب غرثان مرمل

أذنت لي من غير ذنب ششتي

تقاتلني ذاك قال ذا عام أول

فقاتل ولدت الآن بل رست غفرة

لنولك كلني لا هنا ك مأك

ونهم من قال هو الحبل إذا بلغ الغزو.

١٩٠٥٢ - عُمُوش، عُرْمُوش

Rafle (F). Grape-stalk (E).

هو المتفرع أنزع عنه.

١٩٠٥٣ - عُمُش هو القريبون الخوئي، اطليه.

١٩٠٥٤ - عَمَل

Travail (F). Labour (E).

هو نتيجة ما يصرفه المحرك من طاقة سياً كان أو آلياً.

١٩٠٥٥ - عَمَلَس

Amalthee (F).

السلسل كركب سيار من الخنس.

١٩٠٥٦ - عَمَلَس

كل الصيد الخيش.

١٩٠٥٧ - عَمَلَكَة

Géantisme, Gigantisme (F). Giantism, Gigantism (E).

١٩٠٥٨ - عَمَلَكَات حَمَمِيَّة

Opérations volumétriques (F). Volumetric operations (E).

١٩٠٥٩ - عَمَلَكَات كَمِيَّة

Opérations quantitatives (F). Quantitative operations (E).

١٩٠٦٠ - عَمَلَكَة

Opération (F). Operation (E).

١٩٠٦١ - عَمَلَكَة عَكِيَّة

Opération inverse (F). Inverse operation (E).

١٩٠٦٢ - عُمِيد

Emanadia (S). Emanadia (F). Emanadia (E).

جنس حشرات من عديدات الأجنحة عطفات الأجزاء. وفصيلة الزفاليات. أنواعها المرفوعة نحو ٥٠ منتشرة في وسط اقطار العالم وانحصار المعتدلة الحرارة || أجسامها وثقلها مستطيلة. رؤوسها مستديرة. كوكلتها نصف مخروطية. أقدامها قصيرة مائلة. قشرها الاستشعاري مقوس. أظفارها بيضاء اللون تكثر فيها الشفحة والسمرة للفتاوة الخفاف والملاج.

١٩٠٦٣ - عُمُهُوج كل نبات غص.

١٩٠٦٤ - عُمُد الثِقَل

Pile à gravité (F). Pile of gravity (E).

١٩٠٦٥ - عُمُد الْحَرَكَة

Pile thermo-électrique (F). Thermo-electric pile (E).

١٩٠٦٦ - عُمُد الصَلْبِي

Rotanny

نجم لير من كوكبة الدلفين. ويدعى أيضاً ذنب الدلفين.

١٩٠٦٧ - عُمُد جاف

Pile sèche (F). Dry cell (E).



عصيد



عُمَيَت

الى ١٠٠ سم. اوراقها قرصية الالتشاب خفيفة ذرية
تطول من ٦٠ الى ١٢٠ سم. وتعرض من ١ الى ٣ سم.
نماها اسفنتية الصفحة || ازهارها حامية الارتكاز
مختلطة اللوان واشكال التجمع || اشهر انواعه الزينية
الناز الصواني .

١٩٠٩٣ - عَنَابٌ صِيَوَانِي * Butomus umbellatus (S). Butome en ombelle, Jonc fleuri (F). Flowering rush, Lily grass (E). Doldiger Wasserliesch, Blumen-Rohr (D). Butomo, Biedo, Giunco fiorito (I).

نوع من الناز وهو نبات عشقي سبروتي مسمر. اوراقه
تطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٢ سم.
شراخه الزهري يطوغ نحو ٨٠ سم. ازهاره صيواني التجمع.
ازهاره كثيرة العدد وريدة القصل واليتلات ، قطر الزهرة
الواسعة نحو ٣ سم || ازهاره يشمر من حزيران
الى آب .

١٩٠٩٤ - عَنَابِيَّاتٌ Butomaceae (S). Butomacées (F). Butomaceae (E).

فصيلة نباتية من سيدات القلفة بلورها عادمة الاسين .
اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها متعقبة او مائية .
اشهر اجناسها الناز.

١٩٠٩٥ - عَنَابَسَةٌ Porthetis elephas (S). Porthète (F).

نوع من الجنابذ من مستقيات الاجنحة وفسيلة المراءيات.
اصطفا جميع المناطق الحارة من العالم القديم || جسمها
كبير القد يطوغ نحو ٤٥ سم. عند الذكر ، ويطول من
٧٠ الى ٧٥ سم. عند الانثى . نوبها الى الكهبة السمره .
راسها كبير الحجم . زناهاها لافديا الشكل . كويلها
مبين للعدو ولحم الحمار النجسي يشرف على فة الرأس
قوائمها الحلقية كبيرة ، مستطيلة ، منفارحة القنايب ،
معدة لقتل || تجرب المرامي والمواقع الرطبة حيث تكثر
الامشاب . مسرها نهاري . تظهر في حزيران وتبقى
حتى اواخر آب .

١٩٠٩٦ - عَنَابِيرٌ Eléments (F). Elements (E).

الناصر هي المواد البسيطة التي يعتبرها العلم الحالي غير
قابلة التجزئ . الايسط || يعرف منها نحو ٩٠ تقسم الى
ثنتين : فة الناصر الفلزية المعروفة بالمعادن وفة الناصر
اللافلزية .

١٩٠٩٧ - عَنَابِيرٌ غذائية Eléments nutritifs (F). Nutritive elements (E).

هي الناصر التي يتربك منها فذاء النبات والناصر
الذاتية تقسم الى اربع فئات : - الاول : الناصر
الرئيسية وهي الازوت ، فوسفور والبوتاس .
الثانية : الناصر الادوية وهي الكلسيوم والمنجنيزيا والحديد
والكبريت - الثالثة : الناصر الثانوية وهي الميديموم
والسليسيوم والكلور - الرابعة : الناصر الثالثية وهي
البورون والمنجنيزيا والنحاس والزنك والزرنيخ والرساس الخ .

١٩٠٩٨ - عَنَاقٌ

النجم الحثالي ، اي الذي يلي الفلك ، من كوكبة بنات
نمش الصغرى . والى جانبه قائد صغير وزائيه ايضا عناق
والى جانبه الصليق وهو سهى والثالث الحور .

١٩٠٨١ - عَمِيسٌ Aphoticus (F). Aphotic (E).
عميس م. حمية . تمت تعريفه يطلق في الجيولوجية ،
على كل منطقة عادمة النور كجبة البحر البعيدة النور .

١٩٠٨٢ - حَنّ طَرِيقٌ Via ١٩٠٨٣ - حَنَابٌ Zizyphus seiva, Z. vulgaris, Rhamnus zizyphus (S). Jujubier, Gingecoller (F). Jujube tree, Zizyphus, Indian jujube (E). Jujubebaum (D). Giuggiolo (I).

شجرة مشرة شائكة من فصيلة التيقيات . اوراقها عابلة ،
متعاقبة ، صغيرة ، بيضة ، لامعة ، مسنة . لثمارها صغيرة
القد ، صفراء اللون ، عبقورية التجمع . ثمارها زيتونية
الشكل ورائحة ، لمساء البشرة ، عنابية اللون عند النضج ،
مأكولة ، لها الى البياض الاصفر وهو كثير المنافع
الصحية ويقيه الصدر .

١٩٠٨٤ - حَنَابٌ يَرِيّ هو الفصال ، اظله .

١٩٠٨٥ - حَنَابِيَّةٌ Jujube (F).

ثمرة الحناب وهي مأكولة جزيلة الطعم الصحي وتفيد
الصدر .

١٩٠٨٦ - حَنَاجُ السَّمَقِ Pissina quadrata (S).

حشرة من النجابيات ، طولها نحو ٣ سم. جسمها بسيط
الشكل المستطيل . نوبها الى الخنثى الاخير . بطنها يندبها
الى الحشرة || تظهر الحشرة الكاملة في نوسان فسكرم
وتضع مكنها في ايار على مختلف اوراق السرمقات وانحسا
الشوننر فيقتطع بعد متهه بامبوين || اجيالا الحولية
تراوح من اثنين الى ثلاثة . يرقاتها همة تنحصر حصاد
الاوراق فتمسحها ويحسبها وقد تنخر الجلود لتصلها .

١٩٠٨٧ - حَنَاجُ الشُّوكَةِ Tingis cerus (S). Tingis des chardons (F).

حشرة من النجابيات ، طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم.
نوبها حنثي اللون يطوغ تسليح وتكشط . منها اسود .
تعيش على مختلف انواع الشوك ونباتات فصيلة المركبات .

١٩٠٨٨ - حَنَاجُ مَلْتَعٍ Goldene maculé (F).

حشرة من البيريات تدعى بيري ملتح ، اظلبا .

١٩٠٨٩ - حَنَاجِيَّاتٌ Tinginidae (S).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها كثيرة العدد . تتميز بصغر فعا وبروانها الفضية
التركيب ، الشبيكة الرول . ارساغها ثلاثية الفواصل .
امثالها لا تفرق تنور في اعدادها عميقة || جميعها من
الحشرات الخاملة تعيش على اوراق الثبات ويطوره .

١٩٠٩٠ - حَنَازٌ Cochér (la) (F).

الناز كوكبة مجرم شمالية الموضع تدعى ذو الامة ، اظلبا .

١٩٠٩١ - حَنَازٌ هو القلق الحشي ، اظله .

١٩٠٩٢ - حَنَازٌ Butomus (S). Butome (F).

جنس نباتات مسمرة من فصيلة النمازيات . انواعه قليلة
نحو خمسة : ثلاثة منها متعقبة واثنان مائتان . جلورها
جلومرية مدادة . سورها شمراعية متعقبة تملو من ٥٠



حناب



حناب السرمق



حناب الشوك



حنان صيواني



حنمة

١١٠٩٩ - عُنَاق الأَرْض

عنق الأرض نجم من كوكبة المرأة المسلسلة .

١١١٠٠ - عُنَاق الأَرْض *

Lynx caracal, *L. melanotis* (S). *Lynx caracal*, *L. a. oreilles noires* (F). Caracal (E).

ومن اسمائه : العنقب والنعبل والنجل والفراتق . نوع من الفئس من فصيلة السنوريات ورتبة اللوامس . موطنه فصيح الإرياء يمتد من تركيا إلى سورية والجزيرة والبراق وأيران والأفغان وألمند ومن الحيشة إلى أفريقيا الشمالية . وهو كبير الجثة رقيق العظام ، طوله يراوح من ٧٠ إلى ٩٠ سم . ارتفاعه من ٤٥ إلى ٥٥ سم . أما ذنبه فين ٢٢ إلى ٣٥ سم || ثوبه يخطف باللبسة إلى البلاد التي يعيش فيها وهو دائماً سوي اللون المرقوش بالأخضر الاسمر والاسمر الجازري . بهله إلى البياض الاسفر . أذناه كبيرتان ذلعتان طولهما خمسة من الشعر الاسود المنقصب || يألف الكهوف والادغال وأحراج السنط والقمرو .

١١١٠١ - عُنَاقِيَّةٌ فِي الْقَضَابِ ، اَطْلِبْ .

١١١٠٢ - عُنَاقِيك ، رُتَبَاتِلَات *Aranides* (F). *Aranida* (E).

رتبة من الشكبيوتيات فصائلها واجناسها كثيرة العدد ، أشهرها المناكب المرفقة .

١١١٠٣ - عُنَاقِيكٌ ذَيْبِيَّةٌ فِي الْخُنْفَرَقِ ، اَطْلِبْ .

١١١٠٤ - عُنَاقِيكِي ، عُنَكَبُوتِي *Aranides* (F). *Cob-webby* (E).

نمت وصفي يطلق على بعض اجزاء النبات التي تشبه المناكب أو شها .

١١١٠٥ - عُنَاق *Râne* (F). *Rein* (E).

هو سير اللجام .

١١١٠٦ - عُنَاقَة *Impotence sexuelle* (F). *Sexual impotence* (E).

خلل في الجهاز العصبي يمنع الحيوان عن أداء فريضة الكوم الطبيعية . وهي كثيرة في الذكور قليلة في الاناث .

١١١٠٧ - عُنَب *Rabin* (F). *Grapes* (E).

ثمر الكرمة . ج . أعقاب والواحدة عنب .

١١١٠٨ - عُنَبُ الْبَحَرِ *Rabin* (F). *Grapes* (E).

هو اسماء الموزج السابل ، اطلبه .

١١١٠٩ - عُنَبُ التَّمَكَّة *Raisin de table* (F). *Table grapes* (E).

هو العنب المأكول من أي شرب كان تمييزاً لأصناف الحور والكمول .

١١١١٠ - عُنَبُ الْقَعْلَبِ هو الفئاة ، اطلبه .

١١١١١ - عُنَبُ الْحَمِيَّةِ هو الفاشرا السوداء ، اطلبه .

١١١١٢ - عُنَبُ الدَّبِّ هو البيران ، اطلبه .

١١١١٣ - عُنَبُ الدَّيْبِ هو الربرق ، اطلبه .

١١١١٤ - عُنَبُ الشَّطْرِ هو كركوب كير . اطلبه .

١١١١٥ - عُنَبُ الْفُرْكَابِ هو الصخرية ، اطلبه .

١١١١٦ - عُنَبُ الْقَطَا

هو التوارية الكنتية ، اطلبه .

١١١١٧ - عُنَبُ الْحِنْدِ هو البياض ، اطلبه .

١١١١٨ - عُنَبِيَّاء فِي الْوَيْجِ ، اطلبه .

١١١١٩ - عُنَبِيَّاسٌ * *Ambassis* (S).

Ambasse (F). *Ambassis* (E).

جنس اسماء بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة القرعيات . أنواعه المرفقة ثلاثة ، أصلاتها أخوار مصبات الأنهر المحتية || أجسامها أحليجية الشكل ، صغيرة القند ، أطولها تراوح من ١٢ إلى ٢٢ سم . رؤوسها مقطوعة الاغصام ، كبيرة العين الجاحضة . زعانفها الظهرية شبه هرية الشكل . زعانفها الذيلية غاية . أنفها تراوح من الحطلة اللحية الموج إلى الحطلة الخفية || حولها فاعرة الصفن مرفوب فيها .

١١١٢٠ - عُنَبَر *Ambre* (F). *Amber* (E).

مادة راتنجية بحرية صلبة تقع على عدة أشكال واللوان انصها الاصفر والأشهب .

١١١٢١ - عُنَبَر * *Physeter* (S).

Cachalot (F). *Spermwhale* (E).

جنس حيوانات بحرية لبونة عظيمة الهامة من الحيات ذات الأسنان . أجسامها حادة المقع ، وشمية الشكل ، طولها يراوح بين ١٨ و ٣٠ م . رؤوسها ضخمة ، محيطها يراوح بين ٧ و ٩ أمتار . أسنانها كبيرة القند ، صفراء اللون . طول بدن الواحدة نحو ٢٤ م . وضع زرعها من ٥ إلى ٦ سم . أولادها إلى الحطلة الرصاصية الزرقاء اللون ، تتبع مع القراها من الفهر وقبر عند البطن . يألف مياه بحار المناطق الحارة والمعتدلة . يعيش بجماعات كبيرة ، سرها يمد من عشرة أزواج إلى مئة زوج .

١١١٢٢ - عُنَبَرٌ بُولِي هو حب المسك ، اطلبه .

١١١٢٣ - عُنَبَرٌ دُمَاع * *Liquidambar* (S).

Liquidambar (F). *Sweet-gum tree* (E). *Amberbaum* (D). *Liquidambar* (I).

جنس أشجار برية وزراعية من فصيلة القنليات . النوع قليلة ، سوقها جالسة منتصبة ضخمة . أوراقها حاملة ، كبيرة القند ، معتقة ، متعاقبة ، مدببة المنصوص . أزهارها وحيدة المسكن ، قنية التجميع . ثمرها جراد سباعية الاغنية ، يزورها صفيرة جمجمة || يستخرج من خام سوقها ، يالحز ، ميمة صخرية ذكية اللون ، طيبة ، حرة الاستعمال تلشت الشيق وتقوي البقاء || أشهر أنواعه الثلاثة التالية .

١١١٢٤ - عُنَبَرٌ دُمَاعٌ أَمْرِيكِي ، عُنَبَرَسَاكِلِ ،

شجرة الميعة *Liquidambar styraciflua* (S).

Liquidambar à styrax, *Copalme d'Amérique* (F). *Storax*, *Satin walnut tree* (E). *Amerikanischer Amberbaum* (D). *Storax liquida* (I).

شجرة هرية الشكل تملو من ١٥ إلى ٤٠ م . أصلاتها البلاد الأمريكية . أوراقها خالية تقصيص خلية الاعتاق . شاربها الزهرية صفراء اللون ، غصنها اللجج . ميعتها فاعرة الصفن شاملة الاستعمال .



عنق الأرض



عناب



عنبر



عنبر دماع

المحروقة قليلة العدد اصطلاحاً بعض اصقاع المالحين القديم والجديد . ترب في المياض الرطبة انحصاراً حولاني المناطق ويجاري الماء || سيقاناً لينة أو خشبية ، ومنطقة ، فروعاً اوراقها صغيرة ، متماعلة ، متعاقبة ، متناوبة النصال ، رباعية اللون || انزعاجها مرطبة مستطيلة المالحين ، رباعية الاطراف ، يضاء اللون . ثمارها عنبية ، مكورة ، حمراء اللون ، حامضة الطعم قبل النضج التام || ثمارها الناعسة ترب .

١٩١٣٣ - عُبُوثٌ ٥ Tricholoma (S). Tricholome (F).

جلس ظهور كاملة التركيب من لفصيلة الفاريثيات . انواعها المحروقة زهاء ٤٥٠ . اصطلاحاً معظم اقاليم مناطق البلاد المختلفة الحارة . يذوقها ابيض اللون . اطرافها حادة الاطراف ، منطها لبد التجميع وبعضها قارق . تعيش على المواد النباتية المنحلة . معظم انواعها كامن الصنف .

١٩١٣٤ - عُبُوثٌ اَبْيَضٌ ٥ Tricholoma album (S). Tricholome blanc (F).

نوع من العنبوث الكامن الصنف . يوجد في حراج الصنوبريات . ساقه منتفخة القاعدة ، فبراء اللون . اروسوته يضاء ، عاجية المواجه ، قطرها نحو ٩ سم . اطرافها متقاربة يضاء اللون .

١٩١٣٥ - عُبُوثٌ اَحْمَرٌ لَامِعٌ ٥ Tricholoma rutilans (S). Tricholome rutilant (F).

نوع من العنبوث الكامن الصنف . يوجد على جلوع الانجرار النخرة . ساقه الى الحمرة الصفراء المواجه . اروسوته حمراء اللون يطلوها موجه اسطح ، قطرها نحو ١٥ سم .

١٩١٣٦ - عُبُوثٌ جَبَّارٌ ٥ Tricholoma colossus (S). Tricholome géant (F).

نوع من العنبوث الكامن الصنف . يوجد في الغابات . ساقه ضخمة ، سمراء اللون . اروسوته كبيرة ، قطرها نحو ٢٠ سم . لونها الى الشقعة السمراء يطلوها موجه اصفر .

١٩١٣٧ - عُبُوثٌ دَكْمِيٌّ ٥ Tricholoma columbetta (S). Tricholome petite colombe (F).

نوع من العنبوث المأكول . يوجد في الغابات ومراج السديان . ساقه يضاء تملوها ، عند قاعدتها . رقيقة غمرها . اروسوته يضاء اللون او وردية ، قطرها نحو ٨ سم .

١٩١٣٨ - عُبُوثٌ رَكِيحٌ السَّاقِ ٥ Tricholoma stricipes (S). Tricholome à pied étancé (F).

نوع من العنبوث الكامن الصنف . يوجد في المراعي والغابات . ساقه رقيقة متصببة لونها الى البياض الاخير . اروسوته مظلمة الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لونها الى البياض المالح .

١٩١٣٩ - عُبُوثٌ صَابُونِيٌّ الرَّابِحَةِ ٥ Tricholoma saponaceum (S). Tricholome à odeur de savon (F).

نوع من العنبوث الكامن الصنف . يوجد في الغابات والمراج . اروسوته لاقبسية القطر ، مظلمة الشكل ، لونها الى الربعة الخضراء المواجه ، طعمه ورائحته كصابون .

١٩١٢٥ - عُبُوثٌ دُمَاحٌ شَرَقِيّ Liquidambar orientalis (S). Liquidambar oriental (F).

شجرة كبيرة اللد تملو من ١٥ الى ٢٥ متراً . اصطلاحاً بلاد الشرق الاوسط . اوراقها خالصة التنفيس . فصوصها قلبية الشكل ، عادمة التنس . نصلها مالى البشرة يصفر عند الاضواء دون ان يكتشفه الاحرار المموي . شبايقها الزهرية يضاء اللون يطلوها موجه اسفر || ميتها غزيرة للمادة متصلة الصنف .

١٩١٢٦ - عُبُوثٌ دُمَاحٌ فُورْمُوزِيّ Liquidambar formosana (S). Liquidambar de Formose (F).

شجرة كبيرة اللد تملو من ١٥ الى ٣٠ م . اصطلاحاً الصين واليابان . اوراقها ثلاثية او خماسية او سباعية التنفيس . فصوصها مستطيلة الخالصة . اصقاعها ورواقها خلية البشرة . شبايقها الزهرية يضاء اللون يطلوها موجه وردي || ميتها غزيرة للمادة متصلة الصنف .

١٩١٢٧ - عُبُوثٌ كَسْمِيْرِيّ هُوَ التَّيْرِدِيّ، الطَّيْبُ . Succinea (S).

جنس حوالت قازية وبيرة من الرغويات مديات الاجل وفضيلة الخلزويات . انواعها المحروقة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . بعضها قارب ويمش على النباتات المائية وبعضها بري يعيش بين الطحالب قرب صفات مجاري الماء || اصداقها شبه يضيئة الشوزن ، صغيرة اللد ، رسية القواعد ، دقيقة الاطراف المخرزة || تتميز بدم اصقاعها استقبام الاجسام .

١٩١٢٩ - عُبُوثِيَّاتٌ Physceteridées (F). Physceteridées (E).

فصيلة حوالت بحرية لبونة من مرتبة مَحَلَّات الاسنان وردية الخرزيات || اجناسها المحروقة ستة منتشرة في جميع المناطق المختلفة الحارة . ملجها الحياتي جامي . اجسامها تجد من ١٠ انزواج الى ١٥٠ زوجاً || اجسامها ضخمة ، شبه وشية الشكل ، قطرها ٣ انصار الى ١٨ متراً || اعرف اجناسها العنبر والاسفم والرمية .

١٩١٣٠ - عُبُوثِيْرِيْنٌ Ambréine (F).

العنبرين مادة يضاء تستخرج من العنبر الاشهب ، عادمة الرائحة والطعم ، لا تلوذ في الماء ، تلوذ في الكحول والايتر .

١٩١٣١ - عُبُوثِيْلِسٌ ٥ Anableps (S). Anableps (F). Anableps (E).

جنس اسماك نهوية سرلوقة من مفتوحات اللسان ليات الزعانف وفضيلة البنيان . انواعها المحروقة قليلة العدد اصطلاحاً احر امريكا الاستوائية . تعيش في المياض التي يقل فيها انسياب الماء وتكثر فيها النباتات المائية . اجسامها شبه وشية الشكل تطلو من ٢٠ الى ٢٥ سم . رؤوسها صغيرة وزعانفها كذلك باستثناء الخوضية والذيلية الكبيرة اللد السانية الشكل || ويتميز العنبريس بمنيته الكبريتي المفسوتين ، اقنأ ، الى قسم علوي يشاهد ما يجري فوق سطح الماء ، وقسم سفلي يشاهد تحت سطح الماء .

١٩١٣٢ - عُبُوثِيْلِبٌ Oxycoccus (S). Oxycoccus (F).

جنس نباتات مدادة مصررة من فصيلة الملتحيات . انواعها



عنبرة



عنبريس

عنبروث
احمر لامععنبروث
ابيضعنبروث
دليعنبروث
جبّارعنبروث
صابوني الرائحةعنبروث
ركيح الساق



عُثُوبُ قَارَسٍ عُثُوبُ مَلْعٍ

ويجدها في المنائق والنياحات || أجسامها متفائلة القد ،
يكثر فيها الصفر . رؤوسها شبه مكورة . عيونها متفائلة
عنه الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة ،
مركبة من ١٦ فصلة . مرافقها قصيرة ، ملاصقة مستطيلة ،
رباعية العقلى . كواسلها عمودية . بطونها مغنية الشكل .
رواشنها قسطانية الخصب ، مرقوفة . قوائمها مستطيلة ||
يرقاتها ديدانية الشكل ، تعيش كامل طورها البرقي في المنائق
الشجر اجناسها المتنبيل .

١٩١٤٦ - عُثُوبِيَّ . Baccifère (F). Bacciferous (E).
كل نبات عثوبية الشكل .

١٩١٤٧ - عُثُوبِيَّ . Ural
نمت تفرعي يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالنمب .

١٩١٤٨ - عُثُوبِيَّ . Bale (F). Berry (E).
القشرة العنابية كمرعة عذبة غير متفائلة لا نواة لها بل تحوى
زرعة واحدة بذور كالمنية .

١٩١٤٩ - عَثَّة . Impuissance (F). Impotence (E).
عجز ذكر الحيوان من القيام بوظيفته التناسلية .

١٩١٥٠ - عَثَّة . Stalle (F). Stall, Box (E).
الحظيرة من خشب تمل الحليل .

١٩١٥١ - عَثَادَةٌ . Entada (S).
Entada (F). Entada (E).
جس نباتات عمرة برية وتربانية من فصيلة القرنيات
وسبط السطيات . أنوعها المعروفة مشرة منها الشجيرات
والجنيات المتسلقة . منبها الاسفاح الحار . أرواقها
مقابلة مركبة ريشية شعبة . أزهارها سنابل متتابة
عقودية التجميع ثنائية الارتكاز . أزهارها صغيرة القد
متتابة ، لبيدة ، صفراء اللون . ثمارها بذور طيبة مغمية
تغلغلها مادة غطائية لزجة تشمل في الهند لتنظيف شعر
الرأس .



عَثَادَةٌ

١٩١٥٢ - عَثَقُر ، عَثَقُر . Aisle (F). Robber-By (E).
جس حشرات قاتصة مفترسة من فصيلة العنتريات .
أنواعها عديدة مظهرها متوسط القد جزيل النفع بقضي
على الحشرات الضارة || أشهر أنواعها ما يتبع



عَثَرُ الشَّرَاطِلُ عَثَرُ النَّفَاسِ

١٩١٥٣ - عَثَقُرُ الشَّرَاطِلِ . Philoniscus albiceps (S).
Aisle des sables (F).
حشرة من العنتريات ، طولهاراوح بين ١١ و ١٤ م .
نوعها حثلي اللون ، الجمل المروج . عيونها خضراء ،
حلب جسمها وأرسلها بيض . تكثر في الأماكن القاتلة
وفرق دبال الشرطيل من أيار إلى أيلول . تقترس مسا
استطاعت قصه من الحشرات .

١٩١٥٤ - عَثَقُرُ النَّفَاسِ . Machimus pyragra (S). Aisle pyragra (F).
حشرة من العنتريات ، طولهاراوح بين ١٠ و ١٥ م .
نوعها ذو السرة . حلبها أبيض اللون . تكثر في الأماكن
الطليقة . تقترس النفايس والباباب .



عَثَرُ النَّحْلِ

١٩١٥٥ - عَثَقُرُ النَّحْلِ . Dasypogon teutones (S).
Aisle teuton (F).
حشرة من العنتريات ، طولهاراوح بين ١٢ و ١٦ م .
جسمها اسود اللون ، جوفها أصفر . يكثر ويوجد في

١٩١٤٠ - عُثُوبُ قَارَسٍ * Tricholoma
aquestre (S). Tricholome aqestre (F).
نوع من العنوب المأكول . يوجد في سراج الصنوبريات .
أرضيته إلى الصفار المنش بالأسمر ، قطرها نحو ٨ سم .
أطرافها إلى الصفار اللامع .

١٩١٤١ - عُثُوبُ كَبْرِيَّيَ الْقَيْنِ * Tricholoma
sulfureum (S). Tricholome couleur de soufre
نوع من العنوب الكاكن الصف . يوجد في الغابات .
أرضيته كبريائية اللون ، قطرها نحو ٤ سم . أطرافها
متباينة . رائحة تشبه رائحة الفانز .

١٩١٤٢ - عُثُوبُ مَدْعٍ * Tricholoma
portentousum (S). Tricholome prétentieux (F).
نوع من العنوب المأكول . يوجد في الغابات . أرضيته
إلى الريدة السمره بطولها مروج بنفسجي ، قطرها نحو
٩ سم . أطرافها إلى الأبيض الغابر .

١٩١٤٣ - عُثُوبُ الْخَمَاحِ * Clyra seraphacidis (S).
Clyre des sureaux (F). Clyra seraphacidis (E).
حشرة وأشمة غاصلة من فصيلة النضاريات ورتبة مفيدات
الاجنحة . تألف البراري والمواقع الرطبة ومضغاب مجاري
الماء . عناقضها تعيش على أثمار الخناج والصفصاف .
يرقاتها تعيش على صفت التعليلات وأوراق الصفصاف
والخناج || جسمها صغير القد بطول من ٧ إلى ٩ م .
يرتقي اللون اسود الرأس والتفتيح الكحلي والتفتيح الشدي .
أرسلها صغير الحجم . عيناها صغيرتان ، زباناها خيطان .
ظهورها كثالي الصلطي ربابي النقط اسود . غمداهما المتشعبة
التعزيز ، اللثقي . أرسافها رباعية العقلى الظاهرة || لها
جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في أوائل
سبزيان وقي حتى أواخر تموز . كسر في النهار ويبيت
في الليل || البرقة عنه بطولها الإدراك الثام تطول نحو
١٢ م . جسمها شبه أسطواني الشكل ، قليل التقوس ، اسمر
سداسي الروابب ، حثلي اللون ، أصفر المروج ، اسمر
الرأس والروابب || طور الاكمال الذي يتفقي في القرية
يستمر نحو أربعة أسابيع .

١٩١٤٤ - عُثُوبُ Psychoptera (S).
Psychoptère (F). Psychoptera (E).
جس حشرات من فصيلة العنوبليات ورتبة ذوات الجنحين .
أنواعها المعروفة مشرة أسطوانات بمس مناطق البلاد المعتدلة
والحرارة والمنسرة نحو البرادة || أجسامها تطول من ٧ إلى
١٢ م . رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة ، متقاربة عنه
الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١٦
فصلة . مرافقها قصيرة . ملاصقة شديدة الطول ، رباعية
العقل . كواسلها عمودية . بطونها مغنية الشكل . رواشها
قسطانية الخصب ، مرقوفة . قوائمها بالغة الطول ||
تألف المنائق ومضغاب مجاري الماء ، قوتها رقيق الانهار .
يرقاتها دامتة تعيش كامل طورها البرقي في المنائق والامسال
على المواد النباتية المنحلة .

١٩١٤٥ - عُثُوبِيَّاتُ Psychoptera (S).
Psychopteridae (F). Psychopteridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجنحين . اجناسها وأنواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اسفاح العالم . يكثر

١٩١٤٥ - عُثُوبِيَّاتُ Psychoptera (S).
Psychopteridae (F). Psychopteridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجنحين . اجناسها وأنواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اسفاح العالم . يكثر



منر زُبُورِي

ايار الى آب . تقترس معظم عشائيات الاجنحة اخصها النحل وهي بلك تختلف من ريفاتها النافسة .

١٩١٥٦ - عُتْر زُبُورِي *

Asilus crabroniformis (F). *Asile frolon* (F).
حشرة من العتريات ، طولها يراوح بين ١٦ و ٣٠ سم .
نوعها الى الجفوة السوداء ، رأسها أصفر . زياتها الى
السود . اربطها الى الصفة الصناعية . مسرها الحقل
والبساتين . تكثر من حزيران الى ايلول . تقترس الذباب .

١٩١٥٧ - عُتْرِيَّات

Asilidae (S). *Asilidae* (E).
Asilidae (F). *Asilidae* (E).

فصيلة حشرات قانصة مقترسة من رتبة ذوات الجناحين .
اجناسها وانواعها عديدة جميعها متوسطة الحجم ، قوية الاربيل
الزبد ، مستطيلة البطن ، غليظة الصدر والرأس والمخالب ،
قصيرة الخطم ، قوية التأثير ، نشطة الحركة ، سريعة
الطيران || مكثا ونشي الشكل ، اخير اللون ، تمتح
بدون انتظام على الاشجار والاعشاب وشجيرات الزروع
وانصاف الشجر واوراقها وفي التزل واليمن || ريفاتها
عناشيه ، دامت به تكون واجهة تعيش في التربة
تفضل الدبال والرمال ويكثر وجودها تحت الحطب اللدن .



عتيل

Gonomothylus (F).
Gonomothylus (E).

١٩١٥٨ - عُنْكَلَة

تصاب فري ، ذكور اناثه ضحية اما اناثه فتفترس .

Trochus (S). *تُونِيد* *
Trochus (F). *Trochus*, *Topp-shell* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات منطبات الاربيل
وفصيلة التتليات . اناثه المعاصرة المروقة قليلة العدد
أصلها بحار البلاد الحارة . تعيش على الصخور المغطاة
قرب الشواطئ || اصداها غروطية كبيرة القشـة حيلة
الغازات الحاربية ، ولؤلؤة المسحات الداخلية . اجناسها
عزلة كبيرة . رؤوسها صغيرة ثنائية الفواص المميعة .
اربطها مهدية الحمار . اصداها قزينة المادة || اصداها
صناعية ولوحها مأكولة .



عتيل نفيط



عند

١٩١٦٠ - عُنْكَلِيَّات ، نُهِيَّات

Trochidae (S). *Trochidae* (F). *Trochidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات منطبات الاربيل
اماميات الخياش . اجناسها وانواعها المروقة قليلة العدد
أصلها بحار البلاد الحارة || اصداها غروطية شبه حورية
الشكل متباينة الاجسام والنازوق الحاربية . فصلاها
الداخلية مائلة نازقة ولؤلؤة اما الحاربية فمفتحة || اعرف
اجنسها واشهرها العنيل .



عند جميل

Anabackidae (S).
Anabackidae (F). *Anabackidae* (E).

فصيلة طير من الجوارث منيات المتأخر . اجناسها وانواعها
المروقة قليلة العدد شائعة الانتشار في معظم اقطار البلاد
الاستوائية والحارة || اجناسها رفيقة ، متوسطة القد او
صغيرة متقلدها مستطيلة قليلة التقوس . اذنانها مستطيلة
وتاجية الرئال .

١٩١٦٢ - عُنْطِيل نَفِيط *

Melanotus robustus (S).
Melanotus robustus (F). *Melanotus robustus* (E).

حشرة ناعمة مقترسة من فصيلة السالوات ورتبة ممدعات



عنوس

الاجنحة . تألف الحقل المزدودة والادغال . عنافها
تعيش على اوراق النباتات البرية . ريفاتها تركب جلود
النباتات الحولية من الاعشاب البرية الى الدرة وديار
الشس والباطا والشولنر والجزر ولا تمت من الحشرات
الدنيا فتفترسها || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى
١٧ سم . قوبها الى الكسني اللامع . رأسها متوج بانار
حلالي الشكل . فكها كيران . زياتها عيطان . عيناها
صغيرة . ظهورها بلخ التحزير الفضي . اسرافها خامية
الكفل || جيلها رهاهي الحولي . تظهر الحشرة الجبلدة في
اوائل ايار ويقتى حتى اواخر تموز . تسرح في الليل .
تساقط في حزيران . اناثها قزيرة انابيب المكن تحت حلاء
الاجبار او في سراديب الحشرات الحاشية او في التربة ||
البرقة عند بلوغها الادراك اتمام تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم .
جسمها سلكي الشكل ، أصفر اللون امير الموج .

Raisin sec (F). *Raisin* (E).
١٩١٦٣ - عُنْجِد

هو الزبيب وقيل الاسود من الزبيب .

١٩١٦٤ - عُنْجِد * ، شَوْلْكَ بَيْطَهَاء ، لُبَانَة

Euphorbia resinifera (S).
Euphorbia à résine, *E. résinifera* (F). *Euphorbium*
gum-plant (E). *Wolfsmilchgummi* (D). *Euforbo* (I).
نوع من الفربيون وهو نبات لحمي برقي ممر يعطى من
٢٥ الى ٣٠ سم . غرابيه سفلة ربابية الزوايا ، لونها
الى الاخضر القاتم الاصلح الموج . لباته خيرة المادة
الجالية الشديدة الفاعلية الشائعة الاستعمال الطبي .

١٩١٦٥ - عُنْجِد جَمِيل * ، بَيْتُ التَمْلُفِ
Euphorbia pulcherrima, *Poinsettia pulcherrima* (S).
Euphorbe superba, *E. écarlate*, *Fille de consul* (F).
Poinsettia, *Easter flower*, *Flame-leaf* (E). *Weihnachtsstern* (D). *Poinsettia* (I).

نوع من الفربيون وهو جنبة زينة معمرة تاجو من ٦٠
الى ١٢٠ سم . اوراقه حراء اللون غنية التجميع منقطة
نصلا يضيي الشكل ، اذني القاعدة ، ذوب اقزام الاخير .
ازهاره نجمة الشكل ، كبيرة القد ، ارجوانية اللون || يتكاثر
بالتعليل . يرب في المواع الدافئة وفي الارربة المتوسطة
الانساج العميقة الدور .

١٩١٦٦ - عُنْطِيل ، عُنْجِيل *
جنس حشرات من فصيلة العنجلبات ، اطلب منجل .

١٩١٦٧ - عُنْجُوج
Courcier (F). *Charger* (E).

الجواد الصبور الرائع من عيل الميدان .

١٩١٦٨ - عُنْجُوس * ، عَالِيَش ، عَالِيَش ، حَرَّالَة
Gryllotalpa gryllotalpa, *Gr. vulgaris* (S). *Courtillière*
Taupe-grillon, *Taupeette* (F). *Mole cricket* (E). *Maul-*
wurfsgrille (D).

حشرة دجوبة مقترسة من فصيلة الجدديات ورتبة مستطيات
الاجنحة . طولها عند كمال بلوغها اي بعد انسلخها
الخامس لا يقل عن ٥ سم . قوبها الى السمرة الكستنية .
ظهورها خلي النشاء . بطها الى الجفوة . رأسها غروطي
الشكل ، شديد الانساق يرتكز على حلقة صدرية شبه
اسطوانية . عيناها غريزتان بارزتان . زياتها عيطان
بحيما الطرف . جوشها وظهورها مفلغان بقشاه واق صلب .
قوائمها ست . قامتها الى الامامتين مسلمات بمبروتين
مستئين تحفر بها التربة || تألف الارربة الرطبة .

تعيش في دهايز ملحية تسربها في جميع الاجتماعات. حياتها طول من ٢٢ الى ٢٤ شهراً تمر في اثنائها بحس استلخات || قوتها البهائم والحشرات والجذور التي تبتلع طريقها || اغراضها كثيرة لانها لا تقتصر على الدورات والجذور التي تلتهمها بل تتغذى بل تتصلها الى جميع الشئ التي تحلل تربتها فتدبها وتفتتها || اناثها اكبر قدماً من ذكورها وهي تحت مكنها الذي يراوح حده بين ٣٠٠ و ٥٠٠ في الربيع والخريف وفي اجسام حده في التربة على اعماق تراوح بين ٢٠ و ٢٥ سم. مكنها ابيض اللون الملبس للثقل يطول من ٢ الى ٣ سم. وهو يتقشف بعد مئته بشهر ٢٠٠ ساعة || تكاثرها باستعمال اسد الحراشير الفعالة كالأكرود وغلوسيليكات البارود وغيرها.

١٩١٦٩ - **عنكبوت البطاطا *** ، **لاشعة الخبز**
Phthorimaea operculella (S). *Taigne de la pomme de terre*, *Minuscule des feuilles de tabac* (F). *Potazo tuberworm* (E). *Kartoffelmotte* (D).

فراشة صغيرة ابيض من فصيلة العنكبوتات. طولها نحو ٨ سم. يستعملها الحاد بين ١٦ و ١٨ سم. وراشها خفيفة طحال اللون، وراشها الاماميان ميمتان بالاسمر والخلفيان بهديا المختار || مكنها ذري القند، كروي الشكل، اسمر اللون. رقتها خيرا الجسم، وردية المواج، طولها نحو ١٠ سم. خادتها بنية اللون تلصق فيلحة حورية النوس تقسم بين الارزاق الجافة المتساقطة على التربة او في الخافان بين طيات الاكياس وطيا || اغراضها بالغة لان اجسامها الحولية عديدة تراوح بين ٦ و ٧ وأكثر ولان رقاتها تهم تركب البطاطا والباذنجان والتين والبنجور. انما يتعدى من الورقة التي تلتهمها ويعد الى الساق التي تلتها ويهين بالدرجة التي تقربها وتغسلها تعيش على ما تحوي من مواد نشوية || وتغلب اوراق التبغ لانها تلتهمها وتسرب نسيجها بين البشترين ليهو شتالاً خالياً من المواد الثابتة المذرة. تكاثره منه ظهورها باستعمال اسد الحراشير الفعالة المركزة على اليرودتين.

١٩١٧٠ - **عنكبوت الخربوب *** ، **طبور** ، **الويش** ، **حنط الحنطة**

Stecrogra caraealis (S). *Alucide des céréales* (F). *Grain moth* (E). *Geceidemotte* (D).

فراشة صغيرة ابيض من العنكبوتات. طولها نحو ٦ سم. يستعملها تراوح بين ١٢ و ١٤ سم. جسمها وراشها الاماميان الى الطحلة الرءاء تلجوها صفرة طويلا. وراشها الخلفيان الى السرة، اعدادها رصاصية || مكنها ذري القند، بيضي الشكل، يرتقال اللون. رقتها خيرا الجسم طولها نحو ٥ سم. خادتها حنطة اللون تكن في التلبيبة التي تنسجها داخل الحية || اغراضها محصورة بما تسبه اليرقة من صطب في الحبوب المخزونة لانها تتفجها وتعيش داخلها على المواد النشوية.

١٩١٧١ - **عنكبوت الخن *** ، **دودة قرنفلية** ، **دودة الفز القرنفلية**

Platyedra gossypiella, *Gelechia gossypiella* (S). *Platyedra*, *Géléchie du coton*, *Ver rose du cotonnier* (F). *Pink bollworm* (E). *Rotar kapselwurm*, *Baumwollmotte* (D).

الحشرة الكاملة فراشة صغيرة ابيض من فصيلة العنكبوتات. طولها يراوح بين ٧ و ٢ سم. يستعملها نحو ١٥ سم. جسمها

حنط حلق. وراشها الاماميان الى الصلبة الصنافية يطولها عنه قاطعتها وفي طرفها تدبج اسمر تظل ممرته مع ابتاده. وراشها الخلفيان الى الكهبة الرءاء تلجوها مشقة فضية. اما الالاداب فرصافية اللون || مكنها ذري القند، بيضي الشكل، في الايام الاولى عنه وضع ثم يبرق ويضمر ويستقر على الايام القليلة، تنسج الاثني فرداً او مجموعاً على اي جزء من النبات || رقاتها تدريجياً الى ان تنشر على القرنفيل. رأسها كسني اللون دوقها الصبورية بنية زاهية اما الشورية لاصقة. ظهورها اخر القرن جوي التبج. مدنها اسفر حنط. طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم || خادتها صفرة، طولها نحو ٦ سم. فيها التي تطوى باية صفراء. صلبتها رقيقة ناعمة نسجها كالتولاس || رقاتها تركب القصيلة الخبازية انصها القطن. تعيش في بدعدها على البرام الشورية تنسجها وتقات من محروياتها ثم تنابع عملها في الكنتاج لتسهم اليرود، في الطواير النشوية الاولى، قبل جها لباها ولا تنشر عن قرض القيل الجديد قبل اكمال نمو وصلاحته.

١٩١٧٢ - **عنكبوتات ***
Gelechiidae (S). *Géléchiidae* (F). *Gelechiidae* (E).

فصيلة حشرات مؤذية من رتبة شربليات الاجنسة. اجناسها واولوها زهاء ١٥٠٠ جميعها صغيرة الحجم. وراشها مستطيلة ملونة وبنية الأطراف. حادها الخلفي مذهب الحلق. ملاصقها الشورية طوية ذرية ملتوية نحو العلاء. قروتها الاستطارية غريبة حبيبة. مكنها ذري القند، لاقياس الشكل والتجميع. رقاتها ملونة صفرة، وضيقة، سرية الحركة، غاصلة، تركب الازداد والبار والحوب.

١٩١٧٣ - **عنكبوت ***
Trachypetura (S). *Trachypetura* (F). *Trachypetura* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة البشريات اولاهه المرحبة نحو ١٠ اطلابها بحار البلاد الحارة من الماين القديم والجديد. اجسامها مدونة الشكل مسطحة. تنسج رقاتها المستطيلة الانقياسية كما يبرق في الرم. اثراها ثنائية اللون يطولها تدبير جوي وهي فضية الشط الاصل عابية الشط الاسفل

١٩١٧٤ - **عنكبوتات**
Tentoidae, *Trachypetridae* (S). *Tentoidae*, *Trachypetridae* (F). *Tentoidae*, *Trachypetridae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من البشريات ثلاثيات الزغافن. اجناسها واولوها المرحبة متوسطة البدن يكثر وجوها في بحار المناطق الاستوائية || اشهر اجناسها العنكبوت واشرطاط والقوت

١٩١٧٥ - **عنكبوت**
 العنكبوت حارب من المصاير (بحر المحيط).

١٩١٧٦ - **عنكبوت**
Indris brevicaudata (S). *Indris à queue courte* (F).

حيوان لبن وسيد الجنس والنوع من البشريات. موطن جزيرة مدغشكر. يألف الكنايات الرطبة. ملجته الحياتي جماعي. جماعته تد من حمة الى عشرة ازواج || جسمه اعيف الشكل يبرق نحو ١١٠ سم. وهو اكبر اجناس البشريات. شكله وانما قرب القبه بشكل الانسان. ثوبه



عنكبوت البطاطا



عنكبوت الحبوب



عنكبوت القطن



عنكبوت



عنكبوت

Bukkum-wood (E). Sapanbaum, Rotes Brasilienholz (D). Brasilletto dell'Indie (I).

نوع من العندم، شجرته سبروتية شائكة تملأ نحو ٨ أمتار. أوراقها مركبة حاملة، وريقاتها سنائية صغيرة. أزهارها عتقودية التجميع، برتقالية اللون، غائقة البرق السطري. اشخاصا شديدة الصلابة، قوية الملمسة، جيدة الصنف. خشبها أحمر اللون شائع الاستعمال.

١٩١٨٥ - عتدَم قَلَح *، أَطْمُوَط، بِنْدِي هِنْدِي

Cassipouia bonduc (S). Césalpinie bonduc, Bonduc, Chiquer, Chiquer, Chlot du Canada (F). Bonduc, Nicker tree, Gray bonduc (E). Nickerbaum, Gemeiner Schlüsselbaum (D). Bonduc, Niccheri, Occhio di gatto (I).

نوع من العندم شجرته سبروتية قليلة الشوك تملأ نحو ٣ إلى ٥ أمتار، أوراقها مركبة، وريقاتها بيضية النصل. أزهارها عتقودية التجميع صغيرة القدر، صفراء اللون. ثمارها طيبة وصالبة حواء الخشب، اشخاصا صلبة متينة جيدة الصنف.

١٩١٨٦ - عتدَم هِنْدِي *

Cassipouia pulcherrima, Poinciana pulcherrima (S). Césalpinie superbe, Flamboyant, Poincillade magnifique (F). Indian flower-fence, Peacock flower (E). Paradiesblume (D). Poinciana Indiana (I).

نوع من العندم الأزرق. شجرته شائكة، رقيقة، تملأ من ٣ إلى ٤ أمتار. أوراقها مركبة حاملة، وريقاتها أحليجية صغيرة. أزهارها كبيرة القدر، حمراء اللون، عطرية العروق، هريسة التجميع || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

١٩١٨٧ - عتدَم مَيَات

Cassipouia (S). Césalpinie (F). Césalpinie (E).

سبط من فصيلة القرنيات، أجناسه وألوانه زهاء ٦٠. فيها الأشجار والشجيرات والجنبات البرية والمانساعة. أشهر أجناسه العندم.

١٩١٨٨ - عتُرُوسِ أَمَلَس *، Anereus laevis (S).

Anereus lisse (F).

حشرة دامت من فصيلة العمدوسيات. جسمها صغير بسيط. يطول نحو ٥ سم. عند الذكر رفوف ٧ سم. عند الأنثى || ثوبها إلى الجلود. ظهورها كامل الحنجرة، بنفسجي اللون، أسود المواج، ورشها شفاهان. رأسها مكور. غصنها صغير، طليق. عيناها صغيرتان، عنقها قصير. كوسلها مقطوم القاعدة والطرف. حنجرتها نصف دائرية. ظهورها يلفح البطن دون الحمار. حمار ظهرها يجمع بالأسود. قوائمها صغيرة || تألف البراري الغلة. تعيش تحت القشور وفي الجحالة من المواد النباتية المنسلة.

١٩١٨٩ - عتُرُ، Capella (F). Capella (E).

النمر نجم من كوكبية مسك الأعمى. مركزه على المرقق الأسير. يستمر من نجوم البعرة الأولى. يمد من الأرض نحو ٥٠ سنة ضوئية.

١٩١٩٠ - عتُرُ، عتُرُ (E). She-goat (F).

الأنثى من الماعز أو أثنى الكيس. ج. أمز وعوز وناز.

١٩١٩١ - عتُرُ

Ibis هو الخراس، اطله.

الأسرة السوداء. رأسه وكفاه وظهوره وأرجاءه وفخذه إلى السواد القمعي. أذناه كبيرتان كاسيتان. جبهة وصداء وصفة إلى الكهبة. بقاء وريلاه سود. ذنبه شديد التقصر، يطول نحو ٥ سم. || الأثنى ثنائية الكندي، عجلها يوم نحو ١٤٥ بيضا تضم في تمامه جروا واحدا ترضعه نحو ثلاث أشهر || قوته الجار والتمتات والجلود يسى إليها في الليل من القرب إلى الليل ويبعث في النهار حل أنصاف الأشجار الرزمة الزرقة للظل.

١٩١٧٧ - عتدَمَكَة

Bas ventre (F). Lower part of the abdomen (E).

المنطقة أسفل البطن.

١٩١٧٨ - عتدَمَكَة

Chant du rossignol (F). نغريد العندليب.

١٩١٧٩ - عتدَمَكِي *، Luscinia megarhynchos (S).

Rosignol chanteur (F). Nightingale (E).

طائر من أخزاز وطيولة الحمايل يتميز بحسن صوته وبقوة صوت وانبساط أنفاه. طوله نحو ١٥ سم. ثوبه إلى السمر الشفراء. يمين عند الرأس والظهر ويبيض عند البطن || يسر من التلويح يحجب البلاد في طلب الرزق والمصيف والشتى. يألف الحدائق والنبات والادغال. قوته الحشرات والديدان والتمل || يمش في المروج والجنبات أثناء الاشكارة. انثاه تضع من ٥ إلى ٦ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر من ١٣ إلى ١٤ بيضا.

١٩١٨٠ - عتدَمَكِي الياباني (F). Rosignol du japon.

طائر ياباني المهد جميل الثوب، يدعى بعتدَمَكِي، اطله.

١٩١٨١ - عتدَمَكِي

Cassipouia (S). Césalpinie (F). Césalpinie (E). ينسج نباتات. برية وزراعية تربيتية من فصيلة القرنيات. أنواعه نحو ١٠ منها الأشجار والشجيرات والجنبات. اشخاصا ناعمة الرقة، صلبة العود، فائرة الصنف، شائعة الاستعمال ويستخرج منها صبغات حمراء وصفراء فيها تصلح في تخفيف السموم والقطن || أشهر أنواعه مايتج.

١٩١٨٢ - عتدَمَكِي بَرَاذِيلِي، عتدَمَكِي بَرَاذِيلِي

Cassipouia echinata (S). Bois du Brésil, B. de Fernambouc (F). Brasil-wood, Brazilletto-wood, Lima-wood (E). Brasilienbaum, Brasilienholz (D). Brasil-rosso, Legno del Brasile (I).

نوع من العندم، شجرته سبروتية شائكة تملأ نحو سبعة أمتار، أوراقها مركبة حاملة. أزهارها إلى الصفرة. اشخاصا شديدة الملمسة، فائرة الصنف. خشبها أصفر اللون شائع الاستعمال.

١٩١٨٣ - عتدَمَكِي مَيَات *، فَوَلَكَة

Cassipouia coriaria (S). Dividivi (F). Divi-divi tree, American sumach (E). Divi-divi-strauch (D). Sommaco d'America (I).

نوع من العندم، شجرته سبروتية شائكة تملأ نحو ٥ أمتار. أوراقها مركبة حاملة. وريقاتها بيضية الشكل صغيرة القدر. أزهارها متوسطة الحجم، عتقودية التجميع. اشخاصا جيدة الصنف صناعية. غطاء سفها وأرجاءها داغية وصالبة.

١٩١٨٤ - عتدَمَكِي مَيَات *، بَقَمَكِي هِنْدِي

Cassipouia sappan (S). Césalpinie sappan, Bois de sappan, Brésillet des Indes (F). Sapan-wood tree,



عندليب



عندم سَيَاتِي



عندم صِيَان



عندم قَارَح



عندم هِنْدِي



عُرْ الملة



منزج



عسل



عسل



عنقبي

١٩٢٠٢ - عُنُقُرْ مَكْرِي Micro-élément (F).

Micro-élément (E).

هو كل عنصر غذائي جزئي القسبة يسبب اعتداله أو شذائه في التربة ما يدمره الجبن أو القرمز الذي تظهر حوارضه في النباتات والثمار.

١٩٢٠٣ - عُنُقِرْة هي للملح اللهب ، امطابه .

١٩٢٠٤ - عُنُقِرِي Rachal

نمت تعريفي توصف به الاجناس المتحدرة من اصل واحد.

١٩٢٠٥ - عُنُقُصْل Scilla (F).

هو الاشكيل نبات موسمي طوي ، امطابه .

١٩٢٠٦ - عُنُقُصْل جَرَسِي Scilla d'automne (F).

هو اشكيل الخريف ، امطابه .

١٩٢٠٧ - عُنُقُصْل مُنَحْنِر Jacinthe sauvage (F).

هو اشكيل القباب ، امطابه .

١٩٢٠٨ - عُنُقُصْل تَجَسِي Jacinthe étoilée (F).

هو الاشكيل النجمي ، امطابه .

١٩٢٠٩ - عُنُقُصْل * ، جَوَلْنِ المُرُوج Endymion (S).

Endymion (S). Endymion, Agraphide, Jacinthe des prés (F). Blue hyacinth (E).

نبات يصل من فصيلة الزينيثيات . مهده بايات البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واروپة . اوراته مستطيلة ميّانية التصل الجليل الخضار . غمرانه اموج الانتصاب ينتهي بشلة من الازهار المتناوبة المحتبة الحريف ، الجيلة الشكل ، السداسية البتلات الزرق || تنوره رديسي .

١٩٢١٠ - عُنُقُصْف * Felicia (S).

Félicie, Piquereux bleue (F). Blue daisy, Blue Marguerite (E). Felicia, Kapaster (D). Felicia (F). جنس نباتات برية وريينية من فصيلة المركبات . انوامه عديدة منها المشية واللبية واخرية والمصرة . اوراتها لا قياسية الازنكار . انوامها محتلة الاولان ينظ فيها الازرق . سطها نباتي بروبي ويش ويحي في جميع الاربة || اشهر انوامه التريينية ما يلي .

١٩٢١١ - عُنُقُصْف سَمَنَحُوي Felicia (S).

Félicie coelestis (S). Félicie azurée (F).

عشبة ليلية ممررة تطلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراتها متعاقبة ، لاطئة ، بيضية الشكل ؛ نصلها خالي البثرة ؛ ملتص الاطراف . انوامها حالية الازنكار ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ، سمججبة اللون || انوامها يستمر طوال الصيف والخريف .

١٩٢١٢ - عُنُقُصْف لَطِيف Felicia (S).

Félicie délicate (F).

عشبة ممررة تطلو نحو ٣٥ سم . اوراتها متعاقبة غشجية ؛ نصلها حاد الشام ، خالي البثرة ؛ يلمت الخضار . انوامها حالية الازنكار ، فردية التجميع ، لها بين الازرق والبياني || انوامها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩١٩٢ - عُنُقُرْ Cigogne noire (F).

هو اللقلق الاسود ، امطابه .

١٩١٩٣ - عُنُقُرْ الماه * ، قَنَقَر Balistes (S).

Baliste (F). Trigger-fish (E).

جنس اسماك بحرية من رتبة ملحويات الفك . انوامه عديدة . اصطناعها جمار مناطق البلاد الحارة . جميعها من الاسماك المأكولة تتميز بشكلاها البيضية المخططة العادية الاثاق . رؤسها مسلحة بزنايف مهازية الشكل مدينة الطرف تشتر وتنتصب عند الحاجة .

١٩١٩٤ - عُنُقُرْ الماه المَلُون Baliste caprique (F).

سمكة بحرية تسمى قَنَقَر المصط ، امطابه .

١٩١٩٥ - عُنُقُرْب ، عُنُقُرْب هو سماء الكك ، امطابه .

١٩١٩٦ - عُنُقُرُوت Astragale (F).

هو الاسطرغالوس ، امطابه .

١٩١٩٧ - عُنُقُرْع * Eragrostis (S).

Eragrostis (F). Love-grass, Tickle grass (E). Grasses Liebesgras (D). Eragrostis, Gramignone (F).

جنس نباتات عشبية برية من العكرويات وفصيلة النجيليات انوامه عديدة نحو ٢٤٥ منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها حولي وبضها ممر . يكثر ويوجد في المراعي الطوبية وفي الاراضي نخيلة . صفهاشويب التصل ، خيطي الزايم الاخير . انوامها عقيدي متعصب . رعاها الماشية وتضمن عليها .

١٩١٩٨ - عُنُقُرْعَة هي التفت القسي ، امطابه .

١٩١٩٩ - عُنُقُس Aquile sudaux, Uroetux sudaux (S).

Uraète, Uraète sudauleux (F).

المنس ، جمه عناس وينس ، طائر وحيد الجنس والفرع من عمارة العتيان وفصيلة الصقريات . كبير الجثة طوله نحو ١٠٥ سم . وبسطه ٢٦٠ سم . منس قوي البرة الحادة . ذنبه زنايف الريش مقطوم الطرف . ثوب السرة الخفيفة تلويا مشعة من السبهة يتخللها ثوب من السرة الجلوية السوداء المالح . عناء غفريرينا اللون . منس ومطابه صفر || عيشته جبابية ، سر به يعل . رويين الى خسة ازواج . يأنف الجبال والسهول والاسراج . قوته كل ما استطاع اليه يسكن من الحيران والطير والزواجات والاسماك . يرف في الثم والمنازل والظلم ولا ينف من الجيف || يلدن وركه في الانهار القريبة التالية . اناء تحضن سطلها رنتين كبيرتين طول الواحدة يراوح بين ٨ و ٩ سم . ويرضعها من ٦ الى ٧ سم . وهو من العتيان التي تألف حياة الاسر بسهولة .

١٩٢٠٠ - عُنُقُص Myrobahn aillé (F).

هو الاطليح الجنب . من النباتات اللبية ، امطابه .

١٩٢٠١ - عُنُقُص Élément (F).

Element (E).

هو التتريف الوسي لكل مادة بسيطة لم يستخلص منها حتى الآن ، مواد ايسل منها .

١٩٢٢٢ - عقنولانة كتيمة السنبلة

Liatris pycnostachya (S). *Liatride à épi dense* (F).
بجلة زرقية تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. أورقاتها السفلى خضراء أو سباجية المروق طول نحو ٣٠ سم. وتعرض ١٥ سم. أورقاتها العليا خضراء التصل الذرب الجماد. أزهارها رؤوسات صغيرة متتامة كثيفة تتجمع أرجوانية اللون. أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

١٩٢٢٣ - عقنولانة تجليبة الأوراق

Liatris graminifolia (S). *Liatride à feuilles de graminée* (F).
بجلة زرقية تملو من ٤٠ إلى ٩٠ سم. أورقاتها تجليبة صفيحة الشكل، خضراء النسل. أزهارها رؤوسات صغيرة متتامة، متجمعة، يضاء اللون أو حرجاء || أزهارها يستمر من آب إلى أيلول.

١٩٢٢٤ - عقنوط *
Lucanus (S). *Lucane*, *Cerf-volant* (F). *Stag-beetle* (E). *Hirschkäfer* (D).
يفتلك لآك عظماء والآن عظماء. جلبى شحرات ثلثة من فصيلة المنظويات. الذكر أكبر قدماً من الأنثى وهو كبير الحجم، غليظ الرأس، عظم أكتافها، مستطيل الزباني، كسفي الاتحاد السفح الموجب. أما الأناث صغيرة الحجم والرأس وتأثير. اتحادها إلى السمرة المابقة المادمة الموجب || البرقة غشاء اللون، عمودية الشكل، تمشي على جلوج الأشجار اليابسة.

١٩٢٢٥ - عقنوط الصنم

Dorcas des saules (F). هو الدرقس، الحلب.

١٩٢٢٦ - عقنوطيات *
Lucanidae (S). *Lucanidae* (E).
فصيلة شحرات ثلثة من رتبة عمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة تمشي على جلوج الأشجار اليابسة تحت ثلثها وفي محيط انتشار جلوجها. أكثرها صغيرة ومتوسطة القند وبعضها كبير جداً يراوح طول بين ٧٠ و ٨٠ سم. أنثاها مظللة الألوان يلب فيها الاسود والكسفي المايق. قرونها الاستشعارية ورقية الشكل، حشائية المفاصل. رؤوسها مستديرة، اتحادها سلبية، اجناسها قوية. ذكورها أكبر حجماً من أنثاها وأضخم جفنة وأغلظ أضواء وتأثيراً.

١٩٢٢٧ - عقنكة
Interligne (F). *Space-lins*, *Lead* (E).
المنفة في المسافة بين غطلي الزرع.

١٩٢٢٨ - عقنكة
Turbine
دولاب مائي محرك محوره عمودي أو ممتد. والمنفة أشكال أهمها استمالاً:
عقن شعاعية *T. radiale* (F). *Radial T.* (E).
عقن مائية *T. hydraulique* (F). *Hydraulic T.* (E).
عقن عمودية *T. axiale*, *T. parallèle* (F).
Axial T., *Parallel T.* (E).
عقن خطية *T. mixte* (F). *Mixed T.* (E).

١٩٢٢٩ - عقنط هو عقن الارض.

١٩٢٣٠ - عقنقون
Cisse
هو السلح، الحلب.

١٩٢١٣ - عنكبوت متحكس *Felicia reflexa* (S).
Félicie réfléchie (F).

عقبة سمرة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أورقاتها متتامة، ممتدة، بيضبة الشكل، ذلقة الزام الأخير. تصلها جميع الفتق، مالى البثرة، متخفف الطرف، يلمت الحطار البري. أزهارها حامية الارتكاز، فردية تتجمع حواء اللون || أزهارها يستمر من شباط إلى أيلول.

١٩٢١٤ - عنكبوت هو السون البصل، الحلب.

١٩٢١٥ - عنكبوت *
Anthestre (S). *Anthestre* (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النجيليات. أنوعها المعروفة قليلة المند أوطانها البلاد الحارة || والعنكبوت من النباتات الطويلة على الساحل اللياني. مثالبه عكركية تتجمع عطفية بتقنيات دقيقة تحملها كالصفا.

١٩٢١٦ - عنكبوت بلال *
Onitis belial (S). *Onitis belial* (F).

حشرة جملة نالمة من فصيلة الجمليات ورقية ملبفات الاجنحة. تألف المزارع والبساتين والبراري وكل مكان يكثر فيه الخثي والورث والصلح || جسمها متوسط القند يطلو من ٢٠ إلى ٢٦ سم. لونها إلى السواد اللامع. رأسها يلمس الجرم، قصير الأتار والحظ. زباناها صغيران، صفيها الأطراف. حشاما صغيران. ظهرها مضطوم الطرف، لا يلمس كامل البطن. غمداهما خديمتا المصلاية، قليلتا التحزير || الأنثى أصغر قدماً من الذكر وأبهر ثوباً منه || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في احوال الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف. سرسها دجوي || والبرقة منه ادراكها الكمال الجسوري تطول الشكل و فليح التكاثر، قصير الرءاجب، الحبر اللين، اسود الرأس || طود الاكمال يستمر نحو اربعة أسابيع.

١٩٢١٧ - عقنط المنط: تلير النبات من الحرج.

١٩٢١٨ - عنكبوت
Sauterelle malle (F).
He locust (E).

العنكبوت الذكر من الجراد. ج. عنكبوت.

١٩٢١٩ - عنكبوت بيت المنكبوت.

١٩٢٢٠ - عقنولان
Liatris (S). *Liatride* (F).
جنس نباتات عشبية سبروتية سمرة من التفشيات ولبيلة المركبات. أنوعها عديدة مظهرها بري وبعضها ترشي. جلوجها رؤوسية كروية. سوقها بسيطة جملة. أورقاتها صفيحة الشكل متتامة. أزهارها سليلي تتجمع. يزورها قزمية القنمة || أحرف أنوعها وأشهرها ما يلي.

١٩٢٢١ - عقنولانة اليكة
Liatris elegans (S).
Liatride élégante (F).

نوع من العنقوان وهي بجلة زرقية تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أورقاتها مستطيلة التصل، خضراء الصفاة الجملة. رؤوساتها اعليبية الشكل. أزهارها أرجوانية. أزهارها يستمر من آب إلى تشرين الاول.



عنكبوت بلال



عنكبوت ذكر



عنكبوت أنثى

١٩٢٣٣ - عُنُق ، عُنُق (F). Neck (F).

عنق وعنق. ج. عنق.

١٩٢٣٤ - عُنُق (F). Encolure (F).

Neck and shoulders of a horse (F).

جزء من جسم الفرس يمتد من الراس الى الصدر والكتفين.

١٩٢٣٥ - عُنُق (F). Pétiole (F). Petiole (F).

علاقة نصل الورقة.



عقيد السديان

١٩٢٣٦ - عُنُق الحية

عنق الحية نجم نير من كوكبة حور وسيه. مركزه على عنق الحية.

١٩٢٣٧ - عُنُق القميص

عنق القميص نجم نير من كوكبة نجوم القميص الاظم.

١٩٢٣٨ - عُنُق (F). Phénix (F). Phoenix (F).

الصقار كوكبة نجوم مقبها الجنوب.



عقيد الصنوبر

١٩٢٣٩ - عُنُق مغرب هي القميص ، اطلبه.

١٩٢٤٠ - عُنُق ، عُنُق ، قاصدا مهابرة

جنس نباتات عشية حريسة من القاصديات وضيفة

القنريات الفرائشة. انواعه نحو ٢٥ مظهرها بري وبشده.

على رتبتي.

١٩٢٤١ - عُنُق (F). Beryx (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة العقيدات الشالكاك

الزواحف. انواعه المعروفة خمسة مظهرها يمار المناطق

الحارة. جميعها صغيرة القد ، اطلبية الشكل ، زائفة

الالوان الجليدية اللامعة. حيوتها كبيرة مستديرة ، زائفة

الظهيرة مسطحة شائعة ، زائفتها الشرجية نازقة || يعتبر

من الاسماك البادية البهية.

١٩٢٤٢ - عُنُق (F). Oncodes (F).

جنس حشرات من فصيلة العقيدات ودية ذوات الجناحين.

انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد

المعتلة الحرارة || اجسامها مستضيفة الشكل ، تظلم

من ال ٧ م. رؤوسها صغيرة. حيوتها كبيرة ، متناضقة

عند الشقين. قرونها الاستعمارية قصيرة ، ثنائية العمل.

مراسفها ويلاسها شديدة السفر. كوشلها شبه مكورة.

شدهاها كبيرة تلصق الارزعة. بطنها انائية الشكل.

مرزاتها صغيرة. رؤسها مستديرة. قوائمها معتلة الطول ||

تألف البرازي والمواقع الغللة. زواحفها تنطلق على بعض

انواع الناصب.

١٩٢٤٣ - عُنُق (F). Oncodidae (F).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجسامها وانواعها

المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد باستثناء

المناطق الباردة || اجسامها حبيبية القصد ، مستضيفة

الشكل. رؤوسها صغيرة حيوتها كبيرة ، متقاربة عند

الشقين. قرونها الاستعمارية ثنائية او لائحية القصص ،

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان

١٩٢٤١ - عقيد السديان ، قزقة السديان

الجفراة ، بيميكس السديان



عقيد



عقيد

اربعها نائكة . اورقها مركبة ، عابطة ، ورتبة التصنيع . وورقاتها سباعية أو تساعية العدد ، فصلها يضيئ الشكل ، ذلك الزايم الاخير ، سنن الحافة ، عاتق الحصار على صفته العليا يهته على السفلى . ازهارها متصصة متحولة للتصنيع . ثمارها جرداء حواء اللون ، ثلاثية القلق .

Grappe, Racème (F).

١٩٢٥١ - عَفْشُود

Bunch, Racem (E).

شكل ازهار بسيط غير محنود تكون فيه الزهار ذاتاار محمولة على علاقات قصيرة متساوية الطول متمركزة على محور مشترك . مثاله عَفْشُود التنب والكشش .

Uviforme (F).

١٩٢٥٢ - عَفْشُودِي

Grape-shaped (E).

نمت ترميفي يطلق على ما كان شكله كعَفْشُود التنب .

Racémeux (F).

١٩٢٥٣ - عَفْشُودِي الشَّكْل

Racemose (E).

ما كان ترتيبه أو تجميعه شبيه بالمعقود .

Enicurus (S).

١٩٢٥٤ - عَفْشُور

Enicura (F). Enicurus (E).

جنس طير من الجولام سنيات المناظير وفصيلة الليريات . انشور المعروفة نحو عشرة . اصلها منحد من الهند الى ماليزية وجاوا . تألف الغابات وصفاف مجاري الماء . قوتها الحشرات والنباتات || اجسامها رفيقة مهادا تطول من ٢٠ الى ٢٧ سم . تتميز باذنانها المستطيلة القارعة . ازوارها مائلة بالاسود الاسم اللامع والابيض الناصع || تلتذ اثمارها في الفاصح تقيها في صرور الصقور القرية من مجاري الماء . انثاها تحسن من ه الى ٧ بيضات على مرتين في الحبل . الذكور تناوب الاثان في الترخيم .

Spermophagus

١٩٢٥٥ - عَفْشُوس لاهم

sericeus (S). Spermophage soyeux (F).

Spermophagus sericeus (E).

حشرة واضحة حابية من فصيلة المندوسيات ورتبة مملدات الاجنسة . تألف المناطق التي يكثر فيها الابلاب . خنافسها تمش على ازهار النباتات المختلفة الاجناس والفصائل . يترقاتها تمش ضمن كباير الابلاب || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ سم . ثوبها الى السواد البوروي يطلو خل كثيف اذهب . رأسها مستدل الجرم . جناها صغيران . زباناها صغريان . فكها ذريان . ظهراها لا يلفظ كامل السكة الشرجية . ارسافها رباعية المعقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحبل . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في التبار . تتلف يد ظهوها بنسو ١ يوم . تمتع الممكن ميحاذيا على الكباير تتلفه مادة غروية لاصقة || البقرة عنه بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ سم . جسمها مقوس الشكل ، نودلي والرجاب ، حطلي اللون ، اغير المراج ، اسود الرأس || طور الاكامل الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينفضي ضمن صلبة تغلق عند انطلاق الحشرة الجملانة .

Aniloca (S).

١٩٢٥٦ - عَفْشُوس

Aniloca (F). Aniloca (E).

جنس دوفيات بحرية من عشريات متقاربات اصيلات وفصيلة التريوسيات . انواها المعروفة قليلة اعطائها اليسر

بعضها مهذب الاطراف . ملاسها نحيلة او ضامرة . كولسلها شبه مكورة . شيفاتها منبسطة تلحف الازنة . بطنها اثاثية الشكل . وراشها صغيرة ، خافتة || يرقاتها صغيرة ، وشمة الشكل ، مجرة يتأثير ثالثة تمكثها من الصقل على التناكب || اشهر اجنسها المعتد .

Béryclides (F).

١٩٢٤٤ - عَفْشُودِيَّات

Beryclidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزمانف ، اجنسها وانواعها عديدة موطنها مجار المناطق الحارة . جميعها صغيرة القد مأكلة تتميز بالوانها الزاوية الالوان ، بكبر عينا المستمرة . بزمانفها الظهيرة للامانة الشكل وبزمانفها الشرجية القارعة || احرف اجنسها واشهرها المعتد والسفوق والجليل والليوية .

Verge de l'âne (F).

١٩٢٤٥ - عَفْشُور

هو جردان الحار .

١٩٢٤٦ - عَفْشُورَة

انثى الباشق .

١٩٢٤٧ - عَفْشُورِيَّة

Argonauta (S). Argonauta (F). Argonaut (E).

جنس حورلات حلاية رأسية الازيل من الاغشيطيات . انواها عديدة منتشرة في جميع مجار البلاد الحارة . تتميز بالفارح الشكل التاسع الذي يند بين الذكور والاثان . ذكورها صغيرة القد اغشيطية الشكل حادة الصفة قصيرة الملاصق بامتداده الراسي المستطيل . انثاها مستدرة الشكل نصفية للثلاث الصندي التركيب الرقيق الصفة . اشهر انواعها المعروفة :

Argonauta argo (S).

عَفْشُورِيَّة الخوص

Argonauta tuberculata (S).

عَفْشُورِيَّة الخيط الهندي

Empusa (S).

١٩٢٤٨ - عَفْشُوس

Empuse (F).

جنس حشرات من فصيلة السرغيات ورتبة مستنجات الاجنسة . انواعها عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة . اخلاقتها اخلاق الشرعيف اما اشكالها فغريبة .

١٩٢٤٩ - عَفْشُوب السندايان

Oncopeltis lenio (S).

Onopeltis des chènes (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنسة . جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ سم . || ثوبا متباين الالوان بين التفتين . فهو عند الذكر اسود الرأس والكول والحبيطة ، جلوي الظهران ، اسمر البطن والقوائم . وهو عند الاثان جلوي الرأس والكول والحبيطة ، اخضر الظهران ، حطلي البطن والقوائم || رأسها مستعرض ، قليل التتو . جسمها مستدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها نحيلتان ، صغيران . كولسلها مستطيل الشكل . حبيتها كبيرة ، حمرة . ظهراها كامل الحنية ، لاصق وروشان غشائيان ، شفافان . قوائمها نسيقة ، كثيفة . اطلب الشالك || تألف اثمار السندايان والبصص اينا كانت . قوتها القس تحصد من الارواق .

Euscaphis (S).

١٩٢٥٠ - عَفْشُود

جنس نباتات معمرة من فصيلة النبئات . انواها قليلة العدد معظمها بري وبعضها زرعني . جنيتها ومجرباتها تملو من ٢٠٠ الى ٦٠٠ سم . فروصها وانثاها غليظة ،



(ذكر) (انثى)
عَفْشُور



عَفْشُور



عَفْشُور



عَفْشُوس ناعم



عَفْشُور

Analges (S).

Analgé (F). Analges (E).

جنس حشرات جلدية من الحليمان وفصيلة الجربيات .
أنواعها المعروفة قليلة المدد جميعها صغيرة الحجم ، مؤذية .
تتطفل على الكثير من الطيور أعصها الجوارح .

١٩٢٦٧ - عُنُقِيَّة هو الحاصل ، اطليه .

١٩٢٦٨ - عُنُقِيَّة أُرُوْبِيَّ هو الباتيه ، اطليه .

١٩٢٦٩ - عُنُقِيَّة Palmetta, Cordon horizontal
هي شكل من أشكال العنكبوت الاقي يستعمل الحولة لبعض
انواع الانهار للتمسك بقوة الانتفاخ رغبة منهم في الحصول
على ثمار باكرية .

Vrilin (F). Bored (E).

١٩٢٧٠ - عُنُقِيَّة نمت وصني ثباتي على شكل غاصص من الانوار ، يشبه
الحائق او السطحة .

Loranthaceae (S).

Loranthaceae (F). Loranthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات التلقين . أنواعها المعروفة زهاء
٥٠٠ تنتمي الى سبطين : سبط الحاصلات الذي يتميز
بازهاره الوردية الشق . وسبط البقيات الخشري الانهار .
جميع نباتاتها طفيلية تركب فروع واصفا الاثمار للغلبة
فيها مرافقها وتعيش على ما تنصه من التسع . سفيها
مدادة طفلة . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، يضيء النصل
الجلائي التسج . ثمارها صنية دقيقة الصعير .

Staphylin (S). Staphylin (F).

١٩٢٧٢ - عُنُقِيَّة
النسبة جميعها آفة . جنس جنات برية زرواعية تزينة
من فصيلة المعينات . انواعها عديدة . اوراقها مركبة متعاقبة
مائلة ، ازهارها عقدية او حشكية التجميع طويلة الزناد .
ثمارها جرد كروية الشكل ، يزودها صنية صغيرة جامدة .
يستخرج منها زيت للذئ الطعم مأكول || أشهر انواعها
سما يتبع .

١٩٢٧٣ - عُنُقِيَّة الصين Staphylin holocarpa (S).
Staphylin de Chine, S. à capsule antère (F).

شجرة جامدة ، تلوم من ٥ الى ٧ متر . اوراقها مركبة
ثلاثية . ورققاتها اعليجية النصل ، تفلوم من ٦ الى ٩ سم .
ازهارها عقدية متدلية يضاء اللون . ثمارها جرد اعليجية
الشكل مقنطرة الطرف || ازهارها يستمر طوال شهر
ايار .

١٩٢٧٤ - عُنُقِيَّة اليابان Staphylin bumida (S).
Staphylin du japon (F).

شجرة سبروتية تلوم نحو ٢٠٠ سم . اوراقها مركبة
ثلاثية ، ورققاتها اعليجية النصل ، مسنة الحافة ،
حشكية الاسنان . ازهارها عقدية التجميع متدلية .
ثمارها جرد ثنائية الفلج المتعاقبة || ازهارها يستمر طوال
شهر حزيران .

١٩٢٧٥ - عُنُقِيَّة يُونْتَنَد Staphylin bolanderi (S).
Staphylin de Bolander (F).

شجرة سبروتية تلوم من ٣٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها
مركبة ثلاثية . ورققاتها يضيئة النصل ذلقة الزام الاخير ،
تفلوم نحو ٦٥ سم . ازهارها عقدية ، متدلية ، وردية
اللون ، خضراء النصل . ثمارها جرد متساوية الطرف
والعرض || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة لثة اعليجية الشكل
تفلوم من ٥ الى ١٢ مم . اجسامها مجعزة بصفة ماسة ||
تتطفل على الاسماك تختصق بها ولا تقاربها .

Collaire (F).

Pertaining of the neck (E).

١٩٢٥٧ - عُنُقِيَّة نمت لتريني يطلع على كل ما له صلة بالمشق .

Cervical

١٩٢٥٨ - عُنُقِيَّة

Araignée (F). Spider (E).

١٩٢٥٩ - عُنُقِيَّة
جنس دويبات من رتبة العناكب او الرتيلاوات . انواعها
عديدة متباينة الاجسام والاساجيم والاشكال والالوان .
ذكر العنكبوت يضيء عنكب والاني عنكب . ومن اسمائه
العنكبوت والمعنكب والمعنك . ج عناكب وعنكبوتات وعناكب .
وقد جاء ليدفع الزيان :

وهي ان بيت العنكبوت يبيع

رفيع اذا لم تقص فيه الحوائج

١٩٢٦٠ - عُنُقِيَّة المنازل * فُدَس

Tegenaria domestica, T. parietalis (S). Tégénarie,
Araignée domestique (F). House-spider (E).
Winklespinne (D).

نوع من العنكبوت المبلول بكثرة في المنازل الالة والحربة
طوله نحو ٩ سم . ثوبه الى الحولة الخشبية . يله الى اليافس
تعلو زراكل مابطة السرة . شمه لقي الارتكاز ينسجه
في الزوايا .

١٩٢٦١ - عُنُقِيَّة يَبِي

Araignée labyrinth (F).

١٩٢٦٢ - عُنُقِيَّة سَلَطَمُونِي

Araignée crabe (F).

١٩٢٦٣ - عُنُقِيَّة

Arachnida (S).

Arachnida (F). Arachnida (E).

صف حيوانات صغيرة دابة يشمل العناكب والقنارب
والقمل والقراد ، الخ .

Adenostyles (F).

Adénostyle (F).

١٩٢٦٤ - عُنُقِيَّة
جنس نباتات عشبية معمرة من سهل النفثيات فضيلة
المركبات . انواعها عديدة معظمها بري ويضيء زراعي ،
تتميز بها كبر الكبرية الحجم . سفيها تلوم من ٦٠ الى
١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة ، متعاقبة ، نصالها قليلة الشكل ،
فضفاضة الصنفرة ، خلية البشرة . ازهارها عديدة الروبيسات ،
وردية اللون . بلومها صغيرة لثة ، وتدنية الشكل ، قنطرة
القنسة .

Inachus (S).

Inachus (F). Inachus (E).

١٩٢٦٥ - عُنُقِيَّة
جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارابل
قصار القليل فضيلة الامجايات . انواعها المعروفة قليلة العدد
اسطها يحار البلاد المعتدلة الحرارة والمتعرق نحو الباردة ||
اشكالها كشكل بعض العناكب . دروعها محرمة ثمانية
التشديد ، كيفة الحلب البقيق . ثمارها مثقوبة قصيرة .
ارجلها مستطيلة . ملاطها ضليمة . اوائها الى السرة
المختلفة المايات .



عنكبوت المنازل



عنكب



عنب

بحري السفلى ، عتاقها نحاسية صغيرة اللد || ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٧٨ - عُنْبِيَّة مَبْدَلَة

Parthenocissus vitacea (S). *Parthénocissée commune*, *Vigne vierge commune* (F).

جنبة عارضة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م . سرورها الحولية خضراء اللون . اوراقها نحاسية الوريقات . نصلها سنانية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٧ . عتاقها خجورية الارتفاع ، متقابلة مع الاوراق . ازهرارها مفترية . حبا اسود اللون ، ازرق المواج . ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٧٩ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Parthenocissus quinquefolia (S). *Parthénocissée grimpance*, *Vigne vierge grimpance* (F).

جنبة عارضة مسلسلة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م . سرورها الحولية خضراء اللون . اوراقها باعثة الخضار ، خلة البشرة على سطحها . سوارقها ثنائية السط ، سداسية او سداسية الخيوط المحضة . عتاقها طرفية كبيرة اللد || ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

١٩٨٠ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Crotophaga (S). *Ani* (F). جنس طير من المتسلقات وفضيلة التفويجات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها يحد من امريكا الاستوائية الى الوسطي || ملجئها الحياتي جاعي اسرابها متفارقة العدد . تألف النابات والحياتي وتقرب من الأماكن المأهولة ولا يبتعد عن طعام البقر لانها تنظفها من دوي القرد والطح والتمر وغيرها من الحشرات الجلدية || قوتها جميع انواع الحشرات العذبة والحلينة . تتميز بخلقة المتفاد الذي لا يقل طوله عن طول الرأس . اجنحتها معتدلة الحجم . اذنانها مسطلة . ويضا له التجعب . اوضاعها نشطة . اصابعها قوية صمحت الاطراف || وين ميزانها ان الاثا تفرخ البيض في حاضن كبيرة تقيمه بالاشتراك مع الذكر في اعمالي الانجاب الناجمة . تاري من ٥ الى ١٥ اثنى || اهرف انواعه واشهرها النومان التالي :

١٩٨١ - عُنْبِيَّة السَّامِيب * عُنْبِيَّة صَغِير

Crotophaga minor (S). *Ani des savanes* (F).

نوع من النيس قريب اليه بالطقس باستثناء المتفاد . موطنه امريكا الاستوائية . جسمه يطول نحو ٣٧ سم . وبسطه نحو ٥٠ سم . نويه الى الزرق العابقة البنفسجية المواج . متفاد وزقه وقامتاه الى السواد القاتم . حلقه حية شهيد اللون || سره كبير العدد . قوته الحشرات .

١٩٨٢ - عُنْبِيَّة الشُّورِي * عُنْبِيَّة كَبِير

Crotophaga major (S). *Ani des paléoviens* (F).

نوع من النيس كبير اللد موطنه امريكا الوسطي . جسمه يطول نحو ٥٠ سم . بسطه نحو ٦٠ سم . نويه الى الزرق العابقة . صدره اخضر المواج . ذليه بنفسجي . متفاد وزقه وقامتاه الى السرة السوداء . حلقه عية صفراء اللون || قوته الحشرات وبطي الثار اليانة .

١٩٨٣ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Enicocissus (S). *Enicocissée* (F).

جنس دوبيات بحرية من اللحيات وفضيلة النسيبات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مجار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها دوبيية الشكل ، سلسة التركيب

Staphylea colchica (S). *Staphylée de Colchide* (F).

جنبة سبروتية تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية او نحاسية الوريقات . نصلها يضي الشكل ، ماس الصفة ، جميل الخضار . ازهرارها عتقودية ، منتصب ، يفضاء اللون . ثمارها خضراء مسطلة || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

١٩٨٤ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Staphylea pinnata (S). *Staphylée penné*, *Patanotrier*, *Faux platanchier*, *Nex coq* (F). *Common bladder nut*, *Anthony nut* (E). *Echte Pimpernuss* (D). *Staphlodendro*, *Nesotagilano*, *Fussaria*, *Falso platanchio*, *Noce di St. Antonio* (I).

شجرة سبروتية مبدولة تملو من ١٥٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها مركبة نحاسية او سداسية الوريقات . نصلها يضي الشكل ، ضيق الزام الاخير ، سنن الحافة ، يطول نحو ١٣ سم . ويعرض ٥ . ازهرارها عتقودية ، منتصب ، يفضاء اللون . ثمارها خضراء مسطلة الطول والعرض || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٩٨٥ - عُنْبِيَّة كَلْبِيَّة ، عُنْبِيَّة امْرِيكِيَّة

Staphylea trifolia (S). *Staphylée d'Amérique* (F). شجرة جادسة ، تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية . وريقاتها اعليجية النصل المستدير القاطعة ، للمشاري المغلة || ازهرارها عتقودية التجميع ، قصيرة اللد ، يفضاء اللون . ثمارها خضراء كروية مسطلة . ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار .

١٩٨٦ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Staphylea trifolia (S). *Staphylée d'Amérique* (F). فضيلة نباتية من ذوات الفلتيين حليمة المتالات . اجنحتها وانواعها كثيرة العدد قريبة للشي من السبنتيات . ازهرارها خلية الاجزاء . ثمارها حية . يزورها نية الشكل صغرية . اشهر اجناتها ثلاثة : النمة والعتقوت والمملنان .

١٩٨٧ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Parthenocissus (S). *Parthénocissée* (F). حرة من الجفنة العلاء . انواعها المعروفة ثمانية . جميعها جنبت سبروتية عارضة . اوراقها كلفة ثلاثية او نحاسية التجميع الاسمي . تتميز بموطنها الحسية الاطراف وبارزها لعدم الحواطي || الواسلة منها عنية . اشهرها ما يتبع .

١٩٨٨ - عُنْبِيَّة اليابان

Parthenocissus tricuspidata (S). *Parthénocissée du Japon*, *Vigne vierge du Japon* (F).

جنبة عارضة معمرة تطول من ٥ الى ١٠ اطار . اوراقها كلفة عادية التجميع ، تطول نحو ١٥ سم . نصلها يضي الصفة البلبا للالسة اللامعة ، اثير السفلى العملية البارزة المرقق ثم ينحرف الى الحرة التي تمة في الحريف . ازهرارها مفترية . عتاقها كبيرة اللد ، كثيرة الحب || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٨٩ - عُنْبِيَّة مَسَلَّة

Parthenocissus himalayana (S). *Parthénocissée de l'Himalaya*, *Vigne vierge de l'Himalaya* (F).


جنبة عارضة معمرة تطول من ٣ الى ٦ اطار . وريقاتها ثلاثية اعليجية . الوسطي منها تطول نحو ١٢ سم . نصلها مدبب القمة ، بارز المرقق ، جزوي الصفة العليا ،



عُنْبِيَّة



عُنْبِيَّة الشُّورِي



عُنْبِيَّة

Echter Brandschopf, Hahnenkamm (D). Sclamito cressa di gallo, Fior di velluto (I).
حَبَسَة سَبْرُوْتِيَّة تَعْلَمُ مِنْ ٤٠ إِلَى ٦٠ سَم. أَوْرَاقُهَا كَبِيرَةٌ لَقَدْ أَحْلِيْلِيَّةِي الشَّكْل. نَصْلُهَا تَصْنَعُ الصَّفْحَةَ ، غَالِثُ الْبُرُوقِ ، خَلِي الْبَشِيرَةِ ، يَجْلِسُ الْخُضْرَاءُ الْهَادِي . سَبَلُهَا الْزَهْرِيَّةُ خَلِيَّةُ الْمَسِّ ، لَا قِيَاسِيَّةَ الشَّكْلِ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِإِنْخِلَاطِ الْأَصْرَامِ ، يَكْثُرُ فِيهَا الْهَرَبِيُّ وَصُورُ الْبَقْلِ وَالْبَيْتُكُورِيِّ . أَنْزَعَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرِيَّانَ إِلَى آبِ .

Colonia argentea (S). **حَبَسَة لَهْبِيَّة** *
Cálisis argentea (F).
حَبَسَة سَبْرُوْتِيَّة هَرَبِيَّة الشَّكْلِ تَعْلَمُ مِنْ ٤٠ إِلَى ٥٠ سَم. سَلَقُهَا مَرَامَةٌ مَشْعِيَّةٌ . أَوْرَاقُهَا خَفِيفَةُ الْكَمَلِ ، خَلِيَّةُ الْبَشِيرَةِ . أَنْزَعَارُهَا يَضَاهِي الْكَلْبَ ، سَبَلُهَا التَّجْمِيعُ ، غُرُوبِيَّةُ الشَّكْلِ . سَبَلُهَا تَطُولُ نَحْوَ ٨ سَم. ٥ أَنْزَعَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرِيَّانَ إِلَى آبِ .

Aoûtment (F). Ripening (E). **حَبَسُون**
غَايَةُ نَمُوِّ الْقَتْنِيَّاتِ فِي الْكَرَمِ وَالْأَشْجَارِ .



حَبَسَة خَلِيَّة

١٩٢٩٩ - **عَوَّار** ، **وَأَحْيَا الشَّجَاه**
le Bouvier (F). Boctes, the Hardman (E).
الْعَوَّارُ وَالْبَشَارُ وَرَاسِي الشَّجَاهِ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ لَكَرْكِيَّةٍ شَبَالِيَّةٍ تَقَعُ بِالْقَرْبِ مِنَ الْقَنْبِ . مَرْكَزُهَا بَيْنَ الْعُلْوِ وَالْقِسْبَانِ . حُدُودُهَا اثْنَانِ وَخَمْسُونَ فِي الصُّورَةِ وَوَاحِدٌ خَارِجِيًّا . وَهِيَ صُورَةُ رَجُلٍ يَدُهُ الْيَمَانِيَّةُ مَصَا ٥ وَتَقْسِمُ الْغُرْبُ التَّجْمِيعُ الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ ٥ الْفَرْطُوسِ . ٥ وَالَّذِي عَلَى الْمَتَكَيْنِ ٥ مَصَا الْقِسْبَانِ . ٥ وَالَّذِي عَلَى يَدِهِ الْيَمَانِيَّةِ وَعَلَى السَّاعِدِ مِنْ هَذِهِ الْيَدِ وَمَا حَوْلَ الْيَدِ مِنَ الْأَيْمَنِ ٥ أَوْلَادُ الْقِسْبَانِ . ٥ وَهَكَذَا أَيْضًا ٥ الْإِزَارُ ٥ وَوَرَقُ الْإِزَارِ ٥ أَوْهَ الْخُزُرُ . ٥ وَالْخَارِجُ فِي الصُّورَةِ تَحْتِ أَحْمَرٍ نَبْزٍ بَيْنَ لَفْظِيَّةِ يَدِي ٥ وَالسَّابِقُ الرَّاسِ ٥ . وَالسَّابِقُ يَحْسِي مَرْدُودًا حَاسِبًا السَّيَاءَ وَحَاسِبًا الشَّيْءَ لِأَنَّهُ يَرَى أَبَدًا فِي السَّيَاءِ لَا يَلْبِثُ تَحْتَ شُعَاعِ الشَّمْسِ ٥ وَالْعَوَّارُ أَيْضًا مَثَلُ مَنْ مَنَازِلُ الْقَمَرِ الشَّامِيَّةِ يَنْزِلُهَا الْقَمَرُ فِي الْيَلَةِ الثَّالِثَةِ حَشْرَةً . وَفِيهِ الْعَوَّارُ يَدْمَى فَرْعَ الْدَلْوِ الْمَخْضَرِ .

١٩٣٠٠ - **عَوَّار** ، **فَيْسَاح** ، **وَقَوْعَة**
Jappement (F). **وَقَوْعَة**
Yeipung (E).
صَوْتُ الْكَلْبِ وَالْقَلْبِ وَمَا أَشَبَّهَ .

١٩٣٠١ - **عَوَّار** ، **هِي الرَّاكُوسُ لَسَدُ قَسَمِي الْبَلِيرِ**
Conduits génitaux (F). **هَوَّارُ تَنْسَلِيَّة**
Genital ducts (E).
هِيَ الْمَسَالِكُ التَّنْسَلِيَّةُ فِي الْحَيَوَانِ .

١٩٣٠٢ - **عَوَّار** ، **مَعْلُوم**
Avaries (F). **مَعْلُوم**
Damage, Average (E).
الْمَوَارِيثُ تَقْدِيرُهَا تَكُونُ عَاصِيَّةً وَبَشِيرَةً وَمَشْرُوكَةً وَرَوَادُهَا مَعْلُومٌ بِبَعْضِ الْبَشَائِعِ أَثْنَاءَ تَقْلِيلِهَا بِمَرٍّ أَوْ بَرًّا .

١٩٣٠٤ - **عَوَّار** ، **عَوَّارِي**
الْبُورُ وَالْمَوَارِي : جَبْرَةٌ يَنْطَلِقُ جَبْرُوتُهَا قَتْلُهَا ثُمَّ تَبْسُ ثُمَّ تَلْدِي ثُمَّ تَحْمِلُ إِلَى الْأَجْيَةِ إِلَى مَكَّةَ خُبْرًا وَجَسَدًا سَبَا غَالِقًا (الْهَادِي) .

١٩٣٠٥ - **عَوَّار** ، **هِيَ سَمَاءَةُ الْعَرَبِ** ، **أَطْلُهَا** .



حَبَسَة خَلِيَّة

سَمَطِيَّةٌ ، وَرُوسُهَا صَنِيعَةٌ ، خَاسِيَةُ الْوَرَسِ الْبَقِيَّةِ .
أَوْرَاقُهَا تَصْنَعُ الْإِلَافَ الْبَيْدَ ٥ أَشْهُرُ أَوْرَاقُهَا مَتِينَةٌ الْمِطْلُ الْمَتِينُ الَّذِي يَنْجَلِ طَوْلًا نَحْوَ ١٥٠ سَم. وَصَرَفُهَا ٣ سَم. ثُمَّ عَتِيَّةُ الْمَتِينِ الَّذِي يَنْجَلِ طَوْلًا نَحْوَ ١٥٠ سَم. وَصَرَفُهَا ٣ سَم. ثُمَّ التَّحْسِينَةُ الْبَشِيرَةُ الَّتِي يَكْثُرُ جَبْرُوتُهَا فِي الْبَحْرِ الْبَاسِطِ الْمَتِينِ وَهِيَ لَا يَنْجَلِ طَوْلًا نَحْوَ ٦٠ سَم. وَصَرَفُهَا ٢٥ سَم. ٥

١٩٢٩٩ - **عَبَسِيَّة** *
Psyche (S).
Psyché (F). Psycho (E).
يَجْلِسُ حَيَوَانَاتُ بَحْرِيَّةٌ مِنَ الرُّغُوبِيَّاتِ تَجْمَعُ الْإِبْرِيلَ وَفَصِيلَةُ الْأَوْرُوبِيَّاتِ . أَوْرَاقُهَا الْمَعْرُوفَةُ ثَلَاثَةُ أَطْلُهَا مَطْمُ الْمَنَاطِقِ الشَّامِيَّةِ مِنَ الْمِطْلِ الْأَطْلِيِّ . أَسْرَابُهَا شَدِيدَةُ الْكَثَافَةِ وَفَارَةُ الْبَدَدِ ٥ أَصْدَافُهَا خَشَائِصٌ ، شَقَائِقُهَا ، جَرَابِيَّةُ الشَّكْلِ ، مَدْبِيَّةُ الْإِقْطَابِ ، مَقْصَاوِيَّةُ الْمَصَارِيحِ ، مَحْدَلَةُ التَّبْطِيطِ . أَجْسَامُهَا صَغِيرَةٌ ، تَنْبِيَةُ الْكَلْبِ . زَمَانَتُهَا أَقْفِيَّةُ الْإِشْتَابِ ، مَهَابَةٌ رَاقِيَّةُ السُّطُوحِ الْمَسْطِيَّةِ ، مَقْطُوبَةُ الْأَطْرَافِ ، مَهَابَةٌ الْخِتَارِ .

١٩٢٩٠ - **عَبَسِيَّات** *
Eunicidae (S).
Eunicidae (F). Eunicidae (E).
فَصِيلَةُ دَوَابِّ بَحْرِيَّةٌ مِنَ الْخَلْقِيَّاتِ كَثَائِفُهَا أَوْ الْجَوَاكِلِ . أَجْسَامُهَا وَأَوْرَاقُهَا الْمَعْرُوفَةُ كَثِيرَةٌ الْمَدَدُ مَشْتَرِكَةٌ فِي جَمِيعِ بَحَارِ الْعَالَمِ ٥ أَجْسَامُهَا حَلَقِيَّةٌ مَرْكَبَةٌ يَكْثُرُ فِيهَا التَّبْطِيطُ ، تَعْلَمُ مِنْ ٧ سَم. إِلَى ١٥٠ سَم. ٥ أَشْهُرُ أَجْسَامُهَا الْمَتِينِ .

١٩٢٩١ - **عَبَسِيَّة** ، **هِيَ الرَّجَلِيَّة** ، **أَطْلُهَا** .
١٩٢٩٢ - **عَبَسُون** *
Uniola (S). Uniola (F).
جَنْسُ نَبَاتَاتٍ مَشْعِيَّةٌ ، بَرِيَّةٌ ، مَرْعَوِيَّةٌ ، حَوْلِيَّةٌ أَوْ مَعْرَةِ مِنْ فَصِيلَةِ التَّجْلِيَّاتِ . أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ سِتَّةٌ ، ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَسْبُوعِيَّةٌ مَتِينَةٌ مِنْ إِبْرَانٍ إِلَى الْخَمْدِ فَالْصَّيْنِ . وَثَلَاثَةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ مَتِينَةٌ مِنْ إِبْرَانٍ إِلَى الْمَكْسِيكِ ٥ جَمِيعُهَا مَرْعَوِيَّةٌ شَكْلُهَا قَرِيبُ الشَّجَرِ بِالْمَكْرُوشِ .

١٩٢٩٣ - **هَيْدَان**
Caution, Garantie (F).
Security, Garantie (E).
هِيَ الْكَفَالَةُ أَوْ الْضَمَانَةُ الَّتِي تَقْدَمُ تَقْلِيلًا لَلْتَمِيدِ .

١٩٢٩٤ - **حَبَسَة**
Colonia (S). Cálisis (F).
جَنْسُ نَبَاتَاتٍ مَشْعِيَّةٌ حَوْلِيَّةٌ تَرْبِيَّتِيَّةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْفَلْطِيَّاتِ . أَنْوَاعُهَا قَلِيلَةٌ ، أَطْلُهَا الْبِلَادُ الْخَمْسَاءُ . أَوْرَاقُهَا مَعْتَقَةٌ مَتَاعِيَّةٌ ، أَنْزَعَارُهَا سَبَلِيَّةُ التَّجْمِيعِ ، لَبْدَةٌ ، مَرَامَةٌ ، لَا قِيَاسِيَّةَ الشَّكْلِ ٥ أَحْرَفُ أَنْوَاعُهَا وَأَحْيَا مَالِي .

١٩٢٩٥ - **حَبَسَة جَوَّار** ، **حَبَسَة هَوَّار**
Cálisis huttoni (S). Cálisis, de Java, C. de Hutton (F).
حَبَسَة سَبْرُوْتِيَّة تَعْلَمُ مِنْ ٣٠ إِلَى ٤٠ سَم. أَوْرَاقُهَا يَضَاهِي ذَلْفَةً ، نَصْلُهَا أَحْمَرُ الْكَلْبِ يَنْجَلِ مَرَامٌ لَزُوقٍ . سَبَلُهَا الْزَهْرِيَّةُ أَسْطُورِيَّةُ الشَّكْلِ لَبْدَةٌ . أَنْزَعَارُهَا حَرُّ الْقِتَاعَةِ ، يَبْسُ الْأَطْرَافِ ٥ أَنْزَعَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرِيَّانَ إِلَى آبِ .

١٩٢٩٦ - **حَبَسَة خَمْسِيَّة** * ، **عَوَّارُ الدِّيَلِك** ، **جَلَّ**
Colonia cristata (S).
Cálisis crête de coq, Crête de coq, Passe-va-lours (F). Cock's comb, Coxcomb, Woolflower (E).
جَلَّ

تميش حل الرمال فيها . قوتها الحويطات والخشرات والنباتات . تتميز بسرعة الانتقال والانتفاخ في الرمل || أشهر أجناسها الموير والجلبسيم .

١٩٣٢١ - عَوَلَك السِنْدِيَان * ، عَوَلَك شَرِيف *

Anthaxia nobilis (S). *Anthaxie noble*, *Anthaxie des chènes* (F). *Anthaxia nobilis* (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة التزنبقيات ورتبة سمندلات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . تألف جميع المواقع التي تكثر فيها الانجار . غناصها تميش حل يتلاصق الاطراف وعلى الاوراق الفتية . يرقاتها تسردب لحاء الافناد شكرها || جسمها صغير القليل من ٩ الى ١٥ م. قوتها الى الخضار الاسفج الجليل . الاثى اصفر قدأ من الذكر وتسمين باحمار الكوسل الذي تقطعه في وسطه من الرأس الى الجناحة عدة شعراء عابقة . رأسها مستدل الجرم يفرز بمطمة تحت الكوسل . عينها كيرتان . زباناها خيطيان . غذاءها قليتا التميز . ارساغها جاملتا القشار الصلب الذي لا يخترقه الدويون . ارساغها خماسية المقل || جيلها الحولي واحد . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتبقى حتى اواسط تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها التام تطول نحو ٢٥ م. جسمها سمكي التركيب ، مستطيل المقدم ، مستطيل المؤخر ، ثني الين ، كسني الرأس والشرج ، ضليح التأثير الفكي . وهي مرقالة تحمل عند مؤخر سكتها الحادية عشرة زائلة قرنية منشعبة الى شطرين || طور الاكمال الذي ينتهي في آخر نلق تحفره البرقة ، يستمر نحو ١٥ يوما .

١٩٣٢٢ - عَوَلَك لَمَاع * ، عَوَلَك نِيدُلَا * *Anthaxia nitidula* (S).

Anthaxie luisante (F). *Anthaxia nitidula* (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة التزنبقيات ورتبة سمندلات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . تألف الجبال والحدائق والبراري . غناصها تميش حل اوراق نباتات الفصيلة الوردية . يرقاتها تسردب افناد واغصان الانجار الفصيلة ذاتها كانتفاح والاباص والمشمش والخوخ والزعرور والقوز والورد والشرين || جسمها صغير القليل من ٥ الى ٧ م. قوتها اغضر الظفران ناري الكوسل والرأس ، اسمر البطن والجرايز والزياني . رأسها صغير الجرم يفرز بمطمة تحت الكوسل . عينها كيرتان . زباناها خيطيان || غلوانها ذلق المؤخر اللاصق المستدير الطرف غذاءها متباينة التميز . اللقيق . ارساغها خماسية المقل || الاثى اصفر قدأ من الذكر واجبت قوتها منة تقصر زبانا || لها جيل واحد في الحيل . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اوائل تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || تترك البرقة لكامل المجموعي في اواخر شهر كانون الاول . فيصبح طويلا عند ذاك نحو ١٢ م. جسمها متناح الحيد . مستطيل المقدم ، كامن المؤخر المستطيل ، اغبر الين ، اسمر الرأس والشرج . وهي مرقالة تحمل عند مؤخر سكتها الحادية عشرة زائلة قرنية جيزة فائقة الطول || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوما وينتهي فسن صليجة خاوية النشاء .

١٩٣٢٣ - عُرُود أَحْمَر *Armérie* (F).

هو البيفكان ، اطلية .

١٩٣٠٦ - عَوَارِض جَوِّيَّة

Perturbations atmosphériques (S). *Atmospherical perturbations* (E).

اضطراب سير الحوادث الطبيعية الجوية بسبب بعض العوامل الطارئة الخلة .

١٩٣٠٧ - عَوَالِيب

هي العنايات ، الحويطات التي تميش حل المشب .

١٩٣٠٨ - عَوَاشِر

المواشر : قوائم وريش الطائر وكذلك الاعشار .

١٩٣٠٩ - عَوَامِة *Flotteur* (F). *Water-gauge* (E).

اسطوانة صغيرة من خشب السنديان توضع على المياه الجارية لقياس سرعتها نصيبها .

١٩٣١٠ - عَوَامِل التَغْذِيَّة

Facteurs trophiques (F). *Trophic factors* (E).

١٩٣١١ - عَوَامِل تَنْوِيعِيَّة

Facteurs ecologiques (F). *Ecological factors* (E).

١٩٣١٢ - عَوَامِل جَوِّيَّة ، عَوَامِل مَتَابِيَّة

Facteurs climatiques (F). *Climatic factors* (E).

١٩٣١٣ - عَوَامِل مَلَكَة

Facteurs inhibiteurs (F). *Inhibitory factors* (E).

١٩٣١٤ - عَوَامِل مُحَدِّدَة

Facteurs limitateurs (F). *Limiting factors* (E).

١٩٣١٥ - عَوَالَة * ، سَمْتَسُوس *

Sminthus (S). *Sminthe* (F).

جنس حيوئات لبونة قافسة من فصيلة البريوميات . اولدها عديدة ، موطنها البلاد الاسوية والاروبية جميعها صغيرة . القند تطول من ٦ الى ٨ سم . واذناتها كذلك . اوقيا الى الكمية تسمر وتبقى مع اقترابها على ثيج الظفر وتصف وتبيض عند البطن . اذناها حشرقية اطوالها تمد من ١٤٥ الى ١٧٥ . قوتها الاحشاب والجذور .

١٩٣١٦ - عَوَالِدَة

Sous-produits (F).

By-products (E).

هي المواد الثانوية الممكن استعمالها او استخلاصها بعد تصنيع المواد الرئيسية . مفرها عائله .

١٩٣١٧ - عَوَالِد

العوائل اربعة كواكب في وسطها كوكب يدعى الريح . والعوائل تنتمي الى كوكبة الثنين .

١٩٣١٨ - عَوِيَّة

هي الافرنجية ، شجرة من السروبيات ، اطلية .

١٩٣١٩ - عَوَير

جرو القهد لا يزال برقة امه .

١٩٣٢٠ - عَوِيرِيَّات

Ocypodidae (S). *Ocypodidés* (F). *Ocypodidae* (E).

فصيلة دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ، قصيرات الليل ، لامسوايات للالاح || اجناسها وانواعها الحرة متوسطة البد . اصحابها شطوط بحار البلاد الحارة .



عَوَانَة



عَوَلَك السِنْدِيَان



عَوَلَك لَمَاع

Wurz (D). Acoro, A. vero, Canna odorifera, Calam aromatico (I).

نبات عشبي جنموري معمر من فصيلة القنطاريات. جذاميره مدادة. ذكوة الرائحة تستعمل في الطب وتدخل في تحضير بعض الطيوب. أوراقها صفية الشكل جامدة التصل متصصة. شراخه ينتهي بضمه من الإزهار الخشوية. وهو من نباتات السطور القديمة التي ورد ذكرها في التوراة. يستعمل في معالجة الرمد والقرات الصخرية. ويقال إن جلوره مقوية للأعصاب.

١٩٣٥ - عَوْدَلْ ، مَيْلَلْ

Métamère (F). Metamere, Somite (E).

تمت تعريفه يطلق على بعض أعضاء الجسم المتساوية المتتابعة كما هي الحال في سحج المفصليات.

١٩٣٦ - عَوْدَكَة ، مَيْلَلَة

Métamérie (F). Metamery (E).

صفة الأعضاء أو الأجزاء المتعددة.

١٩٣٧ - عَوْرَوْرْ هو إلقاء البري ، أطلبه .

١٩٣٨ - عَوْرْ

Carance (F). Deficiency (E).

شاقة أو عارضه بسبب نقص في تمثيل عنصر غذائي تقتصر إليه التربة أو يفترق إليه مظهر الحيوان.

١٩٣٩ - عَوْصَجْ ، حَلِيقْ ، بَاقْشْ ، حَوَكْلْ

Rubus (S). Ronce (F). Bramble (E).

جس نباتات دظلية برية وزراعية من سبط الوردليات وفصيلة الورديات. أولوه زهاء ٣٠٠ مشتركة في جميع أصقاع العالم. مظهرها بري وبهشاش زرامي. ثمارها مجاميل مأكولة تسمى «المقنع» وله تربوب أو يستخرج منها بهه التحضير وتظهر تقاديد كحولية لليلة العلم. لشور أولوله ما يتبع.

١٩٤٠ - عَوْصَجْ آخَرُ الْهَبْ

Rubus phanicolatus (S). Ronce à poils rouges (F).

نبات دخل معمر ازنب الماء، أحسن الشوك. ساقه قرمراء تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه ثلاثية التخصيص، بفسية الشكل، خلية البشرة || أنزواره متعدي التجميع، ليد الإزهار الوردية اللون. ثماره لذيذة الطعم والمعرف بتقالية اللون.

١٩٤١ - عَوْصَجْ أَسْوَدْ

Bourgane (F).

هو لثيق الأسود ، أطلبه .

١٩٤٢ - عَوْصَجْ أَصْفَرْ

Rubus xanthocarpus (S). Ronce jaune (F).

نبات دخل سبروتي معمر أحسن الشوك. ساقه قرمراء مدادة. أوراقه مركبة ثلاثية الورديات للسنة الحارة. أنزواره نورية التجميع ، بيشاء اللون. ثماره سكرية الطعم عادمة العرف ، صفراء اللون.

١٩٤٣ - عَوْصَجْ الشَّكَلْ

Rubus occidentalis (S). Ronce d'Occident (F).

نبات دخل معمر أحسن الشوك. ساقه قرمراء مستطيلة السروع تملو نحو ٣٠٠ سم. أوراقه مركبة ثلاثية أو خمسية الورديات. نصلها من الحافة ، أخضر الصفعة العليا ، احمل السفلى الحولية البشرة || أنزواره نوري التجميع . أنزواره مستطيلة الأمن ، بيشاء اللون. ثماره ال السوداء اللامع .



عود الأنبياء



عود الحية



عود الرج

١٩٣٤ - عَوْدُ الْأَنْبِيَاء * ، هَبَاكْ مَحْزَنْزِي

Guslacum officinale (S). Galac officinal, Bois de galac (F). Official guslacum gum tree, Lignum-vitse (E). Guajakbaum, Pockholzbaum (D). Guslaco officinale, Galsomino, Legno santo (I).

نوع من التياك وهو شجرة متوسطة القد من فصيلة القنطاريات. أصلها البلاد الأمريكية. أوراقها مركبة متقابلة. وريقاتها أبيضه ، شفعية ، بفسية التصل الجامدة الصفعة، المايق الخشاش . أنزواره أبطية الارتكاز ، نورية التجميع ، زرقاء اللون . ثمارها جلدية اللب . بزورها صفراء اللون ، دهنية اللباب || خشبها نام الزرقعة ، شديد الصلابة ، قليل الوزن ، فاعصر الصنف وله يستخرج منه بالتقشير مادة راتنجية ، ورائحتها رائحة اللوز المر ، تستعمل في عدة مستحضرات طبية أعصها علاجات السفلس .

١٩٣٥ - عَوْدُ الْبَرَقْ هو القنطيل ، أطلبه .

١٩٣٦ - هَوْدُ الْحَبَّةِ *

Ophioxylon serpentium (S). Ophioxyle, Ophioxylon, Serpentina (F). Serpentina, Serpent wood (E). Mardervurzel, Schlangenholz (D). Serpentina, Legno serpentino (I).

جنية برية من فصيلة الفطريات نباتها الهند . ساقها قرمراء. أوراقها أبيضه ، متقابلة ، اهليلجية التصل ، معققة . أنزواره نورية التجميع ، تاجية الارتكاز || يستخرج من جذبها ويجلوها عصارة مضادة لم ألهات ويصالح التئال .

١٩٣٧ - عَوْدُ الْفَيْفَرِ

هو الزايرين اللبناني وهو يشبه اللبيق . أطلبها .

١٩٣٨ - عَوْدُ الرِيحْ هو البرباريس ، أطلبه .

١٩٣٩ - عَوْدُ الصَلْبِ هو القنطاريات ، أطلبه .

١٩٣٠ - عَوْدُ الطَّيْبِ هو الأندروج ، أطلبه .

١٩٣١ - عَوْدُ الْقَرَحْ

Anascyle pyrethra (F).

هو الماقر قرمراء ، أطلبه .

١٩٣٢ - عَوْدُ الْمَاءِ هو صفصان الماء ، أطلبه .

١٩٣٣ - عَوْدُ التَّيْ ، عَوْدُ هِنْدِي ، أَغْلَاغُونْ

Excoecaria agallocha (S). Agalloche, Arbre aveuglant, Bois d'Alots, Bois de Calambac (F). Agallochum, Indian aloe tree, Calambac tree (E). Agallocha, Alderholzbaum (D). Agallocha, Calambuco, Falambo (I).

شجرة برية صابرة اللد من السوسيات تكثر في الحد الشرقية وسرنديب . تنبت عند مصب الأنهر وفي الإخوار التي تنمها المياه الحارة والبحرية . عصارتها حارة كاتية نقطة منها تبتش اللبن وتطلبها . خشبها راتنجي المادة مرغوب فيه . يستخرج منه ادخان عطرية كدغل في صناعة الطيوب واخرى طبية تدغل في عدة مستحضرات وعلاجات. اشتعال خشبها ويعدنا حطري البية ، فليح الرائحة الذكية الانعشادة .

١٩٣٤ - عَوْدُ الْوَجْ * ، عَرَقْ أَكْوَرْ ، وَجْ ، قَعْبُ الذَّرِيَّةِ ، لِيَكْرَ

Acorus calamus, A. aromaticus (S). Acoro, A. vral, Calamus, Roseau odorant (F). Sweet-flag, Sweet-sedge, Myrtle sedge (E). Echter-Kalamus, Acorus

أزهاره يضاء اللون ، ثنائية التجميع أو فردية ، عورقة
الارتكاز ، مستطيلة الاذن ، ثماره الى السواد البنيغسي .
يزرع من اجل ثمره المستعب العلم الشائع الاستعمال .

19353 - عَوَسَجِي
Rubicole (F).
تمت تعريفه يطلق على كل حشرة تعيش على العوسج .

19354 - عَوَسَق
Cricerelle commune (F).
هو الماسوق ، اطلبه .

19355 - عَوَسَقِدْ أَصْفَرُ *
Perotis chlorana (S).
Perotis jaune (F). Perotis chlorana (E).

حشرة خاضعة خاشية من فصيلة الزنتقيات . اطلابها
معلم اصقاع الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والغربية
والغربية الشمالية . تألف البراري والارح والمواع التي يكثر
فيها الفلز والعرور . خنافسها تعيش على ما تنقصه من
نصال الازراق . يرقاتها تعيش تحت القلف والعماء دون
ان تتصل على الشكر ويهي ترطب في الفلز والعرور
والخوخ || جسمها متوسط القد ، احليجي الشكل ، يطول
من ١٥ الى ٢٠ سم . ثوبها الى الصفراء الخشن المراج .
واسها صغير الحجم ، يفرج جسمه تحت الكويل . زباناها
عظيما ، منشوبا الشكل . كويلها منحوبه الصلصة .
الاقلي اكبر قدما من الاكبر والقصير زباناها وكذا ثوبا ||
لا جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجملانة في ايار
وتعيش حتى اوائل تموز . تساقط بعد ظهورها باسبوع .
تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة تتطور بيله
ويبلغ طولها عند الادراك الثمار نحو ٢٤ سم . وهي مرقاة ،
جسمها سمي الكريب ، مستطيل القدم ، كامن الخصر ،
سحلي اللون ، اسير الرأس والفرج . وين ميزانها انها
تصل عند مؤخر سكتها الحادية عشر زائدة قرنية شبيهة
بالملحة لتتقي بطلاص اصابع || تتصلق اليرقة في طور
الاكامل عند منتصف نيسان وتظهر الحشرة الجملانة في
اوائل ايار .

19356 - عَوَسَقِب * ، تَبَكْج
Venturia (S).
جنس تطور مجهرية من السخايات وفصيلة المشويات .
اصابها مستديرة منخفضة السام الحامطة بالار من الحلب
الاسمر اللون . تكاثف ضصوصه بتكاثف غليظة . وبها
اصفر اللون شفي التركيب لتصله وبيرة متمزعة || انواعه
عديدة اشهرها ما يتبع .

19357 - عَوَسَقِب الإِجَاص * ، تَبَكْج الإِجَاص
Venturia pinaria, Fuscladium pininum, F. virescens,
Megadadosporium pininum, Cladosporium pyram,
C. dentriticum (S). Tavelure du poirier (F).
Pear scab (E). Birnenschorf (D).

فطر مجهرية شديد الاذى يصيب الاجاص في اوراقه
وفناده وثماره || مظهره الخارجي يختلف باختلاف الجو
للنضار . وهو في اليرقة يقع بين لا قرابة الشكل والحجم
تركب النصل على صفحته السفلى والعليا || وهو في
الانثان والافناد والاضفان يقع قرسية لا قرابة الشكل
تصلق البيرة والقترة والشكر || اما في الثار فهو يقع
مختلفة الاشكال لونها الى البصرة تركب البيرة تتحور
الى سفن لب صلب يتبع بيرة ويمتلك البيرة نهيب
تشقيها || اثماره جسيمة لانه يطبق هيكل الشجرة
بعد ان يسبب يباس الانثان والافناد ويعد ان يقتضي على

19358 - عَوَسَجَ إِيدَه
Framboisier (F).
هو القرايبوز ، اطلبه .

19359 - عَوَسَجَ لُصَاحِي الْوَرَق
Rubus malifolius (S). Ronce à feuilles de pommier (F).
نبات دغلي معمر شائك . ساقه فروعاً فله مستطيلة السروع ،
تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه بسيطة تقاسية الشكل
تطو من ٦ الى ١٠ وقرص من ٢ الى ٤ || اثماره
عقودي التجميع ، صغير القد ، عاصي الازهار البيض
القصرية الاذن . ثماره الى الحمرة البنفسجية .

19360 - عَوَسَجَ جَوِي
Framboisier (F).
هو القرايبوز ، اطلبه .

19361 - عَوَسَجَ رَشِيْق
Rubus spectabilis (S).
Ronce élégante (F).
نبات دغلي معمر شائك . ساقه متراكبة الفروع والانثان
تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية .
وردياته سنائية مدنية ، نصلها خلي البيرة ، يسارز
السروك || اثماره ثنائية التجميع او فردية ، كبيرة
القد ، جميلة الحمرة الزاهية . ثماره صفر او حر .

19362 - عَوَسَجَ زَهْرَوِي الْوَرَق
Rubus crataegifolius (S). Ronce à feuilles d'ubépine (F).
نبات دغلي معمر شائك . ساقه فروعاً فله نحو ١٠٠
سم . اوراقه زهرورية الشكل ، ثلاثية او خاشية التجميع
الاسماري || اثماره عقودي التجميع كثير الازهار
الوردية المشعة . ثماره برتقالية اللون مستحبة العلم .

19363 - عَوَسَجَ شَاكِبْ
Rubus fruticosus (S). Ronce commune, R. sauvage,
R. frutescent (F). Common bramble, Black-berry
(E). Brombeerstrauch (D). Rovo, Rovo, Roveto (I).
نبات دغلي شائك معمر مهبل يكثر في الاماكن الرطبة .
ساقه فروعاً متدلية . اوراقه مركبة . صاليهه القنية
الثانية طيبة قابضة . ثماره غولية مأكولة مستحبة العلم .

19364 - عَوَسَجَ عَطِير
Rubus odoratus (S).
Ronce odorante (F).

نبات دغلي عاصم البوك معمر . ساقه فروعاً متعصبه تملو
من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية او خاشية النصوص
نصلها يعرض من ١٠ الى ٣٠ سم . وهو خلي البيرة على
صفحته || اثماره عقودي التجميع . عاتليه مستطيلة ،
متشعبة ، كثير الثمر . اثماره كبيرة القند طرية البرف ،
حرار اللون . ثماره سائرة العلم شديدة الحمره .

19365 - عَوَسَجَ لَدِيدِ الشَّمَلِ
Rubus deliciosus (S). Ronce à mûres délicieuses (F).
نبات دغلي عاصم الشوك ، سرح ، معمر . ساقه فروعاً
متعصبه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية او
خاشية النصوص . نصلها يعرض من ٦ الى ٧ سم . وهو
خلي البيرة على صفحته . اثماره كبيرة القد ، يضاء
اللون ، فردية التجميع ، مستطيلة الاذن الحمر . ثماره
شولية بنفسجية اللون لذينة العلم والبرف .

19366 - عَوَسَجَ مَدَاكْ
Rubus procumbens (S).
Ronce rampante (F).

نبات دغلي سروري معمر . ساقه فروعاً ملففة . اوراقه
ثلاثية او خاشية التفريض ، غصراه البيرة المادمة الحمل .



عوسج شائع



عوسج اسمر



عوسج الاجاص

التأثير ١١ يكلف باستعمال أحد الادوية القاطورية
وخاصها سائل بوردو على الورقة التالي : (١ -) قبل
الايلايل بمعدل رايوح بين ١ و ٢ ٪ (٢ -) بعد سقوط
التوتيجات الزهرية باسبوع بمعدل ٠,٨ ٪ (٣ -) بعد
المكافئة السابقة بثلاثة اسابيع يضاف اليه ١ ٪ من
الزنيخات.

١٩٣٥٨ - عَرَفْتُ الْفَخَّارَ* ، تَقَدَّمَ الْفَخَّارَ

Venturia inaequalis, *Venturia chlorospora mali*, *Fusicladium dendriticum*, *Napicladium toranari* (S). Tavelure du pommier (F). Apple scab (E). Apfelschorf (D).

فطر مجري واسع الانتشار شيد الانى يسهب الفاح
 ل جميع اصنافه المراتبة ل مقوره اعراي يخطب بالنسبة
 الى الفطر الشجر ، فهو على الورقة يقع بحر ل قواسم
 تركب شلع النصل وروقه في الصفة العليا و ل
 في الاصلان الانفاد يقع قوسية ل قواسم الشكل ملجوا
 بقشرة والشكر اى ل اكل هو يقع بح مستديرة ملجوا
 مقفرة ل ممراس مشق لل للدة ابر اثل ل اغراضه
 حسية لانه يطب هكل الشجرة يد ان يقضي ل ملجوا
 كبحا يستمال احلى الادوية الفاطورية الغالية المنصر
 الحاسي

١٩٣٥٩ - عَرَطَبُ الْحَوْرِ * ، تَبَكُّعُ الْحَوْرِ

Venturia populina, *V. tremulae*, *Didymosphaeria populina*, *Pollaccia elegans*, *Napicladium tremulae*, *Fusicladium radiosum*, *Stigmina radiosa* (S). Tavelure du peuplier (F). Poplar scab (E).

قطر مجهرى يصيب السور فيؤذيه. مظهره الشاذ
يقع مقرون الزوايا تركب الاوراق والنوامي نخوي نسيج النصل
وتقود الاوراق الى الاحمال الباكور ثم تسقط النوامي
تصحبها وقد تسبب يباسها || يكافح بقطع النوامي
المؤبودة وحرقها مع الاوراق الساقطة.

١٩٣٦ - عَرَضَ الدَّوْمَرُ ٥ ، تَبَيَّنَ الدَّوْمَرُ

Venturia graminicola (S). Tavelure du fromental
(F). False oat scab (E).

فطر بجري مركب التوسر فيؤخيه . مظهره انقاربي يقع
سنتلية تركب الثرفان وقد تنمده الى السنايل وذلك في
ظروف خاصة وعوامل جوية معينة || اضرامه زجاجة ان
انحصرت الاصابة بالثرفاف وجسيمة اذا زلت بالسنايل .
مكافاته مجدية لكنها مكلفة . لذلك يحد الافلاح من
زراع التوسر في تربة يكثر فيها النمل .

١٩٣٦ - عَوَظُ الزُّعْرُورِ * ، قَبْلُ الزُّعْرُورِ

Venturia crataegi, *V. chlorospora*, *Megasciadospo-
rium crataegi*, *Fusicladium crataegi* (S). Tavelure
de l'aubépine (F). Hawthorn scab (E).

فطر مجهرى يعطى البثور ويؤذي الأوراق ||
الخارجي يقع لا قبلية الشكل والحجم تصيب الثمار
فتتبعها وتتركب نصل الأوراق على صفحاتها السفلى فتؤذيها.
أضراره محصورة على انتشاره على الثمار ||
يكافح باستعمال إحدى الأدوية الفطورية .

١٩٣٦٢ - عَوَظُ الصَّبْرَةِ ٥ ، عَوَظُ النُّبُوَاةِ

Venturia inaequalis cinerascens, *V. aucupariae*, *Fusicladium orbiculatum* (S). Tavelure du Sorbier (F).

فطر مجهری واسم الانتشار قليل الاذي يقدم زهر



١٩٣٧٦ - عولط - Fuirens (S), Fuirène (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السديديات . انواعها المعروفة نحو ٤٢ مظهرها في نباتات البلاد الحساسة والامتدادية || يوجد فيها في لبنان العولب الازرق (Fuirens pubescent) منته ينبت بين اسفلة الصوب حيث لا تتطعم البروية . قصبة ساقه مستطيلة ، بسيطة ، عادية المقعد ، زهاء البشرة .

١٩٣٧٧ - عولط الادغال -

Boarmia cinctaria (S).
Boarmie bandée (F). Boarmia cinctaria (E).

حشرة من فصيلة الازديات حرشليات الاجنحة . موطنها الاسفاح الممتدة الحرارة من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها جارية قويا رقيق الازهار . سرقيها تعيش على اوراق النباتات البقلة || جسمها متوسط القفد ينمو نحو ١٢ مم . بسيطها نحو ٢٨ مم . رأسها اقشبه اللون . عيناها كيرتان . زباناها شطيان مزدويان عند الذكر ، عيناها عند الانثى . جوشها ويقتها الى الشبهة || روثانها الاماميان الى الشبهة السوداء المزاج يتوسطها بقعة بيضاء وتعلوها سريجة وزوطة كستنية . روثانها الخلفيان الى الشبهة الخطية تعلوها زرقة كستنية وتضيق اسم || لها جيل واحد في الخيل . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنمو ستة اسابيع وتفتح المكن ميساجيا على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة تطلق نحو ٢٦ مم . جسمها شبه اسطواني للشكل ، مالمس القشار . قويا الى الاغصان البحري تملوح خسة خطوط قاطبة كستنية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال .

١٩٣٧٨ - عولط الموسج -

Boarmia repandata (S).
Boarmie recroussée (F). Boarmia repandata (E).

حشرة من الازديات حرشليات الاجنحة . موطنها المناطق الممتدة الحرارة من سويس البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قويا رقيق الازهار . سرقيها تعيش على اوراق الموسج والبرسيم || جسمها متوسط القفد ، اهيف ، يطلو نحو ١٩ مم . بسيطها نحو ٤٨ مم . رأسها احمر اللون . عيناها كيرتان . زباناها شطيان عند الذكر ، عيناها عند الانثى . جوشها ويقتها الى الشبهة السوداء المزاج || روثانها ، عند الشقين ، الى الشبهة الخطية يعلوها في الزوج الامامي تضيق اسم ويتوسطها سريجة كستنية . ويعلوها في الزوج الخلفي تضيق اسم اريد وزوطة حنارية سمراء || لها جيل واحد في الخيل . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنمو ستة اسابيع وتفتح المكن ميساجيا على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة تطلق نحو ٣٨ مم . جسمها اسطواني للشكل ، مالمس القشار قويا بماتن البيئة التي تعيش فيها لذلك تنمو ابراج بين الاغصان الجسيم والاسمر الجذوي المزاج تملوح ثلاثة خطوط قاطبة . جسمها شديدة السمرة . رأسها جزوي اللون . رواجيا البنية الوسطى ماصة ما يجد بها الى التقير والشب عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال .

١٩٣٧٨ - عولط بنهشي -

Osmanthus aquifolium (S). Osmante à feuilles de houx (F).
شجرة سبروتية دقلة تملو من ٣ الى ٦ امتار . فروجها وانفانها متراكبة . اورثها بيضبة الشكل تطلو نحو ٥ سم . نصلها جامد الصلصة يحمل في كل شطر من شطريه ثلاثة اسنان او اربعة . جميعها غليظة للقاعدة مدبة الطول . ازهارها خافتة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .



عولط بنهشي

١٩٣٧٩ - عولط عطر -

Osmanthus fragrans (S).
Osmante odorant (F).
شجيرة بحداسة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . فروجها وانفانها منسجمة الارتفاع ، معتدلة الكثافة . اورثها زيتونية الشكل تطلو من ٦ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ ، نصلها جامد الصلصة ، لاص البشرة ، حسن الحافة . زهرها قصيرة الازبيب ، كثيرة الفلقة ، فواصة العرف المستحب الاخلاص || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .



عولط

١٩٣٨٠ - عولط مستح -

Osmanthus armatus (S).
Osmante armé (F).
شجيرة سبروتية دقلة تملو من ٣ الى ٥ امتار . اورثها سنانية ذرية تطلو نحو ١٢ سم . نصلها جامد الصلصة ، حسن الحافة ، شالك الاسنان والقصبة . ازهارها حرة مستطيلة المالحق ، متدلية || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين الاول .



عولط

١٩٣٧١ - عولط -

Theropithèque géloée (F).
فرد من فصيلة الحبريات مشهور باسم جلادة . اطليه .

١٩٣٧٢ - عولط -

Wahlwischia
جنس نباتات مسمرة عارضة من فصيلة السديديات . انواعها المعروفة ثلاثة اصلها البلاد الامتدادية . سرقيها وفروجها معتدلة . اورثها متطابقة ، قديقة ، مستطيلة ، جامدة اتصل المالمس البشرة . ازهارها رسيمة المسكن . ثمارها حنكية . بزورها مأكلية . صدارة سويها لينة مرطبة . لحاء فروجها صناعية لتسجية .

١٩٣٧٣ - عولط -

Microclima (F).
Microclima (E).
هو المثلح الموسمي وقد يختلف من المثلح القلبي . ويستر الموكل من البومل الرقسية في التوجيه الزاوي اثنائي وفي مكافئة الحشرات .



عولط الادغال

١٩٣٧٤ - عولط -

Ctena (S).
Ctena (F). Ctena (E).
جنس حنك صغيرة من فصيلة الدكيديات . انواعها المعروفة نحو ١٥ . اصلها البلاد الحارة والممتدة الحرارة . تعيش في الاودية والهايزن || اجسملها صغيرة القفد . بطونها ليلية الشكل . رؤوسها تركب صغيرة وتقلدها قليلا . جرابها مستطيلة ، تحيلة الاطراف . اثرواها الى الصغرة البليحة بالاجهر والاسمر . رؤوسها قوامية الاطواق السرد .



عولط الموسج

١٩٣٧٥ - عولط -

Entrecien (F).
Keeping, Preservation (E).
التقيام بالمحافظة على سلامة الشيء .

ظواهرها اصفر تملو رقعة كستية وتمشع بني. ووشاها غشائيان. الصفة العليا من بطنها صفراء توسيطها بقعة سوداء. الصفة السفلى مرارة || تمشع في المياه الراكدة. توجد في كل مكان.

١٩٣٨٦ - *Serpent court* (F). *Short snake* (E). **عومج**. الحية القصيرة الخليفة

١٩٣٨٧ - *Synergie* (F). *Synergie* (E). **عومرلة**. تاملون عدة اعضاء لقيام بوظيفة.



عولمة خسير

١٩٣٨٨ - **عوميات**. *Notonectidae* (S). *Notonectidae* (F). *Notonectidae*, Back swimmers (E). *Rückenschwimmer* (D).

فصيلة حشرات مائية من رتبة غنظيات الاجنحة ولبقة تصنيفات الجناح. اجناسها والوانها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد او كبيرة ، قلب فيها الاستطالة. رؤوسها مستعرضة. اعظامها صغيرة. عيونها كبيرة جاحقة. فرونها الامتصاصية صغيرة ، رباعية الفصل. كواسلها شبه متساوية الطول ولعروض. حناجرها مزوانية ، لاقامية الجسم. ظواهرها كالم الحبيسة الففروية. وراشها ، عند وجوها ، شفافة ، كبيرة. معدة السباحة باكتاف تقمية الاوتكان ، مهيبة. قوائمها المائية الزاكية. جميعها ترمح على ظهورها. قوتها كل ما تستطيع قصه من حشرات وسرديات وطوام.

١٩٣٨٩ - **عومج**. القلبية لتامة الخلق التي في حقورها غشطان سوداوان.



عومش

١٩٣٩٠ - **عومق**. *Scopus umbretta* (S). *Ombretta* (F). *Umbretta*, Hammer-head (E).

طائر من فصيلة القليقيات وحيد الجنس والنوع. اطلانه الاولاد الارافية || جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه كبير الجرم. متوج القفا بكفة صغيرة. متفاده غرزي الشكل ، غليظ القفص ، منتفخ المقلط العلوي || يتميز بقصر عنقه الذي يبعده من سائر اجناس فصيلة || تويه الى السمره النابضة الجذوية المراج. بطنه اقل سمره من ظهره. مناكب جناحيه والحوالي والاهاهر والكل شديدة السمره الجذوية السفاه. ذنبه قصير القد ، مستعرض الشكل. حذقة منه غرزية اللون. متفاده اسود. رجلاه الى السمره النابضة || يألف اللباس ويجاري الماء والمتاع. قوته الامساك والحيات والورغ والسماء والبقادع وقرونويات والديدان || مسرعه من القجر الى الشروق ومن العصر الى الغسق || يدفن عنه في السط. اثناء تقص اربع فيضات تحضنها بتأويه الاكر نحو ثلاثة اسابيع ، تقف الجلابيط عادمة الزغب وتبقى في العش بعده ابوها الى ان تكشي اي بحر خسة اسابيع.



عويسق

١٩٣٩١ - **عومقك**

السيفقان كوكبان الى جنب الفردن على نسق طريقهما لما يلي القطب.

١٩٣٩٢ - **عويسق** * ، **عويسكة** ، **صكر الجراد** *Tinnunculus cenchris* (S). *Crécairelle crécorine*, *Crécairelle*, *Crécorine* (F). *Lesser kestrel* (E).

طائر من العقربيات وهو نوع من الماوسق صغير القد

١٩٣٩٩ - **عولق** * . *Diphylla* (S). *Diphylla* (F). جنس غفاش من فصيلة الفويات. وحيد النوع. موطنه البرازيل. جسمه صغير القد ، أبيض. طول نحو ٧٠ سم. بطنه ٣٠٠ سم. فوطته اسفينة قصيرة. ثنائيا ثنائية مدبية حادة. ثوبه الى الصبغة الصفانية يطلو مراح اسفر. يعيش بجاهات قليلة العدد. قوته البند يمسه ايها اسفل. يألف الاجمار الحربية اللغة والقدور والكهوف.

١٩٣٨٠ - **عولكة خمير** *

Oourouparia Gambir (S). *Oourouparia Gambir* (F). خميرة حربية من فصيلة الفويات. منتجا يتد من الهند الى ماليزيا || ساقيها منتصبة فراع تملو نحو اربعة اشرار. اوراها متعاقبة ، معتقة. فصالحا اعطيلية الشكل ، مدببة الاطراف ، ناشرة الفضلوع والعروق. انفرادها رئيسي التبعج ، ابلي الاوتكان. انفرادها صغيرة مستطيلة الكتلوس ، خالصة البليات الصفراء ، غائقة العرف المانوس || يستخرج من مرقها بالخر صارة رائحية قابضة تستعمل استعمال الكافور.

١٩٣٨١ - **عولقيات** * . *Vampyrellae* (S). *Vampyrellae* (F). *Vampyrellae* (E).

فصيلة تطور مجهرية من رتبة السرديات ورتبة البيضيات.

١٩٣٨٢ - **عومج**. *Cogia brevicapsa* (S). *Cogia à tête courte*, *Cachalot nain* (F).

نوع من العبر وهو من الحيتان الصغيرة القد ، طول نحو ثلاثة اشرار. ثوبه الى الزرقه السمره. موطنه المحيط الهادي واشيط الهندي والبحر الاحمر. سربه كثير البدد براوح بين ٥٠ و ١٥٠.

١٩٣٨٣ - **عومكة بحيرية اللون** *

Notonecta glauca (S). *Notonecta glauque* (F). حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٤ م. رأسها مستعرض ، بحري اللون. خطمها فسيط. ميناهما كيرتان جاحطتان. زباناها قصيران ، نجيلان. ظواهرها بحري اللون يطلو تمشج اسمر. ووشاها غشائيان ، شفافان. بطنها اسود الصلصة العليا ، بحري السفل. حمار بطنها متكاثف الملب || تعيش في المياه الراكدة. توجد في كل مكان.

١٩٣٨٤ - **عومكة خضراء** * . *Notonecta viridis* (S). *Notonecta vert* (F).

حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط ، يطول نحو ١٤ م. ثوبها اخضر اللون. رأسها مستعرض. خطمها قصير. ميناهما كيرتان جاحطتان. زباناها قصيران. حيفتها مزوانية سوداء. ووشاها كيرتان غشائيان. حمار بطنها مرقش بالاسود || تعيش في المياه الراكدة.

١٩٣٨٥ - **عومكة دكسة** *

Notonecta maculata (S). *Notonecta maculé* (F).

حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٦ م. رأسها عريض ، اسفر اللون. خطمها قصير. ميناهما كيرتان جاحطتان. زباناها قصيران ، نجيلان. كويلها اسفر اللون تملو تمشة سمره لاشاوية الكثافة. حيفتها مزوانية ، كستية اللون.

١٩٣٩٩ - عَوَيْتَة مَسْرُكَة

Gibberella baccata, *Calonectria varians*, *Fusarium fructigenum* (S).

فطر مجهرى يركب عدة أجسام مشعة وسريعية انصهارا اليوسين الحامض واليوسين والكروم والذائق والتفاح والاصاص والزيتون والورد والسنب والصفصاف والصفراء والورد والخبان واليوكا || يصيب ثمار الكروم والذائق والتفاح والاصاص فيطعمها من البشيرة الى البررة المخالفة . مظهره الخارجى بقعة صفية سمراء اللون تتسع وتكون في الثوب . وهو في اليوسين الحامض واليوسين يقع سم مسطيلة ، تركب الجلعوق والسوق تنسب الصرم || وهو في الجزر والزيتون والورد يقع صفيرة مستديرة لونها الى السواد اللامع تنسب للساد وتقرحه || اغزاره منطوية بطروقة البررة وموزرة العوامل الجوية || يكافح كثيره من الفطور

١٩٤٠٠ - عَيْبَايَة هو الانصاف ، اطله .

١٩٤٠١ - عَيْبَايَة

Marée (F), *Tide* (E). حركة دورية تأخذ مياه البحر قوتلغ وتنخفض مرتان يومياً في اوقات شبه معينة لتتصودة . استمرارها يدم ١٢ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة . اما انخفاضها وتقلصها فيدم الجزر والتقليص || ارتفاع مياه الله في البحر الابيض المتوسط يراوح من ١٠ سم الى ١٥٠ سم . وارتفاعه على شواطئ الاطلس يراوح من ٣ امتار الى ١٣ متراً || اما انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة .

١٩٤٠٢ - عَيْبَايَة

Synodique (F), *Synodic* (E) تمت تعريفي يطلق على الدورة الكاملة التي تقوم بها الكواكب بالنسبة الى الشمس . فالدورة القمر السابعية تستمر ٢٩ يوماً و١٣ ساعة و١٣ دقيقة من الدورة الفلكية .

١٩٤٠٣ - عَيْبَايَة

Titre (F), *Titre* (E). هو مقدار العنصر الحر الصافي الذي تحويه مادة معينة . فتركيب مثلاً سبزو حيار ٨٥ منه ان هذه المادة تحوي ٨٥ ٪ من الكحول || وهو أيضاً مقدار المعدن الثمين من ذهب او فضة الذي يوجد في العملة المسكوكة او الخلل . ومن هذا القبيل قولهم ذهب حيار ثمانية عشر ابي بالنسبة الى اربعة وعشرين من الذهب الحر .

١٩٤٠٤ - عَيْبَايَة خِلَايَة

Substitution alimentaire (F), *Alimentary substitution* (E). العياضة الغذائية او عياضة الاغذية هي تبدل بعض الاطعمة بغيرها بشرط ان تحوي الوحدات الغذائية نفسها .

١٩٤٠٥ - عَيْبَايَة

Vice (F), *Fault, Defect* (E). النقص او العيب في الشيء .

١٩٤٠٦ - عَيْبَايَة

راجع اُفد .

١٩٤٠٧ - عَيْبَايَة الْوَكْر

Tendon failli, Nerf-ferrure اقتراب وتر الوظيف من العظمة في الجهة العليا الخلفية من الوظيف . وهو من عيوب الخيل .

١٩٤٠٨ - عَيْبَايَة يَبِيع الرَّد

Vice rédhibitoire (F), *Redhibitory defect* (E). عيب شفي يجعل البيع غير قابل للاستعمال او يحد من

طوله نحو ٢٢ سم . لونه الى الجوزة السوداء ، انحر الرش ، اغصان الفولاد والاباهر والكل || قوته الجنداب والملاء ، يكثر حيث يحل الجراد وقد يرافقه في رحاله .

١٩٣٩٢ - عَوَيْتَات ، لُبُوث عَفِيرَة

Myrmecoleonidae (S), *Myrmecoleonidae* (F), *Myrmecoleonidae* (E).

صفيلة شحات من عصيات الجنح . اجناسها وانواعها عديدة ، قربتها الانتشارية قصيرة مثلية . اناتها تتجمع مكانها في القباب والربل يخفف من حمليص . فضة الجفة ، قوية التأثير ، كثيفة الحلب ، تنحرف في البررة ، حل برات للتدل ، حراً صغيرة قمية الشكل يسقط فيها التدل . تنفسه .

١٩٣٩٤ - عَوَيْتَة

هي الحيوان الرتي ، اطله .

١٩٣٩٥ - عَوَيْتَة

Gibberella (S). جلس فطور مجهرية من المتاحيات وصفيلة المشطيات . اجناسها شقية الانتشار البيسي . تنسبها اسم اللوب يطول مراح اذرق || طويها البيسي كلور الكن . يطها اهلبيسي مستعمل جديد الاضية المتساوية للثيرة الانقسام المتفرس || انواعه عديدة منها اربعة مؤذية وهي ما يتبع .

١٩٣٩٦ - عَوَيْتَة الثَوْت

Gibberella moricola, *Fusarium lateritium*, *F. urticarum* (S).

فطر مجهرى يصيب افتاد الثوت فيؤذيها . مظهره الخارجى يقع قرحة لا تلتئم لونها الى البررة السوداء تلو قشور الفتاد تنسب ذليل الاوراق ثم يماسها ويهاش التقصيب والانتفاذ يدم اسرار خشبها || يكافح بقطع الاغصان المبرودة فور ظهور المرض ثم تطهيرها بأحد الفطوير القاتل المركزة على التماس .

١٩٣٩٧ - عَوَيْتَة الزَّرْع

Gibberella zaea, *G. subnietzi*, *Fusarium graminearum*, *F. roseum*, *F. rostratum* (S).

فطر مجهرى يصيب ٢٦ نوعاً من البات تنسب الى عدة فصائل . اجناسها الحنطة والشيطان والشعر والارز والذرة . كما انه يركب بطور البطاطا واللوبيا ويصيب مشاتل البندور ويؤذي الكتان والقنب والفجل والخيار والفول . مظهره الخارجى مقيم يحل بالزروع وبالنباتات المائلة فيؤذي نموها او يهتك وقد يصيب عدم الاسبال او الاسبال الابيض الخالي من الحلب || اغزاره منطوية بعمق انتشاره الماتك الى وطرية البررة وملوحة العوامل الجوية || يكافح بطوير البذار .

١٩٣٩٨ - عَوَيْتَة حَرَّارَة

Gibberella moniliformis, *Ustilago tritici*, *Fusarium moniliforme* (S).

فطر مجهرى يركب عدة نباتات اجناسها تنسب السكر والارز والذرة ولا يفسد من الحنطة والشيطان والشعر . مظهره الخارجى على تنسب السكر خطوط حر تلو القصبة عند طرفها يتألفها يقع سم تركب تصل نصف النايي فتقوى . وهو على الارز يقع حر تركب تنسب الساق في ايان عيبا تنسب نحوها واسطعائها غير الطبيعي ثم ذوبها قبل الاسبال او قبل الاثمار . وهو على الذرة يقع حنطة تركب الجلعوق تنسب اصفرار الاوراق وذيولها || يكافح بطوير البذار وباجنب اللواتح الرطبة والازرة المكتوية القوية الانفجارج .

استعماله فيجوز حيثل الشاري فسح البيع وسالطه البائع بالتدريس || والمربوب التي يمتريها لثانين ميسرة لرد هي : القدام والنسقة وقائع الحنيرة للزبن والبررة والعرج القديم المتوار والوارد للمايد وباد الخنازير .

١٩٤٠ - عَيْتُون * (F). Altonia (S). Altonia (F).

جنية برفة وثريبتية من فصيلة السبتيات . مهدبا بعض مناطق افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها التريبتية في معظم القطار البلاد المحارة || ساقها قصيرة قرمها . اوراتها معتقة ، ضنية التجسيم ، ستانية النصال الفسيقة . اعزادها بحيلة الشكل ، ليلكية اللون ، غساسة البيلتات ، كثرية الاسدية ، عادمة العرف .

١٩٤١ - عَيْتَام (F). Platane (F).

العيلم هو الدلب . واسدته ميسامة .

١٩٤١ - عَيْتُون * (S). Clambus (S).

جنس حشرات من فصيلة العيشيات ودية لمعديات الاجنسة .

انواعها المعروفة ستة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة

المحارة || اجسامها شديدة الصغر لا تتجاوز ١م . رؤوسها كبيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قاذروها وفكوكها نظامية . قربنها الاستعمارية غريبة . كواسلها مستعرة . امحادها لاحسة قوائمها شديدة . اولياها وحيدة اللون السوي وهي الى القشرة او السمرة || تعيش حل المواد النباتية المختصرة وفي الاعشاب الكثرة وفي القروث والخفي .

١٩٤٢ - عَيْتُونِيَات * (S). Clambidae (S).

فصيلة حشرات من لمعديات الاجنسة . اجناسها وانواعها

المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في جميع القطار العالم || اجسامها شديدة الصغر ، لا تتجاوز ١م . رؤوسها كبيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قاذروها وفكوكها نظامية . قربنها الاستعمارية سداسية الفصل . كواسلها قصيرة مستعرة . امحادها لاحسة . اوسافها وديعة البقل || تعيش في التدي البتالي وفي الاعشاب الكثرة وفي القروث والخفي وفي جميع المواد النباتية المختصرة || لشهر اجناسها العيشون .

١٩١٣ - عَيْشُون * (F). Scardinius erythrophthalmus (S). Red-eye (F).

سمكة من السبتيات . تعيش في المياه العذبة لا فارق متعدا بين البسيرة والنهر والجور . اقلبيها البلاد الميادية والنسقة

المحارة || جسمها اعليجي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . سهفا مستدير كبير . يربوا الى الخضار الزرق المزاج يدي في الظهر ويزهر في الجالينين || ويتصرف الى القفي في البطن . رأسها معتدل الحجم ، قصير الخلف ، صغير الشفق . عيناها مستديرتان ، صغرتان ، جيلتا المحرة القرمزية || زصافها ودية اللون حمراء المزاج ، الظهيرة ودية مزوانية الشكل ، تملو مؤخر الظهر . الذيلية فارقة || لحمها كامن النصف ، قل من يربب فيه .

١٩٤١ - عَيْد * (F). Ophiocten (F).

العيد : حجر جبل ينبت عيناها نحر الدوام المنبر لا ورق له ولا نور ، كثير اللحاء والمعد يفسد بلماته المرح الطري فيلثم (اللسان) .

١٩٤١ - عَيْدَان الحية (F). Ophiocten (F).

سبط من فصيلة العنليات . اشهر نباتات صود الحية .

١٩٤١ - عَيْدَانكة (F). Idus vulgaris (S).

هي كل شجرة سلية قديمة لها عروق نافذة الى اللام (اللسان) .

١٩٤١ - عَيْدَان صُود * (S). Idus vulgaris (S).

سمكة نهريّة بروض من مفتوحات المانة وفصيلة السبتيات .

اصطفاها معظم النهر وبحيرات الشرق الاذلي واروية || جسمها اعليجي الشكل ، يطول نحو ٣٠ سم . رأسها معتدل الحجم ، مخروطي الشكل ، قصير الخلف ، صغير الشفق . قوائمها الى الركبة السمراء السواء المألوة تشبه سمرة في الظهر وتنف في البطن . زصافها معتدلة الاجسام ، الظهيرة واحدة شبه هربية الشكل . الذيلية فارقة || لحمها متوسط النصف ، مأكول .

١٩٤١ - عَيْدَانُون * (F). Iguana (S).

جنس حيوانات زسافة من فصيلة العيشيات . انواعها المعروفة اثنان يتمايزان بذكر الحية واصطالبا التي تراوح بين ١٢٠ و ٢٠٠ سم . اصنافها وتيج ظهورها معتدلة يجار من الحلب غصوري التركيب ، مشطي الشكل ، أسود اللون . اثنائها الى الزرق الخضراء يطولوا وتديم وتطبع وتديم تراوح الزوايا من الصفرة الى السود || وما من الحيوانات الخالصة الحاضرة التي تالف لغط الانهر ويجاري للام . تعيش حل الايجار . لحمها مأكولة ويبريها كذلك .

١٩٤٢ - عَيْدَانُونِيَات * (S). Iguanidae (F).

فصيلة حيوانات زسافة من ربة العنليات السيميات الاسنة ، الرباعيات القوائم ، المستطيلات الانذاب . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اصطافها البلاد المحارة . لشهر اجناسها العيشون .

١٩٤٢ - عَيْدَانَكَة * (F). Isogamia (F).

العيدة ايض طرائق الانسان الشقي ؛ تتميز حدافيا بمساواة النامات الزوانية الذكرية والانثوية .

١٩٤٢ - عَيْدَان * (F). Isogamia (F).

هو للاذن الاكبري ، اطلبه .

١٩٤٢ - عَيْتَر * (F). Baudet (F).

هو الحار اللبل للتعصب الصالح لآزور حل الحجير واللاتن . ج امبار وعيار ويصور ويصور .

١٩٤٢ - عَيْتَر * (F). Baudet (F).

العير : الايل . وقال ابو الهيثم : العير كل ما يتير عليه من الايل والحجير والبلال فهو عير .



عيترون



عيسون



عيسون



عيشون

cile (F). Jerusalem sage (E). Jerusalemssalbei (D).
Salvia arborea, S. di Gerusalemme, Salvione (I).
بججة سريوية معمرة تملو من ٧٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها
خشيشية. فروعها فرقة متبادعة كثيفة الزغب القطبي
الشكل واللون. اوراقها احليجية النسل، خلية البشرة
ازهارها الى البياض الاخير. قناباتها مزينة بدماء اللون.
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. يقال انها من
النباتات الطبية النافعة.

19435 - عِثْرَاوَة مُدْهَبِيَّة *Phlomis aurea* (S).
Phlomis dorée (F).
بججة سريوية معمرة مزينة بكثيفة الحبل الاصفر. تملو من
٧٠ إلى ١٠٠ سم. اوراقها سنانية الشكل مقطوعة الطرف.
ازهارها الى الصفار المذهب الموجج || ازهارها يستمر
طوال فصل الصيف.

19436 - عِثْسِي *Dromadaires blanchâtres* (F).
Whitch dromedary (E).
البس : الايل البيض يتخالط بياضها شي من الشقرة.
واحد احمس والاني عيساء.

19437 - عِثْسَاء *Sauterelle femelle* (F).
المِثْسَاء : الجرادة الاثني.

19438 - عِثْسِرَاك *Arctostaphylos* (S).
Busserole, Bousserole (F).
جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الخلتنيات. انواعه
عديدة جميعها بري. سيقانها خفيفة نميلة مدادة. فروعها
منسعبة. اوراقها كاملة صغيرة القبة معتقة مضطوبة القامة
مسئلة النسل. ازهارها متفرقة التجميع. ثمارها حنينة
للشكل حراء اللون او سواد || اشهر انواعه عيسران
عنب الدب او عنب الالب.

19439 - عِثْسِرَاك عِثْب الدب* ، عِثْب الدب
Arctostaphylos uva-ursi (S). *Busserole raisin*
d'ours, Raisin d'ours, Busserade (F). *Bear-berry,*
Bear's grape, Uva-Ursi (E). *Gemeine Bärentraube*
(D). *Uva ursina, Eva ursina, Orsella* (I).

نوع من البسران ساقه مدادة، فروعها تملو نحو ٣٠ سم.
اوراقها كاملة ابيدة. نصلها جامد الصلابة مائل البشرة.
ازهارها وردية اللون. عقيقها الزهري يضم من ٥ الى
١٢ زهرة. ثمارها حنينة حراء اللون يقال ان الالبية تأكلها.

19440 - عِثْسِكَلان هو الاشقيال النجسي، اطلبه.

19441 - عِثْسُوسُ رَبَاعِي البَجَج*

Allonyx quadrimaculatus (S). *Allonyx à 4*
macules (F). *Allonyx quadrimaculatus* (E).
حشرة واسعة قانصة من فصيلة الزوحنيات وردية ممددات
الاجنحة. موطنها بطن اقاليم حوض البحر الابيض
المتوسط. خنافسها تعيش على رقيق اوراق النباتات الطرية
التي تكثر في غابات الصنوبر واخراجه. يرقانها مقترنة
تقضي على امداع الحشرات الماشية التي تركب الصنوبر ||
جسمها صغير القبة يطول من ٤ الى ٦ سم. لونها اسود
الراس والجن والظفران، احمر الكويل. غليظانها لثاني
التبقيع القندي الابيض. زباناها صولطانيان. عيناها
بارزتان. ارسافها خاسية القتل. || الاثني امير قدأ من
الذكر ولهت ثوباً منه واقصر زبانا || لها جبل واحد

19426 - عِثْرُ السَّراة
طائر كبيكة الحماة قصر الرجلين مسروبا اصفر المتقار
اكمل العينين صافي اللون الى الخضرة اصفر البطن وما
تحت جناحيه وباطن ذنبه كانه يرد شي. يزعمون انه
يأكل التين والخبث. ج. مبرود السراة (السان).

19427 - عِثْرُ قَبِيَّان هو سار قبان، اطلبه.

19428 - عِثْرُون* *Irena* (F). *Irena* (E).
جنس طير من الجوارح نبات للتأثير وفصيلة الكروريات
انواعه المبروعة ثلاثة اعطائها تمتد من الحد الى ماليزية
والفلبين. تألف الادغال والبراري. قوتها الحشرات
والقوديات من المناكب الى المقارب والوزغ والظاء
الصنيرة || اجسامها رمية تطول من ١٨ الى ٢٢ سم.
متنقدها خلية. اجنتها معتدة الطول، ذلقة الاطراف.
اذنابها مغلوقة. اثوابها تراوح من الرمكة السواد الى السواد
للحمار || تدن اشعثا في الاشجار الماتية عند اقتناص
الافسان او الالاتاد. اناثها تحسن نحو اربع بيضات
على مرتين في الحول. الذكر تزين لها الحماة والنفاد.

19429 - عِثْرَاوَة ، فُلُوس *Phlomis* (S).
Phlomis (F).

جنس نباتات برية وريزينة من فصيلة الشفويات. انواعه
عديدة جميعها احشاب ونباتات. منها اقلع البحر المتوسط.
اوراقها حنينة لينة. ازهارها خلفة الاوان لها الابيض
والاحمر والوردي والاصفر || اعرف انواعها واشهرها مالي.

19430 - عِثْرَاوَة الحقل *Phlomis agraria* (S).
Phlomis des champs (F).
بججة معمرة مزينة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقها بيضية
الشكل، قلبية القامة. ازهارها ضية متبادعة كالمنقيد.
عنها تملو نحو عشر زهرات بنفسجية اللون. قناباتها
فصل كروية غريزية الشكل || ازهارها يستمر من
حزيران الى آب.

19431 - عِثْرَاوَة سامية

Phlomis zamis, Phlomis superba (S). *Phlomis de*
Samos, Ph. superba (F).
بججة تريزينة معمرة تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقها
بيضية الشكل، قلبية القامة. نصلها مائل البشرة
خلى الصلابة السفل. ازهارها سلبية التجميع متبادعة
الرصف. ثبلو صغراء اللون ثم تنصرف الى الحمر.
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

19432 - عِثْرَاوَة عِثْرُوبِيَّة

Phlomis tuberosa (S). *Phlomis tubéreuse* (F).
بججة سريوية تريزينة معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٧٠ سم.
جلودها صقلية كروية الشكل. اوراقها قلبية النسل.
عقيقها الزهري يطول من ٦٠ الى ٨٠ سم. ضباهه الزهرية
عديدة. الواحدة منها تجمع من ٢٠ الى ٤٠ زهرة، لونها
الى الحمر || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

19433 - عِثْرَاوَة لَرَجَك هي الاذية، اطلبها.

19434 - عِثْرَاوَة مَحْشُوشِيَّة ، فُلُوسِي

فلسطيني، قرقية

Phlomis fruticosa (S). *Phlomis sous-ligneuse, Ph.*
de Palestine, Saugé au arbre, Bouillon blanc de Si-



ميرن



عيسران عنب الدب*



ميسوس رباعي البجج

اجناسها وانواعها عديدة تكثر في البلاد الحارة والاستوائية.
بجملتها قاتصة. احرف انواعها واشهرها اليفيس .

١٩٤٤٨ - عَيْقُفَان * ، عُوْدُ اَجْمَر ، اُرْمِيرَا

Armeria (S). Arméria, Armérie (F). Thrift, Pink (E).
Granello (D). Armeria (I).

جنس نباتات عشبية سمرية برية طيبة وزراعية تزيينية
من فصيلة الارصاسيات. انواعها عديدة بعضها شجراوية
تحمل الازهار تملو من ١٠ الى ٦٠ سم. اوراقها صفيحة
الشكل، مختلفة الاشجام ويعد السروق. ازهارها كثيرة
الالوان فيها الالبيس والوردي والبيجي والاحمر والارنبوني
والجلوي || ازهاره يستمر من الشهور الى الاربعة
شهور.

١٩٤٤٩ - عَيْقُفُ **Taxus**
وقد ياتي بمحاني مختلفة اعضها السمر والمذكر .

١٩٤٥٠ - عَيْكَة **Rivage (F). Bank, Side (E).**
التَيْكَة : ساحل البحر والشاطئ . وصفة النهر
تسمى عيقة . ج عيقات .

١٩٤٥١ - عَيْكَة

هي الركة اي ساحة المزروعة او المزرب وكل فناء من
الارض احتجزت جوانبه الاربية .

١٩٤٥٢ - عَيْقُفَان

نبات كالفرنج له سفة سكتة القضاء (اللسان) .

١٩٤٥٣ - عَيْكَم * ، عَيْكَمَة

Spermatophore (F). Spermatophore (E).
ج عياكم . البركية حق صغير اشد لحياسي الشكل قدس
قدر بيرة الفيل او بيرة الكنان يطفل رينة من الشلق
عند ذكور بعض الحيوانات الزاحفة والقزابة والعدنيات
الرئوية والراسيات الاربلن الخ ...

١٩٤٥٤ - عَيْلَاء * **Illa (S). Ila (F). Ila (E).**

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الاربل
قصيرات الذليل وفضيلة القشويات . انواعها المروقة قليلة
البعد اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتلة الحارة || اجسامها
صغيرة نصف كروية الشكل ، مخدبة الظهر ، منبسطة
البطن ، مفرجة المقدم والعقب ، محرمة الانظام ، سادة
التأثير ، قوائمها دقيقة مستقلة باستثناء الزوج الاساسي
المستفخم ، الكثير الملاحظ المسنة لشغار الداعلية ||
انواعها عديدة تكثر فيها الجلوة والجلوة البشجية والسمر
الحديدية الموجب .

١٩٤٥٥ - عَيْلَام **Hyala (mala) (F).**
الصبيح الذكر . **Hyala (male) (E).**

١٩٤٥٦ - عَيْلَم

العلم اسم الضفدع والبر الكثرة الماء او للسمه . ج عيال .

١٩٤٥٧ - عَيْشَن **Cel (F). Eye (E).**
هي عضو البصر في الحيوان . تتكون من المقلة والجفون
والجهاز العصبي والاصحاب البصرية .

في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل شهر ايار
وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح في البهار وتبيت في
الليل || البرقة التي تبلغ الكمال الجسدي بمر ستة اشهر
تستعمل الى حورية في اوائل شهر نيسان . جسمها عند تمام
ادراكها يطول من ٧ الى ٩ سم . وهو مدني الشكل ،
مستطيل المقدم والراس ، مسطح الطرف اللذان ، سداسي
الرواسب ، ضلع التأثير ، اسير اللون ، اسير الراس .

١٩٤٥٢ - عَيْشُوم **Phellodendron (S).**
Phellodendro (F).
جنس اشجار برية وزرنيحة من فصيلة الباليات . انواعها
قليلة ، اشجارها سرسة ، تملو من ١٠ الى ١٥ م . اوراقها
متشابهة مركبة ريشية حاوية ، ازهارها حشوكية التجميع ،
طري الارتيكار . ازهارها صغيرة القد صغرية الحرف عديدة
الفصل والبسات والاسدية .

١٩٤٥٣ - عَيْص **Broomallies (F).**
Bushes, Brushwood (E).
الموج والنباتات الغلة الشائكة التي تمش بين الاشجار
الحرجية .

١٩٤٥٤ - عَيْصَم لَدَلِي الْبَيْسَج *

Macroslagon tricuspidata (S). Macroslagon
tricuspid (F). Macroslagon tricuspidata (E).
حشرة واسعة شافرة من فصيلة الزناليات روية مندبات
الاجنحة . تألف جميع الاماكن التي تكثر فيها الازهار
والزناوير والشفاير . تنافسها تمش على ازهار الصوليوات
والشفايرات . يرقاتها تمش على جذ الزناير من النسوة
الى الشفور والهدور || جسمها صغير القد ، يطول من
٧ الى ١٠ م . لونها متعادل الالوان اسها وكسولها
ويطها الى الحمرة الجابية . صدرها الى السرة السوداء
وخملا الى الحمرة الصائبة يعلوها ثلاث بقع سود . اسها
صغير الحجم زيناها خطيوان . عيناها صغيرتان . لملها
مغلقة ، ريشتها شفافة ، بارزان تحت الظهران || لها
جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر
ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في البهار . تسافه
في اوائل تموز . الانثى تهريق الممكن بمحادي قرب عشاريات
الزناير على النبات والحجارة والترية || البرقة عند الادراك
التام تطول نحو ١٦ م . جسمها بسيط الشكل ، سداسي
الراس ، ضلع التأثير الفكية ، حشكي اللون ، اسير
الراس والرواسب والشرج || طول الكمال الذي يستمر
نحو ٣٥ يوما ينتهي في التربة تحت الجملانة .

١٩٤٥٥ - عَيْطَل **Liza (F). Smooth (E).**
الشجر البعل ما كانت لحاء سوكه واخصاه سرسة ناعمة
البشرة .

١٩٤٥٦ - عَيْقَس * **Belostoma (S).**
Belostoma (F).
جنس حشرات قازية من فصيلة البليفيات . انواعها العشرة
تلقه اعطائها البلاد الاستوائية . تمش في مائتها وانواعها .
بجملها مفرقة كبيرة القد طويلا يراوح بين ٦ و ٨ سم ،
قنبا الحيوانات الدنيا والحشرات المائية . لسها مخز عيقت .

١٩٤٥٧ - عَيْقَسِيَّات * **Belostomatidae (S).**
Belostomatidae (F). Belostomatidae (E).
فصيلة حشرات قازية من نصفيات الاجنحة المختلفة .



عصم لدلي البيسج



عيس



ميفنان



علاء

١٩٤٧٨ - عَيْنٌ ، عَيْنِيَّةٌ ، مَسْرَطَةٌ

Echantillon (F). Sample (E).

Rhynopomus (S).

Rhynopomus (F).

جنس غفائيش من حارة الريمات . انواعه قليلة جميعها صغيرة القد . اوراقها من الريادي الاصل الى الكستاني الاسمر . رؤوسها صغيرة ، اذناها كبيرة ، فرائسها ذلقة ، زوائدها منحنية اسطوانية متراكبة . اذناها مسطيلة دقيقة || موطئا مسطح الاجزاء ينمت من الرقيقة الثابتة الى الشريفة ويحوض البحر الاخر وينتهي بواحدة . يكثر ويوجد في وادي النيل . تعيش منفردة او جماعات متوسطة العدد . تسرح في الليل . قوتها الحشرات حل اختلاطها . تألف الكهوف والمغاور وراقب الصخور وتجاوذاً لا تجار .

١٩٤٨٠ - عَيْنُون (F). Globularia (S).

جنس نباتات برية وتربينية معمرة من فصيلة البينونيات . انواعها المعروفة ١٢ لها الاشباب والجنبايات اللينة الحشوية . اوراقها بسيطة ، القرصية منها ضيقة التجميع والشراعية متعاقبة . اثمارها رؤوسية كروية الشكل قريبة الشبه من اثمار المركبات . لها الى الزرقاء زهر ورقيق حسب الالوان || وهو من النباتات التي ترغب في الاراضي الصخرية وتجد في الارربة الكلسية .

١٩٤٨١ - عَيْنُون عَيْطَلِي الزَهْر

Globularia trichosantha (S). Globulaire à fleurs filiformes (F).

نوع من البينون وهو عشية برية وتربينية معمرة تملو نحو ٢٠ سم . اوراقها القرصية اطولاجية الشكل ، وحيدة الشكل ، ثلاثية الايمان . اوراقها الشراعية سنائية التصل متعاقبة . اثمارها كبيرة القد مسطرفة البلات المحيطة التلصص .

١٩٤٨٢ - عَيْنُون عَيْطَر

Globularia alypum (S). Globulaire alype, Alype, Herbe terrible, Séné sauvage (F). Globularia, Alype globe daisy (E). Strauchartige Kugelblume (D). Globularia alypum, Erbe terrible (I).

نوع من البينون وهو عيشة برية ومجلة دخيلة معمرة تملو نحو ٦٠ سم . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، لمعية الشكل ، جامدة التصل . رؤوسها الزهرية لاطئة ، مسطرية العرف المستعجب . وهو من النباتات الطبية البديدة المتألف يوجد بين الصخور وفي المراتل القاحلة وادج السراخ واطراف الغابات .

١٩٤٨٣ - عَيْنُون عَيْطَل (S). Globularia nudicaulis (F).

Globulaire à hampes nues (F).

نوع من البينون وهو عشية جبلية ، معمرة ، برية وتربينية تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها قرصية ، ضيقة التجميع ، كبيرة القد ، مقنطرة القاعدة ، عادية التبيين . شراخها عيطلي اللساء . رؤوسها الزهرية كبيرة القد ، قطرها يراوح بين ٢ و ٣ سم .

١٩٤٨٤ - عَيْنُون قَلْبِي الْوَرَق

Globularia cordifolia (S). Globulaire à feuilles en cœur (F).

نوع من البينون وهو عشية جبلية معمرة برية وتربينية تملو نحو ١٥ سم . اوراقها قرصية ، ضيقة التجميع ، قليلة الشكل ، ثلاثية التبيين العلوي . شراخها حادم الازراق ، أزغب اللساء . رؤوسها الزهرية كثيرة العدد ، صغيرة القد ، قطرها نحو ١ سم .

١٩٤٨٥ - عَيْنٌ ، عَيْنِيَّةٌ ، عَيْنِيَّةٌ

Source (F). Spring (E). عَيْنِيَّةٌ

منه يخرج من جوف الارض وتساب على سطحها .

١٩٤٨٦ - عَيْنٌ

والخامس من كل شيء . وقد شاع استعمال لفظة عين للدلالة على الاموال الثابتة فقط .

١٩٤٩٠ - عَيْنٌ

Bovis sauvages (F). Wild ozen (E).

العين : بشر الوحش .

١٩٤٩١ - عَيْنٌ اَذْكِيَّةٌ

Schpalaire (all)

زعمة ثالوية تظهر في أبط الازدحام .

١٩٤٩٢ - عَيْنُ الْإِمْدَانِ

Bourillon

فمعة في اسفل سرح الكرة تفتتح وتقلع اذا جد .

١٩٤٩٣ - عَيْنُ الْبَرْ

هو الادونيس القرمي ، اطلبه .

١٩٤٩٤ - عَيْنُ الْبَرْ

Schoenus (S).

Choin (F). Bog-rush (E). Koptifed (D). Sceno (I).

جنس نباتات عشية برية معمرة من فصيلة السعديات . انواعها عديدة بعضها متني وبسبها بيت في الاراضي الرملية . اوراقها صفية الشكل جامدة التصل تشبه اوراق الاسل .

١٩٤٩٥ - عَيْنُ الْبَرْ

هو الادونيس الحربي ، اطلبه .

١٩٤٩٦ - عَيْنُ الْبَرْ

هو اتمان الصباغين ، اطلبه .

١٩٤٩٧ - عَيْنُ الْبَرْ

عين البندوب نيم نير من كوكبية برج الثور .

١٩٤٩٨ - عَيْنُ الْبَرْ

هو الادونيس الصبي ، اطلبه .

١٩٤٩٩ - عَيْنُ الْبَرْ

هو الادونيس ، اطلبه .

١٩٥٠٠ - عَيْنُ الْبَرْ

هو عباد الشمس ، اطلبه .

١٩٥٠١ - عَيْنُ الْبَرْ

هو البيرة ، اطلبها .

١٩٥٠٢ - عَيْنُ الْبَرْ

هو الغنيس نبات من السعديات ، اطلبه .

١٩٥٠٣ - عَيْنُ الْبَرْ

هو الاتحوان الاسفر ، اطلبه .

١٩٥٠٤ - عَيْنُ الْبَرْ

هو اذان الفأر ، اطلبه .

١٩٥٠٥ - عَيْنُ الْبَرْ

Opale, Œil de chat (F).

Opal (E).

سبح كريم كثير الالوان . ويلى أيضاً سحر لبي .

١٩٥٠٦ - عَيْنُ الْبَرْ

Corps certain (F).

Certain matter (E).

هي مادة الشيء التي تلمس وترى .

١٩٥٠٧ - عَيْنُ الْبَرْ

Œil composé (F).

Compound eye (E).



عين

جنبي خشيب. جميعها تريينية وأكثرها يستعمل لاستخراج السكر. طرعا دمن اصفر اللون ، فلع العرق الاخاذ يدخل في صناعة معظم الحلوب || أشهر أنواعه الرئيسية التي تحدث منها جمع الفصوص المعروفة وبدا استجد من اسرام ، هي ما يتبع .



عين مبول

١٩٤٩٥ - عَيْنُ الْعِطَر ، عِطَر ، لَنْكِي

Pelargonium capitatum (S). *Pelargonium rostratum* (F). *Géranium rostratum* (F).

عشة ممررة زباد اللحاء ، ساقها فرعاء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مفصصة ومفرقة ، تصلها هلي البشرة ، وردي الرائحة عند اللمس . ازهارها نورية التجميع ، صفراء اللون ، وردية اللون ، ارجوانية التجميع ، فرائح الرائحة العطرية || ازهارها ربيعي . زراعتها صناعية يستخرج من ورقها وازهارها عطر الورود .

١٩٤٩٦ - عَيْنُونِ إِهْلِيَّيْ أَوْزَقْ

Pelargonium oblongatum (S). *Pelargonium à feuilles oblongues* (F).

عشة نيمية ممررة صفولية الجشنة ، حاملة الساق ، مديدة القروخ تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها اطيالية الشكل ، ذرية الزم الاخير || ازهارها ال البيضاء الاصفر يعلو تزيق اخر || ازهارها صيفي .

١٩٤٩٧ - عَيْنُونِ بَهِي

Pelargonium fulgidum (S). *Pelargonium declatant* (F).

عشة ممررة صفولية الجشنة ، ساقها لينة نامية اسطوانية زباد اللحاء تملو نحو ٧٥ سم. اوراقها مفروقة ، خلية البشرة الغضبية المواج . ازهارها نورية التجميع مستعرضة البتلات العادة التطريش والتكترم ، الارجوانية اللون . ازهارها يستمر طوال الصيف .



١٩٤٩٨ - عَيْنُونِ ثَنَاسِي الْوَيْن

Pelargonium bicolor (S). *Pelargonium bicolor* (F).

عشة ممررة صفولية الجشنة تملو نحو ٤٥ سم. اوراقها مفروقة ، غرطية ، مسنة . ازهارها حاملة العرق الطري ثنائية اللون البنفسجي والاصفر الكسبي || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .

عيون التجليات (١)

١٩٤٩٩ - عَيْنُونِ جَعْدِي

Pelargonium crispum (S). *Pelargonium crispum* (F).

عشة ممررة زباد اللحاء ، ساقها فرعاء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مفصصة متجمعة ، تصلها غشور لللمس فلع الرائحة التجماعية . ازهارها مسطوية الاذن والبتلات الوردية اللون ، الارجوانية التجميع || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .



عيون التجليات (٢)

١٩٥٠٠ - عَيْنُونِ حَبَاب

Pelargonium gibbosum (S). *Pelargonium gibbosum* (F).

عشة ممررة صفولية الجشنة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها ورديها غليظة العند . اوراقها بحرية اللون ، مفصصة ، غرطية القصص . ازهارها ال الصفراء الخضراء المواج السوية اللون || ازهارها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

١٩٥٠١ - عَيْنُونِ سِنْدِيَاكِي الْوَرَقْ

Pelargonium quercifolium (S). *Pelargonium à feuilles de chêne* (F).

عشة ممررة ذكية العرق . ساقها فرعاء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مستطانية الشكل متجمعة الاطراف .

١٩٤٩٥ - عَيْنُونِ مَبُول *

Globularia vulgaris (S). *Globularia commune*, *G. vulgaris*, *Marguerite bleue* (F). *Blue daisy*, *Globe daisy* (E). *Kalk-Kugelblume*, *Blaue Kugelblume* (D). *Margherita azzurra*, *Vedoville turchina*, *Morine* (I). نوع من البنون وهو عشة برية ممررة تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها القرصية خماسية المروق ، لا قابلية التكرم . اوراقها الشراعية سائبة التصل ، عابكة الخمار . ازهارها متوسطة القد ، كثيرة العدد ، مشرة البتلات المفصصة . وهو نبات متغلة الماشي لفيدها ولا يتلو من بعض الخواص الطبية التي تنفع الصدر والحم .

١٩٤٩٦ - عَيْنُونِيَّات

Globulariaceae (S). *Globulariaceae* (F). *Globulariaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتين متحدة الفعالات مرتجلة المبيض .

١٩٤٩٧ - عَيْشِي ، عَيْشِي

Identique (F). *Identical* (E).

Spécimen (F). *Specimen* (E).

Gorilla (F). *Gorilla* (male) (E).

هو ذكر النورلا اي الغول ، ج حايبر .

١٩٤٩٨ - عَيْشِي

Chocard des Alpes (F). الميق م. عيقة هو زمث الجروء ، طائر من الغربان ، اطلبه .

١٩٤٩٩ - عَيْشِي

Eau douce (F). *Fresh water*, *Soft water* (E).

يقال لعين المذبة عين عَيْشِي وَيَقَالُ لعين الماخلة عين زَيْشِي || والعيش هو الليل الذكر .

١٩٤٩٧ - عَيْشِي

جنس فلور مجهرية من السناخيات وفصيلة السناخيات كندبر يونانية مهددة بتخدي دمية يضاه اللون ثم تجمد وتصفى وتقتصر على الحمرة التاربية . اهدائها اصاسها . يوطها عيشي شفاف لا يتلو من بعض النقط السمية للبرقة . انواعها قليلة منها نوع واحد شار يلع عيود التجليات .

١٩٤٩٨ - عَيْشِي

Epichloë typhina, *Sphacelia typhina* (S). *Quenouille des graminées* (F). *Cattail fungus of grasses* (E). *Erstickungs-schimmel der Gräser* (D).

فطر مجهري يركب بعض التجليات البرية والعلفية فيطابق . مظهره الخارضي غلاف ابيض اللون ثم يرتقالي يتناق كالم الفد من السيرة الى انتساب نعل الصفه . يظهر في حزيران ويبتدئ خليا رنيا ثم يكتف ويصلب فيسب ذبول الصفه ويرسل نحو الماء والازهار || ومنه من قال انه يؤذي الحيل والابقار التي تأمله مع الملف المصاب به .

١٩٤٩٩ - عَيْشِي

Pelargonium (S). *Pelargonium*, *Pétanier* (F). *Pelargonium* (E).

جنس نباتات عطرية ممررة من فصيلة الفرنجيات . انواعه نحو ١٥٠ وشروبه زباد ٥٠٠ مظهره لئي وبهضا

نصلها خلى البشرة، حطري العرف الاخاذ المستحب .
انزهارها صيوانية التجميع ، صغيرة القند ، متساوية البتلات
الوردية اللون || انزهارها يستمر من الصيف الى الخريف .

١٩٥٠٨ - عَيْتُونٌ قَدَفُ الْقَطَنِ

Pelargonium tomentosum (S). *Pelargonium tomentosum* (F).

عشبة معمرة زباء اللحاء . ساقها فروعاً منتصبية ، تملأ نحو
١٠٠ سم . اوراقها حلوة . نمتية العرف ، مستديرة الشكل ،
متجمعة ، مهيبة التفصيص . نصلها خلى البشرة وهو ابيض
الحمل الكثيف المستطيل . انزهارها الى اليباض الاغبر
يملو تدرجاً وسطى قافاً الحمرة || انزهارها يستمر من
نيسان الى حزيران .

١٩٥٠٩ - عَيْتُونٌ

التيق ويصغر رقيب القُرْبِيَّةِ نيم من كركبة مملكة الامة .
مركزه على المنكب الايسر . يتميز من نجوم العبرة الاولى
يعد من الارض نحو ٤٥ سنة ضوئية .

Hydrophasianus chirurgus (S). * *عَيْتُونٌ* . ١٩٥١٠
Hydrophaisan de Chine, Chirurgien, Pans (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من طيور الساق وفصيلة التفلقيات
اعطاه تحت من الهند الى الصين ويترى الزوايج وسرديب .
يألف طصاف الجيرات والاحوار والمناقع . قوته الزغويات
والبلابيط . جسمه كبير القند يطول نحو ٥٠ سم . عند
الذكر نحو ٥٥ سم . عند الانثى . رأسه ويقدم عنقه وأعلى
جوشه الى اليباض الناصع . مؤخر عنقه الى اليباض
الاصفر يفصله عن يياض المقدم خط اسود . ظهره وذنبه
الى السمرة الزرقاء المائلة بظلياً موجاً ارجوانياً . جوشته
الى السمرة السوداء . جناحاه الى اليباض المائج باستثناء
القوائم السود . حلقة حية حنطية . متقاسمه اوراق
الانتشابه ، اخضر الملقط . رمداً الى الخضار البصري ||
يفلن عنه في عقال الارز او حل اوراق النيلوفر وبغيرها
من الاوراق التي تملأ سطح الماء . الانثى تضع من ٣
الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

Ochne (F). ١٩٥١١ - عَيْتُونُ التَّيْمَرِ

هو الحزبيل ، اطلبه .

١٩٥١٢ - عَيْتُونٌ لُتَوِيَّةٌ ، عَيْتُونٌ عَرَكِيَّةٌ

Sous-yeux (F). *Sub-eyes* (E).
زيمات تنمو حول الزيمة الاصيلة فتخلفها اذا تلفت .

Ommatidie (F). ١٩٥١٣ - عَيْتُونَةٌ
Ommatidium (E).

العينية ، عند المفصليات ، هي العين الصغيرة البسيطة
التي تتألف من مجموعة العين المركبة .

انزهارها وردية اللون جميلة وديجة بالاحمر || انزهارها
يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٢ - عَيْتُونٌ عَشِيٌّ

Pelargonium peltatum (S). *Pelargonium peltatum* (F).
عشبة معمرة لينة الساق المارحة المشقة . فروعها مخلفة
متدلية تطول نحو ١٠٠ سم . اوراقها خاسية التفصيص ،
خلية البشرة . انزهارها كبيرة القند يفسله اللون او حمراء .
انزهارها يستمر من الربيع الى الخريف .

١٩٥٠٣ - عَيْتُونٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ

Pelargonium grandiflorum (S). *Pelargonium à grandes fleurs* (F).

عشبة معمرة مزفيرة اللحاء . ساقها منتصبية ، لينة ،
عشبية ، جامدة ، تملأ نحو ٤٠ سم . اوراقها قلبية او
كلوية الشكل ، خلية البشرة ، بحرية اللون . انزهارها
كبيرة القند ، قطرها يراوح من ٧ الى ٨ سم . لونها الى
اليباض المالح بالاحمر والبنفسجي || انزهارها يستمر
طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٤ - عَيْتُونٌ مُجَدِّعٌ

Pelargonium cordatum (S). *Pelargonium cordé* (F).
عشبة معمرة زباء اللحاء . ساقها فروعاً منتصبية ، تملأ نحو
٧٥ سم . اوراقها حادة العرف ، قلبية الشكل ، مسنة
الحافة . نصلها ازغب البشرة ، اطحل اللون . انزهارها
كبيرة القند ، وردية اللون المالح بالاحمر || انزهارها
يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٥٠٥ - عَيْتُونٌ مُخَطَّلٌ

Pelargonium zonale (S). *Pelargonium zoné* (F).
عشبة معمرة مزفيرة اللحاء . ساقها منتصبية ، لينة ، جامدة ،
تملأ نحو ١٠٠ سم . اوراقها سطحية التفصيص . نضوية
الخط الاسمر الكسبي . انزهارها نورية التجميع ، ضيقة
البتلات المستطيلة ، لوناً يراوح من اليباض الى الارجواني
والقرنبيزي || انزهارها يستمر من الربيع الى الخريف .

١٩٥٠٦ - عَيْتُونٌ مَشْرُومُ الْبِتَلَاتِ

Pelargonium schizopetalum (S). *Pelargonium à pétales déchiquetés* (F).

عشبة معمرة عشقولة الجمئة . ساقها لحية غليظة تملأ
من ٣٥ الى ٥٥ سم . اوراقها مفصصة وشرة للتصل .
انزهارها مسطحة الاذن ، مستعرضة البتلات المشروعة .
الصفراء اللون ، الحافة بالاحمر || انزهارها يستمر طوال
فصل الصيف .

١٩٥٠٧ - عَيْتُونٌ مَعْتَظَرٌ

Pelargonium odoratissimum (S). *Pelargonium très odorant* (F).

عشبة معمرة سرحة . ساقها فروعاً منتصبية ، تملأ نحو
٥٠ سم . اوراقها مستديرة ، شبه قلبية ، مهيبة التفصيص .



عُيُونٌ عَشِيٌّ



عُيُونٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ



عُيُونٌ مُخَطَّلٌ



عَيْقُ

غ



غاب البحر



غادس

١٩٥١٩ - غادُس أسْمَر (S). Gadus aeglefinus (S).

Egle fin, Morue noire (F).
نوع من الغادس المتوسط القد . طوله يراوح بين ٤٠ و ٧٥ سم . اصطناعه شطوط بحار العالم القديم وهو لا يتنفس المياه الاقليمية لانه يعيش على اعماق يراوح بين ٢٠٠ و ٥٠٠ م .

١٩٥٢٠ - غادُس اطحل (S). Gadus hucus (S).

Gede tacud, Baraud, Godde, Mollet (F).
نوع من الغادس المتوسط القد . طوله يراوح بين ٢٠ و ٥٠ سم . يتكاثر في البحر المتوسط . سره كبير العدد . يألف المياه الاقليمية التي يراوح عمقها بين ١٠٠ و ٣٠٠ م .

١٩٥٢١ - غادُس العمق (S). Lota molva (S).

Morue barbue, M. longue, Molva (F).
نوع من الغادس الكبير القد . طوله يراوح من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . اصطناعه معظم بحار العالم . يألف الاماكن البعيدة للزور التي يراوح بين ١٢٠٠ و ١٤٠٠ م .

١٩٥٢٢ - غادُس صغير (S). Gadus minutus (S).

Gade capelan, Capelan (F).
نوع من الغادس صغير القد . طوله يراوح بين ١٥ و ٣٥ سم . سره كبير . العدد يحوي معظم البطار . يألف المياه الاقليمية .

١٩٥٢٣ - غادُسيات ، غادُسيات (S). Gadidae (S).

Gadidae (S). Gadidae (F). Gadidae (E).
فصيلة اسماك من المسارات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بمسطاة اجسامها النحيلة الحوافش الرقيقة الناعمة . اصطناعها معظم بحار العالم . تألف الحياة المجاهية . سرها يعد بعض ثنائ الأولوف || أشهر اجناسها : الغادس والنبر والبقلة والنفلان واللط .

١٩٥١٤ - غاب البحر * ، غابية (E). Millepora (S).

Millepora (S). Millepora (F). Millepora (E).
جنس مديخ حدي من فصيلة الغابيات . انواعه الممرية قليلة العدد . اصطناعها بحار البلاد الحارة . جميعها قريبة الشبه من المرجان يتكاثر فيها اللزج الرخامي الاصفر المبرج والاحمر الباهت والاصفر الحطلي .

١٩٥١٥ - غابية (F). Futale, Bois (F).

Forest of high trees (E).
الغابية هي الاجرة او الحرجة التي سوكت اشجارها فبسقت وداحت وصارت صالحة للصناعة . ج غاب وقابات . وهي يمتلأها الشامل مجموعة نباتية تميزت ببيئتها ومختلف نباتاتها الطولية .

١٩٥١٦ - غابية (F). Forestier, Sylvicole (F).

Pertaining to forests, Living in woods (E).
ما كان مختصاً بالغابات .

١٩٥١٧ - غابيات (S). Milleporidae (S).

Milleporidae (F). Milleporidae (E).
فصيلة مديخ حديرة تعيش وتتكاثر في بحار البلاد الحارة . أشهر اجناسها غاب البحر .

١٩٥١٨ - غادُس * ، غادُس ، غادُس (S). Gadus (S).

Gadus (S). Gade, Morue (F). Cod, Codfish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الغادسيات . لحومها مأكلية ويستخرجون من اكبادها زيت السمك || انواعه عديدة تتميز باجسامها الاقليمية الشكل التي يراوح طولها من ١٥ الى ١٥٠ سم . فوكها وسيدة القدية الطويلة . حيوتها كبيرة جاسطة . أشهر انواعه ما يلي .



غار



غار احمر



غاريقون احمر



غاريقون اعرجش



غار يقون قتال



غاريقون كبيرتي



غاريقون عذري

١٩٢٤ - غار * وركند
Laurus nobilis (S).
 Laurier d'Apollon, L. franc, L. commun, L. des poètes, L. sauce (F). Laurel, Roman laurel, Sweetbay (E). Edle lorbeer, Ehler lorbeerbaum (D). Alloro, Lauro franco, L. regio, L. poetico (I).
 نوع اشجار برية وزيينية من فصيلة الفاريات. شجوبه مدينة. سويها تملو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها ابيدة متعاقبة، معتقة، سنائية الشكل. تصلقات جاكه الصفحة الامسة، عايق الخضار، يطول من ٥ الى ١٤ سم. ويعرض من ٢ الى ٥ م. ازهارها صغيرة القذ، فضتية اللون، حشوكية التجميع، عذرية الاوتكاز. ثمارها زيتونية الشكل والحجم، زرقاء اللون، سواد المواج، يستخرج منها زيت فاخر الصنف يدخل في صناعة الطوب. اوراقها فواحة العرف العطري وبني طيبة، نقيها منه ويستخدم اما كزهر فلفندة || وقد مثل النار دوراً مرموقاً في اثنان الثامر اذ كانت تضطر من اثنائه واوراه اكايل الهة الفزاة القاصين.

١٩٢٥ - غار احمر *
Persea borbonia,
P. carolinensis (S). Laurier Bourbon, L. rouge, Persée de Caroline (F). Borbon laurel (E).
 شجرة برية وزيينية من فصيلة الفاريات. هيكلها جميل الشكل. ساقها تملو من ٨ الى ١٠ امتار. اوراقها اهليجية تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٥ سم. تصلقات جامد الصفحة الامسة الشديدة الخضار الفواحة العرف المسحب. ازهارها جرسية الشكل، حشوكية التجميع، عذرية الاوتكاز، فضتية اللون، ثلالية التركيب، حشوية القفل والبريات. ثمارها حشوية الشكل والقذ، زرقاء اللون، سود المواج، حمر الاذن || وهي من الاشجار البرية التي تجود في جميع الارضية البعيدة الدور، للثوصلة الرطوبية.

١٩٢٦ - غار شيعي *
 Rosee d'Orient (F).
 هو صصلة الشرق، حبة برية وزيينية.

١٩٢٧ - غار هندي *
Persea indica (S).
Persée des Indes (F).
 شجرة برية وزراعية من فصيلة الفاريات. اعشابها صلبة تصلح للصفحة. ساقها تملو من ٦ الى ٨ امتار. اوراقها بيضية مستطيلة، تصلقات جامد الصفحة، جميل الخضار اللامع. ثمارها عناية الشكل والقذ، مأكولة، للذبة الطعم، تنفع الصدر.

١٩٢٨ - غار ووردي * هو البصل، اطليه.

١٩٢٩ - غاروب *
 Garrot (F). Withers (E).
 عطر من جسم الحيوان يكون ما بين التمت والصهوة في الحمل وما بين التمت والسنام في البير. وهو الذي يقلى عليه خضام البير اذا اوسل ليرعى حيث شاء ج غراب.

١٩٣٠ - غاروقه *
Siliago (S).
Siliago (F). *Siliago* (E).
 جنس اسماء بحرية من شالكان الزعانف وفضيلة التروحيات انولها الممرقة قليلة العدد اعطائها تمت من البير الاحمر الى الخليلج والبيض المحدثي | اجسها مستطيلة الشكل، كبيرة القذ، تطول من ١٠ الى ٩٠ سم. وروسها صغيرة اسفلية الشكل. حينها صغيرة ماصة. زعانفها الظهيرة الاول شرعية الشكل تحمل شعراً بالغة الطول. زعانفها الالوية مقعرة. اثنائها الى الشقعة السوداء او الرمكة

البراء. وبعضها مسنج بضبوط قاطبة فضرة || هويا متوسطة الصنف، مأكولة.

١٩٣١ - غار هاجيات *
 Ulmaceae
 هي الاجريات، اطليه.

١٩٣٢ - غاريات *
 Lauraceae (S).
 Lauracées (F). Lauraceae (E).
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة الثغالات. انواعها المعروفة زهاء ٩٠٠ تنتمي الى ٢٤ جنساً تنسب الى ثلاثة اسباط. جميعها اشجار ونبيرات. اعشابها صلبة صناعية. اوراقها ابيدة كاملة، بسيطة، متعاقبة، معتقة، جامدة التصل. ازهارها عذرية او حشوكية او حلقية التجميع، عذرية الاوتكاز. ثمارها زيتونية او نوية الشكل منها المأكولة والطيبة والصناعية.

١٩٣٣ - غاريات *
 Trigonelle (F).
 هي الحلية نبات عشبي من فصيلة القرنيات.

١٩٣٤ - غاريقون *
 Agaricus (S).
 Agaric (F). Agaric (E).
 جنس طيور كاملة التركيب من فصيلة الفاريات. انواعه زهاء ١٠٠٠، اعطائها العالم على اختلاف اقاليمه للمنتج من خط الاستواء الى القطبين الشمالي والجنوبي. تعيش على الزبل والعليل ويغفلت الاعضاء النباتية المنزلة وتحمل على السور وقذعة الجلود... مظهرها جناسي يذوي وحيث وبعضها للذ الطعم مأكلي || اشهر انواعه ما يتبع.

١٩٣٥ - غاريقون احمر *
 Agaricus annularis (S). Agaric annulaire, Tête de méduse (F).
 نوع من الفاريقون البري المؤذي الجمالي المادة القلابة. يكثر في غابات واسراج جبال المناطق المعتدلة. يعيش ويتكاثر على اللحاء والاعشاب السائرة نحو الانحدار.

١٩٣٦ - غاريقون اعرجش *
 Agaricus colubrinus (S). Agaric couleuvré, Couleuvrée (F). Toadstool (E).
 نوع من الفاريقون البري المأكول. يكثر في اسراج البلاد المعتدلة. يعيش على مخلف المواد النباتية المنسلة.

١٩٣٧ - غاريقون عسكي *
 Armillaire de miel (F).
 هو الطرم، اطليه.

١٩٣٨ - غاريقون قتال *
 Agaricus necator (S).
 Agaric meurtrier, Morton (F).
 نوع من الفاريقون البري الجمالي. مادته القلابة شديدة الاذى شمة. يعيش ويتكاثر على المواد المضوية المنسلة.

١٩٣٩ - غاريقون كبيرتي *
 Agaricus sulfureus (S). Agaric soufré (F).
 نوع من الفاريقون البري الجمالي المؤذي. يكثر في الغابات الطليلة. يعيش على المواد المضوية المنسلة. لونه الى الصغار الكبيرتي بين ورس عتد اكل نمو.

١٩٤٠ - غاريقون متخزلي *
 Polyporus officinalis (S). Polypore officinal (F).
 فطر من السميات، يعيش على غاء سوك واغصان الاشجار الحرجية.

١٩٥٦ - غاريقون مريه * ، طرثوث حلو

Agaricus edulis, *A. campestris* (S). *Agaric comestible*, *A. champêtre*, *Champignon de couche* (F). *Field agaric*, *Mushroom* (E).

نوع من الفاريقون المأكول المشهور ، واسع الانتشار يزرع في الغامط . اسراره عديدة ، ألوانها مختلفة يكثر لها الاسفر والاسهل .

١٩٥٧ - غاريقونيات

Agaricaceae (S). *Agaricaceae*, *Agaricinae* (F). *Agaricaceae* (E).

فصيلة الطيور الفاريقونية من رتبة الثعالب . اجنتها وانواعها عديدة منها المأكولة كالغاريقون ومنها المؤذية زراعيها كالعرق والرائحة والنفيسة والكلوبية والكلوبية || تتميز بكمال شكل ظهورها التي تتربك من قاعدة كروية تعلوها ساق اسطوانية تكلها ابرسة مستديرة . شبيها غرر اللادة ، ليد التجميع ، واقر الهيف ، يتكاثر ويعد طولا كاعطيان المغفولة تعلوها دامل صغيرة مدمية الشكل تؤلف نواة الفطر وقاعدة الزبكان .

١٩٥٨ - غاز

هو احدى حالات المادة الثلاث . تتميز الغازات من السوائل والاجسام الصلبة بقدرتها المطلقة على التمدد . وهي تتأثر بالضغط والحرارة ولكل منها وزن وكثافة .

١٩٥٩ - غاز الكربون

ومن اسماه غاز كاربونك وسامس كاربونك ، هو ثاني اكسيد الكربون ، اطلبه .

١٩٥٥ - غاسترولوب * ، غاسترولوب السنتيك

Gastrolobium (S). *Gastrolobe* (F).

جنس نباتات جنينية سرولية معمرة من سبط البذراريات وفصيلة الثغريات الفرائية . انواعها الممرقة نحو ٣٠ منها استراليا . مظهرها بري وبشرها ترابي . حياكلها جيلة القلب . سوطها فرخه . اوراقها صغيرة ملقمة متعاقبة . ازهارها متعقبة التجميع سفراء اللون او حمراء .

١٩٥٦ - غاسول * ، غاسول هو إشنابو اساق ، اطلبه .

١٩٥٧ - غاسول التركيبي .

Glacine (F). هو الظهرة البهرورية ، اطلبه .

١٩٥٨ - غاسول زوي * ، لباله شاككة

Euphorbia spinosa, *Tidymallus diffusus* (S). *Euphorbe épineux*, *Hippophaes des grecs* (F). *Hippophaeton* (E). *Pitula* (I).

جنبة برية طيبة من فصيلة البتويات ، صهارتها لبنة سائلة تمرط الشعر وتقتطع الثوب . اصلها جبال حوض البحر المتوسط || ساقها خشبية فرخه . فروصها منتصب شاككة . اوراقها حاشنة ، رعيه الشكل ، صغيرة اللد ، جامدة النصل . ازهارها فردية ، حامية ، فراءه اللون . يزورها مسطيلة ، مفلطحة ، متعيلة اللون ، ناعمة القشرة زائدة للنبدة .

١٩٥٩ - غاسول مصري

هو الظهرة البغدية ، اطلبه .

١٩٥٠ - غاسيف

Chien de chasse (F). *Sporting dog* (E).

الغاسيف هو كلب الصيد من اي عرق كان . ج غصيف .

١٩٥١ - غاطية

الغاطية من الكرم طالت ساقها وصمت وانتشرت .

١٩٥٢ - غاطية

Galathea (S).

Galathea (F). *Galathea* (E).

جنس حيوانات مائية من الرضويات مسطبات الخياشيم والارجل بين فصيلة البيرينيات . انواعها الممرقة نحو ٧٠ بعضها نهري والآخر يعيش مع مصبات الانهر . يكثر ويوجد في القل والنبير || اصلها شبه قبة الشكل ، كبيرة اللد ، متساوية المصارع . ضاميا ثنائية ، طليقة ، صغيرة || لها كامة الصنف قل || من يربض فيها .

١٩٥٣ - غاطية

Aristolochia (F). هي الزولوه ، نبات يشبه المربون . ج غاغ .

١٩٥٤ - غاط

Prosopeis (S).

Prosopeis, *Prosope* (F). *Musquit bean*, *Sorow bean* (E). *Prosopeis*, *Ahranchelle* (D). *Prosopeis* (I).

جنس الشجار ونجيرات برية وزخنية من فصيلة الثغريات الفرائية . انواعها عديدة ، مهادا اللد . سوطها فرخه شاككة . اوراقها مركبة ، ريشية . وريقاتها لغمية سنائية . ازهارها سبلي التجميع ، عوروي الاذنكار . ازهارها صغيرة اللد ، خافتة العرف ، متعقبة الاذنكار . ثمارها قرون رقيقة مسطيلة ، شبه مستديرة . يزورها فضية مفلطحة .

١٩٥٥ - غاثك

Agrimonia (S). *Algremoine*, *Soubrairette* (F). *Agrimonia*, *Cockle bur*, *Liverwort* (E). *Kleiner Odermennig*, *Laberkraut*, *Agrimonia* (D). *Agrimonia*, *Erba da sudata* (I).

جنس نباتات برية معمرة من سبط البذراريات وفصيلة الثغريات . انواعها قليلة جميعها طيبة تفيد التهابات وشفاة العين || اشهرها الغاثك الفولاني .

١٩٥٦ - غاثك غولاني

Agrimonia eupatoria (S). *Agrimonia eupatoria* (F).

نوع من الغاثك وهو نبات طبي بري معمر سليل . اوراقه ثنائية ، حركية ، وريه التجميع . وريقاته ريشية الشكل ، نصلها بارز الممرق ، سنن الحافة . ازهاره سبلية ، حامية ، سفراء اللون ، تفيد شفاة العين والالتهابات اخصها التهاب الحنجرة .

١٩٥٧ - غاثك * ، غاثك ، قاتل الماء ، غوثك الماء

Phalacrocorax (S). *Cormoran* (F). *Cormorant* (E).

جنس طير من فصيلة البجيات ودية كليات القدم ، انواعه نحو ٤٠ منها الكبيرة الجثة والمتوسطة . طليط راوح من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ألوانها عديدة الاذنكار تكثر لها السمرة الخضراء المروج . مناقبها جالسة مسطيلة محدبة الجهة الحادة || جميعها من طيور البلاد الباردة ولدتلة تعيش قرب الماء تألف الاسوار والقطوط العسرية . قربها الاسماك الصغيرة . تدن بين المصور وفي الاجار . انثيا تنقع من الماء . يبيضات تخضبها بمناوبة اللذكور نحو ٤ اسابيع .

١٩٥٨ - غاثك * ، ديك البحر

Gallicithya (S). *Gal*, *Coq de mer* (F). *Sea-cock* (E).

جنس اسماك بحرية من شاككات الزمائف وفصيلة الاسقمريات . انواعها الممرقة قليلة اللد ، اصلها بحار



غاريقون مريه



غاسترولوب



غاسول روسي



غاثك



غاث



غاث غولاني



غاث

الى الصفرة الزاحية . يكثر في المروج وفي المراعي الطبيعية . يقال انه يفيد الدود وينشط السن . وهو ينثر الحليب ويتعمل في الصناعات الصبغية . صباغه احمر اللون .

١٩٥٦٦ - غالليون صُنْبِيَّيْ *

Galium cruciata (S). Gailliet crosetta, Callic-lait crosetta, Crosetta (F). Crosswort bedstraw, Maywort (E). Kreuzabkraut (D). Prtimbroza, Erba croce delle macchie (I).

نوع من الفالليون البري الطبي . ساقه وفروعه واوراقه زباد . ازهاره صفراء اللون دقيقة الزناد . يتعمل في الصناعات الصبغية . صباغه احمر اللون .

١٩٥٦٧ - **غامَكة** Gamêta (F). Gamete (E). هي الجسيطة اي الحليقة التناسلية البسيطة الجبلية .

١٩٥٦٨ - **غالط** Gadoue (F). Night-soil (E). هو البراز او المادة من الاسمدة الضوية للتنشيط الخصبية . متوسط ما يشمل من مواد رئيسية : ٩٠٪ ، ٩٠٪ ، ٧٠٪ ، ٢٥٪ حافس فسفوري . ٢٥٪ ، ٢٥٪ ، ٢٥٪ ، ٢٥٪ .

١٩٥٦٩ - **هالكية** Télologie (F). Teleology (E). نظرية لسلفية ترتكز حل الغاية . وكل عمل سببه الهدف .

١٩٥٧٠ - **هالبيدييه** ، **هتير كشميري** ، **ناعورة** Gaillardia (S). Gaillardie, Gaillarde (F). Blanket flower (E). Malerblume, Kokardenblume, Burgunder (D). Gaillardo (I). جنس نباتات عشبية زرقونية مصرية من فصيلة المركبات الابرورية الزهر . انواله وفروعه كثيرة العدد . اوراقها متعاقبة صغيرة القد متائلة النصل اللصيق . ازهارها متراكبة الاسرابي والاصفر . زراعتها الزرقونية شائعة ، تصلع في جميع الارربة والمواقع .

١٩٥٧١ - **هبادكة** Téphrosie toxique (F). Fish poison plant (E). هي الحوراء المسكرة ، اطباها .

١٩٥٧٢ - **هتباركة** * Mespilus pyncnoloba (S). Mespilus, Mesplier, Néflier des bois (F). Mespilus (E). Mispel, Mispelbaum (D). Mespolo, Nespolo (I). نوع من الاكيدنيا البيرية من فصيلة الورديات . اطباها بعض جبال اليلد المتدلة الحارة . يكثر ويندوها في ارجاء الكريات ويهي شجرة شائكة تملو من ثمرين الى ستة امتار . اوراقها متائلة ، اهليجية الشكل تطول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ نصليا جامد النسيج ، يارز البروق ، خلي البشرة على صفحت السفلى . ازهارها كبيرة القد ، صفر المأبر ، يفضي البتلات . ثمارها بنية اللون ، طرية اللعوق ، حازنة الطعم ، تؤكل بمد المزاراة .

١٩٥٧٣ - **هعباش** * Photophobie (F). Photophobia (E). تمت تعريفه يطلق كل كل من يخشى النور .

١٩٥٧٤ - **هعباش** Opatrum (S). Opatra (F). جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة البشيات . انواله نحو ٣٠ طولا براوح بين ٥ و ٨ سم . ثوابها عابقة يكثر فيها الاسود والاصفر والابيض . ريقاتها طاملة ، غاشية ،

المنطق الحارة || اجسامها شبه مينية الشكل ، مبطة الجرم ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . وتعرض من ٢٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها شبه يرمية الشكل ، ساحة الانضمام ، صغيرة الاشداد . زفافها الظهري والشرعية متعاقبة مملها مع الزنايف الحوضية بعض الاالياف الحليقة المسطلة الضروفية المادة . زفافها القلبية غارقة || لحوبها كامة الصنت ، قل من يربب فيها || اعرف انواعها واشهرها النعان التالي :

١٩٥٥٩ - هال المتوسط

Gallichthys egypticus (S). Gal de la mediterrandé (F). طوله نحو ٢٥ سم . ثوبه الى الشبهة الفضية . يكثر ويجوده قرب الشطوط المصرية .

١٩٥٦٠ - **هال كيمور** Gallichthys major (S). Gal major (F). طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه الى الشبهة الذهبية الموج . يكثر ويجوده قرب الشطوط الهندية .

١٩٥٦١ - **هال** الدال نبت . والقال ارض مطعنة ذات حجر . ج . غلان .

١٩٥٦٢ - **هالليون** Galium (S). Gallie, Callic-lait (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية أو مصرية من فصيلة الفريات . انواله المعروفة نحو ١٥٠ منها البالية والمرحوية والصباغية . ساقها مصلمة رباعية . اوراقها غمية ، متعاقبة ، صغيرة القد ، خيفة النصل ، مدبة المقصة . ازهارها رباعية التركيب ، ابيلة الايتكاز ، مسطيلة الزناد ، يكثر فيها اللون الاصفر || اشهر انواعه ما يتبع .

١٩٥٦٣ - **هالليون ابيض** ، **هالبيقي** ، **حفيضة الالهي** ، **هتسك** ، **لرمن**

Galium aparine (S). Gailliet aparine, Grataron, Aparine, Rieble (F). Catch-weed, Cleavers, Goose grass (E). Kiebelabkraut (D). Aparine, Asprella, Cappello da signosi (I).

نوع من الفالليون البري الطبي . ساقه فرواه زباد . فروعه دقيقة ، مستصبة ، لينة . اوراقها جامدة النصل ، خلية البترة . ازهاره يفسد اللون مستطيلة الزناد النحيل .

١٩٥٦٤ - هالليون المتابع

Galium palustre (S). Gailliet des marais, Callic-lait des marais (F). Marsh bedstraw, Water bedstraw (E). Sumpfakkraut (D). Stellina ruvida (I).

نوع من الفالليون المرصوي البري يقال انه ينثر الحليب . يكثر في المتابع ويوجد في المروج الرطبة ، رعاء الماشية بشوة فيسبها ويسمن درها .

١٩٥٦٥ - **هالليون حقيقي** ، **هالليون اصفر** ، **هتلكه الابن**

Galium verum (S). Gailliet jaune, Callic-lait jaune (F). Cheese rennet, Yellow bedstraw (E). Echte Labkraut (D). Gaglio giallo, Erba zoffina, Erba nocca (I).

نوع من الفالليون البري المرصوي . ساقه فرواه . فروعه نحيلة ومعدية . اوراقه خيفة النصل الخلية البترة . ازهاره



هال



هالليون ايش



هالليون المتابع



هالليون حقيقي



هالليون صليبي



هالليون غاردييه

1٩٥٨ - غشيس، غشيس Goniozoema (S).
Goniozoema (F). Goniozoema (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السلمونيات متفرجات الخانة. انزواها المعروفة قليلة البلد جميعها صغيرة القد مستطيلة الشكل، فضية اللون او وردية || اصلاها بحار البراد الحارة والمحتلة الحارة اعصها البحر الاحمر والخليج || اشهر انواعها النمس القضي الذي يكثر في المتوسط.



فهارية

1٩٥٦ - غشيسه Tenebrio (S). Ténébrion (F).
جنس حشرات خاضعة مؤذية من فصيلة الغشيات. انواعها نحو ٢٠ اشكالها واصحابها واظفارها غظفة. تعيش على بعض المواد النباتية منها الحبوب والبقول والجلود || اعرف انواعها واضرها ما يلي.



غياش الكرمة

1٩٥٨٧ - غشيسه التبيغ Platycaulis gages (S).
Ténébrion du tabac (F).
نوع من اللبشة يحي خنفساء فضية الشكل مقلعة طويلا نحو ١٠ م. ثوبها سوي السوداء فضي المراج الاربع. تركيب شتيل التبيغ القضي تقترض السور عند سطح الرية. تكلفه يستعمل اسد الحواشير الفعالة تظيرا على التربة والنبات.



غير

1٩٥٨٨ - غشيسه الدقيق Tribolium confusum (S). Tribolium confusum, Ténébrion confusum (F).
حشرة من الغشيات صغيرة القد مقلعة. طويلا نحو ٤ م. لونها الى الكسني البانيق يطلو مواج احمر. تعيش على المواد المضوية في المظان وخازن الحبوب والبقالة. ريقها دقيقة، غيرة، مستطيلة، حالية الجسم تعيش كاشطرة على الدقيق والحبوب المكسورة.



هيوبر

1٩٥٨٩ - غشيسه المظان Tenebrio molitor (S). Ténébrion meunier, Ver de farine (F). Mehlworm (E). Mehlkifer (D).
خنفساء من الغشيات، جسمها مستطيل الشكل مسط، طويلا نحو ١٥ م. ثوبها الى البني الاسفع المراج. تعيش في المظان والافران. ريقها تسمى دودة الدقيق.



غير دن

1٩٥٩٠ - غشيسه Pollucida (F). Pollucid (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما هو نصف خفاف.



غشيسه التبيغ

1٩٥٩١ - غشيسه Pollucidita (F). Pollucidity (E).
اللبشة صفة ما هو غشس او ملبش.



غشيسه الدقيق

1٩٥٩٢ - غشيات Tenébrionidae (S).
Ténébrionidae (F). Darkling beetles (E). Schwarzkäfer, Schattkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشيات الاجنحة. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠٠ مظهرها من الحشرات غير المؤذية. اشكال غناضها غظفة تكثر فيها الاستطالة ويحبذ البقي الاسود. قربها الاستعمارية مركبة من ١١ فصلة. اراسع بزمزمها الاسامية والوسطى خمسية المقل اما الخلفية فرباعية || تألف الاماكن والمواقع المظلمة والاقية وما اشبه. تعيش على بقايا المواد المضوية والنباتية. ريقها دودة الشكل تعيش في التربة على المواد النباتية والمضوية المقلعة او دور الاغصان. اشهر اجناسها الازيدا والقباش والندبة والفتاش والافيتوفاغوس واللاشوس والميلازيا.



غشيسه المظان

تعيش على جلود بعض النباتات البرية والزراعية اعصها الكرمة || اشهر انواعها غياش الكرمة.

١٩٥٧٥ - غشاش الكرمة

Opotrum sabulosum (S). Opstre sablonnier (F).
نوع من الغشاش طوله نحو ٨ م. ثوبه الى السوداء الداكن. يعيش في التربة الرطبة القليلة الانساج. يركب مع ريقها جلود الكرمة فيؤذيها.

1٩٥٧٦ - شبان، ريسان Scarus ghobban (S).
Scarv vers (F). Ghobban scar-fish (E).
سمكة بحرية من بنات مسكار. توجد في المتوسط وفي بحار البلاد الحارة. ثوبها الى الربية الخضراء الزاوية. يقال انها لا تتوكل في زمن مرض المرجان لما قد يحويه لحمها من مواد سامة مؤذية.

1٩٥٧٧ - غشيب، غشيب، بليدم Panon (F).
ثي جلدي تحت عتق البقرة. Dewlap (E).

1٩٥٧٨ - غشبر Martangus (S).
Merlan (F). Whiting (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة النادسيات. انواعها المعروفة حسة تتميز باجسامها المستطيلة الشكل ويحرفها النجيلة الرقيقة. طويها مأكولة. اكبادها وافر الماد الزيتية. جميعها من الاسماك المقترسة الائمة. تألف السمق وتعيش اسرابا وافر العدد || اشهر انواعها الثلاثة التالية.

1٩٥٧٩ - غشبر المتوسط Martangus punctatus (S).
Merlan pontassou, Pontassou (F). Pollack (E).
نوع من الغبر يكثر في بحار البلاد الافريقية اعصها المتوسط والاطلس.

1٩٥٨٠ - غشبر شائع Martangus vulgaris (S).
Merlan commun (F). Common whiting (E).
نوع من الغبر يوجد في معظم بحار العالم. يكثر في المحيط الاطلسي قرب الشواطئ الافريقية والاوربية.

1٩٥٨١ - غشبر قشعي Martangus carbonarius (S).
Merlan noir, Charbonnier (F). Coal-fish (E).
نوع من الغبر يكثر في مياه بحار الشمال وفي البحر الاسود وفي المياه الاقليمية المنتجة من اليونان الى لسانيه.

1٩٥٨٢ - غشبركة في الارلتيوم، اطلب.

1٩٥٨٣ - غشبرور Endrepanis (S).
Endrepanis (F).

جنس طير من الجوامث ريقها المناقير فضيلة المفترسات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اصلاها جزر الفيليبين || اجسامها صغيرة القد، مستطيلة المتائدة الرقيقة، صغيرة الارصاغ الدقيقة والاناب المستديرة الاطراف. اولياها تختلط بين الذكور والاناث || اشهر انواعها واجلها غبرور صتير. ثوب الذكر الى الصفار المنحب. جناصاه وذنبه الى البنفسجي. رأسه الى الخضراء الاسفع. قلته الى الحرة الاريجوانية.

1٩٥٨٤ - غشبرق Exalte factoria (S).
Caille naine (F). Dwarf quail (E).

جنس طير من صارة الجحليات فضيلة الطيوريات. انواعها المعروفة اربعة موطنها شرق الاقصى. تغني البانيق يشكلها وثوبها غير اشيا اسفع قدا وافتح ثوبا واقل طيرانا، تألف السهول والادغال وتدن في انصوص كالسبان.

١٩٦٠ - شَبْرَاءُ الْهِنْد (F). Sorbier des Indes

شجرة من الشبيرة مشهورة باسم عُشْبُ يَفْنَى ، الحلي .

١٩٦١ - شَبْرَاءُ اليابَان (S). Sorbus japonica

Sorbier du Japon (F).

نوع من الشبيرة وهي شجرة حرجية سريرية مهددة بالانقراض .
تطول من ٥ إلى ١٥ م . أوراقها مفضضة ، بيضيه ، ذلقة ،
تطول من ٧ إلى ١٢ سم . وتعرض من ٤ إلى ٨ سم . فصوصها
صغيرة ، ضيقة ، مسنة الحافة . تصلها خلي الصفحة
الشغل ، كبير المروق التي يراوح عددها بين ١١ و ١٣
زوياء || أثمارها بيض . ثمارها بيضية الشكل ، ارجوانية
اللون ، منمشة بالانيش .

١٩٦٢ - شَبْرَاءُ امريكة (S). Sorbier americains

Sorbier d'Amérique (F).

نوع من الشبيرة وهي شجرة سريرية حرجية وترينية . أصلها
بلاد امريكة الشمالية . تملو من ٤ إلى ١٠ أمتار . أوراقها
مركبة وترية التجميع . وريقتها اعليانية ذلقة تطول
من ٢ إلى ١٠ سم . وعددها يراوح بين ٩ و ١٧ .
أثمارها كبيرة اللد ، غراء اللون . ثمارها حامض الطعم .
زاحية الحمرة الاربوانية ، كروية الشكل ، قطرها يراوح
بين ٨ و ١٠ م .

١٩٦٣ - شَبْرَاءُ بَرِّيَّة * ، شَبْرَاءُ مُنْهَضَة

Sorbus torminalis (S). Sorbier torminal, S. alster,

Alster (F). Wild service tree, Chequer tree (E). Wilder Elsbeerbaum (D). Sorbezzolo, Ciavardello (I).

نوع من الشبيرة وهي شجرة حرجية سريرية شائعة تملو من
١٠ إلى ٢٠ م . أوراقها مفضضة ، مائلة للبشرة ، عديدة
المروق . فصوصها ضيقة لا متساوية السمك . عددها
يراوح بين ٥ و ٩ || يتفاوت أثمارها فائقة ، يدها
اللون . ثمارها كروية ، مقطوعة الطرف ، حمراء اللون ،
قطرها نحو ١٥ م .

١٩٦٤ - شَبْرَاءُ ذَرِيَّة

Sorbus cuspidata, Sorbus vestita (S). Sorbier cuspidé (F).

نوع من الشبيرة وهي شجرة سريرية برية وترينية ترعب
في الموائل الباردة . تملو من ٣ إلى ٥ أمتار . ساقها
واخضابها وأنانها والفنابا مزرقية الباه ، فنيها لبد التجميع
قطني الشكل والون || أوراقها اعليانية ذرية تطول من
١٠ إلى ٢٣ سم . وتعرض من ٤ إلى ١١ سم . تصلها خلي
البشرة حل صفحتي . حماره ثنائي التسنين ، حاد التخصيص .
ثمارها كروية الشكل ، مقطوعة القامة والطرف ، ارجوانية
اللون ، صفراء الواج .

١٩٦٥ - شَبْرَاءُ سَوْدَاة الثَمَر

Sorbus melanocarpa (S). Sorbier à fruits noirs (F).

نوع من الشبيرة وهي جنبة عمرة برية وترينية تملو من
١٠٠ إلى ١٥٠ م . أثمارها وأنانها زاه الباه . أوراقها
بيضية مستطيلة . تصلها جامد السجج ، مسن الحافة ،
خلي الصفحة الشغل . ثمارها كروية الشكل مقطوعة
الطرفين ، قطرها يراوح بين ١٠ و ١١ م . لونها ال
السواد اللامع .

١٩٦٦ - عُشْبُ يَفْنَى * ، رُوِيَاص

Goniosoma sphyraena, Argentina sphyraena (S).

Goniosoma argentin, Argentine vulgaris (F).

Common argentine, Silver-fish (E).

نوع من البقس . ممكة بحرية يعيش من السلموفيات .
أصلها من مناطق البحر الابيض المتوسط || سرورها
الانحطاط . لا تقرب من الشطوط والجنادج إلا في زين
الفترة التي يمتد من اوائل شباط الى اواخر آذار || جسمها
شبه دمي الشكل يميل من ١٥ الى ٢٠ سم . رأسها
غروي الشكل . لها واسع الشدق الذي ينتهي تحت العين .
زمنها البالية غايقة . سفها كبير اللد ، تلغض تحصره
كل عام . ثوبا فني اللون يلمع كمرق الزؤل . ظهرها
زني الخشام || لشها عيوط الصفب ، مأكول || تصاد
من أجل الشنق الاثري الذي يملو جسمها وشانها لانه
يدخل في صناعة تقليد الزؤل .



عُشْبُ يَفْنَى

١٩٦٧ - شَبْبُط ، شَبْبُط (E). Javelle

نوع قبضات مجسمة من الزرع المحصد . والنبوط المكمنة

بشم حمله ، راجعها .

١٩٦٨ - شَبْبُط هو البلمد ، الحلي .

١٩٦٩ - هَبْن ، هَبْن (F). Fraude, Tromperie

Fraud, Cheat (E).

البن والبن : الخديعة في البيع والشراء .

١٩٦٧ - شَبْبُطَا

Loechocarpus (S).

Loechocarpa, Cubé (F).

جنس اشجار وجيرات برية وزراعية من فصيلة القرقيات
الافريقية . منبها البلاد الحارة والاشترائية . يستخرج من
جلورها مادة اروتونين التي تستعمل في اباداة الحشرات .

١٩٦٨ - شَبْرَاءُ ، هَبْرَاءُ (F). Sorbus (S), Sorbier

جنس اشجار وجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات
انواعها عديدة مهددة الباه . أوراقها عابلة متعاقبة . أثمارها
نورية التجميع . ثمارها تفاسية الشكل . صغيرة اللد ،
مرجانية اللون ، حلزوة الطعم ، يستخرج منها بدم التضمير
والقطير مشروبات كحولية لا بأس بها || اما متوسط
ما يحويه ثمارها من عناصر مفيدة فهو .

مواد ازوتية	٧ %
غلوكوز	١١ %
نضفات	١ %
حامض تفاسي	٠,٦٤ %
فيتامين ث	٢,٥ %

اغشابها صلبة بيضاء ، ناعمة الرقة تستعمل في صناعة
التنزيل || اشرف اثمارها واشهرها ما يتبع .

١٩٦٩ - شَبْرَاءُ الْحَبَالِين * ، شَجَرَةُ السَّمَر

Sorbus aucuparis (S). Sorbier des oiseaux, S. des

oiseaux, S. sauvage, Cochène (F). Mountain ash,

Rowan (E). Gemeine Ebersche, Ebersche Vogel-

beere (D). Sorbo salvatico, Sorbastrello, Timolna (I).

نوع من الشبيرة وهي شجرة سريرية برية شائعة تملو من
١٢ الى ١٦ م . أثمارها وأنانها ولأوراقها خلية . أوراقها
مركبة وترية التجميع ، وريقتها سنائية ، ذلقة ، مسنة الحافة .
عددها يراوح بين ١١ و ١٧ || أثمارها كروية الرائحة .
لثائية أو رباعية الاقسام . ثمارها ارجوانية كروية ، قطرها
نحو ١٠ م .



شَبْرَاءُ الْحَبَالِين



شَبْرَاءُ برية



غيراء مبدولة



غيشة



غراف



غردة



غشيت

١٩٦١٤ - غشيتة *

Fontinalis (S). Fontinale (F). Fontinalis (E).
جنس طحالب من فصيلة الصرغيات . انواع المروقة قليلة العدد منها مجاري الماء والنامق في البلاد الممتدة الحرارة . جميعها من الطحالب الشطئية الممرودة . بعضها دقيقة كالسنة فراء . اكياس بيضا تاجية الارتكاز .

١٩٦١٥ - شيتال *

Ecaillure (F). Scalling (E).
انتقال القشور الاممي او الحرفشي الذي يلف الجسم عند بعض الحيوانات انحصا القشورات .

١٩٦١٦ - شتراف *

Saurothera (S). Saurochère, Oiseau de pluie (F).
بعضه طائر النيث لانه ييش بقرب حبل المطر عندما يجهر البطاخ الى الغابات والاراج الغظيلة || جنس طير من فصيلة القيقويات . انواعه الممرودة ستة موطنها يمتد من الهند الى جزر الاكليل . ملجها الحياتي جملي . جماعاتها قليلة العدد . قشرا الحشرات والحيوانات والثمار والبرور || اجسها طول من ٤ الى ٤٨ سم . بما فيه الذنب || رؤوسها مستدلة الحبر . متفادها مستطيلة . بيته الاخضداد . اجنسها ذلقة . اذناها بالفة الطول . مستدرة الاطراف . عجلده بخلة غطوط سيد مستدرة يتاحها تيقج ابيض . انواها متراكبة الاوان فيها الاخضر والاصفر والاشفع والافبر والايضا والاسيد || تثن احشاشها في الاشجار الرطبة . انبا تحسن من ٣ الى ٥ فيضات . القترن يستمر نحو ١٥ يوما تقوم به الاناث دون الذكور التي تكون لما القلاء .

١٩٦١٧ - شتردة *

Guettarda (S). Guettarde, Guettardie (F).
جنس طيورات ونباتات برية طية من فصيلة القديرات . انواعها الممرودة ١٥ اصنافا بعض المناطق الاستوائية الاسوية والاربيكة || بعضها فراء . اوراها متطابقة . منقطة . اخضبة . نصالها جامدة بيضه اللون او سناية . انزهارها محوري الارتكاز . انزهارها ثنائية او ثلاثية التجميع . انبوية الكأس . فوارشة البتلات . صطرية العرف . ثمارها نوية للافقة . اشهر انواعها الثلاثة التالية :

١٩٦١٨ - شتردة انيقة *

G. formosa (S).
قشورها مطهرة تشمل لدل الجروح والقروح .

١٩٦١٩ - شتردة لتايكة السكن *

G. diotica (S).
تقبح قشورها دافع كسي .

١٩٦٢٠ - شتردة ملتقيسة *

G. umbigua (S).
تقبح قشورها مفر منشط .

١٩٦٢١ - غشيت *

Coroba cyanea (S). Gu-guit bleu, Oiseau bleu (F). Gu-guit, Bluebird (E).
طائر من فصيلة اللغريات . موطنه بعض مناطق امريكة الجنوبية . يالغ الحياة الجماعية . ييش في الاراج ويسمر حل الثار التناسية في الجنان والحدائق || جسمه صغير الله . وريق القوام . يطول نحو ١٢ سم . لويه جميل

١٩٦٠٦ - غيراء حيوانية

Sorbus umbellata, Pirus meridionalis (S). Sorbier ou ombelles (F).

نوع من الغبراء وهي شجرة سبوتية برية وتزيينة تملو من ٣ الى ٦ امتار . هيكلها حيواني الشكل . اوراها منقسمة مستعرضة تطول من ٥ الى ٧ سم . وتعرض من ٤ الى ٦ سم . نصلها خلى المنقسمة السفلى . حذاه ثنائي التسنين || ثمارها بيضبة الشكل . اربوانية اللون .

١٩٦٠٧ - غيراء فنلندية

Sorbus fenica (S). Sorbier finlandais (F).

نوع من النبراء وهي شجرة برية وتزيينة مبدعا فلتنة . ترب في الاقاليم الباردة . تملو من ٥ الى ١٢ م . اوراها مركبة تطول من ٨ الى ١٦ سم . وتعرض من ٤ الى ٧ سم . نصلها مديد العروق خلى البشرة . اريد الصفحة السفلى . ثمارها مأكلة . قليلة الحفوشة . برفالية اللون . كروية الشكل . طويها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم .

١٩٦٠٨ - غيراء مبدولة *

Sorbus domestica (S). Sorbier domestique, Cornier (F). Common service tree (E). Echar Spierling (D). Sorbo domestico, Sorbo gentile (I).

نوع من الغبراء وهي شجرة سبوتية برية مبدولة تملو من ٣ الى ١٢ م . براعمها لزينة . اوراها مركبة وتريه التجميع وريقها سناية ذلقة تطول من ٤ الى ٥ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . مدها يراوح بين ١٥ و ٢١ سم . نصلها يجر خلى البشرة ثم يفقد الحبل مع الحبر || انزهارها غبراء اللون . خماسية الاكلام . ثمارها اجاصية الشكل مأكلة . تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . لونها ابيض الصفرة يطولوا توشيح احمر ونفحة سمره .

١٩٦٠٩ - غيراء صخشية الورق

Sorbus alnifolia (S). Sorbier à feuilles d'aune (F).

نوع من الغبراء وهي شجرة حرجية سبوتية مبدعا اليابان . تملو من ٥ الى ١٥ م . اوراها بيضبة ذلقة . تشبه اوراك الحشف . تطول من ٦ الى ٨ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ سم . نصلها احضر الصنعتين . ستن الحافة . انزهارها بيض . ثمارها بيضبة الشكل . اربوانية اللون صغر المولج . تطول نحو ١٢ سم .

١٩٦١٠ - غيراء *

Spore
هي البرغ ، اطليه .

١٩٦١١ - غيريات

Sporozoa (F). Sporozoa (E).
هي البويضات ، اطليا .

١٩٦١٢ - غيريات بوغية

Microsporidies
هي البويضات الطفيلية التي تيش حل الحشرات والقشريات .

١٩٦١٣ - غيريبي *

Eremobius (S). Eremobia (F).

جنس نباتات عشية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعها الممرودة قليلة العدد . جميعها من ثبوت بعض مناطق حوض البحر الايبيس المتوسط || بعضها قصيرة . فراء . كلفة الزنب المستطيل . اوراها متراكبة . غشقة النصال . شبه صصيفة الشكل || انزهارها صغيرة . ودية اللون . تنويرها ديبى .

الآرية الجسية وتُزَنّ فيها العسل والطلع || اجسامها قريبة الشبه بأجسام ذكور النحل. قرونها الاستعمارية مسطّلة. ظهورها وبطنها كثيفة الزغب. أظفارها تختلف مع اختلاف الأنواع.

١٩٦٢٨ - عُفْرِي

النثري والعفري من الزرد هو الذي تسقيه السماء. ويسمى العفري.

١٩٦٢٩ - عُجُوم

Gobio (S).
Goujon (F). Gudgeon (E).
جنس سمك نهري من فصيلة الشبوبيات. أنواعه قليلة جميعها مهمة قوتيا للثديان والسمك والبشرى وهي مسطّلة الشكل والمذاقات. أصلها بمحيطات البلاد الآسيوية والاروپية تنجهرها الى الانهار في زين السرة وقد يكون ذلك في اواسط الربيع ثم تدمج اليها في اواخر الصيف || أشهر أنواعه العجوم الشائع.

Gobio fluviatilis (S).
Gujon commun (F). Common gudgeon (E).
نوع من العجوم وهو سمكة نهريّة طول نحو ١٢ سم. جسمها مسطّيل الشكل، زعانفها كبيرة، عذنيها متدليتان. ثوبها الى الربة القضيّة، ظهرها متابع للتدليع الاصفر. ترطب في المياه العذبة الصافية. سرورها يتسمر من ايار الى اواخر تموز. تنحرج بانفائها فوق الصخور فتلتصق بها وتبقى الى ان يتم التفت وقد يكون ذلك بعد السرة باردة او حسة اسابيع. لحمها للذيد الطعم مرغوب فيه.

١٩٦٣١ - عُذْكَو * عُذْرُ * قُرْدُب المتالع،
عصبا الراعي الزياء
Polygnum Ispathifolium (S). Renouée à feuilles de patience (F). Pale persicaria, Willow weed (E). Ampferknechtchen, Pfirsichsücher (D). Persicaria, Erba pepe (I).
نوع من القردوب وهو نبات بري متقني ممر. ساقه فروعاً تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. فروعها دقيقة زياء اللحم. اوراقه متناحية حافضية الشكل طول من ٢ الى ٨ سم. نصلها خلى البشرة، اطبل الخضار. ازهاره سنبل التجميع. سناكه طول من ٨ الى ٨ سم. ازهاره وديّة اللون.

١٩٦٣٢ - عُذْكَو *
Aplisus (S). Aplanis (F).
سمكة بحرية من شاكيات الزمانات وفصيلة الطرنيحات. أصلها تفضل جمع بحار المناطق الاستوائية وألحانة || جسمها بطول من ٣ الى ٥٠ سم. رأسها يرمي الشكل. عيناها ماصحتان. شفتها متدل الرخابة. عذنيها صغيرتان. ثوبها الى الربة القضيّة المتناوطة المماجات السمر. زعنفتان الظهرية كبيرة، مسطّيلة، شاككة المناخس. الذيلية مستديرة الطرف. الثرشية ثلاثية المناخس الحادة. الصدورية مسطّيلة كالجنح وها التناث تسعين بها لقفز فوق الماء || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

١٩٦٣٣ - عُذْكَاف * عُذْكَاف * عُزْوَاب القيط
Corvus frugilegus (S). Corbeau freux, C. chauve, Freux (F). Rook (E).
غُفَات وُفَات ج غُفَان. طائر من الثريان متوسط الحجم طول نحو ٥٠ سم. ثوبه الى السود الاضعف المزاج، ريشه يلس بحجرة. منقاره ورجلاه الى الرمادي الاسمر || وهو

اللون الساطع. وداؤه الى الزرقعة الجسيلة. جناحاه وذنبه واعل ظهوره الى السود الاسمر. عناق قوائمه واباهره الى الصفار الزاهر. منقاره دقيق مسطّيل. حلقته عينه زرقاء اللون. جناحه ذات الطرف. ذنبه قصير الجرم، فارقة الطرف. ريشه دقيق الحبل اللون || طيرانه خفيف الحركة. قوته العسل والحشرات الصغيرة والبار الياينة || يذئن منه في الاجبار القنّاء الاربعة الفل. الانثى تضع ٤ او ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً.

١٩٦٣٢ - عُفِل

يقال فتل اخرج اذا كثّر فيه الشجر وكثك الحديقة واري مكان كان.

١٩٦٣٣ - عُفْ

نبت يختبئ حبه ويؤكل في الجذب. حبه يشبه الجابورس. وهو من تجيل السباغ (السان).

١٩٦٣٤ - عُفْكَه

هو الحسا، اعليه.

١٩٦٣٥ - عُفْكَات *

Capito (S).
Capito (F). Capito (E).
الاسم العلمي من اللاتيني يعني غليظ الرأس. جلس طير من فصيلة الكشائيات. انواعه المعروفة نحو ١٧ جميعها من حل امريكة الجنوبية والوسطى || اجسامها صغيرة القد طول من ١٤ الى ١٧ سم. رؤسها غليظة. منقبيها غزويّة الشكل. شليمة. سبالها كثيفة. تتميز بلباين الاتواب بين الذكور والاناث. اثواب الذكور متراكبة الاثوان الجسيلة، يكثر فيها الاخضر ثم الاحمر والاصفر والاسفر. الاثان عادمة الاخر كبيرة الاصفر الاخضر اجنتها صغيرة، ذلقة الاطراف. اذنانها مسطّية || قوتها الحشرات حل اختلاف فصائلها وانواعها || لثنت احشائها في تجلويث الاجبار وصفوها. انثاها تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً.

١٩٦٦٦ - عُفْكَائِيَات *

Capitonidae (S).
Capitonidae (F). Capitonidae (E).
فصيلة طير من المسفات. اجناسها وانواعها المعروفة مدينة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية والحرارة من الملائين القديم والجديد || طيورها صغيرة القد او متوسطة، جملة الاثوان المتناطقة والمزاجية. تتميز بكثافة سبالها التي تحب في بعض الاتواع، حتى الزود. منقبيها غليظة تشبه غزويّة الشكل. اجنتها متحدة الطول او قصيرة. اذنانها مسطّية او مستديرة. قوتها قصيرة، شديدة النشط || طيراتها قصير الشوط. تتساق الاجبار خفة اما انتقائا على الارض فيطير || قدتن امشاشها اما في تجلويث الاجبار او في عاجر تحضرها في التربة || أشهر اجناسها الغنات والبريكان وقاطرطوف.

١٩٦٦٧ - عُفْكَوَة *

Eucera (S).
Eucera (F). Eucera (E).
جنس حشرات جارية لاهقة من غشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة الثوريديات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحارة والمعتلة الحرارة. قوتها رقيق الازهار ويكويها. مليتها الحياتي جماعي، جامعاها قليلة العدد تختلف من ذكور واثان تمل سوية في سبل الحياة والبقاء. تنهي مشاغلها على الحيطان وتي



عُفَات



عُجُوم شائع



عُذَار



عُذْكَوَة



عُذَات

١٩٦٥ - عُدَّة مَسْتَعْرِبَةٍ ، عُدَّة مَحْتَرَبَةٍ
Thymus (F). Thymus gland (E).

هي غدة المت اللسان في الحيوان .

١٩٦٥١ - عُدَّة مِسْقَادِيَّة
Glande copulatrice (F).
Copulatory gland (E).

١٩٦٥٢ - عُدَّة مَسْرَجِيَّة
Glande ansie (F).
Anal gland (E).

١٩٦٥٣ - عُدَّة مَشْعَرِيَّة
Bulbe pileux (F).
Hair-gland (E).

١٩٦٥٤ - عُدَّة مَصَيَّاه
Endocrine, Glande close (F).
Endocrine, Ductless gland (E).

١٩٦٥٥ - عُدَّة مَصَوَّبَرِيَّة
Apophyse (F).
Apophys (E).

هي الترسوب ، اطليه .

١٩٦٥٦ - عُدَّة مَسْرَعِيَّة
هي بقلة الكلية .

١٩٦٥٧ - عُدَّة عَجَالِيَّة
Glande périnéale,
G. périnéenne (F). Perineal gland (E).

١٩٦٥٨ - عُدَّة قَلَوِيَّة
Glande alcaline (F).
Alkaline gland (E).

١٩٦٥٩ - عُدَّة كُنُطِيَّة
Glande conglobée (F).
Conglobate gland (E).

١٩٦٦٠ - عُدَّة كِلْسِيَّة
Glande calcifère (F).
Calciferous gland (E).

١٩٦٦١ - عُدَّة لَاحِقَةٍ
هي القنعة الاضافية .

١٩٦٦٢ - عُدَّة لُعَابِيَّة ، لَوَزَةُ الرُّطَبِ
Glande salivare (F). Salivary gland (E).

١٩٦٦٣ - عُدَّة لِيْمْفَاتِيَّة ، عُدَّة لِيْمْفَاتِيَّة
Glande lymphatique (F). Lymph gland, Lymphatic
gland, Lymphaden (E).

١٩٦٦٤ - عُدَّة مَحْبِيَّة
Glande vitelline (F).
Vitelline gland (E).

١٩٦٦٥ - عُدَّة مَخْطَاطِيَّة
Glande muqueuse (F).
Mucous gland (E).

١٩٦٦٦ - عُدَّة مَرِيئِيَّة
Glande œsophagienne (F). Oesophageal gland (E).

١٩٦٦٧ - عُدَّة مَصْلِيَّة
Glande séreuse (F).
Serous gland (E).

١٩٦٦٨ - عُدَّة مَعِدِيَّة
Glande gastrique (F).
Gastric gland (E).

١٩٦٦٩ - عُدَّة نَحَاسِيَّة ، عُدَّة بِلْعَمِيَّة
Glande pituitaire, Hypophyse (F). Pituitary gland,
Hypophys (E).
هي غدة قاعدة اللسان .

١٩٦٧٠ - عُدَّة نَسَالِيَّة
Glande du byssus (F).
Byssus gland (E).

١٩٦٧١ - عُدَّة نَكْفِيَّة
Glande parotide (F).
Parotid gland (E).

١٩٦٧٢ - عُدَّة هَضْمِيَّة
Glande digestive (F).
Digestive gland (E).

١٩٦٧٣ - عُدَّة دُ
الغدد هو طاعون الايل .

من القواقع يحوي الشرق الادنى واروية وافريقية الشمالية
والشرقية . يأتلف الحقل والسهول المزروعة المبيسة بالاجمار .
قوته الحشرات والديدان والحبوب . يكثر منه في الاجمار .
اثاثه تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وسحما . يصير
من البلور القشرة لانه يلتهم البذار ويتقي على الحب
الناش .

١٩٦٣٤ - عُدَّة كَلَمَة
Anisogamie (F).
Anisogamy (E).

الندافة احدى طرائق الانسال الثنائي و كنديز ، عذافيء
يتباين انقسامات البويضات الذكرية والانثوية من حيث
الشكل والحجم والرتل .

١٩٦٣٥ - عُدَّة
Glande (F). Gland (E).
عضو في الجسم يفرز مواد خاصة كاللعاب والدمع والرق
والخليب الخ .

١٩٦٣٦ - عُدَّة اِصْطَالِيَّة ، عُدَّة لَاحِقَةٍ
Glande accessoire (F). Accessory gland (E).

١٩٦٣٧ - عُدَّة الرِّحِيْق ، عُدَّة المَغْشَر
Nectaire (F). Nectary, Honey-cup (E).

عضو غدي يتميز به بعض الازهار يفرز عصارة سكرية
تسمى الرقيق او مغش الزهر يجربها النحل .

١٩٦٣٨ - عُدَّة العَرَقِ
Glande sudorifère, G. sudoripare (F). Sudoriferous
gland, Sudoriparous gland (E).

١٩٦٣٩ - عُدَّة اِنْتِجَامِيَّة
Glande lysigène (F).
Lysigenous gland (E).

١٩٦٤٠ - عُدَّة بِلْعَمِيَّة
هي القنعة التناسلية .

١٩٦٤١ - عُدَّة مَتَسَلِيَّة
Gonade (F). Gonad (E).

هي المتسل ، اطليه .

١٩٦٤٢ - عُدَّة ثَوْبِيَّة
Glande moriforme (F).
Moriform gland (E).

١٩٦٤٣ - عُدَّة قَدِيَّة ، عُدَّة مَسْرَعِيَّة
Glande mammaire (F). Mammary gland (E).

١٩٦٤٤ - عُدَّة مَحْمِيَّة
Glande acide (F).
Acid gland (E).

١٩٦٤٥ - عُدَّة دَبْرِيَّة
Glande uropygiale (F).
Uropygial gland (E).

١٩٦٤٦ - عُدَّة دَرَقِيَّة
Glande thyroïde (F).
Thyroid gland (E).

١٩٦٤٧ - عُدَّة دُهْنِيَّة
Glande sébacée (F).
Sebaceous gland (E).

١٩٦٤٨ - عُدَّة دَمَطِيَّة
Glande uropygiale (F).
Uropygial gland (E).

القنعة السطلية غدة ، مركزها في الزئبق اي القطن ، تفرز
مادة دهنية يستعملها الطائر في سفل ريشه . وكذا أيضاً
غدة دبرية .

١٩٦٤٩ - عُدَّة رَحِيْقِيَّة
Glande nectarifère (F).
Nectariferous gland (E).

انواعه عديدة . سيقها فراء . فروجها زباد اللحم . اوراقها مسنقة ، غنية ، ثلاثية التجميع . نصلها اهليلجي الشكل . مقر الصفحة . انزهارها سبيل التجميع ، طرفي الزركاز . انزهارها عشوية ، صغيرة القند ، صفراء اللون ، خضر الملمع .

Scyllium (S). **عُقَاب** ١٩٦٨٨
Roussette, Chien de mer (F). Dog-fish (E).
جنس اسماك بحرية من القرشيات . انواعه المروفة قليلة . اجسامها مسطحة ريشية . جلوحها غشة مدنية الحراشف . لونها مأكلة متوسطة الصفن || اعرفها واشهرها الفراء المنشفة والفراء المدبجة .

Scyllium catulus (S). **عُقَاب هُدْ بَسِجَة** * ١٩٦٨٩
Roussette à grandes taches (F). Lesser spotted (E).
نوع من الفراء ، موطنها المتوسط والمحيط الاطلسي . طول نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الصبغة الصفراء ، يملؤها تديج لا يقاسي الرقشة والقرن تكثر فيه الاستدارة والسواد البنفسجي المزاج .

Scyllium canalicul (S). **عُقَاب مُنْمَطَة** * ١٩٦٩٠
Roussette à petites taches (F).
نوع من الفراء ، موطنها المتوسط والمحيط الاطلسي . طول نحو ٨٠ سم . ثوبها الى الصبغة المنشفة بالكحبة .

١٩٦٩١ - عُقَابِيَّات ، كُوسَجِيَّات

Scyllorhinidae, Oractolobidae (S).
Scyllorhinidae, Oractolobidae (F). Scyllorhinidae, Oractolobidae (E).

فصيلة اسماك مفرسة من رتبة الاضلاع . اجناسها المروفة قليلة العدد منها البويض والسرايد . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مسطحة وشعية الشكل . اعطائها ذلقة شارب . اسنانها مشاربة حادة تقطع كل شيء . زعانفها كبيرة . تتميز بزعانفها الشبكية المثلثة الانساقوية الجرم اذ يفوق حجم الفلقة العليا ضمت حجم الفلقة السفلى || اشهر اجناسها الفراء والكوسج .

la Corbeau (F). **عُقَاب** ، **عُصْبَاء** ، **يَسْمَانِي** ١٩٦٩٢
Corvus (E).
الغراب والنباء الياباني اسمان لكوكبية جنوبية الموضع مركزها غلبت الباطية على جنوب السك الاطول || عدد نجومها سبعة والعرب تسميها حلة « حين الاسم » او « عرش السك الاطول » او « الأحال » . ومن هذه الكوكبية نجمان مزيجيان الاول منها يدعى « عيباء » او « سبا » او « مقار الغراب » . والثاني يدعى « الجبلج » او « جناح الغراب الايمن » .

Corvus (S). **عُقَاب** ١٩٦٩٣
Corbeau (F). Crow (E).

سبي غراباً لسواده . ج غرابان واغربة واغرب واغرب واغرب . كتيبه ابو حاتم وابو جنداد وابو الجراح وابو سذر وابو زيدان وابو زاجر وابو الشؤم وابو غيث وابو القمقام وابو المرقال . ويقال له ابن الارض وابن برع وابن دابة . جنس طير من فصيلة الغرابيات ورتبة الجوارح . انواعه ١٠ منتشرة في جميع اقطار العالم . اشهرها الغراب الاسمر والابيض والاصفر والاكمل والاورق والقرع والندفان . معظمها من القواطع وبضها من الاوابد . قوتها الحشرات والديدان والحيويات والاسماك والقرشيات وبادر الزروع والحبوب النافثة . تمن في الاجمار الليلية . انها تصنع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها .

١٩٦٩٤ - **عُدَّة تَسْلِيَّة ، عُدَّة شَقِيَّة**
Glandes génitales, G. sexuelles (F). Genital glands, Sexual glands (E).
هي القند التي تفرز المواد التناسلية من شلج وبيضات .

١٩٦٩٥ - **عُدْرَانِي ، عُدْرِي ، مَتَعِي**
Palusce (F). Paludal (E).

نمت تعريف يطلق على كل نبات يعيش في البندان .

١٩٦٩٦ - **هَدَقَة**
Testa
الغلاف الخارجى البيضاء والبزرة .

١٩٦٩٧ - **هَدَقِي**
Pluie (F). Rain (E).
التدق هو المطر فاذا كثر قطره فهو غادق . وغدت الارض : اجلت بالندق فاعصب .

١٩٦٩٨ - **هَدَقِي**
Très fertile (F). Very fertile (E).
نمت تعريف يدل على الفزارة .

١٩٦٩٩ - **هَدَقِي**
Glandulaire, Adénoïde (F).
Glandular, Adenoid (E).

١٩٦٨٠ - **هَدْرِي** *
Limnétique (F).
Limnetic (E).

نمت تعريف يطلق على كل ما له صلة بالبندان والمنابع والاقوار والبيمرات . كقولك كتيبت القندرية .

١٩٦٨١ - **هَدَا**
Urine du chameau
الندا هو بول الجمل .

١٩٦٨٢ - **هَدَاك**
Aliment
هو ما به تماء الجسم والحفاظ عليه وهو جزء للامدة الغذائية الذي يتحول منه الحيوان ، في جهاز الهضم ، الى صالح ينقل الى الدم فيغذي الجسم . وهو من النباتات ما يتحول الى الفولة من نسع صاعد بلعل الى نسع سوي كاسل . (راجع حلف) .

١٩٦٨٣ - **هَدَامَة**
Brasénia (S). Brasénia (F).
غداة ج خذم وفدام . نبات وسيد الجنس والنوع من فصيلة النيفرديات . اصلها مناتق العالم القديم . ساقه فراء تكسها غشمة لزبية . اوراقه مسنقة ، سنائية تطول من ١٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها ملس البشرة اللامعة - آخر الصفحة السفلى وسنار العليا . انزهار صفيرة القند ، قطرها نحو ١٠ سم . ثوبها الى القبيص الاخضر || انزهارها يسمر من حموز الى اواخر الخريف .

١٩٦٨٤ - **هَدَدِي ، هَدَوِي**
Festus
الندي والندوي : كل ما في بطون الحوامل اسمها الناء .

١٩٦٨٥ - **هَدَر**
Abecquer (F). To fond (E).
غر هادار فربه اي زده . للفرار : اترك .

١٩٦٨٦ - **هَدَر**
قال الانصري : الفَرَّ طير سود يبيض الرووس من طير الماء . الواحدة غرة . الذكر والاني في ذلك سواء (ابن سيدة) . والفَرَّ الجليل هو الاختنورة ، الحليها .

١٩٦٨٧ - **هَدَرَام** *
Peperomita (S).
Pépéromie (F). Pepper elder (E). Pfeffergesicht (D).
Pope porporino (I).
جنس نباتات حنينية عشوية معمرة من فصيلة النفلديات .



غَرَام



غَرَام مدبجة



غَرَام منشفة

١٩٧٠٤ - **غُرَابِيَّاتُ الْمَتَايِر** (F). *Coracrodontes* (F).
رَبِيَّةٌ مِنَ الطُّيُورِ الْجَوَائِمِ تُشَمَلُ بِمَعْنَى الْقَصَاثِلِ . اِشْتَرَاهَا
لِقَرَابَاتِهَا وَالزُّرُورِيَّاتِ .



غُرَابِ أَبْعَج

١٩٧٠٥ - **غُرَابُكَ**
الْقِرَادَةُ ج غُرَابٌ . غُرَابٌ مِنَ الْكَلَامَةِ (الْأَسَانِ) .

١٩٧٠٦ - **غُرُوكَ ، قَدْرُوكَ** (F). *Interligne* (F).
Space-line, Lead (E).
الْحَافِظَةُ بَيْنَ الرَّيْزِ وَالرَّيْزِ أَوْ بَيْنَ السَّرِيفِ وَالْعَرِيفِ
أَوْ بَيْنَ الْخَطِّ وَالْخَطِّ فِي الْقُرْسِ لِلنَّصِّ الْمُسَطَّرِ .



غُرَابِ أَسَم

١٩٧٠٧ - **غُرُوكَ** (F). *Etoile du matin* (F).
Morning star (E).
النَّجْمُ أَوْ نَجْمُ الصَّبَحِ لَاحَةً يَبْرُقُ بِطَرَفِ النُّجُومِ .

١٩٧٠٨ - **غُرَابِيَّةٌ** (F). *Gratiola* (S). *Gratiola* (F).
جَنَسٌ مِنْ نَبَاتَاتٍ عَشْبِيَّةٍ بِرَبْعَةِ مَسَرَّةٍ مِنْ صِلَةِ الْخُضْرَانِ بِرَبَاتٍ .
أَنْوَامُهَا نَحْوُ ٢٠ مَسَرَّةً فِي جَمِيعِ الْأَصْوَاعِ الْمَمْتَلَةِ الْخُضْرَاءِ .
أَوْرَاقُهَا مُتَقَابِلَةٌ حَامِصَةٌ ثَلَاثِيَّةٌ أَوْ خَلْصِيَّةٌ لِمُرُوقِ الْعُلْبِيَّةِ
تُحْصَلُ السَّيْنُ الْخَافَةِ . أَنْبَارُهَا قُرْبِيَّةٌ أَبْيَضَةٌ ثَلَاثِيَّةٌ الْوَلَنِ
يُغْلَبُ فِيهَا الْأَصْفَرُ وَالْوَدِيدِي فِي أَشْهُرِ أَنْوَامِهَا الْفَرَايِدُ
الْحُزْنِيَّةِ .



غُرَابِ أَسَم

١٩٧٠٩ - **غُرَابِيَّةٌ مَغْرَبِيَّةٌ** ، **عَقِيْقَةُ**
الْمَغْرَبِ ، **عَشْبَةُ الْمَغْرَبِ**

Gratiola officinalis (S). *Gratiola officinale*, *Herbe*
au pauvre homme (F). *Hedge hyssop*, *Poor-man's*
herb (E). *Echta Gnadenkraut* (D). *Gratiola*, *Piccola*
digitalis (I).

نَوْعٌ مِنَ الْفَرَايِدِ وَهُوَ نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ يَرِي مَعْرُوفٌ جُلُومِيٌّ
يُعْمَشُ فِي الشَّجَرِ وَهُوَ مُغْلَبٌ لِلْمَاءِ يَحْمِلُ مِنْ ٢٠ إِلَى ٦٠ سَمِ .
أَوْرَاقُهُ أَعْلِيَّةٌ خَضِرَةٌ تُحْصَلُ . أَنْبَارُهَا أَبْيَضَةٌ مُنْقَطِعَةٌ صَفْرَاءُ
الْبُيُوتِ ، وَرَبْدَةُ الصَّفْصَفَةِ فِي سَمْتِهَا كَامُتٌ نَائِمٌ مَعَ الْعِلْمِ
أَنَّهُ مِنَ النَّبَاتَاتِ السَّامَةِ الَّتِي تُوجِبُ الْمَوْتَ .



غُرَابِ الدَّرَجِ

١٩٧١٠ - **غُرَامُ** (F). *Gramme* (F). *Gramme*, *Gram* (E).
وَسَعْدَةٌ وَزْنِيَّةٌ ، الْأَوْنُ مِنْهَا يَسَاوِي كِيلُوغَرَامَ .



غُرَابِ لُبْنَانِي

١٩٧١١ - **غُرَابَةٌ** (F). *Amende*, *Pénalité* (F).
Fine, *Penalty* (E).
جَزَاءٌ لِقَدْ يَفْرَضُ بِصَفَةِ عَقُوبَةٍ .

١٩٧١٢ - **غُرَابَةٌ إِجْرَائِيَّةٌ** (F). *Amende de procédure* (F). *Fine of procedure* (E).
نَوْعٌ مِنَ الْقَرَامَاتِ الْمَدِينِيَّةِ تُفْرَضُ لِقَضَائِمِ مَعْرِ الْإِجْرَائَاتِ
مَعْرِ مُنْتَظَمَةٍ .

١٩٧١٣ - **غُرَابَةٌ جِنَايَاتِيَّةٌ** (F). *Amende pénale* (F).
Penal fine (E).
عَقُوبَةٌ مَالِيَّةٌ تُكُونُ أَضَافَةً فِي الْجُنَايَاتِ . وَأَصْلِيَّةٌ أَوْ أَضَافِيَّةٌ
فِي الْجُنْحِ . وَدَائِمًا أَصْلِيَّةٌ فِي الْخَالَفَاتِ . وَهِيَ تَتَزَمُّ الْمَحْكُومَ
عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ إِلَى الْخِزَانَةِ الْمَالِيَّةِ .



غُرَابِيَّةٌ عَزْنِيَّةٌ

١٩٧١٤ - **غُرَابَةٌ هَدَكِيَّةٌ** (F). *Amende civile* (F).
Civil fine (E).
هِيَ الْقَرَامَةُ الَّتِي تُحْكَمُ بِهَا لِمَنْ سَلَسَ الْحَاكِمَ الْمَدِينِيَّةَ بِنَاءً عَلَى مَا
نَصَّ عَلَيْهِ الْقَانُونُ الْمَدِينِي .

١٩٧١٤ - **غُرَابِ أَبْعَج** ، **غُرَابِ الْبَيْتِ** ، **قَلَقِ**
(F). *Corvus cornix* (S). *Cornaille mantelée*, *C. candré*,
Corbeau mantelé (F). *Hooded crow*, *Gray-back*
crow (E). *Nebelkrähe* (D).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْقُرَابِ . جَسَدُهُ مُنَوَّسٌ أَسَدٌ ، يَطْلُقُ
نَحْوَ ٥٠ سَمِ . رَأْسُهُ وَصَدْرُهُ وَبَطْنُهُ وَخَدَايُهُ وَخَدَايُهُ وَجِلْدُهُ
أَلْوَنُ السُّودِ الْبَاقِي . تَطِيرُ وَهِيَ أَلْوَنُ الرُّبْدَةِ الْخَضْرَاءِ . سَرَبُهُ
كَثِيرٌ الْعَدَدُ . يَأْكُلُ الْخَبْثَ وَالسَّهْلَ وَصَلَفَاتِ الْإِنْسَانِ
وَشَوَاطِي الْبَحَارِ .

١٩٧١٥ - **غُرَابِ أَسَم** ، **غُرَابِ لُوتَحِي**
(F). *Corvus corax* (S). *Corbeau commun*, *Grand cor-*
beau (F). *Common crow*, *Common raven* (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْأَوْبَادِ . جَسَدُهُ كَثِيرٌ أَسَدٌ ، طَوْقُهُ نَحْوُ
٦٥ سَمِ . وَبَطْنُهُ نَحْوَ ١٠٠ سَمِ . لَوْنُهُ أَسَدٌ الْوَلَنِ السُّوِّي
الْأَبْعَجِ . يَطْلُقُ حَوَاجٍ مُتَنَادِلَةً أَلْوَنَةً وَاحِدَةً . يَأْكُلُ
الْأَحْرَاجَ وَالْجِبَالِ . يَعْشُ أَنْوَامًا جَارَةً مِنْهَا نَحْوُ ١٠٠ سَمِ . اِسْتَعْدَّ
خِيَرَتَهُ مِنَ الْخَشَرَاتِ وَالْوَدِيدَاتِ وَالْعُطَاءِ وَالْقُرْبَانِ وَالْقَصَاثِلِ
وَيُعْشِ النَّصَائِرَ وَالْجُورِ وَالْإِنْسَانِ .

١٩٧١٦ - **غُرَابِ أَسَم** (F). *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (S). *Corbin crabe* (F).
Carrion-crow (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْقُرَابِ مُنَوَّسٌ أَلْبَنُ ، طَوْقُهُ نَحْوَ ٤٢ سَمِ .
لَوْنُهُ أَسَدٌ الْوَلَنِ السُّوِّي الْأَبْعَجِ . مُتَقَارِبٌ وَجِلْدُهُ إِلَى الْخَمْرَةِ ،
يَأْكُلُ سَرَبَهُ الْجِبَالِ وَهُوَ حَزْبٌ الْجُودِ لَيْلُهُ : هُزْزٌ
مِنَ الْقُرْبَانِ الْأَبْعَجِ .

١٩٧١٧ - **غُرَابِ الرُّوْعِ** ، **غُرَابِ أَوْدِي** ، **شُوكَةُ**
(F). *Corvus monedula* (S). *Corbeau choucas*, *Chou-*
cas (F). *Jackdaw* (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْقُرَابِ صَغِيرٌ أَلْبَنُ ، طَوْقُهُ نَحْوَ ٣٦ سَمِ .
رَأْسُهُ وَوَجِلْدُهُ وَخَدَايُهُ أَلْوَنُ السُّودِ الْقَصْبِيِّ الْأَبْعَجِ . عَقْبُهُ
وَصَدْرُهُ وَهِيَ إِلَى الْكَبْكَبَةِ الْخَضْرَاءِ . يَعْشُ جَاهَاثَاتٍ كَثِيرَةً .
سَرَبُهُ كَثِيرٌ الْعَدَدُ . يَأْكُلُ الْأَحْرَاجَ الْمُبَشَّرَةَ الشَّجَرِ وَالْبُيُوتِ
الْخَرِبَةَ وَالْمَوَاقِعَ الصَّخْرِيَّةَ . قُوَّةُ الْخَشَرَاتِ وَالْوَدِيدَاتِ وَالْجُورِ
وَالْبَزَارِ النَّاتِلِ .

١٩٧١٨ - **غُرَابِ الْقَبِيلِ** . هُوَ الْخَشَرَاتُ ، أَطْلَقَ .

١٩٧١٩ - **غُرَابِ الْبَيْتِ** . هُوَ وَاقٌ الشَّجَرِ ، أَطْلَقَ .

١٩٧٢٠ - **غُرَابِ الْمَاءِ** . هُوَ الْوَقْدُ وَالْمَاءُ .

١٩٧٢١ - **غُرَابِ لُبْنَانِي** ، **زُفْتُ**
(F). *Pyrrhocorax graculus* (S). *Corbin chocard* (F).
Chough (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْأَوْبَادِ صَغِيرٌ أَلْبَنُ ، طَوْقُهُ نَحْوَ ٤٠ سَمِ .
قُوَّةُ أَسَدٍ الْوَلَنِ يَطْلُقُ عَشْرَةَ زُرُوقَةٍ . مُتَقَارِبٌ إِلَى الصَّفْرَةِ .
رَبِيلُهُ إِلَى الْخَمْرَةِ . مَوْطِنُ الْبِلَادِ الْأَلْبَانِيَّةِ وَيُجْرَاهَا . يَأْكُلُ
الْجِبَالِ فِي الصَّيْفِ وَيَعْشُ عَلَى الشَّجَرِ فِي شَتَاءِ . سَرَبُهُ
مُنَوَّسٌ الْعَدَدُ . قُوَّةُ الْخَشَرَاتِ وَالْوَدِيدَاتِ وَالْبَزَارِ وَالْجُورِ
النَّاتِلِ .


١٩٧٢٢ - **غُرَابِيَّةٌ** (F). *Consolide* (F). *Consolid* (E).

١٩٧٢٣ - **غُرَابِيَّاتُ** (F). *Corvidae* (S).
Corvidae (E).

فَصِيلَةُ الْقُرْبَانِ مِنَ الْجَوَائِمِ الْقَرَابِيَّةِ لِلنَّاتِلِ . فِيهَا الْقُرَابِ
وَالْقَصَاثِلُ وَالْقَلَقُ .



غريبوط الصنوبر



غريل



غرة



غرة جميلة

١٩٧١٥ - غرنايت

Granit (F). Granite (E). هو الأمل، صخر بلوري شديد الصلابة متجانس الألوان يتكون من الفلسبا والفلق والرو .

١٩٧١٦ - غرنايتي ، ستاتي ، صواني

Granitic (F). Granitic (E). تمت ترميز يطلق على ما هو صواني التركيب .

١٩٧١٧ - غروب

هو المحور القرائي ، اطلبه .
١٩٧١٨ - غروب
القرب : داء يصيب الشاة فيتمتع غرطوبها ويسقط منه شعر العين (السان) .

١٩٧١٩ - غربال

Crible (F). Sieve, Riddle (E). مسدة نقيق التواب .

١٩٧٢٠ - غربالسي

Cribiforme (F). Cribiform (E).

١٩٧٢١ - غربكة

Criblage (F). Sifting (E). تفرير الحبوب عن الفتك والاجرام الغريبة .

١٩٧٢٢ - غروبوس

Cymothos (S). Cymothod, Poux de poisson (F).

جنس دويبات بحرية من القشريات مساويات الارجل فضيلة الترويبات . انواعها المروسة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه مبطلة ، قروية الشبه بالهدية ، طولها من ٣ الى ٥ سم . منها انواع تصطاد على الاسماك .

١٩٧٢٣ - غروبوسيات

Cymothoidae (S). Cymothoidae (E).

فضيلة دويبات بحرية من القشريات مساويات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها اهلجية مبطلة شبيهة باجسام الهدية طولها من ٥ الى ١٠ سم . اخطامها مجهزة بدهة ماسية || بعض اجناسها يتطفل على الاسماك .

١٩٧٢٤ - غروبوط الحراج

Grypotes silvestris (S). Grypote des forêts (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير اللد يظل نحو ٥ سم . || رأسها مستعرض قليل النتوء ، اسفر العين . خطها مثل الطول . عينها كبيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كسلها ينفي الشكل ، اسفر العين اسفر اللوح . حفيفها مزوانية ، صفراء ، ظهرها كامل الخبيجة ، لاحف ، اغضر العين ، بني الطرف . روثناها عشائيان ، شفافان . بطها الى الخلفي الاسمر . قوائمها كهيئة الحلب الشائك || تألف الحراج اصحابها حراج الصنوبر .

١٩٧٢٥ - غروبوط الصنوبر

Grypotes puncticolis (S).

حشرة من فصيلة الوزيديات صغيرة اللد ، طولها نحو ٤ سم . جسمها متاني الشكل . زباناها خيطية مستطيلة . ثوبها الى الصفار الخشن الناعم . مرتها الصنوبر على اختلاف انواعه ، يكثر وجودها من تجوز الى تشرين الاول . اضرارها زهيدة لا تستوجب العناية .

١٩٧٢٦ - غروبيل

غروب من جنس الطائف المشهور وهو ارق النبت واصله سواد .

١٩٧٢٧ - غروبيل

Cancellaria (S). Cancellaire (F). Cancellaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل فضيلة التريليات . انواعها المروسة كثيرة العدد بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والطيابية والبيض الاصفر الذي يتناثر اللة ماصر منتشر في جميع بحار البلاد الحارة || اصداها شبه يضية الشكل او برجية ، ذلقة الاحقاب ، مضطبة الاريلة ، قروية القوطة ، مشبكة الصفحات الحارابية المبهمة بالالوان العابقة .

١٩٧٢٨ - غروبيليات

Cancellaridae (S). Cancellarides (F). Cancellarides (E).

فضيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المروسة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة . جسمها زائلة تعيش على التنبوت البحرية || اصداها شبه يضية الشكل ذلقة الاحقاب الهلزية ، صغيرة الؤلوس المستطيلة ، قصيرة الزروس ، ثنائية الؤلوس الشديدة الانفتاح ، صغيرة الارجل المزوانية الشكل || اعرف اجناسها الغريبة .

١٩٧٢٩ - غرة

Sison amomum (S). Sison amome, Berle aromatique (F). Bastard stone parsley, Hedge sions (E). Amomlein, Würziger Herrukümmel (D). Sison, Amomo falso (I).

عشبة برية من فصيلة السيوليات . جذورها وتماها عطرة طيبة ، كانت ولا تزال تستعمل كقوية . منها بعض مناطق حوض البحر المتوسط . توجد بين الازروع وقرب السياجات ويجاري الماء || اوراقها متعاقبة ، مركبة . وريقاتها ودية التجسيم ، مفرصة التصل . ثمارها جراء عديدة مكورة الطرف .

١٩٧٣٠ - غرة

Fulica (S). Foulque (F). Coot (E). الفرقة والفرج غر . جنس طيور مائية من فصيلة التخلقيات . انواعها ١٢ منتشرة في جميع اصقاع العالم . تتميز بمقاومتها القوية للمدبة الطرف . روثها مدببة الوجة . اجناسها قليلة وقصيرة . اذنانها صغيرة مستديرة . اسرارها قوية . غالبا مستطيلة || اشهر انواعها الفرقة السوداء والفرقة المتوجة .

١٩٧٣١ - غرة جميلة

Anthocharis eupheno (S).

Anthocharis des crucifères, Aurore de Provence (F).

Anthocharis eupheno (E).

حشرة من فصيلة الكروبيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها واضحة قتها رقيق الازهار . سرتها تعيش على اوراق الصليبيات البرية والزراعية || جسمها متدل اللد يظل نحو ١٤ سم . بطها نحو ٤٢ سم . رأسها اريد . عينها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشها الى الوحلة الرصاصية اللوح . بطها الى الوردية الاسمره || روثناها الاسمايان ، منه الذكر ، الى الصفرة يعلوها من الزام الثالث الى الطرف مشمة برتقالية نارية يطلوها اطار اسود .

وراء عند الاثنى الى البياض الاصفر تملو في افرام الرابع شمس طحال يقابلها طحال صغير اسود. ووشاحا الخلفيان ، عند الشقين ، الى البياض الاصفر الموراج تملو رقة طحال خفيفة وست تمل سد هاشية الاذنكاز || لها جيل واحد في الجيل . تظهر القراشة في نيسان . تسرح في النهار . تعالج بعد ظهورها ستة اسابيع وتصلح للمك قطعاً مستطيلة على اتصال الاوراق || السرة عمو ٣٤ سم . جسمها اسطواني الجرم ، مائل التشاير ، يملو حل قصير . ثوبها الى الطغلة السبورية الموراج يملو خطان جانبيين ابيضان وعشرة اطوار خيلة تنتهي عند الذنب . اطوارها الى السرة السوداء . رأسها ومذنها ورواجها الى الربعة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعاً يتبقى ضمن غشاء متين داخل لفافة من الاوراق المتعولة .



عُرَّة سوداء

١٩٧٣٨ - عُرونية قُصْرَجِيَّة

Gardénia thunbergia (S). *Gardénia de Thunberg* (F). جنبة جاسدة ، مهدا بلاد افريقية الجبوية . صلبها تمل نحو ٢٠٠ سم . اوراقها سائبة الشكل ، مائلها عايق الخضار اللامع . اوراقها طرفية الاذنكاز . حطرية الواجهة ، ثمانية كتلات البيض ، نوحها اسطواني الانبوب ، خماسي او سداسي للتشرح الطرقي || ازهارها يستمر من كانون الثاني الى اذار .

١٩٧٣٩ - عُرونية رُصْبَانِيَّة

Gardénia rochmanni (S). *Gardénia de Rochmann* (F). جنبة سرية مهدا بلاد افريقية الجبوية . صلبها تمل ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها اعليجية الشكل ، نصلها فسفي اخضر الزاهي . ازهارها متوسطة القد ، عطرية الرائحة المشبعة ، سداسية الكتلات البيض || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .



فربيل المنصف

١٩٧٤٠ - عُرونية كَبِيرَةُ الزَّهَر * ، عُرونية بَاسْمِيَّة

Gardénia jasminoides, G. *florida* (S). *Gardénia à grandes fleurs* (F). جنبة سرية شائعة الانتشار التريسي . مهدا الصين . تمل نحو ٢٠٠ سم . اوراقها اعليجية تملون من ٧ الى ٩ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ سم . نصلها جبل اخضر اللامع الزاهي . ازهارها فواصة العرف الطرقي ، تبهر بياض اللون ثم تتسرف الى الصلوة وهي كبيرة الحجم قطرها نحو ١٠ سم || ازهارها يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .

١٩٧٤١ - عُرونية مَجْدَرَكَة

Gardénia radicans (S). *Gardénia radicans* (F). علة صغيرة القد شائعة الانتشار التريسي . مهدا اليابان . تمل نحو ٩٠ سم . صلبها مجذرة . اوراقها متالية لامة النصل . ازهارها فواصة العرف الطرقي ، نوحها اسطوانية ، بتلاتها حاجية ، منها البسيطة ومنها المكبة || ازهارها يستمر من اذار الى حزيران .



عرونية كبيرة الزهر

Gordonia (S). *Gordonia* (F). عُرونية جنس نباتات معقدة تتميز على اسم الشاغل الانكليزي « غوردون » وهي من فصيلة الكاسليات . انواعها المعروفة ١٠ مهدا الشرق والبلاد الامريكية . منها القوية والزرامية والتريونية . اوراقها ابيدة او مائلة ، متعاقبة ، معتقة ، جاسدة لتصل الجملدي . ازهارها فردية التجميع ، لا قياسية الاذنكاز ، بياض اللون ، مستحبة القرف الطرقي || اشهر انواعها ما يلي :

١٩٧٤٣ - عُرونية خَضِيلَةُ زَهَر *

Gordonia lasianthus (S). *Gordonia à fleurs velues* (F). نوع من القرونية وهي جنبة سرية شائعة الانتشار التريسي تمل من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها ابيدة سائبة الشكل تملون من ٨ الى ١٣ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مائل البشرة ، مشطاري الحافة ، باحت الخضر الفاتح . ازهارها بياض اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ١٠ سم . بتلاتها خلية البشرة . حرفها ذكي الرائحة القرواسة || ازهارها يستمر من آب الى تشرين الثاني .



عرونية خضيلة زهر

١٩٧٣٢ - عُرونية صَوْدُكَة *

Folice stris (S). *Fouque noire*, F. *morille*, *Macroule* (F). *Common oot* (E).

طائر من القرف ، موطنه فسبح الاجرام يمتد من الشرق الى اربوة وافريقية . يعيش جهات كبيرة العدد . سره يشمل عدة مشات . طوله جثة يراوح بين ٣ و ٤٥ سم . رأسه مدق الى السواد الباق . ظهروه وجناحه وذنبه الى السواد الرصاصي الموراج . بقلته وخوافيه الى السواد الازرق . جيته غبراء الدجج . متقار ودي اللون ، حيتاه قريزيان . ساقاه رديتان تملو حلقة مستعرفة جلوية اللون خضراء الموراج || يائف التامق والبحيرات . قوته الحشرات والنباتات المائية . يثن في شق يقيم على سطح الماء بين القصب والدار والاسل وما اشبه . انتاه تقص من ٧ الى ١٥ بيضة تحضنها بعدها نحو ثلاثة اسابيع .

١٩٧٣٣ - فربيل الصَفَصَف *

Gracila minuta (S). *Gracila de l'oier* (F).

حشرة خالصة من فصيلة القريزيات . طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم . جسمها مستطيل الشكل سوي اللون الاجر والامر الموراج || تظهر الحشرة الجملدي في شهر تموز وتضع مكبها بعد التماثل ، في خلال شهر آب ، على مختلف البيدات المقطوعة من فضلي القديات والقروديات واعصها الصفصاف والكتكنا . يرتقيها فرباء اللون سمراء الرأس تميل على نضبان ويبدان النباتات المذكورة تضلها وتمنع استعمالها الصناعي .

١٩٧٣٤ - عُرونية كَبِيرَة

في الجبتم جنس اشجار من الكلوزيات .

١٩٧٣٥ - عُرونية

Gezouiller (F). *To chiep* (E). عُرونية الطائر او زرق : بلغ صوته وطرب به او معتدل

١٩٧٣٦ - عُرونية كَبِيرَة

علم اصول الادوية ونظريات قواعدها وطرق استعمالها .

١٩٧٣٧ - عُرونية ، عُرونية

Gardénia (S). *Gardénia*, *Gardénia*, *jardin du Cap* (F). *Cape-jasmine*, *Gardeni* (E). *Altgenreische gardenie* (D). *Gardénia* (I). جنس نباتات برية وتريونية من فصيلة القرويات . انواعها نحو ٤٠ منها الشجيرات والجنبات . جميعها من نباتات

اخضتة ، يكثر فيها الطيبان الاصفر والسينات الوردية التي تتميز كآساس النوع || انزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٩٧٥٠ - حُرْدُونِيَّة يَحْمُورِيَّة

Pyrethrum tchihatchewi (S). *Pyréthre gezonnant* (F).
نوع من القردوب وهو عشبة معمرة عديمة الساق ، خلية الاحشاء تملو من ٥ الى ١٥ سم . اوراتها عبطية التفريص .
رؤوسها الزهرية فردية للتجميع تقدم على شراخ قروي الانتداب || انزهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٩٧٥١ - حُرْدُونِيَّة ٥

Garidella (S). *Garidelle* (F). *Garidella* (E).
جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية ، مغترية من فصيلة الفقيقيات . انواعها المرفوعة قليلة العدد منها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا || بعضها عديمة الفروع او قليلتها تتنبت بالانشار . اوراتها متعاقبة ، مفصلة الى غرق خلية او شمعية . انزهارها خالصة التركيب . يتلأها كولية الشكل ، متصصة ، صفراء اللون || تنديدها ربيعي

١٩٧٥٢ - حُرْدُونِيَّة

Gardénia (F).
هي القردونية ، اطليا .

١٩٧٥٣ - حُرْدُون

Aldá (F). *Chance* (E).
هو احتمال حدوث شيء غير مضمون .

١٩٧٥٤ - حُرْدُون

Aldá (F). *Chance* (E).
هو القرد ، اطليه .

١٩٧٥٥ - حُرْدُون

Aldá (F). *Chance* (E).
هو القرد ، اطليه .

١٩٧٥٦ - حُرْدُونِيَّة

Equisetum (S). *Equisetum* (F). *Horsetail* (E).
هي الكنبات ينبت على شواطئ الانهار لا ورق له وهو ذو اماسخ الزهرية ، الواحدة في جوف الاخرى فاذا اجتلبتها خرجت كأنها حشاس اخرج من مكلته .

١٩٧٥٧ - حُرْدُون

Implant (F).
اسم يطلق على المنتجات القوية وعلى مركبات الحرومن التي تستعمل في التبييض الخلوي تحت الجله .

١٩٧٥٨ - حُرْدُونِيَّة ٥ ، حُرْدُون ، حُرْدُون ٥

Gallietis barbara (S). *Grisson talra*, *Huron*, *Hyrra* (F).
حيوان لاحم مفترس من فصيلة السورديات . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى والبارزيل . يألف الاحراج والسحاب الزرقعة العشب . ملجئه الحيواني جامي . جماعته تعد من ٦ ازواج الى ١٢ زوجاً || جسمه ابيض الشكل مستطيل . طوله نحو ١١٥ سم . عا فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . رأسه معتل الجرم وانحط . عتاه واذا سمعت مستديرات . سباله معتل الكثافة والطول . قوائمه قصيرة . براكته حادة الاطراف القليلة التجميع . غذاه للشرعية تفرز مادة دهنية سكية العرف . وبره نام وقصير . ثوبه الى الشبهة السرمل النسوية || الاثنى تقص من جردون الى ثلاثة اجزاء مرة واحدة في الحول || مسرجه دجوي . يتعدو بسرعة جازة ويتسلق الاجسام بشفة . قوته كل ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والطيور .

١٩٧٥٩ - حُرْدُونِيَّة زَيَاة

Gordonia altamaha (S). *Gordonia de l'Altamaha* (F).
شجرة من القردونية تملو نحو ٥ امتار . معدها السواد الاريكية . اوراتها حاملة اهلجية الشكل ، مقنطية التاجعة ، طول من ١٥ الى ١٥ سم . وتفرس من ٣ الى ٥ سم . نصلها سنن الحلفة ، انزب الصفحة السفلى ، يحمر في الحريف . انزهارها كبيرة القدة مستعرضة ، قطرها نحو ٨ سم . عرفها بتفسيق الرائحة || انزهارها يستمر من ايلول الى تشرين .

١٩٧٦٥ - حُرْدُونِيَّة محوَرِيَّة الزهر

Gordonia axillaris, *G. axemalis* (S). *Gordonia à fleurs axillaires* (F).
نوع من القردونية وهي جنية سبرونية صنيعة القدة تملو نحو ١٠٠ سم . معدها الصنن . اوراتها ابيدة سنانية النصل . طول من ٨ الى ١٥ سم . انزهارها حاملة اللون ، كبيرة القدة ، محورية الارتكاز ، ذكية العرف || انزهارها يستمر طوال شهر تشرين الثاني .

١٩٧٦٦ - حُرْدُونِيَّة ٥ ، كالفورنية ، حشيشة الحمى

Pyrethrum (S). *Pyréthre* (F). *Pyrethrum*, *Fever-feu* (E). *Bertrame*, *Bertramawurz*, *Rota wucherblume* (D). *Piretro* (I).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . انزاه حديدية تشبه الاكوان منها الطبية والزيونية والشمعانية التي يستخرج من زهورها بعد طعنها مسروق جعالي المادة شديد الفاعلية يستعمل في القضاء على الحشرات . ومن قائل ان الانواع الطبية تستعمل في علاج بعض الحشرات اغصبا للمادة . جلورها غزيرة للمادة الفعالة ، شائعة الاستعمال الطبي || شهر انواحه ما يلي .

١٩٧٦٧ - حُرْدُونِيَّة قُرْدُونِيَّة

Pyrethrum cinerarinifolium (S). *Pyréthre à feuilles de cinéraire* (F).
نوع من القردوب وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراتها كبيرة القدة ، قوية العرف ، ثلاثية التفريص . والصنن ، رباعية العروق المتوازية المخطوط . نصلها خلي الصفحة السفلى ، فضي اللون . رؤوسها الزهرية كبيرة القدة قطرها يراوح بين ٤ و ٦ سم . زودها كثيفة القدة الدنعية يحمر منها مسروق القردوب الذي يغسل في تركيب بعض الحواير || انزهارها يستمر من تموز الى آب .

١٩٧٦٨ - حُرْدُونِيَّة مشكل

Pyrethrum uliginosum (S). *Pyréthre tardif* (F).
نوع من القردوب وهو بجملة معمرة تملو من ١٥٠ الى ٧٠٠ سم . ساقها قزواء فناء . اوراتها سنانية ذائعة طول من ٦ الى ٦ سم . نصلها لدن الصفحة للتشارية الحلفة . رؤوسها الزهرية صوانية للتجميع ، كبيرة القدة ، قطرها يراوح بين ٤ و ٨ سم . انزهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٩٧٦٩ - حُرْدُونِيَّة وَدِيَّة

Pyrethrum roseum (S). *Pyréthre rose* (F).
نوع من القردوب وهو نبات عشبي معمر شائع الاستعمال الفرنسي . خروبه الزراعية زهاء ٧٠٠ تملو من ٣ الى ٧٥ سم . اوراته لا تباينة للتفريص . نصلها ماس البشرة اخضر اللون . رؤوسها الزهرية عديدة الالوان المتباينة



قردوب



حزون



طرحامة



فرخار الوزال



فهرست متقارن



غریغری معروف



غریغور



غیر حقون

من الملب القليظ الجامد تحتل مكان الرعة ويطلق من
الريش المتشعث يركب قاعة العتق. ثوبه الى السواد
اللامع ، يملو توهم ابيض منسوب الرقشة والحجم .

Numida cristata (S). هيوثير قنبرالي ١٩٦٧ -
 Pintade huppée (F). طائر من القفر. موطنه حوض الزبير، يتميز بقنبرته السوداء وبشبه الأربعة الرصاصي اللامع القليل التشبه.

١٩٧٦ - غزوہ مظلّمہ *

Numida mitrata (S). *Pintade mitrée* (F).
 طائر من الطيور يتميز بقرنه القربي للجمجمة الخشوية
 الشكل. ثوبه الى السواد اللامع يعلوه قوس ابيض يكاد
 يكون تقيحاً || موطنه افريقية الوسط والشرقية .

١٩٧٦٩ - غرغور مغرُوف^٥ ، غرغور شالم

Nymphaea alba (L.). *Nymphaea pinnatifida* (L.).
 طائر من الطيور البرية والفاص. سلالته عديدة فوارها
 القوق والحمام وكثرة البيض. منها الأبيض والبيج والآخر
 والأسود والأزرق والمزرق. جميعها جميلة التكوين والريّة.
 منها سلالات تبقي في البيت نحو ٨٠ يومًا || يتناسل
 مع التناج والحيث والظفر والظفر. حيث جملة الذكوال
 يتكلم مع الانسجام في المأثور.

Numida vulgaris (S). - **فريضة تسري** ١٩٧٧
 Pénide vaurou, P. royale, P. vulgaris (F).
 طائر من الفريضة، جميعه حجم النجاجة الكبيرة، ريشه
 اسفل الجمله اخضر الازرق اللين، يعمل عند قفص طرقة
 من الريش الناعم اللين القصير. جشته ملتحف براد
 من الريش الطويل الازرق المخلع بالابيض. فوه له
 الربة الزرقاء يعلوه قوس ابيض || موطنه شمالي شرق
 افريقية.

۱۹۷۷ - عزت‌خیزیات

Numididae (E). Numididae (E).
 فصيلة طير وسيدة الجبل من رتبة البجديات. طيرها
 برمية الجثة، ذقنة اللحم، صغيرة الرأس للخرج، عريضة
 المنقار الحاد الطرف، صغيرة الجناح والذيل المتكور
 السوي، منتفخة الرقع الاسفل المصبغة البسيطة. الكروان
 باللون الحوم. موطنها افريقية والجزر الحارة
 كتشكسكس طيرها. تألف الحجاب والرجل. أسرتها
 بستاند. البند. تملك الجرب والذئبان والبشارت.
 يجيشها الانجار والسحور الثلاثة القريبة. انثاهما تبيض
 12 بيضة تحضنها وحدها في الحوص. ترصده بالحشيش
 والورق.

• ۱۹۷۷۲ - عُذْر

Gerrhonote (F). جنس حثاء من فصيلة الجملوريات. أنواعه المعروفة نحو ١٠ ، طولها يراوح بين ٧٠ و ٣٠ سم. أنثاها إلى السمره يطولها تجميع أسود وبقعة بيضاء في مؤخرها البلاد الحارة. تألف الأماكن الصخرية.

*۰۰۰۰۰ - ۱۹۷۷۲

Gorgonia (F). Gorgonia (E).
جنس حوريات بحرية وكيئة وأخنة من فصيلة الغرفونيات ||
أنواع المعروفة قليلة العدد لكنها منتشرة في معظم بحار
البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || مستعمراته قريبة للشبه

ثمادها مختلفة الاشكال || اشهر انواعها غشب الانثياء وغشب القديسين والقرند والغلاب .

١٩٧٨٥ - هَرْقَل

غرقك البيشة : مدوت . وبالطبخ فسد ما في جوفه .

١٩٧٨٦ - **هَرْقَلَة** *
Garrulaxe (S). Garrulaxe (F). Garrulaxe (E).

طائر من فصيلة التيتليات لاقتات النمل وربة الجرائم . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى ادفى وافريقية الشرقية والجزيرة ، تجوها ذهاباً واياباً في سبيل المصيف والمشتى . تأتف الاذنان والاحراج الميضة الانجبار || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٠ سم . لونها العلوي الى الشقعة المرمجة بالاسمر . ولها متوج بكشة معتدلة الحجم ، عاجية اللون . عنقها وصدرها الى البياض العاجي . بطنها وزمكاها الى البياض الاخير . متقادح دقيق الحجم ، معتدل الطول ، شديد السرة . عنينا صغيرتان عسلتان . جناحها معتدل الطول ، ذلق الطول . ذنبها مستدير الطول . رسغها دقيقان ، اصمرا || طيرانها خفيف الحركة ، بسية القوط . قبتها النمل والاساربع والادبان والثار المتنية || تدنن معها في الدغل الكثيف على ارتفاع متر او مترين من سطح الارض . الاثنى تقسم من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .

١٩٧٨٧ - **هَرْمِيس** *
Grammistas (S). Grammistas (F). Grammistas (E).

جنس اسمك بحرية من شاكيات الزمانف وقصبة الغريجات . انزومه المروقة قليلة البدن اصطناعها بعض بحار المناطق الحارة اصنعها البحر الاحمر والهند الهندي || اجسامها صغيرة القد ، اعلاجية الشكل ، معتدلة التيطيط ، تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . اولياها تراوح من الرسكة الى الخصر الامس ، يطولها تحطيط قاطب ثلاثي الخطوط الفضية او الذهبية . رؤوسها كبيرة . اخذاتها رسية الانفراج . حيونها جاحشة . زعمانها الظهيرة الاولى شاككة النحاس . زعمانها القليلة مستديرة الاطراف || لونها كاعنة الصفنت قل من يرشب فيها .

١٩٧٨٨ - **هَرْقَن**
Corbeau (male) (F). Crow (male) (E).

هو الزراب الاكر .

١٩٧٨٩ - **هَرْقَاب** ، **هَرْقَاب** *
Corbivaur, Corbeau-vautour (F). Corbivaur (E).

جنس طير من الجرائم سفيات المنابر وقصبة الغريجات . له نوعان ، الزراب الابيض البق والزراب الهليلج المتقاد موطنها بعض المناطق الحارة من القارة الافريقية . يتميزان بكمير الجسم وارتفاع القوائم وفلاحة المنقيد واسوداد الخون || قوتها الجيف والظاء والورز والبرذوان والفكران والشفاويع والحشرات والديدان .

١٩٧٩٠ - هَرْقَاب هَلِيظُ الْمُخْتَفِ

Corbivaur crassirostris (S). Corbivaur à gros bec, C. d'Abyssinie (F). Abyssinian corbivaur (E).

نوع من الزراب . اصطناعه فصيلة الارباء تمتد من سوس البحر الاحمر الى الكنتو . جسمه كبير القد يطول نحو ٨٥ سم . بسطه لا يقل عن ١٥٠ سم . متقادح ضخم هليلج . ثوبه الى السواد القمعي يطول موج اخضر وزرق .

بمستمرات المرجان . لونه تراوح من الابيض القمى الى المرجاني الباهت ، ومن الابيض الاطلل الى الاخضر الامس .

١٩٧٧٤ - **هَرْغُونِيَّات** *
Gorgonides (S). Gorgonides (F). Gorgonides (E).

فصيلة حوينات بحرية من الزماريات الملوينات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها من الحوينات الركبنة الرابضة على الصخور اعلمها صخور القاع || اشهر اجناسها القرفون .

١٩٧٧٥ - **هَرْف**
Feuilles caduques (F). Deciduous leaves (E).

ورق الشجر حامة وورق الانجبار النفضية خاصة .

١٩٧٧٦ - **هَرْف** شجر يدبغ به (اللسان) .

١٩٧٧٧ - **هَرْفَة التيجاركة**
Chambre de Commerce (F). Chambre de Commerce (E).
منطقة مؤلفة من مثل التيجار وارباب الصناعات تتعلق بلسانهم لدى السلطات العامة وتجمع لهم المعلومات الدقيقة من التجارة والصناعة في الداخل والخارج .

١٩٧٧٨ - **هَرْفَة الزراعة**

Chambre d'Agriculture (F). Chamber of Agriculture (E).

غرفة الزراعة ، ندوة تقسم بعض الزراع المستخين لخدمة المصالح الزراعية الوطنية . والفرق الزراعية تابعة الدولة ولها قوانين خاصة .

١٩٧٧٩ - **هَرْفَة المكافحة**

Chambre de compensation (F). Clearing-house (E).
هو مركز اجتماع بطل المصارف ومصارف المصنف لاجراء عمليات مقاضاة التحويلات والاوراق المالية .

١٩٧٨٠ - **هَرْفُو**

Gorhou (F).
جنس طير من صديقات القرش ، كليات القدم ، مشهور باسم طغاف ، اعظمه .

١٩٧٨١ - **هَرْفَاء** ، **هَرْفِي** ، **قَيْفَة**
Chorlon (F).
هو غلاف البيشة الداخلي مركزه تحت القيش .

١٩٧٨٢ - **هَرْفَاء** ، **هَرْفَاء** *
Blanc d'oeuf (F). White of egg (E).
الترند : بياض البيض غرق المسح .

١٩٧٨٣ - **هَرْفَاء** ، **هَرْفَاء** *

Nitraria (S). Nitraria (F). Nitre bush, Salicree (E). Salpeter-rauch (D). Nitraria (I).

جنس نباتات برية من فصيلة النترقيات . اصطناعه بعض المناطق الاسيرية والافريقية الشمالية والوسطى . انواعها شجيرات وجنبات شاككة او سرسة . اوراقها كاشطة ، متعاقبة جامدة التصل . انزادها بياض اللون ، فردية او عكوكلية . ثمارها حنينة او نووية ، مديبة اللون ، حر او سيد .

١٩٧٨٤ - **هَرْفَاء يَت** ، **قَيْفَة يَت**

Zygophyllaceae (S). Zygophyllaceae (F). Zygophyllaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القضاات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها عشبى وبعضها شجري وجبني . اوراقها لا تقيمية الترتيب والشكل فيها المتعاقبة والمتعاقبة وفيها البسيطة والمركبة . انزادها خماسية التركيب عتوية .



غرلة



هرس



غراب هليلج للنقاد



غرناق عادي

قرواء خشوية الساق تلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. فروها طليقة النجس. اورواقها متعاقبة ، لائفة ، صلبة . تصفها سناني الشكل ، غطب الصلبة ، جلمد النجس ، كتيها للمام وللد ، لونه الى الجند الاسمر || رؤيتها الزهرية مستدة الجسم ، قطرها نحو ٤ سم. قطرها لونات كبيرة مستطيلة صفراء اللون || يستخرج منها صارة تقيد ضيق التنفس والالتباس الرئوي .

1947V - غُرُوقَة

Embougement (F).

Nipping of buds, Dis-budding (E).

تقليم او ازالة للزائيق والبرام العرضية الزائفة .

1947V - غُرُوقَة هو البرم ، اطيه .

1947V - غُرُوقَة ، جيرانيوم

Geranium (S). Géranium, Gérânier, Bec de cigogne (F). Geranium, Shepherd's needle, Crane's bill (E). Storchschnabel, Geranium (D). Geranio, Becco di cigogna, Becco di grus (I).

جنس نباتات عشية طرفة من فصيلة الغرنوقيات . انواعه عديدة منها البرية والعلوية والزراعية الزينة . ازهارها غشقة النجس والالوان لها الياض والوردي والاسمر والبنفسجي . تحملها تشبه منقار الغرورق او الرمو . اعرف انواعه واشهرها ما يلي



غرناقية خلية

1948 - غُرُوقَة أرمينية ، جيرانيوم أرميني

Geranium armenum (S). Géranium d'Arménie (F).

نوع من الغرنوق وهو عشية معمرة متصببة تلو نحو ١٠٠ سم. ساقها زهاب الحاء ، فروها زهرية . اورواقها خالية الاقسام . فصومها متعاقبة مستدة الحافة . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها بيضاء الشكل ، جزوية اللون ، بنفسجية اللون ، سود البقعة الوسطى || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .



غرناق الجدار

1948 - غُرُوقَة أسمر ، جيرانيوم أسمر

Geranium phaeum (S). Géranium brun (F).

نوع من الغرنوق وهو عشية معمرة متصببة . ساقها تلو نوع من ٤٠ الى ٦٠ سم. اورواقها خالية او بيضاء الاقسام السنانة الشكل ، المسنة الاطراف . تصفها شديد الخشخاش . يطو بتقيج اسمر . ازهارها جزوية اللون او بنفسجية . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

1948 - غُرُوقَة الجندكول ، جيرانيوم

Geranium rivulare (S).

Géranium des ruisseaux (E).

نوع من الغرنوق وهو عشية معمرة متصببة رطب في الارية الرملية . ساقها تلو نحو ٤٠ سم. اورواقها بيضاء الاقسام المتعاقبة للتفصيص والتشريح . تصفها خلل البشرة ، جزوي اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .



غرناق الروابي

1948 - غُرُوقَة الروابي ، جيرانيوم حصتي

Geranium collinum (S). Géranium des collines (F).

نوع من الغرنوق وهو عشية طرية معمرة تلو نحو ٧٠ سم. اورواقها خالية الاقسام . تصفها خلل البشرة ، باعد الخشخاش . ازهارها مهدبة البقعة لونها الى الازرق والبنفسجي اللون || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

عفة ابيض القلق || طباعه وعاداته لا تختلف من طابع ومعادن الغرب الا ان له اثبت طيرا واطول شيئا . وهو صياح ، هم ، قدر || يثن وكته في الاذغال ويل الامحار المتصلة الانتفاع . وكته يرتكز على مدافين متصاليين وهو كالصاج تقريبا . حياكه قشبان دقيقة متداخلة يطولها ثش ثام . اثاء تحضن رعدا ثلاث يضايت بيتا الذكر يثن لما الفداء .

Corbeau (F).

جنس طير من الغربان يدعى غرباب ، اطيه .

1947V - غُرُوقَة ، غُرُوقَة ، غُرُوقَة

Balaerica (S). Balaerique (F).

جنس طير من الكراكي ، موطنها البلاد الافريقية . انواها جملة الالوان الزاخرة المتباينة . رؤيتها خلية الريش الاسود المتصب . تيجانها الفنية ذنية اللون . اعناقها وساقها طويلة . منازرها غريبة الشكل ذلقة . اجنسها مستطيلة متفرجة الزوايا . اذناها قصيرة مقعطة . ارباعها دقيقة صردية || تألف صفات الانهر واليسيرات والاسراج المبعثرة الانجار . قوتها الحربية والبار والبرام والحشرات || تدن في افاحس تحضرها في البرية . اناتها لها حشختان في السة وفي كل حصة يهستان || ولها الجلس نوات لا غير الغرق الطائوسي والفرناق العادي .

1947V - غُرُوقَة طائوسي ، غُرُوقَة طائوسي

Balaerica pavonina (S). Balaerique pavonine, Grupeau, Oiseau trompette (F).

طائر من الفرناق موطنه يمتد من جبال افريقية الوسطى الى خطوط المتوسط وجزر الباليار || طوله نحو ١٠٠ سم. تاج قلته ذهبي اللون مستطيل الريش الجلي الخرزوي . عسره وقلته الى الحرة المرحانية . ثوبه الى الرعدة ، يمتد ويسمر عنه . القطر ويبر عنه البطن . جناحه جلمعة بالياض والاسود . منقاره وساقه سود .

1948 - غُرُوقَة عادي ، غُرُوقَة عادي

Balaerica regulorum (S). Balaerique commune (F).

طائر من الفرناق اصطناعه فسيحة الارباء تمتد من افريقية الشرقية الى الجنوبية . طوله نحو ١٠٠ سم. تاج قلته اصفر اللون ، ملحب اللوح ، قصير الريش الشهي الجلس . عسره وقلته الى الحرة القرمزية . منقاره وساقه الى السمرة . ثوبه الى الرعدة الرصاصية . جناحه يثن القردام . ذنبه اسود .

1948 - غُرُوقَة خلية ، غُرُوقَة خلية

Grindella (S).

Grindella, Chrysophthalme (F). Grindella (E).

جنس نباتات برية طرية طرية وزراعية زينة من الاسطرية وفضيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة العدد منها الاعشاب الخلية والجنات المعمرة جميعها امريكية المنبت || اورواقها متعاقبة . ازهارها رؤسية صفراء اللون قلبية الشكل بازارها دوار الشمس || اشهر انواعها واعرفها الغرنوقية الضليلة .

1948 - غُرُوقَة خلية ، غُرُوقَة خلية

Grindella robusta (S). Grindella robusta (F).

نوع من الغرنوقية البرية الخلية المعمرة . مهدبة جنس اصناف امريكية الشابة انحصا كاليونية والتكاس والمكسك . تثبت طويلا في المنابع السنية || جنيتها

١٩٨١ - غرثوق عطر * ، جيرانيوم عطر ،
إبرة الزهر

Geranium Robertianum (S). Herbe à Robert, Aiguille, Géranium de Robert (F). Adder's tongue, Herb Robert, Fox geranium (E). Ruprechtstorchschnabel, Robertskraut (D). Geranio Robertino Erba Roberta (I).

نوع من الفرنوق وهو عشية ممررة برية طيبة خالصة الاستعمال تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها فراء مستقيمة السلاحيات. أوراقها خالصة أو سباعية الأقسام. أزهارها لائحية الانقسام فيها الفردية والثنائية والثلاثية التجميع. لونها الالبياض الاخير يملو توشيح ليكي || أزهارها وأوراقها عطرية يقال انها لا تخلو من بعض الخواص الطبية النافعة .

١٩٨١١ - غرثوق لفي * ، جيرانيوم لفي

Geranium argenteum (S). Géranium argenté (F). نوع من الفرنوق وهو عشية ممررة مستقيمة . ساقها مثدنة تملو من ٧ إلى ١٢ سم. أوراقها خالصة أو سباعية الأقسام الثلاثية التفرع . نصلها خلي البشرة ، ففي المروج ، أزهارها فردية التجميع ، غرطية البتلات الوردية اللون . أزهارها يشتمر من حمز الى آب .

١٩٨١٢ - غرثوق كبير الزهر ، جيرانيوم كبير الزهر

Geranium grandiflorum (S). Géranium à grandes fleurs (F).

نوع من الفرنوق وهو عشية ممررة تحيلة أنساك متدلية الفروع تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها مستطيلة للمالحق المدنية الماء ، نصلها خلي البشرة ، بحري اللون ، خالصة الأقسام الانثاسية التكتين . أزهارها كبيرة القد ، متدادة الفصل وبتلات . لونها الالبيكي الوردى المروج . أزهارها يشتمر من حمز الى حموز .

١٩٨١٣ - غرثوق ملتبخ * ، جيرانيوم ملتبخ

Geranium maculatum (S). Géranium maculé (F). نوع من الفرنوق وهو عشية ممررة مستقيمة . ساقها مضلعة تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خالصة الأقسام المسنة نصلها قليل الحسل ، شديد الحفرة . أزهارها منبهة البتلات المستعرضة ، قطرها براوح بين ٣ و ٤ سم. لونها الالبيكي الباهت || أزهارها يشتمر من نيسان الى حموز .

١٩٨١٤ - غرثوقيات

Geraniaceae (S). *Geraniaceae* (F). *Geraniaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وفصيلة الفصليات انواعها المعروفة خمسة . موطنها بعض مناطق أمريكا الاستوائية . قريبا الحشرات حل اغتلاف انوعها واشكالها وبعض الحار المعنية البرية || اجسامها ريمة تطلي من ١٦ الى ٢٢ سم. تتميز بكبر اذنانها المقطوعة الطرف . اجنسها صغيرة ، ذلقة تلحف قاعدة اللب . مثاقيعها شلبية ، مشرودة الاطراف . أثريها متباينة الالوان تكثر والتجميع .

١٩٨١٥ - غرنيس *
Agriornis (S).

Agriornis (F). *Agriornis* (E). جنس طير من الجاثم مشروبات النثار وفصيلة الفصليات انواعها المعروفة خمسة . موطنها بعض مناطق أمريكا الاستوائية . قريبا الحشرات حل اغتلاف انوعها واشكالها وبعض الحار المعنية البرية || اجسامها ريمة تطلي من ١٦ الى ٢٢ سم. تتميز بكبر اذنانها المقطوعة الطرف . اجنسها صغيرة ، ذلقة تلحف قاعدة اللب . مثاقيعها شلبية ، مشرودة الاطراف . أثريها متباينة الالوان تكثر

١٩٨١٤ - غرثوق العزهل * ، جيرانيوم يمسكي
إبرة الراعي

Geranium columbinum (S). *Geranium columbin*. Pied de pigeon (F). Long stalked crane's bill, Pigeon's foot crane's bill (E). Staltnorchschnabel (D). Becco di piccione, Geranio colombino (I).

نوع من الفرنوق وهو عشية ممررة برية طيبة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقها فراء ، دقيقة ، مستطيلة السلاحيات . أوراقها خالصة أو سباعية الأقسام البعقة ، السنفة الحافة ، المنطرية الارتكاز . نصلها حاق الحصار ، نام الحسل القصير . أزهارها فردية أو ثنائية التجميع . وردية اللون ليكية الملوخ || يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية وقد تقيد الصدر .

١٩٨١٥ - غرثوق المروج * ، جيرانيوم مروجي

Geranium pratense (S). Géranium des prés (F). نوع من الفرنوق وهو عشية برية وردية ممررة . ساقها مستقيمة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها سنثاسية الأقسام الانثاسية المد . نصلها خلي البشرة حاق الحصار البحري . أزهارها مستعرضة البتلات الكبيرة لون الالزرة الارجوانية التوشيح || أزهارها يشتمر من حمز الى ايلول .

١٩٨١٦ - غرثوق دموي ، جيرانيوم دموي

Geranium sanguineum (S). *Geranium sanguin* (F). نوع من الفرنوق وهو عشية ممررة متصبية تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها بزمعها حلية الماء . أوراقها سباعية الأقسام ، ثلاثية أو خالصة التفرع المستطيل . أزهارها فردية ، دقيقة الامن ، حكية الفصل ، قلبية البتلات الحمر || أزهارها يشتمر من حمز الى ايلول .

١٩٨١٧ - غرثوق رسادي ، جيرانيوم رسادي

Geranium cinereum (S). Géranium cinré (F). نوع من الفرنوق وهو عشية ممررة مستقيمة . ساقها مثدنة تملو من ٨ الى ١٥ سم. أوراقها خالصة أو سباعية الأقسام الثلاثية القصوص . نصلها بحري اللون ، راند الزهب . أزهارها ثنائية التجميع ، بيضيه البتلات الحمر || أزهارها يشتمر من حمز الى آب .

١٩٨١٨ - غرثوق شقاري الورق * ، غرثوق شقاري

Geranium anemonifolium, *G. tuberosum* (S). *Geranium à feuilles d'anémone*, *G. tubéreux* (E). نوع من الفرنوق وهو عشية ممررة صفولية الاربوية . ساقها تملو نحو ٢٠ سم . أوراقها خالصة الأقسام تشبه اوراق الشقار . نصلها مالى البشرة ماب الحصار . أزهارها ثنائية التجميع ، مستطيلة للمالحق الحليلة الماء . بتلاتها كبيرة لقد حراء اللون .

١٩٨١٩ - غرثوق عريض البتلات ، جيرانيوم عريض البتلات

Geranium platycetalum, *G. ibericum* (S). *Geranium à larges pétales*, *G. d'ibérie* (F).

نوع من الفرنوق وهو عشية ممررة متصبية تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم. ساقها بزمعها زباد الماء . أوراقها خالصة أو سباعية الأقسام الإحليلية الشكل ، المنشارية الحافة . نصلها خلي البشرة ، بحري اللون . أزهارها صوبونية التجميع . بتلاتها مستعرضة ، مشرة الاطراف ، زرقاء اللون او بنسجية || أزهارها يشتمر من ايار الى آب .



غرثوق العزهل



غرثوق المروج



غرثوق شقاري الورق



غرثوق عطر



غرثوق نفي



غريوية خليج



غريوية



غريوية شائعة



غريوية



غريوية



غريوية

١٩٨٢٢ - غريوية * ، إكسور

bora (S). Isore, jassin sauvage (F). Wild jasmine (E). Isore (D). Isora, Gelsomino salvatica (I).
جنس نباتات شجرية ونباتية من فصيلة النورات. أنواعه نحو ٢٠٠ أصلها من المناطق الاستوائية. بعضها بري وبسما زراعي زينة. أوراقها متفكة متعاقبة. بعضها بري حشوي التجميع. تاجي الإزهار، أزهارها صغيرة لده؟ حورية اللون، يضاء اللون أو حراء.

١٩٨٢٤ - غريوية * في الألبانيا، ألبانيا.

١٩٨٢٥ - غريوية
Garrya (S). Garrya (F).
جنس نباتات معمرة ثنائية من فصيلة القرانياث. أنواعها ثمانية. بعضها البلاد الأمريكية. جميعها نباتات صغيرة أو متوسطة القد. أوراقها أبيض متعاقبة. بعضها أحادي الشكل. جلدي الصفحة، منخلف الحار، حادس. الخشار || أزهارها شرقية التجميع، غصن اللون أو سفراء أو غراء.

١٩٨٢٦ - غريوية * ، غريوية ، غريوية ، زيتون
Meles (S). Blaireau (F). Badger (E). Dache (D).
جنس حيوانات ليلية لاحة من فصيلة السبعيات ورتبة الواسم. أنواعه ستة تقريبا بين الكلب والسور. غلظها بين اللب والسور. أصلها أثناء القدم. جميعها قصيرة القوائم السعيد، كازة الدم، غراء الثوب، يضاء الحاسر تحمل على كل إبط من إبطها جده سواد. رؤوسها غريوية الشكل. أصلها مستعيلة. أذنبا قصيرة.

١٩٨٢٧ - غريوية

١٩٨٢٨ - غريوية جدوية ، غريوية وسكية
Instinct
Instinct grégaire (F). Herd instinct, Gregarious instinct (E).
في فرقة التجمهر في الحيوان والنبات.

١٩٨٢٩ - غريوية

Plant (F).
كل نبات في تمكته جلور من انتشار الحياة.

١٩٨٣٠ - غريوية ، غريوية

Pollen (F).
Pollen (E).
الفريق والافريق واللقح والصلاب واسد. راجع صلح.

١٩٨٣١ - غريوية

Roselière de bambou (F).
Reed-bed of bamboo (E).
أحة القريب طبيعة كانت أم صنية.

١٩٨٣٢ - غريوية

Dendrocalamus (S).
Bambou (F). Bamboo (E).
جنس نباتات قصية برية وزراعية من عائلة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات. أنواعه قليلة ترطب في الأتربة الخفيفة الدبالية الرملية. أشهرها غريفة حنون.

١٩٨٣٣ - غريوية

Dendrocalamus hemonis (S). Bambou de Hémon (F).
نوع من القريب بطول من ٣ إلى ٥ متر. سلاحيات متوسطة الطول بأحثة الخشار الخشن. أوراقها طول من ٦ إلى ١٠ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصلها لاسد الخشار عل صفحته || يرطب في الأتربة الدبالية الخفيفة الرملية.

١٩٨٣٤ - غريوية

Grévilée (F).
في الثورويلا ، ألبانيا.

فيها الكعبة والشقمة. جوشها منشة دائما بالاسد || تميز جماعات متوسطة العدد. تكثر أمشاشها في الأشجار المتوسطة الارتفاع. ألبا تحسن وسدا من ٤ إلى ٥ ييضات مرقين في الحقل.

١٩٨١٦ - غريوية

Baldurique (F).
هو الثوراني ، ألبانيا.

١٩٨١٧ - غريوية ، غريوية

Grevillea (S).
Grévilée (F). Silky oak (E). Grévilée, Seide nelche (D). Grevillea (I).
جنس أشجار وشجيرات برية وزيتونية من فصيلة الفصيات أنواعها عديدة. أوراقها أبيض متعاقبة لا تلياس الشكل. أزهارها نواحية غلظة الألوان أكثر قها الأصفر والأحمر. أزهارها سليل أو عتقوة التجميع ، عوري الإزهار. أشهر أنواعها ما يتبع.

١٩٨١٨ - غريوية جبليّة

Grevillea alpina (S).
Grévilée alpina (F).
نوع من الثورويلا وهي جنية معمرة تملو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها سنائية الشكل مقلوبة القاعدة. أزهارها حر البتلات ، صفر الأنابيب ، خلية البشرة ، عتقوية التجميع || أزهارها يستمر طوال شهر أيار.

١٩٨١٩ - غريوية شائعة

Grevillea robusta (S). Grevillea géanta (F).
نوع من الثورويلا وهي جنية معمرة تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها سرعسية الشكل طول نحو ٢٠ سم. نصلها خلي الصفحة السفل. أزهارها برتقالية اللون ، حر الموج ، عتقوية التجميع || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

١٩٨٢٠ - غريوية حرة

Grevillea juniperina (S). Grévilée-Génévrier (F).
نوع من الثورويلا وهي جنية معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. فروصها زباد السماء. أوراقها حدية شائعة طول نحو ٢ سم. أزهارها صفر البتلات حر الأنابيب ، صنية التجميع || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

١٩٨٢١ - غريوية مرطاة

Grevillea glabrata (S). Grévilée glabre (F).
نوع من الثورويلا وهي جنية معمرة تملو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها وفروصها عادمة القريب وأغسل. أوراقها بالغة القريب ، ثلاثية الفصوص المدية الشائعة الأطراف أزهارها صغيرة القد ، يضاء اللون ، عتقوية التجميع. أزهارها يستمر طوال شهر أيار.

١٩٨٢٢ - غريوية * ، سكاوية صخرية

Archibuteo (S). Bussage, Archibuteo, Buse pattue (F). Rough-legged buzzard (E).
جنس طير من عائلة السقاوت وصيلية الصقريات. أنواعه ثلاثة شديدة الشبه بالسقاوة إلا أنها أكبر جنة. طولها وأرجح بين ٨٠ و ٩٠ سم. مؤلفها كبيرة القد ، ذلقة الأطراف ، تلصص مغز الأنفان. أصلها مسرلة. ألوانها إلى السمة المرشبة بالأبيض والأفبر والأصهب والأحمر. جميعها من القاطن التي تجوب البلاد المعتدلة الحرارة. تكثر في شقوق الصخور الرقيقة الشارفة الناتية من كل عراج.

أنها تحسن وسدا من رقتين إلى ثلاث رقتان ، قوتا القرواص والمظاء والأفاني والخشرات عل اختلافها.

١٩٨٤٤ - غزان عَيْن الطاووس

Gazania pavonia (S). Gazanie cell de peon (F).
نوع من الزئزان الممر . ساقه خشبية فراء تملو نحو ٦٠ سم. فروصها كثيرة العدد ، قصيرة القند ، مبركة . أوراقها الجذرية والجدعية متوسطة الحجم ، ريشية التشرج . نصلها انضغاث اللون مبهر الزئب . رؤسها الزهرية متوسطة القند ، اقراصها يرتقاية اللون ، نارية الملمح . حناؤها شديدة السواد اللامع || تنوره يستمر من حزيران الى آب.

١٩٨٤٥ - غزان قردي الزهرة

Gazania uniflora (S). Gazanie uniflora (F).
نوع من الزئزان الممر . ساقه خشبية متدلية الفروع . أوراقها احليجية مسوية . نصلها مائل السفحة العليا ، خلي السفل الذرياق القرن . رؤسها الزهرية فردية التجميع كبريتية الصفار || تنوره يستمر من تموز الى آب.

١٩٨٤٦ - غزاة

Gazza (S). Gazza (F).
الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي . جنس املاك بحرية من فصيلة الشبيبات شائكات الزعانف . انواعها المعروفة ثلاثة . اسطها البحر الاحمر والخليج العربي والخليج الهندي || اجسامها شبه بيضية الشكل ، متدلية التليط ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. الواجا السائلة الى الرتبة الفضية تنسق عند الظهر وتفسر عند البطن . رؤسها شبه اسفلية الشكل . احطها علوية الارتكاز متدعة . حينها مستديرة ، كبيرة ، ماصة . زمانها الظهري والشرية مستطيلة متدالة . زمانها الذيلية لارقة || طويها جيدة الصنف مرفوف فيها .

١٩٨٤٧ - غزول ، تشبيل ، عكلاية

Erotisme (F). Erotism (E).
شوانية متطرة مشيرة . وقد تكون حالة مرضية .

١٩٨٤٨ - غزلي ، عكلاية ، تسبي

Erotique (F). Erotic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالحلب العذري او الخلاعي او الجنسي .

١٩٨٤٩ - غزليل . هو ابرة المجوز ، اطليا .

١٩٨٥٠ - غساس

Cudonia confusa (S). Cudonia confusa (F).
فطر كامن الصنف لامأكول من فصيلة الفشاريات ودية الزئيات . يكثر ويبدو في اخرج السنبور . يعيش على المواد النباتية المنسقة . نكته مجموعة من الريدات الصغيرة فطرها نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الاسمر للملح . معها مصراحي الانطلاق . ساقه متدلة الانقذاع مبطلة الشكل يملوها اخنود ينمت من القاعدة الى الاربسة .

١٩٨٥١ - غسولة

Gastrochaena (S). Gastrochène (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات عديدة الاشام فضيلة المستقيبات . انواعها النابتة المتحجرة عديدة اما الحالية فنسور ٣٠ متشرة في معظم بحار العالم || وهي من المبريات التالقة تعيش ضمن انبوب صدي المادة ثققله المواد الكلسية .

Boue (F). Mud (E).

هو اللين يجعله السيل يفتي على وجه الارض خشقاً رطباً كان او يابساً || وهو التفل في اسفل القادورة .

١٩٨٦ - غرين ، غرين ، طلي
Alluvion, Limon (F). Alluvium, Silt, Ooze (E).
وهي اسماء التالقة والطلح والفلح . والفرير وراش من الاربة والبقايا الصوية مملأ المياه المكرة فرسبت .

١٩٨٦٧ - غريكات

Garryaceae (S). Garryacées (F). Garryaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفلالت . كانت في التصنيف السابق تتبع فصيلة القترانبات . اجناسها وانواعها قليلة العدد اسطها البلاد الامريكية || نباتاتها جنبات سبروتية معمرة ، تملو من مقيون الى اربعة اشعار . اوراقها ابيدة ، متدالة . نصلها جامدة حيلة الخصار الالسي . انفرارها شرقي التجميع . انفرارها ثنائية المسكن ، صيرة الجرم ، خضراء اللون . ثمارها فردية البزة او ثنائيا || اشهر اجناسها القرية .

١٩٨٦٨ - غزول هو قصب الرمل ، اطليا .

١٩٨٦٩ - غزال
Gazelle (F).
اسم شامل يطلق على بعض الحيوانات من ذوات الاظلاف المحيطات القرن منها الطلي العربي والرثم والاريل والآدم الخ . ج غزلة وغزلان .

١٩٨٧٠ - غزول
Bonita à ventre rayé (F).
سمكة بحرية قديمة وبوت مشيرة البطن ، اطليا .

١٩٨٧١ - غزان

Gazania (S). Gazanie (F).
جنس نباتات عشية من فصيلة المركبات . انواعها عديدة اسطها معظم اسواق العالم القديم . سوطها زهاب لانقلابية التفرع . اوراقها خلية لاقياسية التزيب منها الجذرية والجدعية المتدلية . رؤسها الزهرية كبيرة القند صفر اللونات . قنابات قلافاها متدعة ، عديدة الصفوف ، قمية الشكل . ثمرتها مبرانة . رؤسها نائبة القلور المتتامة احرف الالواح واشهرها ما يتبع .

١٩٨٧٢ - غزان لكجي

Gazania nivea (S). Gazanie neigeuse (F).
نوع من الزئزان الممر . ساقه خشبية فراء تملو من ٢٥ الى ٥٥ سم. اوراقها الجذرية والجدعية متوسطة القند مسطوية الشكل . نصلها اخضر السفحة العليا ، ابيض السفل بيانها كالتليج . رؤسها الزهرية كبيرة القند فطرها رايح بين ٧ و ٩ سم. اقراصها الى الصفرة البرتقاوية الملمح . حناؤها اسمر اللون اسف || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

١٩٨٧٣ - غزان ريشي الورق

Gazania pinnata (S). Gazanie pennée (F).
نوع من الزئزان الممر . ساقه خشبية فراء . اوراقها الحليجة متوسطة القند ريشية التشرج . اوراقها الجذرية كبيرة التصل للمهدب الاطراف المنطة . رؤسها الزهرية كثيرة العدد ، صيرة الحجم ، كبريتية الصفار . تنوره يستمر من حزيران الى آب .



غزان



غزة



غسل



غسوة



عشيل



عشبة الارضي شوكة



عشبة الدؤل



عشبة الجنجل



عشبة الحصيد



عشبة الدرة الصفراء



عشبة السمور

19859 - **عشبة الجنجل** *
Hypana rostralis (S).
Noctuelle du houblon, Toupet (F).
فراشة صغيرة القدر طولها نحو ١٢ سم. ثوبها الى الصبهة
الضاربة الى البنية المبرقعة. ريشها مدهية الخشن الجاهلي.
لها جيلان في الحول. ريشها طول نحو ٢٢ سم. ثوبها الى
الخضرة يميلوا لتسليج اسمر. رأسها اسود || تركيب
الجنجل فؤاذيه لشد الانى.

19860 - **عشبة الحصيد** *
فراشة الحصيد
Agrotis segetum,
Euxoa segetum (S). Noctuelle des molsens (F).
Turnip dart moth (E). Wintersteale (D).
فراشة كبيرة القدر سمراء اللون مدهية الرؤوس طولها نحو ٢
سم. وريشها ٤ سم. ريشها الاماميان الى الصفراء الخشن
اما الخلفيان فال الى البياض الخشن تتخلله عروق مائقة.
جهاها يستمر نحو الستين. تمتع مكها ابتداء من اوتائل
الربيع ينفتح بعد اسبوعين || ريشها طول نحو ٥ سم.
وهي شبيهة اللون يميلوا لوج زيتوني وضمان اصفران قاطبان
يتخللها في كل فصل من فصولها اربع نقط سود.
تركب القمح والسلق والقرن والنباتات المروية والبطاطا
والشوندل والكرمة والتبغ والمكثف والبلبل القمح ...

19861 - **عشبة الدرة الصفراء** *
الدرة الصفراء ، **دودة الدرة**

Noctua Zeae, *Leucanum Zeae* (S). Noctuelle du
maïs (F).
فراشة متوسطة القدر ثوبها الى الصبهة الوردية المبرقعة . انثاها
اكبر قدما وايض ثوبا من ذكورها . لها جيلان في السنة .
تظهر في حزيران وفي آب || ريشها سمراء اللون وردية
المزاج طول نحو ٤ سم. تألف الموضع الربطة . تركيب الدرة
ويشار التنبيهات المعلقة .

19862 - **عشبة السمك**
Noctuelle du seigle (F).
حشرة تدعى عشبة الشيلم ، اطفاها .

19863 - **عشبة السمور** *
Panolla piniperda,
P. flammea (S). Noctuelle du pin (F).
فراشة من العشقيات صغيرة القدر. ثوبها الى البصرة الخاضعة ،
تجيبها وزراكتها الروشية جيلة الشكل والانتظام .
ريشها غصراء اللون غسطة بالابيض تركيب السمور من
حزيران الى تموز فطيم لورائه .

19864 - **عشبة القصب**
Sésamole (F).
هي للزبانية ، اطفاها .

19865 - **عشبة القمح** *
فراشة الحنطة

Agrotis tritici, *Euxoa tritici* (S). Noctuelle du blé
(F). White-line dart moth (E).
فراشة من العشقيات صغيرة القدر ثوبها الى الوردية وريشها
الاماميان مبيضان بالاسمر . جهاها يستمر نحو الستين.
تمتج مكها خلال شهر حزيران ينفتح بعد اسبوعين .
ريشها كبيرة القدر طول نحو ٥ سم. ثوبها الى الصبهة
الخضراء يميلوا لوج اخضر وضمان اصفران يتخللها في
كل فصل من فصول جسمها اربع نقط سود || تركيب
الحنطة والشيلم والقرن وتختلف النباتات التنبيهات المروية
والمكثف والكرمة .

19866 - **عشريات** *
Gastrochaenidae (S).
Gastrochaenidae (F). *Gastrochaenidae* (E).
فضيلة حشرات بحرية من الرنويات صليحيات المالحات .
اجناسها وانواعها الممارسة عديدة ، منتشرة في جميع بحار
العالم . اما القارة في تنصيراتها الحقية التالية ||
اشهر اجناسها العشقة والرشافة والفتسولة .

19867 - **عشيقيل** *
Glycyphile (S).
Glycyphile (F).
جنس طير من الجولام ويقات المناظير فضيلة المفترسات .
انواعه المعروفة ١٢ طولها يمتد من جزر الزوايج الى
استراليا . مدجها الحياتي جامعي . قوتها الحشرات الصغيرة
والذباب والحمام وحيث الاضرار || اجسامها صغيرة طول
من ١٢ الى ١٥ سم. مناقيرها مقوية . اجنسها تلحف
الافتيك . انثاها غليظة ، طويلة ، مغطوة الاطراف .
اقولها ملونة بجيلة الغصاف الزاهي || لكثن في الاشجار
المعتلة الارتفاع . تحسن مزلان في الحول وفي كل مرة
من ٤ الى ٥ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوما
تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

19868 - **عشقي**
Crépusculaire (F).
Crepuscular (E).
نعت تعريفه يطلق على كل ما هو مخصص بالقمح .

19869 - **عشقيات** ، **لبيكات**
Noctuidae, *Agrotidae* (S). *Noctuidae*, *Agroti-*
idae (F). *Noctuidae*, *Agrotidae*, *Owlet moths*,
Cutworms (E). Eulen (D).
فضيلة حشرات من غسقات القرون ورتبة حشراف
الاجنسة . انواعها زهاء ٢٠٠٠٠ مظهرها دجوي وبعضها
يسرح في الليل . اجسامها متوسطة القدر . قوتها
الاستغمارية مغطوة الشكل او غليظة || ريشها مائلة
البصرة داكنة الاكوان . خادراتها تقم في التربة تلحف
بجلباب من الليل .

19870 - **عشبة** ، **لبيكة**
Noctuelle (F).
Noctua (E)
اسم شامل يطلق على عمة حشرات افراشة من
العشقيات || اشهر العشقيات ما يتبع :

19871 - **عشبة الارضي شوكة** *
Gortyna ochracea (S). Noctuelle de l'aristach (F).
فراشة صغيرة القدر طول نحو ٢ سم. ثوبها الى الصفرة
الذهبية . ريشها مدهية الاطراف يميلوا لزاكن
وتجاذب متباينة الالوان || ريشها غصراء اللون ، سوداء
الرأس طول نحو ٤ سم. تركيب الارضي شوكة والبطاطا
قلم السورق وتقصي عليها .

19872 - **عشبة البقول** *
Hadena oleraceae,
Polia oleraceae (S). Noctuelle potagère (F). *Bright-*
line brown-eye (E). *Gamüsselle*, *Salataude* (D).
فراشة صغيرة القدر طولها القرب مدهية الرؤوس بالخنثي
والاسمر . تظهر من حزيران الى تموز . تمتج مكها على
لصل الاوراق دون تميز بين الصفقة العليا او السفلى .
ينفتح المكان بعد عشرة ايام من رقات دقيقة سمراء اللون
تتطور بسرعة من السخاخ الى السخاخ حتى يبلغ طولها
نحو ٥ سم . ويستمر ثوبها الى البصرة الخضراء الزرنية
المزاج || وهي في جميع الموراد البرقية لا تنقطع عن اتمام
اوراق البقول على اختلاف انواعها وضماها .

الاقليمي الترتيب || ايجالها الحولية ثلاثة تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها غيرة اللون تطول من ٢٢ الى ٢٧ م. تركب البطاطا والجذر والملفوف والكرمة .

١٩٨٧٤ - عشية ملوكة

Noctuelle colorée (F).
حشرة تلعى زبدية دقيقة ، اطليها .

١٩٨٧٥ - **عسل**
Pédiluve (F).
القتل أو شغل القوام عمل تقرضه الطيارة البيطرية ، قواه شغل قوام الحويان بفض الحاصل الملهوة لاتخاذ الحصى القلاعية ويغيرها من الامراض .

١٩٨٧٦ - **عسلج**

نبات مثل القنطار . ترتفع قدر الشبر . لها ورقة لزجة وزهرة كزهره المرو الجبلي (السان) .

١٩٨٧٧ - **عسوة * ، غلاديشيا**

Gleditsia (S). Févier, Carouge à miel (F). Three thorned acacia (E). Gleditschbaum (D). Gledizia (I). جنس اشجار بيرية ويزينية من فصيلة القرنيات القراقية ، اوراقها المشرفة حسة جميعها ثائكة . سوكها متصبية . اوراقها متناحية ، مركبة ، ريشية . ازهارها عمودية الارتفاع . ثمارها قرنية خرونية خشيشة لا تخلو من السكر . يستخرج منها بحد التضمير والتغير قنبد كسول لا بأس فيه || اعرف انواع النسو واشهرها ما يلي .

١٩٨٧٨ - **عسوة المتناقع ، غلاديشيا المتناقع**

Gleditsia aquatica, G. monosperma (S). Févier des marécages (F).
شجرة بيرية ويزينية ترطب في المستنقعات وسائر الاراضي الرطبة . ساقها تلعو من ٦ الى ١٢ م. شوكها دقيق الجسم ، مقطوع القامة . اوراقها مستطيلة . ورققاتها خشية براوح عددا بين ٢٠ و ٧٨ ، نصلها سناني الشكل مالم البشرة || قرنها بيضيه مبطلة تطول نحو ٤ سم . وتقرض ٢ سم . وهي صيدة البزرة دمية الباب السكري . ازهارها يستمر من ايار الى سزيان .

١٩٨٧٩ - **عسوة اليابانيان ، غلاديشيا يابانية**

Gleditsia japonica, G. horrida (S). Févier du Japon (F).
شجرة سبروتية تلعو من ٨ الى ٢٠ م. اشراكها متشعبة تطول من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها مستطيلة . ورققاتها تدم من ١٦ الى ٢٠ نصلها اطليحي الشكل ، مقطوع القامة ، مالم البشرة بطول نحو ٥ سم . ويقرض نحو ٢ . قرنها كبيرة القد متبوعة تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم . وتقرض نحو ٦ سم . لبها غزير الماددة السكرية || ازهارها يستمر من سزيان الى تموز .

١٩٨٨٠ - **عسوة ثلاثية الشوك ، غلاديشيا ثلاثية الشوك**

Gleditsia tricantha (S).
Févier à trois épines (F).
شجرة سبروتية بيرية ويزينية تلعو من ١٠ الى ٤٠ م. ساقها متصبية . اشراكها ثلاثية التركيب سادة الحمة . اوراقها تطول من ١٤ الى ٢٠ سم . وقص من ١٦ الى ٢٤ وريفة نصلها مالم الصقمة عزز اثمار || قرنها صعبه الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم . لبها غزير الماددة السكرية || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٩٨٦٦ - **عشية الكلاء ، نليكية الكلاء**

Neuronia popularis, Epineuronia popularis, Heliophobus popularis (S). Noctuelle des fourrages (F).
فراشة صغيرة القد حنطية اللون . وروشنا الاماميان الى السرة تمرنها عروق يعض . وروشنا الخلفيان الى التبرية الخنطية يحويها حمار مهدب الاطراف . مسرعا جري . يستمر من تموز الى ايلول . الاثني تمتج مكنا على سوق واوراق الاشاب البرية فيقتف من رقات دقيقة سرية التطور يبلغ طولها نحو ٤٥ م. في اقل من شهر . ثوبا الى السرة يميلوا من كلي جانبيها ثلاثة خطوط فاجلة صفراء اللون || تخفي في النهار تحت الحماجة وتسر في الليل . قوتها اوراق الاحشاب النجيلية ان برية او مروجية وانحسا الذرة .

١٩٨٦٧ - **عشية الملفوف * ، نليكية الكرنب دودة القتب**

Barathra brassicae, Mamestra brassicae (S). Noctuelle du chou, Brassicaria, Ver du coudr (F). Cabbage moth (E). Kohleule (D).
فراشة صغيرة القد حنطية اللون . وروشنا متناخلة الاثاني مبقية ويزركشة . لها جيلات في الحولة . تطير من ايار الى ايلول || يرتبها صغيرة القد تطول من ١٦ الى ١٨ م. تميش على اوراق الملفوف والنس والذرة والبق وقد تقرض سوق شتول الملفوف نصطيا وتقصم اوراق البتج فتشوها .

١٩٨٦٨ - **عشية حنكس ، Noctuelle bois (F)**

حشرة تلعى اخروفس أحس ، اطليها .

١٩٨٦٩ - **عشية رمدكاه ، Acronycta rumicida (S)**
Noctuelle cendrée, Cendrée (F). Dark knot-grass moth (E). Ampferseule (D).
فراشة صغيرة القد رمداء الثوب مبقية بالابيض . ايجالها الحولية ثلاثة . تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها صغيرة القد ثوبا الى السرة العالقة ، طولها براوح بين ١٤ و ١٨ م || تركب الجنبيل والملفوف والاشياك .

١٩٨٧٠ - **عشية زنجية**

Noctuelle basanée (F).
حشرة تلعى اخروفس زنجي ، اطليها .

١٩٨٧١ - **عشية عجيبة * ، نليكية عجيبة**

Agrota exclamatoria, Feltia exclamatoria (S). Noctuelle point d'exclamation, N. double tache, Double tache (F). Heart and dart moth (E). Kreuzkrautzackereule, Ausrufungszeichen (D).
فراشة صغيرة القد حنطية اللون . وروشنا الاماميان الى الشقار الصاني يملوها بتيج ثنائي الشكل . ايجالها الحولية اربعة اوجه || يرتبها كداه اللون تطول من ١٦ الى ١٩ م. تركب القتب والسانت والشعير والذرة وتختطف النجيليات المروجية والشعير والبطاطا والملفوف واللفت والكرمة والبق .

١٩٨٧٢ - **عشية قلوقة ، Noctuelle ypsilon**

هي فراشة البودة القارضة ، اطليها .

١٩٨٧٣ - **عشية مصاحبة**

Tryphaena pronuba (S). Noctuelle pronubée, Flancée (F). Common yellow underwing moth (E). Heumittzerchen (D).
فراشة صغيرة القد ، سمراء اللون ، فضية التيج النقيق



عشية القتب



عشية الملفوف



عشية عجيبة



عشية مصاحبة



عسوة

١٩٨٩٩ - عُشَائِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ

Hyménoptères symphytes (F). Hymenoptera symphytes (E).

رتبة حشرات من طبقة عُشَائِيَّاتِ الجناح . أجناسها وأنواعها زهاء ٨٠٠٠٠٠ أجناسها متباينة الأقسام تراوح بين ٣ و ٤٠ م . جميعها كاملة التطور ، رباعية الأجنحة الثلاثية . عادمة الانفصال الحسري ، بطولها لائحة بحولائها . أعضائها قارضة أو لائحة . ممرات أنثى سننة كالنشارة تحترق أصلب الماء وهي تستعملها في الحفر والحز والروث أو أشهر فصائلها : العلبسات والغطاريات والنطريجات .

١٩٩٠٠ - عُشَائِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ الْمُحْصَرَّةِ

Hyménoptères apocrites (F). Hymenoptera apocrites (E).

رتبة حشرات من طبقة عُشَائِيَّاتِ الجناح . أجناسها وأنواعها زهاء ١٢٠٠٠٠٠ أجناسها متباينة الأقسام والألوان . جميعها كاملة التطور . محصورة دقيقة واضحة منها الابنوبية الشكل والردنية . أجناسها عُشَائِيَّةٌ رباعية . أعضائها قارضة أو لائحة . أشر أنثى سننة كالنشارة تستعمل الحفر والحز والروث أو أشهرها الأبريات والذخوريات والدلتيكات والذيرديات والنطليات والنطليات والصفريات والنمسيات .

١٩٩٠١ - عُشْمِيرٌ

Hyperparasite (F).

كل كائن مقلد يمشى على مقلد آخر .

١٩٩٠٢ - عُشْمُوكَةٌ

ثمرة السدر . ج . شمر .

١٩٩٠٣ - عُصَبٌ

هو الاختصاب ، أطله .

١٩٩٠٤ - عُصَصٌ

Gallinosa (S). Gallinosa, Gallinogla (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات . أنواعها عديدة : جميعها برية . أوراقها متقابلة ، ناعما حادة أو زب . أزهارها حامية الإبتكار ، عديدة الألوان التي تختلف باختلاف الأنواع . وهو بجميع أنواعه من النباتات المرصوة لكنه يعتبر من الاشباق القليلة التي تستنزف التربة وتؤدي الزرع والزعزعة .

١٩٩٠٥ - عُصْنٌ ، تَعَصِينٌ

Ebranchage (F). Pruning, Lopping, Trimming (E).

هو اقتلاع الأغصان وقد يكون السبب حث الشجرة على الارتفاع أو تغيير هيكلها أو تجديد شبابها .

١٩٩٠٦ - عُصْنٌ

Branche (F). Branch, Bough (E). Lmb (E).

الفنص هو الفرع على الساق غلط أو دق .

١٩٩٠٧ - عُصْنٌ تَصْرِيٌّ

Branche frutière (F). Lmb (E).

عصن يكون عادة أدق من الأغصان المألوفة الأخرى يحمل الكبر مباشرة .

١٩٩٠٨ - عُصْنَةٌ ، عُصَيْنٌ

Ramille (F). Twig (E). عُصْنَةٌ والنمسين هو ما اشتق من الأغصان بلغ الحول أو لم يبلغه .

١٩٨٨١ - عُسُولٌ

هو إثنان ابوساق ، أطله .

١٩٨٨٢ - عُسُولِيٌّ

نبت من السباغ (المان) .

١٩٨٨٣ - عُشٌّ

Falsification, Fraude (F). Falsification, Fraud (E).

خدع الشاري بتبديل ماعية المشتري أو تبديل صفاته . وفي القانون المدني هو الخداع المقرون بسوء نية للاضرار بالغير ككسب البادار والاسمعة والأدوية الخ ...

١٩٨٨٤ - عُشَاءٌ ، غِلَافٌ

Tégument, Membrane (F). Membrane, Tégument (E).

ما يغطي أو يلف جسم الحيوان والنبات كالجلك والوبر والریش وأغشاف والماء .

١٩٨٨٥ - عُشَاءٌ جَرْئِيٌّ ، عُشَاءٌ رَحْمِيٌّ

Membrane germinale (S). Germinal membrane (E).

١٩٨٨٦ - عُشَاءٌ خَلَوِيٌّ

Membrane cellulaire (F). Cell membrane (E).

١٩٨٨٧ - عُشَاءٌ مَسْتَحِيٌّ ، عُشَاءٌ نُحْرَوِيٌّ

Membrane alvéolaire (F). Alveolar membrane (E).

١٩٨٨٨ - عُشَاءٌ عَضَلِيٌّ

Myolarme, Sarcolemme (F).

كل غشاء يلف العضلات الرئيسية .

١٩٨٨٩ - عُشَاءٌ هَرِيَّالِيٌّ

Membrane criblée (F). Sieve membrane (E).

١٩٨٩٠ - عُشَاءٌ غُطَائِيٌّ

Membrane recouvrante, M. tectoriale (F). Tectorial membrane (E).

١٩٨٩١ - عُشَاءٌ لَمِيزٌ

Membrane limitative (F). Limiting membrane (E).

١٩٨٩٢ - عُشَاءٌ مُعَاطِيٌّ

Muqueuse, Membrane muqueuse (F). Mucosa, Mucous (E).

مادة مخاطية تلتف بغش أجزاء أعضاء الجسم الحيواني .

١٩٨٩٣ - عُشَاءٌ صَفِيٍّ

Membrane séreuse (F). Serous membrane (E).

١٩٨٩٤ - عُشَاءٌ نَاقِضٌ

Membrane caduque (F). Deciduous membrane, Decidua (E).

١٩٨٩٥ - عُشَاءٌ نَوَوِيٌّ

Membrane nucléaire (F). Nuclear membrane (E).

١٩٨٩٦ - عُشَائِيٌّ

Membraneux (F). Membranous (E).

١٩٨٩٧ - عُشَائِيَّاتٌ ، فُطُورٌ عُشَائِيَّةٌ

Hyménomycètes (F). Hymenomycetes (E).

مجموعة من الفطور العفصية من ذوات اللقطة البورية .

١٩٨٩٨ - عُشَائِيَّاتُ الْجَنَاحِ

Hyménoptéroïdes (F). Hymenopteroides (E).

طبقة حشرات من شعبة الحسدليات وطائفة الأجنحة أصلا . تشمل كل من رتبتي عُشَائِيَّةِ الأجنحة وعُشَائِيَّةِ الأجنحة المحصورة . أما أنواعها فنحو ٢٠٠٠٠٠ تنتمي في ٩٦ فصيلة .

ظهور اليوم باستعمال سائل يورود الحليل من ١ الى ١,٥ %

١٩٩١٥ - عُصْبَاة
Tamaris de Syrie (F).
هو الاثل السوري شجرته تملو نحو عشرة امتار اعتشباها صلبة مغروبة فيها . ج. خضا .

١٩٩١٦ - عُصْبَاة ، دَلْعَان (F).
Glaise, Argile verte (F).
تراب حصالي لايب سحر شديد الانساج والصلابة لونه الى الخضار الداكن . يستعمل في صناعة الفخار والحلج .

١٩٩١٧ - عُصْبَاة *
Paragénézie (F).
Paragenes (E).
النفصارة تهجين تكون فيه المحجن حقيرة ان تصالبت فيها بينها وتكون ثلثة ليا نو تصالبت مع كل من اوروبا .

١٩٩١٨ - عُصْبَاة
Pléthore (F). Plethora (E).
النفصارة حي فرط النمو في النبات .

١٩٩١٩ - عُصْبَاة ، دَلْعَان (F).
Glaiseux (F).
الذي يحتوي على النفار او الذي يشبه النفار او الدلعان .

١٩٩٢٠ - عُصْبَاة
Clayey, Loamy (E).
نوع من الجراد ويسمى الجراد المبارك (السان) .

١٩٩٢١ - عُصْبَان (F).
Avortement (F). Abortion (E).
هو لثاء الاثني الحامل ولدها لغير تمام .

١٩٩٢٢ - عُصْبَاة *
Tunica (S). Tunique (F).
حشية برية معمرة من فصيلة القرنفليات . ساقها دقيقة فروعها تملو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقها جذعية الانتشاج .

١٩٩٢٣ - عُصْبَاة
Lawn, Greensward (E).
كل ارض يشعلها العشب الاخضر ان طويها او مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٢٤ - عُصْبَاة
Pelouse (F).
النفرة لبت دقيق الورق الاخضر يفرش الارض .

١٩٩٢٥ - عُصْبَرَم
Silicate d'alumine (F).
Silicate of alumina (E).
مركب طبيعي يحوي بعض الاليومين . للفسارم كمية العدد لا يبالغ لذكرا جميعها انما تختص منها الفلمسية والميكا والنفار والكولان .

١٩٩٢٦ - عُصْرُوف
Cartilage (F).
Cartilage, Gristle (E).
مادة عضوية قوية مرنة مطاطة يضاء اللون تكثر كمامة عند الحراف الطام .

١٩٩٢٧ - عُصْرُوفُ العُطَم
Cartilage des os (F).
Bone cartilage (E).

١٩٩٠٩ - عُصْرُوفُ جَسُور *
Tyrannus Intrepidus (S).

Tyrannus Intrepide, Pipiri (F). Tyrant, King-bird (E).
طائر من القوط من فصيلة التصوصيات . موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية يرسل منها الى امريكا الشمالية في اواسط آذار ويصل اليها في اواسط ايلول . يالت غشاق البعيريات ويحاري الماء ويقترّب من الجنائن والحدائق والبساتين || جسمه متوسط القد بطول نحو ٢٠ سم . ثوبه متباين الالوان المتداخلة . رأسه وظهوره الى الازرق الزرقاء المزاج . ذرو صقلا الى الياض الناطع . صدره وبطنه الى الازرق الشهباء . ويعلو في كل من صغفه شريط يرتقالي يمتد من قاعدة الحنق الى الفخذ . جناحا وذنبه الى الزرقة السوداء المزاج . ذنبه مستدير الطرف . ريشه واصابعه الى السرة || قوته الحشرات المخططة من الكبيرة الى الصغيرة والزيتون والنمل || يثنى حثه في الاجار الرطبة على الاضغان المنسطة . الاثني تقع من اربع الى خمس بيضات لونها الى الياض المرقوش بالاحمر والاسمر . الحفن يستمر نحو اسبوعين تقود به الاثني بتأدية الذكر .



عُصْرُوفُ جَسُور

١٩٩١٠ - عُصْرُوبَات *
Tyrannidae (S). Tyrannidae (E).

فصيلة طير من الجوارم نباتات المتأثير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور البلاد الامريكية اجناسها امريكية الجنوبية || اجناسها متوسطة القد . مناقبها بطول رؤوسها . اجنتها ذلقة . اذنانها قصيرة متباينة الاشكال . ارجلها دقيقة مستعدة لليل . اقبها ملونة زاهية الخصب || قوتها الحشرات وصل اختلاف فصائلها || اعرف انواعها وفهرها العُصْرُوفُ الجَسُور .



نفساء لاطح

١٩٩١١ - عُصِين *
Polychaete (F). Polychaetous (E).

العُصِين من النبات ما كانت اجناسه وفائده اكثر من المائون .

١٩٩١٢ - عُصْبَاة ، اَنْتُمْصُورِيَوْم *
Entomosporium (S). Entomosporiose (F).

جنس تطور مجهرية من فصيلة المدكيات . يكتنفاته مغلفة ، سوداء اللون ، فريجة الانفلاق . جولا تحيل الحلة ، غليظ القاعدة . شقيراته سبية لاسقة ، بويذاته ثنائية الخلية || اشهر انواعه العُصْبَاة لاطح .

١٩٩١٣ - عُصْبَاة الخُل *
Entomosporium thuemeli (S). Entomosporiose du dattier (F).

آفة لثقل الكالهار يقع حل البسر فيفتح الاذراك ويصيب التبيش والنفث || يكافح حثه ظهوره باستعمال سائل يورود الحليل من ٨ الى ١ %

١٩٩١٤ - عُصْبَاة لاطح *
Entomosporium maculatum (S). Entomosporiose maculée (F).

نظر مجهرية يصيب ورق الزعرور والارونة والشملة والاكيذنيا . وقد يصيب في بعض ظروف غامضة الاضغان والجار غير المعرضة لاسمة الشمس || مظهره الخاربي يقع صغرة مستديرة مبررة على كامل فصل الاوراق ، تبعو بقية اللون ثم تحرف نحو السرة نصب البشرة والنجس المتحارة وتثل التبادل التلشي || يكافح حثه



عُصْبَاة

١٩٩٣٩ - غُضُرُوفٌ حَلَقِيَّةٌ ، جُوتِيَّ البَيْدَاءِ

Syrhaptus paradoxus (F). *Syrhaptus paradoxus*,
Poule des stappes (F). Black-bellied (E).

طائر من النصف طول نحو ٢٤ سم. يعيش أستراليا كبيرة
تجرب في أي أسية التباينة وإكسولي. قلا خلق في سماء لبنان .

١٩٩٤٠ - غُضُرُوفٌ حَلَقِيَّةٌ ، جُوتِيَّ التَبَتِ

Syrhaptus tibetanus (S). *Syrhaptus du Thibet* (F).

طائر من النصف طول نحو ٢٢ سم. توهه الالباس .

أستراليا قليلة العدد . موطنه مرتفعات التبت وبجبالها .

١٩٩٤١ - غُضَيِّفَات

Pteroclididae (S). *Pteroclididae* (E).

فصيلة من الطير من رتبة الدجاجيات تعرف بالجواريث .

١٩٩٤٢ - غُضَيِّفٌ

Tunika (F). *Tunica* (E).

١٩٩٤٣ - غُضَيِّفٌ العَيْنِ

Tunika de l'oeil (F).

Tunika granuleuse (F). *Granulosa tunica* (E).

Tunika adventice (F). *Adventice tunica* (E).

Tunika fibreuse (F). *Fibrosa tunica* (E).

Tunika moyenne (F). *Media tunica* (E).

Tunika muqueuse (F). *Mucosa tunica* (E).

Pli déjeté (F). *Asymmetrical fold* (E).

Saccolaryx (S). *Saccolaryx* (F).

Saccolaryx (F). *Saccolaryx* (E).

Pléthorique (F). *Plethoric* (E).

Sistostrema confusum (S). *Sistostrema confusum* (F).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).

Sistostrema confusum (F). *Sistostrema confusum* (E).



غُضَيِّفَةُ التَّبَتِ



غُضَيِّفٌ

١٩٩٣٨ - غُضُرُوفٌ حَلَقِيَّةٌ

Cartilage cricoide (F). *Cricoid cartilage* (E).

Cartilage costal (F). *Costal cartilage* (E).

Fibrocartilage (F). *Fibro-cartilage* (E).

Cartilage calcifié (F). *Calcified cartilage* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Cartilagineux (F). *Cartilaginous*, *Gristly* (E).

Argyronète (F).

١٩٩٦٢ - غُطْرُف

هي النسيبة للمالية، اطلمها .

Podicipidae (S).

١٩٩٦٣ - غُطْرُفِيَّات

Podicipidae (F). Podicipidae (E).

فصيلة طيور مائية من رتبة كفيّات القدم تتميز بأجسامها البيضية الشكل . امتنقا دقيقة مسطيلة ورؤوسها صديرة . أذناها هريانة . أرساغها حبيبية . أصابعها غليظة اعظافها عريضة مبيلة . ريشها ناعم . حرري ، مصقول . اجنحتها قصيرة ذلقة . أذناها مشعرة وطلة . أشهر اجناسها الطاس .

Pterocles senegalensis (S). غُطْرُط

Pterocle du Sénégal (F). Singed sandgrouse (E). قال المصري : و ضرب من الطفا غير الطهور والبطون والابدان سود بطون الاجنحة طول الاربيل والاعتاق لطاف لا تتجمع ارسابا واكثر ما تكون ثلاثا او اثنتين الواحدة غطاطة كذا قاله الجاهري وقال ابن سيده الطفا القطا وقيل الطفا ضربان فالقصار الاربيل الصغر الاعتاق السود القوادم الصهب الخوازي هي الكديرة والجلوية والطواف الاربيل البيض البطون القدر الطهور البراسمة السبين هي الطفاط . وقيل الطفاط ضرب من الطير ليس من الطفا .

Neotragus pygmaeus (S). غُطْرُف

Guevi (F). حيوان لبني وحيد الجنس والنوع من الغزلان . موطنه يمتد من ليريه الى افنديه . يأكل الغابات . ملجته الحياني جاسي || جسمه صغير القد بطول نحو ٦٥ سم . ويرتفع نحو ٤٥ سم . قوائمه دقيقة . القفائمان الاسودتان اقصر من الخلفيتين . ثوبه الى الشحنة السوداء المروج . صدره وبطنه الى البياض الاخير . قرنا الذكر قصيرا دليقان . الاثنى جاء ثنائية الاخلاص || يعتبر من اسرع انواع الغزلان وانفرا .

Vipère tigrée (F). غُطْرُوب

الطرب حية خبيثة تدعى افسى نمره اطلمها .

Vipère noire (F). غُطْرُوب اَسْوَد

حية خبيثة تدعى افسى سوداء . اطلمها .

١٩٩٦٨ - غُطْرُف الحَمْصِيَّات

Aleurotrachilus citri (S). Aleurodes des citrus (F). ويدهي ذبابا للملاح البيضاء . حشرة من الطفريات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ م . حوريتها بيضية الشكل عمودية الظهر الاسود . حناص صفتها كثيف الاهداب الشمعية البياض . تركيب جميع انواع الحَمْصِيَّات تنفذيها لأنها تطب الارواح بد ان تمص مصارتها .

١٩٩٦٩ - غُطْرُف الرِّمَان

Siphonius granati (S). Aleurodes des granadiers (F). حشرة من الطفريات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ م . جسمها اسمر اللون ، اغبر للمادة الشمعية . تمتص مكثا على اوراق البنيات الحَمْصِيَّات فيقتف من حوريات مغلطمة اللون الاسمر ، بيضية الشكل ، كثيفة الاهداب الشمعية البياض || تركيب اوراق وانفان الريان والاجاص والسفرجل .

Plicatula (S).

١٩٩٥٥ - غُصَيَّة

Plicatule (F). Plicatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخليش وفضيلة القفاحات . انواعها الماسرة المعروفة قليلة العدد منتشرة من المحيط الهندي الى اطراف المحيط الهادي || اصداها صخرة الجرم ، مروحية الشكل ، متحفة القدم ، شمانية التخديذ ، لامناوية المصاريع ، المصراع الانسي محذوب الضفحة قليل التخديذ || تعيش لاصقة بالصخور البعيدة القور .

Ganga 'brûlé (F). غُصَيَّة

طائر من القتا يعرف بالقطاة المصراوية .

Podiceps (S). غُطْرُاس ، غُطْرُاس

Grèbe (F). Grèbe (E). جنس طيور مائية من فصيلة القنطليات . انوله نحو ٣٥ اطلمها العالم . جميعها من القواطع . تربط في المياه العذبة . تتميز باسعالها امتنقا . غطاطها جالسة . اجنحتها قصيرة ذلقة . يطي تحيد العرم والقص . قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات والحشرات والنفذاع والنباتات المائية . تدن في القصب والقتزار والامل حل ضفاف البحيرات والابار || انها تقنع من ٣ الى ٦ بيضات تحضنها بتناوبه الذكر مدة ثلاثة اشابيع . أشهر انواعها الطاس اثنيج والمطوق والاذن والصنبر .

Podiceps auritus (S). غُطْرُاس اَدِن

Grèbe oreillard (F). طائر من الطاس متوسط الوجة طول نحو ٣٥ سم . ثوبه متراكب الالوان الزاهية . غططه اسود الجسم ، اجر اللطط . اطانه فضية الارباء تشمل معظم بحيرات الشرق واروبه التي يتفقد اكثرها في كل حبل .

١٩٩٥٩ - غُطْرُاس صَغِير

Podiceps minor, P. fluviatilis (S). Grèbe castagneux, Plongeur nain, P. des fleuves... (F).

طائر من الطاس صغير الوجة طول نحو ٢٤ سم . ثوبه متباين الالوان الزاهية . ظهره الى السمرة يعلوها موج زخرفي . صدره الى الربعة السوداء المروج . بطنه اسهب اللون . حنقه الى الشقرة الكريزية . زلفه ابيض . غططه اصفر الجسم ، اسود اللطط || اطانه بحيرات ومنتاج وانهار العالم القديم يتفقد معظمها كل عام .

١٩٩٦٠ - غُطْرُاس مُتَوَجِّع

Podiceps cristatus (S). Grèbe huppé (F).

طائر من الطاس كبير الوجة طول نحو ٥٢ سم . ثوبه متراكب الالوان الالاسمة . ظهره الى السمرة السوداء المروج . رأسه متوجج القفن بقنطحين اقفية الاوتكاز . محسره وصنعه بيض اللون ، سود اعثار الباعلي . شقر الاهداب الخارجية . زوره وبطنه وغوايته فضية اللون ، صناعية الرقعة . زلفه وصنعه حر . غططه اصفر الضفحة البليا ، احر السفل ، ابيض اللقط . قاتمته الى السمرة الخضراء . اطانه العالم يحرب جميع البلاد مستقدا حيائها العذبة .

١٩٩٦١ - غُطْرُاس مُطْرُوق

Podiceps nigricollis (S). Grèbe à cou noir (F).

طائر من الطاس متوسط الوجة طول نحو ٣٢ سم . ثوبه متراكب الالوان الزاهية ، حنقه اسود . بطنه ابيض . وهو يجتنب المناطق الباردة ويحجب مياه البلاد الممتدة دون سواها .



غُصَيَّة



قُطاس متوج



قُطاس



غُطْرُف الحَمْصِيَّات



غُطْرُف الرِّمَان



غُطُوف السَّيْدِيَّان



غُطُوف اللَّيْلِ



غُطُوف الْقَطَنِ



غُطُوف الْمَلْفُوف



غُطُوف النَّعْنَاع



غُفَّتْ ابْنِ سَيْنَا

١٩٨٠ - غُطُوبِيَّة

Hydroble (F). تمت ترميزه يطلق على النباتات والحشرات التي تعيش في الماء .

١٩٨١ - غُطُوبِيَّة

Bifora (S). Bifore (F). جنس نباتات عشبية حولية بيرة من فصيلة الخيميات . أنواعها المعروفة قليلة البعد منها بيش مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وبیش مناطق أمريكا الجنوبية || جميعها كزبرية الشكل ، مستقيمة الرقبة . أزهارها صيوانية التجميع . أزهارها بيضاء اللون . ثمارها شبه لبيبة الشكل ، مبطلة الجرم ، عذبة الوسط للمضغ || أعرف أنواعها وأشهرها التفصارة الخيمية .

١٩٨٢ - غُطُوبِيَّة

Bifora caucasicola (S). Bifore caucasicola (F). نوع من التفصارة ، عشبية حولية بيرة . طويعة في بعض أصناف لبنان وسورية . ساقها لساء فراء . أوراقها مركبة ، ريشية ، ثنائية التفرع . أزهارها صيوانية . أزهارها بيضاء اللون . ثمارها معتدلة التبطيط قريبة الشبه بالخصي .

١٩٨٣ - غُفَّتْ

Eupatorium (S). Eupatoire (F). جنس نباتات معمرة من سبط الغنديات وفصيلة المركبات أنواعها عديدة معظمها بري وبیشها زرعبي . ساقها خشوية . أوراقها لاقامية الانتظام والارتكاز منها البسيطة والمركبة ومنها المتعاقبة والمتناوبة || أزهارها رؤسية صغيرة لثقة . بزورها نخولة . يعلوها حلب مسنن || أعرف أنواعها وأشهرها ما على .

١٩٨٤ - غُفَّتْ ابْنِ سَيْنَا ، عَحْدَةُ الْبَيْتِ

Eupatorium cannabinum (S). Eupatoire d'Avicenne, E. chanvrine, Chanvre d'eau, Chanvrine, Herbe de Ste Cunegonde (F). Water hemp, Hemp agrimony, Hemp weed (E). Hanfzweed, Wasserhanf (D). Eupatoria d'Avicenna, Canapa acquatica (I). مجلة برويتية مبطلة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقها مركبة ثلاثية أو خماسية الورديات المستطيلة . نصلها أصصي الشكل ، مسنن الحافة . أزهارها وردية اللون ، خماسية أو سداسية الرؤيات الصغيرة || أزهارها يمتد من محور إلى الأعلى . وهي ترقب في المزارع البرية . كانت شائعة الاستعمال الطبي لقيمة الكبد وتستعمل في عدة علاجات لأمراض أخرى .

١٩٨٥ - غُفَّتْ أَرْجَوَانِيَّة

Eupatorium purpureum (S). Eupatoire pourpre (F). جنبة برويتية معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . ساقها لسطوانية سرسة . أوراقها السفلى لسمية براوح عذبة بين ٣ و ٦ . أوراقها العليا متعاقبة ، جميعها منقطة ، متناوبة لنصل الخشن للملس || رؤياتها الزهرية خمرية التجميع ، أرجوانية اللون || أزهارها يمتد من أيلول إلى تشرين .

١٩٨٦ - غُفَّتْ أَسْمَر

Eupatorium strorubens (S). Eupatoire brune (F). جنبة برويتية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها ورديتها زرقاء اللحاء ، زغبية جزوي اللون . أوراقها منقطة كبيرة لثقة تملو نحو ٣٠ سم . وتعرض من ١٦ إلى ٢٠ سم . نصلها

١٩٨٧ - غُطُوبِيَّة السَّيْدِيَّان

Aleurodes quercus (S). Aleurode des chênes (F). حشرة من الطفريات طلياً براوح بين ١ و ٢ مم . لها إلى الصفار الباهت الشفاف المنش بالأسود || حورياتها مستبنة بقط لامة متناوبة قاطية . وهي تركب أوراق السيتان فتؤذيها .

١٩٨٨ - غُطُوبِيَّة الْقَلْب

Dialeurodes kirkaldyi (S). Dialeurode (F). حشرة صغيرة من الطفريات طلياً براوح بين ١ و ١.٥ مم . جسمها اسمر اللون . مكثها أخضر . حورياتها تركب الأوراق حل صفحتها السفلى وهي صفراء اللون ، خضراء اللون ، يبيضه العداب الشمية اللقيقة القصيرة .

١٩٨٩ - غُطُوبِيَّة الْقُطْن

Bemisia gossypiperda (S). Bemisia, Aleurode du coton (F). حشرة من الطفريات طلياً نحو ١ مم . لها إلى الصفرة النضائية العاطية || حورياتها مستبنة الشكل ، زيتية اللون ، مدرة أخضر المنحرب . تركب أوراق القطن والبنندرة وأبالذاتجنا .

١٩٩٠ - غُطُوبِيَّة الْمَلْفُوف

Aleurodes brassicae (S). Aleurode du chou (F). Greenhouse white fly (E). حشرة من الطفريات طلياً براوح بين ١ و ١.٥ مم . لها إلى الصفرة تملو رقيقة صفراء . حورياتها مسطلة الشكل ، سمر اللون ، طليقة لفواصل ، تركب أوراق شتل الملفوف في أول عهدا فتؤذيها لحد الانس .

١٩٩١ - غُطُوبِيَّة التَّعَن

Aleurodes menthae (S). Aleurode de la menthe (F). حشرة من الطفريات طلياً براوح بين ١ و ١.٥ مم . اجتمعتها بحجة العروق الوسطى || حورياتها يضيئة الشكل ، عذوبة اللون الغليل اللادة الشمية . لعداب حشواتها طليقة ، ثنائية التجميع || تركب أوراق التنع فتؤذيها .

١٩٩٢ - غُطُوبِيَّة

Aleurodidae (S). Aleurodidae (F). Aleurodidae (E). فصيلة حشرات من رتبة حشائبات الاجنحة . اجتمعتها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة لثقة سريعة الطيران يكر ويجود في البلاد الباردة . تتميز برويتها لتضررها حشواتها كبيرة . قرونها الاستشعارية مركبة من عدة فواصل تراوح بين ٤ و ٧ . اضطلعها بارزة مخفية . جوشها عريضة . بطيها اسطوانية . ارجلها مستطيلة . اجتمعتها كبيرة ، مستدرة الأطراف . اجسامها واجتمعتها مفاضة شمعية طليقة الشكل يبيضه اللون || حورياتها مبطلة الجسم ، يضيئة الشكل أو مستديرة . ظهورها موشمة بشفاء شمعي يخلط قدره باختلاف الاجناس .

١٩٩٣ - غُطُوبِيَّة

Immerger (F). غطس ، غطس غطس انفس في الماء فغمره .

١٩٩٤ - غُطُوبِيَّة

الصلط . ج ضاغط : السائل الاناث .

١٩٩٥ - غُطُوبِيَّة

الطلس . الطلس هو اللذب .

٧ م. ثوبها خطي اللون ، اسمر المواج . ريقها تركب
الصنوبر الممر تغترس الجلاء والشكير .
Umbra (S). Umbra (F). **شَفْشَف** .
Umbra, Mud-minnow (E).

جنس اسماك بحرية من مفتحات المثانة . اجسامها
احليجية الشكل ، قصيرة ، مقنونة . زعانفها
الظهيرية والشرجية كبيرة الحجم اما الصدرية والبطنية
فصغيرة . فصوصها خشنة متراكمة . اثنيها الى السرة
القبزاء يطولها تبقيع ضارب . اشهر انواعها المروقة اثنتان .
Métal cru (F). Raw metal (E). **غُفْغُل** .
Inertie (F). Inertia (E). **غُفْغُل** .
٢٠٠٠٥ - **غُفْغُر** هو رجب الشمره ، اطلية .

٢٠٠١٣ - **غُفْغُل المتناقع ، شَفْشَف المتناقع**
Umbra crameri (S).
سمكة من الغلاء تعيش في البحيرات والمتنقع والياه الزاكنة .
طولها نحو ١٥ سم . ثوبها الى السرة الغبراء الباكنة .
تتميز بكثرة تنسلها وقوة احتياكها لقلبات دجبات الحرارة .
Melochria (S). **غُفْغُور** .
Mélochrie (F). Melochria (E).

جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة القرقيات . مهدا
بعض المناطق الاسيوية والافريقية الحارة . حولتها طويلة
لانشفية . اوراقها كبيرة قلبية الشكل او احليجية .
ازهارها وحيطة المسكن عتقة الالوان . ثمارها بيضيه او
مستديرة || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .
Umbra lilii (S). **شَفْشَف ليلي** .
سمكة من الغلاء تعيش في بحيرات البلاد الباردة ، طولها نحو
١٢ سم . ثوبها الى السرة الخفيفة يبقع عنه الظهور .

٢٠٠١٥ - **غُفْغُوشيا**
Févier (F).
هي النسوة شجرة من القرقيات القرشالية ، اطلية .
٢٠٠٠٧ - **غُفْغُور مُتَدَلِّي الثمار**

Melochria pendula (S).
Melochria à fruits pendants (F).
نوع من الفُفُور الممر . مهد بعض المناطق الاسيوية .
ساقه متسلقة قصيرة . جنته مدلاة . اوراقه قلبية الشكل ،
ثلثية او خماسية الفصوص المسنة الحار . ازهارها وسيدة
المسكن ، المتكية منها ضمية التجميع ، المتكية فردية ،
مستطيلة المالحق . لونها الى البياض الاخضر المواج .
ثمارها بيضيه الشكل لونها الى الاخضر الاصفر ، طولا
نحو ٢ سم . ورضها ١ سم .

٢٠٠٠٨ - **غُفْغُور مَدْرَاسِي**

Melochria madraspatana (S).
Mélochrie de Madras (F).
نوع من الفُفُور الحولي . مهد بعض مناطق الهند . ساقه
متسلقة تطول نحو خمسة امتار . اوراقه احليجية الشكل ،
ثلثية او خماسية الفصوص . نصلها قاسية ، مهدبة
الصنمحات السفلى . ازهارها صفراء اللون ، المتكية منها
ضمية التجميع ، المتكية فردية . ثماره نصف مستديرة
الشكل ، حجبها حجم البرتقالة الصغيرة . قشورها مشامة
بالاصفر والاخر . تتوكل مطبوخة .

٢٠٠٠٩ - **غُفْغُور هَاتِكُ الزَّيْن**

Melochria heterophylla (S).
Mélochria heterophylla (F).
نوع من الفُفُور الممر . مهد بيند الى اليابان .
ساقه متسلقة محتلة الطول . اوراقه هاتكة حتيانية الاشكال ،
منها الاحليجية المنصصة ومنها المسنة والسنانية . نصلها
قاسية ، مرقها حاملة يزنق ابيض فضي المواج . ازهارها
ثنائية المسكن ، يضاء اللون . الذكرية طقية التجميع ،
الانثوية فردية . هناك الذكرية رباعية الجيوب .
Périchondre (F). **غِلاف الفُفُورُف** .
Perichondrium (E).

٢٠٠٢٢ - **غِلاف مِثَالِي**
Hydrosphère (F).
Hydrosphere (E).

٢٠٠٢٣ - **غِلاف مِخْرَم**
Pericycle (F).
Pericycle (E).

اسم يطلق على التسج الخشبية ، ان في الساق ام في الجذر ،
الكثانة بين الحزم القوامية والشكير .
Inertie (F). Inert (E). **غُفْغُل** .
٢٠٠١١ - **هَلْ ، إعتياد ، إعتياد**
Invagimtion
دخول جزء من تسج في تسج آخر . وهو ان سمل في
الصران كان تتالا .



غلاء

٢٠٢٤ - **غِلَافٌ يَكْبِسُ**Lithosphere (F).
Lithosphere (E).٢٠٢٥ - **غِلَالِيَتُ** (F). Gahlich (E).
جبين صناعي صَافٍ يستخرجون منه مادة قاسية كالقطن
كبيرة الاسماح الصناعي .٢٠٢٦ - **غِلَاكُ**Gadiculus (S). Gadicle (F).
جنس احساك بحرية من فصيلة الغاديسيات المسالوات . انواعه
قليلة . اصلاها ببحار البلاد المعتدلة الحرارة انحصار شري
وجنوبي المتوسط || اجسامها صغيرة اللد ، اطليجية
الشكل ، عديمة الزواحف ، سفلية الشفق ، كبيرة العين
المستديرة البارزة || احرف انواعها واشهرها الثلاث اللقي.٢٠٢٧ - **غِلَاكُ لَفِيفِي**Gadiculus argenteus (S).
Gadicule argenté (F).
سمكة من الثلاث اصلاها بعض مناطق البحر المتوسط . طولها
يراجح بين ١٥ و ١٢ سم . ثوبها وردي اللون . بطبا
وصهرها الى الفضة ، زعامتها ربادية || لحمها مستحب
الطعم .٢٠٢٨ - **غُلْبُولُ**

Galbula (S).

Galbula (F). Galbula (E).

جنس طير من فصيلة الغلبوليات ودبة الجوارح وانها
الناثري . انواعه المعروفة ستة جميعها من طيور البرازيل
وفنزويلا || اجسامها ريمية ريشة تطول من ١٨ الى ٢٤
سم . تتميز باستطالة المناديل الهززية الشكل . اجنتها
قصيرة . اذنتها مسطيلة ، راتجة الرقاع . اقرباها متراكبة
الالوان الصفراء المراح . بعض انواعها ابيض الزور ||
تألف النبايات دون سواها ، فوها الحشرات وبعض الثمار
الغنية البرية .٢٠٢٩ - **غُلْبُولِيَّاتٌ**

Galbulidae (S).

Galbulidae (F). Galbulidae (E).

فصيلة طير من الجوارح وانها المتناقلة . اجنتها وانواعها
المعروفة عديدة ، جميعها من طيور البلاد الأمريكية
اشهر اجنتها الجفاري والغليول .٢٠٣٠ - **غُلَّةٌ ، لُزْلُكٌ**

Produit, Revenu (F).

Produit, Revenu, Income (E).

هي العمل او الربح وقد شاع استعمالها على حاصل الارض
الزراعية .٢٠٣١ - **غُلْتُونِيَّاتٌ**

Galtonia (S), Galtonia (F).

جنس نباتات زينة من فصيلة الزنقيات . مهدسا
افريقية الجنوبية . انواعها المعروفة قليلة . هدفها
مستديرة الشكل . ساقها اسطوانية تطول من ٨٠ الى ١٢٠
سم . اوروقها قرصية الالتشاب ، صفية ، تطول نحو
٧٥ سم . وتثمر من ٥ الى ٧ سم . تصلها الى الحصار
المابق الازرق المالح . اثمارها عتيدي للصبغ يطول
نحو ٣٠ سم . يحمل من ١٠ الى ٣٠ زهرة قمية الشكل ،
كبيرة القد ، يضاء اللون ، متدلية . تنموها يستمر من
تموز الى ايلول .٢٠٣٢ - **غُلْتٌ**

Criblure (F). Siftings (E).

ما يتغيه الغربال او يبقى بعد الفرلة من حبوب صغيرة
وزرد غريبة واجرام . والثالث يصلح طعاما للطيور
الدواجن .٢٠٣٣ - **غُلْتِي**

شجرة مرة قيل تمزجها بملك السباع (السان) .

٢٠٣٤ - **غُلْرُوقٌ** ، **غُلْغُلْسَاءُ الزَّرْقُ**

Galeruca (S). Galérucque (F).

جنس حشرات من فصيلة النضاريات ودبة مفدمات
الاجنحة . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد ، غيطة
الزرقا زاهية الالوان || يرقاتها غاشقة تركب اوراق
النبات فتخونها || اشهر انواعها ما يتبع .٢٠٣٥ - **غُلْرُوقُ الدَّرْدَرِ**Galerucella luteosa (S). Galérucque de l'orme (F).
حشرة من الغلروق جسمها ابيض الشكل يطول نحو ٧ مم .
ثوبها الى الصفراء المختل يطول موج احمر . اجسامها
الحليمة اثنتان || يرقاتها صغيرة القد تركب اوراق الدردار
تقترض التصل وتقضي عليه .٢٠٣٦ - **غُلْرُوقُ الشَّامِ**٢٠٣٧ - **غُلْرُوقُ الشَّيْطَانِ**Galerucella tenella (S). Galérucque du fraisier (F).
Strawberry leaf beetle (E). Erdbeerblattkäfer (F).
حشرة من الغلروق جسمها ابيض الشكل يطول نحو ٤ مم .
ثوبها صناعي اللون ، اغبر المالح . جيلها الحولي واحد .
يرقاتها تركب اوراق الشيك فتلهم التسج وتنف من
العروق .٢٠٣٨ - **غُلْرُوقُ المَفْثِ**Agelastica alni (S).
Galérucque de l'aulne (F).
حشرة من الغلروق طولها نحو ٦ مم . ثوبها الى الزرقة
البنفسجية . وسيدة الجبل الحولي . يرقاتها صغيرة القد
تميش بجمعة على اوراق المَفْث فتلتهم الواحدة بعد
الاخرى الى ان يتم افسادها فتترك الارواق وتستقر
في القرية حيث تمخلة وتبيض .٢٠٣٩ - **غُلْرُوقُ التَّرْجِسِ**Malacosoma lusitanica (S). Galérucque des
narcisses (F).
حشرة من الغلروق طولها نحو ٧ مم . ثوبها الى الصبغة
الصناعية البرتقالية . تركب وكوي رايح وانواع الترجيس
والزريق وسائر النبايات السكرية || يرقاتها تميش في
القرية عادمة الاذى .٢٠٤٠ - **غُلْطِي**

ساف من الطبقة الباشيرية يعرف بالالبيني ، اطلبه .

٢٠٤١ - **غُلْغُلُ**Pivot (F). Tap-root (E).
الغفل عرق الشجرة اذا آمن في الارض . ج غلاغل .
راجع جنت .٢٠٤٢ - **غُلْغُو**Galago (F).
حيوان لين من اليموريات يدعى دغفوس ، اطلبه .٢٠٤٣ - **غُلْغُلُ**Galgulus (S).
Galgule (F). Galgulus (E).
جنس حشرات دامت من لفصيلة الاجنحة المختلفة . انواعه
المعروفة نحو عشرة تميش على شفاف المنافع ويجاري الماء
غائرة في الاسماح والاصحال || اجسامها صغيرة القد ،

غلروق الدردار



غلروق الشيك



غلروق المَفْث



غلروق الترجيس

٢٠٠٥٤ - **غُلْدَه ٥٥**، **قَارِ الثَّيْل** *Golanda*
جس دويبات لبونة فاقسة من الجوزيات فضيلة الفأريات.
انواعه قليلة مطبأ افريقية ولحد صرديب . جميعها صغيرة
القد . أزهارها الى السرة المشته بالاصفر والاسفر بطريا
الى البياض الاقبر . صوفها خشن للمس || تألف
الحقل والمراعي وزراعات البن . قوتها قليل وزيمات البن
وأوراقه وقد تهب الرز وتقرنه في أجسامها .



غلف

٢٠٠٥٥ - **غُلْنُوس** *Glinus (S).*
Gline (F). *Glinus (E).*
جس نباتات عشبية ، حولية ، برية ، مروجية من فصيلة
المغريبات . انواعه المعروفة قليلة البند منبتها حوض
البحر الابيض المتوسط || سفها مستطبة . أزهارها
او يصفية مقلوبة . ازهارها ابيض الازكاز . ازهارها
صفراء او بيضاء اللون . تنويرها صيني || اعرف انواعه
غلنوس بشني وغلنوس دقتوني .

٢٠٠٥٦ - **غُلْنُوس بَشْنِي** *Glinus lotoides (S).* *Gline lotoides (F).*
نوع من الغلنوس . ساقه مستطبة ، منقبة ، مستطبة .
أوراقه شبه يصفية التصل . ازهارها ابيض . ازهار بيضاء .
تنويره صيني .

٢٠٠٥٧ - **غُلْنُوس دَقْتُونِي** *Glinus dictamnoides (S).* *Gline dictamnoides (F).*
نوع من الغلنوس يربط في المراتع الرطبة . ساقه متعنية ،
مستطبة . أوراقه صغيرة التصل ، ملطبة . ازهاره صغيرة ،
تينية اللون . تنويره صيني .



غلف

٢٠٠٥٨ - **غُلْنُوم** *Aglaonema (S).*
Aglaonima (F).
جس نباتات معمرة برية وترينية من فصيلة القلقاسيات .
انواعه المعروفة قليلة للبند اصلها بعض مناطق الهند وبنز
الزنج || سفها قصيرة . أزهارها متتامة ، منتشة ،
محفوفة الاضلاع ، سانية التصل المتفتحة الاطراف .
ازهارها محوري الانتشاب ، صبي التجميع . ازهارها
صغيرة ، شبه انبوية الشكل . منها الاحمر والاسفر
والوردي . أزهارها فواحة العرف الطري المشعب ||
تزرع في المراكب الزرين .

٢٠٠٥٩ - **غُلُوْبُولِيْن** ، **غُلُوْبِيلِيْن** *Globeline (F).*
Globulin (E).
مادة آسية تكون في كريات الدم .

٢٠٠٦٠ - **غُلُوْتَامِيْن** *Glutamine (F).* *Glutamin (E).*
مادة ازوتية تكون في بعض النباتات كالشوتدر .

٢٠٠٦١ - **غُلُوْتِيْن** *Glutan*
هي المادة الازوتية في القيق ويتركب الغلوتون من الغلوتين
والجليين .

٢٠٠٦٢ - **غُلُوْتِيْنِيْن** *Gluténine (F).* *Glutenin (E).*
مادة ازوتية ثانوية توجد في دقيق الحبوب .



غلوم

٢٠٠٦٣ - **غُلُوْدُس** *Glocodes*
جس فلور مجهرية من فصيلة المدركيات . يتميز بخصباته
المحيطة الشكل ، المبشرة او النسية التجميع ، السطحية
الازكاز . انواعه التي هم الاقتصاد الزراعي قليلة اعرفها
غلوس التفلح .

شبه يصفية الشوزن ، مطبلة الشكل . كثير بينها
النافرة الكبيرة وبسطة لقايمها الخلفية التي تمكها من
التفزر . ألونها مزيج من الشحنة والشبهة يملوها تحويج
اسمر وشفة خضراء . قوتها مطبقة بالانصر .

٢٠٠٤٤ - **غُلُوْدِيَّات** *Galgulidae (S).*
Galgulidés (F). *Galgulidae (E).*
فصيلة حشرات من نصفية الاجنسة المختلفة . اجسامها
وانواعها قليلة البند . اصلها البلاد الحارة والمطلة الحرارة
من القارتين القديمة والحديثة || مطف انواعها يعيش قرب
الماء او متنسأ في الاسال والاصال . بعضها خاضل
والبعض الآخر دامن || اعرف اجسامها واشهرها القلقل .

٢٠٠٤٥ - **غُلْب** ، **كَرَكُوْمَة** *Scapella, Caralluma (S).* *Scapella (F).* *Carrian flower (E).* *Asablum, Scapella (D).* *Scapella, Fior di rosopo (F).*
جس نباتات برية وترينية من فصيلة الصقلابيات .
انواعه نحو ٧٥ جميعها من نباتات المناطق الصحراوية
يقال ان منها الاصيل كان بعض قباني افريقية الجنوبية .
ازهارها سيقان لحية رباعية الاضلاع الستة . ازهارها
لحية كبيرة لقد تلو الارواق .

٢٠٠٤٦ - **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** *Hyménium, Yolve (F).* *Hyménium, Skin (E).*
غلاف بشري رقيق يحيط ببعض الفطور حتما تكون
في طورها للثوري .

٢٠٠٤٧ - **غُلْبَل**
لبت في الماء ورفه هريض || وهو ورق الكرم ما دام
حل مجره || وهو الطبل وكل خضرة حل رأس الماء .

٢٠٠٤٨ - **غُلْبَق** *Clé de voûte (F).*
Keystone of a vault (E).
حجر شبه عروطي الشكل يلقن به قوس البند .

٢٠٠٤٩ - **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** *Vincetoxicum officinal (S).*
Vincetoxicum officinal, Asclápiade officinale, Dompé-venin (F). *Tamepsolon (E).* *Echte Schwalbenwurz (D).* *Vincetoxico, Bozoli (I).*
جنية طبية معمرة من فصيلة الصقلابيات . ساقها منتصبة
غزرة الصصرة الجنية الطبية والمضادة السموم . أزهارها
متقابلة ، كاملة ، احليجية . نصلها شديد الخضرة .
ازهارها حلقة التجميع ، يضاء اللون يملوها مزاج فتى .

٢٠٠٥٠ - **غُلْبَة الدَّهَب** هي الحبل ، الطلب .

٢٠٠٥١ - **غُلْبَكْتَاز** ، **لَبْزَاز** *Galactase*
خيرة لبنة تذيب الجبين في اللبن .

٢٠٠٥٢ - **غُلْبَكْتُوْر** *Galactosa*
عرب من الفلوكروز يحصل من تحول البنوز .

٢٠٠٥٣ - **غُلْمَة** *Nymphomania (F).*
Nymphomania (E).
ازدياد شهوة الساد في اثاث الحيوانات . اسبابها حديثة
منها حيوية ومها طارئة . فالاسباب الطبيعية تقود معظمها
الى المقدم الدائم . اما الاسباب الطارئة فمقدمات . والاث
في هذه الحالة تنهي مغلف . راجع اختلام .

Glycérine (F). **غَلِيمَرِين** ٢٠٠٧٦ -

Glycerin, Glycerium (E).

سائل متادل لا لون له يذوب في الماء ويحسّن من متين المواد الدفينة .

٢٠٠٧٧ - **غَلِيمَرِين** هي البلية ، اطلبها .

٢٠٠٧٨ - **غَلِيمَرِين عَسَلُولِيَّة** *

Apios tuberosa (S). Glycine tubéreuse (F).

نبات عسلي حادس ممر من فصيلة القرنيات الفراضية . جلوره مصقولة ، اجاسية الشكل ، مأكولة . ساقه مادة ، مارشة . طول نحو ٤ أمتار . اوراقه مركبة . وريقاته وريّة التجسيم ، يضيئة الشكل ، مستتقة العنقة || ازهاره صطرية الرائحة ، حراء اللون ، ازهاره متناحية محورية الانزكار .

Crassceps (F). **غَلِيظُ الرَّأْس** ٢٠٠٧٩ -

نمت تعريفني يطلق على كل حيوان او حشرة مستطلة الرأس .

Crassicole (F). **غَلِيظُ العُنُق** ٢٠٠٨٠ -

نمت تعريفني يطلق على كل حيوان مستطعم المتق .

Crassicorne (F). **غَلِيظُ القرن** ٢٠٠٨١ -

نمت تعريفني يطلق على كل حيوان مستطعم القرن .

Eudothèque (F). **غَلِيظَةُ** ٢٠٠٨٢ -

القائمة شفاء داخل يلف نص المتك .

Glycos ٢٠٠٨٣ - **غَلِيكُوز**

الغليكوز اي سكر النخب مادة يضاء سكرية قابلة للاختبار ككوث في البّار والصل ويضرها .

Pipe ٢٠٠٨٤ - **غَلِيْبُون**

غليبن ج . غلايين ، اداة تستعمل لتسعين التّفن المفرور .

٢٠٠٨٥ - **غَمّ ، غَمَل ، غَمَم**

Ensachage, Capuchonnage (F). Putting a hood (E). تغليف الاذمار بالاكياس منّا لتجهيزها . وتغليف النّار لصناعتها . ويقال للبور والبّار النّاجة من هذه العملية بلبور او ثمار مدفولة او مدفولة .

Plafond (F). Celling (E). **غَمَمِي** ٢٠٠٨٦ -

هو سقف البيت . ج . اغية واغلا . ويقال غمى البيت ويغشى . غطاء بالخشب والطين .

Colymbus (S). ٢٠٠٨٧ - **غَمَّاس**

Piongeon (F). Diver (E). جنس طيور مائية من كفتيات المقدم مولها بالبلاد الباردة تفرح منها في الشتاء نحو الأقاليم المعتدلة . انواعها المعروفة اربعة جميعها كبيرة القد ، مستطيلة المتق ، جباله الضخم ، اناذها رائقة . اجنحتها صغيرة . اذنانها جدعة . ارسافها صردية || تألف البصار والبيصريات ولا تبرز على السوء . فيها الاسماك الصغيرة والقرشيات . تدفن في انفيس رتبها على الشطوط وصفات الجيبرات واعواد الانهار . اناتها تنقع يضيئين تمخضها بمنارة الاكوار ثلاثة اسابيع || اشهر انواعها غملا الحسن وغملا القبط .

٢٠٠٨٤ - **غَلِيدُوسُ النَّحَّاح** * ، **بَلَطُشُ دُعَاكِي** *

Gloxides pontigna (S). Bloch fumeux, Maladie de la sule (F). Sooty blotch (E).

نطر مجهري يركب اثناد ومار التفاح والاجاس . مظهره الخارجى على الاقناب يقع للدخان حيث ولوا ، لا تقياسية الشكل والحجم ، متناحية الاتصال تسبب انضداد البيرة ويضف الاذى || وهو على البّار يقع سمر لا تقياسية الشكل والحجم تركب البيرة تقطوعها دون ان تسلب الب . يتكاثر ويقتل في الاماكن الحارة المرتفعة للرطوبة النسبية . يكاثف بمشاكل علول يورود المركز من ١% الى ١٠% بشرط ان تحصل المكاثفة في امان ظهور اللوس .

٢٠٠٨٥ - **غَلُوسِيَا** اطلب هيدرات الكربون .

Gluadium ٢٠٠٦٦ - **غَلُوسِيُوم**

هو البريليوم ، اطلبه .

Glouzon (F). **غَلُوشُون** ٢٠٠٦٧ -

هو الثور حيوان من السرمويات ، اطلبه .

٢٠٠٦٨ - **غَلُوسِيَّة** * ، **سَلُغان**

Gloxinia (S). Gloxinie (F). Gloxinia (E). Gloxinien (D). Gloxinia, Ligaria (F).

جنس نباتات عشبية جلوسورية مسرة من فصيلة الجسرييات . انواعها المعروفة ١٢ اما ضررها وبهجتها فكثيرة البعد . جميعها زينة . سقها جلوسورية . اوراقها منعقة متعاقبة كثيرة القند . فصلها جيل الحصار ، خل البيرة ، بارز المروق والشرابين . ازهارها فردية ، طويلة الازداد ، بوقية الشكل ، جيلة الالوان الزاهية .

٢٠٠٦٩ - **غَلُوكُوز** ، **سُكَّر العنب**

Glucose مادة سكرية يضاء قابلة للاختبار ككوث في البّار والصل ويضرها .

٢٠٠٧٠ - **غَلُوكُوزِيَا** (F). Glucosid (E).

مركبات نباتية تحوي الكثير من الغلوكوز فيستخرج منها .

٢٠٠٧١ - **غَلُوم** *

Galeomma (S). Galeomma (F). Galeomma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم واصله للفنحيات . انواعه المعروفة متوسطة البعد منتشرة في سطر بحار العالم القديم احصاها البحر الابيض المتوسط || اجسامها مسطوقة باصداق شبه هورية الشكل تشب في السفسور البحرية وتمتدق عليها .

٢٠٠٧٢ - **غَلُومِيَّات** *

Galeommidae (S). Galeommidae (F). Galeommidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجسامها وانوامها المعروفة من غائرة ومماصرة كثيرة البعد منتشرة في الطبقة البسيانية وفي سطر بحار العالم . اصداقها صغيرة ، شبه مستطيرة ، ثنائية المصاروع عادمة التكتين || اشهر اجناسها الغلوم والسنبيل والمزاريبة ...

٢٠٠٧٣ - **غَلِيْدَايْن**

Gladiine (F). Gladin (E). مادة البويونية اي آحبة ككوث في الدقيق .

٢٠٠٧٤ - **غَلِيْبَان**

Ebullition

٢٠٠٧٥ - **غَلِيْسَرِيْد**

Glycerides (F). Glycerid (E). اسم شامل لاثريات الغليسرين من زيتين وصرغرين وتغلين وضرها ما يدخل في تركيب الادلان .



غلوس التفاح



غلوسينية



غلم



غلين صقولة



غامة الحن



غامة القطب



عبر



غير



غرة



غروس

٢٠٠٩٨ - غَمْدِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ، مُغَمَّدَةُ الْأَجْنَحَةِ

Coléoptères (F). Coleoptera (E).
رَبَّةٌ حشرات من طبقة غمديات الجناح . أجناسها وأواعها
زهاء ٣٠٠٠٠٠ متنترة في جميع أقطار العالم ، جميعها
١٦ لة والمديد من الفصائل || جميع حشراتنا تأمة التطور
قارضة ، مجنحة . أجناسها مؤلفة من زوجين الأزواج العلوي
المزوي بالظهران وهو مركب من غميتين قروين ولطغان
الأزواج السفلي الثنائي التركيب الذي ينفق عنه الطيران .
سقطها من الحشرات للقرصة وبعضها يفتني بالزباد
المضوية || رقاتها مغترسة أو عاتية ، سورياتها طرية
الأيدي . لطفاها مكونة من إفرازات خاصة تجمّع إليها بعض
المواد المضوية وعلاؤها || أشهر فصائلها ، المديد
من أجناسها وأواعها في لبنان وشار البلاد العربية ، هي
النالسة : الطيريات ، الجليات ، التنبقيات ،
الساليات ، السرفانيات ، السويات ، الظلاميات ،
الناشيات ، السرقليات ، القززيات ، الكركشيات ،
الككجيات ، المتصويات ، التباصلات ، التفرانيات ،
والزوسيات .

٢٠٠٩٩ - غَمْرٌ

Eprouvette graduée (F).
Graduated gauge (E). ويرف أيضاً بالناتل . ج أحمار .

٢٠١٠٠ - غَمْرٌ

Chaos (F). Chaos (E).
الغمر هو الخولة ، اطليه .

٢٠١٠١ - غَمْرٌ ، قَطْلُوسٌ ، تَرَبِيسٌ

Submersion
هو الإسقام بالنمر أو التقلوس .

٢٠١٠٢ - غَمْرُكَةٌ

هو الورس ، اطليه .

٢٠١٠٣ - غَمْرُكَةٌ

Zostera (S). Zostère (F).
Eel grass, Turd grass, Grass warck (E). Zwer-
seagras (D). Zostera, Alga del vetral (I).
جس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . أنواعها المعروفة
ثلاثة . سوطها مدادة . أوراقها عيوية مستطيلة ، قوامها
مخدية . أطرافها عيوية ، جيوبها تفلح من سبائل مكونة
من صف وأسد من الإفراز البسطة .

٢٠١٠٤ - غَمْرُوسٌ

Gammarus (S).
Gammarus (F). Gammarus (E).

جس حوييات بحرية من القشريات العليا وضيفة
القمروسيات . أنواعها المعروفة كثيرة العدد بعضها بحري وبعضها
في بحار وأهـر البلاد الباردة || أجناسها مسيرة القند .
أطوالها تراوح من ٢ إلى ٣ سم . زياتها مركبة ثلاثية
الفصل . الأزواج الأول من قوائمها ملتصق بالراس وبنتهي
بملاط فكية . الزويان الثاني والثالث ينتهيان بكلمات
قارضة . أثوابها شبيثة الألوان وبها الأييض الشفاف .

٢٠١٠٥ - غَمْرُوسِيَّاتٌ

Gammaridae (S).
Gammaridae (F). Gammaridae (E).

فصيلة حوييات مائية من القشريات العليا مزودجات الأرجل
أجناسها وأواعها المعروفة كثيرة العدد بعضها بحري وبعضها
الأخر يعيش في مياه البحيرات والأهـر . معظمها من البلاد
الباردة || أجناسها شبيثة الأجناس بكثير لها الصدر .
جميعها عاتية الصفات . عيبتها بسطة . زياتها ثلاثية
الفصل . الأزواج الأول من قوائمها الصدرية ينتهي بملاط
فكية || أشهر أجناسها القمروس .

٢٠٠٩٨ - غَمَاكَةُ الْحُسْنِ

Colymbus stellatus. C. septentrionalis (S). Plongeon
cas-marin (F). Red-throated diver (E).

طائر من القناس كبير الجفة طوله نحو ٧٠ سم . رأسه وبقته
الى الريدة المخلد . ظهره الى السرة القاتمة وكذلك سائر
صفته العليا من القنف الى الذنب . صدره وبقته وبطاطه
الى البايض الناصع . غنطه اسود اللون || ينح في زمن
البرد من الشمال الى الجنوب نحو المتوسط وشاطئ الهند .

٢٠٠٩٩ - غَمَاكَةُ الْقُطْبِ

Colymbus glacialis (S). Plongeon imbrin, P. glacial
(F). Great northern diver (E).

طائر من القناس كبير الجفة طوله نحو ١٠٠ سم . رأسه
ويظهر الى السواد القاتم . بقله وصدره واسفل عنقه بيض .
أبطاه مجنحة وميتية بالاسود || ينح في زمن البرد من
الشمال الى الجنوب نحو الشطوط الاروية .

٢٠٠٩٠ - غَمَالِجٌ

نبات على شكل اللذان ينبت في الربيع .

٢٠٠٩١ - غَمْبُكُورٌ

هو الأريان ، اطليه .

٢٠٠٩٢ - غَمْبِيرٌ ، قُمرُويّاتٌ

Gnatophyllum elegans (S).
Gnatophyllum elegant (F).

حويان بحري من القشريات حشرات الأرجل طول
الذيل ينتمي الى فصيلة القزريسيات . اطافه البحر
الاييض المتوسط || جسمه ايطولي الشكل ، متطبق
الذيل ، يطول نحو ٧ سم . متكه قصير القند ، مسنن
الخطار . ثوبه الى القشقة المنقطة بالاصفر اللحي ||
يعتبر من الانواع القانصة الصف المروغب فيها .

٢٠٠٩٣ - غَمْبِيرٌ

Ourosparia gambir (S).
Gambir (F).

شجرة برية مسرة من فصيلة الفويات شبيها الملائير .
يستخرج من أوراقها بدق قلعها بالماء وقلها مادة صغية
رائحة تشبه الكافور لها استعمالها الطبي والهناعي .

٢٠٠٩٤ - غَمْدٌ ، قُمرُويّاتٌ

Elytre (F). Elytron (E).

معدج أحمد . والاخاد هي الاجنحة العليا لحشرات ربة
غمديات الاجنحة وهي صلبة قزرة المادة ممها حفظ
الاجنحة الرقيقة المبرودة تحتها المعروفة بالرواش .

٢٠٠٩٥ - غَمْدٌ

Gaine (F). Sheath, Ocrea (E).

قاعدة مملأة القوة وهي تحيط بالساق قليلا أو كثيرا
وقد تكون طويلة ناعية في التنبليات .

٢٠٠٩٦ - غَمْدٌ مَكَاكِيٌّ

Etui médullaire (F).
Medullary sheath (E).

٢٠٠٩٧ - غَمْدِيَّاتُ الْجَنَاحِ

Coléoptéroïdes (F).
Coleopteroides (E).

طبقة حشرات من شبة الحسدليات وثلاثة الاجنحات أصلا .
تشمل ربة واحدة تسمى غمفة الاجنحة . شحرتها تعرف
بالخفساء أو الخنفساء . جميعها عاتس والمدراء لدى حورية
جميعها حوريات .



فُشَس



فُشَس دِين



فُشَس لِرَج



فُشَس وُرْدِي



فُشَس



فُشَس

٢٠١٠٦ - فُشَس *
Gamasus (S). Gamaso (F).
جنس قراد من فصيلة الغمشيات . أنواعه عديدة جميعها عياد صغيرة القدد ، طولها نحو ملليمتر واحد . وهي من الحشرات القاتلة قوتها المواد الضوئية المنحلة || تتطفل على الحشرات اغصها تحمية الجناح لتقلها من مكان الى آخر .

٢٠١٠٧ - فُشَسِيَّات *
Gamasidae (S). Gamasidés (F).
فصيلة حشرات من القراديات . اجناسها المعروفة اربعة اما انواعها فعديدة جميعها صغيرة القدد ، طولها يراوح من ١ الى ٢ سم . وهي عياد عادمة اللون . انواعها سوية الالوان المائلة الى تراوح من الاصفر القاتم الى الاسمر الجوزي || تتطفل على الطير والحيوانات والحشرات .

٢٠١٠٨ - فُشَسِيْد *
Gomphidius (S). Gomphide (F).

جنس فطور من فصيلة السيمات . أنواعه المعروفة قليلة العدد اعطاهم القليم الصنوبريات في المناطق المعتدلة الحرارة . يعيش على الجروح واللدبال والمواد النباتية المنحلة . بعض انواعه مأكول والبعض الآخر كاعن الصف غير مرغوب فيه || اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٢٠١٠٩ - فُشَسِيْد دِين *
Gomphidius glutinosus (S). Gomphide gluant
نوع من الفُشَسِيْد المأكول . يعيش في الموائل الرطبة . ساقه مستقيمة ، ديقة النشاء ، صفراء القسم السفلي غبراء العلوي . اروسه كبيرة القدد ، شبه قلنسوة الشكل ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الكستني البنفسجي المالح || لحية جامدة ، لذينة الطعم ، مستحبة المذاق .

٢٠١١٠ - فُشَسِيْد لِرَج *
Gomphidius viscidus (S). Gomphide visqueux (F).
نوع من الفُشَسِيْد الكامن الصف . يعيش في المراعي على الدبال . ساقه معتدلة الثلاثة والارتفاع ، سمر اللون ، صفراء المالح . اروسه لينة ، قلنسوة الشكل ، قطرها نحو ٨ سم . لونها الى المغرة النحاسية المالح . اطرافه الى اللبنة الصفراء المالح .

٢٠١١١ - فُشَسِيْد وُرْدِي *
Gomphidius roseus (S). Gomphide rose (F).
نوع من الفُشَسِيْد الكامن الصف . يعيش في ارجاج الصنوبر على المواد النباتية المنحلة . ساقه قصيرة مستقيمة النتح ، يضاء اللون ، فراء النشاء . اروسه ثلاثية الفلق قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الوردى الليملي المالح . اطرافه لينة ، لونها الى البياض الافر .

٢٠١١٢ - فُشَسِي *
Rosée (F). Dew (E).
المن هو الندى . تحمت الارض وكها التي فهي عمقة . وحق لذبات هي او فسد من كثرة الانداه عليه . ولكن المكان الذي يركبه الندى .

٢٠١١٣ - فُشَس *
هو الفُشَسمان عارض يصيب الزرع .

٢٠١١٤ - فُشَس *
Capechonnage (F).
هو اثم ، واجبه .

٢٠١١٥ - فُشَس *
Crossarchus (S). Crossarque, Mangué (F).
جنس حيوانات قرضابة من فصيلة الزباديات . انواعها المعروفة ستة موطنها بعض مناطق افريقية الشرقية والبالية والوسطى . تألف الرياش والغابات وفضاف مجاري الماء والقفر . ملينها الحياني جاعي . جامعتها تمد من ٢٠ الى ٣٠٠ زوج واكثر || اجسامها صغيرة ، شوزها شوزن النمس ، اطولها ترازح من ٦٠ الى ٧٥ سم . بما فيه اللاب الذي يطول من ١٧ الى ٢٥ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها واذاها صغيرة مستديرة . اعنتها معتدلة الطول . قوائمها قصيرة ، خاسية الاصابع . اوبارها صغيرة خشنة . خضابها اوبالها يختلف مع التروح تكثر فيه الكمية والشبهة والتلجيع المتروض || تعيش في اوجار تحطرها في التربة او في اليعان المهجورة من النمل والارضة . قوتها الحيون والحشرات والثمار والجوهر . اشهر انواعها المعروفة التالية :

فُشَس جَلْدَع *
Crossarchus fasciatus (S).
فُشَس رَاي *
Crossarque rayé (F).
فُشَس مُعَمِم *
Crossarchus obscurus (S).
فُشَس مُعَمِم *
Crossarque obscur (F).

فُشَس شَمْسِي *
Crossarchus gambianus (S).
فُشَس شَمْسِي *
Crossarque de Gambie (F).

فُشَس الصَّال *
Crossarchus somalicus (S).
فُشَس الصَّال *
Crossarque de Somalie (F).

٢٠١١٦ - فُشَسُوج *
Dard (F). Dart, Sténg (E).
ناية او اينة مشرة تكون في بعض الانجار اغصها التلغح والاجاس . ج خاليج .

٢٠١١٧ - فُشَسُوط *
Megaspira (S). Mégaspire (F). Megaspira (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات مديبات الاربجل وفصيلة الثارات . انواعه الماصرة المعروفة قليلة العدد اعطاهم بعض مناطق امريكا الجنوبية اغصها البرازيل || تعيش في الموائل الظليلة الرطبة وقرب مجاري الماء || اصداها اسطوانية ، بربجية الشكل ، مستطيلة ، مقاربة القلبة .

٢٠١١٨ - فُشَسُول *
Acantholimon (S). Prickly thrift (E). Sachelgrasnelke (D). Acantholima (I).
ج. خاليل . جنس اشباب برية وزراعية مدرة من فصيلة الرصاصيات . انواعه عديدة ، بعضها مرقعات حوض البعر المتوسط جميعها صغيرة القدد ، مثقوبة ، شائكة . اوراقها لا قياسية الشكل . انذارها سلبية التجميع || اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٢٠١١٩ - فُشَسُول أُنِيَق *
Acantholimon venustum (S). Acantholimon élégant (F).
نوع من الفُشَسُول وهو مجلة سريرية صغيرة القدد ، تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها منبسطة الصفحة ، حشوية النصل . سبلتها تطول نحو ٨ سم . ازهارها وردية اللون متراكبة || ازهارها يستمر طوال الصيف . وهي من البقول القسمية ، تبكر في اول الربيع وتؤكل مطبوخة .

٢٠١٢٠ - غُملُول سَبْطِي

Acantholimon glutaceum (S). *Acantholimon en dpl* (F).

نوع من الغملول وهو بجملة سريرية صغيرة اللقد، تملو الشوك تملو نحو ١٥ سم. أوراقها هندية الشكل خضراء اللون. سبلتها مسطيلة، أزهارها حر البتلات، بيض الكرويس، سود المروق. أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٠١٢١ - غُملُول شَكَلَك

Acantholimon acarosum (S). *Acantholimon aculaire* (F).

نوع من الغملول، وهو بجملة سريرية صغيرة اللقد، تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها ريجية الشكل تملو من ٥ إلى ٩ سم. وتعرض عنه قاعدتها نحو ٥ سم. أزهارها كثيرة. سبلاتها تملو من ١٠ إلى ٢٠ سم. أزهارها قروزية. أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٠١٢٢ - غُملُول حَمَمَن

Goémon (F). *Seaweed* (E).

هو سباد الالغ، اطليه.

٢٠١٢٤ - غُملُول حَمِيمَسَة

Argyroneta (S). *Argyroneta* (F). *Argyroneta* (E).

جنس حناكب من فصيلة الغمليات. أنواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها مائية تعيش في البحيرات والأهوار والأبحر. الرافضة المياه. ملاجئها حكاكيد من التماسك. زينة الشكل متينة الحليك تنبنيها في الاعشاب المائية وتنقل إليها الهواء بواسطة الفتحات التي تجمعها بين حلب صدورها وبطنها كلما علت سطح الماء وفارقت. أجسامها صغيرة اللقد، فضية اللون، رصاصية الجرامز الكثيفة الحلب.

٢٠١٢٥ - غُملُول حَمِيمَسَة صَالِيَة

Argyroneta aquatica (S). *Argyroneta aquatilis* (F). *Water-spider* (E). *Wasserspinn* (D).

دورية من التناكب الساعية القانصة من فصيلة الغمليات. موطنها معظم مياه البلاد المعتدلة الحرارة. جسمها صغير اللقد يطول نحو ٩ سم. عند التكاثر ونحو ١٤ سم. عند التكاثر. صدرها أحمر اللون اسم الموج. صياها مركبتان زهرتان. ثيابها صغيرة. فكها مستطيلان. جرامزها دقيقة. كيفية الحلب. بطنها بيض الشكل، أخضر اللون، نقي الموج. قوتها الحشرات المائية لتغلقها عاتمة على سطح الماء أو فائصة فيه. تتمر نحو ثلاث سنوات وتساقد قبل نهاية أجلها بثلاثة أشهر. تعتبر من الدويات النافعة.

٢٠١٢٦ - غُملُول حَمِيمَسَات

Argyronetidae (S). *Argyronetidae* (F). *Argyronetidae* (E).

فصيلة من التناكب الساعية القانصة وراعيات الروايا والمشتان. أجسامها وأنواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها صغيرة اللقد تتميز بأسالة حلب جرامزها الخلفية. أشهر أجناسها الندية.

٢٠١٢٧ - غُملُول حَمِيمَسَة

Procyon

الغيمياء إحدى الشريرين، من منازل القمر. اطلب شمرى شامية.

٢٠١٢٨ - غُملُول حَمَمَن

يقال غن- الغمل إذا أدرك ثمره.

٢٠١٢٩ - غُنبَاط

Pitta (S). *Brevo* (F).

جنس طير من الغنبايات الجواثم مشروبات المنابر. أنواعها المعروفة خمسة أصنافها البلاد الآسيوية والأفريقية. جميعها صغيرة اللقد، قصيرة القالب، مسطيلة الساق. أوتارها مختلفة الألوان. جميعها مطوقة الحامس، منشفة الصدر وألوانها. قوتها الحشرات والبرور البرية. تدفن بين الأقدال في الغاميس قليلة السمك. حشبتها أزواج من ٥ إلى ٧ يبيضات طرفها الأتي بمثابة الذكر نحو ١٥ يومًا.

٢٠١٣٠ - غُنبَاط حَمِيمَسَات

Pittidae (S). *Pittidae* (F). *Pittidae* (E).

فصيلة طير من الجواثم لاقتات النمل وزيقات المنابر. أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد. موطنها البلاد الحارة المعتدلة نحو الاستوائية من العالم القديم. معظم طيورها صغير اللقد وبعضها متوسط ولكها جميعها مسطيلة الساق. تتميز بقلع الطران وبرصة اللقد والرفشة واللغة واللذع. تألف الإحراج النحلة وتعيش أسيابًا صغيرة ثلثا يتجاوز عددها أربعة أزواج. قوتها الحشرات المختلفة أعصها النمل وبعض البرور البرية. أعرف أجناسها وأشهرها النذاج.

٢٠١٣١ - غُنبَاط طَائِر

Berger (F). *Shepherd* (E).

صاحب القم وراعيها.

٢٠١٣٣ - غُنبَاط

الغنباط : صوت الذباب.

٢٠١٣٤ - غُنبَاط ش

Blaps mucronata (S). *Blaps, Scarabaeus punct, S. funebre* (F).

غنطاه من فصيلة الغنبايات، طولها يراوح بين ٢٠ و ٢٥ سم. قوتها إلى السواد الباقي القشال السودي. تعيش تحت الحجارة وفي الآنية والتعايير المظلمة. راعيتها مختلفة كرجية. قوتها المواد النباتية والعضوية المنطحة.

٢٠١٣٥ - غُنبَاط حَمِيمَسَة

Rhinobatis (S). *Rhinobate, Guitare, Violon de mer* (F). *Guitare* (E).

جنس اسماك بحرية ولوية من فصيلة الغنبايات. أنواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. أجسامها كبيرة، وشية الشكل. رؤوسها مستديرة، منطوقة - منطوقة بالزواجل الصدوية، مخروطية الشكل. أفيانها سفلى الإرتكاز. لشدها كبيرة. أسنانها مسطحة، متكاثفة الرصف. أوتارها تنطف مع الأنواع، تكثر فيها الكهبة الزقية الموج. زعانفها الذيلية غارقة، كبيرة القلق العليا، صغيرة السفلى. سرحتها أسلم البواج. ثلثا تشاهد قرب الجاذب والسطوط. أشهر أنواعها ثلاثة أقالية.

٢٠١٣٦ - غُنبَاط الجُزُر اليونانية

Rhinobatis colossus (S). *Rhinobate des Iles grecques* (F). *Rhinobatis colossus* (E).

نوع من الغنبايات. يتكرر في بحر اليونان والجزر. قوته القشريات والرخويات والشوكيات. جسمه وشي الشكل، يطول نحو ١٠٠ سم. رأسه مسطع الجرم، مخروطي الشكل. عيناه مسطحتان. له سفلى الإرتكاز واسع الشدة. ثوبه إلى الكهبة الزقية الموج تملوها رقة سمراء في الظهر وتشيخ أبيض في البطن. لحمه كامن الصف، مأكول.



غُنبَاط



غُنبَاط



غُنبَاط الجُزُر اليونانية

او غربا، وما تبقى فلوته يختلف مع النوع || يمش
أزاليا كبيرة العدد قوته البلور والحروب احصها شب
الازر .

٢٠٦٤٧ - غُثَيْلُ أَسْوَدُ الزُّبَانِي *

Podagrica fuscicornis (S).

Podagrica à antennes noires (F).

حشرة غامضة من فصيلة النصاريات ورنية غديات
الاجنحة . تألف البراري حيث تكثر نباتات الفصيلة
الخبازية . غثانها تعيش على بتلات الازهار . يرقاها
تلم الاوراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير القد
يطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبها ثنائي اللون . رأسها وكوسلها
وبطنها وبرامزها الى الحمرة البرتقالية . ظهرها الى الزرق
السفاه . قليل الاحتياط ، مستدير الطرف اللاصق .

زبانها خيطيان اسودان || لها جيل واحد في الحول .
تظهر الجملدة في ايار ويبقى حتى ايلول . تمتع الاثن
المكثرت زبنا تلتصقا بتصال الاوراق || البرقة تطول نحو
٧ سم . جسمها وشي الشكل ، سداسي الرواجب . ثوبها
الى الصفرة القاتمة بعلوها غطان جانيبان اسودان . رأسها
وشربها ورواجبها الى السمرة || طول الاكمال يستمر
نحو اربعة اسابيع ويتقضي في التربة ضمن جراب من
التراب والحواد الصخرية والنباتية .

٢٠٦٤٨ - غُثُفُورُوسُ الْقُرْنُ *

Gnathocerus Cornutus (S).

Gnathocère cornu (F). *Gnathocerus cornutus* (S).

حشرة ناعمة ملوثة من فصيلة الغنثيات ورنية غمدت
الاجنحة . موطنها يشمل جميع الاقطار المسكونة . تألف
مخازن التيق والبقالة وبيوت السكن . غثانها وبقاها
تعيش على التيق وبركةا للصنوعة وعلى المراد السكرية
والقار المحففة || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ سم .
ثوبها الى السمرة الكستنية الصنائية المواج ، ذكرورها
مجهزة بزوائد رأسية فارقة تميزها عن الاناث وعن غيرها من
الحشرات . رأسها مستقيم الهرم مجهز بقرنين متقابلين
يكتنفان التأثير الفككية . عينها ناضرة . زباناها
سوطانيان صيران . فكها ذريان . ظهرها لا يلحف
كامل السمكة للشرية . غمدتها متناظرة التحزير القاطب
والتنطيق التيق || لها جيلان في الحول . تسرح في التراب
وفي الليل || والبرقة : عند بلوغها الادراك التام ، تطول
من ٦ الى ٧ سم . جسمها اسطواني الهرم . ثوبها الى
الصفار الباهت . رأسها الى السمرة . سمكتها الشرية
مجهزة بمرتين ذريين || طول الاكمال الذي يستمر من
١٤ الى ٣٠ يوما يتقضي طليقا من كل غلاف .

Hérissone (F).

She-hedgehog (E).

Lynx caracal (F).

Gongyle ocellé (F).

٢٠٦٤٩ - هُتَجَة

هي القنفذة اثنى القنفذ .

٢٠٦٥٠ - هُتَجَل

هو عنق الارض ، الحلبه .

٢٠٦٤٦ - هُتَجِيل

هو النمساة النرة ، الحلبا .

٢٠٦٤٧ - هُتَدُصُولِي * ، زَنْجُونِي

Hedychium (S). *Hédychie* (F). *Ginger lily, Garland flower* (E). *Schöne krauzblume* (D). *Coronaria* (I).

هتدصولي هو الاسم الهندي لهذا النبات . جنس نباتات

٢٠١٣٧ - غُثَبَاتُ التُّوسَط *

Rhinobatis rhinobatis (S). *Rhinobate de la Méditerranée* (F). *Rhinobatis rhinobatis* (E).

نوع من الغنابات . اصلاها من مناطق حوض البحر
الايض المتوسط . مسرحه اساطير الهياج . قوته القنريات
والزبونيات والقشريات || جسمه وشي الشكل يطول من
١٠٠ الى ١٥٠ سم . رأسه مبسط الهرم ، مخروطي الشكل .
عيناه مسطحتان . فم سفلي الاركانز ، واسع الشفق .
اسنانه مسطحة ، متكافئة ، متراسة . زعنفته الليلية
فارقة ، كبيرة الفتلة العليا || ثوبه الى الكهية الزيتية
المواج تملحها شحة سمره في الظهر ، تلبية في البطن ||
لحمه كامن الصف ، مأكلي .

٢٠١٣٨ - غُثَبَاتُ صِيْدَة

Rhynchobatus djiddensis (S). *Rhynchobate*

Djeddá (F). *Rhynchobatis djiddensis* (E).

ممكث من الغنابات . اصلاها البحر الاحمر والايحج . مسرحها
اساطير الهياج || جسمها شبه وشي الشكل ، مستعرض
للقدم ، مستطوق للمرض ، يطول من مترين الى ثلاثة
امتار . رأسها مبسط الهرم ، مخروطي الشكل .
مسطحتان . لها سفلي الاركانز ، واسع الشفق . اسناتها
مسطحة متراسة || ثوبها الى الريدية السوداء بعلوها تيجج
اخضر في الظهر وفي الزانفتان || لحمها كامن الصف ، مأكلي .

٢٠١٣٩ - غُثَبَاتِيَّات *

Rhinobatidae (S). *Rhinobatidés* (F). *Rhinobatidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية ولودة من السنفيات ورنية الاشفاق .
اجناسها وانواعها المروفة نحو ٢٥ جمعا من اسماك بحار
البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها وشية الشكل
تطول من ١٥٠ الى ٥٠٠ سم . رؤوسها منبسطة ،
مخروطية الشكل ، موطقة باكتاف فارقة ناعمة من تنحاضها
بالزائمان الصخرية الرحية . اقولها سفلية الاركانز ،
واسعة الاشفاق . حوضها سطحية صغيرة . اسناتها مسطحة ،
متراسة ، كثيرة العدد . اصلاها الخشوية سفلية
الاركانز كالاقلام . زعانفها الليلية فارقة ، كبيرة الفتق
العليا || اعرف اجناسها واشهرها الغنابات .

Rhamphocenus (S).

Rhamphocène (F).

جنس طير من الجوانث وفصيلة البيرليات . انواعه المروفة
سنة اسطانيا امريكة الاستوائية . ملجتها الجواني حماسي
الا في زين القنصاد والحضامة . تألف القنابات . قوتها التمل
والحشرات الصغيرة والذباب والحرل || اجسامها صغيرة .
متناظرة مسطوية . اقنابها مخروطية قصيرة . الثوابا تراكية
الالوان تكثر فيها الشقة والطلمة والشفية . ميونها مكملة .
محارها سطوة بالاسود . صدورها موشة || تنثن في الانجار
التوصلة الارتفاع . انثاها تنقع من ٤ الى ٥ بيضات على
مرتين في الحول . الترحيم يستمر نحو ١٣ يوما تقوم به
الاناث بتناوبة الذكور .

Paddas, Munia (S).

Padda, Calfes (F). *Paddes* (E).

جنس طير من الجوانث المخروطيات المتاخر . انولعه مدينة
جميعها اسيرة فاخرية الاصطناع . الثوابا متعلقة الالوان
المختلفة . رؤوسها سود . محارها بيض . بطونها وردية



غنابات التوسط



هتور



غنيل



غنيل اسود الزباني



هتوروس القرن



هتدصولي



غندي

الذئب يطول نحو ٢٤ سم. رأسه حنوج بقعته مستطيلة الریش المنطقت على القفص والعتق. منقاده مخززي الشكل ، قليل الاحديذاب . جناحاه مريضان قصيران . ذنبه مستدير الطرف . ساقاه مستطال ارتقاع . ثوبه الى الشبية القلوية المواج . قترته حاصية اللون . جناحاه موشحان بالاسود ، فواديه بعلقة بالابيض . الاثني مائة العشرة || يدلن اقصومه في القرية بين الحماش المنطقة . الاثني مئتين وسعدها من ٣ الى ٥ يعيشات بينا الذكر بين ١ الى ٣ .

جلعورية مسرة من فصيلة الزنجيبليات . انولاه المعروفة ٢٥ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . قريبة الشبه من القتا . اوراقها سائسة متعاقبة . ازهارها سنبل ، حايك ، كبير الذئ || ازهارها عديدة الالوان ، انبوية الشكل الثلاثية التفرص يعلما توبع انبوي مستطيل ينثي بثلاث مصلحات ثنائية التخصيص . ماكرها عديدة تملوها سات دقيقة || تجود في جميع الارابة الغنية بالمواد العضوية لكنها تفضي المواق الباردة || اشهر انواعها ما يلي .

٢٠١٤٨ - عُشْرُوتُ أُرْجُونِي

Rhinocostidae (S). * عُشْرُوتَات
Rhinocostidae (F). Rhinocostidae (E).

فصيلة طير من طولها الساق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور قلعونية الجندية || اعرف اجناسها واشهرها الفنشوش .

Hedychium coccineum (S). Hédychie écarlate (F). نبات ترابي يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. بما فيه السنبلة الزهرية . اوراقه خيشية خضابية خالية التصل تطول نحو ٥٠ سم . وتعرض نحو ٢ || ازهارها ابيضالية اللون ، شريفاتها صغيرة مستديرة ، فضوضها شطيلة تطول نحو ٣ سم || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٠١٤٩ - عُشْرُوتُ عُشْرُوت

Gnathosus (S). * عُشْرُوتُ

جنس حشرات مفترسة من فصيلة الحشرات ، انولاه المعروفة قليلة العدد . جميعها مسرة الذئب خيشية الشكل طويلا يراوح بين ٣ و ٤ سم . انولها الى السرة السوداء المواج || يرقاتها مفترسة تبتش على المزاليل لتلهم الحوام ويكن الحماش .

Hedychium gardenianum (S). Hédychie de Gardner (F). نبات ترابي يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه خيشية مستطيلة مدنية الزام الاسير . تصلها ماس البشرة يطول نحو ٥٠ سم || ازهارها صفراء اللون شريفاتها مستطيلة ، ماكرها وسماها حر || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠١٥٠ - عُشْرُوتُ تَحِيل

Gnaphosa (S). * عُشْرُوتَات

جنس حناكب سائسة قاصصة من الزبيلات وفصيلة الكوكايات . انواعها المعروفة نحو ٥٥ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة الذئ ، متكاثرة الجمل ، سمراء اللون . فواحها مستطيلة خضابية . تبتش في البراري للذئ وفي النباتات . تسرح في النهار . ضعضها ستة لوزية الشكل تشبهها تحت الحجارة وفي تجاويف الاشجار وفي الجافة || قترتها الحشرات الصغيرة ونسبا الذباب الذي تفطسه على كل حشرة .

Hedychium gracile (S). Hédychie grêle (F). نبات ترابي يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم . ساقه دقيقة نميلة . اوراقه سائسة التصل تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم || سنبلة الزهرية متدلية تطول نحو ١٦ سم . لون ازهارها الى اليباض الموشح بالاخضر . ازهارها يدوم طولا شهر الجليل .

٢٠١٥١ - عُشْرُوتَات

Gondwana (F). Gondwana (E).

اسم يطلقه علماء الجغرافية والجيولوجية على قارة افريقية كانت في الازمنة السبيلة تشمل القسم الاكبر من الهند وكامل جزيرة مدغشقر واستراليا فانشقت وانقسمت من بعدها في الاباج الثاني واصبحت كما هي الآن .

Gondwana (F). Gondwana (E).

اسم يطلقه علماء الجغرافية والجيولوجية على قارة افريقية كانت في الازمنة السبيلة تشمل القسم الاكبر من الهند وكامل جزيرة مدغشقر واستراليا فانشقت وانقسمت من بعدها في الاباج الثاني واصبحت كما هي الآن .

٢٠١٥٢ - عُشْرُوتِي

Uropeltis grandis (S). * عُشْرُوتَات

نوع من الضفائر ، حية يربض جلدة من فصيلة الضفائر . موطنها جزيرة سيلان . طويلا نحو ٦٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، جلد السيف . رأسها صغير . سطحها مخززي . عيناها صغيرتان . ذنبها مقطوع الطرف ، ازور الحلف يدوم كاهين . ثوبا العلوي الى الصفرة يميلو تدبج لولبي اسمر . ابطاها وينديا الى الصفرة الباتية المنشة بالابيض والاخير || تألف المروج والقبائل . قترتا القفار والغطاء والتمايين الصغيرة والحشرات والنباتات .

Ctenodactylus gundl (S). Ctenodactyle, Gundl (F).

حيوان لوبن قاضي وحيد الجنس والوتر من فصيلة الثدييات . موطن اطراف الصحراء الكبرى من الغرب والقبائل . جنته جنة الالب الصغير . يألف المناطق الصخرية البصرة اذناه صغيرتان . ذنبه جفحة كسبية . جزامه وريمية الاسباع انظاقه قوية ذرية . ثوبه الى الوردية السهباء بطة ابيض || قوته الاضباب والجلور .

٢٠١٥٣ - عُشْرُوتَات

Uropeltidae (S). * عُشْرُوتَات

Uropeltidae (F). Uropeltidae (E).

فصيلة حيات يربضة ، جلدة ، مائة السموم ، لافونية . اجناسها المعروفة سبعة ، اما انواعها نحو ٩٠ اعطاه تحت من الخليل الى الهند والبلد الصينية جزيرية سيلان وجزر الزانج || اجسامها اسطوانية تطول من ٣٥ الى ٥٠ سم .

Gnetae

حجر متبلور ثوري المصدر يكثر في الاراضي الاسلية .

٢٠١٥٤ - عُشْرُوتَات

Rhinocostus (S). Rhinocostus (F).

طائر وحيد الجنس والوتر من فصيلة الفنشوشيات . موطنه قلدنية الهندية . تألف البراري والاحراج المبشرة الاشجار . ملجته الخياطي جامي جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات واللوبيات وبعض اثار النية والبرور || جسمه متوسط

Rhinocostus (S). Rhinocostus (F).

طائر وحيد الجنس والوتر من فصيلة الفنشوشيات . موطنه قلدنية الهندية . تألف البراري والاحراج المبشرة الاشجار . ملجته الخياطي جامي جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات واللوبيات وبعض اثار النية والبرور || جسمه متوسط



فنشوش



نطشوس



غفلة

٢٠١٦٧ - شتوج * *Melopsittacus undulatus* (S).
Melopsittacus, Perruche ondulée (F). *Budgerigar* (E).
طائر وسيد الجنس والنوع من الببغاوات. موطنه بلاد
أستراليا. تربيته منتشرة في معظم انحاء العالم. يألف
القص لكنه لا يعيش منفرداً وأن عاش فلوقت عمود ||
جسمه صغير اللد مستطيل الذنب الفيلق. ثوبه جميل
الالوان، متركب الاخضر والاصفر والاحمر والبياض
في لا ميل له يتشعب ارجف الاذواق || قوته اللدن
والقنبر وتلار التناضجة والمفوف وانس || الاثنى ثلث
عشها في تجويف جلع. حشفتها من ٤ الى ٦ بيضات
تستمر نحو ١٥ يوماً.

٢٠١٦٨ - شتوج * *Melopsittacus* (S).
Melopsittacus (F). *Budgerigar* (E).

٢٠١٦٩ - شتاييت * *Goniatis* (S).
Goniatis (F). *Goniatis* (E).
جنس حيوانات من الرخويات رأسيات الاربل رباعيات
الايض وفضيلة الشيتاييت. انواعها المعروفة نحو ٣٠٠
جميعها من الصخور. احاديها تستمر من الحية
الفيزية الى اواخر الكربونية || اصداها مكورة الشكل
او مبطنة. قرية الشبه بالثقب.

٢٠١٧٠ - شيتاييت * *Goniatis* (S).
Goniatis (F). *Goniatis* (E).
فضيلة من الرخويات رأسيات الاربل، رباعيات
الايض. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، جميعها من صخور
الحقبة الفيزية والكربونية من الاباج الاول المعروف
بالقديم || اعراف اجناسها الشيتاييت والكليميت.

٢٠١٧١ - شيتيكة * *Gouania* (S). *Gouania* (F).
سكة بحرية من شالكات الزعانف وفضيلة الشطاريات.
اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها
صغير اللد، يطول من ٤ الى ٦ سم. رأسها صغير
مستدير الخط القصير. عينها ماحتان. زعانفها الظهرية
والشرجية خفيفة، مستطيلة. الذيلية صغيرة، مستديرة
الطرف. ثوبها الى الشقعة المنطقه بالاحمر. تتميز
بمحتبها الطيانية الايليبيتي الشكل التي تمكنها من
الالتصاق بالأسطح الصخرية حيث تكمن واحدة تقوم
فرانها.

٢٠١٧٢ - شوجيت * *Cryptobranchius* (S).
Cryptobranchius (F). *Cryptobranchius* (E).
فضيلة حيوانات قلازية من صف الشفطيات ورتبة
السرفقيات. اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم
انحاء العالم || جميعها ملققة الخياشيم، قاربة، تعيش
في البر والماء || اجسامها مستطيلة، رباعية القوائم
والاصابع، اسفلية الزروس، مستديرة الميرون الصغيرة.
امودها اعمد المستدل || قوتها اللدن والخرش
والوحيات.

٢٠١٧٣ - شوارانة *

٢٠١٧٤ - شيميد * *Ganymede* (F). *Ganymede* (E).
اسد اثار المشتري. اكتشفه غاليله بتاريخ ٧ كانون
الثاني ١٦١٠ دورته الكروية حول المشتري تستمر ٦ ايام
و ٤٢ دقيقة ٣٦ ثانية.

٦٠ سم. رؤوسها صغيرة. اعطائها متباينة الاشكال،
منها المنطقية والمستديرة والخرطوية. ميونها صغيرة. فكوها
مستنة. اعطائها معدية. اقلها قصيرة. اقلها مرقوشة،
متركة الالوان || اشهر انواعها غنفر سيلان.

٢٠١٦٢ - شغلة * *Fieraser* (S).
Fieraser (F). *Fieraser* (E).
المنطقية شغل وغفل جنس اسماك بحرية من الملساوات
انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بعض مجار البلاد
الخامسة والمتحدة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط ||
اجسامها مبطنة مستطيلة كدية الشكل تطول من ١٠ الى
١٥ سم. زعانفها الظهرية قليلة العدد، قاطبة، تمتد
من الخلف الى طرف الليل. اقلها تختلف مع الانواع منها
الاصفر والاحمر والاصفر والاصفر والاصفر الباهت ||
تستمر على كواكب البحر وتلانيات البحر وتعيش في
اقنيتها الحفصية.

٢٠١٦٣ - شغور * *Gnophos obscurus* (S). *Gnophos obscurus* (F).
Gnophos obscurus (E).
حشرة من فصيلة الافريات ورتبة حشرهايات الاجنحة.
موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط
والاقل وادوية. فراشها جارية قوتها رقيق الازهار.
سرها خافتة قوتها اوراق النبات || جسمها نحيل فضيف
يطول نحو ١٦ مم. بطنها نحو ٣٠ مم. رأسها اريد احمر.
عينها صغيرتان. زباناها غليظة. جوتها ويطنها الى
الربعة السواء المولج || وشها الاماميان الى الربعة
اعطائها شمش اكهب وثلاثة خطوط متفرقة وسط مقطع
جميعها الى السرة. حادها الخارجي مغرض سبياس الاسنان.
وشها الخلفيان الى الربعة اعطائها غطان مغرضان اسمران
وسط حادري شديد السرة. حادها الخارجي خامسي
الفرض || لها جليل واحد في الخلف. تظهر الفرشة في
تحوز وتنتهي حتى ايلال. تسرح من السرة الى فحة الجبل.
تعاقل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان محادياً
على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول
نحو ٢٤ مم. جسمها شبه مدققي الشكل. ثوبها يلائن
البينة التي تعيش فيها وهو يراوح بين الاخضر والاحمر
والايرد المرقوش بالاحمر تملو ثلاثة خطوط قاطبة. جميعها
الى الجوزة. رأسها اسود. راجعها البنية الوسطى ماحتة
ما يجعلها تنحوس منه الانتقال || طور الاكمال الذي
يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في الاجلعة ضمن صلجة
مبدلة الشباك.

٢٠١٦٤ - شتم * *Ovidas* (S). *Ovidas* (F). *Ovidas* (E).
فضيلة من مزدوجات الاصابع المبررات يقسمونها الى قسمين
الفائية والمزمية.


٢٠١٦٥ - شيميد * *Ganymede* (F). *Ganymede* (E).
اسد اثار المشتري. اكتشفه غاليله بتاريخ ٧ كانون
الثاني ١٦١٠ دورته الكروية حول المشتري تستمر ٦ ايام
و ٤٢ دقيقة ٣٦ ثانية.



غنفر



شغور



شيتاييت



شيتيكة

بارزة العروق المتوازية . نصلها مالم بشرة الصفحة العليا ،
خلل السفلى ، طري الرائحة ، يستمد كالشفاي وينشط
الحضم || أثمارها بيضاء اللون ، طرية اللون المستحب .
ثمارها اجناسية الشكل تنقل من ٣ الى ١٠ سم . لها اصفر
اللون وقد يكون ابيض او وردي او برتقالي في بعض
الضروب || غروبها مدينة . ثمارها مشطرة على السلسل
اللباني من صور الى طرابلس .



غواصة

٢٠١٧٨ - غُوَاةٌ نَفَاحِيَّةٌ ، غُوَاةٌ حَمْرَاءُ

Psidium pomiferum, *P. guayava pomifera* (S). *Goyavier* pomme, *G. rouge* (F). Apple shaped guava, Red guava (E). Apfeltragender Guava, Rote Guava (D). *Guayava rosso* (I).

نوع من الغواطة الزراعية المشعة . ثمرتها تملو من ٣ الى ٦ أمتار . تميز في غلاف الازرق الرملة والبيضاء . ثمارها نفاحية الشكل مأكلة اقل جودة واغزر مادة وانتجية من الغواطة الاجناسية .

٢٠١٧٩ - غُوَاةٌ ٥

Agave

حشرة من الغواطات صغيرة القصد تنقل مع ريقاتها على دبا اللذاب . جسمها منزلي الشكل ، ازرق اللون عند الذكر ، اسود عند الانثى . رأسها مستطيل . زباناها دقيقتان صولجانان . اجنحتها شققة ، قليلة العروق والاعصاب ، تزينة اللون عند الذكر ، وردية عند الانثى . جوفها مسم . بطنها مستطيل مركب من سبع حلقات وربعيات تنتهي بالزوائد التسالسية . اشربتها مستقيمة مدبة الوحز .



غواطة مقطع الشرة

٢٠١٨٠ - غُوَاكُو

Guano

سماد ازرق في فسفوري حصل من تجميع وتراكم ملح الطيور البحرية رجمة من الزنن في بلاد الفيل وباريو وغيرها من بلدان امريكا الجنوبية . وهو من انشاد الاسمدة الازرقية وقد وجد حيزه الان بعد استنزاف منظم وكماه .

٢٠١٨١ - غُوَاكُو اخفاش

Guano de chauve-souris (F). *Guano of flietarmouse* (E).

نوع من الغوانو يوجد في الفلور والكهوف ، يكثر في الجزائر والاندلس .

٢٠١٨٢ - غُوَاكُو السمكة

Guano de poisson (F).

نوع من الغوانو يصنع بمجاعة بقايا الاسماك بالمخاض الكبيرين .



غواصة

٢٠١٨٣ - غُوَاكِيَّاتٌ ٥

Agaonidae (S).

Agaonidae (F). *Agaonidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة شفاليات الاجنحة المحصورة . انواعها عديدة جميعها نافعة تنقل على بعض انواع النباتات اعصها اللين وصل بعض الحشرات الفاضلة من ذوات الجناتين || حشرات صغيرة القصد طولها يراوح من ١ الى ٥ ميليمتر . اجسامها رجمة . زباناها صغيرة دقيقة . اسرارها رباعية المقل . اثوابها متباينة الايلوان بين الذكور والاناث || أشهر انواعها الغواطة ذكراك التنين .

٢٠١٨٤ - غُوَاكُو ٥ ، مِسْكُوْب ٥

Mystacope (S).

Mystacine (F).

خفاش وسيد الجنس والرقع من عمارة الحشرات . موطنه زيلته الجديدية يتميز بطول جسمه للسليطة التي تمككه

وقد انتشرت زراعيا في بعض المناطق الحارة الرطبة ||
ساقها مستطيلة كثيرة الايلات المتينة . اوراقها متعاقبة ،
مركبة ، وقرية التجميع . وريقاتها اعطليجية النصال
الجامدة ، ناشرة الفسول والعروق . ازهارها عذوقية
التجميع ، محورية الاوتكار . اثمارها بيضاء اللون ،
خسبة التفصيل ، رباعية الثلاث ، ثمانية الاسدية . ثمارها
جراة عجمية . ثلاثية الزوايا والسلف المستطيلة تحضن من
عصا الى ثلاث عصيات فيه مكررة الشكل تنقل نحو
١٥ سم . وطه العجيات التي تحوي نحو ٥ ٪ من الكالكين
تستعمل بالتجميع استعمال البن او لتحضير بعض
انواع الشراب المشمش الثلث الانتباه في الجزائر .

Gnass (S).

Gnass (F). *Gnass* (E).

جنس حيوانات بحرية مقوسة من الرغويات واسيات
الانجيل . مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامز وفصيلة
الودوسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في البحار
الغنية اجسامها اسطوانية مستطيلة . زعانفها طرفية
كلوية الشكل . رؤوسها شبه مكررة . هوبها ماصة .
جرامزها عجمية متساوية الطول باستثناء الزوج القيق الذي
يبلغ طوله نصف طول الجسم والاني ينتهي برعي سنانية
الشكل تملوها الكالكين في اقزام الاول ، والهام في
الزائين الثالث والاخير .

٢٠١٨٥ - غُوَاص

Grèbe (F). *Grèbe* (E).

هو الطغاس من طير الماء وكيفية سيده انه يوصى في الماء
منكبسا بوق شديفة ويمكث تحت الماء بعض الوقت ،
نحو ٨ دقائق ، الى ان يرى شيئا من السمك فيأخذه
غور ويصعد به || قال بعضهم : رأيت غواصا غاص فقلع
بسكة فله غراب عليها فأخذه من نفاس مرة اخرى
وطلع بسكة اخرى فأخذه من الغراب ثم الثالثة كذلك
فلما اشغل الغراب بالسكة وثب للنفاس فأخذ برميل الغراب
وراض به تحت الماء حتى مات الغراب ثم خرج هو من
الماء .

٢٠١٧٦ - غُوَاةٌ ٥

Psidium guayava (S).

Goyavier (F). *Guava tree* (E). *Groaze gelbe* *Guayava* (D). *Guzajava*, *Paidio* (I).

جنس الشجار وجيريات مشرة برية وزراعية من فصيلة
الاسيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ منها الاسلي امريكة
الاسطوانية وجزر الانجيل . اوراقها كاملة متعاقبة بارزة
العروق . ازهارها محورية الاوتكار ثنائية او ثلاثية
التجميع . قصيرة الزناد ، خسبة البيلات البيض . ثمارها
نورية طرية راتنية مأكلة ورطب || تتكاثر بالبر
والتقليل والقصم . الفرة الناجية من برة تضر بدورها
في مستقرها بادر سنوات ويستمر نموها حتى عمر ١٥
سنة ثم يستمر صلاحها الى ان تبلغ ٣٥ سنة حيث ينتهي
دور الانحطاط والقصمة || وفي ترب في الاربة
المستقيمة الانحطاط تنية بالناسر الثلاثية والبارد البديلة .
اشهر انواعها الزراعية : الغواطة الاجناسية والنفاحية .

٢٠١٧٧ - غُوَاةٌ اجناسية ، غُوَاةٌ بَيْضَاءُ

Psidium piriferum, *P. guayava pirifera* (S). *Goyavier* *poire*, *G. blanc* (F). *Pear shaped guava*, *White guava* (E). *Blutguayava*, *Weisse Guava* (D). *Guayava* *bianco*, *Guayabo* (I).

نوع من الغواطة الزراعية المشعة . ثمرتها تملو من ٤ الى ٨ أمتار . فرصها زانداها مسفلة . اوراقها سنانية الشكل



غور

من جمع جنسها في ثنائيا. يطير ويسير على الأرض ويسبق الإخبار بدون تردد || يعيش منفرداً. الذكر لا يقرب الانثى إلا عند الكرم. يسبح في اوائل وواخر الليل. قوته الحشرات. يألف تجاريف الاشجار وواقب الصغور واللغاور ولكثوث.

٢٠١٨٥ - **هُورَة** *
Scolopsis (S).
Scolopside (F). *Scolopsis* (E).

سمكة بحرية يمرض من شاكلات الزنائف وفضيلة الفرغيات. اعطائها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي. قلا تقرب من الشطوط الرملية اما يكثر بجوها قرب المالحح || جسمها اعليها الشكل بطول نحو ٢٢ سم. رأسها حدير القند رسطها كذلك. عينها كيرتان، جاحطتان. زعنفتها الظهرية وحيدة، مستطيلة، متساوية الارتفاع. زعنفتها الخلفية فائقة. ثوبها الى الريكة القنسية يبق في الظهر ويسير في البطن. ويصلها ثلاثة خطوط وريدية جانبية قاعية وسط ابيض القلي السراير تمتد من مقدم العظم الى القاعدة الزعنفة الصدرية || لها متوسط الصفه، مأكول.

٢٠١٨٦ - **هُوتارِيَة**
هو الرُّبَر : نبات من الخُلجَنِيَّات ، اطبخه .

٢٠١٨٧ - **هُورَة ثَلَاثِيَة النَطَط**

Limnobia tripunctata (S).
Limnobia tripunctus (F).

حشرة لافظية من فصيلة الغوريات. جسمها صغير القند بطول من ٧ الى ١٠ سم. رأسها شبه مكور الشكل. زباناها عظيمان، اسمران، صدرها صناعي طعوب جعدة تقسية سمراء. بطنها الى السرة الصنانية. زعنفتها ثلاثيا النطط السمر || الانثى اكبر قدماً من الذكر. تروّز مكنتها في التربة ليخفف من برقات تعيش على المواد النباتية المنحلة.

٢٠١٨٨ - **هُورَة صَفراء**
Limnobia lutea (S).
Limnobia lutea (F).

حشرة لافظية من فصيلة الغوريات. جسمها صغير القند بطول من ٦ الى ٩ سم. رأسها شبه مكور الشكل. زباناها عظيمان، اسمران، ثوبها الى الصفرة الصنانية المواج. زعنفتها كيرتان غضبان بالاسفر والوردي والاخضر || مرتعها المالحق الثلثة والحدائق والبساتين || الانثى اكبر قدماً من الذكر. تروّز المكان في التربة ليخفف من برقات تعيش على المواد القنسية والنباتية.

٢٠١٨٩ - **هُورِيَّات** *
Limnobiidae (S).
Limnobiidae (F). *Limnobiidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المبرقة عديدة، منظرها من علم الاثام الباردة تعيش على رقيق الزهار والفرزات الاروك. يكثر بجوها في الغابات وقرب مجاري الماء || اجسامها غيلة. رؤوسها مكورة، صغيرة، قرونها الاستمدادية غليظة. قوائمها مستطيلة، قصيرة || برقاتها خاضعة او داتنة او زائجة. جميعها تنتمن في التربة في زين الاكمال وتلتصق بصلية تفرز نواصها فعد خاصة في مقدم الجسم.

٢٠١٩٠ - **هُوتَل** *
Aegothales (S).
Aegothale (F). *Aegothales* (E).

جنس طير من فصيلة البذرطوسيات. انواعه المبرقة خمسة



غوجمة صغيرة

موطنها بعض مناطق الشرق الاوسط والاهلي. تسرح في الليل وتبيت في التهار على الاشجار || اجسامها مستطيلة القند بطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. رؤوسها مستعرضة مغلطة. عينها كبيرة. سالما كيفة. مناقبها غروبية الشكل، واسمة الاشداق. اعناقها قصيرة. اجنحتها متدلة الطول، ذلقة الاطراف. اغخابها مقلوبة. الثوب الى الباردة تملوها رقة سمراء وتنسج اسود يمتد حتى الحواف الاجنحة || قوتها الحشرات وبعض الثمار والبذور || تدفن في تجاريف الاشجار. اناثها تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوية الذكر نحو ١٧ يوماً.

٢٠١٩١ - **هُوجَمَة صَغِيرَة** *

Trachys minutus (S). *Trachys menu* (F).
Trachys minutus (E).

حشرة خاضعة من فصيلة الزنقيديات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف المالحق الربطية وضفاف مجاري الماء. غناتها تعيش على اوراق الحور والصفصاف. برقاتها مرقاة تلم تصال الاوراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير القند بطول نحو ٣ سم. ثوبها الى القسرة السوداء يملوها مواج يتنسجي. رأسها غروبي الشكل. عينها كيرتان جاحطتان. زباناها صغيران دقيقان، ظهرها غصنور الوص. مستدير الطرف للانسف. اداسها خاضعة المغل || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجمالدة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواسط الصيف. تسرح في التهار. تساهل بعد ظهورها بثلاثة اسابيع. تروّز المكان في نصال الاوراق || البرقة عند بلورها الاذراك اتمام قندل نحو ٥ سم. جسمها اسطواني الشكل، عام الراسب، قنط التآخير الشفوية، تبي اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في الجلالة ضمن صلبة خيارة النشاء المركب من مواد نباتية مسجولة بالاريا.

٢٠١٩٢ - **هُودِصِيَة** *

Godetia (S).
Godétie (F). *Godetia* (E).

جنس نباتات عشبية حولية سرطوية مغالية من فصيلة الاسفريات. اوراقها متناوبة بسيطة. ازهارها عنقودية التجميع، رباعية القنصل والبتلات، ثمانية الاسدية، غنطلة الاولان || انواعها المبرقة قليلة العدد، اشهرها التالية :

٢٠١٩٣ - **هُودِصِيَة كَبِيرَة الزَهَر**

Godetia grandiflora (S).
Godétie à grandes fleurs (F).

نوع من الفوسية. عشبة ثريضية سرطوية مغالية هريمية الشكل. سيقانها موقفة تملو نحو ٤٥ سم. اوراقها سنائية ضيقة. ازهارها سنبلية التجميع. ازهارها كبيرة القند، طورها من ٨ الى ١٠ سم. ثوبها الى الحسرة الصفراء المواج ومنها ضروب يبيض. ويرثقها باليليكي || تنويرها صيفي.

٢٠١٩٤ - **هُودِصِيَة مُسْتَحَبَّة** *

Godetia amena (S). *Godétie plaisante* (F).

نوع من الفوسية. عشبة ثريضية سرطوية مغالية. سيقانها موقفة تملو من ٤٥ الى ٦٠ سم. اوراقها سنائية النصال، مسنة الحمار. ازهارها سنبلية التجميع. ازهارها عديدة الاولان التي تخلف مع الضروب منها اليكي والاخر الحصري والوردي والابيض والورقوش بالابيض واليكي || تنويرها يسمر من حزيران الى تموز.



عُثْبَة



غُشَّة مَرَسِيَّة (١)



غُشَّة مُطَاة (٢)



غُشَّة مُجْمَعَة (٣)



غُزْلَان



غُزْلَان



غُزْلَان

الزرقاء السوداء . سباله كثيفة مستطيلة سوداء اللون . متفاده ذوب المقطع المحبب ، واسع الشق السحب ، لونه الى الطلحة تلوينا مابية حراء . ساقه الى السرة الزيتية المالح || طيراته غطيف الحركة ، متثل الشيط ، كثير التصليق || قوته الثار والبورو وبس الحشرات الكبيرة || عنه اخصوص يذير انا كان بين تخاليف حضور الكهوف والمناور . الاثني تسع من يبيضن الى اربع يبيضات تحسبها بمنوية الذكر نحو ١٨ يوما .

٢٠٢٠٦ - **غُزْلَانِيَّات** * (S). *Scatarnithidae* (F). *Scatarnithidae* (E).

نفسيلة طير من الجرايم مشققات المناظر . اجناسها وانواعها المروعة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى || طيورها كبيرة القند تتميز بمناظيرها الفضية الشبه مشووية الشكل ، وباجنيتها المستطيلة || سرسها دجوي يستمر من الغرب الى الشرق . قوتها الثار والبورو || اعرف انواعها بشارها النشار .

٢٠٢٠٧ - **غُزْلَانِيَّات** * (F). *Amblypygo, Phryna* (F).

جنس حناكب ولحمة من الزوطيات . تتميز بجملها من مؤخر الجوف وبطونها المركبة من ١١ سكة . اجسامها صغيرة ، مبطلة ، عادمة الحساسية ، تطلي نحو ٤٥ م . م . مجنتها يشمل معظم اقطار البلاد الحارة .

٢٠٢٠٨ - **غُزْلَانِيَّات** * (S). *Helvels phalloides, Morchella esculenta* (S). *Helvelle, Morille, M. de moine* (F). *Morell, Bishop's mitra mushroom* (E). *Spugnola* (F).

جنس فطور مأكلة من فصيلة الفشاريات ورتبة الزوطيات . انواعها عديدة جميعها صالحة للاكل لكنها تختلف حسن بعضها بمجدة الطعم وبشكل الحجم .

٢٠٢٠٩ - **غُزْلَانِيَّات** * (F). *Benthos* (F). *Benthos* (E).

فوط ج افراط . اسم يطلق على الاحماق البحرية المختلفة الابداد وعلى الكائنات الحية الثابتة والمتحركة التي تعيش في هذا المحيط . فن الكائنات الثابتة تذكر الخليايات والاسفنجيات والفشوكيات والعلمليات ... ومن الكائنات المتحركة فخص بالذكر البهتان والمَشْفَرَات والصفيحيات الخياشيم والمدليات والنباتيات ...

٢٠٢١٠ - **غُزْلَانِيَّات** * (F). *Benthique* (F). *Benthic* (E).

لعت تعريف يطلق على الاحماق البحرية وعلى الكائنات الحية التي تعيش وتتكاثر في هذا المحيط .

٢٠٢١١ - **غُزْلَانِيَّات** * (F). *Gunnar* (F). *Gunnar* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .

٢٠٢١٢ - **غُزْلَانِيَّات** * (F). *Ageratum* (S). *Agérata, Ageratum, Céléstine* (F). *Goat weed, Bastard agrimony, Flores flower* (E). *Laberbalum* (D). *Agerata, Celestina* (I).

جنس نباتات عشبية سولية او مصررة من سبط البفنجيات وفصيلة المركبات . انواعها عديدة معظمها بري . سقها فزاه . اوراقها السفل والوسطى متعاقبة اما العليا فتضائية . ازهارها شكلوي التجميع ، هامي الارتكاز ، طويل الامة يدوم من اول الصيف الى اواخر الخريف . ازهارها صغيرة

القد ، طويلة الزغب ، زرقاء اللون او يفضاء || يزور القزوين ، يتكاثر بالبورو والعقل . تلبز مشالته في اذار وفيما تنقل الشتول الى مستقرها في اواخر ايار فتضرس بعد قرف ورووس سقها . اما العقل فتضرس في اذار ولبسان . والنولان يرغب في الاثرية البليانية الجسية المعرعة الشمس . وهو لا يتطلب عناية خاصة وجل ما يجب الانتباه اليه هو مكافئة الاثر عند ظهوره لانه يتعصن لسخ الاوراق ويؤذي النبات . يكالغ باستمال مركبات النيكوتين ويقرها من الحواشير القمالة .

٢٠٢١٤ - **غُزْلَانِيَّات** * (S). *Ageratum conyzoides* (F). *Agératum fausse-conyze* (F).

نوع من الفولان ، وهو عشبة زينة سولية جامدة . ساقها فزاه ، حرمية الهيكل ، وكتية الجذر . اوراقها بيضية التسل للمسن الحافة . ازهارها صغيرة القند ، زرقاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

٢٠٢١٥ - **غُزْلَانِيَّات** * (S). *Ageratum corymbosum, A. celestinum* (F).

نوع من الفولان ، وهو عشبة سولية زينة تملو نحو ٨٠ سم . اوراقها منقطة . نصلها قلبي القاعة ، يفضي الصنف المائل . ازهارها خلية البشرة ، زرقاء اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى اواخر تشرين .

٢٠٢١٦ - **غُزْلَانِيَّات** * (F). *Lama vicugna* (S). *Vicugna* (E).

غوزكا هو الاسم الشائع في بوليفيا والبيرو . نوع من اللاما ، حيوان لين عاش من فصيلة الجمليات . موطنه جبال بوليفيا والبيرو من ارتفاع ٣٠٠٠ م . فصاعدا || جسمها رقيق القوام بطول نحو ٢٠٠ سم . ويرتفع نحو ١٠٠ سم . وبرها فاخر الصنف ، خالي الشن || الاثن ثنائية الاخلاط . عضلها يدوم نحو ١٧٠ يوما . الجاذب من النوكا يستعمل لدر الحليب ونقل الاتقال .

٢٠٢١٧ - **غُزْلَانِيَّات** * (F). *Gunnar* (S). *Gunnar* (F).

جنس نباتات عشبية دماعة مسرة دماعة من سبط البفنجيات . انواعها عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها قرسية الانتشاب ، منقطة ، كبيرة القند ، مفضعة ، قلبي القاعة نصلها بطول من ٣٠٠ الى ٣٠٠ سم . ازهارها صغيرة القند ، متبيلة التجميع تركز على شراخ يطل من ٦٠ الى ٤٠٠ سم || جميع انواعها دماعة خيرية النسخ . جلودها واوراقها مضادة للجراثيم . قشورها صلبة . صباغها اسود اللون .

٢٠٢١٨ - **غُزْلَانِيَّات** * (S). *Gunneraceae* (F). *Gunneraceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .

٢٠٢١٩ - **غُزْلَانِيَّات** * (F). *Contumace* (F). *Contumacy, Default* (E).

هي سالة المكلف بالمحضور امام المحكمة وقد تخلف اما جهلا او عمدا فاحضر في سالة غياب وتسب عليه غيابيا .

٢٠٢٢٠ - **غُزْلَانِيَّات** * (F). *Pogonophora* (F). *Pogonophora* (E).

الفيالقات فة حيوانات بحرية دودية الشكل كثيرة القوس .



عُكَّة باهت



عُكَّة سَوِيَّة الْوَن



عُكَّة الْمَرْسُوط

زبانها مستطيان قصيران. جشتها مستطيل المخثر. بطنها اسطواني الشكل || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الفرائشة في ايار. تسرح في القفار. تماثل بعد ظهورها بمدة وسيرة فراوح من بين الى اربعة ايام. تمتع المكان مباحداً على سوق الثبات وفرويه || قشرة تفلل نحو ١٢ م. جسمها اسطواني الشكل، اسمر اللون يميلون تقطع اسود ورفشة صفراء. رأسها كسني اللون. رواجبها الصدرية شديدة البنية شديدة القصر عمجة الأطراف. تلتحف بطنها باغشية غروية للمادة تملأ شكل القرباب لتلتصق بها فئات الصالح والارواق والقشور و طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوم ينتهي ضمن قرباب السرة. الذكر يترك القرباب ويطير اما الانثى للمرأة فلا تخرج القرباب الا عند التماثل ولا تدنو اليه.

٢٠٢٢٩ - عُكَّة الْفَيَات * Psychidae (S).

Psychidae (F). Psychidae (E). فصيلة حشرات فراشية من رتبة حشرقيات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم. تسرح في القفار. طيراتها خفيفة الحركة، كثير المرقعة والحرم || اجسامها صغيرة. قصيرة. ذكورها جنسة. انثاها مدار. عيناها جرداء. قرونها الاستعمارية مطعنة مزدوجة. ملابسها شديدة القصر. مراففها اربعة. حلماتها خير موسمية. بطنها كثيفة الخمل. ورأسها صغيرة. مستديرة الاطراف، قليلة الحرافش البشرة، سوية الاالوان. جرماتها تامة النسو، غنايتها الخلفية ثالثة للنحس أو رواجبها || اساميرها عرواية اما يلفظ بطنها اغشية غرائية المادّة يخرج منها فئات الصالح والارواق وكل ما يلتصق بها || عاداتها طليقة تتصور ضمن غلات السرة || اشهر اجناتها العبدانة والكنكثرة.

٢٠٢٣٠ - عُكَّة الْمَرْسُوط * Gadus mediterraneus (F). Gade mediterranean (E).

Mediterranean gudgeon (E). سمكة بحرية يعيش من فصيلة الغاديات ورتبة للمساومات. اصطنها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تتميز من الاسماك البنية. لا تقرب من الشطوط والحداد الا في زمن التسرة. لمنجها الحيائي كرسومي. اسرناها وافرّة البدن || جسمها اعطليجي الشكل، مستدل التغطيل يطلو من ٢٢ الى ٢٧ سم. حراشفها صغيرة رقيقة. ثوبها الى الريدة الرصاصية الغضبية المواج تبق في الظهر وتنبير وتبيض في البطن. زعانفها الى اخضر البشري. خطها الجانبي جاسي الامتداد الاقني || رأسها مخروطي الشكل، ذلق الخمل. فكها الاعلى يعمل في مقدمه جديتان دقيقتان. والفك الاسفل يعمل ملية واحدة عيناها كبيرتان بارزتان، ابرجزيان، زعنفتها الظهرية واحدة، مستطيلة، رقيقة المقدم || لها عوصم الصف، مأكول.

٢٠٢٣١ - عُكَّة الْفَيَات * Libératès (F). Libératès (E).

التيقة العلاء بسخاء وبسيرة.

٢٠٢٣٢ - عُكَّة الْفَيَات * Parthénogenèse (F).

Parthénogenèse (E). التيلة وكعى ولادة الطنارى، فسح تناسلي تقوم به بعض طنارى الخشرات والطنويات الدنيا في زمن قنوم من حياتها اذ ان يوفضاتها تتصور وتقتف كال و انما كانت

٢٠٢٣١ - عُكَّة * هو غشب القنمين، اطلبه.

٢٠٢٣٢ - عُكَّة عُقْرِي * هو حيد الانبياء، اطلبه.

٢٠٢٣٣ - عُكَّة * Scarus stellatus (S).

Scarus stellatus (F). سمكة بحرية من بنات مصفار يقال ان لها يولفي في بعض فصول السنة وذلك عندما ترى زيمات المرجان. وهي من اسماك المتوسط والخليج.

٢٠٢٣٤ - عُكَّة باهت * Polypterus diluta, Asphalin diluta (S).

Asphalin diluta (F). Polypterus diluta (E). حشرة من فصيلة الشربقيات ورتبة حشرقيات الاجنحة. موطنها معظم الاقاليم المعتدلة الحرارة من الفرق الاوسط والاولد واروبه. فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرقتها تمش على اوراق الشبان || جسمها صغير قصيف يطول نحو ١٢ م. بطنها نحو ٢٣ م. رأسها اسمر. زبانها كبيرتان. زبانها غشيان مستطيلان. جشتها وربطها الى الحطلة الخطية المواج || ورشها الاماميان الى الحطلة الحطية تملؤها جدتان مترسختان بينتان وخسة خطوط متبرجة حطية. ورشها الخلفيان الى الحطلة التبراء البيضاء المواج. اهدابها الى الصبهة || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الفرائشة في آب. تسرح من القرب الى فسة الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتع المكان مباحداً تحت القشور اوبين شرق الماء || السرة تطول من ٢٤ الى ٢٧ م. جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل الرأس والسمة الصدرية الاول. ثوبها الى الحطلة السوداء يعلوها خط بني قاطع اسود وخسة خطوط جانبية، نخيلة، مسرعة، صفراء اللون. رأسها يضيي الشكل، كسني اللون، مدبسا ورواجبها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينتهي ضمن صلبة تحميها السرة بين شرق الماء.

٢٠٢٣٥ - عُكَّة * Plute abundantia (F).

Abundant rain (E). النيث : المطر الجرد الكثير.

٢٠٢٣٦ - عُكَّة عُقْرِي * Orbicula (F). Orbicular (E).

نمت ترميضي يطلق عل ما هو موسمي في جميع اقطار العالم.

٢٠٢٣٧ - عُكَّة كافي * هو ولد الفس وهو اكبر من الحسل.

٢٠٢٣٨ - عُكَّة كَاكَّة سَوِيَّة الْوَن * Psyche unicolor (S). Psyché unicolore (F).

Psyche unicolor (E). حشرة من فصيلة البديديات ورتبة حشرقيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبية وافريقية الشمالية. فراشتها عجيبة تمش على مخزوبها الامدائي. حرقها خاضعة ثوبها اوراق النباتات البرية الحولية والحموية || ذكورها مجنسة انثاها مدار. جسم الذكر صغير قصيف يطول نحو ٦ م. بسطه نحو ١٩ م. رأسه الى الخلفي الاسمر. عيناها صغيرتان. زبانه مستطيلان مزدوجتان. جشته وبطنه الى الخلفي الاسمر المواج. وراشته حطية اللون، صمراء المواج || الاثنى مرة تطول نحو ٩ م. ثوبها الى الخلفي تملوه رفشة سوداء. رأسها صغير الجرم. عيناها صغيرتان.

Glaucomyidae (S). ۲۰۲۴۷ - غَیْشَرِیَّات

Glaucomyidae (S). Glaucomyidae (E).

فصيلة حيوانات مائية بحرية ونهرية من الرغويات
صفيحية الخياشيم. أنواعها المعروفة نحو ۲۰
جنس واحد || أعطائها مصبات أنهر الخند والعين وباليزيا.
تمشي منتفخة في الأسماك والريال. أجسامها صغيرة.
اصداقها ثنائية المصارع ، شبه أحليلية الشكل ، عابقة
اللون التي يكثر فيها الأخضر المتفاوت الماهات ||
جلسها الوحيدة يدهي القنير .

۲۰۲۴۸ - غَیْش ، نَقْصُ الْقِيَمَةِ

Moins-value (F). Inferior value (E).

هو انخفاض قيمة الشيء بين زيتين .

Tare (F). Waste, Damage (E). ۲۰۲۴۹ - غَیْش

خسوس اللواجن من خيل وبقر وغيرها كثيرة أهمها ما
يمتري قوائم الخيل وبسببه تمدد الغشاء الآسي في المفاصل .
وهي حل نوسين :

Tares molles (F). Soft wastes (E). ۲۰۲۵۰ - غَیْشُ الْخَوَاشِبِ

تخصل من تمدد الغشاء الآسي في المفاصل . منها غيش
الحشوب والمرقوب .

Tares dures (F). Harsh wastes (E). ۲۰۲۵۱ - غَیْشُ الرُّكْبَةِ

تزيادات أو انتقارات تعود لذات السب . منها الجرد
والنخس والرن والمش .

Molette (F). ۲۰۲۵۲ - غَیْشُ الْمِرْقِ

Wind-gall (E).

انتفاخ رخو مفصل أو وتر يسهب للإجهاد .

Vessigon du genou (F). ۲۰۲۵۳ - غَیْشُ الْعُرْقُوبِ

Vessignon of the knee (E).
ورم رخو مفصل أو وتر يحصل في بعض أنحاء الركبة .

Vessigon du jarret (F). ۲۰۲۵۴ - غَیْشُ الْمُتَمَتِّعِ ، غَیْرُ وَاجِبٍ

Vessignon of the hough (E).
ورم رخو مفصل أو وتر يحصل في بعض أنحاء المرقوب .

Eponge (F). Heel (E). ۲۰۲۵۵ - غَیْشُ الْمُتَمَتِّعِ ، غَیْرُ وَاجِبٍ

هو انتفاخ رأس المرقق عند الخيل .

۲۰۲۵۶ - غَیْشُ الْخَوَاشِبِ

غابة تكثر فيها الرطوبة أو جداول الماء .

۲۰۲۵۷ - غَیْطُ

هو الخغل ، الحلبه .

۲۰۲۵۸ - غَیْطَلُ

أطلب حرقلة ناقة .

۲۰۲۵۹ - غَیْطَلُ

الغيطلة : البقرة الوحشية . وقيل البقرة مطلقاً تسمى
غيطلة في زمن البر . ج غيطال .

Bande d'oiseaux (F). ۲۰۲۶۰ - غَیْطَفُ

Flight, Flock (E).

الغيف جماعة الطير . والرف كذلك والسرب أيضاً .

۲۰۲۶۱ - غَیْطَفُ

شكل من أشكال المراج .

Coléoptile (F). Coleoptile (E). ۲۰۲۶۲ - غَیْطَفُ

خند زبارة بعض بلور الاعشاب .

مركبة || من هذه الحشرات واللويبات تخص بالذكر
النورات والارقيات وبراغيت الماء والآبروت والصفديات .

۲۰۲۶۳ - غَیْرُ جَائِزٍ

Illicite (F). ما لا يبيزه القانون .

۲۰۲۶۴ - غَیْرُ شَرْعِيٍّ

Illegitime (F). ما كانت حالته غير شرعية .

۲۰۲۶۵ - غَیْرُ قَابِلٍ الْإِنْفَاقِ

Main mortable (F). Mort main (E).

هي حالة الاموال الموقوفة التي لا تباع ولا توهب ولا يمكن
انتقالها الى الورثة .

۲۰۲۶۶ - غَیْرُ مُتَحَوِّكٍ

Inconverti (F). Unconverted (E).

۲۰۲۶۷ - غَیْرُ مُتَسَاوِيٍّ الْأَوْرَاقِ ، لَا مُتَسَاوِيٍّ

Anisophylle (F). Anisophyllous (E).

۲۰۲۶۸ - غَیْرُ مُتَسَاوِيٍّ الْبَتَلَاتِ ، لَا مُتَسَاوِيٍّ

Anisopétale (F). Anisopetalous (E).

۲۰۲۶۹ - غَیْرُ مُتَسَاوِيٍّ الْأَجْزَاءِ ، لَا مُتَسَاوِيٍّ

Anisomère (F). Anisomeric (E).

۲۰۲۷۰ - غَیْرُ مُتَمَتِّعٍ

Anisométrique (F). Anisometric (E).

۲۰۲۷۱ - غَیْرُ مُتَمَتِّعٍ

Indéfini (F). Indefinite (E).

۲۰۲۷۲ - غَیْرُ مُتَمَتِّعٍ ، غَیْرُ وَاجِبٍ

Indu (F). Undue (E).

هو دفع مبلغ لا يقابله التزام بقده يحل القانون حق
استرداده .

۲۰۲۷۳ - غَیْرُ مُتَمَتِّعٍ

Indéterminé (F). Indeterminato (E).

۲۰۲۷۴ - غَیْرُ مُتَمَتِّعٍ ، طَالَعٍ

Indigeste (F). Undigested (E).

۲۰۲۷۵ - غَیْشَتَكَ

Abrassus globosus (S). Abrée sphérique (F).

حشرة من سمقات الاجنحة ، دوسيات القرون ،
خماسيات الاجزاء . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى
اروبه || جسمها صغير القد ، نصف كروي الشكل ،
جذوي اللون ، اسفح المراج . قرونها الاستشعارية خاسية
القصل ، دوسية الأطراف || قوتها كل ما استطاعت
نقصه من اللويبات الصغيرة والديدان .

۲۰۲۷۶ - غَیْشَتَكَ

Glaucomya (S). Glaucomya (F). Glaucomya (E).

غيشر هو الاسم الحديث . جنس حيوانات مائية من
الرغويات صفيحات الخياشيم لفصيلة الغيشريات . انواعها
المعروفة نحو ۲۰ موطنها اخوار الانهر الحديثة والصينية
والماليزية .. تمشي منتفخة في الاسماك . جميعها صغيرة
القد ، تافهة العنوم للأماكولة .



غيشة

٢٦٧-٢٠ - فِتْنَةُ دِيْنِ الشَّامِ، ٥ *

Guignardia theae (S). Brown blight (E).

فطر مجهري يركب أوراق الشاي فيقوفا ، مظهره الخارجي يقع تحتية اللون يابسة المحور الاطلس . وهي سريعة الانتشار والاذى فما لو ساحتها العوامل الجوية || لم تكافح حتى الآن ضعفاً عل أوراق الشاي من المواد المعدية .



فہرديہ الشاي

٢٠٢٦٨ - غِنَى دِيَةِ الْعَمَلِ ٥ *

Gulgerardia baccae, Physalospora baccae, P. reniformis, Phoma flaccida, Ph. reniformis, Ph. Cookii, Macrophoma flaccida (S). Excoriosis de la vigne (F).



فیروزیه العریضی

۲۰۲۹ - هينرديه بدولتي ° ، هلاکوت
الکرمه ، هکن اسود

Geulardia bidwellii, Sphaeria bidwellii, Physalospora bidwellii, Lascaudia bidwellii, Phoma ovicola, Phyllosticta labruscae, P. ampelopsidis, Neospora ampelidis (3). Black-rot of the vine, Pourriture noire de la vigne (F), Black-rot of grape (E).
يُسببها فطر يسمى بـ *Geulardia bidwellii* و *Sphaeria bidwellii* و *Physalospora bidwellii* و *Lascaudia bidwellii* و *Phoma ovicola* و *Phyllosticta labruscae* و *P. ampelopsidis* و *Neospora ampelidis* (3). مرض العفن الأسود في العنب، Pourriture noire de la vigne (F)، مرض العفن الأسود في العنب (E).



غیردیه بدولی

٢٠٢٧٠ - قَهَبْ هو النظم، ذكر النظم.

Cnemidophorus (5). ٢٠٧١ - فَنْيُوقْ *

Cnemidophora (F). **Cnemidophorus** (E).

جنس حيوانات زساعة من الطاء وقصيلة التيديات. انواحه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق الجنوب الشرقي من امريكا الشمالية | تألف العاري والقيعان. تتميز بحركة الانتقال. قوتها الحشرات والقيعان. اثوابها وسبعة الالوان السوية. تكثر فيها الريد السمر والسمر.



غيره

Tortua (mille) (F). - ٢٠٢٦١ - حليم

الغيلم : ذكر السلاحف ويدهى الابس والغيلم، ويقال
لحافها الليل .

Nuage (F). Cloud (E). غَيَمٌ، كَعَابٌ ٢٠٢٦٢

العلم أو الحساب غار ماء علا في الجو وتكاثف. ويكثر
سدة نتيجة التيارات الهوائية الصاعدة من الأرض إلى
طبقات السكاك. وتعتبر القهوم من عوامل المناخ الهامة
لأنها مصدر الأمطار والثلوج. وبسبب الضغط وانخفاض
الحرارة || والقهوم عديدة الأشكال ولكل منها اسم يميز
عنها يدل على نوعها وتوسط ارتفاعها التفرعي من سطح
الأرض. أمثلها وأشهرها ما يلي:

Nimbu دجنة ، فحلة ، عصصة

Complete clothes

رنام ، حكومي ، شعبي

سليم ، ربيع

Cirro-stratus سحابی ، عارضی

سير ، فیلپ Cumulus

طخاف ، طخوور

٢٠٢٦٣ - قتر منامه: **Ngare airtidat (F)**

Artificial cloud (E).

دخان كثيف يحصل من سرق بعض المواد اللصينة وغيرها يستعمل لمنع جلد الريح عن بعض النباتات ، اغصانها الاشجار المثمرة .

٢٠٢٩ - قضاء

النسار : الشجرة الخضراء التي في الكتلة الاصطناعية .

Fourré de bois (F), Wooded (E), **فَيْتَة** - ٢٠٢٦٥

البنة من الألف

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Guignardia (5). ٢٠٢٦٦ - هيسترونية •

جنس تطور مجهرية من السخاميات وصيلة الشفويات
تتميز بأحسانها البسيطة المستديرة التي تغرز في نسيج النبات
المنحار. تكاثرها عديمة النكبات، بوضع شفاف وحيه
الخلية || أنواعه الاقتصادية الزراعية ثلاثة وهــ.

جنس حيوانات زحافة من العطاء وفصيلة التدييات. النواحه



prunier, Tordeuse verte du prunier (F).
Argyroplaca pruniana (E).

حشرة مؤذية من فصيلة الفانلات حرشيات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشتها عجيقة .
سرقها خاضعة تركيب اوراق الخوخ والزيتون وفتلتها
وتعيش عليها || جسمها صغير القند بطول من ٦ الى ٧ سم .
يسقطها تراوح من ١٢ الى ١٤ م . رأسها مستدق الجرم
اسمر اللون . عينها زيتان صغيرتان . زبابها خيطيان .
ملابسها قصيرة . مرشها جذعة . جوشنها ويطعنا الى
الكعبة السراء المواج || روشنها الاماميان الى الدبرة
يعملها تبييض وتوشم اسمر . روشنها الخلفيان الى الريدة
السراء . احداها فحبة || الاثنى امير قدأ من الذكر
واغلف بطناً منه واطول روشناً || لها جيل واحد في الحول .
تسرح من الدروب الى فحمة الجبل ومن القجر الى الشرق ||
الاثنى تلقي المكن ميحادي على الصفحات العليا من نصال
الاوراق . الطور البري يستمر نحو عشرة اسابيع ويتقضي
على اوراق الاشجار التي تقتلها السرعة وتعيش من غصنيها
وعلاياها . والسرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ١٦ م .
جسمها مستدق المقدم والمؤخر ، اخضر اللون ، زيتي
المواج . يعلو ثلاثة صفوف قاذبة من الثعلب السمر المتوجبة
هللبي دقيق || رأسها ودونها الصدرية الى السرة القاذبة .
وراجبها الى الخفسار الاضلح || طور الاكمال الذي
يستمر نحو ٣٨ اسبوعاً يتقضي ضمن صلبة تنسجها
السرقة بين شقوق السواء او تحت القشور الصلبة .

٢٠٢٧٧ - قاذبة الدراقين الشرقية *

Laspeyresia molesta, Cydia molesta (S). Tordeuse
orientale du pacher (F). Oriental fruit-moth (E).
Pfirsichtriebböhrer (D).

حشرة من الفانلات . فراشتها صغيرة القند ، بسطها تراوح
من ١٢ الى ١٤ م . روشنها الاماميان الى الكعبة يعملها

Tortricidae (S).

Tortricidae (F). Tortricidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها تمتد نحو ١٥٠٠ جميعها صغيرة القند . رواشتها
حمرينة ، قائمة الزوايا الخارجية . قرونها الاستشعارية عجيقة
الشكل . اضلاعها ظاهرة . حوتيتها بارزة . اقواسها
متراكبة الالوان المزركشة || يرقاتها قاذبة قاذرة تقضم
البراعم والاوراق والافانان وتقرض السوق والتار والجروب .

٢٠٢٧٣ - قاذبة اليبسة *

Evetria hercyniana (S). Tordeuse de l'épicéa (F).

حشرة من الفانلات . فراشتها صغيرة القند مخططه اللون
بسطها تراوح بين ١٠ و ١٢ م . رواشتها مهدبة الختار ،
غبراء اللون ، مضيئة بالاسمر || يرقاتها دقيقة الجسم ،
مستطبة اللون ، تركيب يتلقى اليبسة تتقضي عليها بدم
ان تغلفها بجيريتها الحمرينة .

٢٠٢٧٤ - قاذبة الاشجار الحرجية *

Cacaecia podana (S). Tordeuse des arbres forestiers (F).

حشرة من الفانلات . فراشتها صغيرة القند مستطبة اللون .
رواشها مضيئة بالاسمر || يرقاتها تركيب مختلف الاشجار
الحرجية وقد لا تنف من بعض الاشجار المثمرة فتقتل
الاوراق وتقتسلها وتقرض البراعم والافانان النامية .

٢٠٢٧٥ - قاذبة الجفانكين

Tordeuse des vergers (F).

فراشة صغيرة تدعى بيرونة ملوثة ، اطفا .

٢٠٢٧٦ - قاذبة الخوخ الحضرية *

Argyroplaca pruniana (S). Argyroplaca du



قاذبة الاشجار الحرجية



قاذبة الخوخ الحضرية



قاذبة الدراق الشرقية



فأثلة السرو



فأثلة السنايل



فأثلة السندبان



فأثلة العنب



فأثلة القزفل



فأثلة الكزرة (البقرة)



فأثلة الورد



فأثلة الورديات



فأثلة خضرار

تركب نواحي القزفل فتلحقها وتقضمها وقد لا تنف من الورد والياباب وغيرها .

٢٠٢٨٣ - فأثلة الكزرة * ، *Sparganothis pilleriana*, *Tortrix pilleriana*, *Aenophthira pilleriana*, *Aenactra pilleriana* (S). Tordeuse de la vigne, *Pyralis de la vigne* (F). *Sparganothis pilleriana* (E). Springwurm, Springwurmwickler, Laubwurm (D).

حشرة من الفأثلات . فراشها حطية اللون مراء الرأس . بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثها الإمانان إلى الصفرة تلوها زرققة حراء . وراثها الخلفاني إلى الصفرة اللحية المالح || وراثها سيد الرويس ، خضر الظهور ، صفر الجوانب المخططة بالابيض مدبا غير اللون . ارجلها سمر || تركب برام الكزرة وأورثها تلتف البرام وتقتل الأوراق وتقضمها . وقد تركب بعض النباتات الاخرى كالمران والقدار والصبوح والثليك . لكنها لا تؤذي ايامها الكزرة .

٢٠٢٨٤ - فأثلة الورد * ، *Tortrix bergmanniana* (S). Tordeuse du rosier (F). Bergmann moth (E).

حشرة من الفأثلات . فراشها حطية اللون ، بسطها تراوح بين ١٢ و ١٥ م . وراثها إلى الحارة يعلوها جميع اصفر || وراثها خضرار اللون تركب الورد فتلحق الأوراق وتقتطعها مع العروق وتقضم البرام والنواحي .

٢٠٢٨٥ - فأثلة الورديات * ، *Cacaecia rosana* (S). Tordeuse des rosacées, T. du poirier et du pommier (F). Rose twist moth (E). Heckenwickler (D).

حشرة من الفأثلات فراشها سمر الجسم بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثها حطية اللون ، الامامية منها بجملة بثلاثة خطوط حر ممتدة || وراثها إلى السرة الخضراء المالح . وهي تقتل اوراق معظم اشجار البقعة الوردية اعصها افتتاح والاباس والسفرجل والخوخ والمشمش والورد ، لتتقط بشرة الاوراق وتغلاها وقد تقتك بالبرام وبالبز اللينة .

٢٠٢٨٦ - فأثلة خضرار * ، *Argyroproctus variegatus*, *Olethreutes variegatus* (S). Tordeuse verte des arbres fruitiers (F). Bud moth (E). Grauer Knapenwickler (D).

حشرة من الفأثلات فراشها حطية اللون . بسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثها الاماميان إلى الصفرة البقعة بالازرق . وراثها الخلفاني إلى الوردية . اطرافها مهدية فضية || وراثها خضرار اللون تركب الاشجار الممتدة اعصها تتلف فتلحق الاوراق اللينة وتقضي عليها .

٢٠٢٨٧ - فأثلة * ، *Hemerocallis* (S). *Hémérocalce* (F). Yellow day-lily (E). Helle Taglilie (D). Giglio dorato, Bellezza di un giorno (I).

جفت نباتات شتوية جلمورية مصرة من فصيلة الزنبقيات . اورثها قرصية الانتساب ، ثنائية الصف ، متعاقبة . لصالحها شقيق الصفحة مستطيلة || انوارها حالية كبيرة القند تركب على سرائر قوي نشيط || انيلها حطية جميعا زينة سريوية ترعب في الازرة الممتدة الانساج الخزيرة المادة البدالية || اشهرها ما يتبع .

تبيع ابيض . وراثها الخلفاني إلى الوردية || لها جيلان في السنة . وراثها صغيرة نحيلة تركب الدواقر وتؤذي على الشكل التالي : ينصر ضرر يقات الجبل الاول بقرض ولحم البرام والافانن البنية . اما القصر الناعم من رقات الجبل الثاني فينصر بقرض النار وبسطها .

٢٠٢٨٨ - فأثلة السرو * ، *Evetria buoliana* (S). Tordeuse des pousset du sapin (F). European pine shoot moth (E). Kieferntriebwickler (D).

حشرة من الفأثلات فراشها صغيرة القند بسطها تراوح بين ١٧ و ٢٠ م . وراثها إلى الحشرة اللبقة والبقعة والفضي ، اهداب اطرافها الخارجية كثيفة التجميع فراء اللون . وراثها مستتقة ، نحيلة ، بقية الثوب تقرض نباتي السرو والصنوبر تمش في داخلها فتسبب تحجيبها وقد تقعدوا إلى اليابس .

٢٠٢٨٩ - فأثلة السنايل * ، *Cnephias pyrophagana* (S). Tordeuse des épis (F). حشرة من الفأثلات . فراشها صغيرة القند حطية اللون . وراثها إلى الصفرة يعلوها توضع اصفر || وراثها خضرار اللون مسددة ، تظل نحو ١٠ م . تركب سنايل القمح وتقتل على البر .

٢٠٢٩٠ - فأثلة السندبان * ، *Tortrix viridana* (S). Tordeuse du chêne (F). Carnation tortrix (E). Grüner Eichenwickler (D).

حشرة من الفأثلات بسطها فراشها تراوح بين ١٥ و ٢٥ م . وراثها الاماميان إلى الخضار القاتح الاصفر المالح وراثها الخلفاني إلى الشبة البهراء || وراثها تركب البرام ثم الاوراق فتلحقها وتلتهمها . يكثر وجودها من حزيران إلى آب على السندبان والشرم والتبولا والحور الجرجاج .

٢٠٢٩١ - فأثلة العنب * ، *Clypea ambigua*, *Cochylis ambigua* (S). Cochyte de la vigne, Taïgne de la grappe, Ver coquin (F). Grappe berry moths (E). Traubenwickler, Gosseswurm, Henwurm, Saurenwurm (D).

حشرة من الفأثلات بسطها فراشها تراوح بين ١٤ و ١٦ م . وراثها مهدية الخار . لون الامامية منها إلى الوردية يعلوها مزاج اصفر ويجمع اسود . اما الخلفية فالل الوردية قصبية المزاج || وراثها دقيقة ، تنف حطية اللون ثم تلتصق بهد كل انسلخ إلى ان تستقر على الاحمر الساكن || لها جيلان في السنة تركب في جيلها الاول اثمار الكزرة قبل ثابرها ويده . وتركب في جيلها الثاني حبوب العنب في غلظ اثمارها فتفترسها وتسطها .

٢٠٢٩٢ - فأثلة القزفل * ، *Tortrix prunabana*, *Cacaecia prunabana* (S). Tordeuse de l'aillet (F). Pink twist moth (E).

حشرة من الفأثلات بسطها فراشها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثها خضرار اللون مهدية الخار الخارجي . وراثها الاماميان جمعا على الباسر || مكبا اللون شديد السمان تحمض الاثني لطخ مستطيلة على القصر والاوراق فينف من رقات دقيقة نحيلة نوحا إلى الخضرة البسار .

Phacel. ٢٠٢٩٧ - فَاوَرَةُ ، فَاوَرَةُ الْحَمَامَةِ

الفَاوَرَةُ أو فَاوَرَةُ الْحَمَامَةِ نَجْمٌ فَاوَرٌ مَزْجُوجٌ مِنْ كَوْكَبَةِ الْحَمَامَةِ .

٢٠٢٩٨ - فَاوَرَةُ شَرِيفِيَّةٍ

Zenaidinae orientalis (S). Mélopée orientale (F).
طَائِرٌ مِنَ الْفَاوَرَاتِ جَيْلٌ الشَّكْلِ حَسَنُ الْمَنْجَمِ وَالصَّوْتِ
كَثِيْبَةٌ سَتُ الرُّوْمِ وَبَا كَرِيْم . مَوْطَنُهُ الْمَغْنِ وَالْمَرْكَبُ وَصُورِيَّةُ
وَالْأَنْصَابُ . طَوْلُهُ نَحْوُ ٢٣ سَم . ثَوْبُهُ مَتْرَاكِبُ الْأَلْوَانِ
فِيهِ الْأَصْفَرُ وَالْخَضِرُ وَالْبَيْضُ وَالْبَرْدِيُّ وَالْبَيْضُجِيُّ وَالْأَخْضَرُ
وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسَدُ وَهُوَ مَطْرُوقُ الْمَنْعِ ۥ قُوَّتُهُ الْحَيَوِيَّةُ عَلَى
اِسْتِثْنَائِهَا . يَنْشُئُ فِي الْأَدْغَالِ الْقَلِيلَةِ الْارْتِفَاعِ اِنْتَاهُ تَبْيِضُ
بَيْضَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي السَّنَةِ .

٢٠٢٩٩ - فَاوَرَةُ

ثَبِتَ طَيْبُ الرِّيحِ . قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ : هُوَ الْمَرْوُ الْعَرَبِيُّ
الْوَرَقُ . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ جَانِبُجٌ لَهُ وَسَطُهُ كَانَهُ
أَذْنَابُ الثَّغَالِ عَلَيْهِمَا نُورٌ أَحْمَرُ طَيْبُ الرِّيحِ . وَقِيلَ هُوَ
رِيحَانُ الشَّيْخِ ج . فَاوَرَةُ .

Potier (F). Potter (E).

٢٠٣٠٠ - فَاوَرَةُ

هُوَ مِنْ سَنِ الثَّلَاثِينَ وَعَمَلُهُ فَاوَرًا .

Chamois (F).

٢٠٣٠١ - فَاوَرَةُ

هُوَ الْبَشَوُجُ جُ فَاوَرُ . وَقِيلَ الْفَادَرُ مِنَ الْبُورِلِ الَّذِي قَدْ
أَسْنَى وَهُوَ بِمِثْلَةِ الْقَارِجِ مِنْ الْخَيْلِ وَالْبَائِزِ مِنَ الْأَيْلِ وَالْبَقَرِ
وَالْغَنَمِ .

٢٠٣٠٢ - فَاوَرَةُ هُوَ الشَّاقِلُ ج . فَاوَرُ .

Niveau (F). Level (E).

٢٠٣٠٣ - فَاوَرَةُ

هُوَ الرُّوْمَةُ أَيْ مِيزَانُ الْاِسْتَوَاءِ .

Aulacode (F).

٢٠٣٠٤ - فَاوَرَةُ الْبُورِ

هُوَ الْفَقِياعُ ، اَطْلَبُ .

Golunda (F).

٢٠٣٠٥ - فَاوَرَةُ الْبَيْتِ

هُوَ الْفَلَنْدَةُ ، اَطْلَبُهَا .

Puteis féclide (F).

٢٠٣٠٦ - فَاوَرَةُ الْخَيْلِ

يَعْرِفُ بِأَيْنِ عَرَبٍ مَشْنُ ، اَطْلَبُ .

Ichneumon

٢٠٣٠٧ - فَاوَرَةُ الْفِرْعَوْنِ

هُوَ النَّمْلُ الْمَصْرِيُّ ، اَطْلَبُ .

٢٠٣٠٨ - فَاوَرَةُ ، فَاوَرَةُ الْبُيُوتِ

Mus musculus (S). Souris commune, S. domestique,
S. ordinaire (F). House mouse (E). Hausmaus (D).
نَوْعٌ مِنَ الْجُرَذِ صَغِيرٌ الْقَدِّ . مَوْطَنُهُ الْعَالَمُ . ضَرْبُهُ عَدِيدَةٌ
يُوجَدُ مِنْهَا فِي الصَّيْنِ وَبَعْضُهَا نَحْوُ ٣٠ ضَرْبًا ۥ جَسَدُهَا
وَشِقُّهُ يَطُولُ مِنَ ٨ إِلَى ١٠ سَم . وَذَنُّهَا كَثَلُكَ . ثَوْبُهَا
الْمُشَاعِلُ إِلَى الرِّفْدَةِ الرِّصَاسِيَّةِ يَطْلُوها مَوَاجٍ أَصْفَرُ . ظَهْرُهَا
أَحْمَرٌ مِنْ بَطْنِهَا الَّذِي يَمِيلُ إِلَى الصَّفَرِ . أَذْنَاهَا كَبِيرَتَانِ .
حَرَافَتُهَا ذَنْبُهَا ثَلَاثُ ١٨٠ وَاطِلَاها الْاِتْنِ ١٠ ۥ تَأَلَّفَ
الْبُيُوتِ وَتَتَنَبَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْمَأْكَلِ وَالْحَيَوِيَّةِ .

٢٠٣٠٩ - فَاوَرَةُ أَرَبَةِ ، سَقَطِيْمٌ

Mus arianus (S). Souris arienne (F). Arian mouse (E).
نَوْعٌ مِنَ الْجُرَذِ صَغِيرَةٌ الْقَدِّ مَوْطَنُهَا آسِيَّةُ الْوَسْطَى حَتَّى الْعِرَاقِ .
نُوجُهَا إِلَى الصَّهْبَةِ السَّمَرَاءِ يَطْلُوها إِلَى الْبَيْضِ الْاَفْرِجِ . طَوْلُهَا

٢٠٢٨٨ - فَاوَرَةُ بُرْتَقَالِيَّةٍ

Hemerocallis aurantiaca (S). Hémerocallis orange (F).
نَوْعٌ مِنَ الْفَاوَرَةِ أَوْ رَقَاتِهَا طَوِيلٌ مِنَ ٣٠ إِلَى ٥٠ سَم . وَتَعْرِضُ
مِنْ ١٢ إِلَى ١٦ سَم . نَاصِلُهَا أَخْضَرُ الْوَيْلِ حُلُّ صَفِيْحَتِهِ .
شُرَافُهَا الْزَهْرِيُّ يَطْلُو مِنْ ٤٠ إِلَى ٦٠ سَم . أَزْهَارُهَا طَوِيلٌ
نَحْوُ ٧ سَم . وَبُيُوتِ بُرْتَقَالِيَّةِ الْوَيْلِ حَادَّةُ الْبَرْقِ ۥ أَزْهَارُهَا
يَسْتَمِرُّ مِنْ عَمُودِ إِلَى الْبَلَوِ .

Hemerocallis flava (S). فَاوَرَةُ صَفْرَاءُ

Hémérocalle jaune, La jaune (F).
نَوْعٌ مِنَ الْفَاوَرَةِ أَوْ رَقَاتِهَا طَوِيلٌ مِنَ ٤٠ إِلَى ٦٠ سَم . وَتَعْرِضُ
مِنْ ١٥ إِلَى ٢٠ سَم . نَاصِلُهَا جَيْلٌ الْخَضِرُ الْزَهْرِيُّ ۥ شُرَافُهَا
يَطْلُو مِنْ ٦٠ إِلَى ١٠٠ سَم . أَزْهَارُهَا طَوِيلٌ مِنْ ٧ إِلَى ١٠
سَم . وَبُيُوتِ جَيْلَةِ الصَّفَرِ الْكَبِيرِيِّ ، فَاوَرَةُ الْبَرْقِ الْمُسْتَصْبِ .
أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ سَازِرَانِ إِلَى تَمُوزِ .

Hemerocallis fulva (S). فَاوَرَةُ صَبْغِيَّةٍ

Hémérocalle fulve (F).
نَوْعٌ مِنَ الْفَاوَرَةِ أَوْ رَقَاتِهَا طَوِيلٌ مِنَ ٦٠ إِلَى ٨٠ سَم . وَتَعْرِضُ
نَحْوُ ٢٠ سَم . نَاصِلُهَا يَجْرِي الصَّفَرَةُ السَّالِفُ ، أَخْضَرُ الدُّبَابِ .
شُرَافُهَا يَطْلُو مِنْ ١٠٠ إِلَى ١٢٠ سَم . أَزْهَارُهَا طَوِيلٌ نَحْوُ
١٠ سَم . وَبُيُوتِ صَفْرَاءِ الْوَيْلِ ، صَنَائِيَةُ الْمَوَاجِ ، حَادَّةُ
الْبَرْقِ . أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ أَيْلَانَ إِلَى آبِ .

٢٠٢٩١ - فَاوَرَةُ سَبِيلِيَّةٍ

Hemerocallis graminea, H. minor (S). Hémerocallis
graminée (F).
نَوْعٌ مِنَ الْفَاوَرَةِ أَوْ رَقَاتِهَا صَفِيْحَةُ الشَّكْلِ طَوِيلٌ مِنْ ٣٥ إِلَى
٥٠ سَم . وَتَعْرِضُ مِنْ ٥ إِلَى ٨ سَم . نَاصِلُهَا إِلَى الْخَضِرِ
الْبَاهِتِ ۥ شُرَافُهَا يَطْلُو مِنْ ٤٠ إِلَى ٥٠ سَم . أَزْهَارُهَا
طَوِيلٌ مِنْ ٦ إِلَى ١١ سَم . وَبُيُوتِ خَضِيَّةِ الْوَيْلِ فَاوَرَةُ الْبَرْقِ
السَّلَفِ ۥ أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ أَيْلَانَ إِلَى حَزْرَتَانَ .

٢٠٢٩٢ - فَاوَرَةُ ، فَاوَرَةُ الْفَيْدَكَفِي

Facture (F).
Invoice (E).
الْفَاوَرَةُ أَوْ الْبَيَانُ بِالْأَلْمَانِ عِي رَقِيْقَةٌ حَصَانِيَّةٌ مَسْرُورَةٌ
فِيهَا بِالْمُفَصَّلِ بَيَانُ الْمَلِيْمَاتِ أَوْ خُطْبَةُ الْاِثْمَاءِ مَعَ اَلْمُجَانِبِ .

٢٠٢٩٣ - فَاوَرَةُ

الْفَاوَرَةُ أَوْ الْفَاوَرَةُ الْخَالِلُ السَّيْنَةِ .

٢٠٢٩٤ - فَاوَرَةُ

Phelus (S). Phelo (F).
جَنْسٌ بَيَاتَاتٌ مَحْصَرَةٌ مِنْ صَفِيْحَةِ السَّحَابِيَّاتِ . اِنْثَوَاهُ الْمَعْرُوفَةُ
قَلِيلَةٌ ، مَعَهَا الْمَغْنِ وَبَلِيْزِيَا . سَقَطِيْمٌ سَرْعَةٌ مَتَصَبَّةٌ حَادَّةُ
الْبَرْقِ ، تَطْلُو مِنْ ٨٠ إِلَى ١٢٠ سَم . تَقْبِضُ بِالْأَفْرَاقِ حَقْوِيَّةِ
الْتَجَمِيعِ . أَزْهَارُهَا كَبِيرَةٌ الْقَدِّ طَوِيلًا رَافِعٌ بَيْنَ ١٢ وَ
١٥ سَم . يَتَلَوَّنُ بَيْضُ الصَّفَرَةِ الْخَارِجِيَّةِ حَرَّ الْبَاغِيَّةِ
الَّتِي يَطْلُوها زَاوِيْقٌ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْوَانِ رَافِعٌ مِنَ الْاَفْرِجِ إِلَى
الْأَصْفَرِ وَالْخَضِرِ . أَوْ رَقَاتِهَا فَاوَرَةُ جَلِيَّةِ الْاِسْتِثْبَاتِ طَوِيلٌ
مِنْ ٦٠ إِلَى ٩٠ سَم .

٢٠٢٩٥ - فَاوَرَةُ

Fagina (F). Fagine (E).
مَادَّةٌ حَقِيْقَةٌ تَخْرُجُ بِالْأَطْعَمِ مِنْ ثَمَارِ شَجَرِ الزَّيْتَانِ .

٢٠٢٩٦ - فَاوَرَةُ

فِي الْمَجْتَبِئَةِ ، اَطْلَبُ .



فَاوَرَةُ



فَاوَرَةُ



فَاوَرَةُ



فَاوَرَةُ أَرَبَةِ



فأرة الاذغال



قاسيات البطيخ



قاسيات البوصير



قاسيات الشيلم



قاسيات القطن



قاسيات الملقوف

٢٠٣٢٢ - **قاس** Hache (F), Azn (E).
أداة حادة لتصل يقطع بها القنصل والأشجار والحطب.

٢٠٣٢٤ - **قاس** Hédysaron (F).
هو الأينوسارون ، اطليه .

٢٠٣٢٥ - **قاسخ ، قبطيل ، منق** Résolutoire (F), Cancelling, Abrogating (E).

٢٠٣٢٦ - **قاسرى** Bryone (F).
هي القاشراء ، اطلبها .

٢٠٣٢٧ - **قاسى** Sécuriforme (F), Securiform (E).
تمت تعريفى لوصف به الاشياء التي تشبه القاسى .

٢٠٣٢٨ - **قاسيكه ، قاسيه** Pentatome, Punaise (F), Bug (E).
جلس حشرات من فصيلة القاسيات. انزاعه حديدية تتميز بأجسامها المثلثة لمدة حديدية كرجية الزاحية . الوابها مزرقرة وبزركشة . ابراسها لثائية القمل . قرونها الاستشارية لحسية القنوصل ، جميعها مقلية تنمى حصاره التباتات التي تركبها || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٠٣٢٩ - **قاسيات البطيخ** * Aspongopus viduus alger (S), Punaise du pastèque (F).
حشرة من القاسيات جسمها متوسط القند مفلطح الشكل عريض نحو ١٦ مم . ويرفص نحو ٦ فويجا الى الفزقة السراء المولج . قرونها المهادها الى الجلوة || تركب اوراق ونواحي البطيخ وسائر النباتات القرمية والقن .

٢٠٣٣٠ - **قاسيات البوصير** * Carpoporis verbescei (S), Punaise des molènes (F).
حشرة من القاسيات طولها يراوح بين ١٢ و ١٤ مم . فويجا الى الحرة الجلوية تعلوها الزغارف والزراراكس السود . ابرسلها سود للفاصل حمر القفان || اصطنائها فسيحة الاربعاء تركب البوصير وسائر نباتات الفصيلة الخنازيرية وبعض التباتات الصناعية ومنها تتبع الذي تنمى حصاره اطرافه الخنازيرية وارواقه الخفية .

٢٠٣٣١ - **قاسيات الشيلم** * Aelia scuminata (S), Punaise du seigle (F).
حشرة من القاسيات صغيرة القند مفلطح الجسم طولها يراوح من ٨ الى ٩ مم . ويرفص نحو ٥ مم . فويجا حلي الى القرن المولج . ظهرها ثلاثي الخطوط القاطية الصفراء اللون . تركب الشيلم وبعض التباتات البرية .

٢٠٣٣٢ - **قاسيات القطن** * Nezara viridula (S), Nézara verte, Punaise du coton (F).
حشرة من القاسيات جسمها مفلطح الشكل اخضر اللون طولها من ١٢ الى ١٦ مم . ويرفص نحو ٩ مم || اصطنائها فسيحة الاربعاء تشمل جميع الابداء افارة والمثدلة || تركب القطن والبقول وبعض التباتات الصناعية كالنخ . تنمى حصاره التواحي والاوراق الخفية .

٢٠٣٣٣ - **قاسيات الملقوف** * Eurydema oleracea, Pentatoma oleracea (S), Pentatome du chou, Punaise du chou (F).
حشرة من القاسيات صغيرة القند مفلطح الجسم طولها يراوح

نحو ١٠ سم . وذلها ١٤ || تعيش في الحقول وقرب البيوت . قتها جميع المواد العضوية والنباتية .

٢٠٣٣٤ - **فأرة الأذغال** * Mus agrarius (S), Souris agriure (F), Agrarius mouse (E).
نوع من الجرذ صغيرة القند موطنها الشرق الأوسط وأروبة . نوبها الى الصهبة الصناعية . تبع ظهرها اسود . بطنها وعناقها جرابها يبيض . طولها نحو ١١ سم . وذنها ٩ سم . اذناها مستدلتان . حارشت ذتها تبلغ ١٢٠ ، اطها الاثني ٨ || تعيش بجماعات كثيرة العدد . تألف الاذغال وجرانها الحقول المزروعة . قتها الجيوب اصعبا الحقة ثم لسائل والجلور والبصل والحشرات والديدان .

٢٠٣٣٥ - **فأرة البحر** Rat de mer (F).
هو الراسون ، اطلبه .

٢٠٣٣٦ - **فأرة الخرجاج** Mulet (F).
هي الدتية ، اطلبها .

٢٠٣٣٧ - **فأرة الحصاد** Souris des moissons (F).
هي الزبالة ، اطلبها .

٢٠٣٣٨ - **فأرة الصحرارة** Souris du désert (F).
هي النصار ، اطلبها .

٢٠٣٣٩ - **فأرة القبط** في حكر الخقل ، اطلبه .

٢٠٣٤٠ - **فأرة نمطية** Spalm.
هي الخلد ، اطلبه .

٢٠٣٤١ - **فأرد** هو الثور يجر كل شيء متفرد . والشجرة الفأردية هي المختبة من ثيرها .

٢٠٣٤٢ - **فأريش** Agé (F), Agé (E).
هو السنن من الجوران . كترك « أنها بقرة لا فأريش ولا بكر » أي لا سنة لا فتية .

٢٠٣٤٣ - **فأريطان** الفأريطان كركبان متباينان امام سرور نبات نعل .

٢٠٣٤٤ - **فأريوط ، عبط** Gaele (F).
مصاويطة تستعمل لفضائل الشجرة .

٢٠٣٤٥ - **فأريوات** Muridae (S).
Muridae (F), Muridae (E).

فصيلة حيوانات لينة قادمة من مرتبة قرقنات الشوزب ورتبة القوام . اجناسها ٨٦ وانواعها ٧٢٠ لما عمارتها فتلوات الجرذيات والقناديات والفكريات . جميعها حيوانات صغيرة القند ، مدينة الزلقوم ، مستطيلة الكنب || موطنها العالم . تسرح في الليل . تركض على الارض ، تعوم في الماء وتتسلق الاشجار . قتها ما استطاعت الى سبيل من غطف المواد النباتية والعضوية الحيوانية . قنارها لا يفيقه غصبي . اناتها تقف في الامم الوليد من ٢ الى خمس موات .

٢٠٣٤٦ - **فأرد** نمل اسود فيه حرة .

٢٠٣٤٠ - **فاشرا إفريقياة** (F). *Bryone africalne*
هي الخلدوس ، اطليه .

٢٠٣٤١ - **فاشرا بيتضاء، كرمة بيتضاء، حاليق الشعر**
Bryonia alba (S).

Bryone blanche, à, monoïque (F). *White bryony* (E). *Gemeine Zauurübe* (D). *Brionia blanca, Fescera* (I).
نوع من الفاشرا المباشة تكثر في الاسراج النضلة والمواقع الرطبة . ثمارها عنية بيضاء اللون . جذاميرها غليظة مستعيلة تستعمل في الطب يستخرج منها صلبة حارقة ، منهجة ، مهيجة ومغلفة . وهي سهل شديدة الفعل يستعمل في حالات الاستسقاء والصرع وفي المنص الناتج عن الديد وفي الحشيات الصفراوية . وقد قال فيه ابن البيطار ، انه يحرق الشعر من الجلود وما تمره المتقوي فلدغ الجلود .

٢٠٣٤٢ - **فاشرا حبشية**
Bryonia abyssinica (S). *Bryone d'Abyssinie* (F).
نوع من الفاشرا موطنه الحبشة وهو نبات زراعي شائع الاستعمال . اوراقه كبيرة الحجم متشعبة . انماها خضراء اللون . ثماره عنية حامدة للنفخ . جلوره دوفضية الشكل ، جامدة اللب ، تؤكل بعد نقعها بالماء الساخن وتغيره مرتين او ثلاث مرات .

٢٠٣٤٣ - **فاشرا اسوداء ، عنب الحبة ، غبضة**
Bryonia dioica (S). *Bryone dioique, Vigne noire, Naveit du diable* (F). *White wild vine, Common bryony, Snake bryony* (E). *Rote Zauurübe* (D). *Barbone, Kaps del diavolo, R. di serpente* (I).
نوع من الفاشرا انثالي المسكن يكثر قرب السياجات وفي المواقع الرطبة انحصا البرية || ثماره عنية بيضاء اللون غنية بالمادة الفعالة المر || جلوره غليظة مستعيلة . المنافع الطبية انحصا ما لها صلة بالصدر كالات الجنب وما يليه .

٢٠٣٤٤ - **فاشرا هندية** (S). *Bryonia grandiflora* (S). *Bryone à grandes fleurs* (F).
نوع من الفاشرا موطنه الهند . وهو نبات حولي زراعي . يعل . اوراقه كبيرة القذ مأكولة تستعمل استعمال الاسبانخ . اثماره جميلة الشكل حمراء اللون . جلوره دوفضية فزرية المادة الفشرية .

٢٠٣٤٥ - **فاشرشين ، شفشيدار ، هنزوك جشان**
Tamus (S). *Tamier, Bryone douce, Racine vierge* (F). *Black bryony, Ladie's seal, Mandraka* (E). *Echte Scherwurz, Schwarzwurzel* (D). *Tameroo, Radice vergine, Brionia nera, Carsoloda, Vite nera* (I).
جنس نباتات عشبية طيبة معمرة من فصيلة الديدوسوريات . انواعها قليلة العدد موطنها عارضة غرام تملون من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها ثلجية الشكل منبهة الزام الاسير . ثمارها خضراء اللون . ثمارها حفية الشكل لائقة . جلورها سحرية غليظة سواء اللون . خصائصها الطبية كخصائص الفاشرا الا انها اصعب منها قليلا . اما الازراق فتشج حروح الحيلون ويشادها ينفع التواء المسب .

٢٠٣٤٦ - **فاشرشين اكريتي** (S). *Tamus cretica* (S). *Tamier de Crète* (F).
نوع من الفاشرشين ، موطنه جزر البحر المتوسط ، يكثر في جزيرة اكريت || اوراقه ثلاثية التخصيم ، مستعيرة النضين الجابنيين ، مستعيلة الفص الوسطي . ناصها لامة

بين ٦ و ٧ م . ثوبها اخضر اللون كثير الزواكش الحمر في الالات والبيض في الاكوار || تركب معظم القبول انحصا الملقوف وقد لا تمت في الكرمية .

٢٠٣٤٤ - **قائِماء الملقوف الحمراء**
Eurydema ornatum, Pentatomia ornatum (S). *Punaise rouge du chou, Eurydème ornée* (F).
حشرة من القائِماء صغيرة القذ مبطلة الجسم طولها يراوح بين ٨ و ١٠ م . ثوبها تركيب التوازيق والزواكش الحمر والوسد . انحصا مستعرض الشكل ، احمر اللون ، احمر المختار ، جوشها الى الحمرية تملو عثر نقط سود . تركب الملقوف واقتت ولا تمت في البطاطا .

٢٠٣٤٥ - **قائِماء زهرية**
Palomena prasina (S). *Palomane verte* (F).
حشرة من القائِماء طولها نحو ١٢ م . وعرضها ٧ م . ثوبها الى انضمار الزهرية تملو عثرة سطحية خفيفة وستار خري يراوح عرضه بين ١ و ٢ م || اطليها تشج جميع البلاد الحارة الجرداء . تركب معظم انواع الاشجار باستثناء الصنوبريات . وتركب التبغ وغيره من نباتات الصناعية كالخروع والكتان .

٢٠٣٤٦ - **قائِماء كيات**
هي فصيلة خاسيات القبول ، اطليها .

٢٠٣٤٧ - **قائِماء الغاب** (S). *Pentatomia rufipes* (S). *Punaise des bois* (F).
حشرة مثلية من فصيلة القائِماء . جسمها مفلطح ، عني الشكل بطول نحو ١٤ م . ثوبها احمر اللون ، كثيف التبيير الاسير . بطها احمر مجذع بالاسود ، وهو خاصي التسلية عند الذكر ، سابعه عند الانثى . رأسها غروبلي . عليها مستطيل المك . منها عشرين ماصت . زياتها سطلان ، اسمران ، كوسها قليل العرض ، مقرن الجابنيين . حشيتها حمراء الطرف . ظهورها حشلي اللون ، احمر الخنجر . قشراتها شفافة . قواشها الى الحمرية القرمزية الباهتة || تركب اوراق الاشجار الحمرية باستثناء الصنوبريات || رانحتها كرمية .

٢٠٣٤٨ - **قائِماء** (S). *Dermapnyssus* (S). *Dermapnyssus* (F).
جنس قردان من فصيلة النشيات انواعها عديدة جميعها حمراء ، صغيرة القذ ، يعضية الشكل ، مبطلة ، طولها نحو ملير واحد . اوراقها الى الرتبة ، ظهورها مزركشة بالاسير والجوي . تركب الخبز والخفافيش ولا تمت في الانسان .

٢٠٣٤٩ - **فاشرا ، فاشرا ، فاشري** (F). *Bryonia* (S). *Bryone* (F). *Bryony* (E).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة القرقيات . انواعها المروقة ١٢ جميعها طيبة منها الماددة والمباشرة . اوراقها متطابقة كبيرة القذ . نصلها مفروض الصفحة ، انضب البشرة ، كرمية القزامة . انماها الى البيضاء الاثير . ثمارها نورية ، صغيرة القذ ، صفراء اللون او حمراء او سوداء . جلورها نشوية التركيب ، جامدورية او دوفضية الشكل . اما ناعها فيقارب بمجوده نشا الحبوب وقد يستعمل استعمال ذلك بعد استزاف ما فيه من خواص مرة مسهلة في نصلها واستغناها بولسة الماء . بزورها زيقية ، زبها اصفر اللون . يصنع الصناعة || اشهر انواعها الفاشرا البيضاء والسوداء والحبشية والهندية .



قائِماء الملقوف الحمراء



قائِماء زهرية



قائِماء



فاشرا سوداء

جالة رضية ، بزوها صغرة || انزمارها يشتر طوال شهر آب .

٢٠٣٥٥ - فاصولياء ليمّا

Phaseolus lunatus (S). Haricot de Lima (F).
نوع من الفاصوليا الزراعية المصرة . بزوها كثيرة العدد .
سوقها حارشة طولها من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها كبيرة
القد وورقها ثاقلية ، مستطيلة الزايم الاخير الذروب
المذهب . انزمارها صغرة الحصى ، يفضاء اللون ، خضراء
المواج . عناقيدها الزهرية صغرة . سفاتها منجلية الشكل
تطول من ٣ الى ٥ سم . بزوها كلوية ياروح طولها من
١٥ الى ٢٥ سم .



فانشرشين مبدول

٢٠٣٥٦ - فاصولياء معروفة

Phaseolus vulgaris (S). Haricot commun (F). French beans, Kidney beans (E). Gartenbohne, Bohnen (D). Fagiolo, Fagiolino (I).
هي الفاصوليا الزراعية الفلانية المشهورة . بزوها
المعروفة نحو ٥٠٠ . جميعها شامة الاستعمال منتشرة في معظم
اصقاع العالم || سوقها متباينة القد مختلفة الاشكال تلو
من ٣٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضيه متجمعة التصل
المذهب القصبة || انزمارها ليلكية او يفضاء اللون . عناقيدها
كثيرة . سفاتها لاصلية الشكل تلوها من ١٠ الى ٣٠ سم .
بزوها مختلفة الاشكال والاصجام ، خفية بالمواد الفلانية ،
زكيتها الوعلي يشعل :



فاصولياء امريكية

١٧,٤٥ ٪ من المواد الاوتية .

١٥,٣٩ ٪ من المواد البعنية .

٥٩,٦٩ ٪ من هيدرات الكربون .

اما متوسط ما تشكله القرون الحضر المفعلة الطبخ فهو

١٨,٨٥ ٪ من المواد الاوتية .

٥,٢٠ ٪ من المواد البعنية .

١٤,١٧ ٪ من المواد الاستخلاصية .

٢٠٣٥٧ - فاصولياء مبدولة

في البنية ، اطلبها .



فاصولياء

٢٠٣٥٨ - فاصولياء

Phaseolus (F).
بجارة من فصيلة القرنيات اجناسها وانزمارها عديدة معظمها
من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة شهريا فاصوليا .

٢٠٣٥٨١ - فاصول ، فاصول ، قش

Excedent de compte (F). Excess account (E).

٢٠٣٥٩ - فاصول

Surdent (F). Irregular tooth, Wolf's tooth, (in horses) (E).

سن زائلة .

٢٠٣٦٠ - فاصول

Anemophile (F).
Anemophilous (E).

نمت ترميني يطلق على كل نبات تنثر الرياح طلع ازهاره .

٢٠٣٦١ - فاصول

Fongicide, Anticropogemique (F). Fungicide, Anticropogemique (E).

اسم شامل يطلق على جميع المواد والسوائل المركبة للخصلة
في مكافحة الفطور الفطرية .



فاصولياء معروفة

٢٠٣٦٢ - قاطوس

قال الجاسط والقاطوس مكنة عطية تكسر البطن واللاصون
يعرفونها فينتظون غرق الحيفس ويلعقونها على السية فاتها
تهرب و يقال القزوني هذا هو صوت الحيفس .

شديدة الخضار || انزماره صغرة الحجم فستقية اللون .
ثمارة خصية القد وبشكل لونها الى الاحمر الوردي تملوه
ماجة صفراء . جلده سحالي ، غروي ، اسود اللون ،
جانبه الاياب يتصل بجميع الخصاصم الطية المائدة الى
الفانشرشين المبدول .

٢٠٣٦٢ - فانشرشين مبدول * انبلس مكثيا

بالميمون ، بين ميمون

Tamus communis (S). Tamier commun, Taminier, Tame, Tamne, Herbe aux femmes battues, Sceau de Notre-Dame (F).

نوع من الفانشرشين موطنه حوض البحر المتوسط . ساقه
غبراء تطول نحو ٣٠٠ سم . اوراقه ملينة وبيضة لؤلؤ وهي
قلبية الشكل مدنية الطرف . تصلها خاسي او سباعي
البرق مالى البصرة الخضراء الالسة . ثمارة خصية القد ،
حمراء اللون . جلده حزائي الشكل ، اسود اللون ، جامد
الهاب ، يستعمل استعمال الفانشر .

٢٠٣٦٨ - فاصول

Synchrone (F). Synchronous (E).

نمت ترميني يطلق على التواتر التزامني زينا وقاسا .

٢٠٣٦٩ - فاصول

Clôture (F). Enclosure (E).
هو كل ما يفصل ارضين متلاصقتين . لذلك قد يكون
حائطا او سياجا او خندقا ، الخ .

٢٠٣٧٠ - فاصول ، صلاصية

Mérithalle, Entre-nœud (F). Internode (E).

هي الجزء من الساق النباتية الكائن بين عقدتين متتاليتين .

٢٠٣٧١ - فاصول ، فاصول

كل جزء من الأجزاء المتشابهة المتتالية في النسب المركب .

٢٠٣٧٢ - فاصولياء ، فاصولياء ، فاصولياء ، حبش

Phaseolus (S). Haricot (F). Kidney-bean (E).

جنس نباتات زراعية حرلية او مصرية من فصيلة القرنيات
القرنانية . انزماره المعروفة نحو ٦٠ اصنافها فسيمة الارباع
تشمل جميع المناطق الحارة والمعتدلة . معظمها غذائي يزود
لبن ثماره قلبية الخضراء او لاصتار حويبه الجلف .
وبعضها زينة يزرع لجاء زهره او لكثرة وكثافة غفرته
وسرع نمو || سوقها ملطفة ، حارشة . اوراقها معتقة ،
مركبة ، ثلاثية الورقيات . ازمارها عقيدية . ثمارها
قرنية . بزوها مستطيلة الشكل ، ثنائية الفلق ، عديدة
الالوان || اشهر انزمارها ما يتبع .

٢٠٣٧٣ - فاصولياء اسبانية

Phaseolus multiflorus (S). Haricot-flour, H. d'Es-

pagne (F). Scarlet runner (E).

نوع من الفاصوليا البصرية الزينة المصرة . ساقها
حارشة تطول من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها شديدة الخضار .
عناقيدها الزهرية كثيرة العدد والازهار . الزوايا مختلفة
تختلف مع القسور منها الابيض والابيض والبنفسج والبنفسج
الاقوان || انزمارها يشتر من حزران الى ايلول .

٢٠٣٧٤ - فاصولياء حذونية

Phaseolus caracalla (S). Haricot caracalla, H. lima-

con (F).

نوع من الفاصوليا البصرية الزينة المصرة . ساقها
حارشة تطول نحو اربعة امتار . اوراقها كبيرة . وورقها
فستقية اللون . انزمارها عطرية الرائحة ، حذونية الشكل ،
ليلكية اللون الاصفر المواج . عناقيدها بحسة . سفاتها

٢٠٣٨٩ - **فَالِدَة حَقَّة** (F). Intérêt de droit.

Vested Interest (E). هي التي تحسب اما على اساس القانون او على ما اتفق عليه المتعاقدون.

٢٠٣٩٠ - **فَالِدَة خَاصَّة** (F). Advantage particulier.

Particular advantage (E). هي هي عقد الشركة عناية أحد الشركاء دون الآخرين بنسبة حقوق اوفر من حقوقهم. وقد لا يكون ذلك الا بموافقة الجمعية التأسيسية.

٢٠٣٩١ - **فَالِدَة رِبَوِيَّة** (F). Intérêt usuraire.

Usurious interest (E). هي التي تتجاوز الحد الذي عينه القانون لسر الفائدة.

٢٠٣٩٢ - **فَالِدَة غَيْر مُبَاشَرَة** (F). Advantage indirect.

Indirect advantage (E). هي التبرع بطريقة غير مباشرة. او اخفاء حصة وراء عقد معاوضة. او الاراء من دين. او التنازل عن حق الانتفاع. الخ.

٢٠٣٩٣ - **فَالِدَة قَانُونِيَّة** (F). Intérêt légal.

Lawful interest (E). هي التي يحدد القانون سعرها اذا ما فات للمتعاقدون تعيينه في العقد.

٢٠٣٩٤ - **فَالِدَة قَضَائِيَّة** (F). Intérêt judiciaire.

Judiciary interest (E). هي التي تسري منذ اعلان صحيفة الدعوى او اقرار دعي.

٢٠٣٩٥ - **فَالِدَة مُعَدَّة** (F). Intérêt Rise.

Set Interest (E). هي الفائدة الواجب تسديدها حتى لو لم تحقق الشركة اي ربح.

٢٠٣٩٦ - **فَالِدَة مُرَكَّبَة** (F). Intérêt composé.

Compound interest (E). هي التي تحسب على مبلغ اصلي مضاعف اية فوائد متراكمة.

٢٠٣٩٧ - **فَالِدَة مُتَعَدِّدَة** (F). Intérêt échel.

Due interest (E). هي التي اجل دفعها يتقابلها غير المتسقة.

٢٠٣٩٨ - **فَالِي** (F). Axis (E).

الفالق هو قطب دورة القُرس المحورية وهو الفقرة الثانية من السمت تأتي بعد الفقرة وهي اول فقرة تلي الرأس. ويختلف الفالق عن غيره من الفقرات المتبقية بتمتدحه التلوي الواضح.

٢٠٣٩٩ - **فَابِيَانَة** (F). Fabiana (E).

جنية معمرة، ابيدة، واثنية، اترجة من فصيلة الباذنجانيات. معقودة التبريد على اسم الحاكم ولبانيات. ساقها صلبة تفلو من متر الى مترين. اوراقها لائقة، بيضية الشكل، متصببة كالغرايش. ازهارها عذرية الاوتكاز، يضاء اللون، قطرها نحو ٤ سم. طولها نحو ٣ سم. تنموها يستمر من ايار الى محرم.

سرقها تعيش على اوراق الستيان || جسمها كبير لثد يطلق من ٢٤ الى ٢٦ سم. يسلطها تفرح من ٦٠ الى ٦٤ سم. رأسها اصفر صفاني المواج. جنتها كيرتان. زباناها مشطيان مزويجان عند الذكر، عيطان عند الانثى. مرقشها مكد الطول. جوشها وبطنها الى الصفرة الخنطية المواج || روشناها الامانيات الى الزينة البنياء تملوها خطوط متزينة بنية وبقعة طرفية صفراء. روشناها السليمان الى الياض الحاجي تملوها مابة تينية. تزنيها حنطي. اهدابها تينية || لها جلولان في الخول. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز. تسرح في الليل، تماثل بعد ظهورها بنور اربعة اسابيع وتحتسج المكان ليلتها على الصفحات الغفل من نصال الاوراق || السرعة تطلي من ٥٢ الى ٥٥ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، كثيف الحلب، مستطيل البطن، مدبب الثرج. ثوبها الى الصفار الجليل يطلق عند ثلاثي السك خطوط سود وبقعة حراء وتقط ييش. رأسها مكثي اللون يعلو خط اصفر قاطب ينطق عند الاقنن. منها الى الصفرة السمراء. رواجها سود. هليها كبريتي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي غسن صلبة. تحبكها السرعة في شقوق الماء او تحت القشور.

٢٠٣٨١ - **فَامِنِيَّة** (F). Famenien (E).

نسبة الى منطقة فامن البلجيكية. تمت تعريفها يطلق في الجيولوجية على الساف الاعبر اي الاصل من الاراضي الديفونية المائلة الى الحنية الثالثة من الياض التقدم. جميع متحجرات هذا الساف من ضفديات الارسل ونسيلة الكجانيات.

٢٠٣٨٢ - **فَانِيَّة** (F). Fongivore (E).

نمت تعريفها يطلق على كل حشرة او دويبة تعيش على للظهور.

٢٠٣٨٣ - **فَانِيَّة** (F). Pénide (E).

نوع من سكر اثبات كان يستخرج في الماضي من القرموس وقد بطل استخراجه الآن.

٢٠٣٨٤ - **فَانِيَّة** (F). Sambucée (E).

نمت تعريفها يطلق على النباتات التابعة الى فصيلة القويبات او القرية التي منها || وهو سبط من فصيلة القويبات يشغل بعض الاجناس والانواع.

٢٠٣٨٥ - **فَانِيَّة** (F). قسم من الارض بين مرتفعين ج. فوائج.

٢٠٣٨٦ - **فَالِدَة، مُرَكَّبَة** (F). Intérêt (E).

الفائدة هي المرء اي ربح الاموال المقرضة.

٢٠٣٨٧ - **فَالِدَة اِتِّصَافِيَّة** (F). Conventional interest (E).

هي الفائدة المشعورة صريحا في عقد الاقراض على ان لا تزيد على ما يحدده القانون.

٢٠٣٨٨ - **فَالِدَة بَسِيطَة** (F). Simple interest (E).

هي التي تسري على اصل الدين فقط وتقابلها الفائدة المركبة.

Charbon de bois (F).
Charcoal (E).

الفحم النباتي أو فحم الخشب هو الخشب المحروق بمعدل من الهواء . ثم ذلك بالخشعة .



نخعية مرجانية

Erwinia ardisae

٢٠٤٧٢ - فحمة الساق

وصم بكتيري شديد الانحسار يلحق فروعيه عسقلية ، الخشب .

Sphacelotheca

٢٠٤٧٣ - فحمة

جنس تطور بيجرية طفيلية من فصيلة الراعوييات تتميز بخلو حبيها الخارج من الأريقات البارزة || أنواعه عديدة جميعها مؤذية تسبب التيجليات اشهرها ما يليق .



فحمة الدخن

٢٠٤٧٤ - فحمة الدخن

Sphacelotheca holci-sorghii, S. reiliana, Ustilago holci-sorghii, U. reiliana, Sorosporium reilianum (S).
فطر مجهرى يسبب ازهار اللوز والقمح على اختلاف انواعها || مظهره الخارجى كتل خيطية بيضية تنشئ الشكل من رشاته الى زبداته دون ان تقرب من الاغشية الزهرية . صفة البوي سريع الانقلاق . بريداته يمر اللون ، كروية الشكل ، خشكة البشرة ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٢ مم . || يكافح مكافحة فحمة اللوز .

٢٠٤٧٥ - فحمة الذرة

Sphacelotheca sorghi, Ustilago sorghi, Sporisorium sorghi (S). Charbon couvert du sorgho (F). Covered smut of sorghum (E).

فطر طفيل مجهرى يسبب المطر والشكل فيضيا ويطلب الازهار ويمنعها عن العقد || مظهره الخارجى ينثر بويضة لونها الى القلعة ، يبيض القاعدة ، سطحه القمى ، لساء البشرة تنطلق من خيوط كروية لونها الى السرة القائمة . يكافح بتغير البذار بمسحوق كربونات الصوديوم او سلفات الصوديوم .

٢٠٤٧٦ - فحمة الزهر

Sphacelotheca cruenta, Ustilago cruenta (S).

فطر مجهرى يسبب ازهر فيضى عليه . ينثر أولا بصفته البويجى الكروي الشكل السريع الانقلاق . ثانياً بفروسه النخعية المستطيلة التي تتركب جميع اغشية الزهر عن زبدات ورشات وسمايل المتكون . ثالثاً بأريقاته المتعددة القائمة على سن البويضات بعد تحويلها الى بؤر بويضة || وهو من الاوصاف المتعددة الانتشار كثره اذاها لانها تتطلب العديد من العوامل البيئية المواتية || يكافح مكافحة فحمة اللوز .

Symptôme (F).

٢٠٤٧٧ - فحمة عرقش

Symptom (E).

ج فوئمن وأعراض .

٢٠٤٧٨ - فحمة

في الشفران الاسود ، وصم فطرى يسبب الكوة .

٢٠٤٧٩ - فحج

فحج الاضى : صوباً من فيها وكثيش الاضى صوباً من جلدها .

rocket (E). Echter Meersalz (D). Baccheroni, Ravascello maritimo (I).

نوع من البلياس وهي عشية برية حولية يقال انها طيبة منها رمال الشطوط البحرية والبرية . جنوباً حجازية وتدية . سوقها وفروعها زبد . اورقاتها خلية البشرة . ازهارها صغيرة القد ، يبيض اللون . وهي عشية مرعوية متوسطة المادة اللدائية تنشط الدر .

Spadice (F). Spadix (E).

٢٠٤٨٠ - فحل

هو ذكر النخل خاصة ينبغ به حواملها . ج . فصاحيل .

Symptomatologie (F).

٢٠٤٨١ - فحالة

Symptomatology (E).

الفعالة علم يبحث في امراض الامراض .

Test

٢٠٤٨٢ - فحس

Analysa du sol (F).

٢٠٤٨٣ - فحس التربة

راجع تحليل التربة .

Fossette (F). Small cavity (E).

٢٠٤٨٤ - فحمة

الفحمة نفرة صغيرة تكون في بعض الحبوب والبذور . والنفرة الموجودة عند رباط الاصداف البحرية من فوات المصريين تسمى ايضاً فحمة . ج . فماس .

٢٠٤٨٥ - فحمة مرجانية

Embothrium coccineum (S). Embothrie écarlate (F).

جنبة زرقانية معمرة من فصيلة الفصيات . ساقها متصصة فروعها تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اثمارها حرشية اللحم . اورقاتها بسيطة ، متعاقبة ، متعقبة ، قصيرة الزناد . نصلها اطيالبي الشكل لامع الفصمة العليا باحت السفل . ازهارها متدفقة التجميع ، ثنائية التزويج ، تاجية الارتكاز ، حواء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

Etalon (F). Stallion (E).

٢٠٤٨٦ - فحل

الاكر من كل حيوان . ج . فحول والفحل وضال وضاعة وضروة .

Carboniser (F). To carbonize (E).

٢٠٤٨٧ - فحم

حول الشيء الى فحم .

Charbon (F). Coal (E).

٢٠٤٨٨ - فحم

اسم شامل يطلق على بعض مركبات الكربون غير المتبلور . اشهر انواعه الحجرى والنباتى .

٢٠٤٨٩ - فحم العظام

Noir animal, Charbon d'os (F). Bone-black, Animal charcoal (E).

سماد فسفوري يحصل من حرق العظام بطريقة خاصة .

Houille (F).

٢٠٤٩٠ - فحم حجرى

Coal, Pit-coal (E).

مادة معدنية سوداء اللون تستخرج من الارض تستعمل وقوداً . انواعها متعددة تختلف باختلاف نسبة الكربون التي تحويها .



فحمة الزهر

۲۰۴۹۲ - فِدَادُكَة كَالِحَة * *Ula nebulosa* (S).

Chouette nébuleuse (F).
طائر من الفئاد كبير الجفّة طوله نحو ٦٠ سم. موطنه
أمريكا الشمالية. يأوى إلى الأسراج الكثيفة. يصيد الجرذ
والقار والأرانب والسناجب والفصّادع والأسماك.

۲۰۴۹۴ - فِدَادُكَة *Grenouille* (F).

هي الضفدع، أطلبه.

۲۰۴۹۵ - فِدَادُكَاتِيَات *Ululens* (F).

عمارة من فصيلة الببويات تشمل ثمانية اجناس: الخُم
والخيل والصدى والضوء والفداد وأنهم والهرنق والهرذ.

۲۰۴۹۶ - فِدَاكُر *Concasseur* (F). Breaker (E).

۲۰۴۹۷ - فِدَاكُرَة *Pratia* (S).

Pratie (F). *Pratie* (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الببويات. موطنها
مستنقبة أو أراضي مستنقبة، متعاقية، أزهارها
عويية الأبركار، فردية، مستطيلة المالحق، ثمارها
عنية متباعدة يكثر نيسا الأخر || أنواعها
المروفة قليلة البدء، أشهرها التالية.

۲۰۴۹۸ - فِدَاكُرَة ضِعْمَة التَسْتِين *Pratia macrodon* (S). *Pratie à grosses dents* (F).

نوع من الفدانة. ساقها قصيرة مستنقبة فراء. أوراقها
صغيرة مسطوية الشكل، شبه لحمية النصال، غسفة
الكسنة اختاري. أزهارها حلزونية العرف، قصيرة المالحق،
صفراء اللون، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر طوال
فصل الصيف.

۲۰۴۹۹ - فِدَاكُرَة قُرْصَة *Pratia perpusilla* (S).

Pratie naine (F).
نوع من الفدانة. ساقها جذمة. أوراقها شديدة الصغر.
أزهارها مستطيلة المالحق، صغيرة القد، بيضاء اللون،
نخلية التويجات || تنويرها من حزيران إلى تموز.

۲۰۵۰۰ - فِدَاكُرَة مَحْرَسَة *Pratia angulata* (S). *Pratie anguleuse* (F).

نوع من الفدانة. ساقها محرسة فراء تملو من ٢٠ إلى
٣٠ سم. أوراقها مستنقبة، بيضية الشكل، نصلها مزرق
البشرة. أزهارها مستطيلة المالحق، بيضاء اللون، مرققة
بالأخر. ثمارها عنية حراء اللون || تنويرها يستمر طوال
فصل الصيف.

۲۰۵۰۱ - فِدَاكُرَة صَدَاكَة *Pratie repena* (S).

Pratie rampante (F).
نوع من الفدانة. ساقها مدادة زائفة. أوراقها مستطيلة
الاعتك التي يتجاوز طولها طول النصال، نصلها شبه
قلبية الشكل، عادمة الكسنة. أزهارها مستطيلة المالحق،
بيضاء اللون، مشيرة بالبنفسجي. ثمارها عنية مرجانية ||
تنويرها يستمر من حزيران إلى تشرين الأول.

۲۰۵۰۲ - فِدَاكُم *Chausse* (F). Filter (E).

مصفاة تمر بها السوائل لتنقي.

۲۰۵۰۳ - فِدَاكُن *Bœufs de travail, Bœufs de labour* (F). Oxen (E).

القدان هما الثوران اللذان يقدن عليهما. ج. قدن وأندة.

۲۰۴۹۰ - فَحِيل *Racour* (F). Thorough (E).

نمت تعريف يطلق على الحيوان الذي يطلع في الليل صفاته
ذكراً كان أو أنثى.

۲۰۴۹۱ - فَع *Happeau* (F). Snare (E).

أداة تصاد بها الطيور والقوام.

۲۰۴۹۲ - فَعَار *Claris de la lune* (F).

الفتح هو ضوء القمر.

۲۰۴۹۳ - فَعَت *Light of the moon* (E).

الفتح هو ضوء القمر.

۲۰۴۹۴ - فَعْدَة، فَعْد *Cuisse* (F). Thigh (E).

عضو من أعضاء الجسم الحيواني. وما فخذان. ج. أخذا.

۲۰۴۹۵ - فَعْدَة الدَب *Volume*

نجم من كوكبة الدب الأكبر.

۲۰۴۹۶ - فَعْر الثَّلُوج *فَعْر الثَّلُوج* هي الثيرونوكا. أطلبا.

۲۰۴۹۷ - فِدَاكُم *Volume*

الفدانة: حجم الشيء.

۲۰۴۹۸ - فِدَاكُم *Oton*

الافداد حيوب المعلقة لا تزال حسانتها حائلة بها وتكون
غالباً حيوب نخلية أو صفيغة.

۲۰۴۹۹ - فِدَاكُم *Grenier* (F). Grenary,

هو الإبتار، أطلبه.

۲۰۴۹۰ - فِدَاكُم *Chouettes* (F).

Screech-owls, Barn-owls (E).

جنس طير من الببويات وحارة الفداديات. أنواعه عديدة
جميعها من الرؤاس الكواسر. كبيرة القد، خفيفة الرأس،
عريضة الجسر المستدير، قوية للفسر. ألوانها إلى البصرة
الموغة تعلوها رقعة صغيرة البنية وبعض التباذيع.
قوته القارتي على اختلافها والصفادع والظلمة ... ين
في تجلويث الأشجار البنية الهدد في الأكرار الكبيرة
المزوقة. أناته تفيض مرة واحدة في العام. حشنتها
تراوح بين ٤ و ٦ يبيضات || أشهر أنواعه الثلاثة
التالية.

۲۰۴۹۱ - فِدَاكَة الشَّرَق *Ula noctua* (S).

Chouette chevêche (F).

طائر من الفداد أصغره نسيحة الإرياء تمتد من الصين إلى
أطراف أوروبا ومن حضايا إفريقيا الشرقية وبرقعات
أفريقيا إلى تمام مراكش الإيطالية || وهو آبد، متوسط
القد، طوله نحو ٤٥ سم. يأوى إلى الأسراج والخواب.
سرسره يدم من القسق إلى الفجر. يصيد الجرذ والقار
والظلمة والصفادع وجميع أنواع الحشرات والبدان.

۲۰۴۹۲ - فِدَاكَة الشَّال *Ula isponica* (S).

Chouette lapone (F).

طائر من الفداد كبير الجفّة طوله نحو ٧٠ سم. يأوى
إلى أسراج البلاد الباردة أخصها الشمالية || وهو يلي
الطيران لا يصف من شيء يمكن منه وقد يقتصر السناجب
والفوق.



فِدَاكَة الشَّرَق.



فِدَاكَة الشَّال



فِدَاكَة كَالِحَة

٢٠٥١٤ - قرأ التبت * ، هَمِينِيْد

Equus hemionus (S). *Hémione* (F). *Klang* (E).
نوع من الأفراس موطنه التبت ويصنف في ثاني أسية الوسطى .
وهو كبير الجثة يملو نحو ١٢٠ سم . ويطول ٢١٠ سم .
يما في ذلك الذنب الذي يبلغ ٥٠ سم || رمله يراوح
بين ٨ و ٢٠ .



فلس المساكن

Eques indicus (S). *قرأ الهند ، قُولَان*
Onagre de l'Inde, O. de Britson, Koulan, Ghour, Ghor-Khur (F).
نوع من الفراء موطنه الهند والافغان والصين وكستان وبران
وهو متوسط القد جسمه حبي الفراء الاسودى الا انه افتح
ثوباً وأعرض ثوباً وأطول أذنأ || عدد رمله يراوح
بين ٨ و ١٥ .

٢٠٥١٦ - قُرَاكَل ما في كوش الحيوان من القوت .

٢٠٥١٧ - قُرَاكَج هو القرد نبات مثقي ، اطلبه .



فراء آسودى

٢٠٥١٨ - قُرَاكَج ، قُرَاكَل
Cépée (F).
Tuft of shoots (E).
جاء القراسيكي التي تفرخ حول اودية الشجرة المغطاة .

٢٠٥١٩ - قُرَاكَل هي العائقة ، اطلبه .

٢٠٥٢٠ - قُرَاكَل ، قُرَاكَل ولد النجسة والاعز وبقرة .

٢٠٥٢١ - قُرَاكَلِيَّة *

Ferraria (S).
Ferraria (F). *Tiger flower* (E). *Tigerblume* (D).
Gladiolo indiano (I).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة السوسنيات انواعه قليلة
جميعها زينة. بعضها ظارية . اوراقها لاسعة زاهية الخضار
مشربة اخضر بالاحمر والي . انزاعها جميلة الشكل كبيرة
القد نورة ووشحة لكنها سرية القبول اما اسمها فتدغم
وسمها كبيرة ويهدية || يستخرج من دوائها مادة
صمغية حريفة تستعمل في الطب || اشهر الوراها مايلي .

٢٠٥٢٢ - قُرَاكَلِيَّة صَوْدَاكَة
Ferraria atrata (S).
Ferraria noirâtre (F).

نوع من القراوية السورية ساقها تملو نحو ١٥ سم .
انزاعها الى الحيرة الابريانية التبرع للوشحة بالاحمر
والاصفر || انزاعها يشتر من آذار الى نيسان .

٢٠٥٢٣ - قُرَاكَلِيَّة مَحْمُودِيَّة

Ferraria undulata (S). *Ferraria ondulée* (F).

نوع من القراوية السورية . ساقها تملو من ٢٠ الى ٣٠
سم . انزاعها الى الخضار الاسمر تملو رشفة جردية .
بتلاتها مكوية النصل ، منقطعة الاطراف || انزاعها
يشتر من آذار الى نيسان .

٢٠٥٢٤ - قُرَاكَلِيَّة
Ecrémusse (F). *Separeur* (E).
آلة تفرز الكتانة من الحليب مع بيد القوة النابضة .

٢٠٥٢٥ - قُرَاكَلِيَّة قُرَاكَلِيَّة
Equitation (F).
Horsemanship, Riding (E).
هو فن استقاء الخيل .

٢٠٥٢٦ - قُرَاكَلِيَّة الجَو
Prévision du temps (F).
Prevision from time (E).
هو تشخيص الجو .

٢٠٥٢٧ - قُرَاكَلِيَّة كِين هو العين المحتدي ، اطلبه .



قُرَاكَلِيَّة

٢٠٥٠٤ - قُدَر *Chamois* (F).

الفرد والفرد هو النملوة . ج قُدور وفرد .

٢٠٥٠٥ - قُدَر *Concasser* (F).

To bruise, To crush (E).
قُدَر الحبيابة : كسرها صغاراً .

٢٠٥٠٦ - قُدَس *Araignée* (F).

هو العنكبوت . ج قُدسة .

٢٠٥٠٧ - قُدَس المساكن * ، عَنَكَبُوتُ الْفَارِل

Tegenaria domestica (S). *Tégénurie domestique, Araignée domestique* (F). *House-spider* (E).

نوع من العناكب الساعية المربصة الفانسة ثنائية الروايا
سداسية المشاا ينتمي الى فصيلة العنكبوتات || جسمه
صغير القد بطول نحو ٨ سم . عند الذكر ونحو ١٤ سم .
عند الانثى . صدره مثل الجرم لونه ال الصفرة الخضراء
المزاج . صباه زهيتان . خيشام صبران ذريان . نكاه
تقيدان صبران . جرمه نعلية كثيفة الحلب . بطة اثير
الكون تملو بعض الزواكش واللفظ || يأنف المساكن
والأحولة والغراب . نكه الحشرات الصغيرة والذباب والحمل .
يربص لها في حبه ويسعى اليها ركضاً وقفزاً . حبه كبير
القد ، اقل السطح ، قوي المركز ، يقينه في الزوايا
يلجأ اليه في التبار ويسرح في الليل || ياله الشتوي
يشتر نحو ١٧ اسبوعاً يقضيها في مكانة بطولية الشكل
ينسجها في شقوق الخوايا او تحت الاغصان ويبيتا ||
يمشي نحو ثلاث سنوات . ملجته الحياتي لا يختلف من
ملجن غيره من العناكب || يعتبر من الدواب النافعة
اللاذنية .

٢٠٥٠٨ - قُدَش *Araignée (femelle)* (F).

الدش انثى العناكب (كراغ) . *Spider (female)* (E).

٢٠٥٠٩ - قُدَح *Distorsion* (F). *Distorsion* (E).

القُدح انواء يطرأ على عضو من الجسم او على قسم منه .

٢٠٥١٠ - قُدَحَم القُدَم : البقل الكثير الماء .

٢٠٥١١ - قُدَحَن ، مَهْدَد *Niveler* (F). *To level* (E).

يسد الارض ويصلاها .

٢٠٥١٢ - قُرَا * قُرَاكَة *Onagre* (F). *Onager* (E).

شرة من الحمر الوحشية حديثة الانواع تتميز بأذنانها الدقيقة
وأذنانها الصغيرة وأعرافها القصيرة السبب المنصب
وسوارها القليلة الاستدارة || اصطناعها بعض فياني وجبال
العالم القديم . تميل جمادات . ارباعها لاجسية يراوح
عدد افرادها بين ٥ و ٢٠ رأس الرجل فصل يقوده ويحميه
ال ان ينقلب على امره فيتنسى . اعرف انواعه فراء التبت
واحدة والفراء الاسودى .

٢٠٥١٣ - قُرَا آسودِي * ، قُرَا الشام

Equus hemippus (S). *Hémippe, Onagre de Mésopotamie* (F). *Syrian wild as* (E).

نوع من الفراء ثوبه انيس اللون موطنه يمتد من جبال ايران
الى العراق السورية حتى تدمر . وهو متوسط القد يملو نحو
١١٥ سم . ويطول ٢٠٠ سم . يما في ذلك الذنب الذي يبلغ
٤٥ سم . رمله يراوح بين ٥ و ١٢ .

٢٠٥٣٣ - قراغة (F). Butterfly, Moth (E).
اسم شامل يطلق حل جميع الحشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. وبهم من خصص الاسم بحشرات القمصيلة القراغية دون سواها.

٢٠٥٣٤ - قراغة الحصيد (F).
هي غصية الحصيد، اطليا.

٢٠٥٣٥ - قراغة الحنطة (F).
هي غصية القمح، اطليا.

٢٠٥٣٦ - قراغة الزعرور (F).
هي كرنيبة الزعرور، اطليا.

٢٠٥٣٧ - قراغة السمسم (F).
راجع دودة السمسم.

٢٠٥٣٨ - قراغة الصنفايد (F).
هي حلوظ الكربة، اطليا.

٢٠٥٣٩ - قراغة القث (F).
هي كرنيبة القث، اطليا.

٢٠٥٤٠ - قراغة الملفوف (F).
هي كرنيبة الملفوف، اطليا.

٢٠٥٤١ - قراغة جوارك القطن (F).
هي دودة القطن الشوكية، اطليا.

٢٠٥٤٢ - قراشيات (S).
Papilionidae (F). Papilionidae, Swallowtails (E).
Ritter (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة، صولجانايات القرن. اجنحتها والاولاهما كثيرة الممد منتشرة في جميع اصقاع العالم.

٢٠٥٤٣ - قراشية (S).
Papilionaceae (F). Papilionaceae (E).

سبط من فصيلة القراشيات اجنحة نحو ٣٠٠ منها الاثمار والجنبايات والمكسقات والاصباب الحولية والمعمرة. معظمها زراعي غذائي او عطري وصناعي.

٢٠٥٤٤ - قراط (S).
Coregonus fers (S).
Féra, Férat, Ferrat (F).

سمكة ثورية من السلموليات. اصلها من بحيرات ميسورا وايطاليا الشمالية وقد انتشرت تربيتها في الاكوازي والاسواض المصنعية المبيعة النور. جسمها بطول نحو ٥٠ سم. ثورما الى السمرة الخطية الخضراء المولج. يطها الى الثيرة البيضاء. لحمها جيد الصنف مرغوب فيه كسالم القور.

٢٠٥٤٥ - قراغ، قنطرة، قنطرة (F).
Lacuna, Alr-cell (E).

٢٠٥٤٦ - قراغ حجووي (F).
هو في التسج الحية جربوب دقيقة خالية من الهواء.

٢٠٥٤٧ - قراغي (F). Lacunose (E).
نمت ترميفي يطلق على التسج النباتية التي يتخلل خلاياها فراغات مليئة بالهواء او بغيره من السوائل المختلفة. يقال تسج قراغي.

٢٠٥٤٨ - قراسيون، بذاذ كورد (S).
Marrubium (F). Horehound (E).

جنس نباتات عشبية برية طيبة مسرة من فصيلة الشفويات. اناوله عديدة جميعا طرية تتميز برعها الصواع القريب الشبه من المسك. سيقانها فراء عشوية مزينة. اورقها متعابلة متقابلة بيضا. فصلها كثيرة الفروق، متجمعة الصفحة الحولية البشرة، مسنة الخار. اناولها صغيرة الله، ضمية التجميع. محورية الارتكاز || اعرف اناوله مائل.

٢٠٥٤٩ - قراسيون ابيض، حشيشة الكلب، قلبية، مقل الصنف (S).

Marrubium vulgare (S). Marrube commun, M. blanc (F). Common white horehound (E). Marandom, Welsch Androm (D). Marrubio comune, Marrobio, Mentastro, Erba apiola, Prasline (I).

نوع من القراسيون وهو ضمية مبلولة تنبت في الاراضي الجور وتل جوانب الطرقات. تطلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. ساقها فراء كثيفة الزغب الابيض. اورقها صغيرة الله، بيضا الشكل، سمكة التصل الحشن. اناولها الى اليباس الاخير || وهو قوي الرائحة المرصية، مر، حريف، لاذع وقايش. يدر البول ويخفف الحرارة وينفي التشنج ويعمل حالات السعال.

٢٠٥٥٠ - قراسيون اسود، بكتوط الارض (S).

Ballota nigra (S). Ballote fétide, B. noire, Marrube noir (F). Fétid-horehound, Black horehound (E). Schwarze Bulte, Fenweibel, Zahntosa (D). Marrobio bastardo, M. nero, Ballota fetida (I).

نبات عشبي طوي يري من فصيلة الشفويات طري الرائحة القوية، يدر البول ويبرد التورم ويذل الحامض البولي وينفي التشنج || ساقه فراء. اورقها متعابلة، اهلالية، صغيرة الله || فصلها شش الصفحة، مسن الحافة. اناوله دقيقة مستطيلة ضمية التجميع، محورية الارتكاز لونها الى الجلوة.

٢٠٥٥١ - قراسيون القلب، بكلة الامهات (S).
Leonurus cardiaca (S). Léonure cardiaque, Agripaume, Cardique (F). Common mother-wort (E). Echtes Herzsgepann (D). Cardica, Leonuro, Melissa salvatica (I).

عشبة برية طيبة مبلولة من فصيلة الشفويات. ساقها تطلو نحو ١٠٠ سم. اورقها متقابلة متعابلة، فصلها مفرض الصفحة شديد الخشار. اناولها صغيرة الله، ضمية التجميع، محورية الارتكاز لونها الى المسرة تملوها رقة بيضاء || كان ولا يزال يستعمل في علاج امراض القلب عند الاطفال وبهم من قال ان مثل نقيه يثني الكلب.

٢٠٥٥٢ - قراسيون مائي (S).
Lycopus (S). Lycopo, Marrube aquatique, Pied-de-loup (F). Gipswort, Water horehound (E). Gemeiner Wolfstrapp (D). Lycopo, Marrubio aquatico, Erba sega (I).

نبات عشبي طوي يري مسر من فصيلة الشفويات يكثر في المناطق والمواقع الرطبة. ساقه فراء. اورقها متعابلة، لاذعة، سانية || فصلها متشاري الخشار، خلي البشرة. اناولها بيضاء اللون، صغيرة الله، ضمية التجميع، محورية الارتكاز || يقال انه يظهر الجرح ويعملها وهو حريف لاذع يستعمل في التخفيف الاسود.



قراسيون ابيض



قراسيون اسود



قراسيون القلب



قراسيون مائي



قراغ

ايض الحار || ازهاره خيمي الشكل ثلاثي الاكوار
يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٠٥٥٩ - **فريون الالديين** * ، يتفرع هندي
فريون هندي

Euphorbia antiquorum (S). *Euphorbe des anciens* (F). *Ancient milk-wort* (E). *Wolfsmilch der alten* (D). *Euforbio indiano*, *E. triangolato* (I).

نوع من الفريون البري الطبي المعمر كان يستعمل في الماضي لعلاج امراضه الانسداد والصلابة وهو يستعمل الآن في الطب البشري لانه سهل حثيف لا يتخلو من السموم القاتلة .

٢٠٥٦٠ - **فريون السمك**

Euphorbia piscatoria (S). *Euphorbe des pêcheurs* (F). نوع من الفريون البري المعمر . ساقه فروع غليظة ، قطرها نحو ٢٠ سم . يصلها ثلاثة اشجار . فروعها خراشيد مستطيلة قطرها نحو ١٠ سم . اوراقها خضراء طويلة نحو ٥ سم . وتعرض ٦ سم . لونها الى الخضار البصري . ازهاره خيمي المتجمعة ، خاسي او سبالي الاطراف . صارتها خزيمة المادة الجسالية القاتلة تستعمل في صيد الاسماك .

٢٠٥٦١ - **فريون السمك** * ، يتفرع السمك
فريون

Euphorbia helioscopia (S). *Euphorbe héliscopie*, *Néveil matin*, *Herbe aux verrues* (F). *Sun spurge*, *Wort-grass*, *Wort-Wort* (E). *Sonnenwolfsmilch* (D). *Euforbio mirasole*, *Rogna*, *Titimalo elioscopio* (I).

نوع من الفريون البري الطبي المعمر . يقال ان ضباب اوراقه او صلاته يقضي على التآكل .

٢٠٥٦٢ - **فريون افريقي** ، فريون لانياسي
الورق ، يتفرع المكسيك

Euphorbia heterophylla (S). *Euphorbe hétérophylle*, *Poinsette d'Amérique* (F). *Mexican fire-plant* (E). *Poinsettia* (D). *Poinsettia d'America* (I).

نوع من الفريون المحلي . ساقه منتصبة تنمو الى ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه معتقة ، السفلى منها بيضيه الشكل مدببة المنقصة ، تصلها مسنن الحافة على الصفحة السفلى . اما الاوراق العليا فانها لا تقياسية الشكل والجمع منها البسيطة والمنقصية والقرصية والمقرصة . ازهاره قليلة العدد ، ثنائياتها حرة التفتح ، ولبنية الانسان لثلاثة التبري ، و ازهاره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠٥٦٣ - **فريون بهي**
هو الاكليل الشوكي ، اطلبه .

٢٠٥٦٤ - **فريون رانج**
Euphorbia fulgens (S). *Euphorbe éclatante* (F).

نوع من الفريون البري المعمر . ساقه خشوية نجيلية تنمو نحو ١٢٥ سم . اوراقه متعاقبة ، معتقة ، متدلية ، تصلها خيوط المنقصة بطول من ١٠ الى ١٥ سم . ويعرض نحو ٢ ، وازهاره عذرية الاذنكاز كبيرة الحدد البتلية الشكل ، للمفرد اللون || ازهاره يستمر طوال الربيع .

فراغية * *Vaccinium* (F). *Vaccum* (E). فراغية ملتح فلسي حكيم قديم العهد يقول بان الفراغ مروي في الطبعية .

٢٠٥٦٩ - **فراغية** شجر تميل منه الرجال (السان) .

٢٠٥٧٠ - **فراغية** * ، عوسج رند ، عوسج حوي
Rubus idaeus (S). *Framboisier* (F). *Red raspberry*, *Raspberry-bush* (E). *Echter Himbeersruch* (D). *Lampine*, *Lampone*, *Rovo idaeo*, *Mora prugnola* (I). جنبة مشعرة من جنس العليق وفضيلة الورديات . ارضها ممتعة . ساقها متعقبة ممتعة شائكة . اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها لانياسية الحد الذي يراوح من ٢ الى ٥ نصالها بارزة الفروق سفنة الحافة ، مزينة المنقصة السفلى . ازهارها متعقبة المتجمعة ، عذرية الاذنكاز ، مستطيلة المالبق ، يضاء اللون . ثمارها شاميل جزوية اللون او بنفسجية مائلة . وهي مأكولة مستعينة العلم تجبر من المرطبات اللينيات || زراعتها تنمو في الخريف نفسه من ١٠ الى ١٢ سنة . تتكاثر بالانلاخ التي تنفس على ابعاد يولية تراوح بين ١٠٠ و ١٢٠ سم . وابعاد مستطلة تراوح بين ١٢٠ و ٢٤٠ سم . وهي رطب في الارربة الحربية القليلة الانساج وفي المواقف الظليلة الرطبة .

٢٠٥٧١ - **فراغية** ، صمغية
Framboise (F). *Raspberry* (E).

ثمرة الفراغية وهي خضراء البتامين و ث و لثة غرام من ثوبها المأكول تحوي من ٢٠ الى ٢٥ مغ . فيتامين ث و .

٢٠٥٧٢ - **فراغية**
Fournier (F).

هو الفراغ من الطيور الامريكية ، اطلبه .

٢٠٥٧٣ - **فراغية**
Tigre (F).

هو الجبر ، اطلبه .

٢٠٥٧٤ - **فراغية**
Fraie (F).

هي الشبك ، اطلبه .

٢٠٥٧٥ - **فراغية**
سبط من فصيلة الورديات يعرف بالشيليكيات .

٢٠٥٧٦ - **فراغية**
Caillie (F). *Quail* (E).

واحدة الفري اي الباق .

٢٠٥٧٧ - **فريون** ، يتفرع ، تاكوت ، عنجيد
Euphorbia (S). *Euphorbe* (F). *Spurge*, *Devil's milk* (E). *Wolfsmilch* (D). *Euforbio*, *Titimalo* (I).

جنس نباتات برية وريسية من فصيلة الفريونيات . انواعه نحو ١٦٠٠ منها المحلية والممتدة ومنها المشية والقيمية والخشوية والحمية الاوراق كالمسبار || اصطناعها البلاد الحارة . جميعها دامة لبنة المعصرة . معظمها طبي جمالي للمادة || اعرف انواعه ما يتبع .

٢٠٥٧٨ - **فريون ابيض الحولي**
Euphorbia marginata, *E. variegata* (S). *Euphorbe marginée* (F).

نوع من الفريون الحولي . ساقه متعقبة مزينة تنمو من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقها الجذعية متعاقبة اما العليا والحامية فصالية وهي لائقة ، تصلها بيضيه الشكل ، ساقه المنقصة ،



فراغية



فريون الاقسين



فريون الفجر

٢٠٥٧٧ - قَرْجِي، عَكَلِي، أَصْلِي

Congénital (F). Congenital (E).

نمت تمرقي رادف الصفة الوراثية حسنة كانت أو سيئة .

٢٠٥٧٨ - قَرْجَانَكَة، قَطْر الحَقْل

جس فلور بأكله من فصيلة الفاريقونات . أشهر أنواعه الفاريقون المري .

٢٠٥٧٩ - قَرْج

ولد الطائر هذا الأصل وقد استعمل في كل صغير من الحيوانات والنبات والاشجار فريضة وجم القلة افرخ وأفرخ والكثرة فراخ .

٢٠٥٨٠ - قَرْج، بِقَيْمَكَة، وَكَزَرَة، وَدَة، هَنْب

Rajet, Rajetan (F). مَوْش .

Young shoot, Sprout, Offshoot (E). الفرخ والنبلة وفركزة والركل والطبق والمروش قصبان تتشأ من براعم عرضية على موضع ما من ساق الشجرة ولا سبل الاروية المظفوة .

٢٠٥٨١ - قَرْج، Pärca (S). Pärche (F). Pärch (E).

جس اسمك من فصيلة القرشيات ورثة الطغيات الشاكتات الزعانف . أنواعه عديدة جميعها من اسمك المياه العذبة تعيش في الأنهر والبحيرات والأبواض . طولها يراوح بين ٢٥ و ٤٠ سم . ألوانها تختلف مع فصول السنة ، يكثر فيها اللون الأصفر المذهب يطوق بتجديد معروض اسم يحزم الطيور والايائل وينتهي عند البطن || أعرف أنواعه وأشهرها :

الفرخ المذبول

Perca fluviatilis (S). Perche

Commune (F). Common perch, European perch (E).

الفرخ الإيطالي

Perca italica (S). Perche d'Italie (F).

الفرخ التركستاني

Perca schrencki (S).

Perche du Turkestan (F).

الفرخ الكندي

Perca gracilis (S).

Perche du Canada (F).

٢٠٥٨٢ - قَرْج لَيْلِي

هو لاس الليل ، اطلبه .

٢٠٥٨٣ - قَرْج البَط

الذكر من صغير البط .

٢٠٥٨٤ - قَرْج النَحْل، فَرْخ النَحْل

Essaim d'abeilles (F). Bee-swarm (E).

ثول من النحل هجر غايته لتسير غليظة جديدة . والفرخ يتألف من ملكة وذكر وراملات .

٢٠٥٨٥ - قَرْجَة البَط

الانثى من صغير البط .

٢٠٥٨٦ - قَرْجَة خَصِيَة

فرخة تخصى وتسمن . وتلقى ايضاً مطبوعة .

٢٠٥٨٧ - قَرْجَة سُلْطَانِيَة

هي البرهان السلطاني ، اطلبه .

٢٠٥٨٥ - قَرْيُون لَيْسَرَس، قَرْيُون

مَنْصَلَب، حَبَّ المَلَكَة

Euphorbia lachryis (S). Euphorbe épurge, Epurge, Catapuce, Catharinece (F). Capen-epurge, Myrde spurge, Wild caper (E). Springwölmlich (D). Catapuzza, Euforbio latiride, Gomitaria (I).

نوع من الفريون وهو نبات ليلى يري حول يكثر في المراتع الرطبة ويصبر من النباتات الضارة || ساقه تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . أوراقه متطابقة متصالية رباعية ، نصلها سناني الشكل وحيد النسل . عادم القرون ، بحري اللون ، يطول من ٦ الى ١٢ سم . ويمرض نحو ٢ سم . انزهاره غشي الشكل ، وباهي الاطراف الفرقة ، يستمر من حزيران الى تموز .

٢٠٥٦٦ - قَرْيُون مَعْرُوسِي، شَعْرُوسِي، عَمَق

Euphorbia officinarum (S). Euphorbe officinale, E. des apothicaires, E. de juifs (F). Poisonous gumthistle (E). Gebräuchliche wolfmilch (D). Euforbio officinale, E. del speziale (I).

نوع من الفريون البري القبيح للممر . ساقه منتصب . عراحيبه منتفلة تطل نحو ٨ سم . لونها الى الخضار الباهت . حار خلوصها قرني للمادة غير اللون || صغاره غزيرة للمادة الجسالية الثالثة الاستعمال الطبي .

٢٠٥٦٧ - قَرْيُون مَدَلِي

Euphorbia pendula (S).

Euphorbe pendante (F).

نوع من الفريون السروي للممر . ساقه منتصبه فراء . فروه عراحيب اسطوانية دقيقة اسلية الشكل ، متدلية . نواميلها تطول نحو ٥ سم . أوراقه عراشف لحمية مظلة لؤلؤها ، بحرية الخضار ، متطابقة الاينكار .

٢٠٥٦٨ - قَرْيُونِيَّات، بِقَيْمِيَّات

Euphorbiaceae (S). Euphorbiacées (F).

Euphorbiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتين . أنواعها نحو ٣٥٠٠ تنتمي الى ٢١٠ اجناس . جميعها من النباتات السامة البنية الصغرة || اصطناعها البلاد الحارة . معظمها بري وذيبي وبعضها طبي وصناعي .

٢٠٥٦٩ - قَرْث، السَّرِجِين ما دام في كرش الحيوان .

٢٠٥٧٠ - قَرْج، لُغْر

Vulva (F). Vulva (E).

هو مجسمة الأعضاء التناسلية الخارجية في انثى الحيوان يشمل الشفرين والثرنية وبالطارة والكنية .

٢٠٥٧١ - قَرْج الأَرْض، هو سورنجان الجبل، اطلبه .

٢٠٥٧٢ - فَرْجَك

هو البركار ، اطلبه .

٢٠٥٧٣ - فَرْجَكُوي

En cerde (F). As cirde (E).

لعت تمرقي توصف به الخيلوط الدائرية .

٢٠٥٧٤ - فَرْجَكَة

أطب لخصه .

٢٠٥٧٥ - قَرْجَكَة

Panage (F). Grooming (E).

تنظيف جلد الحيوان بما عليه من اوساخ والقدار وفبار ...

٢٠٥٧٦ - فَرْجُون، مَيْحَكَة

Etrilla (F).

Curry-comb (E).

إداة من حديد تستعمل لتنظيف جلد الحيوان .



فريون ليسرس



فريون مدلي



فرخ

Individuallité (F). **فَرْدِيَّة ، شَخْصِيَّة**

Individuality (E).

جَماع الصفات التي يَتميز بها الفرد عن سائر المجموع .

Imparité (F). **فَرْدِيَّة ، وَتَرِيَّة**

Imparity (E).

كون الشيء عَلاً أو فَرْداً .

Troupeau de moutons (F). **فَرْد ، فَرْد**

Flock of sheep (E).

طَبع الفَرَس الكَثير المَند .

Ecrémage (F). Skimming (E). **فَرْد الكَفَاة**

فَرز الكَفَاة من الحَلِيب وَه يَمَ اما أَلِياً باستِعمال الفَرَاة واما طَبيعياً يَترك الحَلِيب يَفسد لِقوت لَظفر الكَفَاة تَفتش .

Graines de coton (F).

Cottonseed (E).

فَرْدُوع

حَب القُطن ؟ الواسِدة فَرُوة .

Interspécifique (F).

Interspecific (E).

فَرْدِي

فَرَس

نَبت رَقيق هو التَقسَاص والبَروق والمَجن .

Jument, Cavale (F). **فَرَس ، حُجُور**

Mare, Brood-mare (E).

أُنثى المَحصان .

Equus caballus (S).

Cheval (F). Horse (E).

فَرَس

الذَكَر والآنثى . ج. افراس . وجماعة الافراس تَدعى اَخيَل جَمها خَويل وواحدُها خَائل . والذَكَر في اَخيَل يَدعى مَحصان . ج. احصة ومَحصن والآنثى تَدعى حَجر . ج. حُجُور وحُجُور وسَحاب . وكنية الفَرَس اَبَر شِباع وَاَبَر طالِب وَاَبَر مَندُك وَاَبَر المَصار وَاَبَر النَسي وَاَبَر مَضي . والفَرَس حَيوان داجِن ووسَطي من فَصيلة الخَيليات ، ضَروبه وسَلالاته عَديدة تَختلف باختلاف اشكالها وشَفاة او ضَامة اجسامها وسَعة عَظُمها وبَلى نَشاطها الخ . اشهر ضَروبه وسَلالاته ما يَليخ .

فَرَس آري ، فَرَس اَسيَوي

Equus caballus aryanus, E. caballus asiaticus (S).

Cheval aryan (F). Aryan horse (E).

ضَرب من الخَيل الَارية او الَاسَوية . اصَرمه عَديدة اشهرها الرَربي والمَسيحي والقفَغازي .

Pégase (F). **فَرَس اعظم**

Pegasus, Flying horse (E).

الفَرَس الاعظم كَوكبة جَرم ضالِية المَيع لا تَبد كثيراً عن الذَب الا كَثير . مَركَها بَد كَوكبة ذات الكَربي || جَويها النَيرة والخالِفة عَديدة . والَرب تَسمي النَجم الذي على المَرة « مَرة الفَرَس » . ونَسي الَارية اَثرة اَني على المَرج « مَن الفَرَس » و« مَنك الفَرَس » و« هَت الفَرَس » و« جَناح الفَرَس » . ولَدي على جَبلته « اَنف الفَرَس » . وتَسمي الَائنين المَقتَدين « المَرقُوة » والَائنين اللَين في البَطن « النَائم » والكَربي « . والَائنين اللَين على الرَأس « سَد الهام » . والَائنين اللَين عَلى البَطن « سَد المَمام » . والَائنين المَختارَين بين اللَين في الصَور « سَد البارِج » . والَائنين اللَين على الرَكة البَين « سَد المَطر » .

Percidae (S). **فَرَسِيَّات**

Percidés (F). Percidæ (E).

فَصيلَة اسماك من الفَصيلات الشالَكَات الرَصاص . اجناسها وانواعها عَديدة ، اشهرها الفَرَس .

Farad **فَرْد**

وحدَة قَياسة كَهربائية .

Individu (F). Individual (E). **فَرْد**

كل شيء له وجود مستقل وبشكل نوعي معين وصفات خاصة تميزه عن غيره .

فَرْد

الفَرْد نَجم يَتر من كَوكبة جَماع اَني . مَركَزه في آثر المَعتق . وقد سَمي فَرْداً لِانفرادِه عن اَشباهه .

فَرْدُوع

Anaspis (S).

Anaspis (F). Anaspis (E).

جَنس حشرات من فَصيلة الفَرَدِيَّات وَرَبة عَظُميات الَاجِنَة . انواعها المَعرُوة عَديدة مَنتشرة في جَميع مَناطق البلاد الحارَة والمَعتدلة الحارَة || اجسامها صَغيرة ، عَفاء ، مَعتدلة التَخطيط ، طَولُها من ٣ الى ٥ م . رؤوسها صَغيرة ، قَليلة النُشُور ، عَيونها مَاصة . تأثيرها وبَلاستها نَظامية . فَرُونها الاستِشارية عَظيمة . كَواسلها مَعتيبة الشَكل . اَحادِها مَستَظيلة ، لاسَعة . قَواطعها نَشيطة . اَثولها ثنائية اللون || الحاشية الجَملانة واثمة رَمتها اَزار الحَلييات . البَرقَة خالِصة .

فَرْدُوسِيَّات

Anaspididae (S).

Anaspididae (F). Anaspididae (E).

فَصيلَة حشرات من عَظُميات الَاجِنَة . اجناسها وانواعها المَعرُوة كَثيرَة البَعد مَنتشرة في مَناطق البلاد المَعتدلة الحارَة || اجسامها صَغيرة اللَون ، مَستَظيلة الشَكل ، مَعتدلة التَخطيط ، طَولُها من ٣ الى ٧ م . رؤوسها صَغيرة ، قَليلة البَروز . عَيونها مَاصة . تأثيرها وبَلاستها نَظامية . فَرُونها الاستِشارية عَظيمة ، مَركَبة من ١١ فَصلة . كَواسلها نَصف دائَرية الشَكل ، اَحادِها لاسَعة . قَواطعها نَشيطة . اَراسِها رَباعية المَقل في التَزوج الخَلقي ، خالِصتها في التَزوجين الِامامي والواسط . اَثولها مَلوَنة || جَميعها خالِصة وواشعة . تَعيش خاصَة على اوراق اَزار الحَلييات || اشهر اجناسها الفَرْدُوسُ .

فَرْدُود

الفَرْدود كَواكب مَستَظلة خَلف اَريا .

Jardin (F). **فَرْدُوس**

هو البَستان ، الحَظيرة .

Parasitoidae (S). **فَرْدُوسِيَّات**

Parasitiens (F). Parasitoidae (E).

فَصيلَة من رَبة الجَواثم تَمثل طَيور الفَرْدوس .

Haploide (F). **فَرْدِي النَظَظ**

Haploid (E).

صَفة الحَبيرات الحَويائية والَخلايا النَباتية الرَسيمة المَنتَظ .



فَرْد

والسنتية بين الكواكب . وهو يبادل المسافة التي يجتازها النور لمدة ٣٢٥٠٠٠٠ سنة .

Perée (F). - ٢٠٦٢٥ - **فرسكوس**
كوكبة نجوم شمالية المقي تدعى سيوس .

Lieu, Parasange (F).
Leagus, Parasang (E).

الفرسخ وحدة قياسية مسافة لدعما كانت تساوي في الماضي نحو ٤٠٠٠ م. وتقادي الآن نحو ٥٠٢٥٠ م.

Parsec (F). **Parsec (E).** - ٢٠٦٢٢ - **فرسك فلكي**
الفرسخ الفلكي وحدة قياسية اصطلاحية تستعمل لقياس المسافات الفلكية . طولها نحو ٣,٢٥٦ سنة ضوئية .

Actinostemma (S).
Actinostemma (F). - ٢٠٦٢٣ - **فرسُع**
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرقيات . منها بعض مناطق الشرق . سوقها عارية ، جملتها مدرة . أوراقها كفية الشكل . أزهارها وحبها المسكن ، المشكبة منها عشقودية التجميع أما الملقية لفردية أو ضبية التجميع . ثمارها أصبغة الشكل ، ناعمة الطعم ، تستعمل كحلقات || لها نومان مخروطان .

Actinostemma paniculatum (S).
Actinostemma paniculé (F). - ٢٠٦٢٤ - **فرسُع عُنُقُونِي**
نوع من الفرس . ساقها عارية تطول نحو أربعة أمتار . أوراقها كفية خاسية القصص تطول نحو ١٠ سم وتعرض نحو ٧ سم . أزهارها عُنُقُونِي التجميع . أزهارها صفراء اللون . ثمارها أصبغة الشكل مائة تطول نحو ٧ سم .

Actinostemma lobatum (S).
Actinostemma lobé (F). - ٢٠٦٢٥ - **فرسُع مَحْصَص**
نوع من الفرس . ساقها عارية تطول نحو أربعة أمتار . أوراقها كفية ثلاثية أو خاسية القصص تطول من ٦ إلى ١٢ سم . وتعرض من ٤ إلى ٨ سم . تصالها خلية المروق على الصلصتين . ثمارها أصبغة الشكل ، صغيرة القدة ، تطول من ٣ إلى ٤ سم . وتعرض من ١٥ إلى ٢٠ سم .

Pécher (F). - ٢٠٦٢٦ - **فرسك**
هو الفرائس ، الطلح .

٢٠٦٢٧ - فرسين
الفرسين : طرف خف البعير وللشاة . ج فراسن .

٢٠٦٢٨ - قرش هو الشفنين الصجور ، اطلح .

٢٠٦٢٩ - قرش الصبغ هو الشبلة الخشة ، اطلحها .

٢٠٦٣٠ - فرشاح
الأرض الواسعة العريضة وقيل السحاب الذي لا مطر فيه .

٢٠٦٣١ - فرشة
Litière (F).
Stable-litter, Straw (E).
فراش من حشيش أو قش أو تبن وغيرها من المواد النباتية يفرش تحت الدواب في الاستبلات لراحة عليه .

٢٠٦٣١ - فرس البحر ، **فرس النهر** ، **بريق**
Hippopotamus (S).
Hippopotame (F). **Hippopotamus (E).**

جنس حيوانات لبونة من ذوات الحوافر عطيفة القدة ، سفيفة الجلد ، ليس في جسمها شيء يشبه الفرس . رأسها وتوابعها مشبه الغنظة والكب . جسمها بالغ النضامة ، عنقها وقوائمها وذنبها قصيرة || مهنها البلاد الإفريقية الحارة . تعيش في مياه الأنهار وتل سفانها . قنأ الاعشاب .

٢٠٦٣١ - فرس السباق الانكليزي
Pur sang anglais (F). **English blood-horse (E).**
هو الفرس الانكليزي الاصيل يعتبر أجود سلالات خيول السباق .

٢٠٦٣١ - فرس المغرب
Cheval berbe (F).
African horse (E).
مصر من الجياد القوية الشبقة . مهنها بلاد المغرب . يقال أنها سلالات مختلفة نتجت من تصالب الخيول العرب مع خيول المغرب الاصلية وذلك على اثر الفتح العربي .

٢٠٦٣٢ - فرس القوي
Mante religieuse (F).
هي السروقة ، اطلحها .

٢٠٦٣٣ - فرس السباق اصيل ، **فرس السباق الانكليزي**
Pur sang anglais (F).
English blood-horse (E).

الفرس الانكليزي الاصيل أو الخقيق أو الكرم هو اسبق الخيل كلفة . نشأ من اب عربي وأم انكليزية وأصبح صرعاً صريعاً معروفاً له كتب انسابه المفضية وله شهرة عالمية التي تقني عن كل تعريف .

٢٠٦٣٤ - فرس بوني ، **بوني**
Poney, Ponet (F).
Pony (E).
نعت تعريفي يطلق على كل جياد صغير القدة خفيف الوزن .

٢٠٦٣٥ - فرس محتاب
Cheval trotteur (F).
Trotter horse (E).
كل فرس ركض الخيب . والخيول الحيازة سلالات تميزت بهذا النوع من البعير السريع الخاص .

٢٠٦٣٦ - فرس صغير
Petit cheval (F).
Equuleus (E).

الفرس الصغير كوكبة نجوم شمالية المقي مشهورة باسم قطرة الفرس ، اطلحها .

٢٠٦٣٧ - فرس عربي اصيل
Pur sang arabe (F). **Arabian blood-horse (E).**
هو الفرس العربي الخقيق الكرم وهو اصيل الخيل واجلها واسلمها الركوب || سلالاته المشهورة عديدة اشخاص كحيالات الصجور والمقلديات وأم عرب وباشريات والنبات والمعتيات وهذه ابيات والمجلف .

٢٠٦٣٨ - فرساح
الفرساح : الأرض العريضة الواسعة . ج فراسح .

٢٠٦٣٩ - فرساح
Mégaparsec (F).
Megaparsec (E).
الفرساح وحدة قياسية تستعمل في تحديده الأبعاد الفضائية



فرس البحر



فرس عربي اصيل

انتار. هيكلها هيكل الدار. اوراقها مدقة مستطيلة الزناد تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٣. نصلها اعليها الشكل، ذلق الزنم الانخير || ازهارها وردية او غريزة اللون. حناقيها لبدة قريية من الاستدارة. ازهارها يستمر من ايار الى آب.

Noyaux de basamés (F).
الفرص : نوى اللؤلؤ .
Stone of bdellium tree (E).

٢٠٦٤٥ - **فَرْصَاخ كَثِير الزَّهَر** (F).
Haken florida (S).
Vaubier multiflore (F).
نوع من الفرصاخ وهو جنية تربية سرورية تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها صغيرة خفيفة. نصلها عادم العروق. مسن الحافة، مدبب المقصبة || ازهارها صغيرة عطرية القوي، بيضاء اللون. حناقيها كثيرة المدد، متوصقة الحجم || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

Mürir (F).
فَرْصَاد
هو الثوت ، المطب .

Müriforme (F).
نمت وصني تعرف به الاشكال الشجيرة شاميل الثوت .

Pépin de raisin (F).
٢٠٦٤٥ - **فَرْصِيد** ، **فَرْصِيد**
Grape-stone (E).
الفرصيد والفرصيد : حجم المنب والفرصيد .

٢٠٦٤٦ - **فَرْصِيدِي** ٥
Acineux (F).
Acinose, Acinouse (E).
ما كان شكله شكل الفرصيد .

٢٠٦٤٦ - **فَرْصَاخ مُهَدَّب** (S).
Haken acicularis (S).
Vaubier à aiguilles (F).
نوع من الفرصاخ وهو جنية تربية سرورية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها خفيفة خضرة المسفة السفل، شاذلة المقصبة المدنية || ازهارها خراة اللون، عطرية التجميع . ثمارها جرابية عحمدية ، ثنائية التلويس الطرية. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

Arbres à pépins (F).
٢٠٦٤٧ - **فَرْصِيدِيَات**
Stone-trees (E).
هي الاشجار الفرصيدية البذور كالكروية والشلح والاجاس والفرجل الخ...

٢٠٦٤٨ - **فَرْصُوسِي** ٥
Acinélique (F). Acinetic (E).
نمت تمريني يظل كل ما يقف حركة القلب. النجيتال الانبواني نبات فرسي.

٢٠٦٤٩ - **فَرْصُوس** الفرص : ثمر اللوم ما دام احر.

٢٠٦٤٩ - **فَرْصُوس الصَّبِيحَة**
Imposition
هو اتباع نظام تقني لاجل تقدير الاموال وما يكتبها ان تحصل من الضرائب .

٢٠٦٤١ - **فَرْصَاخ** (F).
Haken (S). Vaubier (F).
جس اشجار وجنات برية وزراعية تربية من نصيلة اللصيات ، اقلها عديمة ، اقلها اقليم الزيتون. سيقا فرما . اوراقها متعالية ، جلدية النصل . ازهارها صغيرة لقة ، عطرية التجميع ، بشارنة الاسدية المنحرفة. اشهر اقلها ما يتبع .

٢٠٦٤٢ - **فَرْصَاخ صَفْصَافِي لَوْرِي**
Haken saligna (S). Vaubier à feuilles de saule (F).
نوع من الفرصاخ وهو جنية تربية سرورية تملو من ٢٥٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها وحيدة النصل ، عادمة العروق تطول من ١٠ الى ١٢ سم. وتعرض من ١ الى ٢ نصلها مائل البيرة ، بحري اللون ، ابري المقصبة || ازهارها خراة اللون مقنودية التجميع ، صورية الايزكان || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

٢٠٦٤٣ - **فَرْصَاخ عَطِير** (F).
Haken suaveolens (S).
Vaubier à odeur suave (F).
نوع من الفرصاخ ، وهو جنية تربية سرورية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. فرونها خلية اللحاء ، فضية اللون. اوراقها مفترسة ، غيبطية التفرج ، نصلها جامد التجميع ، شاذل الاطراف المدنية || ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة اللدة ، فواحة العرف الطري || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٠٦٤٤ - **فَرْصَاخ عَظَاي**
Haken laurina (S).
Vaubier laurier (F).
نوع من الفرصاخ وهو شجرة تربية تملو من ٤ الى ١٥

٢٠٦٤٧ - **فَرْصُغ الشَّوْطِي** ٥
Garryus littoralis (S).
Garrye des rivages (F). Garryus (E).
دوية من الفرصاخ تنتمي الى فصيلة الكرنشيات وربة المقربيات الكاذبة . جسمها صغير اقله يطول من ٥ الى ٧ مم. ثوبا الى الرتبة العلواء . صدولها موزاني الشكل ، مطوية تحته احر . مقنباها مستطيلان يمتدبان بمقلطين كلفاط المقارب لوتها الى السرة . يطها اعليها الشكل مقنوم الطول ، عادم اللذب ، واضح التقسيم السلمي . حناها مركبتان ، صغيرتان . جرابها دقيقة ، سيدة الملب . الذكر اصغر قدما من الانثى || تألف الشواطىء البحرية . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات الصغيرة والحوام . قمر نحو خمس سنوات || تنشر من الدويبات الثامنة الاموية .

٢٠٦٤٨ - **فَرْصُغ**
الشاة الفارسي اي للينة وقيل المكسورة القرنين .

٢٠٦٤٩ - **فَرْصِي**
Hypothétique (F).
Hypothetic (E).

٢٠٦٥٠ - **فَرْطُ** ، **فَرْطُش** (F).
Gaulage (F). Beating (E).
جني الثار بواسطة الفرب بالصا وهي بكر وكثر استعمالا في التريون والجوز واللوز . وهي مفرقة لانها تحش وتطبل الثار وتحت الارواق وتكرس الانثان وقد توكي الاغصان .

٢٠٦٥١ - **فَرْطُ التَّطَوُّر** (F).
Hypermétamorphose (F).
Hypermetamorphosis (E).

٢٠٦٥٢ - **فَرْطُ التَّطَوُّل** (F).
Blano-estec (F).
هو نعل الشجر الحربي بارساف .

٢٠٦٥٣ - **فَرْطُوس**
Pénis de l'éléphant et du porc (F). Penis of the elephant and pig (E).
هو تقليب القليل والخزير .



فرغ الشواطىء

Phryganidae (S). * فَرْطُوسِيَّات ٢٠٦٦٤

Phryganidés (F). Phryganoides (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة. اجناسها واولادها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة. تعيش قرب مجاري الماء || اجسامها لاقامية الشكل والخضراء، طولها من ٢ الى ٦ سم. اولادها مزركفة || اشهر اجناسها الفرفون.

٢٠٦٦٥ - فَرْقَار

شجر صبور على النار تنطفئ منه السماس والقصاص.

٢٠٦٦٦ - فَرْقَارَة ، دِيك الرِيح (F). Girouette

هي الدرة جهاز يدل على جهة مهب الريح.

Tussilage (F).

٢٠٦٦٧ - فَرْقَارَة

هي حشيشة السعال. اطليه.

Pourprie (F).

٢٠٦٦٨ - فَرْقَحِين

هو القطة الحقة، اطليه.

٢٠٦٦٩ - فَرْقَح * ، فَرْقَحَة ، حَشِيصَة

Euphorbia papius (S). Euphorbe des vignes, Eaulé (F). Wild purslane, Purple spurge (E). Gartenwolfsmilch (D). Euforbio delle vite, Calenzuola piccola, Papilo (I).

نوع من الفربيون وهو نبات حشيش بري طيب سمر. يرغب في الاراضي الملتصقة وفي الآخرة الرملية. يكثر في الكروم وعلى جوانب الطرقات. ساقه فروع تملو من ٥ الى ١٠٠ سم. عصارته لينة، لزجة، يصفاء اللون، حريفة، لاذقة، تستعمل في القضاء على التآكل. اوواله متناقبة، رديئة الشكل، صغيرة القند، مذبة المصعة. ازهاره عثكولية التجميع وردية اللون.

Poule d'eau (F).

٢٠٦٧٠ - فَرْفَر

هو برهان فرفور. اطليه.

Guttier (F).

٢٠٦٧١ - فَرْفَرَان

هو الجندب الحدي، اطليه.

٢٠٦٧٢ - فَرْفُور

هو الميراث الزياء، اطليه.

٢٠٦٧٣ - فَرْفُورَة * ، فَرْفُورَا (S). Purpura

Pourprie (F). Purpura (E).

جنس اصداف بحرية كثير الانواع جميعها متشابهة الاشكال متباينة الاحجام يستخرج منها الابرون. احطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة يكثر ويوجد في المتوسط.

Mulle brun (F).

٢٠٦٧٤ - فَرْفُورَة

سكة بحرية تدعى طرستج اسمر، اطليه.

Delta Céphée, Alfirk (F).

٢٠٦٧٥ - فَرْق

الفريق نجم من كوكبة قيفاوس يدعى أيضاً «دلتا قيفاوس» وهو من النجوم النابضة للاستسفرة البويع. يبدو ان حجمه ينفق حسب الشمس نحو عشرة آلاف مرة.

Dichotome (F).

٢٠٦٧٦ - فَرْقِي

Dichotomous (E).

نمت وصي يستعمل دلالة على الفرق المزدوجة والانصاف والافاندا ؛ تقول ساق فرقة وفن فرق .

Groin (F).

٢٠٦٥٤ - فَرْطُوسَة ، فَرْطُوسَة

Snout (E).

هو عظم الخنزير ويسمى بالفتلية .

Sparassie (S).

٢٠٦٥٥ - فَرْطُوسِي

جنس ضرور من فصيلة الدبوسيات . انواعه قليلة تتميز بقصر وفلاظة سمها ، يصفخانة نكمتها القارضة الخدعة التي يبلغ طولها نحو ٤٠ سم. ويصنعيها للترابك الموج. لوها الى العيان التي ونها الى الصفرة ، لحينها يصفاء القطع خافتة اللون || تركيب جلوه الضنور قشيب عن الحب وانغراف لونه نحو الجوزة المابقة ثم انقراض وانحطت الحواجز الخلووية التي تنتهي دقيقة كالليبار .

Branch (F).

٢٠٦٥٦ - فَرْع

Branch, Bough, Limb (E).

كل ضمن غلط وحل انصافاً حلت اقنفاً .

٢٠٦٥٧ - فَرْع ، عَكَب ، سَكِيل

Descendant (F). Descending (E).

هو كل من ولد من اصل في حبل القشب للنسور. الاولاد هم القروم والاباء هم الاصول .

٢٠٦٥٨ - فَرْعَة * ، قَمَلَة الرَأْس

Pediculus capitis (S). Pou de tête (F). Louse (E).

حشرة من الفريجات ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ م. تركيب الرأس . مكها يلى عشان وهو ابيض اللون تنحه الاثني على الشعر فينتفخ بعد ستة او سبعة ايام . والفرد تعيش نحو ٧ اسابيع وتبيض نحو ٣٠٠ مكته .

٢٠٦٥٩ - فَرْعَل * (F). Young hyena (E).

صغير الفصح ويدعى بهذا ؛ والاثنى فرملة . ج فرامل وفراملعة .

Pediculidae (S).

٢٠٦٦٠ - فَرْعِيَّات

Pédiculidés (F). Pediculidae (E).

فصيلة من الطفليات ، اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة لينة مغلطلة الجسم المبطط ، صغيرة الرأس ، كبيرة المويينات ، ثوبها الى الطلعة المابقة || اشهر اجناسها الفرعة والقمة والبطورع .

٢٠٦٦١ - فَرْعِ أَوَّل

الفَرْع الاول او فَرْع الدلو المقدم منزل من منازل القمر الثانية . فَرْع اربعة كوكب ، اثنتان منها هما الفَرْع الاول ، واثنان الفَرْع الاخر || وقب الفَرْع الاول يدعى الفَرْعَة .

٢٠٦٦٢ - فَرْعِ ثَان

الفَرْع الثاني او فَرْع الدلو المؤخر منزل من منازل القمر الثانية . وما لقطر المؤخر من الدلو || وقب الفَرْع الثاني يدعى الدلو .

Phryganea (S).

٢٠٦٦٣ - فَرْغُون * ، فَرْغُونِي

Phrigane, Phrygane (F). Phryganea (E).

جنس حشرات من فصيلة الفرفونيات ورتبة جملونيات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد . المعتدلة الحارة والحارة || حشرات الجملانة تعيش على اليابسة . اساريها تعيش في الماء ملتحفة بجلايين متباينة الاشكال مصنوعة بالريال وسحات الاصداق وقعات المواد الخشبية وغيرها .



فرمة



فرفون



فرف



فرفورة (صدفة)

٢٠٦٧٧ - **فَرْقَى** (F). Purgative flux (E).
هو الكتان المسهل .

٢٠٦٧٨ - **فَرْقَى النحل** ، **فَرْقَى النحل**
Essaim d'abeilles (F). Bee-Swarm (E).
ثيل من النحل هجر خليته لتسير علياً جديدة .

٢٠٦٧٩ - **فَرْقَاء**
في الشاة والتمز البعيدة ما بين العينين .

٢٠٦٨٠ - **فَرْقَد**
الفرقة نجم من كوكبة قنذوس قريب من القطب الشمالي
يمتدح به . وما فرقدان .

٢٠٦٨١ - **فَرْقَد**
الفرقد : ولد البقرة وقيل ولد البقرة الوحشية . والفرقد
كلك .

٢٠٦٨٢ - **فَرْقَلَع لَوْزٌ** *
Agyrrnus notodonta (S).
فرع لوز هو الاسم المصري لشجرة من الساليويات كثيرة
القد ، طولها نحو ٤٠ سم . فربما الى الحظي الاسمر .
زبانها متصلة الطويل ، متشاربة الشكل . اوراقها
خلفية المثل في رقاتها سلكية الجسم ، مستطيلة ، صفراء
اللون ، تعيش على جذور النباتات وقد تركب البطاطا .
اغصانها زينة لا تستوي المكافحة .

٢٠٦٨٣ - **فَرْقَلَعَة** (F). Dichomyia (E).
الفرقية ، في علم النبات ، طريقة انقسام جزلي مفرق .
وفي علم الفلك ، حالة القمر عندما يكون نصفه فقط
مضاء .

٢٠٦٨٤ - **فَرْقَلَع**
الفرق هو المتفرق تشبه من الجسم وما اشبه . يقال لوز
فرق وجوز فرق ...

٢٠٦٨٥ - **فَرْقَلَع**
Baobab acuminé (F).
هو البوباب الزنقة ، اطبخا .

٢٠٦٨٦ - **فَرْقَلَعَة**
Virachola livia (S).
شجرة من الحرف ، ديدانها تركب القروان . اطبخ حرض
الربان .

٢٠٦٨٧ - **فَرْقَلَعَة** *
Froloids (S).
Froloids (F). Froloids (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الارجل
ضمنية القريات . انوارها المعروفة قليلة المدد متشعبة
في بحار البلاد المعتدلة الحرارة - اجسامها صغيرة شبه
اطليجية الشوزن ، حلابة المادة ، شفافة ، صامدة
الاصداف ، قليلة النفاخات المبهمة مع سائر الاشياء في
جراب صغير مركزه تحت البطن .

٢٠٦٨٨ - **فَرْقَلَعَة مُرْبَعَة** *
Vertulia quadrata (S).
Vertulæ carré (F).

شجرة غاصلة من فصيلة الكورسيات ورتبة عثقات
الاجنحة . جسمها معتدل التطيط ، مربع البطن ، يطلي
نحو ١٢ سم . ثوبها الى الحظي المنصب الموج . رأسها
شبه مربع الشكل . عظامها مستطيلة . انوارها ناشز . عيناها
صغيرتان ، بارزتان . زبانها مستطيلات ، اسودا الطرف .

الفصحة السفل من بطنها تيرة اللون . فوائدها مستطيلة
الانضاد والفتايب || مرقتها اشباب البراري والحراج .

٢٠٦٨٩ - **قَرْم** ، **قَرْمَة**
Hachage (F).
Chopping (E).
هو قطع او تجزئة البلف الطويل او الكثير الحجم قبل
تقديمه الى اللشاة .

٢٠٦٩٠ - **قَرْمَل** ، **قَرْمَلَة** ، **قَرْمَلَة**
Frein (F). Braka (E).
اداة الكبح . اشكالها عديدة وظلقة أعما اشدائها واحدة .
ج فرامل .

٢٠٦٩١ - **قَرْمَلْدِيد** ، **قَرْمَلْدِيد**
Formaldéhyde (F). Formalde-
hyde (E).
اطلب فورميد .

٢٠٦٩٢ - **قَرْمَلِين** ، **قَرْمَلِين**
Formaline (F).
Formalin (E).
اطلب فورمالين .

٢٠٦٩٣ - **قَرْمُول**
Formol
هو الفورمول ، اطبخه .

٢٠٦٩٤ - **قَرْمُولِيم** (F). Phormium (S).
Phormium (S).
جنس نباتات عشوية مسمرة من فصيلة الزنبقيات . انواره
قليلة مغطاه بري . اوراقها قرصية الاكشاف ، ثنائية
الترتيب ، مستطيلة الجرم . نصلها خطي الصفحة ، جامد
اللسج البني التركيب . انوارها كبيرة القند عشوية
التبصير ترتكز على شراخض منقصب غليظ || احرف انواره
واشهرها سالي .

٢٠٦٩٥ - **قَرْمُولِيم كُوك**
Phormium cookianum (S).
Phormium de Cook (F).
نوع من القرموليم الزنبقي . اوراقه تطول من ٦٠ الى
١٠٠ سم . نصلها قدي الشكل ، بارز الحد ، جامد
الصفحة ، اخضر اللون ، احمر الكظر . شراخض يعلو
من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . انوارها كبيرة القند منقصب ، لونها
الى الصفرة يعلوها موج اخضر || انوارها يستمر طوال
فصل الصيف .

٢٠٦٩٦ - **قَرْمُولِيم مُتَصَلِب** * ، **قَرْمُولِيم مُتَصَلِب**
Phormium tenax (S).
Phormium tenax (F).
نوع من القرموليم الزراعي الصناعي . يزرع لاوراقه
الليفية الشائكة الاستعمال في حق الصناعات النسيجية .
اوراقه جامدة متصل تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .
وتنمض من ٤ الى ٦ نصلها اخضر اللون اسمر الموج
يعلو على كامل امتطالته كظر احمر . شراخض الزمري
يعلو من ٣ الى ٤ امتار . انوارها كبيرة القند منقصب صفراء
اللون او حمره .

٢٠٦٩٧ - **قَرْوَن**
Four (F).
Oven, Bakehouse, Kiln (E).
بناء خاص بخلف الاشكال والاصجام ويولد البناء والخبز
يستعمل في تدبير الحرارة اللازمة لتقادم بعض الاعمال
الصناعية .



فرع لوز



فرودة



قرموليم متصلب

Basilic sauvage (F). **٢٠٧٠٢ - قَرْجَمَشْك**

هو الريحان البري ، اطلبه .

Rose rouge (F). Red rose (E). ۲۰۷۰۴ - فرند

الفرند : الورد الاحمر وينمى الحوجم . والفرند هو ايضاً حب الرمان .

Lagerstroemia (S). * ۲۰۷۰۵ - فرنداد *

Lagerströmia (F). شجرة زينة من فصيلة الحنائيات . مهدا الحنف . ساقها منتصبه فروع تملو من ٨ أمتار . اوراقها لاطه ، متقابله ، بيضيه ؛ تصلها مزغب البشره يطول نحو ٧ سم . ويمرض س . م . ازهارها شكلية التجميع ، تاجية الازكاز ، مسطيله الشكل ، حمده الثلاث ، وردية اللون . ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

Lythrum (5). Salicaire (F). ۲۰۷۰۶ - قرندى

Loosestrife (E), Blutweiderich (D), Salicaria (I).
 جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخنائيات. أنواعه
 عديدة معظمها بري وبعدها ترابي. سيقانها ليفية
 أو خشبية. أوراقها لا تقياسه الارتكاز منها المتعاقبة
 والمتناوبة والقصبة. أزهارها لا نظامية التجميع لل
 أنواعه وأشهرها مايل.

۲۰۷۰۷ - فونڈ کی طرف

Lythrum graefferi, *L. meonanthum* (S). Salicaire de Graeff (F).
نوع من القرنفل التركيبي. ساقه فراء تعلو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. أوراقه السفلى متقابلة والعلوية متعاقبة ؛ نصلها مائل البشرة ؛ صغير القند ، يطول نحو ٢ م. ٢٠. ويمرض غالباً من أجزائه بحموية الزنكاكاز ، فريدة التجميع ، بتفسيحية اللون. أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول.

٢٠٧٠٨ - قەندەس مەدۇل *

Lythrum salicaria (S). Salicaire commune, Lysimachie rouge (F). Purple loosestrife, Willow weed (E). Purpur-Welderich (D). Salicaria comune, Lisimachia rossa, Verga rossa (I).

وتنصق، تعلم من هو العدو ومن هو الأصدقاء، قلعة القاعدة

تطول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٣. فصلها خلى البشرة على صفحتيه. أزهاره سنبلية التجميع ، هامة الارتكاز، سدلية البتلات، لونها الى الحمرة القرمزية || أزهاره يستمر من تموز الى ايلول .

۲۰۷۰۹ - قرکندک مجتنب

نوع من القزقند التركيبي. ساقه فروعاً تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. فروعه دقيقة مضلمة. اوراقه ثنائية القاعدة. تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ١ سم؛ ازهاره ارجوانية اللون. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

Furnarius (S). ၁၀၀၀၀, ၁၀၀၀၀-၂၀၇၇၇

Journal (F), Oven-bird (E).

الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي يدل على كنية الطائر المماثل إلى آلة الفرنجة بالفرن في يشيخه في زمن التصريق

يبيض فيه ٥ واكثر طائر من فصيلة الفرنجيات.

يموت بعض منافع امريكة الصطي والارانب في يانف

الغابات الامريكة الاصحار واصعبا والارانب في جسمه

الغابات القدي طيلو نحو ١٨ سم. ثوبه الى القشرة الخشبية

التي لا تخلف عن لون التربة. زوره ايض. متقاد

جالس. مستعد الطوف. حذقة في جعل حبيته اقل. جناحه

متساو الطول. حذقة في حذقة. ريشه سمراء اقل في

جميع انواع الحشرات واصعبا التبل. يصي على الارض

بريقا ويستعمل السيف البرية المختلفة الاجسام. وكنه

كافرن المستدير المزبور. يدخلها من الجيوب. يشيها

بالطين الفرج. الساف ثلر الساف. في غمن اقل

الاعتداد. الذكر والاثنى يتفكران في العمل. اما طلي

الوكنة من الدالاح نحو ٢٥ سم. وعرضها نحو ١٥ سم.

وتضعها نحو ١٧ سم. في ارفع ارفع

ويطناها بالحشيش التام والريش والرفف. الاثنى تضع

في ٣ ال. ويضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو اسبوعين.

Furnacidae (5). ۲۰۶۹۹ - فُرْنَارِيَّات ۵

فurnaridae (F). Furnariidae (E).
 ضئيلة من الجوارث لاقتل وبقيات الناجين.
 أنجاسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد
 أمريكا الجنوبية وأستراليا | أنجاسها صعبة أو متوسطة
 اللد. منقبيها جالسة قوية، طويلة يماثل طول الرأس.
 اجنحتها متوسطة الطول، أطول قوائمها الثالثة. أذنائها
 قصيرة، وفمها قليلة الصلابة شبه مثدلة. أرسافها رقيقة.
 أصابعها قوية ترم من منقبتها للفرار على الأرض | أرف
 أنواها وأشعرها القردان والجرار والسنين.

Elomys (5). ۲۰۷۰۰ - فرتب

جنس حيوانات لينة قاسية من فصيلة القروديات. أنواعه قليلة، موطنها العالم القديم. تتميز بروسها الاسفينية واذاها الكبيرة واذنانها الاسطوانية الدقيقة الثنائية اللون. قشها الجار وبعض الحشرات. يبلها الثشري، يلوم نحو ٩ أشهر.

٢٠٧٠١ - فرٲٲب شالٲم * ، قراب

ملحوم (F). *Quemond dormouse*, *Garden dormouse* (E).
 مرقع من القزرب، طول ١٤ سم، وذيله ١٠، وأرجله
 وظهوره وذيله أبيض اللون المصفر. صدره وظهره وصدرته
 وذيله أبيض. خمار عيني وأذني ونبج على
 الجانبين أبيض. موطنه غابات مناطق الشرق الأوسط
 وأوروبا والريفية. تألفت الإضافة والحالة من
 يسكن التجمهر والجفردان معيشة عشية. قبة التزاوج على
 اختلاف اتجاهها. يدخل البيوت المأهولة فيجب التنبه
 والحيلولة والحيلولة والبيض في أواخر
 الصيف. أنثاه تضع من ٤ إلى ٦ حبات تبصر وتكتمل
 بعد أسبوعين كل حبة وزنها ١٠ أسابيع.

Basilic velu (F). ٢٠٧٠٢ - فَرْجَمَشْك

هو الحقيق الورى ، اطلب .



فرقہ



ایرپ شاتم



رنداد



روڈی میٹری

الإرتكاز، سداسية التيلات، لونها ال الحرة النفسجية .
أزهاره يستمر من حزيران ال ايلول .

٢٠٧٢٢ - فُرُوجِيَّة

Poulette (F).

Young hen, Pullet (E).

أيّ الفروج وهي الفتية من النسلج .

٢٠٧١١ - فُرُتْسَع الأَرَب *

Haemodipus ventricosus (S). Pou du lapin (F).
Louse of rabbit (E)حشرة صغيرة من الفرتنيات ، طولها يراوح من ملليمتر
ال ملليمترين ، جسمها اغبر اللون ، يضيء الشكل مفلطح .
تركب الارلب وتزيد .

٢٠٧٢٤ - فُرُوع

Orion

الفروع كوكبة نجوم تدعى الجبار او الجوزاء .

٢٠٧١٢ - فُرُتْسَع البَقَر * ، دَبَا البَقَر

Haemastopinus erythrocephala (S). Grand pou du
boeuf (F). Big louse of ox (E).حشرة من الفرتنيات . طولها نحو ٦ سم . جسمها اكعب
البن ، احليجي الشكل عذب الظهر || تركب الابقار
وتؤذيها .

٢٠٧١٣ - فُرُتْسَع الجُرَد * ، دَبَا الجُرَد

Polyphax spinulosa (S). Pou des rats (F). Louse of rats (E).

حشرة صغيرة من الفرتنيات ، طولها نحو ١ سم . لونها
ال الربة الغبراء || تركب الجرذ والقار .

٢٠٧١٤ - فُرُتْسَع الحَمِير * ، دَبَا الحَمِير

Haemastopinus asinus (S). Pou de l'âne (F). Louse of
ass (E).حشرة صغيرة من الفرتنيات ، طولها نحو ٤ سم . جسمها
يضيء الشكل ، غمر اللون || تركب الحمير والبقال
والخيل .

٢٠٧١٥ - فُرُتْسَع الخنزير * ، دَبَا الخنزير

Haemastopinus suis (S). Pou du porc (F). Louse of
swine (E).حشرة صغيرة من الفرتنيات ، طولها نحو ٥ سم . جسمها
مبط الشكل ، اغبر اللون ، رأسها عرطوي مستطيل ،
قرونها الاستعمارية خاسية العقل . حلها دقيق وصغير .
تركب الخنزير وتؤذيها .

٢٠٧١٦ - فُرُتْسَعِيَّات

Haemastopinidae (S).

Haemastopinidae (F). Haemastopinidae (E).

فصيلة حشرات جليية من المغمقيات . اجناسها نحو ٢٠
جميعها صغيرة الجسم ، مفلطحة الشكل ، مبطقة ، كثيرة
الغلب . قرونها الاستعمارية ثلاثية او خلية البطن .
مقاييل اوساها حادة وقوية || تركب الحيوانات اللبونة
والقائمة . أشهر اجناسها القرقن وين اناولها فروع
البقر والحامير والافان والحنزير .

٢٠٧١٧ - فُرُتْسَعِيَّة

Haemastopinus (S).

Haemastopinus (F). Haemastopinus (E).

هو الشفنين المعروف ، اطلبه .

٢٠٧١٨ - فُرُتْسَعِيَّة

Vernonia (F).

Vernonia (F).

هي السرفل ، اطلبه .

٢٠٧١٩ - فُرُتْسَعِيَّة

Fournure (F). Fur (E).

Fournure (F). Fur (E).

الفردود ولد الوعل . نج فراheid . ومن من قال القراheid :
صدار الغنم .

٢٠٧٢٠ - فُرُوج ، فُرُوجِيَّة

Fournure (F). Fur (E).

كل جلد يذرى به . ج فراه .

٢٠٧٢١ - فُرُوج

Poulet (F). Chicken (E).

Poulet (F). Chicken (E).

القي من اللداج . ج فراريج .



فروع الارلب



فروع البقر



فروع الحمير



فروع الخنزير



فرويلة حشوية



فريدِي شائع



فريدِي مُسْتَج

٢٠٧٢٣ - فُرُوج حَشَوِيَّة

Branches charpentières (F). Carpenter branches (E).

يسمى من دعاما فروع شجرية . هي الفروع الخشبية التي
تعمل للاغصان ويتألف منها هيكل الشجرة الرئيسي .

٢٠٧٢٤ - فُرُوج

Orion

الفروع كوكبة نجوم تدعى الجبار او الجوزاء .

٢٠٧٢٥ - فُرُوجِيَّة عُسْكَوِيَّة * ، دَبَا عُسْكَوِيَّة

Erwinia asotidea (S). Maladie de la jambe noire (F).
Black leg (E).وصم تشبه بكتيريته من الكرويات . يصير أنواع كثيرة
من النبات اصعبا التبع واللثوف والجذر والبطاطا الخ ...
تخارو شديد الرفع مع الفتح يركب الساق فيسم بعض
اقسامها به ان يسحب لموداعها ولها وقد يمتد الى السنتج
والجذور فيبدو كيقم مسطحة متشابها سواء اللون تحوها
حالات صم تقضي حل اغشية الساق ثم تحبس السنتج وتلتفها .
الجروح والحامض ولا تقتك الا في ظروف متناعية معينة
اغصبا الرطوبية المستمرة وكثرة الفومر او قلة الفصح .
اما انتقاله من القرية الى النبات فيم بواسطة الاوراق
والخيل التي تلتاس القرية .

٢٠٧٢٦ - فُرُوجِيَّة

Achéroline (F).

Achéroline (F).

٢٠٧٢٧ - فُرُوجِيَّة

Achéroline (F).

هي القولة من الاسماك الصغيرة النقيقة ، اطلبها .

٢٠٧٢٨ - فُرُوجِيَّة

Fritillaire (F).

هي المرار نبات من الزليقيات ، اطلبه .

٢٠٧٢٩ - فُرُوجِيَّة

Pagellus (S). Pagel, Pagelle, Pageau, Pageul (F).

Bratze, Red porgy (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبرويات ودية شالكاك
الزئافن . انزاهه سمكة ، اصحابها مياه المناطق الحارة
والمعتدلة . سكة منها تعيش في المتوسط . اجسامها احليجية
والشكل طوليا يراوح من ٢٠ الى ٧٥ سم . ورونها كبيرة
القد . زئافنها الظهرية مسطحة شالكة . انزاهه كبيرة
الحسرة المجرانية تزود وتسير وتعيش بالقي والاصفر
والخيطي والاسمر . جميعها مأكلة للذية الطعم . امرها
واشهرها الفريدِي الشائع .

٢٠٧٣٠ - فُرُوجِيَّة

Pagellus erythrinus (S). Pagel commun (F). Common
bratze (E).نوع من الفريدِي كبير القد ، مرجاني الثوب ، طوله
يراوح ، عند اكباله وبلوغه الاربع سنوات ، ٦٠
الى ٧٥ سم . وهو من الاسماك المشهورة المستعملة للمزولة
في المتوسط .

٢٠٧٣١ - فُرُوجِيَّة مُسْتَج * ، فُرُوجِيَّة

Pagellus mormyrus (S).

Pagel marbré, Mourme (F). Mormyrus (E).

نوع من سمك الفريدِي . موطنها البحر الايغس المتوسط .

Physopoda du tabac (F). ٢٠٧٤٣ - **فُوبِدُ التَبَاقِ** *
سحرة من التريسي تركيب اوراقه التبغ تنقطع الخشب
وتقتصر صناعة الخلابا والتبغ الناضج . اغلب فريز التبغ .

Sidérite (F). ٢٠٧٤٤ - **فُورُز**
هو الفخاخ نبات طبي من الشفويات .

Vaseline (F). ٢٠٧٤٥ - **فُولِغِين**
هو الزولين ، اطليا .

٢٠٧٤٦ - **فُوسَاةُ الصُّنُوبَرِ** *
Chlorothroa pinicola (S). **Puasée des pins (F).**
حشرة مؤذية من فصيلة الفاسيات ، جسمها مفلطح ،
اعليها الشكل ، يطول نحو ١٢ سم . ثوبها الى الخضار
الاسمر المواج . يبتلى الى الخشب الاسفر يطول في جانيه
تجميع دقيق اسود || ولها شبه عثري ، قطرم الطوف .
عظمها مثل الطول . ميتاها صفراوان . زباناها مستطيلان
اسمران . كوسها اثير الخمار الخاري . حشيتها خفاء
الطوف . ظهرها اريد اللون ، اخضر الخشب . قشرها
شفاف . قوائمها الى الانقسام اللامس || تركيب اهداب
الصنوبر || راجعها كرية .

Ameérine féde (F). ٢٠٧٤٧ - **فُوسَاةُ الكَلْبِ**
عثة كرية قزاحة تسمى مئة ، اطليا .

Putréfaction (F). ٢٠٧٤٨ - **فُوسَاةُ ، فُوسَاةُ**
Putrefaction (E). اضمحل المواد العضوية بتأثير الجراثيم .

٢٠٧٤٩ - **فُوسَاةُ الكرم ، فُوسَاةُ الكرم**
Aubernage, Cabuchage, Court-noué, Roncat (F).
مرض فيزيولوجي يجهول الاسباب يصطب الكرم بأكمل
اصنافها فُوسَاةُ .

٢٠٧٥٠ - **فُوسْتَقِ** *
Pistacia vers (S). **Pistachier, Pistachio du Levant (F).** **Pistachio tree (E).** **Echte Pistazie, Pistazienbaum (D).** **Pistachio, P. verde (I).**

شجرة زراعية معمرة تعيش من قرنين الى ثلاثة قرون . وهي
من سبط الفستقيات واسيلة الطيحات . صروبها واصرارها
عديدة ، منها حوش البحر المشط ، اشهرها الفستق الحلبي
يختلف اصرامه كالمناشوري والمراسي والبائوري والعليسي
ونساب الجمل . ثم الفستق القزبي والمفرقي والصقل
والقريسي والاراني . اقلها واسع الانتشار وهو انسج
من اقليم الزيت لانها تتحمل الصقيع حتى بعض درجيات
تحت الصفر . غير انها ترطب في الموامع العادية من الرياح
التيح وفي المراض الفرية والقرية الشالية || وهي
تجود في جميع الارابة الخفيفة القليلة الاندماج ، والرافة
للادة الكلسية ، البادئة الرطوبة المستحكة || تلو
٤ م الى ٨ امتار وقطر دوحها يراوح بين ٣ و ٧ امتار .
جلوبها متصبة بكتبة تنور في الارض على اعماق عمدة .
ساقها متصبة عقدية فراء . اوراقها مركبة ورية . وريقاتها
اعليها اوبضية الشكل . تصلها مستمس الصفة
الجامدة الكثيرة الفروع النقيقة المتزاوية . ازهارها ثنائية
المسكن ، حادة البتلات ، محورية الارتكاز ، تلتأ على
الفروع الهولة . الذكرية منها قدية التجميع ، خنسية
الاسدية ، اما الانثوية مضغوطة وهي وسيدة المبيض
والغدر . ثمارها زيتونة الشكل تتكون عند اكتمال نفسها

مسرعا قرب الشوط || جسمها اعليها الشكل يطول
نحو ٦٠ سم . ثوبها الى الشبة الوردية الغضية المواج
يطولها في جانيها تسليج اسود والحمل || لحمها جيد
الصنف في الربيع والصيف ، متوسط في الخريف والشتاء .

٢٠٧٧٢ - **فُورِز**
Fraise (F). **Strawberry (E).**
هي ثمرة الشيك وتسمى شيل فريز وشيل شيك .

٢٠٧٧٣ - **فُورِزَة** *
Froese (S). **Frösle (F).** **Frosta (E).** **Kaickschwarte (D).** **Frosta (I).**

نبات طعسي زريبي من فصيلة السوليات . وحيد الجلس
والنوع ، عديد الفروب والهمين . اوراقه قرصية الانتشاب ،
سفية الشكل ، ثنائية الصف . ازهاره بريق الشكل ،
سداسية الاقسام ، صلبة العرف ، منها الابيض والاصفر
والبرتقالي والوردي الخ ... وهي متباينة الارتكاز من
جهة واحدة يصعب تفرغ تحمل يطول نحو ٣٠ سم . ثم
يرجع تحت صبه الازهار || ازهاره يستمر طوال
فصل الربيع .

٢٠٧٣٤ - **فُورِزَة** *
Farysle (S).
جلس بطور مجهرية طفيلة من فصيلة الفراخويات تتميز
بطولها البسيط التركيب ثم يفيها الفي التجميع
وبوبتها القرية الانقسام وبكثرة || يصيب السمنيات
على اختلاف انواعها النباتية .

٢٠٧٣٥ - **فُورِزَة**
Prole (F). **Prey (E).**
كل ما استعمل عليه الحيوان الفاري لفته .

٢٠٧٣٦ - **فُورِزَة ، فُورِزَة**
Acaule (F). **Acaulous, Stemless (E).**
الفريز والمقر هو من النباتات ما ينبت على رجة الارض
ولم يقم على ساق ج . فرائش .

٢٠٧٣٧ - **فُورِزَة**
الفريش : القوس يده نتاجها يتسم ليال وهو غير اوقات
الزهر عليها || والفريش ايضا الثور الذي لا سنام له .

٢٠٧٣٨ - **فُورِزَة** *
Calocera (S). **Calocère (F).**
جلس بطور شفائية من فصيلة البوسيات . الزواة قليلة
العديد كثيرة الانتشار الذي يم معظم شاطئ الشرق الاوسط
واروية واسريكة الشالية || تعيش على المواد النباتية
والخشبية المتحللة . اشهر انواعها واصرها الفرية القرية .

٢٠٧٣٩ - **فُورِزَة لُزْجَة** *
Calocera viscom (S). **Calocère visqueuse (F).**
نوع من الفرية . اطليا اقليم الصنوبر في معظم اقطار
الدالم . تعيش على النبات المتطورة المضة || تحتها غشوي
الحسية الجاملة . وتنبها متشعبة ، لزجة ، تلو نحو
٥ سم . ثوبها الى الصفار القاري .

٢٠٧٤٠ - **فُورِزَة**
Fénugrec (F).
هي الحلبة الرومية . اطليا .

٢٠٧٤١ - **فُورِزَة**
هو ولد البقرة الوحشية .

٢٠٧٤٢ - **فُورِزَة**
Tigrasse (F). **Tigress (E).**
انثى البير وتسمى فزرة ويقال اولها الفز .



فريزة



فريزة لجة



فستق

من غلاف خارجي مثل الفستق لونه الى البخرية يملوها
تؤشج ربادي . من غلاف داخل غشبي المادة مؤلف
من مصراعين يتشقان عن صلب أصفر اللون مأكول لمنحه
قشرة رقيقة لونها الى البخرية || يتكاثر الفستق بالبذر
و بالتطعيم . فالفستقج بالبذر يكون في شاتل خاصة
تؤشكز على طبق من الحصى مهمتها استئصال الماء . وقد
يم عادة في شهر شباط ويكون ذلك اما نثرًا على كامل
المشعل او عن طريق تناثره في يد الراسد منها عن الآخر
من ٣٠ الى ٣٥ سم . ويبقى الفستق في المشعل من سنتين
الى ثلاث سنوات قبل ان تنقل الى مستطرها || اما الفستق
بالتطعيم فيجوز على الطير اي الفستقج والطير الاخر
والمصطكاك على مائر اجناس سبط الفستقيات . ويطعمون
بشر يد خمس سنوات في حين ان الفرة لا تستر قبل
تسع او عشر سنوات || وفيغرة الفستق تبلغ كلال ثمرها
بسر ٣٠ سنة وتستمر على حالها نحو ١٥٠ سنة قبل ان
تتمثل في طور الانحطاط الذي يدوم نحو نصف قرن .



فستق حبيبه

٢٠٧٥٢ - فستق متغلاشي * ، حصى بمستورقه

فستقجيه
Voandzeia subterranea (S). *Voandzeia*, *Pistache malgache*, *Pois bambara* (F).
نبات عشبي حولي زراعي وحيد الجنس والنوع من فصيلة
القرنقيات القرغرافية . هذه البذور الافريقية اكلية . ساقه
معداة . اوراقه مركبة ، مستطيلة الزوائد القام ، ثلاثية
الورقات الطرفية السانحة المتصال . ازهارها ابطية الارتكاز
تتشعب على السوق للمادة وهي صغيرة القند ترتكز على
سمايل لفيغة التنسج تغط بالازهار ، بعد تأيرها وتكوين
الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعماق تراوح من ٥ الى
٨ سم . حيث تستقر الى ان يتم نمو الثمار وبفسجها . اما
الثمار فهي غالبا فردية الحبة وانادر مزدوجة وهي تحنوي
على البوب غزير المواد الغذائية المروقة التي تعتبر من اكل
الافلاطية التي تنتجها المملكة البانثية || يقبل « بوانام »
وفيره من حلاوة حبوب الفستق المتغلاشي انها تحوي العناصر
الرئيسية التالية :

مواد ازرقية	١٨,٦٨ %
مواد دهنية	١٦,٤١ %
مواد هيدروكربونية	٧,٠٧ %

زراعتها لا تختلف عن زراعة الفستق حبيبه وانتاج الثمر
يراجع من ١٥٠ الى ٢٥٠ كيلو من الحبوب المملفة .
اما شتمه فيحصل كلف فائض اخصها الاقبال لانه
يكثر الدر ويشط في المواد الزبدية .

٢٠٧٥٣ - فستقج

Pistache (F). **Pistachio, Pistachio-nut** (E).
ثمره الفستق . لياها جامد المكسر . فستق اللين ، لليد
الطعم الخاص واللذكية المشبعة . متوسط تركيبه العنصري
ما يلي :

مواد آسية	٢٢,٧ %
مواد دهنية	١١,٩١ %
حلاوات الكربون	١٣,٠١ %

٢٠٧٥٤ - فستقيات (F). Pistacien (E).

سبط من فصيلة البساتيات يشمل ثمانية انواع منها بعض
مناطق حوض البحر المتوسط . جميعها اشجار وحميرات
برية وزراعية وافر المادة الزرقانية القلوة العرف الثامنة
الاستعمال الصناعي || اشهر انواعه الفستق .

٢٠٧٥٥ - فستقجيه *

Physostegia (S). **Physostégia** (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . اوراقها
اهليجية او سنائية مسنة المختار . ازهارها مثل التجميع
كازهارها صغيرة وريدة اللون او بتقسيمه || انواعها المعروفة
قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٠٧٥١ - فستق عيبد * ، قويل سوداكي

Arachis hypogaea (S). *Arachide*, *Pistachier de terre*,
Pois de terre, *Cacahouette* (F). *Earth nut*, *Ground*
nut, *Peanut* (E). *Echte Erdnuss*, *Erdmandel* (D).
Arachide, *Pistacchio di terra*, *Mani* (I).

لبات عشبي حولي زراعي معناني من فصيلة القرنقيات .
غروبها واصرامها عديدة تقسم الى قسمين : الافريقية
وهي معداة قليلة الزغب والاسيوية وهي متصببة السوق
زبدية الاضواء . جلورها كثيفة متشعبة . سيقه فراء
مترابكة ، اصمها اسطوانية ، اطرافها مفصلة . اوراقه
متناقبة مركبة لاقامية التجميع يكثر فيها العدد الشفي
للمركب من زوجين . وريقاتها يفضية الشكل تصلي
يختلف باختلاف الاصرام منه مالى الصلصة العليا خلي
السفل كما في الاصرام الافريقية ومنه مذهب الصلصتين
كما في الاصرام الاسيوية || ازهارها ابطية تشعب عنه
قواعد الفروع بين اللادتين مهيمنين وهي صغيرة القند صفراء
اللون تؤشكز على سمايل لفيغة التنسج تشعل بالازهار ،
بعد تأيرها وتكوين الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعماق
تراوح بين ٦ و ١٠ سم . حيث تستقر الى ان يتم نمو
الثمار وبفسجها || اما الثمار فزرقية ، اسطوانية ، معزوة ،
مقبضة الوسط . طولها يراوح بالاسية الى غروبها بين
٢ و ٤ سم . وهي تحوي على البوب او البروين في الاصرام
الافريقية وعلى ثلاثة الايبب في الاصرام الاسيوية .
اما البوبها فهو غزير المواد الغذائية المروقة التي ترتكز
من العناصر الرئيسية التالية :

مواد ازرقية	٢١,٨٠ %
مواد دهنية	١١,٧٥ %
مواد هيدروكربونية	١٧,٦٦ %

زراعتها منتشرة في جميع البلاد اكلية اخصها البرازيل
والكسبك وبعض مناطق امريكا الشمالية وكندا واليونان
ومصر ولها . وهو مزروع على الشواطئ البانثية السورية
الروية المعتمدة من حكاك الى اللاذقية || يجهز في جميع
الآربة الزراعية لكاملة التركيب الممكن رجاء . بأصا
يفضل الزبدية المتوسطة او القليلة الاتساج الدنية بالمواد
الضوية ويمتصري الرياس والفسفور || يبلو في
قديم الواحد من ٦ الى ٧ كيلو من الحبوب المملفة او نحو
٣ كيلو من الايوبب اي الحب الممد التلاف . وذلك
في اواخر شهر نيسان . فينتش الحب وتظهر براومه بعد
البذر بثلاثة اسابيع . معشذ يشار بالري ويدوم عليه



فستق ملتاني

٢٠٧٠٦ - فُسْتُوجَة صَغِيرَة الزَّهَر
Physostegia parviflora (S).
Physostégia à petites fleurs (F).
نوع من الفستوجة . ساقها نحيلة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم.
اوراقها لامعة سنائية الشكل . نصلها منشورية الحار .
ساقها الزهرية تطلو نحو ١٠ سم . ازهارها لينة بنفسجية
اللون صغيرة القد . تطلو من ١٠ الى ١٥ سم . لوفا الى
الوردي في تنويرها . يستمر من حزيران الى آب .

٢٠٧٠٧ - فُسْتُوجَة مُسَنَّكَ
Physostegia denticulata (S).
Physostégia denticulée (F).
نوع من الفستوجة . ساقها قوية مستدلة الصلبة تملو من
٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها اطيحية تطلو نحو ٨ سم .
نصلها غشيرة اللون القاتم ، مستند الحار . ازهارها وردية
اللون ، مستدلة القد ، تطلو نحو ٣ سم . تنويرها
يستمر من حزيران الى آب .

٢٠٧١٤ - فُسْفَات الكِلْس
Phosphate de chaux, Ph. de calcium (F). Calcium
phosphate (E).
مركب فسفوري يستعمل في تحضير السورفسفات .

٢٠٧١٥ - فُسْفَات الكِلْس الطَبِيعِي ، فُسْفَات
مُعَدَّنِي
Phosphate de chaux naturel, Ph. minéral (F).
Natural calcium phosphate, Mineral phosphate (E).
مركب فسفوري طبيعي يستعمل اما مباشرة في تسميد
التربة او في تحضير السورفسفات .

٢٠٧١٦ - فُسْفُس
Peribals (S). Péribals (F).
فسفس ج . فسفس جيس حشرات شديدة النتن من فصيلة
الفاشيديات . انواحه عديدة جيسها صغيرة القد ، محببة
الشكل ، مبطقة . طويلا يراوح بين ٧ و ١٠ مم . اولياها
مخططة الالوان منها الاخضر الباهت والرمادي والمخضر
والسج والمزركش . وهي شديدة الاذى تركب الاغصان
البيرة والزراوية وسبا البقول والنباتات الصناعية كالبنج
والخروع .

٢٠٧٦٧ - فُسْفُسَة مُسَنَّطَة
Brachynema cinctum (S). Brachynème cinct (F).
حشرة مؤذية من فصيلة الفاشيات . جسمها كثيف
الحمل القصير ، مفلطح ، مبطط ، بطول نحو ١١ مم .
لوفا الى الخضار الالسي . رأسها شبه مخروطي . خطها
مستطيل المثلث . عينها ناشزتان . زياتها اخضران .
كوسها احر الحار . صفيها مخروطية الشكل ، يضاء
الطرف . ظهورها وردي اللون ، اخضر الخنجر . بطها
الى الخضار الباهت مخططة حار احر . قشرها شفافة .
تفرغها الى الخضار الاسفر الاسمر . تركب جميع انواع
السورفات فتمتص عصارة الارواق والنواهي .
كروية .

٢٠٧٦٨ - فُسْفُطَة
Phosphatage (F).
تسميد التربة بالفوسفات . ومنهم من كتبها فسفطة .

٢٠٧٦٩ - فُسْفُور ، فُسْفُور ، فُسْفُور
Phosphore (F). Phosphorus (E).
جسم بسيط لا يوجد في الطبيعة الا متحدا مع غيره من
الاناسر . وهو اهم الاغذية الباقية بعد الآزوت . يوجد في

٢٠٧٥٨ - فُسْتُوجَة
Fistulana (S).
Fistulana (F). Fistulana (E).
جس سبوانات بحرية من الرغويات صفيحات الغليظ
وفسيلة النسيجات .
انواعها الفابرة كثيرة البد جميعها
من متحبرات الطبقة الطباشيرية ، اما الانواع الماصرة
فثلاثة جميعها من دويبات امث الصنينة . تمويش قرب
الشواطئ مدفونة في الرمال المغمورة بالماء . اصداها
ابوية طليقة .

٢٠٧٥٩ - فُسْج
Pourridié, Rocellinia (F).
جس فطور مجهرية عديدة الانواع (رايح وروانيه) .

٢٠٧٦٠ - فُسْج ، الفُغَاء
Réailliation (F).
Cancelling (E).
هو ابطال مدفول عقد بالتفاهل للتعاقد .

٢٠٧٦١ - فُسْجَة
Eclat (F). Shiver, Splinder (E).
هي الملوقة ، فسج يفسخ عن جلع له .

٢٠٧٦٢ - فُسْدِيَلَا
Phacidiella (S).
جس فطور مجهرية يعرف بالريح ، اطليه .

٢٠٧٦٣ - فُسْفَات ، فُسْفَات ، فُسْفَات
Phosphate
ملح يحصل من امتزاج حامض الفسفوريك بالحصى
الفرامد من معدن او فظفان او غيرها كالبيوتاس والكلس
والحديد الخ . وهو من الاسماء الزراعية الجزئية للفسج
التي تعد انبثات بمضخ الفسفور . مصادوه عديدة تقسم
الى خمس فئات :

١ - فُسْفَات الفسفات الطبيعي وهي تشمل الابنيت والبرال
الفسفاتية والطباشير الفسفاتية والفوسفات الحجر
والفسفوريوت ...

٢ - فُسْفَات الفسفات الصنوي وهي تشمل مختلف مساحيق
النظام ورياد النظام .

٣ - فُسْفَات المستخرجة من التدين وهي تشمل
التريال اي السكوري حل اختلاف انواحه .

٤ - فُسْفَات التي حوالت حكما وكيمياويا وهي
تشمل البازيفسفات والفوسفات الراسب ...



لسعة

في نصل حادٍ الخضر ثم تصفرّ وتبيس، فتذبل الأوراق وتعيها وتيت النبات. راجع سرج.

٢٠٧٧٨ - **فُشِيكَة** *Cisticola ornithina* (F).
هي الكروان الليل طائر من الشبليات. اطلبه.

٢٠٧٧٩ - **فُشِيكَة** *Rejston (F), Shoot (E)*.
كل رلة أو قصب ينمو على ارضية قلعت مسج ارضية.
ج. فاشل. والفاسل وفاسل صغار النخل تنزل تنزل تنضم قصير نخلة.

٢٠٧٨٠ - **فُشِيكَة، فُشِيكَة، فُشِيكَة**
Physiologie (F), Physiology (E).
علم يبحث عن ظواهر الحياة في الياهي ومن وظائف اعضاء الخلقة.

٢٠٧٨١ - **فُشِي** *Bryone (F)*.
هو الفاشرا، اطلبه.

٢٠٧٨٢ - **فُشَاغٌ، فُشَاغٌ**
Smilax (S), Salsaparella (F), Sarsaparella (E).
جس نباتات ليفية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعه المعروفة نحو ٢٠٠٠ صنفها جنات سريعة، معظمها بري وبضها زراعي. اوراقها ابيضاء، مقلقة، متعاقبة، لاتناسية الشكل، كثيفة العروق. انواعها صغيرة القد لثلاثة ارجل خالصة البلات. انفرها صبراني او صغوي، التجميع، ابطي الاثر كثر. ثمارها عتيبة اءرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٠٧٨٣ - **فُشَاغٌ امريكي**
Salsaparella d'Amérique. اطلبه.
هو الاربابة الفارية، اطلبه.

٢٠٧٨٤ - **فُشَاغٌ صِينِيّ، فُشَاغٌ صِينِيّ**
Smilax aspers (S), Smilax ruda, Salsaparella d'Europe, Lisaron épineux (F), Prickly ivy, Rough bindweed (E), Stachwind (D), Smilax, Smilaclo, Rovo cervino (I).
نوع من الفشاغ الطبي البري المبدول. ساقه ليفية سريعة مضطعة تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه قلبية القامة، نصلها جامد التجميع الاخضر اللامع الشائك الحافة. ثماره خر ا انزهره ينمو من آب الى تشرين الاول.

٢٠٧٨٥ - **فُشَاغٌ شاك**
Smilax bona-nox (S), Smilax épineux, Salsaparella bonne-nuit (F), Rough bindweed (E), Rauhe Stachwind (D), Smilax spinosa (I).
نوع من الفشاغ الطبي البري والزرادي. ساقه ليفية سريعة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه اطيالية الشكل. نصلها متينض الوسط، جامد التجميع، سامي العروق، شائك الحافة ا انزهره ينمو من نيسان الى تموز.

٢٠٧٨٦ - **فُشَاغٌ صِينِيّ**
Smilax china (S), Smilax de Chine, Salsaparella squina, Squina (F), China smilax, Chinese root (E), Chinastachwind, Chinawurzel (D), China carnos, Salsapariglia della China, kina (I).

نوع من الفشاغ الزراعي مهدد الهين. جدو وبني الشكل تكتنه بعض البساتين المستصلحة اشماء اللين. ساقه ليفية قليلة الشوك. اوراقه بيضية الشكل، قلبية القامة، مدينة المصعة، نصلها جامد التجميع الاخضر اللامع،

الربة الزراعية وفي التيج النباتية والحيوانية لاسيا في النظام ا والفشور اخر جسم صلب، شفاه، كوري، كوري، كربة الراحة، نضبط للملدة البامة القفظة. يتألف في الفلام، يشتمل في الهواة ولا يلوب في الماء. ريز (فر) ثقله النضي ١٨٤ و١٩٨ وزنه اللذي ٣٠٩،٨. ينمو بجمرة ٤٢،٢ سم حيث يناع كالزيت ويصل ٢٩٠ سم ا ويوجد ايضا الفشور الاخر الذي يحضر من الكوري بالتسجين المائي، وهو اخر اللين عادم المم والراحة لا يتألف في الفلام ولا يشتمل الا حته ٢٦ سم. يشتمل في عدة صناعات انصها صناعة القباب.

٢٠٧٧٠ - **فُشُورِيَت** *Phosphorus*
نوع من فسلات الكلن الطبي للتصير للشعبي الطول. يشتمل في تحضير الفشور والوريفغات.

٢٠٧٧١ - **فُشُكُل، فُشُكُل، فُشُكُل**
Dernier (F), Loaz (E).
الفرس الذي يبي في الحلية آخر الجمل.

٢٠٧٧٢ - **فُشُل** *Plançon, Plantard (F), Sapling (E)*.
هو كل قصب كبر من الحور والمصنات وما شبه شارب وحضر للفرس ان في الهندلة او في المستقر.

٢٠٧٧٣ - **فُشُلَة** *Bouture (F), Slip (E)*.
هي البقلة كا انزمت قبل ثقلها وتحضرها الفرس.

٢٠٧٧٤ - **فُشُمَة** *Phasma (S), Phasma (F), Phasma (E)*.
جس حشرات من فصيلة الفشيات. انواعها المعروفة عديدة اطلبها غابات البلاد الاستوائية والحارة ا اجناسها اسطوانية ثنية القفبان طولي من ٦ الى ٤٠ سم. ثمارها متاعس حادة. رولوها صغيرة. قربها الاستعمارية دقيقة مضطبة. اجنتها، حته بعض الاثوار، نضقة، شانة مضطبة الطول، وحت البفض الآخر جداد لا عمل لها. قوامها مسنة الانخاذ والسفان والارباع ا الثوابا تمان البيته وهي غالباً بلون الاثان والقفبان.

٢٠٧٧٥ - **فُشُمِيَتَة** *Phasmidæ (S), Phasmidæ (F), Phasmidæ (E)*.
فصيلة حشرات من مستقيبات الاجنة. اجناسها وانواعها كثيرة المدن معظمها من افاير العصر البليستوساني المالك الى اوائل الابراج الرابع. اما الحاضر فيها فلا يقل من ٢٠٠ نوع معظمها من حشرات الغابات الاستوائية والحارة ا من ميئات حشرات اناها جبانة الاشكال والاحجام تمان المواعف التي تقم فيها. بضها يشبه القفبان والبفض الآخر يشبه الارباق ا اءرف اجناسها واشهرها القفصة والقليلة.

٢٠٧٧٦ - **فُشُورِيَت** *Rachitisme (F)*.
هي الخرامة، اطلبه.

٢٠٧٧٧ - **فُشُورِيَت، فُشُورِيَت** *Mosaïque (F), Mosaic (E)*.
مرض يكبري يصيب بعض النباتات انصها التبغ والبطاطا والخس. يقال انه ينتشر بواسطة بعض انواع الارق. مظهره الخارجي يقع سريحية الشكل والارتقب، لاقباسة المدم، تركب فنج الارباق فنبط طلاء اللين



فُشَاغٌ

Stace (F). ٢٠٧٩٥ - **فُشَاغَش** - **فُشَاغَش**
هو الأربيل وأحدته نشفاشة .

٢٠٧٩٦ - **فُشَق** - **فُشَق** : تباد ما بين القرنين .

Roncet (F). ٢٠٧٩٧ - **فُشَل الكَرَم**
هو فسالة الكرم ، اطليا .

Synchronisme (F). ٢٠٧٩٨ - **فُشَن** ٥
Synchronism (E). الشن والإفشان وأسد .

Synchronique (F). ٢٠٧٩٩ - **فُشَنِي** ٥
Synchronistic (E).

Carposcene (S). ٢٠٨٠٠ - **فُشَيْغِيَّات**
Carposcées (F). Carposcées (E).
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزقيات . تتميز بأوراقها
المحفولة في الإصان . فصائلها أربع الإردادات
والخشايات والمشيقات والزقيات .

Dicranocère (F). ٢٠٨٠١ - **فُشَيْغ** ٥
Dicranoceros (E).

لعت قمريني يطلق على كل حيوان منشعب القرن وعلى
كل حشرة منشعبة الأربان .

Smilacina (S). ٢٠٨٠٢ - **فُشَيْغَة** ٥

Smilacine (F). Smilacina (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الزقيات قريبة
الشيء من الفُشَاغ . سيقانها مدادة كاسية . أوراقها متعاقبة
خلية الصفحات السطلي . أزهارها عنقودي التجميع
طولي . ثمارها عنية || تزدهن القرنين في معظم المواسم
لاتها لا تنضج البرد . تروث في الأتربة المعتدلة الانساج
الوافرة المواد الغذائية من عضوية وبمعدنية || أنواعها
المعروفة قليلة أشهرها التالية :

٢٠٨٠٣ - **فُشَيْغَة بَكَلِيَّة** ٥

Smilacina oleracea (S). Smilacina légumière (F).
نوع من الفُشَيْغَة . مهدا جبال الهند والأفغان .
ساقها تطول نحو ١٢ سم . أوراقها متصلة البدن ، سنانية
الشكل ، تطول من ١٥ إلى ١٨ سم . أزهارها عنقودي
التجميع . أزهارها وردية اللون ، جلبةلية الشكل . ثمارها
عنينة أرجوانية ملوفا موج وردية || تنموها يستمر
طوال شهر أيار .

٢٠٨٠٤ - **فُشَيْغَة عُنُقُودِيَّة** ٥

Smilacina racemosa (S). Smilacina à grappes (F).
نوع من الفُشَيْغَة . مهدا بعض مناطق أمريكا الشمالية .
ساقها تطول من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . أوراقها سنانية الشكل
تطول من ٨ إلى ١٥ سم . وتعرض من ٣ إلى ٧ سم .
أزهارها عنقودي التجميع ، كثير البدن ، يطول نحو
١٠ سم . أزهارها بيضاء اللون . ثمارها عنية ، بنسجية ،
حزرة || تنموها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٠٨٠٥ - **فُشَيْغَة تَجْمِيَّة** ٥

Smilacina stellata (S). Smilacine étoilée (F).
نوع من الفُشَيْغَة . مهدا الشرق الأدنى . ساقها متبادعة
الأوراق ، تطول من ٤٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها قليلة البدن ،

عادم الفوك || حسانه مأكولة وهي لا تتحلل من بعض
الناصر الطبية الناقمة .

٢٠٧٩٧ - **فُشَاغ مَعْرُوفِي** ٥ ، **صَبْرِين**
Smilax officinalis (S). Salepareille officinale (F).
Sarsaparilla (E). Salsaparilla (D). Salsaparilla offi-
cinalis (I).

نوع من الفُشَاغ الطبي البري والزراعي . حسانه اهليلجية
الشكل ، جوية اللون ، شائكة الاستعمال الطبي . ساقه
ليفية تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقه بيضيه الشكل ،
نصلها جامد النسيج عابن الحفرة اللامعة ، شائك الحافة .

٢٠٧٩٨ - **فُشَا**
Gousse d'anagry (F).
Shell of bean-traufol (E).

هي حنبلية ألبون تملو نحو ١٥ سم . وقمرن نحو ٢ سم .
زورها مستديرة ، مفلطحة ، قلبية ، بنسجية اللون ،
جسمانية المادة الخشبية . ج نش .

٢٠٧٩٩ - **فُشَرَا**
Bryone (F).
هي الفاشرا ، اطليا .

٢٠٧٩٠ - **فُشَع**
فُشَع النبات . يست اطراشه . وفُشَع الأترة : يست اطراشها
فُشَان قلفها .

٢٠٧٩١ - **فُشَع ٥** ، **مِيَالِيَّة**
Podocarpus (S).

Podocarpe (F). Chinese yew tree (E). Podocarpus,
Steinleib (D). Podocarpus, Lauro del Giappon (I).
جنس أشجار سربية وزينية من فصيلة السنوبريات
الطليسيات . أولاه نحو ٤٠ سم . جميعها من أشجار المناطق
الحارة والمعتدلة . سيقانها مستقيمة تملو ، حسب الأنواع ، من
مترين إلى ٢٥ م . أوراقها متعاقبة ضيقة النصل السليك .
أزهارها الأكرية قدية الشكل إما الإثوية سفلية التجميع
وهي عمودية أو طرفية الإرتكاز || أغصانها صلبة لا
يتبرها فساد || أشهر أنواعها ما يلي .

٢٠٧٩٢ - **فُشَع قَلْبِي الرَّقْز**

Podocarpus nerifolia (S). Podocarpe à feuilles de
laurier rose (F).

نوع من الفُشَع وهو شجرة سربية سرورية تملو من ١٥ إلى
٢٠ م . أغصانها غارشة لا متدلة . ثنائياتها سيبانية الشكل .
أوراقها مستقيمة الإرتكاز ، منجلية الشكل ، تطول
من ١٥ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ١ إلى ٢ سم .
زورها أرجوانية اللون ، بحرية المراج .

٢٠٧٩٣ - **فُشَع كَبِير الرَّقْز**

Podocarpus macrophylla (S). Podocarpe à grandes
feuilles (F).

نوع من الفُشَع وهو شجرة سربية وزينية جميلة الشكل تملو
من ١٥ إلى ٢٠ م . ثنائياتها غارشة ، أغصانها انقية الإرتكاز
متدلة الأطراف . أوراقها جالسة تطول نحو ١٢ سم .
وتعرض نحو ١ سم . زورها سنوبرية الشكل ، جوية
اللون تطول نحو ٢ سم .

٢٠٧٩٤ - **فُشَع نَاجَمِي**

Podocarpus nageia (S).
Podocarpe Negi (F).

نوع من الفُشَع وهو شجرة سربية سرورية تملو من ١٥
إلى ٢٥ م . أغصانها غارشة متدلة الأطراف . أوراقها
بيضيه سنانية تطول نحو ٩ سم وتعرض نحو ٤ سم .
أغصانها الصفحة العليا أصفر الفل . زورها تكبر
نحو ٢ سم . وهي جوية اللون . بنسجية المراج .



فُشَاغ مَعْرُوفِي



فُشَع

ملونة || معظمها يعيش تحت الحجارة وبعضها في قرى النمل. قوتها المواد المضوية والنباتية المنحلة || أشهر أجناسها **الفصصاع**.

٢٠٨١٧ - فصصعة ، رطبة ، قصب

Medicago (S). Luzerna, Lupulina (F). Lucerne (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البقوليات. أنواعه عديدة منها البرية والزراعية جميعها مرموقة طبية. جلودها ونباتية قليلة الانتعاب تنور نحو ٢٠٠ سم. موطنها مستنقطة فرسا. اورقها مركبة ثلاثية الوردية ، زنادية الرضلى اي العليا. ازهارها عقدية التجميع فيها الالبض والازرق والبنفسجي. ثمارها حنابل سطولية تفلت البذور. يزورها حشرة ، دفيقة ، لوتيا الى الجوزة يملأها مواج اغصر او اسفر || احرف انواعها واشهرها ما يلي .



فصص مزروعة

٢٠٨١٨ - فصصعة برية ، قصب

Medicago ciliaris (S). Luzerna sauvage (F). Sea hedgehog medick (E). Hornigal, Dornenkron (D). Medica salvatica, Trifoglio tarpeterra (I).
نوع من الفصص البرية تكثر في المواقع المنحلة الرطوبة اغصها الجبال. وهي من اسود النباتات المرموقة الطبية. تتميز بكثافة زيتها ويذهب حار وريقتها. ازهارها الى الزرة المايقة .

٢٠٨١٩ - فصص مزروعة ، فصصية مغروكة ، برسيم حجازي

Medicago sativa (S). Luzerna cultivée, Trèfle de Bourgne (F). Lucern, Alfalfa, Common medick (E). Luzerna, Blauer Schneckenklau (D). Luzerna, Medica, Marica, Lupinella (I).
هي الفصص الزراعية الكثيرة المشهورة بما تحوي من مواد غذائية منبهة (رابع حلف) || فروها دفيقة مستنقطة قليلة الحبل. وريقتها قليلة الاعذاب للموت. ازهارها بنفسجية اللون || تزرع في جميع البلاد المعتدلة الحارة. تقم في الخيف الواحد نحو ١٢ سم. ترطب في الازرة الميعقة النور، المعتدلة الانفساج ، اللينة يناسر الكلس والفسفور والبوتاس. وهي تحشى الازرة الطينية والطبية الجسيمة || تحشى في العام الواحد من اربع الى ثمان مرات. اما سبب هذا التفرق فيفيد الى الاكلم ويوقع ازراعه واسكانية الري || اما متوسط انتاج الدقم في الحقل الواحد فتراوح بين ٣٥٠٠ و ٤٠٠٠ كيلو حطب اغصر. وادأ قسنا الانتاج بالكاد الجفاف اي الحلف يكون متوسط محصول الدقم السنوي من ٧٥٠ الى ١٢٠٠ كيلو .



فصص شجيرة

٢٠٨٢٠ - فصص شجيرة ، قصب

Medicago arborea (S). Luzerna en arbre (F). Tree medick, Moon trefoil (E). Baumartiger Schneckenklau (D). Erbs medica arborescente, Medica citro (I).
نوع من الفصص البرية وهي جنبة فرسا تطل من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. وريقتها بيضية الشكل ، جبلة اغصاها البصري. ازهارها متجمعة مستحبة العرف الخابت. يقال انها طيبة ازهارها تقيد الاسه .



فصصاء

٢٠٨٢١ - فصص

٢٠٨٢٢ - فصصاء ، قارة الصبحرارة

Mus barbarus (S). Souris de Barbarie, S. du desert (F).
نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها فصص الاربعاء يمتد من افريقية الشمالية الى الصحرار وغنية. طولها نحو ١٠ سم.

سنانة الشكل ، لاطقة ، تطل من ٥ الى ١٥ سم. وترعرع من ٢ الى ٤ سم. ازهارها شكولي التجميع. ازهارها منبسطة البتلات ، نجمة الشكل ، غصراه اللون ، يفس الحفاف. ثمارها عتية شديدة الحمرة القائمة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٠٨٠٦ - قصب

Caeu, Cayeu (F).
من التوية وانواعها .

٢٠٨٠٧ - قصب ، قصب

Lobe
كل جزء من الورقة او الزرة بالغ التفرع مستدير .

٢٠٨٠٨ - قصب الجعكار هو الاقسن ، اطبل .

٢٠٨٠٩ - قصب التلك

Logo pollinique (F).
Pollinic call (E).

غشاء يلف جدرات الطلع في تلك الزرة .

٢٠٨١٠ - قصب جداري

Lobe parétal (F).
Parietal lobe (E).

٢٠٨١١ - قصب ككي

Lobe maxillaire (F).
Maxillary lobe (E).

٢٠٨١٢ - فصصاء

القص حب الزبيب . الواحدة فصصاء .

٢٠٨١٣ - فصصاء ، فصصاء

Saignée (F). Bleeding (E).
فتح عرق الدم .

٢٠٨١٤ - فصصاع

Syrinx, Siringe (F). Syrinx (E).
الفصصاض عضو الصوت في الطير . مركزه عند انتعاب القصبة الزرئية .

٢٠٨١٥ - فصصاع

Thoricetus (S).
Thoricet (F). Thoricetus (E).

جنس حشرات من فصيلة الفصصاعات ورتبة غفجات الاجنحة. انواعه المرموقة قليلة البد منتشرة في بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اغصها المعتدلة من لبنان الى اليونان || اجسامها صغيرة ، معتدلة الاعذاب ، تطل نحو ٣ م. وروسها غروبية . حوتها بارزة . ثآثيرها وبلاستها نظامية . قوتها الاستثنائية جدوية الاطراف ، جانبية الارتكاز . كواسلها قصرة ، معدبة . الحامدا مائلة ، لاطقة . قوائمها نشطة . ازواجها وسيدة اللون ، تكثر لها الشفحة السوداء فالدبة فالجوزة || تميش تحت الحجارة . سرعها دجوي . قوتها المواد المضوية والنباتية المنحلة .

٢٠٨١٦ - فصصاعات

Thoricetidae (S).
Thoricetidae (F). Thoricetidae (E).

فصيلة حشرات من غفديات الاجنحة . اجسامها واثرها المرموقة قليلة البد ، اصحابها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة ، معتدلة التطيط ، تطل من ٢ الى ٤ م. وروسها غروبية الشكل . حوتها بارزة . ثآثيرها وبلاستها نظامية . قوتها الاستثنائية جدوية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها معدبة . الحامدا لاطقة . قوائمها نشطة . ارصاها حاسبة القمل . الواجا

Sépale (F). Sepal (E).

ورقة كأس الزهرة. ومنهم من سماها كأسية.

Métacarpe (F).

Metacarpi (E).

فصيلة الرُسع الأوتى

في الفرسج، أطليه.

Phasmoptera (S).

Phasmoptères (F). Phasmoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيبات الجناح. فصائلها وأجناسها وانواعها كثيرة البدن معظمها كبير القد لا يابسي الشكل والون || وفي تتميز بتضيقها الصغيرة وبسيفانها القصيرة التي لا يمكنها من القفز، يمكن أثنائها كبير الحجم يشبه بر الحنطة.

فصيلة - فصيلة في الفاصوليا، أطليه.

Cisticola (F).

فصيلة

في الكروان طائر من الخلدات، أطليه.

فصيلة - فصيلة صوت الجنادب.

Lobula

فصيلة

فصيلة، فليبي

Lobulaire, Lobulé (F). Lobular (E).

ما كان شكله أو تفريره يشبه الفص أو اللقطة.

Polystigma (S).

فصيلة

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات تتميز بوليصة مدلية جامدة القصر الآخر. أصانها كثيفة. يونها بسيط التركيب، أحليبي الشكل، ثماني البدن، تتجمع تكات بيضية لونها إلى السرة الفاتحة || له نوزان مؤذان هما فصيلة الخوخ وفصيلة الوز.

فصيلة الخوخ

Polystigma rubrum, Libarsetta rubra, Polystigmia rubra (S).

فطر مجهرى يصيب أوراق الخوخ فيؤذيها ويؤذي الشجر. مظهره الخارجي يقع لاقية الشكل والحجم تملو نصل الاورق فتبدو صفراء اللون ثم حراء ينفسج تملو خلايا النسيج تتسحب ذليل الاورق وأحيانها الباكر ثم ازهار الشجرة في تشرن بدن ان تغد عليها دونها الحولية الطليعية. يكاثف بأصحال سائل يورود الحول ١ ٪ ثم يؤد المقعد. ومن الانفصل إعادة النسيج مرة ثانية تكون بدن الاورق بثلاثة أسابيع.

فصيلة اللوز

Polystigma ochraceum, Polystigmia (S).

فطر مجهرى يصيب أوراق الفرز وهو شديد الشبه بفصيلة الخوخ || مظهره الخارجي يقع لاقية تملو نصل الاورق لونها إلى الجؤوة الباقية تسحب خلايا النسيج وتسحب الأحيال الباكر الذي يفسج الشجرة بدن ان يغد عليها لآذان دونها الحولية || يكاثف كالخوخ باستمال سائل يورود الحول ١ ٪

فصيلة

الفصيلة: ولد الهيبة اذا فصل عن رضاع امه.

وذئها ١٢ سم. ثوبها إلى الصبغة الصنايية، يملو ظهرها عشرة خطوط سم قاطبة. بطنها وخولها جرمها بيض. جرحها سرداب قسيح حديد الانفاق والمناظ تحزن فيه ما تكثره من حيوب وحبور.

Coprinus (S).

Coprini (F). Coprinus (E).

جنس فطور من فصيلة التاريتقيات. انواعه المعروفة قليلة البدن أطالها بعض مناطق الشرق الأوسط وأروية. تعيش في التربة على الدبال ومل المواد النباتية المنحلة في المراتق المنحلة الرطبة. معظم انواعها سريع الطيب والازوال. بعض انواعها كثيف التجميع، كشته تمد من ١٥ إلى ٢٥ ذوباً || أشهر انواعها الفصانة القرفة والفصانة السوداء.

فصانة سوداء

Coprinus stramentarius (S).

Coprini noir d'ence (F).

نوع من الفصانة المأكولة. لحيتها متوتجة الصف. اوسيتها قمية الشكل، معتدلة الحجم، سمراد اللون، يطوها موج أريد اسود. ساقها معتدلة الطول، ربداء اللون، يكتنفها طرق شغالي المادة لاقية الارتكاز.

فصانة قرفة

Coprinus comatus (S). Coprin chevelu (F).

نوع من الفصانة المأكولة. لحيتها جيدة الصف في أول مدها ثم ليبة عند الإدراك التام. اوسيتها كبيرة القد، ككتانية الشكل، لونها إلى الرعدة المروحة بالاسر المالح. ساقها معتدلة الطول، طحلاء اللون، يكتنفها طرق كالسول لاقية الارتكاز يكثر ويؤديه في القسم الأعل.

فصيلة - فصيلة نوع من المغرب ويقل ولدا الصغير.

Cresels (S).

Créséls (F). Cresels (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات مجنحات الاريل وفصيلة التنايبات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة بما فيها البحر الأبيض المتوسط. جميعها مية تعيش بعيداً عن الشطوط. أسرابها وافرة العدد || اجسامها صفيرة. اديتها وزناها قليلة الانفلاق. اصداها خروزة اللون، مسقة الأطراف، شائلة، سريعة الطيب.

Phosphore (F).

فصيلة

هو الفسفور، أطليه.

فصيلة - فصيلة في النصة، أطليه.

Sevrer (F). To wean (E).

فصل - فصل قطع الحليب من الرضع.

Saison (F). Saison (E).

الفصل زين من زينة السنة الاربية وفي الربيع والصيف والخريف والشتاء.

Disjonction (F).

Severance of causes (E).

هو في قانون المرافعات الفصل بين قضيتين كانتا متصلتين حتى تنظر كل منها على حدة.



فصانة سوداء



فصانة قرفة



فصيلة



فصيلة الخوخ



فصيلة اللوز

٢٠٨٥٢ - فضية

Protas (S).
Protée (F). Silver tree (E). Proteusstrauch,
Silberbaum (D). Prosea, Legno argentino (I).
جنس نباتات جنبية ممرنة من فصيلة الفصيات. أنوارها
حليمة مغطىها بري وبضها زبرني. أوراقها صغيرة
الحجم، كاملة النصل الفضي، أنوارها زهرية، طرفية،
ترشح الرقيق بنزارة وهي كبيرة القند، إرسوانية اللون
أو تستقي أو للكية. أحشائها خفيفة تنبت تسعمل في
عدة صناعات || أشهر أنوارها ما يلي.

٢٠٨٥٣ - فضية بهية

Protas speciosa (S).
Protée superba (F).
نوع من الفضية وهي جنبية زبرنية تملو نحو ٢٠٠ سم.
أوراقها معتقة قصيرة الزنادة، نصلها بيضي الشكل يطول
من ٨ إلى ١٢ سم || أنوارها زهرية، خسية، كبيرة
القند، يضاء اللون، حراء الزهر، قنابها ملعنة
الصفحة، كثيفة الإهاب المزينة، سود الحنار.

٢٠٨٥٤ - فضية حرسكية

Protas cynaroides (S).
Protée arduant (F).
نوع من الفضية وهي بجملة زبرنية ممرنية تملو من ٥٠
إلى ٦٠ سم. أوراقها معتقة مستطيلة الزنادة، نصلها بيضي
الشكل يطول من ٨ إلى ١٢ سم. صفحت خلية البشرة
الفضية || أنوارها زهرية، خسية، حراء اللون أو
وردية، حجمها حجم كوز الأرضي شوكي الكبير القند.

٢٠٨٥٥ - فضية مستطيلة لوزك

Protas longifolia (S). Protée à longues feuilles (F).
نوع من الفضية وهي بجملة زبرنية تملو نحو ١٠٠ سم.
أوراقها سنانة مستطيلة طويلا يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم.
أنوارها بنفسجة عاقبة. قنابها بحرية الحنار يطولها
تشيح لوزك || أنوارها يستمر من أيار إلى آب.

٢٠٨٥٦ - فضية مغشيرة

Protas mellifera (S).
Protée mellifère (F).
نوع من الفضية وهي جنبية زبرنية تملو من ٢٠٠ إلى
٣٠٠ سم. أوراقها خلية تملو من ٨ إلى ١٢ سم. وترفض
من ١٠ إلى ١٥ سم. نصلها مائل البشرة، ذلق الزنم
الأخضر || أنوارها وردية أو يضاء اللون، كبيرة القند،
غزيرة الرقيق الفشري، قنابها بدقة الصفحة الداخلية
وهي حراء اللون مجتمعة بالاسود || أنوارها يستمر من
كانون الثاني إلى نيسان.

٢٠٨٥٧ - فضية

Jus de raisin (F).
Juce de grapes (E).
حصير السنب يتم ويحفظ في القناني الحكيمة البس فلا
يغترس.

٢٠٨٥٨ - فطاح

Pollination (F). Pollinastion (E).
الفتح زبن ظهور الطلع وانتشاره عند النبات.

٢٠٨٥٩ - فطاحة

Autogamia (F).
Autogamy (E).
هي الإصباح الذاتي الذي يرتكز على تأثير ملقة الزهرة
من وليح أسيها.

٢٠٨٦٠ - فطارة

Mycetogenesis (F).
Mycetogenesis (E).
الانتارة علم يربط في إثبات الفطور ونوجها.

٢٠٨٥٥ - فضية

Famille (F). Family (E).
الفصيلة في تصنيف الاسماء هي جماع اجناس لما صفات
مشتركة. أو جماع الاجناس التي تتشابه بتفاصيل البناء
المشتركة. وترتيب الفصيلة يأتي بعد الرتبة وقبل الجنس.
راجع تصنيف.

٢٠٨٥٦ - فضاء أوسط

Mésosphère (F).
Mesosphere (E).
الفضاء الأوسط أو الوسطي طبقة من الجو تقع بين الفضاء
السديمي والفضاء الشاردي. تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع
٣٠ كيلومتر من سطح الأرض، لما سماكتها فتراوح من
٨٠٠ إلى ٨٠٠ كيلومتر ذلك لانها تتغير مع فصول السنة
ومع المواقع نظرا لامتدادها المكسي بالعوامل الحكيمة والحرارة
وسرعة الصوت.

٢٠٨٥٧ - فضاء سدديمي

Stratosphère (F).
Stratosphere (E).
الفضاء السديمي طبقة من الجو تقع بين الفضاء الكندي
والفضاء الأوسط. تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع ١٢ كيلومتر
من سطح الأرض. سماكتها نحو ٢٥ كيلومتر. تتميز
بكثرة مجاري الهواء وبالحارة القليلة الفروقات إذ أنها
تراوح من ٥٠ إلى ٦٠ درجة ستيفراد تحت الصفر.

٢٠٨٥٨ - فضاء شاردي

Ionosphere (F).
Ionosphere (E).
الفضاء الشاردي أو الباقلي طبقة من الجو الخارجي تقع
بمد الفضاء الأوسط وتمتد عمقا إلى حيث تنقطع العوامل
الشاردية.

٢٠٨٥٩ - فضاء كندي

Troposphere (F).
Troposphere (E).
الفضاء الكندي أو الجو الأرضي طبقة من الجو تغلف الكرة
الأرضية. تبدأ من سطح الأرض حتى ارتفاع ١٠ و ١٢
كيلومتر. تتميز بكثافة الهواء وبالحنار وباللزات
المختلفة وبالزوايح واليوم واللاسلار.

٢٠٨٥٠ - فضة

Argent (F). Silver (E).
معدن أبيض اللون يراى لا يتأثر بالماء ولما. يفوق جميع
المعادن في دفع الحرارة والتزوي وبإسالية الكهرية.
رمزها (ف- Ag) وزنها الذري ١٠٧.٨٨ ثقلها الذري
١٠٧.٥ تنصهر في نحو ١٠٠٠ مع || وهي
متوصلة الفوية قابلة للتشديد والطرق والسقل. مرضها
الإنسان واستخدمها منذ أقدم العصور. توجد في الطبيعة
أما شيء نقيه بصورة بولورات أو ذرات مختلفة الإصباح
مرصقة داخل يمد الصخور، أو مزوجة يتناثر مختلفة
كالكريت والزيديخ والألمد والبروم والكلور || أم
مصادر استخلاصها في العالم كبريتة الفضة الذي يحوي
نحو ٨٦٪ من أفضة المعروف وكلوريد الفضة الذي
يحوي نحو ٧٥٪

٢٠٨٥١ - فضيات

Protaceae (F). Protaceae (E).
فصيلة نباتية من نباتيات الفلقة، عديمت القنعة،
مرتقمتا المبيض. أنوارها زهراء ١٠٠٠ متنبها البلاد
الحارة. فيها الأشجار والشجيرات والجنينات والأعشاب.
أوراقها متعاقبة مسننة. أنوارها غشيرة زياية الإجزاء،
سليبية أو متقوية التجميع. ثمارها مختلفة الاشكال
والاصباح والخواص بعضها ما كويل.

٢٠٨٧٥ - **فُطْرِيّ** Cryptogamique (F).

Cryptogamic (E).
نعت تعريفي توصف به الأصنام المتأدية عن الفطور .

٢٠٨٧٦ - **فُطْرِيّ** Fongiforme, Fongoide (F).

Fungiform, Fungoid (E).
ما كان على شكل الفطر أو هيشته .

٢٠٨٧٧ - **فُطْرِيَّات** Champignons (F). Fungus (E).

شعبة من النباتات الدنيا تنتمي إلى صف المشريات . تشمل أربع رتب وهي البشويات والنعاميات والزقيات والهاميات وفي كل منها مراتب وفصائل وأجناس وأنواع عديدة .

٢٠٨٧٨ - **فُطْرِيَّة** Baie de myrte (F).

Barry of myrtle (E).
هي حبة الآس . ج. فطس .

٢٠٨٧٩ - **فُطُور فِطَامِيَّة** Hyménomycètes

هي الفشائيات فطور من رتبة النعاميات منها الداريقون وأجناس أخرى عديدة .

٢٠٨٨٠ - **فُطُور مَعْدِيَّة**

هي الفشائيات فطيرة فطور من النعاميات .

٢٠٨٨١ - **فُطِيمَة** Adénophore (F).

هي الأفسفورة ، أطليا .

٢٠٨٨٢ - **فُطِيح** Autogame (F).

Autogamous (E).
نعت تعريفي يوصف به كل نبات اغصابه فطاحة .

٢٠٨٨٣ - **فُطِيرَة** Sanderling

هي الطيرجة ، أطليا .

٢٠٨٨٤ - **فُطِيرَكَة**

مشفر ذوات أنف .

٢٠٨٨٥ - **فُطِيمَة *** Prion (S). Prion (F).

Prion (E).
جنس طير من كليات القدم وقصيلة جليديات الماء .

أنواعها المعروفة قليلة العدد . أصلها تحت من بحار القطب الجنوبي إلى المحيط الأطلسي حتى تقوم أروية || اجسامها

ممتلئة اللد . اجنحتها مستطيلة ، لاحقة ، ذلقة .

اذنابها غشوية الشكل تتألف من ١٢ رفة . رقلها متناظرة

ضلعية ، ممتلئة الطول ، متشققة البهرة ، تعمل سطوح الماكها العليا بعض الطوام || اذنابها تختلط مع الاوتوار .

أعرف أنواعها فطيمة أريال وفطيمة مجعدة .

٢٠٨٨٦ - **فُطِيمَة أُرِيَال** Prion ariel (S).

Prion ariel (F).
نوع من الفطيمة . ثوبها الملوي إلى الزرقه الشبه المراج .

صدورها وبطنها واثنينها إلى البياض الماسجي || أصلها المحيط الأطلسي . يكثر ويوجد في زمن التناهد والخصانة

على المهادج الإفريقية والإسبانية .

٢٠٨٨٧ - **فُطِيمَة مُجَدَّة عَكَة** Prion vittatus (S).

Prion orné (F).
نوع من الفطيمة . ثوبها الملوي إلى الزرقه الزرادية المراج

يلعوا في جناحها وذنبها جميع أسود . صدورها وبطنها إلى البياض الاغبر || أصلها القطب الجنوبي وجواره .

٢٠٨٩١ - **فُطَام** Sevrage (F). Weaning (E).

انتقال لولاد الحيوانات من دور الرضاعة إلى دور الانضواء بغير الحليب .

٢٠٨٩٢ - **فُطَح** عرض في وسط الرأس .

٢٠٨٩٣ - **فُطَح ، بُع** Polliniser (F).

eo pollinate (E).
فطع وزبع وأبر : نقل شارب الطلع من متك زهرة إلى ميسامه

أو ميسام غيرها من الاوتوار .

٢٠٨٩٤ - **فُطَمَل**

قيل **الفُطَمَل** « دهر » لم يُفْطَر فيه الناس بعد . وقال أبو حمزة « هو زمن كانت الحيازة فيه رطبة » . الفارق بين المتحدين يفتر عجائزات السنين لأن الزمن التي كانت الحيازة فيه رطبة يعود إلى أوائل الحقبة السحيقة من أباج ما قبل الكمبري . راجع حياة .

٢٠٨٩٥ - **فُطَمَل** Proton

رطب مصري للدلالة على الوفرة .

٢٠٨٩٦ - **فُطَر** Champignon (F).

Mushroom, Fungus (E).
كل نبات من غشيات الريح ينتمي إلى شعبة الفطريات .

ج. فطور .

٢٠٨٩٧ - **فُطَر السَّاق** Ophiobolus (S).

فطر مجعري من أرتقيات ركب الحطبة وغيرها في أسافل سوقها فيصيب لها مرض الساق .

٢٠٨٩٨ - **فُطَر الصُّوْكَان**

هو الصفوان فطر من السميات ، أطليه .

٢٠٨٩٩ - **فُطَر الِغِمَة** Acrospore (F).

Acrospore (E).
جنس فطور مجعري تركب قم التجليات ، أي اطرافها

الثانية ، فطخيا .

٢٠٩٠٠ - **فُطَر الكَبِد** Fistuline (F).

هو الفطيرتينا فطر مأكلي من السميات . يعيش على

جلود بعض الاوتوار الخرجية في المواقع القليلة الرطبة .

وهو كبير القد ، كبدي الشكل ، حشفي اللون ، حابق القاعدة .

٢٠٩٠١ - **فُطَر المَرَجَّان** Clavira (F).

هو اللبوسية ، أطليا .

٢٠٩٠٢ - **فُطَر سَاقِ الرُّزْج** Ophiobolus graminis (S).

نوع من فطور الساق يركب سوق التجليات فطخيا .

٢٠٩٠٣ - **فُطَر مَالِطَة** Champignon de Malto (F).

هو الطرثيث ، أطليه .

٢٠٩٠٤ - **فُطَر مَرَجَّامِي** Clavira corall (F).

هو اللبوسية المرجانية ، أطليا .



فطيمة

٢٠٨٩٥ - قَعْرِيةٌ شَعْرَاءُ *

Dasyllirion acrotrichum (S). *Dasyllire cheveli* (F).
نوع من القعرية الزرقية . ساقها قصيرة . أوراقها كثيفة
التجميع طول نحو ١٥٠ سم . وتعرض نحو ١٠ سم . نصلها
جمل الخضار الزاوي ، شاك الحافة ، أصفر الشوك .
يلهي بضلة من ألين الأصفر النقيق . إزهارها إلى
الخضار البستني . تنورها يستمر طوال الصيف .



فقط

٢٠٨٩٦ - قَعْرِيةٌ مُشَارِبَةٌ

Dasyllirion serratifolium (S). *Dasyllire denté* on
sle (F).

نوع من القعرية الزرقية . ساقها تمل نحو ٣ أمتار .
أوراقها لينة متراكبة طول من ٧٥ إلى ١٥٠ سم . وتعرض
نحو ٣ سم . نصلها أخضر اللون ، أزرق المواج ، مشفاري
الحافة ، تسنيت نحو ٢ سم . سبلها الزهرية متباعدة ،
إزهارها إلى الخضار الباقع اللامع . تنورها يستمر طوال
فصل الصيف .



نفر

٢٠٨٩٧ - قَعْرِيةٌ تَجِيلِيَّةٌ

Dasyllirion graminifolium (S). *Dasyllire graminoides* (F).

نوع من القعرية الزرقية . ساقها تمل نحو ١٥٠ إلى
٢٥٠ سم . أوراقها لينة متراكبة طول نحو ١٥٠ سم .
نصلها حصي الشكل ، جمل الخضار اللامع ، قصير
الشوك المبر ، يلهي بضلة صغيرة من ألين الأصفر .
إزهارها إلى الخضار الباقع المدمم . تنورها يستمر
طوال فصل الصيف .

٢٠٨٩٨ - قَعْمٌ ، زَهْرَةُ الْعَنْكَبُوتِ

Anthericum Phalangium (S). *Phalangium Anthérie* (F).

Spider-wort (E). *Kleine Graelille* (D). *Antico* (I).
جس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الزيفقيات .
انولاه قليلة العدد تتميز بأوراقها القرصية الانتشاب
الميزابية للنصل || أحرف انولاه الزرقية من أيل .



قعرية شعراء

٢٠٨٩٩ - قَعْمٌ زَلْبَكِيٌّ الزَّهْرُ *

Anthericum liliago, *Phalangium liliago* (S). *Phalan-*
gère à fleur de lis (F).

نوع من القمم ، شعريه ثلاثة . سيقه شمراكية مرسمة تمل نحو
٣٠ إلى ١٥٠ سم . أواله قرصية الانتشاب ميزابية النصل
تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم . وتعرض نحو ٦ سم . إزهار
حامية الانتكاز حامية اللورف ، يضاء ألين تطول نحو
٢ سم . أسنيتها مقوصة || إزهاره يستمر من أيار إلى
حزيران .

٢٠٩٠٠ - قَعْمٌ مُتَشَعَّبٌ

Anthericum ramosum, *Phalangium ramosum* (S).
Phalangère rameuse (F).

نوع من القمم . ساقه شمراكية فرعاء تمل نحو ٣٠ إلى ٦٠
سم . أواله قرصية الانتشاب ميزابية النصل تطول من
٢٠ إلى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . إزهارها حامية
المرق يضاء ألين تطول نحو ١ سم . أسنيتها جالسة .
إزهاره يستمر من حزيران إلى تموز .



قعم زنبقي الزهر

٢٠٩٠١ - فَنَاءٌ ، قَعْمٌ ، قَعْمٌ ، فَنَاءٌ

Epanouissement (F). *قَعْمٌ ، قَعْمٌ ، فَنَاءٌ ، فَنَاءٌ* (E).

فنا وأقنى الشجر : تفتح نوره . ولقناه هو ساحة الإزهار
المتفتحة .

٢٠٨٨٨ - قَطْ ، فَيْسَلُ الْبَحْرِ

Tricheus (S). *Morse, Eléphant de mer, Cheval marin* (F).
Walrus (E).

جس حيوانات بحرية لينة من فصيلة الفيليات أو فيلة
البحر . له نواحل القظ الشائع والقظ البليط أو القظ
يشبه القطة لكنه أكبر جثة وأقبح منظراً . طول الذكر
نحو ٦ أمتار وله نابان مستطيلان متدليان من فكه الأعل .
أصنائه مناطق الجليد الباقع . يعيش أسراباً متوسطة العدد .
قوته الإصماك والأصداد .

٢٠٨٨٩ - قَطَبَاتٌ ، فَيْسَلَةُ الْبَحْرِ

Trichocidae (S). *Trichocidae* (F). *Trichocidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية لينة من رتبة زفصيات الافدام ،
وهي وحيدة الجنس ثنائية النوع فيلها تتجر من سباع
البحر .

٢٠٨٩٠ - قَعَائِيَّةٌ

Efficacité (F). *Efficacy, Effectiveness* (E).

٢٠٨٩١ - قَعْرٌ ، زَلْبَكِيٌّ إفرنجيَّةٌ ، زَهْرَةٌ مَحْبُوبَةٌ

Agapanthus (S). *Agapanthe, Lis africain, Tubéreuse*
bleue (F). *Blue african lily, Blue lily of the Nile* (E).
Africanische Liebesblume, Blaue Tuberosa (D).
Tuberosa turchino (I).

نبات عشبي جذموري معمور وسيد الجنس وتنتوع من
فصيلة الزيفقيات ، شعريه عديدة . أواله صفية الشكل
تطول من ٢٥ إلى ٣٥ سم . وتعرض من ١٢ إلى ١٨ سم .
شراخه يمل نحو ٤٥ إلى ٨٥ سم . يلهي بقرص من الزهر
صيوالي التجميع يمد من ١٥ إلى ٣٠ زهرة حامية اللورف
تطول من ٣ إلى ٤ سم . ألوانها تختلف مع الشعريه أكثر
فيها الأزرق والأبيض || إزهاره يستمر من تموز إلى
أب .

٢٠٨٩٢ - قَعْرِيةٌ

Dasyllirion, Bonspertes (S). *Dasyllire* (F).

جس نباتات برية وقرينية من فصيلة الزيفقيات . ألوانها
عديدة جميعها من لباتات المناطق الحارة . أوالها وسيقها
لبنية التركيب . أوراقها ضيقة النصل ، مستطيلة ،
متراكبة ، متدلية . إزهارها سفلي التجميع يرتكر حل
شمراخ متصعب مستطيل || تعيش في جميع الأترية أما
تفتحي كثرة الكلس والرطوبة والمعارض الضالية الباردة .
أحرف ألوانها وأشهرها ما يليح .

٢٠٨٩٣ - قَعْرِيةٌ بَحْرِيَّةٌ

Dasyllirion glaucophyllum (S). *Dasyllire glauque* (F).

نوع من القعرية الزرقية . ساقها تمل نحو ٤ أمتار .
أوراقها متراكبة لينة تطول من ٦٥ إلى ١٥٠ سم . وتعرض
من ١٥ إلى ٢٥ سم . نصلها بحري اللون ، شاك الحافة
المسنة . أصفر التئين . سبلها كبيرة القند منطفة الزام
الاعير . إزهارها إلى الخضار الأزرق المواج . تنورها
يستمر طوال الصيف .

٢٠٨٩٤ - قَعْرِيةٌ تَرْغُونِيَّةٌ

Dasyllirion longistimum (S). *Dasyllire tétragone* (F).

نوع من القعرية الزرقية . ساقها تمل نحو ٢٥٠ سم .
أوراقها متراكبة لينة تطول من ١٢٥ إلى ١٨٥ سم . نصلها
وباعي الزوايا يعرض نحو ٦ سم . لونه إلى الخضار الباقع .
سبلها الزهرية كبيرة القند . إزهارها إلى الخضار الباقع .
تنورها يستمر طوال الصيف .

Vertèbrés (F).

٢٠٩١٥ - **فَقَارِيَّات**

هي الفقاريات ، أظلمها .

٢٠٩١٦ - **فَقَاشُ البُنْدُقِي**

Casse-noix vulgaire (F).

طائر يلقى الحشاش ، أظلمها .

Bulle (F). Bubble (E).

٢٠٩١٧ - **فَقَاعَة**

Tétrodon (F). Puffier (E).

٢٠٩١٨ - **فَقَاقَة**

هي الفمقة ، سمكة بحرية تكثر في النيل والتيجر . وقيل الفمقة طائر (كلا) .

Eucinetus (S).

٢٠٩١٩ - **فَقَاعِدَة**

Eucinéte (F). Eucinetus (E).

جنس حشرات من فصيلة الفمقيات ورتبة غمديات الإجنسة . أنواعها المعروفة ١٢ أصلها معظم المناطق الشمالية وجبال المناطق المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة ، مبطلة ، شبه أحليجية الشكل ، تظل ٣ إلى ٧ م . رؤوسها صغيرة الجرم ، مستعرضة القطن . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية غليظة أو قلابية . كواسلها شبه مربعة . الحامدا لاسفة ، رباعية الاضاديد التحيلة القاطية . قوائمها نشيطة . أظلمها ملونة يكثر فيها البني || الجملانة منها والبرقة تعيش في الجلالة وفي الاشعاب النشرة على المواد النباتية المنحلة .

Eucinetidae (S).

٢٠٩٢٠ - **فَقَاعِيَّات**

Eucinetidés (F). Eucinetidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الإجنسة . أجسامها وأنواعها المعروفة بمصطبة العدد ، منتشرة في معظم حراج البلاد الباردة والمعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة ، شبه أحليجية الشكل ، مبطلة ، تظل ٣ إلى ٧ م . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة القطن . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية تساعية . الفصل . كواسلها شبه مربعة . الحامدا لاسفة . قوائمها نشيطة . أرساغها خماسية العقلى . أظلمها ملونة || جميعها دامتة تعيش على المواد النباتية المنحلة || أشهر أجناسها الفمقالة .

٢٠٩٢١ - **فَقَح** قح الجرو : فتح صيله .٢٠٩٢٢ - **فَقَح**

قح الشجر : أشقت عيون رقه وبدت أطرافه .

٢٠٩٢٣ - **فَقَحَة** هي حلقة الدبر .

Cuscuta à odeur suave (F).

٢٠٩٢٤ - **فَقَد**

هو انكشوت للسر ، أظلمها .

٢٠٩٢٥ - **فَقْد البَصَر** ، **فَقْدَان البَصَر**

Caligatio

Creuser (F). To hollow (E).

٢٠٩٢٦ - **فَقَر**

قَر الأرض : قفرا . والفقرة : الحفرة . ج قفر .

Anémie (F). Anæmia (E).

٢٠٩٢٧ - **فَقَر الدَّم**

عدم كفاية الدم إما من حيث تركيبه أو من حيث مقداره . أسبابه عديدة أشيعها اللل والنود في المدة أو الاماء .

Epanthe (F). Epanthous (E).

٢٠٩٠٢ - **فَقَار**

نمت تعريفي يطلق على كل ما يعيش طفيلياً على الاثمار .

٢٠٩٠٣ - **فَقَر ، قَعَم**

الفقر والقعم : ازوار الورد عندما تفتح .

٢٠٩٠٤ - **فَقُو** هو الياس ، أظلمها .٢٠٩٠٥ - **فَقْرَة**

Fragrance (F).

هي لرائحة المتحة ، يقال فقرة الطيب .

٢٠٩٠٦ - **فَقَاح**

Inflorescence (F).

قحاق وفقحة كل نبات : زهره .

٢٠٩٠٧ - **فَقَاح**

هو ذرة الربيع ، أظلمها .

٢٠٩٠٨ - **فَقَاح ، فِرْز**

Sideritis (S).

Sideritide, Siderite, Crapaudine (F). Iron wort (E). Gledkraut (D). Basilica salvatica (I).

وأحد فقا . جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة الفمقيات . مهدد المناطق الاسيوية والاروبية المعتدلة الحارة .

Spondylidae (S).

٢٠٩٠٩ - **فَقَاحِيَّات**

Spondylidés (EF). Spondyliidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الياشج الرباعية ، عادات المتعصب . أجناسها وأنواعها عديدة معظمها من المحيط الاراضي الثالثية || انتشارها يعم معظم بحار العالم أخصها بحار البلاد الحارة || أعرف أجناسها المعاصرة وأشهرها الفقاغة والفمقينة .

Spondylus (S).

٢٠٩١٠ - **فَقَاحَة**

Spondyia (F). Spondylus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الياشج الرباعية ، عادات المتعصب . وفصيلة الفقاغات . أنواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || أسدانها شبه بيضية اللون ، لاستشافية المصاريح الشائكة تملأها زعمات متباعدة الاصطالة ، دقيقة الأطراف الدرة || تعيش لاسفة بالصخور المتوسطة التعور .

٢٠٩١١ - **فَقَار الجَوْزَاء**

Baudrier d'orion (F).

فَقَار الجوزاء كواكبها ، وهي الثلاثة المستعرضة للرباسة في وسط الجوزاء . تسحبها العرب النظم وتسميها أيضاً نطاق الجوزاء ومنطقة الجوزاء ويد الجوزاء . وهي مثل في الانتظام والالتزام .

٢٠٩١٢ - **فَقَار الشَّجَاع**

فَقَار الشجاع كواكب .

٢٠٩١٣ - **فَقَارَة ، فَقْرَة**

Vertèbre (F).

Vertebra (E).

هي الفقرة ، اسطوانة عظمية صغيرة يتألف منها السند الفقري الحيواني .

٢٠٩١٤ - **فَقَارِيَّ**

Rachidian (F).

Rachidian. Spinal (E).

نمت تعريفي يوصف به ما هو مختص بسلسلة الفقار .



فَقَاة

٢٠٩٢٨ - ففترات

لفترات نجم ثير من كوكبة برج القرب .

٢٠٩٢٩ - ففركة ، ففركة

هي جزء من مادة من البقعة تضاع بسطر جديد ويسمى جديد .

٢٠٩٣٠ - ففركة ، ففركة

كل واحدة من الاسطرانات العظمية التي يؤلف جسمها السموذ الفقري . وهي صغيرة القذ متقوية الوسط تحسن الانشاع الشوكي الذي يمر في ثقبها . ج . قفاظر .

٢٠٩٣١ - ففركة

هي الحفرة المعدة لاقبال الفرس . ويقال لها الجب والجورة والفقير .

٢٠٩٣٢ - ففريات ، ففريات

قسم من المملكة الحيوانية يشمل جميع الحيوانات الفقرية التي تتجمع الى خمسة صفوف : الاسماك والصفديات والزحافات والطيور والثدييات .

٢٠٩٣٣ - ففغ ، ففغ

Lycoperdon (S). Lycoperdon, Vases-de-loup (F). Devil's snuff-box, Earth-ball, Puff-ball (E). Sea-bling (D). Lycoperdon, Vascia lupaja (I).
جنس ففغ من فصيلة الففقيات ورتبة الحمانيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها مأكولة لكنها متوسطة الصنف ويجدر انذارها واستعمالها قبل دغولها في طور الادراك لانها تصبح اذ ذاك جلدية السج .

٢٠٩٣٤ - ففقي

جنس طير من فصيلة الحمانيات . انواعه اربعة جميعها مربية القامة ، مجهزة ، مستطيلة الاجنحة الدقة ، صغيرة الاذنان والارباع ، مستطيلة الاصابع ، متراكبة الاخوان السعد المالحج || واحدنا ففغ . اطله .

٢٠٩٣٥ - ففقيات

Lycoperdaceae (S). Lycoperdaceae (E).
فصيلة ففغ مائية مملوكة توجد في جميع انطار العالم . تتميز بفسهما الاسفنجية التي تبدو خرداء اللون ثم تحترق مع اقترابها من الادراك الى السرة والصلابة او الرشوة وينتفاها تكتسب رائحة خاصة يسببها اللوق .

٢٠٩٣٦ - ففقل

الفقل هو الربيع . يقال ارض كثيرة الفقل وزراعة جيدة الفقل .

٢٠٩٣٧ - ففقل

فقل البير : ذراه وبق دقه بالفلقة .

٢٠٩٣٨ - ففقل

سمكة مسنحة لا تتركز وهي صغيرة قنعا كاصح (قناوس)

٢٠٩٣٩ - ففق ، ففقم

Museau du chien (F). ففقم
الفقم والفقم طرط سفل الكلب . (F). Muzzle of the dog (E).

٢٠٩٤٠ - فففة ، فففة

Phoca (S).
فففة حيوانات لبونة مائية من فصيلة الففقيات . انواعه عديدة منظها يعيش في بحار البلاد الشمالية وبسها في بحار البلاد للمتلة منها المتوسط || اجناسها كبيرة القذ ففة طولها يراوح بين ١٥٠ و ٦٥٠ سم . اولها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسمر الكسني المالحج الابيض والاربد . رؤوسها وظهورها اعين من جوانها . بطنها الى السفل الابيض المالحج . رؤوسها خفيفة . اصنافها وظواهرها قصيرة ذكورها اكبر جنس من انثاها || قنبا لا يملك والفشريات والرعويات . الاثني ففغ جروا واسدا في العام ففك في الاخر ايار || ففاد من اجل جلدها وزنها ومنهم من اكل اللحم واسفل الاسماء والاسلام .

٢٠٩٤١ - فففة مفتوحة

Phoque à capuchon (F).
حيوان بحري يسمى سففور ، اطله .

٢٠٩٤٢ - ففقيات

Phocidae (S).
ففقيات حيوانات لبونة مائية من رتبة زفقيات الاسلام . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الفففة .

٢٠٩٤٣ - ففقوس ، ففقوس

هو الففقا ، اطله .

٢٠٩٤٤ - ففقوس الحميمير

هو الففقا البري ، اطله .

٢٠٩٤٥ - ففقركة

Achinea, Akéna (F).
هي الففركة الففيرة المتصلة الجث من الجباب .

٢٠٩٤٦ - ففقيش ، ففقيش

Vichania somnifera (S). Coqueret somnifère (F). Winter cherry (E). Vitis (I).
نبات عشبي حولي بري من الففقيات الباذنجانيات . ساه ففاه تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه متعاقبة متصلة كبر القذ للثني او خاسي التفريش . اثماره ابضة الارنكار ، ثنائية او لثالية التجميع ، زرقاء اللون . ثماره متنية ، كروية ، صغيرة القذ ، بتسجسة اللون لما استعمالها الطبي وتعتبر من المتوتات .

٢٠٩٤٧ - ففقي الحننج

Phaps fumachelle, Colombe varta
طائر من الففقي وفصيلة الحمانيات . طوله نحو ٣٥ سم . رأسه وظهوره الى السرة الخفيفة ، زود ابيض اصفر ، صدوه الى الخفوة ، بطنه الى الربية ، اجنحته ممتدة ورفعة بالاعصر التحاسي الاسفل للمالحج . افضكه عني الانتشاب والوسط ، وبداي الاطار . سفقا اسود اللون . قوامه حو . يالف البراري وادغال الحننج قريبا الشاع ويباري في الله . قرته الحبري حل اعتلاها . يثن في الاشجار الخفيفة الارتفاع اناء تبيض ففشتين مرتين في السنة .

٢٠٩٤٨ - ففقيع الغلاب

Laucosarcia (F).
طائر من الففقي وفصيلة الحمانيات . طوله نحو ٣٨ سم . ثوبه لوب ففقي الحننج ، زود خال من اللباس . مثاقه اسر اللون سفلي الحنجر || يالف الثابات والاحراج . يثن في الاشجار الباسقة .



ففغ



فففة



ففقي الحننج

٢٠٩٥٨ - فُلٌّ * ، يَسْمِين زَيْتِي

Jasminum sambac, Mogorium sambac (S). Jasin sambac, J. d'Arable (F). Arabian Jasmine, Double Jasmine (E). Arabischer Jasin, Sambac Jasin (D). Mugarino doppio, Gelsomino d'Arabia (I).

يَسِين لِبَاتَات زَيْتِيْنِيَّة ، سَبْرُوْتِيَّة ، مَعْمَرَةٌ مِنْ سَبَلِ الْيَاسْمِينِيَّاتِ وَصُفِيَّةِ الزَيْتُونِيَّاتِ . انْوَاهُ اَرْبَعَةٌ جَمِيعُهَا جَنِيَّاتٌ فَرْعَاهُ مَعْمُورَةٌ لَقَدْ تَمَلُّوْا مِنْ ٥٠ اِلَى ١٥٠ سَم . اَوْرَاقُهَا كَامِلَةٌ مُتَقَابِلَةٌ يَبْضِيَةُ الشَّكْلِ . نَافِلُهَا جَانِبُ الصَّفَةِ ، مَالِسُ الْبُشْرَةِ شَدِيدُ الْمَطَرِ الْقَوَاجِ || اَزْهَارُهَا بِيَضَاءُ الْوَيْلِ ، ذِكِّيَّةُ الْعَرَفِ الْمَطَرِ الْقَوَاجِ || اَشْهُرُ انْوَاهُ الْفَلِّ الْمَكْبُوسِ الْيَتِيْزُ بِاَزْهَارِهِ الْكَبِيْرَةِ الْمَتْرَاكِئَةِ الْبِلَاتِ الْعِدِيْدَةِ الْمُسْتَرْسِفَةِ . ثُمَّ الْفَلِّ الْطَرِيْقُ وَهُوَ صَنِيرُ الْاَزْهَارِ ، خَاسِيُ الْبِلَاتِ الْمُنْدَغَةِ || وَالْفَلِّ يَتَكَثَّرُ بِالتَّعْمَلِ وَزُرْعَاهُ لَا تَطْلُبُ عَنَاءِيَّةً خَاصَةً .

٢٠٩٥٩ - فُلٌّ * ، فُلِيل

Faille, Barle, Géoclase, Paraclose (F). Fautz (E). تصدع في الصخور يسبب انشقاقها .

٢٠٩٦٠ - فُلٌّ حَوْصِيٌّ (F). Fosse d'affondrement (F). Trough fault (E).

٢٠٩٦١ - فُلٌّ عَادِي (F). Faille normale (F). Normal fault (E).

٢٠٩٦٢ - فُلٌّ قَافِر (F). Faille béante (F). Open fault (E). تصدع واسع الفج .

٢٠٩٦٣ - فُلٌّ مَدْرُج (F). Faille à gradins (F). Step fault (E). تصدع متتابع الشقوق .

٢٠٩٦٤ - قَلَاةٌ ، قَلْبِيَّاتَةٌ ، سَهْبٌ Steppe ج. فَلَواتٌ رِيَّافِيَّةٌ وَسَهْبِيَّةٌ . سَهْلٌ مَرَامِيَّةٌ الْاَطْرَافَ شَاسِعَةٍ اِلَى صَحْرَاوِيَّةِ الْبُيُوتِ .

٢٠٩٦٥ - قَلْبِيٌّ (F). Steppique (F). Steppical (E). ما هو غصص بالقلاة كالسطح والنبوت .

٢٠٩٦٦ - قَلْبِيَّةٌ

Charnus fossoyeuse, Charnus rigoleuse (F).

٢٠٩٦٧ - قَلْبُوح (F). Laboureur, Cultivateur (F). Husbandman, Cultivator (E). من ماث حرت التربة وزرعها .

٢٠٩٦٨ - قَلْبَاحَةٌ ، حَرَاثَةٌ (F). Labourage (F). Tillage, Ploughing (E). شق التربة وقلبها بالحرث .

٢٠٩٦٩ - قَلْبَارِيْس (F). Phalaris (F). هو البقشة نبات عشبي علوي من النجيليات .

٢٠٩٧٠ - قَلْبَارِيْسٌ مُعْتَكِدٌ (F). Phalaris noueux (F). هو البقشة المقدية ، نبات عشبي علوي من النجيليات .

٢٠٩٧١ - قَلْبَاسٌ (F). Pallas (F). Pallas (E). اسم علم لسطوري لسيار بين المشتري والمريخ اكتشفه ١٨٠٢ عام .

٢٠٩٧٢ - قَلْبَاطٌ (F). Voltmètre (F). Voltmeter (E). مقياس الفولط .

٢٠٩٤٩ - فَنِيْعُ الْمَتَاعِ *

Géophae, Colombi-Caille (F). طائر من الفصيلة الحماميات طوله نحو ٢٤ سم . صغير المنقار ، قصير الجناح المستدير ، مستطيل الأبراج . لونه ثوب الفنيع للسمي لكنه مادم للكشفة ومائل من ليفة الحمران . وهو قريب الشبه من السباقي || يَأْتِي الْمَتَاعُ وَالرَّاسِي . يَنْتَشِرُ اَلْصَوْفُ فِي التَّرْبَةِ بَيْنَ الْاَدْنَاءِ وَالْاَحْشَابِ الْكَثِيْفَةِ .



فنيع المتاع

٢٠٩٥٠ - فَنِيْعٌ عَدَاقِيٌّ ، يَحْمُومٌ

Phaps lophotea, Colombe polgarde (F). طائر من الفصيلة رُفِيصِيَّةِ الْهَامِيَّاتِ . طوله نحو ٣٣ سم . يتميز بكشفة مستطيلة تملأ مؤخر الرأس . رأسه وصنقه ومصدره وبلبله اِلَى الْرَبْدَةِ الْرَّادِيَّةِ . يَمْلِكُ مَقْدَمَ صَدْرِهِ بَقْمَةً حُمْرًا كَالْبُيَاضِ مِنْ اَلْمِمْ . ظُهُورُهُ زَيْتَوِيٌّ ، اِجْنَتُهُ اِلَى اَلْخُضَارِ اَلنَّحَاسِيِّ الْمُوْزَنُ بِالْاَبْيَضِ . مَقْبَلُهُ اسود . قَوَامُهُ حُرٌّ || يَأْتِي ضَافًا اَلْاَنْهَارَ وَالْمَسْتَنَاتِ . قَوِيَّةُ الْخَوِيْبِ . يَنْتَشِرُ فِي الْاَشْجَارِ وَالشَّجَرِيَّاتِ الْكَثِيْفَةِ . اِنَّهُ يَنْفِيضُ يَدَيْتَيْهِ .

٢٠٩٥١ - فَنِيْلِيَّةٌ * ، جَوْزُ الْاَنْبِي (S). Févillée, Avila, Noix de serpent (F). Nhandroba (E).

يَسِينُ لِبَاتَاتٌ جَنِيَّةٌ عَادِيَّةٌ ، ثَنَائِيَّةُ الْمَسْكَنِ مِنْ فَصِيْلَةِ الْفَرْصِيَّاتِ . اَنْوَاهُا الْمَعْرُوفَةُ سَمِيَّةٌ مَشِيَّتًا مَعْظَمُ مَناطِقِ الْاَبْلَادِ اَلْحَارَةِ وَالْاَسْتَوَالِيَّةِ || سَوِيْقُهَا عَادِيَّةٌ مُسْتَطِيلَةٌ . اَوْرَاقُهَا مَسْتَقَّةٌ ، كَفِيَّةُ الشَّكْلِ ، خَاسِيَّةُ اَلتَّنْفِيصِ . اَزْهَارُهَا مَعْمُورَةٌ اَلتَّصْبِيحِ ، اَزْهَارُهَا خَاسِيَّةُ الْبِلَاتِ اَلصَفْرِ . ثَمَارُهَا تَلْمِيٌّ جَوْزُ الثَّيْبَانِ وَهُوَ بَلْبِيْقِيَّةُ الشَّكْلِ ، صَفِيْرَةٌ اَللَّهْ ، مَالِسَةُ السَّطْحِ ، تَقْلُبُ بَعْضُ الْبُلُورِ الْمُرَكَّبَةِ عَلَیْ غُورِ الثَّمَرَةِ الْاَتْلَالِ الْاَسْلَفِ . || يَسْتَخْرِجُ مِنْ بَزْوَرِهَا مَادَّةٌ زَيْتِيَّةٌ لَهَا اسْتِعْمَالُهَا الْبَلِي .



فيلة

٢٠٩٥٢ - فَنَكٌ (F). Mâchoire (F). Jaw (E). احد جزئي الفم حيث غرزت الانسان وما فكان علوي وغلي .

٢٠٩٥٣ - فَنَكٌ (F). Mœdile (F). Maxilla (E). هما في الحشرات فكان عريضان متساويان ، مركزهما في مقعدة الرأس بين التآخير ، يحصلان الملاصق الفكية .

٢٠٩٥٤ - فَنَكَاكَةٌ مِنْ اَلْاِنْمَاطِ اَلزَّرَاعِيَّةِ . رَاسِحٌ تَعْمَرِيٌّ .

٢٠٩٥٥ - فَنَكَّةٌ ، اِكْتِيلِيلٌ شَمَكِيٌّ

Couronne boréale (F). Corona borealis (E). الْفَنَكَّةُ اَوْ الْاِكْتِيلِيلُ اَلثَّالِي كَوْكَبِيَّةٌ يَهْرُومُ شَمَالِيَّةُ الْمَقْبِ مَرْكَزُهَا بَيْنَ اَلْبُورِ وَالْقَمِيَّانِ وَالْجَانِي . عَدَدُ نَجْمِيَّاتِهَا ثَمَانِيَّةٌ وَهُوَ مُسْتَدِيرَةُ الشَّكْلِ وَفِي اسْتِدَارَتِهَا ثَلَاثَةُ اَللَّكِ يَقَالُ لَهَا اَيْضًا « قَعْمَةُ الْمَاكِيْنِ » . وَفِي نَجْمِيَّاتِهَا اَلثَّانِيَّةُ الْمَرْبُوعِيَّةُ نَجْمٌ ، مِنْ اَلْمَرْبُوعَةِ الْقَرَابَةِ ، يَدْعُو « نَجْمُ الْفَنَكَةِ » . وَنَجْمٌ مِنْ اَلْمَرْبُوعَةِ السَّادَةِ يَدْعُو « نَجْمُ الْقَعْمَةِ » .



فلك

٢٠٩٥٦ - فَنَكَشٌ (F). Entorse (F). Sprain (E). زوْعٌ اَلْمَفَاصِلِ وَرِيْعُهَا مِنْ مَوَاضِعِهَا .

٢٠٩٥٧ - فَنَكِيٌّ (F). Maxillaire (F). Maxillary (E). ما هو غصص بالفلك .



فُلَّحُوسُ الْإِبْرَامِ

Philepizus (S).
Philépizus (F).

مَاطَرٌ وَسِيدٌ الْجَنَسُ وَالنَّوْعُ مِنَ الْجِلْمِ شُرُوبَاتُ الْمَنَاقِبِ وَصِلَةُ النَّجَاحَاتِ. أَصْلَاهُ بَعْضُ مَنَاطِقِ افْرِيقَةِ الشَّرْقِيَّةِ وَبِزِيرَةِ مَسْفَرٍ ۥ ثَوْبُهُ إِلَى الشَّعْمَةِ السَّوَادِ. رَأْسُهُ وَزَوْرُهُ وَاحِلٌ صَدْرُهُ إِلَى السَّعَةِ الْبَاقِيَةِ. يَطْلُقُ رَأْسَهُ وَأَبَاهُ مَرْقُوعٌ ۥ حَتَّى تُحْمَرُ الْحَشْرَاتُ الصَّغِيرَةُ وَالنَّمْلُ وَالْبِلُورُ. يَنْثَنُ عِنْدَ الشَّجَرَاتِ الْكَثْلَةِ. الْأَشْيُ خَمْسُنَ نَحْوِ ٥ يَبْغِيثُ مِنَ مَرْثِيٍّ إِلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فِي الْحَبْلِ. الْذَكَرُ يَبْغِيثُ لَهَا الْغَنَاءَ.

٢٠٩٨١ - فُلَّحَانٌ

مَاطَرٌ زَعَمُوا أَنَّهُ يَحْمِدُ الْقِرَدَةَ (الْبَانِ).



فُلَّحُوسُ الْإِبْرَامِ

Répärir (F).
To divide, To distribute (E).

٢٠٩٨٢ - فُلَّجٌ، فُلَّجٌ
فُلَّجُ الْأَرْضِ الزَّرَاعَةُ : نَحْمَا ۥ فُلَّجُ الْمَالِ يَبْغِيهِ : قَسَمَهُ بِالْمَتَلَوِيِّ.

Molcé (F). Half (E).

٢٠٩٨٣ - فُلَّجٌ

فُلَّجُ كُلِّ شَيْءٍ : نَصْلُهُ.



فُلَّحُوسُ الْإِبْرَامِ

Fente branchiale (F).
Branchial fissure (E).

٢٠٩٨٥ - فُلَّجَةٌ
الْقَلْبِيَّةُ : سَاقِيَةُ الزَّرْعِ. ج. فُلَّجَانٌ.

٢٠٩٨٦ - فُلَّجَةٌ
Blatomère (F). Blatomera (E).
أَسْمُ لَعْرَيْنِ يَمْلِكُ عَلَى كُلِّ بِلَسْتِيَّةٍ أَوْ بِيصِيَّةٍ مِنَ الْبُوصِيَّاتِ لَمُتَّاقِيَةٍ تَنْسَكِمُ الْبَيْضَةَ فِي طَوْرِ نَحْمَةِ الْخَنَازِيرِ الْعَادِي.



فُلَّحُوسُ الْإِبْرَامِ

Labourer (F).

٢٠٩٨٧ - فُلَّجٌ، فُلَّجٌ
شَقَّ الْأَرْضَ أَوْ قَلَّبَهَا بِالْمَحْرَاثِ.

٢٠٩٨٨ - فُلَّحَسٌ
الْكَلْبُ الْمَسْنُ وَالْبَنُ أَيْضاً.

Hemigalea (S).
Hémigale (F).

٢٠٩٨٩ - فُلَّحُوسٌ
جِلْسُ حَيَوَاتِنَ لِاحَةٍ مَفْرَسَةٍ مِنَ فَصِيلَةِ الْفَزِيَادِيَّاتِ. مَوْطِنُهَا مَلَقَةُ وَصُوتُهَا وَبُورُوتِي. تَأْتِي الْأَجْرَاجُ وَالْقَانِطُ. سَرَّحَهَا دَجُورِي. مَلْبَنُهَا الْحَيَاتِي فَرْدِي لَا يَجْمَعُ إِلَّا فِي زَيْنِ الْوَدَّاقِ وَالْكُومِ ۥ أَجْسَامُهَا مُسَطَّلَةٌ الشَّكْلُ، حَيْثُهَا تَطْلُقُ مِنَ ٨٠ إِلَى ٩٠ سَم. بِمَا لَيْهِ الْقَنْبُ. رُؤُوسُهَا زَائِلَةٌ. إِعْطَامُهَا ذَائِلَةٌ. عَيْنُهَا صَغِيرَةٌ. أَذْنَاهَا دَقِيقَةٌ جَالِسَةٌ. قَوَائِمُهَا صَغِيرَةٌ. أَذْنَاهَا مُسَطَّلَةٌ جِلَّةٌ. وَبِهَا قَصِيرٌ، مَتَوَسِّطُ النَّمْرِ. الْوُجَاهُ إِلَى الشَّهْبِ الْفَقْرَاءُ يَمْلِكُوا تَجْلِيْعُ مَتَرَفِيٍّ أَسَدٍ أَوْ تَجْلِيْعُ كَسَنِيٍّ وَفَقَّ الْبَانِيَّةِ إِلَى النَّوْعِ ۥ قَتَبَاتُهَا مِاسْطَعَاتُ إِلَيْهِ سَيْلًا مِنَ الْحَيَوَانِ وَالطَّيْرِ وَالْإِنْسَانِ وَالزَّرْعِ. نَوَاعِلُهَا الْمَرْوُفَانُ :

٢٠٩٩٠ - فُلَّحُوسٌ مُجَدِّعٌ

Hemigalea Hoesi (S). Hémigale de Hoes (E).

سَرَّحَهُ جِبَالُ بُولِيورِي.

٢٠٩٩١ - فُلَّحُوسٌ مُجَدِّعٌ

Hemigalea Hardwicki (S). Hémigale zébée (F).

سَرَّحَهُ مَلَقَةُ وَصُوتُهَا وَبُولِيورِي.



فُلَّحُوسٌ



فُلَّحُوسٌ

Polycotylédon (F).
Polycotylédon (E).

٢٠٩٧٣ - فُلَّحٌ
مَتَدَدُ الْفُلَّحِ.

٢٠٩٧٤ - فُلَّحَاكَةٌ
Astronomie (F). Astronomy (E).

يُمِىءُ عِلْمُ الْفُلَّحِ، عِلْمُ يَبْغِيثُ فِي الْأَجْرَامِ الْبَلَوِيَّةِ ۥ مِنْ حَيْثُ نَظَرُ دُرُوبِهَا وَإِبْعَادُهَا وَزَاكِبُهَا الْمُقَدَّرَةُ وَالْقَوَائِنُ الَّتِي تَقَرُّ ظَوَاهِرُهَا الْمُنْتَظَرَةُ.

Phyllobius (S).
Phyllobie, Coupe-bourgeois (F).

٢٠٩٧٥ - فُلَّيْبُوسٌ
جِلْسُ حَشْرَاتٍ نَاهِيَةٍ مِنَ فَصِيلَةِ الْبُوصِيَّاتِ. أَنْوَالُهُ عَدِيدَةٌ تَرْكِبُ مَعْطَرِ الْإِبْرَامِ الْمَشْرُوعَةِ وَالْمَرْجِيَّةِ. جَمِيعُهَا صَغِيرَةٌ أَتَقَدُّ طَوِيلًا يَرَاوِجُ بَيْنَ ٤ وَ ٧ سَم. أَجْسَامُهَا سَهِيْفَةٌ الْتَشَارُ سَهِيْفَةٌ لِلْمَاجَةِ. أَمَّا كَمَا غِلْظَةُ الشَّكْلِ قَصِيرَةٌ أَلَدَّ مُسْتَقْبِيَةِ الْإِنْتِشَابِ. يَكْثُرُ وَجْهِيهَا فِي الرَّيْعِ. يَمْلِكُهَا تَبِيْشٌ فِي الْأَرْضِ عَلَى الْمَوَادِّ الْعَصَوِيَّةِ حَتَّى أَكْثَالُ طَوْرُهَا الْبَرِّي. أَغْصَارُهَا مَحْصُورَةٌ بِمَا تَقْتَرِفُهُ ۥ الْحَشْرَاتُ الْكَامِلَةُ، مِنْ أَشْيُ قَرَضِ الْبَرَامِ وَأَسْرَافِ الْأَوْرَاقِ.

٢٠٩٧٦ - فُلَّيْبُوسُ الْإِبْرَامِ
Phyllobius pyri (S). Phyllobie du poirier (F).

٢٠٩٧٧ - فُلَّيْبُوسُ الْإِبْرَامِ
Large green weevil, Pear leaf eating weevil (E).
Breiter Birnengrünrüssler, Grünrüssler (D).

نَوْعٌ مِنَ الْفُلَّيْبُوسِ. مَرْثِيَةُ الْإِبْرَامِ الْمَشْرُوعَةِ أَجْسَامُهَا خَضِرَاءُ. طَوْلُهُ يَرَاوِجُ بَيْنَ ٥ وَ ٧ سَم. ثَوْبُهُ إِلَى الْخُضَارِ الْمَلْهَبِ. ظَهْرَانُهُ كَثِيرُ التَّخَطُّطِ. مَدْبَهُ أَسْمَرُ الْخُضَارِ يَأْتِي الْمَاجَةِ. مَتَكُهُ قَصِيرٌ أَتَقَدُّ بِأَلَدَّ التَّخَدِيدِ. زَبَانُهُ إِلَى الشَّهْبَةِ الْخَضِلَةِ. يَسْرَحُ فِي الْبَارِ، يَكْثُرُ فِي أَوَّلِ الرَّيْعِ. قُوَّةُ أَطْرَافِ الْأَوْرَاقِ الْقَتْلِيَّةِ لَا يَمُوتُ مِنَ الْبَرَامِ.

٢٠٩٧٧ - فُلَّيْبُوسُ الْبُورِ
Phyllobius betulae (S). Phyllobie du bouleau (F).

نَوْعٌ مِنَ الْفُلَّيْبُوسِ. مَرْثِيَةُ الْإِبْرَامِ الْخَرْجِيَّةِ أَجْسَامُهَا الْبُورِيَّةُ. طَوْلُهُ يَرَاوِجُ بَيْنَ ٤ وَ ٦ سَم. ثَوْبُهُ إِلَى الْخُضَارِ الْأَخْضَرِ. ظَهْرَانُهُ مَبْمَرٌ السَّهْفِ وَالْمَلْبِ الْمَتَصَبِّ الْفَقِيرِ. زَبَانُهُ وَسِيقَانُهُ وَأَسْرَافُهُ إِلَى الصُّلْبِ الْخَضِلِ. مَتَكُهُ ضَبِيقٌ الْهَرَفِ، حَادِمُ التَّخَدِيدِ ۥ يَسْرَحُ فِي الْبَارِ. يَكْثُرُ فِي أَوَّلِ الرَّيْعِ. قُوَّةُ الْأَوْرَاقِ الْقَتْلِيَّةِ.

٢٠٩٧٨ - فُلَّيْبُوسُ الْإِبْرَامِ
Phyllobius oblongus (S). Phyllobie oblongue (F).

٢٠٩٧٩ - فُلَّيْبُوسُ الْبُورِ
Leaf eating weevil, Brown leaf weevil (E).
Gemeiner Blattkäfer, Schmalbauch, Obstbäume-grünrüssler (D).

نَوْعٌ مِنَ الْفُلَّيْبُوسِ مَرْثِيَةُ الْإِبْرَامِ الْمَشْرُوعَةِ. طَوْلُهُ يَرَاوِجُ بَيْنَ ٤ وَ ٦ سَم. ثَوْبُهُ إِلَى السَّوَادِ الْأَخْضَرِ. ظَهْرَانُهُ خَضِرٌ السَّهْفِ الْفَقِيرِ. يَسْرَحُ فِي الْبَارِ. يَقْتَسِمُ الْبَرَامِ وَالْأَوْرَاقِ.

٢٠٩٧٩ - فُلَّيْبُوسُ الْبُورِ
Phyllobius argentatus (S). Phyllobie argentée (F).

نَوْعٌ مِنَ الْفُلَّيْبُوسِ مَرْثِيَةُ الْإِبْرَامِ الْخَرْجِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَالِهَا طَوْلُهُ يَرَاوِجُ بَيْنَ ٣ وَ ٥ سَم. ثَوْبُهُ إِلَى السَّوَادِ الْفَقِيرِ يَمْلِكُهَا مَوَاجِجٌ قَصِيْرَةٌ. زَبَانُهُ وَسِيقَانُهُ وَأَسْرَافُهُ مَحْلِيَّةٌ الْوَرْنُ. مَتَكُهُ عَرُوبِيٌّ الشَّكْلِ غِلْظَتُهَا الْخَضِلَةُ ۥ يَسْرَحُ فِي الْبَارِ. يَكْثُرُ فِي أَوَّلِ الرَّيْعِ. قُوَّةُ الْبَرَامِ وَالْأَوْرَاقِ الْقَتْلِيَّةِ.

٢١٠٠٥ - **فِلْتِي** (F). Voltaique (F). Voltaique (E).
نمت توصف به الكهرباء. الفلطة المصدر .

٢١٠٠٦ - **فِلْتِيَة** (F). Voltage (F).
هو فرق الجهد بين طرفي السلك الموصل . وهو مقدار
الفلط اللازم لتشغيل آلة ما .

٢١٠٠٧ - **فِلْتَت** (S). Valvata (S). Valvate (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأبريل
وصفيلة الغلفيات. أنشائه المعروفة قليلة المدد منتشرة
في بعض بحار البلاد الباردة || أصدانها حلزونة ، مبطنة ،
شبه مستديرة الشكل يكثر فيها اللون الأبيض .

٢١٠٠٨ - **فِلْتِيَات** (S). Valvatidae (S). Valvatides (F). Valvatides (E).
نفسية حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأبريل
أصنافها الألبانيم . أجناسها وأنواعها المعاصرة المعروفة
قليلة المدد منتشرة في معظم بحار البلاد الباردة والمنسوبة
نحو الباردة || أصدانها متباينة الانحناء يكثر فيها
التخطيط والاستدارة || أعرف أجناسها الفلست .

٢١٠٠٩ - **فِيلِل** (S). Piper (S).
Poirier (F). Pepper (E). Pfeffer (D). Pepe (I).
جنس نباتات مختلفة الإحجام معمرة من فصيلة الفلفلليات.
أنواعه نحو ٦٠٠ أصنافها المناطق الحارة من المالين القديم
والجديد . معظمها شجيرات ونباتات برية متسلقة وريشها
زراعي وتربني . أوراقها متقنة متناحية ، نصلها جلدي
الصفحة . الثمارها محورية الارتكاز ، قدية التجميع ،
متدلية . ثمارها كروية الشكل ، صغيرة القدر يكثر فيها
اللون الكحلي ثم الجاوي || أشهر أنواعه ما يتبع .

٢١٠١٠ - **فِيلِل أَحْمَر** هو الفليفلة ، أظلم .

٢١٠١١ - **فِيلِل أَسْوَد** ، **فِيلِل عَطِر**
Piper nigrum, P. aromaticum (S). Poirier noir (F).
Black pepper plant (E). Schwarzer Pfeffer, Gemeiner
Pfeffer (D). Pepe nero, P. aromatico, Pevare (I).
نوع من الفلفل وهو شجيرة زراعية متسلقة ، حوائقها غليظة
تنمينا حل الارتقاء والتثبث || ثمارها حارة مشهورة
تستعمل في الطعام .

٢١٠١٢ - **فِيلِل الصكالية** (S). Agnus castus (S).
هو الأذنة والقرصاد وكف مريم ، النج .

٢١٠١٣ - **فِيلِل الماء** ، **زَجَجِيل الكلاب**
Polygonum hydropiper (S). Cusage, Poivre d'eau,
Piment d'eau (F). Water pepper, Lake weed, Biting
persicaria, Cusage (E). Pfeffer-Knöterich (D). Polli-
gono piperino, Pepe d'asino, Polygono acre (I).
نبات عشبي بري من فصيلة البيلطليات . يعيش في
المتنق . ساقه مقعدة . أوراقه وجلودره سريفة الطعم كانت
تستعمل قديماً في الطب .

٢١٠١٤ - **فِيلِل حُلُو** ، **فِيلِل إفرنجي**
Pimenta (S). Pimenta, Piment des anglais, Poivre
de la Jamaïque, Tousse-épice (F). Allspice, Pimento
(E). Pimentbaum, Pimentmyrte (D). Pimento (I).
شجرة برية وزراعية من فصيلة الأسيات . مهدا البلاد

٢٠٩٩٢ - **فِلْدَة** (F). Phyllode (F).
ورقة عرضية ناتجة من شلوة جسوري . ج فلد .

٢٠٩٩٣ - **فِلْدَة سَبَاة** ، **فِلْدَة سِكِر** (F). Feldspath (F). Feldspar (E).
هي صوانات الألبين مع إحدى القواعد القلوية كالبوتاس
والصوديوم والكلس والميزا ... || يكثر وجودها في الصخور
الأصلية والبركانية . وهي تتألف مع الطلق والمرو مواد
الأميل البلورية .

٢٠٩٩٤ - **فِلْدُوس** ، **فِلْدُوس** (F). Phyllozoa (S). Phyllozoa (F). Phyllozoa (E).
بصلة صغيرة معمرة من فصيلة الفلتيات . مهدا بعض
جبال حوض البحر الأبيض المتوسط . ساقها فرعاء تملأ
من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها كثيرة المدد ، صغيرة القدر ،
تطويل نحو ١٠ م . وتفرس نحو ٢ م . نصلها مائلة ،
خضراء اللون ، مستندة الحمار . أزهارها صوانية التجميع .
أثمارها كبيرة جلجلة الشكل ، مستطيلة المالحق الخلفية
الانقشار . لنوا إلى الزينة البفسجية . توجعها خاسية
الاستان . كما يراها خاسية المصارع || تنويرها يستمر
من حزيران إلى آب .

٢٠٩٩٥ - **فِلْدَر** ، **فِلْدَر** (F). Métal (F).
هو المعدن ، أظلم .

٢٠٩٩٦ - **فِلْدَر التواليس** (F). Bronze de cloche (F). Bell-metal (E).
مزيج من نحاس ووزنك وأحمد وقصدير يستعمل في صناعة
الاجراس والتواليس .

٢٠٩٩٧ - **فِلْدَرَات قَلْبِيَة** (F). Métaux alcalins (F). Alkaline metals (E).
٢٠٩٩٨ - **فِلْس** (F). Squamula (F). Squamula (E).
فلس ج فلرس هي الحراشف الصغيرة التي تغطي جلود بعض
الاسماك أو رواشن بعض الحشرات .

٢٠٩٩٩ - **فِلْسَا** (S). Vais (S).
نظر مجبري من اللبليات يدعى ذئب ، أظلم .
٢١٠٠٠ - **فِلْسِي** (F). Lépidote (F). Lapidot (E).
نمت تعريفي وهي يطلق على الإغشية النباتية الحراشفية
البشرة .

٢١٠٠١ - **فِلْسِي** (F). Felistic (F). Felistic (E).
نمت تعريفي يطلق على الآربة والصخور الفلستية التركيب .

٢١٠٠٢ - **فِلْسِيَة** (F). Felisio, Pétrosilex (F). Felisio (E).
طبقات صخرية ثوارة نحيضة متجانسة لا قياسية السمك .

٢١٠٠٣ - **فِلْسِي** ، **فِلْسِي** (F). Felistic (F). Felistic (E).
يقال ضرور فليسية ورية فلدا .

٢١٠٠٤ - **فِلْط** (F). Volt (F).
هو رعدة هيدرو الجهد ، يمر حته بفرق الجهد بين نقطتين
من سلك موصل إذا كان الجهد الذي يؤديه الكولوم بين
هاتين النقطتين يساوي جولاً واحداً . ج فلطام .



فلت



لفل أسود



نفل الماء



نفل حلو



فلك البروج بأقسامه وأرقامه وعلاماته وأسمائه وصوره وشهوره



نفل عرق الذهب



نفل كناية



فكر



فلكوس



فلكي

الشمس الظاهر بما فيه النجوم وتلقى الثوابت. وهو منطقة سماوية عرضها نحو ١٨ درجة تطلو الفضاء بموازاة مدار الشمس. وتقسّم إلى قسمين، البروج الصاعدة والبروج الهابطة. فالصاعدة تتألف من ستة بزرج والمهابطة كذلك. وهي باسماؤها من القرب إلى البُعد: الحمل، الثور، القنطورين، السرطان، الأسد، العقول، الميزان، المقرب، الرامي، الجدي، القدر، الحوت. أما البروج الصاعدة فهي الجدي والقدر والحوت والقنطورين والثور والحمل. والبروج الهابطة هي السرطان والأسد والعقور والميزان والمقرب والرامي.

٢١-٢٤ - فلك - اطلب مدلو.

٢١-٢٥ - فلك - Arché (F). هي أم الخلول، اطلبها.

٢١-٢٦ - فلكوس * - صبر وركي

Phyllocactus (S). Phyllocactus (S). جنس نباتات لحية مبرمة من الصباريات. أنواعه عديدة أصلها البلاد الاستوائية. سيقانها أوراق تتباعدة مفصصة وغنضة. أزهارها كبيرة القند مستطيلة البتلات البيضاء. ثمراتها تختلف مع أنواعها منها الأبيض والوردي والارنجي والقرمزي. ثمارها حامضة الطعم مأكولة. أشهر أنواعه الأريزية:

Ph. à grandes fleurs (F). فلكوس كبير الزهر
Ph. crénéle (F). فلكوس مفرغ
Ph. anguleux (F). فلكوس مضلع

٢١-٢٧ - فلكي - Sideral (F). Sideral (F). نمت تصريفي يطلق على مجرى النجوم والكواكب السيارية. فالبرم الفلكي هو دوران الأرض اليومي. والسة الفلكية هي دوران الأرض السنوي.

٢١-٢٨ - فلكي * - مداري - Orbital (F). Orbital (E). نمت وصفي خاص بمدار الكواكب، أي كوكب كان.

٢١-٢٩ - فلكيات * - Arcades (S). Arcades (F). Arcades (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحاتها الجاهية اجناسها وأنواعها المروعة حلقة منتشرة في معظم بحار العالم. أصلها متباينة الأشكال والأحجام والألوان. فصلها منسفة. صلابتها انطوائية. منها القنطورية ومنها المتناولة. اجسامها صاعدة الخاضع، مستطيلة الأبريل. أحرف اجسامها وأشهرها الفلكية والحويلة والفرطية.

٢١-٣٠ - فلكي * - Arca (S). Arca (F). Arca, Ark, Ark shell (E). وتلقى أم الخلول وفلك. جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحاتها الخاضع وفصيلة الفلكيات. أنواعها المروعة كثيرة العدد. معظمها من صفيحات الخفة السيارية، أي أنه يبدو في القدم التكوين الجيولوجية. أما الأنواع المبرسة فتنتشر في جميع بحار العالم اعصها اكتسبت. أصلها شبه ييشية الشكل أو أخيلية متصلة اللحم أو صغيرة. حزمة الأسفاد الملونة. تعيش لاصقة بالصخور المنورة المتوسطة النور.

أحمارها أوراقها منطقة متقابلة كبيرة التصل. ثمارها حامية اللد والشكل، قمرية اللون، صلبة، يستخرج منها حطر يحل على حطر القنطورية. أما مسطحها فيصنع امتثال بعض الفويات في عدة مأكول.

٢١-٣٥ - فلكي رومي - هو الفلفيلة، اطلبها.

٢١-٣٦ - فلكي عرق اللب * - Piper longum (S). Polvrit long (F). Long pepper (E). Langer Pfeffer (D). Pepe longo, Albaro del pepe (I). نوع من الفلفل وهو شجرة كرينية حيلة الشكل. أوراقها موشحة بالأصفر ثمارها متناطة مستطيلة متدلية، حبرها كروية صغيرة أرجوانية اللون ذهبية للمالح.

٢١-٣٧ - فلكي كناية * - حب العروس، كناية - Piper cubeba (S). Polvrit cubeba, Polvre à queue, Cubèbe (F). Cubeb pepper (E). Cubebenpfeffer, Cubebenstrauch (D). Cubeba, Pepe a coda (I). نوع من الفلفل الأبيض وهو شجرة حيلة الشكل والمحام. أزهارها حثانية مستطيلة مرجالية أو أرجوانية اللون.

٢١-٣٨ - فلفليات - Piperaceae (S). Piperaceae (F). Piperaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين حدييات القمامة، مرتفعات الخيش. أنواعها زهاء ١٠٠٠ تنحسب إلى عشرة اجناس معظمها جنات وأصايب. أوراقها لأقيامية الانطام فيها المتعاقلة والمتناطة والنامية. أزهارها ثدية الشكل، حلية التجميع، لأقيامية الارتكاز، منها المحورية والتاجية والمتعاقلة مع الأوراق. ثمارها حثية كروية صغيرة القند غنطلة الأوان.

٢١-٣٩ - فلفلة، زبارة - Conyoladon (F). Conyoladon (E). صفة ورقية تلصق جبين البزة، رابع زبارة.

٢١-٤٠ - فلفلة، فلفلة، فلف - Lobe (F). Lobe, Lobus (E). كل جزء من الورقة أو الزهرة بالغ التضرب من مستديره.

٢١-٤١ - فلفوس * - Valgus hemipterus (S). Valgus hemipterus (F). شجرة من فصيلة الجمليات ورقية مقدمات الاجنحة. موطنها يشمل معظم مناطق البلاد المتدلة الحارة من العالم القديم. جسمها صغير القند يطول نحو ٨ م. عند الذكر وقصو ١٠ م. عند الأنثى. ثمرها إلى السمرة السوداء تلوها زغاريت لنية يبيض اللون عند الذكر. ثمراتها يلفس ستة اشعار الجسم. قصيدة الاثنى تنتهي برمز مستن مستطيل يركبها من متع الكفن حتى في الخشب اليابس. تظهر من نيسان إلى أواخر حزيران. مسرحتها يستمر طوال الناز. مرقها الانحار. يربتها حثلية اللون، سودا الرأس، تنقب الخشب وقشره اثنى بانحاء القلب فيبدو كك سلباً في حين انه لا يحتل أية صفة.

٢١-٤٢ - فلفي، فلفي - Lobulaire (F). Lobular (E).

٢١-٤٣ - فلك، فلك البروج - le Zodiaque (F). the Zodiac (E). الفلك وفلك البروج وبروج الاطلاق واسد. هو مجرى

قوائمها خاصة الاصابع ، حادة الاظفار . اصولها زامة لينة || انثاها مجهزة بجرباب في اسفل البطن تقم فيه الرضيع حتى للطماع || اشهر اجناسها الفكتنجير ولبهكوان ولفكتورج والكوذور .

٢١٠٣٨ - **فلتورج** * (F. Eupleres, Eupleres)

فلتورج هو الاسم للملغاشي . حيوان لين مقترن وسيد الجلس والنوع من فصيلة الزباديات . موطنه جزيرة مدغشقر . يألف للقباهات الساحلية . يسرح في النهار . قوته الحشرات والودويات واللبدان || جسمه مستطيل الشكل ، كثيف الفبر والصلابة الناعم . طوله نحو ٨٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٣ سم . ارتفاعه الى الحاروك لا يتجاوز ١٨ سم . راسه صغير الحجم ، غريب الشكل وافر السبال . عيناه صغيرتان واذا كان كذلك . قوامه خرافة الاصابع الصغيرة النعيلة . غلابة رقيقة عجمية اطرافه . ثوبه الى انشفحة السمراء ، صدره وبعده الى الغشية البرتقالية المائج .

٢١٠٣٩ - **فلتيم** * (F. Vagin d'insecta, Vagina of the insect)

حوض من شوار انثى الحشرات وهو القناة التي توصل للفرج بحسب الزكة .

٢١٠٤٠ - **فلو** * (F. Poulain, Yearling, Foul)

الفلو والفلو والمهر هو ولد الفرس قبل بروز ثنيتيه اثنتين . ج . الفلاء .

٢١٠٤١ - **فلوت** * (F. Voluta)

الفلوت حيوان بحري من الرخويات يدعى غطوخة ، اطلها .

٢١٠٤٢ - **فلوكة** * (F. Pouliche, Pilly)

الفلوة والفلوة هي انثى الفلر .

٢١٠٤٣ - **فلوكة** * (F. Vallota, Vallote)

مشية دوفسية وسيدة الجنس كيرة النوع كيرة المربوب من فصيلة الترجسات . مهدا افريقية الجنوبية . دوفسها مستديرة الشكل . اورثها جلدية اللانشاب ثنائية التصنيف المتقابل ، نصلها بطول من ٤٠ الى ٨٠ سم . ويعرض نحو ٣ سم . فوه الى الخصار المايق . شرعاعها الزهري اجوف القصية بطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ازهارها متعاقبة الارتكاز ، كيرة الله ، تطول من ٨ الى ١٠ سم . الزوايا تختلف باختلاف القشروب منها الاحمر والكروزي والوردي والابيض والموشح . تنورها يستمر من ايار الى آب . ترغب في المواتع الرطبة والممارش الجنوبية . تعيش في المراكب ولا تخفى سوى البرد .

٢١٠٤٤ - **فلوچية** * (F. Fallugia, Fallugia)

جنبة تزيينية مسمرة من فصيلة الودديات . منبتها بعض اسماق امريكة الشمالية . سلقها متعصبة الحمراء تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم . افنادها الحلوة مزينة الاخر وارتقا متعاقبة صغيرة الحجم ، ثلاثية الفلق . نصلها خضر الصفحات العليا ، يفض السفلى . ازهارها عاجية اللون ممتحة بالوردي ، طهرها نحو ٣ سم . || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٢١٠٣١ - **فلنمكر** * (F. Fulmar, Fulmar)

طائر من الرغاء يدعى رغاء الجبلية ، اطله .

٢١٠٣٢ - **فلننجر** * ، **كسكوس** * (F. Phalanger, Phalanger, Couscous)

جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الشاهيرات . وفصيلة الفلننجات . قوائمها المرفوعة اربعة موطنها استراليا وفيها الجديدة . تألف للقباهات الباسقة الانجبار . قوتها الاوراق والازهار والارز والسمكسور ويضها والحشرات . تروث في النهار في قن الانجبار الرقيقة ويسرح في الليل في طلب القوت وتقتل بين الانجبار تحليفا في الغشاء || اجسادها قريبة اليه من السنور . رؤوسها شبه غروطية الشكل . آذانها صغيرة . قوائمها خاصة الاصابع . احشيتها الجناحية تمتد من الزور الى رؤوس الاغذاء . انثاها مستطيلة اعلاخ . اولهاا مبقية ومبيلة || انثاها ربابية الاعلاخ .



فلنجر

٢١٠٣٣ - **فلننجر ابلق** * ، **كسكوس ابلق** * (F. Phalanger maculatus, Phalanger maculé, Couscous tacheté)

نوع من الفلنجر . قده قد السنور . موطنه بعض مناطق استراليا ، اعصها الشمالية وجزر فينيان الجديدة واسيون وسيام وبنما . ثوبه الى الرينة السمراء الملققة بالابيض الابهر . يتنيز بكبر عليه ويصغر اذنيه .

٢١٠٣٤ - **فلننجر السالب** * ، **كسكوس السالب** * (F. Phalanger Colobensis, Phalanger de Célèbes, Couscous de Célèbes)

نوع من الفلنجر . قده قد السنور . موطنه يمتد من القسم الشرقي الى الجنوبي من جزيرة السالب . ثوبه الى الرينة الشهاب الغشية المائج .

٢١٠٣٥ - **فلننجر دوبي** * ، **كسكوس دوبي** * (F. Phalanger ursinus, Phalanger ourson, Couscous ourson)

نوع من الفلنجر . قده قد السنور لكنه مكروم الشكل . موطنه القسم الشمالي من جزيرة السالب . يتنيز بخلافة الرأس الذي يقه رأس السلب . ثوبه الى الرينة السمراء السوية ، يمتد الى الفرة .

٢١٠٣٦ - **فلننجر شرقي** * ، **كسكوس شرقي** * (F. Phalanger orientalis, Phalanger oriental, Couscous oriental)

نوع من الفلنجر . قده قد السنور الاجل . موطنه فينيان الجديدة وتيمور واسيون وسيام وسلا وأرو... ثوبه الى الرينة السوية يمتد بعض ثوبه في الظهر . ويتنيز ايضا بكبر العين ويصغر الاذن .



فلنر

٢١٠٣٧ - **فلننجرية** * (F. Phalangeridae, Phalangeridae)

فصيلة حيوانات لبونة من الجرابيات الشاهيرات . اجناسها وانواعها المرفوعة عديدة . مسطها من حيوانات استراليا وبعضها من الجزر القريبة منها || تألف للقباهات والارحاج . تساق الانجبار بصفة ممتعة وبها انواع مجهزة بنشاء جناحي الشكل يمكنها حدة انتشاره من الانتقال بين الانجبار تحليفا في الغشاء || جميعها رقيقة ثامرة ويضها مباشرة || اجسادها صغيرة او متوسطة القد . تتنيز باسطاة الاذناناب .

٢١٠٥٤ - **فليرة** * ، **كلبيكار** * Equula (S).
Equule (F). Equula (E).

كلبيكار هو الاسم المحلي. جنس اسماك بحرية من فصيلة الفليديات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠. اصحابها المحيط الهندي والمحيط الاطلسي اجسامها شبه بيضية الشكل ، مبطلة ، صغيرة القبة او متوسطة ، تطيل من ١٢ الى ٢٤ سم. رؤوسها مستدلة الحليم ، ناشرة الاشعاع الثلاثة. اشداقها صغيرة. صفيها كبيرة جاسطة. زعانفها الظهرية والشرجية مسطيلة ، متقابلة يتقاطعا بعضا البعض الخاضع الحادة. زعانفها الذيلية غارقة في لحمها جيدة الصنف ، مرغوب لها .

٢١٠٥٥ - **فلوكس** Phlox (F).
هو الشوفاة جنس نباتات زرقية شائعة الاستعمال ، اطلبها .

٢١٠٥٦ - **فلوميس** Phlomis (F).
هو البزارة ، اطلبها .

٢١٠٥٧ - **فلوميس لزقي** Phlomis visqueuse (F).
هو الازينة ، اطلبها .

٢١٠٥٨ - **فلوميس فلسطيني** Phlomis de Palestine (F).
هو البزارة الفلسطينية ، اطلبها .

٢١٠٥٩ - **فلبة** Marrube blanc (F).
هي القراشيد ، الابيض ، اطلبه .

٢١٠٦٠ - **فلبة** Poulot (F).
هي القوتج البري ، نبات عشبي صخري ، اطلبه .

٢١٠٦١ - **فليجييات** Schizomycetes (F).
Schizomycophyta (E).
فئة من النباتات وسيدات الخلية الحضيف تتكاثر بانقسام الخلية الى فليجين متساويين .

٢١٠٦٢ - **فليديكا** * Phyllidis (S).
Phyllidie (F). Phyllidis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل اماميات الخياشيم وفصيلة الفليديات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من حبل المحيط الهندي والمحيط الهادئة تعيش على حضور التوتالي . اصداقها اطليجية ، صغيرة القبة ، مسطيلة ، مدنية المقدم والمؤخر ، جلدية القشار الملون للبقع بالاسود والابيض . غشايبها كثيرة العدد ، حناوية الارتكاز . لواسها رباعية ، منها زوج علوي شبه اتوبي الشكل وزوج سفلي مخروطي مكره قرب الفم . اذنيها لحية مستدلة الاعطاط الطولي .

٢١٠٦٣ - **فليديات** Phyllididae (S).
Phyllidides (F). Phyllididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اكثرها من متحجرات الازينة القارية . المعاصر منها يعيش على شواطئ بحار البلاد الحارة في اصداقها خياشيم التركيب والاشعاع منها وسيدات المسامير ومنها حديدية . جميعها تستنشق الماء . غشايبها حناوية الارتكاز . اعرف اجناسها المعاصرة القليلة .

٢١٠٤٥ - **فلور** * Phyllirroe (S).
Phyllirrhoë (F). Phyllirroe (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل غشقيات الخياشيم وفصيلة الفلوريات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اصحابها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . جميعها مية تسرح في الليل . اجسامها حلالية شفافة مبطلة لا تخلو من المواد الفسفورية المضيئة . رؤوسها ثنائية القابس التي تبدو كقرون التيران .

٢١٠٤٦ - **فلوريات** Phyllirrhoidae (S).
Phyllirrhoides (F). Phyllirrhoidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل غشقيات الخياشيم . انواعها قليلة العدد جميعها جنس واحد الفلور . جميعها مية لا تقرب الشاطئ . تسرح في الليل . اجسامها شفافة تحمل بعض المواد الفسفورية المضيئة .

٢١٠٤٧ - **فلوريد** Fluorure (F). Fluoride (E).
ملح الحامض الفلوريدينيكي .

٢١٠٤٨ - **فلوريد الباريوم** Fluorure de baryum (F).
Barium fluoride (E).
مركب الفلور مع الباريوم .

٢١٠٤٩ - **فلورين ، فلورور ، فلور** ، **لاصف** Fluor (F). Fluorine (E).
غاز اصفر اللون ، كبريه الرائحة ، شديد التفاعل . ثقله الذري ١٩,٣١ رقه الانوي ٩ .

٢١٠٥٠ - **فلوس** * ، **زب الكرم** ، **ستير** Phallus, Ph. impudicus (S). Phallus, Phallus impudicus, Satire (F). Phallus, Devil's horn, Steink horn (E).
Gichtschwamm (D). Spugnolo (I).

فطر دصامي من فصيلة الفلوريات شائع الانتشار يبيض في جميع المواقع الرطبة من الاقاليم الحارة والمعتدلة . شكله ما حركه الجسم . مله اسفنجية ، اوسسته مخروطية . لها الى الخفسار التاني في يؤكل في اول عهد ، عند انقلاق الكلاف ، قبل استطائه وتصلب خلاياه . اعرف انواعه الصيني والكليبي .

٢١٠٥١ - **فلوس صيني** Phallus molusini (S).
Phallus de Chine (F).
نوع من الفلوس صغير القبة والساك ، سنطلي اللون ، احر الاروسة النعومة الشكل .

٢١٠٥٢ - **فلوس كنيني** Phallus canis (S).
Phallus de chien (F).
نوع من الفلوس . مله دقيقة ، مسطيلة ، جزوية اللون ، سنطلية الملح . ارضونه خفيفة ، بلوطية الشكل ، خرية اللون .

٢١٠٥٣ - **فلوسيات** Phalloaceae (S).
Phalloaceae (F). Phalloaceae (E).
فصيلة الفطور القلوسية من رتبة الدصاميات . اجناسها وانواعها مديدة يكثر وجودها في المناطق الحارة والاعتدالية . اعرف اجناسها واشهرها الفلوس ثم الديكتوفور الذي يركب الانسان في المواقع الرطبة فيوق نمو ويؤذنه .



فلور



فلوس



فليرة



فليرة

Trilobites (F).

٢١٠٧٣ - فليبيات

تة من القشريات تسمى ثلاثيات الفلج ، أطلها .

Navicella (S).

٢١٠٧٤ - فليكة

Navicella (F). Navicella (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مدبذات الأبرص
وفصيلة المزيقيات . أنواعها المرونة قليلة البدن مواطنها
أنهر المنة || أصدافها كبيرة اللد ، شبه بيضية الشوزن ،
فصيلة التجويف المقعر ، جؤرية اللون أو بيضاء ||
أجسامها كبيرة . رؤوسها حلالية الشكل ، ثنائية القواس
للحيزة المستطيلة الجاحة || جميع أنواعها مأكولة .

Pébrine, Gactine, Echse (F).

٢١٠٧٥ - فلييل

القليل أو مرض الطفيل أو المرض الطفيل أو ندوة دودة
الحرير . مرض طفيلي يصيب دود القز فيفقدونها شهوة
الأكل ويسقطون نحو الموت || مظهره الخارجي نقط سود
مبهمة تركب الجسم من الرأس إلى الفرج || يمتد من
الأمراض المميتة إذا حل بالبدن في طوره الثاني . أما إذا
اقتصر على الطور الرابع فأسابته تكون قليلة الأذى وغير
ميتة .

Phyllum (S).

٢١٠٧٦ - فليكة

Phyllite (F). Phyllium (E).

جنس حشرات من مستحبات الأجنة وفصيلة الفسيات .
أنواعها المرونة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد
الحارة والاشترالية من العالم القديم || أجسامها مستطيلة
القد طول من ٥ إلى ١٠ سم . بطونها مبطنة بيضية الشوزن .
رؤوسها مكورة صغيرة . قرونها الاستحسان دقيقة
وقصيرة . أجنحتها كثيرة الاصاب الفقية ، قصيرة ،
لا تلتصق كمثل البطل . قرونها معتدلة الطول ، مستعرضة
الاختلاف والسيفان يبدو كأنها جمنة || وهي من الحشرات
التي تقاتل البنية التي تعيش فيها . يرقاتها برتقالية اللون
أو حمراء .

Crinière du lion (F).

٢١٠٧٧ - فليكة

Mane of lion (E).

شعر زهرة الأسد .

Liège, Suber (F).

٢١٠٧٨ - فليين ، فليين

Cork, Suber (E).

مادة دسنة ، مطاطة ، خفيفة ، تسمى من لحاء البش اي سديان
ولا تفسدها الرطوبة ، تقطع من لحاء البش اي سديان
القليل .

Bouchar (F). Bush (E).

٢١٠٧٩ - فليكة

هي السداة ، أطلها .

٢١٠٨٠ - فليين ، بهني

Liègeux, Subéreux (F). Like cork, Suberous (E).

تتمتع بمرئي يطلق على التسج النباتية الفليية التركيب
أو الشبيهة بالفلين

٢١٠٨١ - فليين

Phellogène (F) Phellogenetic (E).

تتمتع بمرئي توصف به النباتات التي تلج الفلين .

٢١٠٨٢ - فليينين

Subérine (F). Suberin (E).

للمادة البشورية التي يتركب منها الفلين .

Tuf (F). Tuff, Tufa (E).

٢١٠٧٤ - فليس

اسم نبي يطلق على تكوينين مختلفين من طبقات الأرض .
التكوين الرسوبي والتكوين التوراني .

Tuffeau, Tufeau (F).

٢١٠٧٥ - فليكة

Micaeous chalk (E).

صفائح متفردة بلاتيزية التركيب ميكة تكون مهلة
الحفر لينة المكسر عند استخراجها من الأرض ثم تتصلب
رويدا رويدا مع تعرضها للهواء .

Géll (F).

٢١٠٦٦ - فليين ، صدع

Frost-cleft (E).

تتمت حال توصف به الاشياء المفلوكة أو القابلة للانصدام
والقلم من تأثير فصل الصقيع فيها .

Capicum (S).

٢١٠٦٧ - فليكة

Piment (F). Pepper (E).

جنس نباتات زراعية حولية ومعمرة من فصيلة
الباذنجانيات . منها المناطق الحارة والمعتدلة . أنواعها
قليلة . فروعها كثيرة البدن . أوراقها بسيطة متعاقبة
أزهارها غشوية بيضاء اللون . ثمارها قرون خضلة الاشكال
والاجسام والالوان . زهورها مستندرة ، مبطنة ، رقيقة ،
منقبضة المنش . || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢١٠٦٨ - فليكة زركية ، فلييل زكي ،

فليل أحمر

Capicum annuum (S).

Piment annuel, Poivre long, P. de Guinée, Poivron,
Corail des jardins, Capsique (F). Capicum, Red pepper
(E). Echo Belaboera (D). Paparone, Pimento (I).
نوع من الفليكة فروعها وأصنافها كثيرة العدد شائعة
الزراعة والاشتهال . جميعها نباتات حولية ومعمرة تزهر
لأزهار المأكولة الحارة أو غير الحارة .

٢١٠٦٩ - فليكة ليكية

Capicum frutescens (S). Piment frutescens (F).

نوع من الفليكة الخشوشة التي تعيش من ٤ إلى ٦ سنوات.
ساقها فروعها تملو من ٩٠ إلى ١٨٠ سم . فروعها دقيقة ،
منسقة مرتفعة الاطراف . أوراقها بيضية الشكل مدبية
الزاج الاخير . نصلها مائل الصفحة الخضراء يطول من
٧ إلى ١٠ سم . ويؤرض من ٥ إلى ٨ سم || ثمارها
بيضية الشكل ، كبيرة اللد تلو غفرها اللون ثم تتحول
الى الحمرة وتشتقر عليها .

٢١٠٧٠ - فليين

Schistocarpe (F).

Schistocarpos (E).

تتمتع بمرئي يطلق على كل نبات تتفاد ثماره عند الامداد .

٢١٠٧١ - فليكة ، فليين

Lobule (F).

Lobule, Lobulus (E).

الفغلة الصغيرة القدر .

٢١٠٧٢ - فليكة

Otides onetice (S).

Otide oreille de lièvre (F).

ضفر من فصيلة المشاريات ودية الزقيات . يكثر وجوده
في الحراج الطيلة اغصانها حراج السديان . يعيش مجتمعات
على الدبال والمواد النباتية المنسقة . مجتمعة تعد من زوسين
الى حزة ازواج . سيقانها جيدة . نكاحها مستطيلة الشكل
مفلقة ، جؤاء ، تبدو كأذان القرواع ، لونها الى الصغار
الذهبي ، قرواعها بيض الداخل || تنصير من القشور
الكعبة الصنف اللامأكولة .



فليكة زراعية (١)



فليكة زراعية (٢)



فليكة



فليكة



فليكة



فليكة



فليوت أخضر



فليوت المشعر



فليوت مغلب



فليوت مخمض



فليوت مرن



فليوت بخر



فند

Fluor

٢١٠٩٠ - فليور

هو الفلور أو اللاسف .

Fomalheur (F).

٢١٠٩١ - فَم الحوت

Fomalhut (E).

فم الحوت نجم نير من كوكبة الحوت الجنوبي . مركزه على النجم . يبعد عن الأرض نحو ٢٤ سنة ضوئية .

Pylote (F).

٢١٠٩٢ - فَم الصلدة ، بوقب

Pylorus (E).

Stomatopoda (S).

٢١٠٩٣ - فُصَيَات الأرجل

Stomatopodes (F). Stomatopoda (E).

رنية حيوانات من القشريات .

Cour de ferme (F).

٢١٠٩٤ - فَنكه

Farm-yard (E).

مساحة تحيط بِنَا إبليّة المستغل .

Branchue (F).

٢١٠٩٥ - فَنكاه

Forked, Ramifying (E).

فناه وفنلاه : شجرة كثيرة الأفران واسعة النخل .

٢١٠٩٦ - فَنكاه

بقرة القطيع لا عمل ولا دَرَج فنوات .

٢١٠٩٧ - فَنكاه * ، عَنَب العُصْب

Paris incompleta (S). Parizetta, Raisin de renard (F).

Fox grape, Herb Paris (E). Einbeer, Parisbeere (D).

Paride, Uva di volpe (I).

لبات عشبي بري طيب من الخليليات فضيلة الزنبقيات . يكثر في المراعي الطبيعية وفي بعض الأجرار . جلوره مخيرة . أوراقه مهيبة ونيقة .

Ramure (F).

٢١٠٩٨ - فَنكاهة

Branches, Boughs (E).

جمرع الحصان وفناد وفنات الشيرة .

Vanadium

٢١٠٩٩ - فَنكاهيوم ، فَنكاهم

معدن أبيض اللون متبلور . ثقله النوعي ٥.٥ وزنه الذري ٥١.٣ . يتحد مع الأكاسيد والكبر والازوت . يذوب في المحالض المائية باستثناء الحمض الكبريتيك . يكتسب لونه الأصفر عند تسخينه في قنن الصناعيات والصبغات .

Scyphozoaires (F).

٢١١٠٠ - فَنجَنَائِيَّات

Scyphozoa (E).

رنية حيوانات بحرية ملامية من شعبة الحريات . فضائلها وألوانها وأنواعها عديدة . أشهرها المصوبات .

Lynx pardé (F).

٢١١٠١ - فَنجَل

هو الفوش الفندي ، الظب .

Gastrell commun (F).

٢١١٠٢ - فَنجَنَكُفَت

هو الأرنه جنية طيبة ممرمة ، الظب .

Fongique (F). Fungic (E).

٢١١٠٣ - فَنجِي

ما كان فطري الطبيعة أو الصفة .

Ramess (F). Bough (E).

٢١١٠٤ - فَنكده

هو النصن الصلير أو الصلة بين النصن والأفنان .

Pholiota (S).

٢١٠٨٣ - فُليُوت *

Pholiota (F). Pholiota (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقيات . أنواعها المعروفة عديدة أصنافها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . يكثر ويوجد في الغابات والمساب والمجال . معظمها يعيش على المواد النباتية المتحللة . تتميز بوضعها الأصفر اللون وبوفرة عدد مجسماتها || أفرانها وأنواعها وأشهرها الصفة التالية .

٢١٠٨٤ - فُليُوت أسمر *

Pholiota picra (S). Pholiote brune (F).

نوع من الفليوت . يعيش على أرويات المستور . ساه جزلة ، مبطلة ، عوياء ، صلبة ، شبه غضروفية . نكهته قبيحة الشكل ، قطرها نحو ٣ سم . لبها إلى الصفرة الصلابة المراج . يفرغ منها رائحة لا مألوفة || لحيته حمراء حمرة العلم ، كافة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٥ - فُليُوت المشعر *

Pholiota carbonaria (S). Pholiota des charbonnières (F).

نوع من الفليوت . يتكاثر في مواقع المشاعر . مجسمته وثرية المعد الذي يتألف من ٣ أو ٥ أو ٧ وسادات ، ساه دقيقة ، صفراء اللون . نكهته لزجة ، صافية الشكل ، قطرها نحو ٢ سم . لبها إلى الصلبة السوداء || لحيته كافة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٦ - فُليُوت مُنَكَب *

Pholiota mutabilis (S). Pholiota changante (F).

نوع من الفليوت . يعيش على أرويات الأجار الحمراء . مجسمته وثرية المعد تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وسادات ، ساه دقيقة ، عوياء ، مبطلة حتى الزام الثالث . نكهته صافية ، عادمة الرائحة ، قطرها نحو ٢ سم . لبها إلى الصلبة البرتقالية وفي مستحبة الرائحة عند المس || لحيته جيدة الصنف ، مأكله .

٢١٠٨٧ - فُليُوت مُعَرَشَف *

Pholiota squarrosa (S). Pholiota écaillée (F).

نوع من الفليوت . يعيش على أرويات الفم والستيدان . ساه مبطلة مخرفة الأطوار حتى أوائل الزام الرابع . نكهته مغلية الشكل ، صفراء اللون ، مدروية والخراف السمر . قطرها نحو ٥ سم . اطرافها إلى الصفار الأخضر المراج || لحيته كافة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٨ - فُليُوت صَر *^٥

Pholiota lenta (S). Pholiote flexible (F).

نوع من الفليوت . يعيش على الببال في المواقع الظليلة . ساه معتدلة الجرم والارتفاع ، غبراء اللون يملؤها زغب أصفر . نكهته صافية الشكل ، قطرها نحو ٥ سم . لبها إلى البقرة الصفراء . اطرافها إلى الصفار الباهت || لحيته جيدة الصنف ، مأكله .

٢١٠٨٩ - فُليُوت خَصِر *

Pholiota flammans (S). Pholiota éclatante (F).

نوع من الفليوت . يعيش على أرويات الصنوبريات . مجسماته وثرية المعد . ساه معتدلة الجرم ، مخرفة حتى أطراف الزام الرابع . نكهته صافية الشكل ، صفراء اللون ، خفية المراج ، قطرها نحو ٢ سم . رائحتها رائحة الفت || لحيته كافة الصنف ، غير مرغوب فيها .

كيرتان ، مستديرتان ، حولتا الارزكاز ، زعنفتها الظهريّة الاولى ثلاثية الشعب المستطيلة المنحصر النوبة || لحما مصط الصف ، مأكلي ، يعض فصول السنة ، سام في فصل الربيع .

٢١١١٥ - فنكربات **Balistidae (S).** **Balistidae (F), Balistidae (E).**

فصيلة اصملا بحرية من ملحويات الفك شاككات الزمانف . اجناسها وانواعها عديدة اطالها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . سرسها حشاف المهاد . قوتها الرخويات ونواحي الرجان والمرجان || اجناسها شبه يضيي الشكل ، مبطلة الجرم ، مائدة الاعتاق ، طولها من ٤٠ الى ١٠٠ سم . قشورها مراكب القلوس الحرة . رؤوسها مسلحة بزنانف مهازية مدنية حادة تمسخر وتقتصب عند الحاجة . اسنانها صلبة قوية تمكها من سحق صدف الحمار والرخويات ومن هرس نواحي الرجان والمرجان || ألوانها ملونة فيها الأزرق والاصفر والبني والاسود والبرتقالي والاحمر القويدي والبي والارصاعي والاسود || لحومها جسيمة الصف ، مأكولة في بعض فصول السنة ، سامة في فصل الربيع من اواخر آذار الى اواخر حزيران || اشهر اجناسها الفنكسر أو صر الماء .

٢١١١٦ - فنكس **Phoenix (S).** **Phénix (F), Phoenix (E).**

طائر عراني ورد ذكره في اساطير الاولين . اما اليوم فلام يطلق على ديك من الفروسيات هو الديك الياباني القويدي التيكس الزاوي الالوان .

٢١١١٧ - فنكل **Funicula (F), Funicle (E).**

هو من الزباني سوقيها التليق الذي يحمل في نهايته الصق الصرمان .

٢١١١٨ - فنكلي **Funifère (F), Funifer (E).**

لمت تعريفي يطلق في علم الاحياء على كل عضو مجهز بزوائله عجيبة الشكل دقيقة شبيهة بالفنكل .

٢١١١٩ - فنك **Fennec (S).** **Fennec, Fenec (F), Fennec (E).**

نوع من الثعالب صغير الجثة ، لاهم الور ، وديق القوام ، يتميز بكبر اذنيه وبمضاغة ريشة ذليه || قوته الصانير والورويات والحشرات والزاسافات واليرابع ... مسرحه من القروب الى الشرق ، ويبر نفق مستطيل وحيد المدخل . اتاه تقبع من ٣ الى ٤ جراه || موطنه فسح الاربياء وشمل القارة الافريقية مع الجزيرة العربية وجزائرها || ضروره المروعة اربعة :

٢١١٢٠ - فنك اعهر **Fennecus pallipes (S).** **Fennec pala (F).**

غرب من الفنك موطنه افريقية الشرقية والبرية وبلاد التوب وكردفان . ثوبه دلي اللون ، ظهره احمر المالح ، اذنيه اسود الطرف . جسمه يطول نحو ٥٠ سم . منه الذنب الذي يبلغ ٢٥ سم .

٢١١٢١ - فنك البوكادي **Fennecus famelicus (S).** **Fennec sabora, Sabora (F), Sabora fennec (E).**

غرب من الفنك موطنه التوب وصاري الجزائر وتونس بصورية والصوم والافغان . ثوبه بلون الزيل الاسمر . ظهره

٢١١٢٠ - فنكاف **Facture (F), Invoice (E).**

في الفاتورة أي قائمة الحساب .

٢١١٢٦ - فنده **Vanda (S).** **Vanda (F), Vanda (E).**

جنس نباتات اسيمة من السطحيات . انواعها المروعة نحو ٣٥ اصلها بلاد الحارة . جميعها يرية وتزيينية . ازهارها كبيرة متباينة الاشكال الجميلة . ألوانها زاهرة زلمة || تزور في المراكب : تنفي الصبح || اشهر انواعها واعها زروعة التلاله التالية :

٢١١٢٧ - فنده البتغال **Vanda courtes (S).**

نوع من الفنده . مهدا البنغال وقد انتشرت زراعتها في معظم اقطار المسكونة || ازهارها كبيرة جميلة زرواء اللون .

٢١١٢٨ - فنده التيمور **Vanda insignis (S).**

نوع من الفنده . مهدا بلاد التيمور وقد انتشرت زراعتها في كل مكان || ازهارها متصلة الفنده ، سطيحة اللون مبقية بالاربعوني .

٢١١٢٩ - فنده الجزر **Vanda Indeni (S).**

نوع من الفنده . مهدا جزر الزايج ، ازهارها عتقوية التجميع لونا الى الصلار الكبريتي اللامع الجميل .

٢١١٣٠ - فنكود **Ramaria botrytis (S).** **Ramaria chou-fleur (F).**

فطر من فصيلة الذبويات . اطالها غابات جبال البلاد المعتدلة الحرارة . يمش على المواد النباتية المتسلة . ساقه شديدة القصر متفجرة مع التكملة . نكته تحت لحمي تتكون قشبه فيه مجموعات من المراجين الصغيرة تبدو كزهره الانابيب ظهرا يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم . لونها الى البيرة الصفراء المالح ، مارجها الى الصفرة السوداء الصفاء || لحمة جميلة الصف ، لينة اللحم ، مرغوب فيها .

٢١١٣١ - فندي الزهر **Raniflore (F).**

لمت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره فندية الانتكاش .

٢١١٣٢ - فنطاسيات **Pterythians (F).**

في الحيوانات مجسمة قري العالم الجديد .

٢١١٣٣ - فنطية **Groin (F), Snout (E).**

في القروطة والقروطية أي علم الحزير .

٢١١٣٤ - فنتر المتوسط * **Balistes capricus (S).** **Balistes capricus (F).**

نوع من الفنك . سمكة بحرية يروض من فصيلة الفنكيات وربة ملحويات الفك شاككات الزمانف . اطالها بعض اقالم البحر الابيض المتوسط . سرسها حشاف المهاد . قوتها القشريات والرخويات ونواحي الرجان والمرجان || جسمها يضيي الشكل ، مبط الجرم ، عديم الفتق ، يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . سرائها جامدة حرة . ثوبها متداخل الالوان يغلب فيه البني والبني المظلات المايات

يلوه بتيج ازرقة واجر وتضلع اصفر وبرتقالي وكسني ويظوي || رأسها خلروفي الثوزن صغير النظم والتم والشلق . اسنانها قوية ، حادة ، ثنائية الصف . عيناها



فنده



فنكود



فنر المتوسط

فَنَكِي الون بطول من ١٠ الى ٢٥ سم. ويبيض من ٨ الى ١٥ سم. || شرانها الزهري بطول من ٣٠ الى ٤٥ سم. عقوده يمد من ٩ الى ١٥ زهرة طول نحو ٤ سم. لونها الى البياض الناصع، عرطها فواح الرائحة الجميلة. ازهارها يستمر من محو الى ايلول.



فَنَك زَرْدَة

٢١١٧٩ - **فَنَكْس - عُصْنَة - عُصْبَن**
Ramilla (F). Twig (E).
هو ما استبق من ثقبان الاغصان بلغ الحبل او لم يبلغه.

٢١١٢٠ - **فَنَنْغُس**
Funling (S). Fungio (F).
طائر وحيد الجنس ولون من البياض وفصيلة الحمايات. موطنه افريقية الشرقية وبزيرة مدسكير. ملجته الحياطي جامي. سره يمد بعض المئات || جسم متوسط القد، بجسم لينة. رأس صغير. كشته قصيرة. جناحه ذاتي الطرف. ذيله مثل الطول، مقطوع. ثوبه ازرق واجر متناوب الماجات || قوته البهادر والحروب يحرق البلاد في طلبها || الاثني تدنن عشها في الاجبار الفخلة حشنتا يستان، لتناوب عل الترخيم مع الذكر.

٢١١٢١ - **فَنُود لَمَرِيَّة**
Branches fruitières (F).
Fruit-boughs (E).
هي الاغصان الصغيرة التي تحمل الثمر بدون سيط.



فَنَك لَفِي

٢١١٢٢ - **فَنُونِيَس**
Aphanomyces (S).
جنس فطور مجهرية من الفيشيات انزلها عديدة تنقل على الحيران والنبات، اشهرها واعمرها ما يتبع.

٢١١٢٣ - **فَنُونِيَس لَاسِي**
Aphanomyces Levis, A. cochlioides (S).
فطر مجهرية من الفنونيس يسبب يزور الشفتر عند انتشارها فيقضي عليها واذا اصابتها بعد الانتاش في زين الفصوح والاداس اوقع بها الاضرار الجسيمة. اما اذا اصابت الشتول يمد غيبا فلها تقاويه ولكنها تكاثر وينفلس انتابها || مظهره على الاوراق اخضرار زيتوني المزاج يمتد ذيل النسل في البهار وتصلبه في الليل. وهو في الجلود عند قطعها حروق سود محورية || يكافح باجتناب الزراعة في الموضع المرطوبة وبطويرة البذار والتربة.

٢١١٢٤ - **فَنُونِيَس مَتَوَرِي**
Aphanomyces Magnulii (S).
نوع من الفنونيس يتغلل على السلاطين البهريه فيؤذيها ويسبب هلاكها.



فَنُونِيَس لَاسِي

٢١١٢٥ - **فَنِيَخ**
Flacherie (F). Flaccidity (E).
ويسمى «فلاخري» مرض ميكروبي فلك يسبب دود الفتر في جهازها الهضمي عند انسانها الرابع.

٢١١٢٦ - **فَنِينِيوم**
Vanidium (S). Vénidie (F).
جنس نباتات حشوية حولة من فصيلة المركبات. انولاه نحو ٢٠ مظهره بري وفيها ترابي. اوراقه متناوبة وباية الشكل، ملتوية || نصلها كبري القد خلى البشرة. وروسلها الزهرية كثيفة التجميع ظهرها نحو ٦ سم. لسانها مسنة الطول، برنقالية اللون. طباها مفرع الشكل قنانيه متناوبة مرصعة، ثلاثية او رباعية الصغوف. اشهر انواعه ما يلي.

الى الحرة، بلته الى البياض. جسمه بطول نحو ٤٨ سم. منه الذنب الذي يبلغ ٢٢ سم.

٢١١٢٢ - **فَنَك زَرْدَة * زَرْدَة**
Fennecus zarda (S). Fennec zarda, Renard du Sahara (F). Zarda fennec, True fennec, Sahara fox, Fennec of bruce (E).

شرب من الفلك موطنه الصحاري الافريقية ووادي النيل والنوبة وسائر ويزان والجزيرة حتى سيناء وسوريه. وهو اصفر شرب الفلك واحسنها شكلا واقرها لقة. ثوبه بلون الريال يميل مع اقترابه من ثوب الفلهر. جسمه بطول نحو ٤٠ سم. منه الذنب الذي يبلغ ١٨ سم.

٢١١٢٣ - **فَنَك لَفِي * اَص**
Fennecus chama (S). Fennec chama, Chama, Asse (F). Caama, Asse (E).

شرب من الفلك موطنه شفاف نهر الارباع من افريقية الجنوبية. جسمه بطول نحو ٦٣ سم. منه الذنب الذي يبلغ ٣٠ سم. ثوبه الى الصبغة الرملية المواج. ظهره فضي اللون. طرف خلفه وذنبه الى السرة السوداء.

٢١١٢٤ - **فَنَكَة * هَسْتَة * زَنَقِي التَهَك**
Funkia, Hosta (S). Funkie (F). Plantain lily, Japanese day lily (E). Herzlille, Hosta, Taglilie (D). Funkia, Hosta, Giglio plantagine (I).

جنس نباتات حشوية بجمورية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعه قليلة وهذا الصين واليابان. سورها شرانعة الانتشاب. ازهارها عنقودية التجميع. اوراقها متينة قسية قاعية. احرف واشهر انواعه الازينية ما يلي.

٢١١٢٥ - **فَنَكَة سَنَائِيَة**
Funkia lancifolia, Hosta lancifolia (S). Funkie lancifolia (F).

نوع من الفلكه اوراقها سنائية النصل حيلة اخضرار طول من ١٠ الى ١٢ سم. وعرض من ٤ الى ٥ سم. || شرانها الزهري يرتفع من ٢٠ الى ٢٥ سم. عقوده يمد من ٦ الى ١٠ ازهار طول نحو ٣ سم. لونها الى البياض الناصع. ازهارها يستمر من محو الى آب.

٢١١٢٦ - **فَنَكَة سِيُولَة**
Funkia Sieboldiana, Hosta Sieboldiana (S). Funkie de Siebold (F).

نوع من الفلكه اوراقها بيضية الشكل، نصلها عديم العروق بطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. ويبيض من ١٧ الى ٢٣ طول الزهري يرتفع من ٢٠ الى ٢٥ سم. عقوده يمد من ٦ الى ١٠ ازهار طول نحو ٣ سم. لونها الى الزرق البنفسجية الزاوية. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٢١١٢٧ - **فَنَكَة قَلْبِيَة**
Funkia ovata, Hosta coerules (S). Funkie bleue (F).
نوع من الفلكه اوراقها قلبية الشكل، نصلها مائل البشرة، بارز العروق، جميل اخضرار تعلوه نقشه يضاف || شرانها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. عقوده يمد من ٦ الى ٩ ازهار طول من ٣ الى ٥ سم. لونها الى الزرق الجميلة. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢١١٢٨ - **فَنَكَة يَابَانِيَة**
Funkia subcordata, Hosta japonica (S). Funkie du Japon (F).

نوع من الفلكه اوراقها بيضية الشكل، نصلها مائل البشرة

٢١١٣٧ - قيدوم آذربايجاني الزهره

Vanidium calendulaceum (S). *Vénidie à fleurs de souci* (F).

عشبة حولية سرقية زينة زغبية الساق والفروع تملو نحو ٣٠ سم. فروعها انيقة الاكتشاف. اوراقها مائلة الصفرة العليا الخضراء اللون. اما السفلى زغبية خضرة. ورياسها الزهرية تشبه ورياس الاذريون. طباها حشلي اللون، لسنتها برقالية || انزهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢١١٣٨ - قيدوم مهدب

Vanidium vyleyi (S). *Vénidie hirsute* (F).

عشبة حولية زينة سرقية زغبية الساق والفروع المتضبة. تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها غبراء اللون حناكية النصل حل صفحتي || ورياسها الزهرية متضبة اللد، طباها جلوي اللون، لسنتها حشلي لزام الال، ملحية الكاني، والثلاث، برقالية لزام الاخضر || انزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢١١٣٩ - قيقق

القيقق نجم لير من كوكبة برج الثور.

٢١١٤٠ - قيقق

الفصل الكرم من الابل الذي لا يركب ولا يان.

٢١١٤١ - قيققة

هي القيقلة، اطباها.

٢١١٤٢ - قيققة

Anémophilie (F). *Anemophily, Anemogamy* (E).

التهارة التأثير الطبيعي الذي كونه الرياح يتغلغلها الريح اي جذرات الطلع من الاسدية الذكرية الى الملقحات الانثوية.



نهد ارقل



نهد ارقل



نهد اور



نهدة



نهدة سامة

نحو ١٣٥ سم. ويصلو ٧٥، اما طول ذنبه فلا يقل عن ٧٥ سم. وهو اجلس واكمل شكله من الاعرف. ثوبه كثيف الور القصير. كبير الرقعة السوداء.

٢١١٤٥ - قهد اعرف *
Cynallurus jubatus (S). *Guépard à crinière* (F). *Hunting leopard, Chatah* (E). *Tschitah, Gemähne gepard* (D).

نوع من القهد اصلاته نسيمة الارباء تمتد من الهند الى بلاد العرب وافريقية الشرقية والغربية والبنالية || جسمه يطول نحو ١٣٠ سم. ويصلو ٧٥ سم. اما ذنبه فلا يقل عن ٧٠ وهو رقيق القولم صغير الرأس مستدير. عيوط الاذن اعرف العنق. ثوبه قصير الور، صغير الرقعة.

٢١١٤٦ - قهد اوير *
Cynallurus lanus (S). *Guépard lalieux* (F).

نوع من القهد اصلاته تشبه بلاد افريقية الجنوبية. جسمه يطول نحو ١٠٥ سم. ويصلو ٦٠ سم. اما ذنبه فلا يقل عن ٥٥ سم || ثوبه كثيف الور المستطيل، رصقته الى الجفوة السوداء.

٢١١٤٧ - قهدكة
Barbus perince (S).
سمكة نهريه من الشبوطيات تعرف باسم بني دجلة. يكثر وجودها في دجلة والفرات.

٢١١٤٨ - فينومة نباتية
Phytonymie (F). *Phytonymy* (E).
الفهرسة نباتية مجموعة الانفاظ والمصلطحات الخاصة المألدة الى النبات.

٢١١٤٩ - قهدكة
Atlas, Vertebrae atlas (F). *The first cervical vertebra* (E).
القفقة هي اول فقرة من العنق تلي الرأس. وهي موصل العنق بالرأس او مركب الرأس في العنق.

٢١١٥٠ - قهدكة *
Promecoccephalus (S). *Tétrodon* (F). *Globe fish, Puffer* (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة التفتيات. انواعها عديدة معظمها من اسماك بحار البلاد الحارة. تتميز بقرابة اجسامها المتضخمة التي تبهر كائنها خالية من الرأس.

٢١١٥١ - قهدكة سامة *
Canthigaster valentini (S). *Tétrodon venimeux* (F). *Venomous Globe-fish* (E).
نوع من القهدكة. سمكة بحرية يمرض اصلاتها بعض مناطق البحر الاحمر والمحيط الهندي. ملحنها الحياتي جماعي، اسراجها كثيرة العدد || جسمها يطول من ٢٤ الى ٣٠ سم. رأسها يبرسي الشكل. عيناها كبرتان، جاحضتان، رطبنا الاركانا. ثوبها الى الطحلة القفصية المرقطة بالبي ويملوها اربع جذات سود متعرجة، الابل عند عتق الرأس والاخرة عند قاعدة الزعنفة الذيلية || لها سام لا يولك.

٢١١٥٢ - قهدكيات
Tetrodontidae (S). *Tétrodonitidae* (F). *Tetrodontidae* (E).
فصيلة اسماك من رتبة مسليات الفكوكه حرياتان الانسان. اجسامها وانواعها كثيرة العدد. اصلاتها بحار البلاد الحارة. جميعها من الاسماك المتضخمة القوية الاشكال والانواع.

٢١١٥٣ - قهدكة
Arnébie (F).
هي الاطن، اطباها.

٢١١٤٤ - قهد اوطق *
Cynallurus guttatus (S). *Guépard moucheté* (F). *Chita* (E). *Fahhad* (D).
نوع من القهد اصلاته نسيمة الارباء تشبه الهند والانفاظ وارباب وحوض بحر قزوين والبلاد العربية وافريقية الشرقية والبنالية مع اصغرها الكبرى والسنان || جسمه يطول

Fuchsiae ٢١١٨٤ - **فوشين**
صياغ آخر يستعمل في تلون الانسجة الضوية لتسكين من درهما المهري . وهو يستعمل من تأكيد الانثيين بالنيروبزين .

Foussa (F). ٢١١٨٥ - **فوشة**
الفوشة حيوان لاسم مفترس يسمى صاس ، اطله .

Anarchisme (F). ٢١١٨٦ - **فوشية**
Anarchism (E).
الفوشية ملعب سياسي قوله ابدال اعمال السلطة الحاكمة بالمبادأة القروية .

Virulence (F). ٢١١٨٧ - **فوشة**
Virulence, Malignity (E).
خاصة في بعض الميكروبات تجعلها اذا دخلت جسماً تكررت فيه بسرعة وخلفت الفلزات وبيلة تحدث اوجم الموراث .

Pelticula d'un noyau (F). ٢١١٨٨ - **فوشة**
Peltic of the stone (E).
الفوشة فوش . هي شفاء للتواء .

Nauclea (S), Nauclee (F). ٢١١٨٩ - **فوشل**
Nauclea (E), Morgenstern (D), Nauclea (I).
جنس نباتات برية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ اصلها المناطق الحارة من القارتين الاسيوية والافريقية . مظهرها اشجار شاذكة السوق والفروع وبهضها جنات مسقلة . اوراقها معتقة ، متقابلة ، بيضوية الشكل ، لصلها جامد الصلابة ، مائل البشرة كثير المروق . ازهارها ابطية شعاعية ملونة || اشهر انواعها الفوشل الهندي .

Nauclea (S), Nauclee (F). ٢١١٩٠ - **فوشل هندي ، فوشل سرح**
Nauclea inermis (S), Nauclee inermis (F).
نوع من الفوشل وهو جنبة مسقلة سرية تملو من ٣ الى ٥ اسيار . ساقها قليلة الفروع ، سميكة القشور الطيبة النافذة . تستعمل ضد الحميات .

Dividivi (F). ٢١١٩١ - **فوشة**
هي المسمى السابق ، اطله .

Méthanumain (F). ٢١١٩٢ - **فوشل بختري**
نمت تعريفه يطلق على ما هو فوق التفكير البشري وادراكه .

Fucū, Varech ٢١١٩٣ - **فوشس**
هو الفريج جلى نباتات بحرية من فصيلة الفوشيات .

Fucaceae (S). ٢١١٩٤ - **فوشيات**
Fucacées (F), Fucaceae (E).
فصيلة نباتات مائية من رتبة الخفيات السمر . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بحري المنيث .

Vochysiaceae (S). ٢١١٩٥ - **فوشيات**
Vochysiaceae (F), Vochystaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة العائلات . اجناسها وانواعها للمروفة قليلة العدد اصنافها منظم اصقاع امريكة الاستوائية || جميع نباتاتها معمرة ، بعضها شجيرة

التجميع . ازهارها جميلة الشكل ملونة الكزوين ، رباعية الفصل والبيئات ، ثمانية الاسبعة || ترطب في الاربة المتوسطة الانسجام والربوطة ، الثنية بالمواد الضوية والتماسر المعدنية . غير انها تخشى المراض الطليقة الكثيرة الاشخاص || اشهر انواعها ما يتبع .

Fuchsia fulgens (S). ٢١١٧٨ - **فوشيا بهية**
Fuchsia elaeagnae (F).
نوع من الفوشيا وهي جملة زهرة تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مسطحة ساقها وفروعها كثيفة . اوراقها غضراء اللون ، بيضية الشكل ، مغزلة الفصل ، تطلو من ١٠ الى ٢٠ سم . وتقرض من ٥ الى ١٢ سم . ازهارها عتقودية التجميع متدلية . كزوها وصلها مستطيلة مرجانية . يتلاتها الى الحفرة الاربوجانية الساطعة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

Fuchsia triphylla (S), Fuchsia à feuilles ternées (F). ٢١١٧٩ - **فوشيا ثلاثية الأوراق**
نوع من الفوشيا وهي جملة سرية صغيرة الة تملو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوراقها غسبية ، ثلاثية ، سنانية الشكل تطلو من ٨ الى ٨ سم . فصلها اخر اللون ، لمع المراج ، خلي المروق . ازهارها عتقودية التجميع متدلية ، لونها الى الحفرة القرمزية || ازهارها يستمر طوال السنة .

Fuchsia magellanica, F. macrostemma, F. coccinea, F. corallina (S), Fuchsia commun (F), Common fuchsia (E). ٢١١٨٠ - **فوشيا شاذكة**
نوع من الفوشيا وهي جملة سرية تملو نحو ١٠٠ سم . فروعها مجلحة حمراء اللون . اوراقها معتقة اهليجية . ازهارها متدلية جرسية الشكل . كزوها وصلها اربوجانية اللون . يتلاتها الى القرقة البنفسجية الموراج || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

Fuchsia corymbiflora (S), Fuchsia an corymb (F). ٢١١٨١ - **فوشيا حلقية**
نوع من الفوشيا وهي جنبة جادسة تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . فروعها دقيقة كسكية اللون . اوراقها اهليجية ذلقة تطلو من ٢٠ الى ٣٢ سم . فصلها خلي البشرة اخر الصلابة . ازهارها كثيرة الة حلقية التجميع . كزوها ويتلاتها الى البياض الاخير ، فصلها اربوجانية عاقبة الموراج . ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

Fuchsia splendens (S). ٢١١٨٢ - **فوشيا لامعة**
Fuchsia brilliant (F).
نوع من الفوشيا وهي جملة سرية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها جزيرية اللون لزجة . اوراقها الى الخضار الزاهي . ازهارها فردية ، ابطية ، مستطيلة المالحق ، متدلية . كزوها وصلها اربوجانية اللون . يتلاتها عتقودية . ازهارها يستمر طوال الصيف .

Fuchsia arborescens (S), Fuchsia arborescent (F). ٢١١٨٣ - **فوشيا شجيرة**
نوع من الفوشيا وهي جنبة جادسة فروع مهدا المكسك . تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضية الشكل ، ذلقة الزام الاخير . تطلو نحو ٣٠ سم . فصلها خلي البشرة جزوي اللون . ازهارها عتقودية التجميع ، ملونة الازرناكاز ، متصلة الة ، وردية اللون ، متصبية . ازهارها يستمر من الخريف الى الربيع .



فوشيا بهية



فوشل

والبيض الآخر جنسي. أولادها كاملة ، متطابقة أو ضمنية. أزهارها خشوية ، متحدة الإزهارات ، ثمارها جرد مستطيلة تحسن بعض البذور المذبة الآح .



فول (١)

٢١٢٠٣ - فول هندي *Pois d'Inde (F).*
هو القنول الباتر ، اطليه .

٢١٢٠٤ - فول هندي مسهل *Strychnos ignator.*
هو ستر يكتوس اينياس ، اطليه .

٢١٢٠٥ - قوتج *وفاطر احمر الرجلين* كان رأسه شيب مصعوب ونها ما يكن اسود الرأس وصار خلفه اغير *ابن سيده* .

٢١٢٠٦ - قوتج *Enveloppe (F), Wrapper (E).*
القوتج : طلاء كل شي .

٢١٢٠٧ - فوم *All (F).*
هو الفوم لزراعي ، اطليه .

٢١٢٠٨ - فومارين *Fumarine (F), Fumaric (E).*
مادة قلوية فعالة تستخرج من الشاترج الحزني .



فول (٢)

٢١٢٠٩ - فومالكه *Fumara (S).*
جنس نباتات عشبية مجعولة من فصيلة الاذنيات .

أزهارها المعروفة قليلة المدد جميعها برية . منتجاتها غابات وجراج وإدخال بعض مناطق حوض البحر الايضي المتوسط || أولادها وأزهارها عطرية العرف || أعراف أزهارها وأشهرها الثلاثة التالية :

٢١٢١٠ - فومالكه حريرية *Fumana arabica (S).*
Fumana arabique (F).
نوع من الفصانة . فرومها منتصب . أولادها مراكية ، تصيرة الاذنيات ، عطية الاتصال المستطيلة المنطقة الرؤوس . أزهارها صفراء اللون || تنويرها ابيي .

٢١٢١١ - فومالكه لرجية *Fumana glutinosa (S).*
Fumana glutineuse (F).
نوع من الفصانة . فرومها منتصب . أولادها متطابقة ، عضالية ، لزجة . نصالها ضيقة ، مستطيلة . أزهارها ال الصفار الباهت . تنويرها ديبني .

٢١٢١٢ - فومالكه متحنبة *Fumana procumbens (S).*
Fumana penchée (F).
نوع من الفصانة . فرومها متحنبة . أولادها مترافعة ، جلالة ، عطية . أزهارها ابيي الارتكاز . أزهارها مستعرة صفراء اللون . تنويرها صبي .

٢١٢١٣ - فومكة *Phoma (S).*
جنس ظفود مجعولة من الصنبيات . بكتيدات كروية الشكل أو بيضية مفلطحة تنشا تحت الإدمة ثم ترقى ال سطح . مقة يرتكز على حلويات دقيقة . شغراتها تصيرة ، يوبقاتها مستطيلة ، بسيطة ، شائعة || أنواعها عديدة تركب تخلف أعضاء النبات . أشهرها :

٢١٢١٤ - فومكة البطاطا *Phoma solanicola (S).*
فطر مجعري يصيب سوق البطاطا ومرتقيا نقيضها ويثير نموا || مظهره الخاربي لطح مستطيلة ، ييش أو صفر .



فول كلبار



فول مصري



فوية البطاطا

٢١١٩٦ - فول* ، بالتي ، باللاء ، جمني *Vicia faba, Faba vulgaris (S).* *Fève (F), Broad bean (E), Buffbohnen (D), Fava (I).*

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة البقوليات القرشاية . وهو نوع عديد الصوروب والاصرام فوارقها اعتلاط علو السوق ولون الانزاع وشمم القرون وشكل الحبوب . والقول نبات غليظ الجذور المخورة القليلة الانشباب ساقه منتصب ، مرمة ، جواء ، محزوزة ، حاددة الفروع تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . أولادها متطابقة مركبة . ورقها شحمية الترتيب ، بيضبة النصل البحري اللون . أزهار كبيرة القند ، متفوية الجميع ، ابيطة الارتكاز ، يضاء اللون أو حراء تملوا رقة بنفسية سواد الموج . ثمار قرون مفلطحة مستطيلة تلفت الحبوب التي يراوح عددا بين ٣ و ٨ . وحوبه هذه التي تعتبر من أش وانشط للمأكول الزراعية تحوي نحو ٨١٪ من الوحدات المللكية ، ترميها :

مواد ازوتية ٢١ و ١٪
مواد دهنية ١٥ و ٤٪
مواد هيدروكربونية ٥٥ و ٢٥٪

والقول يرغب في الآرية المتندبة ويفضل منها الطليبة الزلية ثم الطليبة الكلدية الزلية ثم الطليبة . وهو قليل الجودة ولانتاج في أبل ، يفضل الري الذي يلائم مزاجه ويضاهت انتاجه || حاجته ال الاسدة المنطبة تنقص حل الحامض السكوري والبوتاس . لزوم الدم الواحد يقدر بنحو ٥٠ كيلو منها ٣٠ كيلو سوربفات و ٢٥ كيلو كلورير البوتاس تدر على التربة وتطمر جيها .

٢١١٩٧ - فول انجيل *Fève de cheval (F).*
هو الفول المصري ، اطليه .

٢١١٩٨ - فول إينياس *Strychnos ignator (F).*
هو ستر يكتوس اينياس ، اطليه .

٢١١٩٩ - فول مسيبي *Haricot-cauba (F).*
هو القنول البتي ، اطليه .

٢١٢٠٠ - فول مسوفاكي *Anachide (F).*
شائع باسم فسق صبيد ، اطليه .

٢١٢٠١ - فول كلبار *Physostigma venenosum (S).* *Physostigma vénéneux, Fève de Calabar (F), Calabar bean (E), Kalaberbohne (D), Fava del Calabara (I).*

نبات عارث مسمر من فصيلة القرنيات . أولادها متطابقة أزهاره اوسيوالي . يزود سامة لكنها لا تملو من اللتاع الطليبة وقد تستعمل في علاجات البين .

٢١٢٠٢ - فول مصري* ، فول انجيل *Vicia faba equina, Faba equina (S).* *Féverolle, Fève de cheval (F), Horse bean, Tick bean (E), Pferdebohne (D), Fava cavallina, Favetta cavallina (I).*

ضرب من القول زراعت واسعة الانتشار تكثر في مصر والسودان . ساقه رقيقة تملو نحو ١٠٠ سم . نصل ورقهاة عابق الخضار . ثماره قرون صفيرة اسطوانية منتصب .

للملفوف والقنبيط واللفت والسلم والحدود || مظهره الخارجي يقع مستعرضة تملأ اطراف التصل. تبدو قمرية اللون ثم حمراء حنطية المواج تقرح التسح المتضامة وتنفسي عليها || يركب الثبات في مختلف ادوار له يعيش في الثربة || يكالغ اولاً باجتناب تكرار زراعة الصليبيات في نفس الموقع. ثانياً يظهر البذار، قبل نثره، بمعلول بيكلوريز اقريب المركز ٪.

Phoma linicola (S). * قُوْمَةُ الكَتَانِ *
ظهر مجهري يصيب سوق الكتان فيلوجيا. مظهره الخارجي يقع سفيرة مستطيلة حنطية اللون يركب التسح في زامه الأول من الثربة وصاعداً فتقرح اللحاء والبشرة وتذبل الثبات. يكالغ يظهر الثربة والثبات.

Phoma apicola (S). * قُوْمَةُ الكَرَسِ *
Gale du céleri (F).
ظهر مجهري يصيب الكرّس والبقندوس في اجنتها وازداد اوراقها || مظهره الخارجي يقع حنطية تقرح البشرة ورفقها تقسب رخاوة وذبول الاعضاء الموصومة || يكالغ يظهر الثربة والبذار.

Phoma citricarpa (S). * قُوْمَةُ الجَدُورِ *، * قُثْدُور *
Hymenochaete noxia, Fomes lamsensis, Fomes noxius (S). Hymenochaete (F).
ظهر من السميات موطنه البلاد الحارة. يركب جلور عدة نباتات انحصا القشقة والبن والشاي والفلن || مظهره الخارجي انكاش فيفبات فذبول في الارواق يعقبها جثم الجبرم في الاثان والنباس || وهو على الجلود خيوط سفيرة مَرَامَة حنطية اللون تملق الجلود وقد تغلفها قشطب الجراوة والايات || اما الفطر فهو كثافة من دملة زباه الجبرم، شيرانية التكمه المستدرة الخطيط الجلوية اللون || ليس له علاجات شافية سوى الآن.

Phoma lignous, Fomes semitostus, Rigidoporus microporus, Polyporus zonalis (S). Polypore zonale, Maladie des «racines blanches» (F). White rot (E).
ظهر من السميات موطنه البلاد الحارة يركب جلور عدة نباتات انحصا الكاكار والقشقة والمانا والنبيل. مظهره الخارجي انكاش جزئي على بعض اقسام الشجرة يصيب جفاف الارواق والاياتن به حجوم التوازي. وهو على الجلود خيوط متوازية جسمية العقد المرسوفة كعب السبحة. تبدو يضاء اللون ثم تبتية وتنتهي بالوردي. شبيهه كيف الحيف يقضم الجراوة فيطعمها مع اوبياها لا علاج له، اما اجنتها فهوور وذلك بالانضاد من اربابت الانجار الحمضية القايمة المتروكة في الثربة. او باقتلاع هذه الارويات قبل المباشرة بالكرس.

Phomopsis (S). * قُوْمُوْسِيْسِ *
جفس ظهور مجهري من فصيلة السنيبات. يتميز بيكنيداته الاقياسية الشكل. شيراته خرزوية او خيطية. بويذاته بسيطة، شفاقة، مستطيلة، جالسة او منقطة. لعرف انواحه ما يتبع.

Phomopsis abietina (S). * قُوْمُوْسِيْسِ التَّنَوُّبِ *
ظهر مجهري يصيب اثناد التنوب في نوايبها. مظهره الخارجي اطار يحيط القنولي على حدود زامها الاخير

تركب الساق والمروق قسب جفاف التسج وانصداع البشرة || يكالغ يظهر الثربة.

Phoma umbilicaris (S). * قُوْمَةُ التَّفَاحِ *
ظهر مجهري يصيب ثمار التفاح والاجاص في ابان تمها. مظهره الخارجي بقعة حنطية تركب القشرة عند عاتقها ثم تمتد قليلا بعد ان تنفي البشرة ويطلع من الشجج رفقها ويصلها || يتميز من الاضام الملوثة الانتشار والاذى الي لا تستوجب المكافاة.

Phoma sanguinolenta, Ph. rostrupii (S).
ظهر مجهري يصيب الجوز في قرص جنته وقد يمتد الى الارواق || مظهره الخارجي يقع خطوطه اللون تبدو مسيرة ثم تتسح وتتشابك تقرح الامة والبشرة وتطليها. ينشط في الازربة النهائية الرملية ويلاشي بقدر ما يزداد انتماج الثربة.

Phoma citricarpa (S). * قُوْمَةُ الحَمْضِيَّاتِ *
ظهر مجهري يصيب اوراق وثمار الحمضيات. مظهره الخارجي، على الارواق، يقع سفيرة مستدرة سمراء اللون تركب التصل على سفحات العليا || وهو على الثمار يقع مستدرة قطرها من ١ الى ٥ سم. تبدو مسيرة ثم تمتد وتتشابك ضلع مساحتها نحو ٢ سم. تكون في اول مهادها غبراء اللون ثم تتصرف نحو المعطي وتنتهي بسلاسر. بيكنيداته فردية او سفية للتصميم، حنطية او حمراء اللون، قطرها من ١٥٠ الى ١٢٥ ميكرون. بويذاته اطيبيية او مريدية الشكل، قياسها نحو ٤×٢ ميكرون. يصيب الثمار ويقتصر مدة حططها || يكالغ ينضج الانجار بسائل يورود الملول ٪١ على ثلاث او اربع مرات، الاول بعد اكال الاجزاء يامبر والثانية بعد الاول ثلاثة اسابيع والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع والرابعة بعد الثالثة بمسعة اسابيع || ومنهم من استعمل الفوطير غير المركزة على التماس وقد يكونوا مسميين.

Phoma lavendulae (S). * قُوْمَةُ الخَرْقَمِي *
ظهر مجهري يصيب الخرقاس في قرحها الحرة والجديدة فيلوجيا || مظهره الخارجي ذبول على بالفروع القديمة والجديدة سبه انتشار القوس بين الاذمة والبشرة التي تسر قفيس || بيكنيداته كروية قطرها يراوح بين ٨٥ و ١٥٥ ميكرون. بويذاته اسطوانية قياسها نحو ٢×٤ ميكرون || يكالغ يظهر الثربة بالكلس الحراق بعد اقتلاص مرقق النباتات المصابة.

Phoma insidiaria (S). * قُوْمَةُ الدَّرَةِ *
ظهر مجهري يصيب اوراق الدرة فيلوجيا. مظهره الخارجي يقع لاجسية الشكل والحجم تركب نصل الارواق. تبدو حنطية ثم تنصرف الى الربادي بعد ان يكتنفها اطار اصعب مابق || بيكنيداته مستدرة قطرها يراوح بين ٧٥ و ٨٥ ميكرون. بويذاته اطيبيية قياسها ٢×٢ ميكرون. تلاحق مرقق النباتات المصابة.

Phoma lingam (S). * قُوْمَةُ الصَلْبِيَّاتِ *
ظهر مجهري يصيب بعض نباتات الفصيلة الصليبية انحصا



قوة التفاح



قوة الحمضيات



قوة الدرة



فوس الجلود

٧١٢٢٧ - فيتامين (F). Vitamine (F). Vitamin (E).
فيتامين اسم يطلق على بعض المواد اللازمة لنماء الجسم ونموه مع العلم ان نقص نسبة من هذه المواد لا يسبب بعض الأمراض الناتجة عن نقص فيتامين (E) || وفيتامينات (F) ليست مركبات خيالية تستخدم في بناء الانسجة. او مركبات عضوية تتحرر تحوله طائفة حيوانية يستعملها الجسم في نشاطه... بل هي مواد وافية لازمة يفتقر اليها الجسم في جميع احواله وامراضه || وفيتامينات حديثة الانقسام تختلف باختلاف غاياتها وفعاليتها. امثلها حالياً الفيتامين «أ» و «ب» و «ج» و «د» و «هـ» و «و» و «ز» || سائبة الجسم الحيوية الى مختلف الفيتامينات تراوح بين ٧٠ و ٩٠ مليغرام. متوسطها جسم وزنه ٧٠ كلو يقدر بنحو:

فيتامين «ث»	٧٠,٠٠٠ مع
فيتامين «ب ١»	١,٥٠٠ مع
فيتامين «ب ٢»	١,٥٠٠ مع
فيتامين «أ»	٣,٥٠٠ مع
فيتامين «د»	١٠,٠٠٣ مع

٧١٢٢٨ - فيتامين «أ» Vitamine A (F). Vitamin A (E).
يأخذ العين لان نقصه في الجسم يسبب تقصير المتصلة ويضعف البصر ويقلش || مصادره حيوانية ونباتية كما هي مدونة ادناه وقد جاء ترتيبها بالنسبة الى غناها.
مصادر حيوانية : زيت كبد الكندس، زيت كبد التونا، السمك، الكبد النوي، الخشخاش، صفار البيض، البيض، الكلى، الزبدية، الخشخشة، الجبن، السم، لحم البقر، الحمار، الحليب المكثف المحلى، الحليب المالح، اللحم المدخن.
مصادر نباتية : يقطين، طرشقون، خضار، سلق، اسبانج، ملوخية، قرق، سلو، حمض، خس، مشمش، قرع، ورق النجيل، جزر، زيل، خوخ، فليفلة، زيتون، شوندر، كرنب، بقدونس، فلفل، فلفل، موز، قوس، جزر.

٧١٢٢٩ - فيتامين «ب» Vitamine B (F). Vitamin B (E).
اسم شامل يطلق على عدة فيتامينات تلعب في الملم، نشاطها كثير الفوائد انحصار تأمين النشوة ومضادة مرض البربري وداء الفم || اما التمييز عن فوائدها ومصادرها فهو منوط بالمحدد الاساس على كافي التصنيف التتابع حيث ذكرنا انواعها الثلاثة المشهورة مع مصادرها التي جاء ترتيبها بالنسبة الى غناها.

فيتامين «ب» مصادر الكبح : زيت كبد التونا، الكندس، الزبدية، البارد، القبر، صفار البيض، الزبدية الصلبة، دهن النخيل، الكبد، الحمار، لحم الحليب.

فيتامين «ب ١» مصادر لالتهاب العصب : خيرة البيرة، رشم الزردع، كبد في، صفار البيض، حبوب القزليات، دقيق القمح، زيل، خضار، برقال، لينون، حمار، كستناء، طرشقون، حبوب الزردع، شوندر، سلق، تين ناشف، جزر، خضار، ورق النجيل، زبيب، خوخ مجفف، اسبانج، حمض، خبز اسمر، يقطين، موز، قرع.

فيتامين «ب ٢» يهد النشوة : خيرة البيرة، كبد في، صفار البيض، كلى، سلق، بازديان،

فوسيب جفاف التسبب ويحرق الار ثم يتهه يراس الحلب الذي يته زروا وشيئا فشيئا حتى يتم كمال القدر ثم النقص. يكافئ بالتصاوغ وحرق الاعضاء الموصولة ويتطوّر الجروح يعلو سفلات النحاس.

٧١٢٢٧ - فوسمي Solifis sauvage (F). هو السلفيل البري، اطبه.

٧١٢٢٨ - فوسمي أسود Solifis noir (F). هو الدبع الزرعي، اطبه.

٧١٢٢٩ - فوكيا Pivoline (F). هي البوح، اطبه.

٧١٢٣٠ - فوكية Crazière (F). Crater (E). مثله حم البركان.

٧١٢٣١ - فويات Rubiacene (S). Rubiacene (E).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القمالة. انواعها نحو ٤٠٠٠ تنتمي الى ٣٤٥ جنساً تنحصر الى ثلاثة اسباط : البليات والكيزيات وقشويات. معظمها اشجار ونباتات بعضها اعشاب. جميعها كاملة الاوراق ولازهار.

٧١٢٣٢ - فوكية Episperme (F). اسم يطلق على الفشاء الرقيق الذي يلفك التوتة.

٧١٢٣٣ - قبي قطرة او سرب من البير.

٧١٢٣٤ - قبيج Erectile. قابل الملم والانتصاب.

٧١٢٣٥ - قبياد Hibou (mille) (F). Owl (E). ذكر البروم ويقال له الصدى والصيح.

٧١٢٣٦ - قبياني Pichartus (S). Pichartus (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرايات. موطنه بعض مناطق افريقية الشمالية. ملجئه الحياتي جماعي. فوجيه يده من ٢٠ الى ٤٠ زوجاً. قوته الحشرات والقرويات والاسماك والقشريات والحبوب والبلور || جسمه كبير القدر يطلو نحو ٥٥ سم. راسه صغير الجرم. منقاده معتدل الصلابة. عنقه كمنقذ السرة مستطيل الشكل ازغب الريش. جناحاه قصيران. ذنبه مستطيل القدر، مستدير الطرف. قويه اسود الزرء والجانح والذنب، أبيض الرأس والعنق والباطن والاطيل والقصع.

٧١٢٣٧ - قبيال Cornac (F). Elephant-driver (E). من يقدر القيل ويضئ بامره.

٧١٢٣٨ - فيبروم هو الورم اللي، اطبه.

٧١٢٣٩ - فيرون، فيريون، فيريون Vibration (F). Vibrio (E). نوع من البكتيرية كثيرة الحركة لولبية الشكل او مقوية.

٧١٢٤٠ - فيبرين، فيبرين Fibrine (E). Fibrin (E). مادة آسية يبيض اللون مادمة اللحم والورف تتدخل في تركيب الدم والصلب والشغلات.

٧١٢٤١ - فيتيكاس هو الكتان البري، اطبه.



فان

موت الصيصان الحديثة التفت. مصادره عديدة اشهرها:
زيت رثم الحنطة ، رثم الذروع ، الكبد اليء ، زيت
فستق البية ، زيت القطن ، زيت التفل ، زيت التفل ، زيت
الصويا ، الخس ، الرشا ، القرء ، عضلات البقر ،
دهن الخنزير ، زيت الزيتون ، زيت الجوز ، الزبدء ،
الحلب الكامل .

Vitamines (F).

٢١٢٥٠ - فيتامينات

انظر الجدول في الصفحة المقابلة .

٢١٢٥١ - فيثون زيتي* ، فيثودكتة زيتية* ،

نجمار زيتي (Phytodecta olivaceus (S). **Phytodecta olivacea** (E).
Phytodecta olivacea (F). **Phytodecta olivacea** (E).

حشرة غاضلة من فصيلة النصاريات ورتبة مدمدات
الاجنحة. تألف البراري والارحاج اللذلة. غناصها
ويرقاتها تعيش على نباتات القرنيات القرأشية واعصها الوزال
والقنطول || جسمها صغير اللقء يطول من ٤ الى ٥ سم.
لونها الى الصفر الزيتي الاسمر المالح يملوء في الظهور
توضيح قائم وصالان اسودان قاطبان. رأسها كبير الحجم.
عينها صغيرتان. زانباها غيظيان. ظهورها مسندل
الاحدياب. مستدير الطرف اللاتيف. محمدا متتاها
التنظيف الخفيف. ارسافها رابعية العقل الظاهرة || لها
جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في ايار
وتبقى حتى ايلول. تسرح في النهار. تساء بعد ظهورها
باربعة اسابيع. تجتمع المكان رزنا لاقامية الحجم ضمن
شفاة غروي المادة يلتصق بضال الازراق ويشرة البعء ||
البرقة تتد بلوطها الادراك التام تطول نحو ٨ سم. جسمها
ونشي الشكل ، سداسي الرؤوب. لونها الى الصفر
القائم يطوء تنظيط اسمر. رأسها وشربها ورواجها الى
السمة || طور الكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع
يتغذى في القرية تحت الحجارة ضمن جراب من القراب
والمواد النباتية .

٢١٢٥٢ - فيثوتونس الاجاص

هو غاشية الاجاص ، اطبا .
Phytopte du poirier

٢١٢٥٣ - فيثوتونس الكرمة

هو غاشية الكرمة ، اطبا .
Phytopte de la vigne

٢١٢٥٤ - فيثوتومة

Phytotoma (S).
Phytotoma (F).

جنس طير من الجالوم سيات المناقير وفصيلة القطنجيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من طمر امركة الجنوبية
اجسامها متوسطة القد تطول من ١٨ الى ٢٠ سم. مناقبها
قصيرة ، مستعرجة الاشفاق. اولياها متراكبة الالوان
الجميلة . اطراف اجنحتها واذاهاها تنتهي دائما بالاسود
الاسفع . صغورها ويطونها يعض || ملجأها الحياتي : حامي.
تألف الغابات والاشجار القريبة من مجاري الماء . قوتها
البذور والثمار البائعة وبعض الحشرات والديدان .

٢١٢٥٥ - فيثوتوميعة ، متحاجة

Phytotomie (F). Phytotomy (E).

الفيثوتوميعة علم يبحث في قريع النبات .

خوخ مجفف ، حبوب القرنيات ، مشش مجفف ،
كستناء ، بزيلا خضراء ، نياض البيض ، اسبانغ ،
ورق النجل ، حبش ، طرخشقون ، حبوب الذروع ،
ملفوف ، قرء ، بقونس ، غيض الحليب ، رثم
الذروع ، محار .

٢١٢٥٥ - فيتامين ث

Vitamin C (F).
Vitamin C (E).

يستر من اليء الفيتامينات وازنها للجسم . نقشه يسبب
ضمت اليئة والصداع وسوء الهضم واين القامسل وكأكل
الانسان والحفر المرفوف بقاء الاستقريب || مصدره
الرئيسي النبات حيث يكثر في بعض الثمار والاوراق كما
هو مين في التصنيف التابع. وقد جاء ترتيب المصادر الواردة
بالنسبة الى غناها فالاولية للاشي :

اعرف مصادر فيتامين ث || **للمالوية** : ثمرة الترسين ،
ثمرة الزعرور ، ثمرة الاكدينيا ، بقونس ، قليفلة ،
ملفوف ، قرء ، حبش ، ورق النجل ، بزيلا خضراء ،
برتقال ، ليمون ، كزيفروت (ليمون الجنة) ، يوسبي ،
اسبانغ ، سلق ، سمرة ، كستناء ، طرخشقون ، كبد فيء ،
فراشكين ، باذنجان ، عنباء ، قوم ، كرات ، بتتوره ،
كرلس ، بطاطا ، فجل .

٢١٢٤٦ - فيتامين ج

Vitamin G. Vitamin P.P. (F). Vitamin G. (E).

يساء ويلفظ جيل الشيمرات القوية فيزبها متاة
ويشبعها من سرمة الازراق || مصادره عديدة اعصها الليمون
والبرتقال ثم الخوخ والمشمش ثم الاسبانغ والبقونس والخس .

٢١٢٤٧ - فيتامين د

Vitamin D (F).
Vitamin D (E).

هو ما يعونه فيتامين اشعة الشمس لانه يتكون في الجسم
هناك يتعرض لاشعة الشمس وذلك لان الازرقيرول الموجود
في المادة المعنية التي يفرزها الجسم يتحول بفعل الاشعة
وراء البنفسجية الى فيتامين د || **والفيتامين د** :
يؤن توازن وتثبل الكليوم والفسفور في الدم والنظام .
خلوه من الجسم يسبب خواية النظام وليها وانماقها وتشرية
شكلها ما يؤدي الى الكسح || مصدره زيت كبد القداس
المعروف بزيت السمك .

٢١٢٤٨ - فيتامين ك

Vitamin K (F).
Vitamin K (E).

يمتج الزيف ويساهم على تجلط الدم تحليما طبييا لذلك
فهر من الضروريات لان نقشه في الجسم سيء المواقب .
والفيتامين ك || يقسم الى ثلات اشهرها ك و ك٢ و ك٣ .
ومصادر الفيتامين ك || هي الاسبانغ والملفوف والقنيط
واضباب البحر وهو يستخرج ، للاستهال العلاجي ،
من دقيق القصة || اما الفيتامين ك٢ || فيستخرج
من دقيق السلك .

٢١٢٤٩ - فيتامين هـ

Vitamin E (F).
Vitamin E (E).

هو ما يعونه فيتامين التماسل او الفيتامين المانع العقم وهو
المسال الرئيسي في نمو الحجيرات التناسلية وبين الزرم
شروديات التنوء الجنيني ونسجه المولدة || وهو ذو علاقة
كبرى بانتاج يعض الاسباج لان نقشه في الغذاء يؤدي
اولا الى انخفاض عدد البيض . ثانيا الى تدني نسبة المبوك
الصالح للتقيس . ثالثا الى ارتفاع نسبة التفتة ثم الى



فيت زيتي

جدول بأشهر الآثار الفنية يختلف الفيتامينات مع المقدار النوعي والمحمى للتوسيدي والطاقة الحرارية الخ...

Tableau des Vitamines, teneur en glucides et valeur calorique des principaux fruits

الموضوع	مقدار الفيتامينات الموجودة في كل ١٠٠ غرام من سوطي الثمار المأكولى									
	التصير عن المقدار بالوحدات الدولية					التصير بالمليغرام عن الحامض الاسفروتي				
	فيتامين «أ»			فيتامين «ب»		فيتامين «ث»				
	الحد الأقصى	المتوسط	الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى	المتوسط	الحد الأدنى	حليض بالسكر	للملح القياسي
									بالغرام	بالسكر
									الطاقة	الحرارية
									%	
أجاص	١٠٠	—	١٢	—	٣٠	—	٥	—	٢٠٢٦	٢,٤٦
أكينايا	—	—	—	—	—	—	—	—	١٠١٥	—
أنناس	١٦٠	—	١٠٠	—	٢٥	—	٢٠	—	١٥	—
برباريس	٤٠٠	٣٠٠	٩٠	—	—	١٠٠	—	٥٠	٠,٩٦	٦,٠٠
بنشق	—	—	—	—	٢٠٠	—	—	٣٠	—	—
بيلسان	—	—	—	—	—	—	١٠	—	—	—
تفاح	—	—	—	—	—	—	—	٢	٠,٦٤	١٦
تمر	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٢٦	١٠,٥٥
تين أخضر	—	١٠٠	—	—	٣٥	—	٥	—	٢	—
تين ناشف	—	٥٠	—	—	٢٥	—	—	—	١,٥٥	٢٨,٣٥
جوز طازج	—	—	—	٤٥٠	—	١٥٠	—	٣٠	—	—
خوخ	١٥٠٠	—	١٠٠	—	٤٠	—	١٠	—	٠,٩٥	٦,٣٤
خوخ جفف	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٧٢	٢٢,٢٥
دراق	٢٠٠٠	—	٧١٠	—	٩	٢	—	١٠	٠,٨١	٦,٥٦
زبيب	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٥٢	٢١,٨٥
سفرجل	—	—	—	—	—	—	١٥	—	٥	٠,٩٣
شوك القصار	—	—	—	—	—	٦٥٠	—	—	٤٥٠	—
عنب	—	٥٠	—	٧٥	—	٣٠	٤	٣	٠,٧٧	٥,٢٦
عوج	٨٠٠	—	٢٨٠	—	٣٠٠	—	١٤	—	١٠	—
خيزاء الخليلين	—	—	—	—	—	—	٨٠	—	٢٠	—
خيزاء برية	—	—	—	—	—	—	٢٥	—	—	—
فراز (فراولة)	—	٦٠	—	—	١٠٠	—	٥٠	—	٢٥	—
فراز	—	—	—	—	—	—	٤٥	—	—	—
فراز	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
قام	—	٢	—	—	—	—	١٥	—	٠,٩٨	٣,١٢
قام آبي	١٠٠٠	—	١٠٠	—	١٠٠	—	—	١٠	٠,٨٥	—
كرز	٦٠٠	—	٥٠٠	—	—	—	٥	—	٠,٦٨	٢,٧٤
كستناء	—	—	—	٩٠	—	—	٣٠	—	—	—
كشمش	—	—	—	—	—	٣٠	—	٢٥	٢,٣٥	٦,٩٢
كشمش احمر	—	—	—	—	—	٥٠	—	٢٠	١,٩٠	٤,٣٨
كشمش اسود	٥٠٠	٣٠٠	١٢	—	١٢	٦	—	٢٢٠	٢,٠٠	١٠,٧٤
لوز	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ليون	—	٩٠	—	—	—	—	٥٠	—	٢,٤٦	٦,٤٦
مشمش	٢٠٠٠	—	٧٦٠	—	٩	٢	—	١٠	١,٢٧	٧,٥٠
مصمة (فرايبواز)	—	—	—	—	—	٢٥	—	—	٢٠	٦,٤٧
موز	٢٨٠	—	٢٥٠	—	٥٠	—	١٠	—	٢	٠,٢٦
نسرين	—	٥٠٠٠	—	—	—	١٠٠٠	—	—	—	—
يوسى (مستدين)	—	—	—	١٠٠	—	٣٠	—	—	٢٠	—

٨٠ م. ثوبها متناخل الا لوان . راسها وصلرها الى الشقار الحظي . بطنها الى الياس النبي . روشنها الامسيان بلون صديها يسترهها توشيح وتظليل ويكسر كل واحد منها ينجح قصي مستطيل . روشنها الخلفيان بلون بطنها . تظهر في لبنان من ايار الى آب . اجيائها الحولية اربعة . روقاتها خمسة تركب غنطل اوراق التيساتات الزرافية والريضية . اغبرها قليلة لا تستوجب المكافئة .

٢١٢٦٢ - فيثوميترا شحابية *

Phytometra chalcites, Plusia chalcites (S).
Phytometra cuivré (F). *Phytometra chalcites* (E).
حشرة مؤذية من فصيلة الشفويات حشرقيات الاجتحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية غصبا رقيق الازهار . روقها غاسلة تموش على اوراق النباتات البرية اغصها الباذنجانيات ومنها البتونة || جسمها شبه مدني الشكل بطول نحو ١٥ م . يسقطها تراوح من ٣٦ الى ٤٠ م . راسها معتدل الجرم ، سطحي الين ، اقصر الموج . مينها زيتان ، نازلاتان زباناها غليظتان . ملابسها صغيرة . مرشفها معتدل اللون . جوشنها وبطنها الى الصخرة الخطيئة الموج || روشنها الامسيان الى الصخرة تملوها زركشة سمراء وبقتجان متلاصفتان نحاسيتان اللون . روشنها الخلفيان الى الصخرة الخطيئة السوية . اعلاها الى الحظي الاكلث || لها ثلاثة اجيال في الحيل . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان || الطور البرقي في ايلول الاول والثاني يستمر نحو ٣٨ يوما ويستمر في ايلول الثالث نحو ٢٠ اسبوعا || السرة نحو ٤٠ م . اجيائها الكمال الجسودي بطول نحو ٤٠ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، زني اللون . سطحي الموج تملوه ثلاثة غسوط لبيبة قاطبة ريشان جانبيا جميعها متناخله الاخضر والاصفر . راسها شديد الصخرة . مدنها ورواجيها الى الحظي الاصفر || طور الكمال الذي يستمر في ايلولين الاول والثاني نحو ١٥ يوما ، يستمر في ايلول الثالث نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي ضمن سلجة لتسبب السرة بين قصبان النبات المائل او تحت الاوراق الساقطة التي تلصق التربة .

٢١٢٦٤ - فيثوميترا * فوئوئو

Phyteuma (S). *Raiponce, Raponce* (F). *Rampion* (E). *Lange Tenfelskralle* (D). *Raponzolo* (I).
جنس نباتات حشوية مسمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي بقل وتريسي . جلورها وشية الشكل . اوراقها زرقاء بقلية بسيطة ، القرصية منها مستطيلة الزائد ، كبيرة التصل اما الجلهية فصغيرة . اوراقها حالية ، لاقامية التجميع ، يكثر فيها اللون الازرق . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٢٦٥ - فيثوميترا ديمية الورق

Phyteuma scorzoneraefolium, Ph. betonicosifolium, Ph. Micheli (S). *Raiponce de Micheli* (F).
نوع من الفيتوميترا وهي حشبة بقلية سبريتية تملو من ٤٠ الى ٧٠ م . جلورها ولدي الشكل جامد للمادة الحشوية لماكورة اليضاح اللون . اوراقها القرصية ضيقة التصل ، قلبية القاعدة ، تشبه اوراق اللبغ . اذغابها ليلكية اللون ، سلبية التجميع ، اسطوانية الترتوب ، ثنائية او ثلاثية السات .

٢١٢٦٦ - فيثوميترا سلبكية ، عصا يعقوب

Phyteuma spicatum (S). *Raiponce en épi* (F).
نوع من الفيتوميترا وهي حشبة بقلية سبريتية عديدة الفروع .

Phytoclea (S). *Phytoclea* (F).
جنس حشرات من فصيلة القزنيديات انواعها عديدة جميعها صغيرة القند ، مستطيلة الشكل والزبان . طول اجسامها يراوح بين ٨ و ١٥ م . اوراقها غتلفة الا لوان يكثر فيها الاصفر والاصفر || وهي تموش على ازهار الحشويات دون ان تلتظيا . اما روقاتها فتركب السوق وتنسجها عند حمام التربة .

٢١٢٥٧ - فيثوميترا حية

Phytologie (F).
Phytology (E).
الفيتولوجية علم يبحث في النبات ، راجع علم النبات .

٢١٢٥٨ - فيثوميترا *

Phytometra, Plusia (S).
Phytometra (F).
جنس سفرات فراشية من فصيلة الليات . انواعها عديدة . اجسامها غتلفة القند والا لوان . قرنها الاستحارية غميلة . وراقها الامسية زركشة || انثاها اكبر حشبا من ذكورها تمتع مكها افراديا على نصل الاوراق . روقاتها قليلة تسطر على حقة نباتات بقلية وصناعية وتريضية . بطنها من القراشات القاطعة التي تجوب البلاد في طلب البيت والنبات المائل || اجيائها الحولية عديدة تراوح بين ٣ و ٥ || اشهر انواعها ما يلي .

٢١٢٥٩ - فيثوميترا اخضانية

Phytometra pulchrina (S).
نوع من الفيتوميترا الالفة . متوسطة القند ، بطنها نحو ٥٠ م . وصلها الى الجوزة الزرافية . بطنها الى السرة الخطيئة الصفراء الموج . روقاتها سمر الحنار || تظهر في لبنان من ايار الى حزيران بين آب الى ايلول ، اجيائها الحولية اربعة || روقاتها تركب اوراق نباتات الفصيلة النجارية دون ان توشح بها شديدة الالفة .

٢١٢٦٠ - فيثوميترا المكش

Phytometra festuca, Plusia festuca (S).
نوع من الفيتوميترا الالفة . متوسطة القند . بطنها نحو ٤٠ م . ثوبها الى السرة الخطيئة . صديها ابيض من بطنها . روشنها الامسيان جملعها بخطوط عابقة مستطيلة || تظهر في لبنان من حزيران الى ايلول . اجيائها الحولية اربعة . تموش روقاتها على النباتات النجيلية اغصها المكش والبطوط والسادي .

٢١٢٦١ - فيثوميترا حمام *

Phytometra gamma, Plusia gamma (S). *Gammia, Nocuelle gamma* (F). *Silver y moth* (E). *Lammaseule, Ypsioneule* (D).
نوع من الفيتوميترا القاطعة . متوسطة القند طولا نحو ١٧ م . وبطنها ٤٠ م . ثوبها الى السرة البنية . صديها ابيض من بطنها . روشنها الامسيان بلون صديها تترسرها غسوط سمر ويوجد على كل واحد منها عند اواخر زامه الثاني علامة خازة ييضاح اللون تشبه سرف غا ثلاث اسرف الالجمية اليونانية || تظهر في لبنان من نيسان الى تشرين . اجيائها الحولية عديدة تراوح بين ٤ و ٥ || روقها خمسة تشبه دودة غا . تركب اوراق غنطل البقول والنباتات الصناعية والريضية .

٢١٢٦٢ - فيثوميترا سلبكية *

Phytometra ni, Plusia ni (S).
نوع من الفيتوميترا القاطعة . كبيرة القند ، بطنها نحو



فيثوميترا



فيثوميترا الخانجات



فيثوميترا المكش



فيثوميترا غا



فيثوميترا مبقجة



فيثوميترا حمام



فيثوميترا

* ٢١٢٧٢ - فَيْتُونُمَا أَسْوَدُ الْغُطَفِ *

Phytonomus nigristrois (S). *Phytonome à rostre noir* (F).

حشرة صغيرة اللون من فصيلة السويبات طولها ٤ مم. لونها إلى الخضار الداكن. غطتها إلى السرة القاتمة. رجليها تركيب برام وأزهار وأوراق القنطاريات على اختلاف أنواعها خنثوية.



فَيْتُون أَحْمَرُ الذَّنَبِ

* ٢١٢٧٤ - فَيْتُونُمَا الْكَمَلِ *

Phytonomus zollus, Ph. punctatus (S). *Phytonome du trèfle* (F). *Clover bud weevil*, *Lasser clover leaf weevil* (E). *Schwarzrüsseliger*, *Blattnager*, *Kleeblattnager* (D).

حشرة من فصيلة السويبات. طولها ١٢ مم. رجليها خضراء اللون يغطيها من الرأس إلى الشرج غط أبيض كالتلج. وهي تركيب مع رجليها أوراق النفل قدسدها وتقع بها الأنثى.



فَيْتُونُمَا أَسْوَدُ الْغُطَفِ

* ٢١٢٧٥ - فَيْتُونِيَات *

Phaetonidae (S).

Phaetonidés, *Phaetonitidés* (F) *Phaetonidae* (E).

مركبة طير من كليات القدم، شملت الكف. مركزها المرعي بين الجبع والقنطاريين. أصابعها اقترابا من الجبع وتقرب بيضها من القنطاريين. طيراتها سفيف مستدل الانفتاح بعيد للشرط. قتيها الاصمك تصطادها بالمطبخ إلى الماء كما يقلل القاتق. أنواعها المعروفة أربعة تنتمي إلى جنس واحد يدعى فيتون.

* ٢١٢٧٦ - قَيْجَ * *Erection*

هو الانتشار.

* ٢١٢٧٧ - قَيْجَرَكَة مَعْتُولَة *

Pygara curtula (S). *Pygare circoncéle* (F). *Pygara curtula* (E).

حشرة من فصيلة الشوطيات ورتبة حوشيات الاجنسة. موطنها المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الأوسط إلى أوربة. فرائضها جارية قوتها رقيق الأزارار. سرقها قمش على أوراق الحور والصفصاف. جسمها متوسط اللون بطول نحو ١٦ مم. يسقطها نحو ٣٦ مم. رأسها شهب اللون. منابها صفيرتان. زباناها مشطيان مزدوجتان عند الذكر، عظيمات عند الانثى. جوشها ويطنها إلى الشبه. وريشها الاماميان إلى الشبه يملوها تحفح حنطي وبقية بنية تتألفها اخرى طرفية إلى الرتبة القلبية. ريشهاا الخلفيان إلى البياض الشبني المولج. اهدابها تنية. لها جيلان في الحول. تظهر فرائدة الجيل الاول في نيسان وتظهر فرائدة الجيل الثاني في تموز. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو أربعة أسابيع وتتح للكن على الصفصاف السفلى من نصال الأوراق. البقرة تطول نحو ٣٤ مم. جسمها شبه اسطوانى الشكل، قروي القبول السككية الجانبية. نوبها إلى الخطي الاسمر يملو غط نجسي فاقب اسودتة غطوط متفرعة تنتمي بالمطابق حر تزرير النمل. منبها ورواجها إلى القطة السراء. لها طور الاكمال الذي يسمر نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صلبة تحبها للرق في شقوق حلا الحور او الصفصاف.



فَيْتُونُمَا أَسْوَدُ الْغُطَفِ



فَيْجَرَة مَعْتُولَة

* ٢١٢٧٨ - قَيْجَن * *Rue* (F).

هو الذئب، الطلي.

جندرها وشعي الشكل، كبير القد، جامد المادة الحبية للأكلية البيضاء اللون. ساقها قوية تنصب جواء نمل من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراها القرمزية يضيئة الشكل، قلبية القاعدة، كبيرة النصل، مأكولة، طعمها يشبه طعم البندق. أنيابها سبيلة التجميع، كبيرة القد. لونها غشيت بلطف القرموب فيها الاغبر والسستجوني والازرق على اختلاف مجاميع. جميعها ثنائية السات.

* ٢١٢٧٩ - فَيْتُونُمَا مَدَوَكَة *

Phyteuma orbiculare (S). *Ralponce orbiculaire* (F).

نوع من الفينيه وهي شبيهة رية ورتيبية نمل من ١٥ إلى ٥٠ سم. أوراها القرمزية مستطيلة الزناد، يضيئة النصل الدلق الزام الاغبر. أنيابها حلقية التجميع، ثلاثية السات. لونها إلى الزرقاء الداكنة. أنيابها يسمر من ايار إلى تشرين الاول.

* ٢١٢٨٠ - فَيْتُونُمَا وَهَيْمَكَة ، لَفَت بَرَي *

Phyteuma humile (S). *Ralponce naine* (F).

نوع من الفينيه وهي عذبة رية ورتيبية صغيرة القد نمل من ٥ إلى ١٥ سم. أوراها القرمزية مصفية الشكل. أنيابها حلقية التجميع، بنفسية اللون، حلقية يحمل من ١٢ إلى ١٥ زهرة. أنيابها يسمر من تموز إلى آب.

* ٢١٢٩١ - فَيْتُونُمَا الْبَهْش *

هي لائحة البهشية، الطلي.

* ٢١٢٩٠ - فَيْتُونُمَا قَرَنَاء *

هي لائحة الكرنيم، الطلي.

* ٢١٢٩١ - فَيْتُون، طَائِرُ الْمَقَالِبِ *

Phaeton (S). *Phaeton*, *Oiseau des tropiques*, *Paille-en-queue* (F). *Phaeton* (E).

جنس طير من فصيلة الفيتونيات. أنبوه المعروفة أربعة. اصطناعها مجاميع البلاد الاستوائية والمجاعة. اجسامها متصلة القد. مناقيد جالسة، مسنة الخاطار. اجنتها كبيرة، ذلقة. اذناها مستطيلة المزال. ارساها قصيرة. خطاب اصابعها شامل الكفاف. اعراف انبوه واشهرها الفيتون الاخر الذئب.

* ٢١٢٩٢ - فَيْتُون أَحْمَرُ الذَّنَبِ *

Phaeton rubricauda (S). *Phaeton à queue rouge* (F).

طائر من الفيتون. طوله الكمال نحو ٩٠ سم. منها نحو ٥٠ سم. للزنان. ثوبه متراكب الاوان الهلعة والمرفوشة، فيها الأبيض والرودي والمرباني والاخر والاسود. ذنبه احر اللون. منقاد مرجاني. حلقه عيشة كستية. رسناه واصابعه حر. خطاب احر الانتشاب والزاد الاول، اسود الباني. اعطانه تشمل منط مجاميع البلاد الاستوائية من المالم القديم. يالفت الموانع الاسفريفة التالية. قوته الاسمك يتغذى عليها. كالمس ويطن في طليها على غق عدة لقدام. يلدن عشه، غالباً، في اضموس يديره بين الصغور وقد يدن أيضاً في الاشجار القلبية. اثناء قمع بيضة واحدة تحضنها بتناوبة الذكر نحو أربعة أسابيع.

٢١٢٨٨ - **فِيرُونُز** ، **فِيرُونُز** (F). Turquoise (F).

حبر عَيْنِ أَزْرَقُ الْهِنِّ .

٢١٢٨٩ - **فِيرُونُس** Virus

هو القيرس ، اطليبا .

٢١٢٩٠ - **فِيرُونِيَّة** ، **مِيزُول** ٥

Férolite, Mésolo (F).

سليكات مركب من الالومنيوم والكاليوم والصوديوم ونحو ٤٤٪ من السيليوس .

٢١٢٩١ - **فِيرُونِيَّة** ، **نُفَاقُ الْفِيل**

Feronia (S). Féronie, F. de l'Inde (F). Wood apple, Elephant apple tree (E). Elephananapfel (D). Feronia, Pomo d'elefanta (I).

جنس اشجار برية مشرة من فصيلة البرتقاليات . الزواحة قليلة العدد حينها ثمرات شاذكة . اطليبا الهند وبنديب والاندوس . ثمارها كروية الشكل حجمها حبر البرتقال . قشورها غليظة ليفية جامدة . لبها وردي اللون ، طعمه مزيج من الحلاوة والحامضة الحامضة .

٢١٢٩٢ - **فِيرُونِيكَا** Veronica (S). Véronique (F).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الخنازيريات . انواعها عديدة منها العشبية الحولية والمعمرة ومنها المنجيات الليفية والحشوية ومنها الاشجار التي يبلغ قطرها نحو ١٠٠ سم . اوراقها واغصانها لاقامية الاشكال والارتكاز || اءرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢١٢٩٣ - **فِيرُونِيكَا أَنْثَى** ، **لِينَارِيَّةُ حَرْشَاءَ**

Veronica tauricum, V. chamaedrys (S). Véronique germande, V. femelle, V. bilcardi (F). German-spedwell, Wild germander (E). Gemander-Ehrenpreis (D). Veronica piccola quercia, V. femina (I).

نوع من القيرونيكاهي عشبة ترينينية معمرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . ساقها منتصبة . اوراقها متفكة متقابلة ، نصلها سناني الشكل ، ضيق الصفحة الزباء . ازهارها عقودية التجميع ، عمودية الارتكاز ، زرقاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٢٩٤ - **فِيرُونِيكَا بَهْشِيَّةُ الْوَرَق** ٥

Veronica buxifolia (S). Véronique à feuilles de buis (F).

نوع من القيرونيكاهي جينة ترينينية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها منتصبة ، فرونها دقيقة جالسة ، اوراقها بهشية الشكل ، نصلها جامد الصفحة الاعمدة . ازهارها سلبية التجميع ، كاجية الارتكاز ، بيضاء اللون او وردية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢١٢٩٥ - **فِيرُونِيكَا حَبِيقُ الْمَنَى** ، **فُونْتَجُ مَعْصَرِي**

Veronica anagallis aquatica (S). Véronique d'eau (F). Water speedwell (E). Wasser Ehrenpreis (D). Veronica aquatica (I).

نوع من القيرونيكاهي عشبة برية طيبة معمرة تعيش في النظم وصل جوانب الاودية وبجاري الماء ، تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم . اوراقها متقابلة لسنة ، نصلها خلي البشرة تباعد التسعين المستدير المستدير الى الزرقعة . القليكية .

٢١٢٧٩ - **فَيْجَن حَلْبِي** Rue d'Alep (F).

هو السذاب السوري ، اطليبا .

٢١٢٨٠ - **فَيْجَن لَعْن** Rue officinale (F).

هو السذاب افريقي ، اطليبا .

٢١٢٨١ - **فَيْجَنِين** Rutine (F). Rutin (E).

الفيجنين او الحامض الفيجني ، غلوكونيد تربتي اللون يوجد في القيجين اي السذاب وفي عدة نباتات اخرى انحصا الكبر والورد .

٢١٢٨٢ - **فَيْد** Feuilles de safran (F).

هو ورق الزعفران .

٢١٢٨٣ - **فَيْدُ الْهَلِيَّة**

هي بنت الهلية الكردية ، اطليبا .

٢١٢٨٤ - **فَيْدُ الْهَلِيَّة كَرْدِيَّة**

Novius cardinal (F).

حشرة تسمى نفيريس كرداني ، اطليبا .

٢١٢٨٥ - **فَيْدُ الْهَلِيَّة عَمْدِيَّة** ، **بِكْرُوَّة**

عَمْدِيَّة ٥

Fidonia famula, Bichroma famula (S).

Fidonia servante (F). Bichroma famula (E).

حشرة من فصيلة الايفيات ودية حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا المعتدلة الحارة . فراشها واثمة قوتها مضر الازهار . موطنها تعيش على اوراق الزوال وانما هو جسمها نحيل ضئيف يطول نحو ١٠ م . يستلها نحو ٣١ م . رأسها اكعب اللون اصعب المالح . حينها صليتان . زباناها شطيان مة الذكر ، عظيمات مة الانثى . جوشها ويصلها الى الكعبة || وراثتها مة الثقبين الى الكعبة الصفراء الملوحة يطولها في الزوج الاسامي تبليج وتجميع وزرقة وزرقة كستية اللون . ويملونها في الزوج الخلفي شفحة متطلة وضلعان متفرعان مقصبان كستية اللون . اهدابها الى الحشوي الاثني || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفرائشة ايار وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بسة اسابيع وتضع المكن ميساديا على الصفحات السفل من نصال الوراق || السرقة تطول نحو ٢٤ م . جسمها رمدي الشكل مستطبع الرأس والمقدم . ثوباها ياتن لبيضة التي تعيش فيها وهو يراوح بين الاخضر والاصفر . رأسها الى النمرة . رواجها البطينة القسيلي مامعة ما يحيلها تقصيص مة الانتفال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في الجفالة اوبوين فروع النبات ضمن صلجة مثيلة الحيك .

٢١٢٨٦ - **فَيْرُونُس** ، **فَيْرُونُس** ، **فَيْرُونُس** Virus

ج. فيروس وبلاوس . هي اصول بعض الامراض الالاصام الجرثومية التي لم يتسكن العلم ، حتى الآن ، من تحييده الاشكالها الا بواسطة المجر الالكتروني . وهي كائنات حية ميكروية الجسم اي متناهية الصغر ، عديدة الاشكال القضيية ، كثيرة الانثى ، مستصبة على كل علاج .

٢١٢٨٧ - **فَيْرُونِي** Viral (F).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو منسوب الى القيرس .



فِيرُونِيَّة عَمْدِيَّة



فِيرُونِيَّة



فِيرُونِيكَا أَنْثَى



فِيرُونِيكَا بَهْشِيَّةُ الْوَرَق



فِيرُونِيكَا حَبِيقُ الْمَنَى

٢١٣٠٣ - فيرونيكا صغرى * ولباب البحر

Veronica officinalis (S). Véronique officinale, V. mla, Thé d'Europe (F). Common speedwell, Medicinal tea speedwell (E). Echter Ehrenpreis, Speedwell (D). Veronica officinale, Thé d'Europe, Quadenmuzzo (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية مصرية تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. تألف الإبراج والسيقان القليلة للزهر. أوراقها لينة مستديرة الطرف تستعمل استعمال الشاي وهي حديدية المنافع الصحية، تنقي الصدر والقلب || أنوارها سلبية التجميع || زرقاء اللون. مثالبها مستطلة الحجم، كثيفة الأجزاء.

٢١٣٠٤ - فيرونيكا التبغ * و فيز بود التبغ

Physopis nicotiana (S). Physopis du tabac (F). نوع من التريسي، حشرته تملو نحو ٣ م. لها ألسنة البصرة الخشبية السوداء الموح. تركب تنضج الخشب ويمنس التبغ وصارة أخلايا ينسب ما يعونه مرض الرق الأبيض || الأكر حامد الأجنبية. البرقة صفراء اللون تملو من ١ إلى ٢ م. راجع تريسي يفرق أيضا.

٢١٣٠٥ - فيزود * Physa (S).

Physa (F). Physa (E).

جنس حيوانات مائية من الغزويات مملات الإبريل وبصيلة الفيزيات. أنواعها المروعة الماهرة العدد منتشرة في سائر أنهر العالم وينتقل وينتقل. نوعها النباتات المائية || أصنافها مختلفة، صغيرة، رقيقة، مائة، شائعة، شفافة، ألب. أجسامها أطيحية لينة. رؤوسها واضحة. لوامسها مستطيلة مبطنة. أرجلها وحيدة، مستديرة المقدم، ذلقة المؤخر، حادة السطاح.

٢١٣٠٦ - فيزود Imperméable (F).

Impermable, Impervious (E).

أرض خرولة : سريمة السيل إذا أصابها نيت.

٢١٣٠٧ - فيزود Physalus (S).

Physala, Physalis (F).

جنس ضفاد من الثدييات فضيلة الفيزليات. أنواعها المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم مجار العالم || مستعمراتها تبدو كشدة من الألياف فضفية اللون يتبعها غلاف قابل للتهدية، أوسوي الشكل عند الانتفاخ فوق سطح الماء حيث يتوسع مع القوي أبنا يشاه.

٢١٣٠٨ - فيزود Physalides (S).

Physalides (F). Physalides (E).

فضيلة من الضفاد الثدييات البسوة. أنواعها المروعة تحسب تجمعت إلى جنس الفيزليات ويطرود.

٢١٣٠٩ - فيزود Physocarpus (S).

Physocarpus (F). Physocarpus (E).

جنس ميجرات مصرية من فضيلة الورديات. سؤفا متصبية تملو من متر إلى ثلاثة أمتار. أوراقها متعاقبة، معققة، عابدة، مفصصة ومنسدة الأطراف. أنوارها عتيقة التجميع، مختلفة الألوان || تزود الزرين في الخلال. ترطب في الأتربة المتعددة الانتماع، المنسوبة التركيب المنصري، الفلورة المواد الخفائية || أنواعها المروعة قليلة العدد، أشهرها التالية :

٢١٣٠٩ - فيرونيكا سرّوية

Veronica cupressoides (S). Véronique cyprès (F). نوع من الفيرونيكا وهي جنبة سرّوية مصرية تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها متصبية. فرونها دقيقة. أوراقها حشرية تملو نحو ٢ م. أنوارها سلبية التجميع، حادة الارتكاز، صفيرة اللد، ليلكية اللون || أنوارها يستمر طوال الصيف.

٢١٣٠٩ - فيرونيكا سبيلية * Veronica spicata (S).

Véronique en épi (F).

نوع من الفيرونيكا وهي بجملة تريينية مصرية تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها متعاقبة متعاقبة، نصلها أهليجي الشكل، منن الحافة، حديد المقصة. نورها سلبية التجميع مستطيلة السيلة الوسيلة. أنوارها كبيرة اللد وردية اللون || أنوارها يستمر من سريان إلى آب.

٢١٣٠٩ - فيرونيكا شرقية Veronica orientalis (S).

Véronique orientale (F).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة تريينية مصرية تملو نحو ٢٠ سم. ساقها ملتوية الطرف. أوراقها خفيفة النصل المفروض والمنس. أنوارها ليلكية أو وردية اللون، صفودية التجميع، عويوة الارتكاز، كوروسا حاشية النصل. أنوارها يستمر من تموز إلى آب.

٢١٣٠٩ - فيرونيكا صفراء Veronica lutea (S).

Véronique jaune (F).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة تريينية مصرية تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها يضيئة الشكل. نصلها منن الحافة ذات الزام الأسير. أنوارها صفودية التجميع، صفراء اللون، مسنخة البلات العليا || أنوارها يستمر من أيار إلى سريان.

٢١٣٠٩ - فيرونيكا عيسى القمل * Veronica snagaloïdes (S).

Véronique des sables (F). Speedwell (E). Ehrenpreis (D). Veronica mucronata (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية طيبة مصرية متنبها الأتربة الرملية. ساقها خشوية نحيلة. أوراقها صفيرة اللد، أهليجية الشكل، زبد النصل. أنوارها صفودية التجميع || زرقاء اللون، بحرية اللوح.

٢١٣٠٩ - فيرونيكا شجيرة Veronica incana (S).

Véronique blanchâtre (F).

نوع من الفيرونيكا وهي بجملة تريينية مصرية تملو من ٢٠ إلى ٧٠ سم. فرونها مزينة اللحاء. أوراقها متعاقبة متعاقبة، نصلها ساني الشكل، منن الحافة، خلي للشرة حل صفحتها، يدو كانه أشير اللون || أنوارها سلبية التجميع، زرقاء اللون. أنوارها وسيد السيلة يستمر من سريان إلى تموز.

٢١٣٠٩ - فيرونيكا قرد العين * Veronica beccabunga (S).

Véronique cressonnée, Beccabunga, Cressonnière, Cresson de cheval (F). Brooklime, Water pimpernel (E). Bachbunge Ehrenpreis (D). Bacabunga, Veronica cressone (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشبة برية مصرية تملو نحو ٢٠ سم. تعيش في المناء وعلى جوانب مجاري الماء. أوراقها صفيرة اللد، يضيئة الشكل، نصلها مالى البشرة، شديد الخضار. أنوارها صفيرة اللد ليلكية اللون، سبيلية التجميع || أوراقها مأكولة غشراء ويطرودة.



فيرونيكا سبيلية فيرونيكا من الشط



فيرونيكا قرد العين فيرونيكا مخزنية



فيز بود التبغ



فيزة



فيزوس

٢١٣١٠ - فيزوكرب الغلومي الورق

Physocarpus opulifolia (S).

Physocarpus à feuilles d'obier (F).

نوع من الفيزوكرب . موطنه بعض مناطق أمريكا الشمالية . ساقه تملو من ستر الى ثلاثة امتار . اوراقه ثلاثية او خمسية القصوص ، خلية الصفحات العليا ، مزلاء السفلى . ازهاره عتيق تتجمع . ازهاره يضاء اللون او ودية || تنموه يستمر من حزيران الى تموز

Physique (F). Physica (E).

٢١٣١١ - فيزيما

علم الطبيعة أو الفيزياء .

Physides (S).

Physidés (F). Physidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرغويات معنيات الارابل ودية الرغويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة متصلة الدم معظمها من مستحشرات الطبقة الجبورية . اما الانواع المعاصرة فنشرة في معظم انهر العالم وبحيراته وسنائه . قوتها النباتات المائية || اجناسها صغيرة ، رقيقة ، لامة ، شفافة ، حلزونة . شفاء الوب || اعرف اجناسها المعاصرة الفرية .

Biophysique (F).

٢١٣١٢ - فيزيياحية

علم يبحث في علاقة الفيزياء بالحياة . راجع فيزيويات .

Physiologie (F).

٢١٣١٤ - فيزيولوجية

في الفيزيولوجية ، الحلبا .

٢١٣١٥ - فيستولينا ، فطر الكبد

Fistulina hepatica (S). Fistuline, Fistule hépatique, Foie de bœuf (F).

فطر مأكول من فصيلة السميات يركب جلود بعض الاشجار الحرجية في الموطن الغظلية الرطبة . وهو كبير القد ، كبدى الشكل والحمى ، حشلى اللون ، اسمر القاعدة ، جابك الركيزة المتبقية . اغراس زهيدة لا تستحق الاهتمام .

٢١٣١٦ - فيسيجة باهرية

Phycita splendida (S).

Phycita splendide (F). Phycita splendida (E).

حشرة من فصيلة التارايات ودية حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم مناطق اوروبية المعتدلة الحارة . فرشتها واحة قوتها رقيق الازهار وطلوها . سرلتها قرضابة تموت تحت طاء الصنوبر وتنتج الشكبر قسب سيلان القرائع || جسمها يطول نحو ١٢ م . يسطها تراوح من ٣٠ الى ٣٢ م . رأسها صغير الجرم والظهر . عيناها يمتدات ، ماصحات . زباناها غطيلان . ملابسها دقيقة . مرشفها مستدل الطول . جوشنها ويطنها الى الكسني الاكثر المراج || ورشها الاناميان الى السرة الكسنية يطولها تقيح ابيض وزراش فراء . ورشها الخلفيان الى الطلمة يطولها شمشيح كسني يكتشف الاصاب وقاعدة الحنجر الخاربي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفرائشة في اواسط نيسان تسرح في الليل وتستن في النهار || الانثى تلقي المكن مباحدا بين شقوق السماء وتحت القشور . البور الاسروية يستمر نحو عشرة اشهر والسرقة منه يلونها الادراك تطول نحو ١٥ م . جسمها بين التقسيم السلمي ، بني اللون تملو



فيزولينا



غصنة

خسة خطوط جوية قاطبة . رأسها اسود . مهابا وواجبا الى الحطلى || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع يتقفي ضمن صلبة تسحبها السرقة بين قشور الصنوبر .

٢١٣١٧ - فيشركه

Fischeria (S).

Fischérie (F). Fischæria (E).

جنس حيوانات مائية من الرغويات صفحيات الحياض والارابل ومن فصيلة البيرينات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جميع بحيرات واهر افريقية الشمالية || اصنافها صغيرة القد ، شبه قلدوسية الشكل ، متساوية المصاريخ ، لامشادية الاضلاع . متاعها ثنائية ، طبقة صغيرة || تعيش في الاسمال . طوبها مأكولة مبتلة الصفت .

Gul (F).

٢١٣١٨ - فيشكة

في الحدال ، ج . فيائل .

Sporobolus (S). Sporobole (F).

٢١٣١٩ - فيسيم

جنس نباتات عشبية ، برية ، مرعوية ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة .

Nemestrina (S).

٢١٣٢٠ - فيسيمية

Némestrina (F). Nemastrina (E).

جنس حشرات من فصيلة الفيسبيات ودية ذوات الجناحين انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الانريقية || اجسامها كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٦ م . رؤوسها مسترسمة . عيونها كبيرة ، فارقة عنه الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل . ملابسها نحيلة . اعطائها شديدة الطول . كواسلها كثيفة الخمل . بطونها بارزة الحيد السكسي . اثوابها مبرقعة . ورشها شفافة . قوتها نحيلة || جميعها واحة تألف الغابات والمروج التي تكثر فيها الازهار . يرقاتها راحة او طفيلية . تتفلق على المصليات .

Nemestrinidae (S).

٢١٣٢١ - فيسيميات

Némestrinidés (F). Nemastrinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . تألف الغابات والمروج في زن الازهار || اجسامها ضخمة ، شبه يضيبة الشكل ، تطول من ٧ الى ٣٦ م . رؤوسها مسترسمة . عيونها كبيرة ، فارقة عنه الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل . اعطائها متباينة الجرم منها الصغيرة ومنها الكبيرة المستطيلة . ملابسها نحيلة او خامرة . كواسلها كثيفة الحلب . بطونها بيضاء اسطوانية ، مقنطرة الخشور . ورشها شفافة || يرقاتها غامضة ، حودية الشكل || اشهر اجناسها الفيسمة والولانة .

Plus-value (F).

٢١٣٢٢ - فيض

Increase in value, Increment (E).

هو الفرق الناتج عن ارتفاع ثمن الشيء بين تقديرين يختلف زمانها . وهو ايضا زيادة ما يتصفه الشيء من الثمن يما او تقديراً .

٢١٣٢٣ - فيض ، طفق

Débordement, Crue (F). Overflowing, Rising (E).

هو ازدياد المياه في الانهر وارتفاعها عن مستواها المألوف .

٢١٣٢١ - فَيْصَان

Inondation (F).

Inundation, Flood (E).

غمر المياه الطافية لبلاد أو مكان ما .

٢١٣٢٥ - فَيْصَرَج

Leptodermis (S).

Leptoderme (F).

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الفقيويات . أرواقها المسقوفة قليلة . سوقها منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ م . فروصها مفصلة متقابلة الإزديكاز . أرواقها ابيدة مسننة متقابلة ، نصلها ساني الشكل خالي البشرة على سطحه . إزادها الثوبية التبرج ، روثية التجميع ، يضاء القرن أو زرقاء أو بنفسجية .

٢١٣٢٦ - فَيْقَن ، قَرْقَل

Gloissement (F).

Clucking, Cluck (of hen) (E).

القيق : صوت الدجاج .

٢١٣٢٧ - فَيْقِل * ٥

Figulus (S). Figule (F).

جنس خنافس من ذبذبات الاجنحة صغريات القرن وصيلة المتفويات . أنواعه المروقة نحو ٢٠ اصطلحها البلاد الحارة والاعتوائية من العالم القديم || جميعها حرة تعيش في الغابات على الاشجار انتشارها الى الشقة السهام أو الكهبة السواد السماء . ريقها صغيرة ، اسطوانية الشكل ، صلبة ، كستية اللون . قوتها المواد الخشبية السائرة الى الاكل .

٢١٣٢٨ - فَيْكوريا رَجِيَا * ٥ ذُرَّةُ الْمَاء

Victoria regia (S). Victoria (F). Giant water lily (E).

Seekönigin (D). Victoria (F).

جنس نباتات مائية من فصيلة النيلوفاريات . اصطلحها مياه بحيرات البلاد الحارة والاعتوائية || أرواقها مستديرة ، نصلها جلد الصلصة ، صافي الشكل ، مكثف الخلة ، قطرها يراوح من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . وهو يطفو على وجه الماء ورائه زناد ليبي التسج اسطواني الشكل يطول من ٤٠٠ الى ٤٠٠ سم . || إزادها كبيرة الحجم ، عديدة البتلات . بتلاتها بنفسجية الفاضة ، قرمزية الزام الاو ، ريقها الثاني ، بيض الثالث والرابع . ثمارها كروية ضخمة شاذكة . بزورها ثشوية مأكولة ولذا يصعبها ذرة الماء .

٢١٣٢٩ - فَيْكُس ، فَيْكُون

Ficus

هو البقيع ، اطبله .

٢١٣٣٠ - فَيْكِل

Elephas (S).

Elephant (F). Elephant (E).

ج . افيال وفيول وفيلة . كنيته ابر الحجاج وابر الحريان وأبو غفل وأبو كلفوم وأبو مزاس . الاقنية فيلة ومعجم كنيتهام أم شبل || القليل جنس سبوانات ضخمة لينة من فصيلة الفيليات وربة الخرطوميات || جسمه معتدل الطول مغطى البشاة يرتكز على اربع قوائم خلفية عمودية الشكل . رأسه كبير ضخم . صيانه صغيرتان . اذنان كبيرتان مرسيتان . خرطومه جرم اللد ، بالغ الطول يلامس التربة . ناباه مستطيلتان نخيتان مقوستان || والقيل يعيش نحو ١٥٠ سنة وهو يبلغ كامل نضجه بمر ٢٥ سنة . محبل الاثني بدم ٢٢ شهراً تنقص في نهاية دخلا وأسدأ وزنه نحو ١٠٠ كيلو . قوته اصطناع البلاد الحارة يألف الاحراج والمناطق الرطبة . قوته الاشجار والجبلور والرايز ليقطعها بخرطومه ويدخلها الى

له تفسنها ويطنها || والقيل يسرح في طلب القوت من الساحة الثالثة صباحاً الى الساعة الثالثة ثم يرجع الى الخفيض كسائر الحيوانات حي الساعة الثالثة بعد الظهر فيقوم ويسرح عن جديد حتى انتصاف الليل حيث يرجع من جديد الى الساعة الثالثة صباحاً . وهو يتررب مرتين في اليوم ، الاول عند شروق الشمس والثانية قبل الليل أما وجبهه اليومية من القوت فتراوح من ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو || انولاه الثتان والأفريقي .

٢١٣٣١ - فَيْكِل إفريقيا * ٥

Elephas africanus (S).

Eléphant d'Afrique (F). African elephant (E).

لوح من القيل موطنه يمتد من غربي وجنوبي الصحراء الكبرى الى بلاد الحبشة . وهو اكبر وأضخم حيوان ارضي يعيش الآن . يطول من ٣ الى ٤ امتار . محيط بطنه يراوح بين ٦ و ٧ امتار وطول جمعه مع الخرطوم والذنب يراوح بين ٨ و ١٠ امتار . وزنه يراوح بين ٤٥٠٠ و ٥٥٠٠ كيلو أما ناباه فترتان من ٧٠ الى ٩٠ كيلو .

٢١٣٣٢ - فَيْكِل الْبَحْر

Elephant de mer (F).

هو الفيل ، اطبله .

٢١٣٣٣ - فَيْكِل هندي * ٥

Elephas indicus (S).

Eléphant d'Asie, E.de l'Inde (F). Indian elephant (E).

نوع من القيل موطنه اسراج الهند والاصام وبناليه والسيام والكوششين وبلق ... وهو حليم الجلة جسمها يطول من ٢٧٠ الى ٣٦٠ سم . طوله يراوح من ٧ الى ٨ امتار بما فيه الخرطوم والذنب . وزنه يراوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو وكل واحدة من نابيه تزن من ٢٠ الى ٤٠ كيلو . والقيل الهندي مشهور بحسن الخلق واتقاس القام . وهو يستخدم في القق الاعمال واستفكها فيقوم بها غير قيام . أما القيل الايش فهو من ذات النوع انما اصيب بالاحساب اي باندغام المادة اللينة في الجلة .

٢١٣٣٤ - فَيْلَادَلْفُوس

Philadelphus

نبات من السرفسيات يعرف بالسرجة ، اطبله .

٢١٣٣٥ - فَيْلَادِيَه

Filare (F).

هي الهادية ، اطبله .

٢١٣٣٦ - فَيْلَارِيُونُز

Filarion (F). Filaris (E).

دريدات تصيب نسيج الانسان والحيران سببا وصول يورضات الهذاب الى الجسم اما بطريق القتم أو عن طريق الجرح وما اشبه .

٢١٣٣٧ - فَيْكِل الْبَحْر

هو الفيل ، اطبله .

٢١٣٣٨ - فَيْكَلْمَكَة

Cacon (F).

هي الصلصة ، اطبله .

٢١٣٣٩ - فَيْكَلْجُونُ

Arum (F).

هو القرياق الايش ، اطبله .

٢١٣٤٠ - فَيْكُورَة

Phytachora (F).

هي البتيكة ، اطبله .

٢١٣٤١ - فَيْلُونُزَة

Akte des crudifera (F).

هي الكدوش ، اطبله .

٢١٣٤٢ - فَيْلُولُكَيْت

هو كهدب الزينج ، اطبله .



فيل



فيكتوريا ريجيا



فيل افريقي



فيل هندي

٢١٢٤٨ - فيلوكس الوزال * *Phylus genista* (S).*Phylus des genêts* (F).

حشرة غاشلة من فصيلة الفصيفيات . جسمها صغير يطول نحو ٥ م. ثوبها كثيف اللون يطول تمسح أبيض وتتقيد اسمر . رأسها عريض ، صغير غطتها مثل الطول . عينها صغيرتان ، بارزتان . زباناها دقيقان . كسيتان . كسلها عريسي الشكل . حبيبتها صغيرة . ظهراتها لاحف ، مستطيلة الخنجية الدققة . بطنها وبذنها الى الخلف الاسمر || تألف البراري والمواقع الدققة . يكثر وجودها على الوزال .

٢١٢٤٩ - فيلوكسيرة ، فيلوكسيرة *Phylloxera* (S).*Phylloxera* (F). *Phylloxera* (E).

جنس حشرات صغيرة القد وبمضها بجرية من فصيلة الارقيات ورتبة متجانسات الاجنحة || انواعها عديدة جميعها مؤذية انما اضرها واشدها اذى فيلوكسيرة الكرمة .

٢١٢٥٠ - فيلوكسيرة السندبان *Phylloxera quercus*, *Ph. coccinea* (S). *Phylloxéra du chêne* (F).

نوع من الفيلوكسيرة حمار اللون صغيرة القد تطول نحو ١ م. تركب اوراق السندبان فتؤذيها . مظهرها الخارجي بقع صفر لاقياسية الانتظام تملو نصل الارقاق فتذبلها وتقصي عليها .

٢١٢٥١ - فيلوكسيرة الصنم *Phylloxera salicis* (S). *Phylloxéra des saules* (F).

نوع من الفيلوكسيرة صغيرة القد تطول نحو ١ م. لونها الى السرة تمشي ضمن جوارح شعبة المادة ندية الشكل كاللغز وتكثر عند ابط الانسان والبرام والارقاق . تنصص النسخ من الاربعة الشبكية وتؤدي النبات وتضيقه .

٢١٢٥٢ - فيلوكسيرة الكرمة * *Phylloxera vastatrix*, *Rhizaphis vastatrix*, *Peritymbia vitifolia*, *Pemphigus vitifolii*, *Xerampelus vastator*, *Dactylospheora vitifoliae* (S). *Phylloxéra de la vigne* (F).

نوع من الفيلوكسيرة وهي حشرة صغيرة القد ، رباعية الاشكال تتميز بالفوارق التالية : الشكل الاول يشبه الفيلوكسيرة الفصية وهي معارة ، لا شقية ، مستطيلة المنك القالب تمشي على الارقاق || الشكل الثاني يشبه الفيلوكسيرة الجردية وهي معارة ، لا شقية ، مستطيلة المنك القالب تمشي على الجذور || الشكل الثالث يشبه الفيلوكسيرة الخنجة وهي لا شقية مستطيلة المنك القالب تمشي على الارباق وفي التربة حتى اسلخها الاخير ثم تخرج وتطير || الشكل الرابع يشبه الفيلوكسيرة الشقية ذات الاعضاء التناسلية الكاملة وهي عادمة الجناح والمنك .

كيفية تطور الحشرة - يبتعث بالانثى الحشرة التي تمسك واسعة في ايلول تدمي مكة مكة الشتاء تموت على ارضها . وتكتبها هذه اسطوانية الشكل زيتونية اللون ، تكاد لا تكون متطورة ، طولا ٢٥٠ م. وعرضها ١٢٠ م. لتلقاها من عقبها في احدى طبقات القشرة تنبت على حافة حتى الربيع حيث يتحول لونها الى الاصفر ثم يعقبه اللون الذي يتم في نيسان . فالحشرة اذا تقضي الشتاء ككتنه ثم تنبت في الربيع ينجم عنها اما الفصية التي تتساق الساق والفروع الى ان تستقر على الارقاق او الجردية التي تدور في التربة حتى تسوي الجذور والجذيرات .

٢١٢٤٧ - فيلوكس الادغال * *Philaenus spumarius* (S). *Philaenus des buissons* (F).

حشرة من فصيلة السركويات . جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م. ثوبها غطت السرة السوداء والصفراء || رأسها نصف دائري الشكل ، اصفر اللون . غطتها ثلاثي الاجزاء . عيناها كبيرتان . زباناها قصيران . كسلها اصفر اللون ، اسوده في الزايم الاخير . حبيبتها مزوانية . ظهراتها كامل الخنجية ، لاحف ، اسود اللون ، اصفر الحمار . وريثها عشائيان ، شفافان . بطنها شديد السرة ، اصفر المجد . قوائمها الى السرة || يكثر وجودها في البراري الدققة وعلى السيابات الحية . قريبا نضج الارقاق .



فيلوكس السناير

٢١٢٤٨ - فيلوكس *Phyllanthus* (S).*Phyllanthus* (F). *Phyllanthus*, *Tipsey-wood* (E). *Blatzblume* (D). *Flanto* (I).

جنس اشجار وجنبات برية ورتبية من فصيلة السويديات . لورائها معقدة متعاقبة ، نصلها يبيض الشكل جامد الصفرة . ازهارها صغيرة القد ، فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، سداسية البتلات ، ثلاثية الفصل والامدية || انوعه المعروفة نحو ٤٠٠ جميعها استوائية المنبت ، مظهرها بري وبمضها تربس وبسبب انواع طيبة تلعب السيلان وبغيرها تنفجر الاصباح لتستعمل في تنوير السمك لاصطياده .

٢١٢٤٩ - فيلوكس السناير * ، أمثج *Phyllanthus emblica* (S). *Emblique officinale*, *Grane myrobalane*, *Myrobalanenbaum* (D). *Mirobalano emblica* (I).

شجرة برية من البجيات قريبة الشبه من الفيلوكسيرة متنبية لند ، تستعمل في الطب لمعالجة الزنقة .



فيلوكس

٢١٢٤٦ - فيلوكس الاميات * *Philopotamidae* (S).*Philopotamidae* (F). *Philopotamidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة حلوقيات الاجنحة . اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اخصها الجبال حيث الغابات وجدول الماء . اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . بسطة اجنتها تقارب من ١٥ الى ٣٦ م. اجنتها شديدة السرة يطولها تقطيع ملهب . جميعها سوداء اللون . رؤوسها وصغورها مشاة حلق اصفر تطير في النهار . طيراتها قصير الشوط ، سريع الحركة || اساريها مفترسة ، طليقة ، تمشي في المياه الجارية . تصنع شبكا قمية الشكل تلتصق فيها فرائسها .

اشهر اجنتها :

Philopotamus (S).*Chimarra* (S).

الفيلوپاتاموس

الشمار

٢١٢٤٧ - فيلوكس *Phyllornis* (S).*Phyllornis* (F).

جنس طير من الجوارح شرويات المتأخرات وفصيلة الكيميتيات . انوعه المعروفة قليلة العدد اسطوانات تمتد من الهند الى جزر الزايج || اجسامها تشبه البيليل بهامته وشكله . اثوابها ملونة زاهرة الخضاب || جميعها غريبة ، تألف حياة الاسر وتقتبس الاغان وترددها .



فيلوكسيرة الكرمة



فيلمون

٢١٣٥٤ - فيليومون * Philémon, Phylédon (F).
جنس طير من الجواثم ربيقات المنقاريات وعضلة الفشريات .
أنواعه المعروفة قليلة العدد أحياناً جزر الزانج وبرتغال .
أجسامها متوسطة الحجم قدما قد الشجور . رؤوسها
صغيرة . منقارها مقبضة مغطاة القشور . أذنابها مستطيلة ،
مقطوعة الأطراف . أوتارها متباينة الألوان يسود فيها
الأخضر اللامع أما بطونها فبنية اللون أبيضاء .
تدتن في الانحجار الرطبة . حشمتها من ٤ إلى ٦ يمشات ترزها
وسحها دون الذكر الذي يئذن لها الغناء .

٢١٣٥٥ - فيلوتريكوم * Phylotrichum (S).
هو النسيجة جنس ظفوف مجهرية ، أظلمها .

٢١٣٥٦ - فينتة * Gyps de Ruppell (F).
هي تقشمان الارش ، أظلمها .

٢١٣٥٧ - فينولوجيا * Phénologie (F).
Phenology (E).
هي علم الظواهر ، علم يبحث في الوقت الذي تحصل فيه
دورياً للظواهر الخاصة بالدورة الحياتية النباتية وتأثير
حوائل البيئة في هذه الظواهر أهمها البرودة والارتفاعات
واردك الشر والاحبال .

٢١٣٥٨ - فينج * Vin (vieux) (F).
هو الخمر العتيقة الصافية .

٢١٣٥٩ - فيم * Sigle (F). Sigle, Outline (E).
الفهم الحرف الرئيسي المفتاح المصطلح التعبير عن كلمة .
وهو أيضاً مجموعة من الحرف الأولية تستعمل التعبير عن
مجموعة كلمات . ج . فيم .

٢١٣٦٠ - فينتة * Spizæus bellinacous (S).
Spizæba belliqueux, Griffard (F).

طائر من الالاه ينتمي الى عائلة الفصيات وعضلة الفشريات .
أصنافه البلاد الحارة الأفريقية أخصها جبال الحبشة . طوله
نحو ١٠٠ سم . وهو لهيف القوام ، عنق الرأس ، قصير
المنقار ، مستطيل اللسان . ظهره ورأسه الى الكهبة تتخللها
سرة فضية . سقطة الى السرة المنقطة المرقشة يتفرعها
خط أبيض . يملكه ويحولها الى البياض الأزرق المروج .
ذنبه الى الكهبة الرمادية تتفرع ٦ خطوط عابطة شديدة
السمرة ٥ وهو من الأوباد يعيش ذكراً وإناثاً لا يفرقها
سوى الحوت . قوته الغناء والقنوق . يئن ذكره في
قوة الشجرة الرطبة او في بعض أوقات الصبح النائية
الشاذية ٥ أثناء قنص وقتين مستمرتين قطر الواحدة
يرأوح بين ٨ و ٩ سم . تحضنها وحدها نحو ٥ أسابيع .



فينة

الجلجلة - أصغر قدماً من الفصية طولها نحو ١٠٠٠ م .
لونها الى الصفار الكبير وهي شديدة الاذى . أحياناً
الموسمية تراوح بين ٦ و ٨ ويصل شحرات الجبل الأخير
بقضي ياله الشري تحت قشور الجفوف ٥ فسردها
محسور بلطاف تتسلها لان ونحوها الجفوف والجفوف ، التي
تميش عليها وفيها ، قد يبلغ بعض القرويات .

المنجحة - هي من حيث الأصل حشرة مقبضة دخلت
الربة بعد انسلخها الثالث فتحوورت لها بعد انسلخ
تكميلي رابع الى الفوف ثم الى حشرة منجحة طولها نحو ٢
م . أي ٢٠٠٠ م . وهي لا شقة الجلس ، صفراء اللون .
رمانية الاجنحة الشفافة . تقص من ٤ الى ٨ مكثات
مختلفة الاحجام تقص مكن الصف . الصغرى منها وقد
تطول نحو ٢٦٠ م . تنقف من الذكور . والذكور
تطول نحو ٤٠٠ م . تنقف من الاناث .

الشفقة - هي الكاملة الأعضاء التناسلية تنقف من مكن
الصف المائل الى الحشرة المنجحة . وهي صفراء اللون حادة
المنك والاجنحة والاذى . الذكر منها يطول من ٢٦٠ الى
٣٨٠ م . والانثى من ٤٠٠ الى ٤٦٠ م . ٥ سفادها
يبتنى بعد النقف بيوم أو يومين تقص الانثى بعده مكنة
واحدة تعرف بمكنة الشتاء التي جنبها على ذكرها في اول
هذا الجث .

الضرباء الحشرة - اضطرابها جسمية لانها تمت الكومة بعد
ان تقضي على الجفوف والاوراق .
مكافحتها - طرق مكافحتها متعددة منها القنص بالاد نحو
٢٥ يوماً او استعمال الموشير النشطة القمالة السامة التي
يصطب القيام بها تفكراً لهابطة اكلافها وما قد تسببه من
عواقب . لذلك يحسن استعمال الصلح على كومة اسريكية
بنية وهو ما مكن اربعة من تجديد كرومها بعد ان
قنص عليها الفيلوكسرة .

٢١٣٥٣ - فيلانتيد * Elephantidae (S).
Elephantidae (E).

فصيلة الفيلة من رتبة الخرطوبيات .

أنجزت « المطبعة الكاثوليكية ش.م.ل. »
في عاريا - لبنان
طباعة الجزء الثاني من « الموسوعة في علوم الطبيعة »
في العام ١٩٨٨

*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.*

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume II
2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE



Dar el-Machreq sarl
Beyrouth

**ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**



Der al-Machreq east
Boîte Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :



Librairie Orientale - Boîte Postale 1986
Beyrouth, Liban



ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH